HERB

IMPERIAL MYCOLOGICAL
2 MAY 1939
INSTITUTE

Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/index-kewensis_1931-1935_supplement-9

INDEX KEWENSIS

PLANTARUM PHANEROGAMARUM

SUPPLEMENTUM NONUM

NOMINA ET SYNONYMA OMNIUM GENERUM ET SPECIERUM

AB INITIO ANNI MDCCCCXXXI USQUE AD FINEM ANNI MDCCCCXXXV

NONNULLA ETIAM ANTEA EDITA COMPLECTENS

COMMONWEALTH MYCOLOGICAL INSTITUTE

DUCTU ET CONSILIO A. W. HILL

CONFECERUNT

HERBARII HORTI REGII BOTANICI KEWENSIS CURATORES

OXONII

E PRELO CLARENDONIANO

M DCCCC XXXVIII

LONDINI ET NOVI EBORACI

APUD HUMFREDUM MILFORD, A.M.

OXONII: EXCUDEBAT IOHANNES JOHNSON, A.M.,
ARCHITYPOGRAPHUS ACADEMICUS

MONITUM

HOC nonum Indicis Kewensis Supplementum eadem fere rerum dispositione qua Supplementa priora conditum est. Secundum Regulas Internationales Nomenclaturae Botanicae, Amstelodami anno MCMXXXV recensas, citationis ratio tamen quoad sequentia mutata est.

I In combinationibus novis e prioribus confectis primum auctoris pristini nomen inter parentheses, deinde nominis novi auctor, postremo citatio datur (vide Art. 49).

II Comma, olim inter plantae et auctoris nomina insertum, nunc omissum est.

III Hybridarum nomina signo × vel + praenotata sunt.

IV Nominum genus grammaticum, ubi oportuit, commutatum est, ut Regulo 72 Amstelodami emendato pareatur.

Sicut in Supplementis VII et VIII, tabula nominum genericorum novorum sub familiis alphabetice dispositorum maiori usui botanicorum suppeditatur.

Grates magnae iterum sunt habendae Mariae L. Green herbarii Kewensis custodi et T. A. Sprague Doctori adiuvantibus M. I. Skan et S. Wilson quorum fide ac diligentia opus tempore praescripto perfectum est.

ARTHUR W. HILL

Datum ex horto Regio Kewensi
mense Novembri A. S. MCMXXXVIII.

INDICIS KEWENSIS

SUPPLEMENTUM NONUM

NOMINA PLANTARUM PHANEROGAMARUM OMNIA

ANNIS M.DCCCCXXXI—M.DCCCCXXXV EDITA

COMPLECTENS

ABAMA—ACACIA

ABAMA Adans. (Liliac.).
asiatica (*Maxim.*) *Makino in Journ. Jap. Bot.* vii. 4 (1931): Narthecium asiaticum.

ABATIA Ruiz & Pav. (Flacourtiac.; Samydac., Gen. Pl.).
canescens *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 951 (1934).—Peruv.
macrostachya *Killip in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1934, xxiv. 50.—Peruv.
mexicana *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 318 (1931).—Mexico.

ABDOMINEA J. J. Smith (Orchidac.).
macranthera (*Ridley*) *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 54 (1932): Saccolabium macranthera.

ABELA Salisb. in Quart. Journ. Sc. & Arts, ii. 312 (1817), in obs. *PINACEAE*.

ABELIA R. Br. (Caprifoliac.).
sanguinea (*Makino*) *Makino in Journ. Jap. Bot.* i. 14 (1917): A. spathulata var. sanguinea.

ABIES Mill. (Pinac.; Conif., Gen. Pl.).
Abies (*L.*) *Rusby in Bull. Pharm.* 1892, reimpr. p. 16: Pinus Abies.
brevifolia (*Hort.*) *Hort. ex Dallimore in Rep. Conif. Conf. R.H.S. 1931* (*Conif. in Cult.*) 9 (1932): A. alba var. brevifolia.
Georgei *Orr in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 1 (1933).—China (Yunnan).
Hickeli *Flous & Gaussen in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse*, 1932, lxiv. 24.—Mexico.
marylandica *Hort. ex Dallimore & A. B. Jackson, Handb. Conif.* 340 (1923), in syn.: Picea nigra.
oregona *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1138 (1895), in syn.: A. grandis.
Pardei *Gaussen in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse*, 1928, lvii. 358 (1929).—Hort.
Parlatorei *Hort. ex Dallimore & A. B. Jackson, Handb. Conif.* 349 (1923), in syn.: Picea pungens.
Parryana *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1241 (1895), in syn.: Picea pungens.
Pindrow *Royle, Ill. Bot. Himal.* t. 86 (1836).—Himal.
pumila *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1241 (1895), in syn.: Picea excelsa f. pumila *Beissn.*
×speciosa *Hort. ex Vilmorin, l. c.* 1238, in obs.—Hab.?
Wittmanniana *Hort. ex Vilmorin, l. c.* 1241, in syn.: Picea orientalis.

ABIETIA Kent in Veitch, Man. Conif. ed. Kent, 474 (1900): **Pseudotsuga** Carrière (Pinac.).
Douglasii (*Lindl.*) *Kent, l. c.* 476, 478: Abies Douglasii.
Fortunei (*A. Murr.*) *Kent, l. c.* 485, 486: Abies Fortunei.

ABOLBODA Humb. & Bonpl. (Xyridac.).
excelsa *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxv. A. No. 12, 16 (1933).—Venez.
pervaginata *Malme, l. c.*—Bras. (Pará).
Sprucei *Malme, l. c.* 17.—Venez.

ABORTOPETALUM Degener, Fl. Hawaiiensis, Fam. 221 (1932). *MALVACEAE*.
sandwicense *Degener, l. c.*—Ins. Sandvic. (Oahu).

ABRAMSIA Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu, No. 91, 27 (1932). *RUBIACEAE*.
trichotoma *Gillespie, l. c.* 29.—Ins. Viti.

ABROMEITIELLA Mez in Bot. Archiv, xix. 460 (1927). *BROMELIACEAE*.
abstrusa *Castellanos in An. Mus. Nac. Buenos Aires*, xxxvi. 369 (1931).—Argent.
brevifolia (*Gris*) *Castellanos, l. c.* 371: Navia brevifolia.
chlorantha (*Hauman*) *Mez in Engl. Pflanzenreich, Bromeliac.* 279 (1935): Lindmania chlorantha.
pulvinata *Mez in Bot. Archiv*, xix. 460 (1927).—Argent.

ABRONIA Juss. (Nyctaginac.).
Wootoni (*Standley*) *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 39: Tripterocalyx Wootoni.

ABROTANELLA Cass. (Compos.).
trichoachaenia *Cabrera in Rev. Chil. Hist. Nat.* 1934, xxxviii. 85.—Chile.

ABRUS Adans. Fam. ii. 327 (1763). *LEGUMINOSAE*.
repens *Tisserant in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1933, Sér. II. v. 332.—Afr. Gall. Centr.
Schimperi *Hochst. ex Taub.*; *Baker in Oliv. Fl. Trop. Afr.* ii. 175 (1871), descr.—Nubia; Abyss.
Wittei *E. G. Baker in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxi. 303 (1932).—Congo Belg.

ABUTA Aubl. (Menispermac.).
velutina *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 361.—Venez.

ABUTILON Mill. (Malvac.).
barrancae *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 57 (1933–5).—Mexico.
cryptopetalum *Caum in Degener, Fl. Hawaiiensis*, Fam. 221 (1933).—Ins. Sandvic.
eremitopetalum *Caum in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu*, x. No. 15, 7 (1934), in adnot.: A. cryptopetalum *Caum*.
eriocarpum *Speg. ex Stuckert in An. Soc. Cient. Argent.* 1932, cxiv. 9, nomen.—Argent.
Gebauerianum *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 607 (1933).—China (Yunnan).
hybridum *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 135 (1894).—Hab.?
paniculatum *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 606 (1933).—China (Szechuan).

ABUTILON:—
roseum *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 607 (1933).—China (Yunnan).
sandwicense (*Degener*) *Christoph. in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu*, x. No. 15, 4 (1934): Abortopetalum sandwicense.
Woronowii *Ulbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 520 (1932).—Venez.

ACACIA Mill. (Legumin.).
Ankokib *Chiov. Fl. Somala*, II. 190 (1932).—Somal. Ital.
barattensis *J. M. Black in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1932, lvi. 42.—S. Austral.
benadirensis *Chiov. Fl. Somala*, II. 183 (1932).—Somal. Ital.
brunnescens *C. E. Parkinson in Kew Bull.* 1932, 103.—Lower Burma.
Burttii *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 342.—Tanganyika Terr.
chariessa *Milne-Redhead in Kew Bull.* 1933, 143.—S. Rhodesia.
compta *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* ii. 268 (1834).—Bras.
Derwentii *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 228 (1894), in syn.: A. dealbata.
Eggelingii *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 263.—Uganda.
filicifolia *Cheel & Welch in Journ. & Proc. Roy. Soc. N. S. Wales*, 1931, lxv. 232 (1932).—Austral. (N. S. Wales).
Gillettiae *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xvii. 343 (1932).—Transvaal.
Gorinii *Chiov. Fl. Somala*, II. 194 (1932).—Somal. Ital.
Hildebrandtii (*Vatke*) *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxx. (*Hist. Nat. Pl.* i. texte) 63 (1902): Calliandra Hildebrandtii.
Joachimii *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 507 (1935).—Tanganyika Terr.
laeta *R. Br.*; *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. 508 (1842), descr.—Abyss.
lasiopus *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* ii. 267 (1834).—Bras.
Lathouwersii *Staner in Ann. Soc. Sc. Brux.* Sér. B, lv. 311 (1935).—Congo Belg.
mattogrossensis *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 13, 45 (1931).—Bras. (Matto Grosso).
media *Colla, Herb. Pedem.* ii. 262 (1834), in obs.: A. alba *Colla*.
mollicoma *Mart. ex Colla, l. c.* 267.—Bras.
myriophylla *Mart. ex Colla, l. c.* 266.—Bras.
nayaritensis *Standley in G. Ortega, Apuntes Fl. Indig. Sinaloa, Cat. Sist. Pl. Sinaloa*, 19 (1929), nomen.—Mexico.
nervosula *Chiov. Fl. Somala*, II. 192 (1932).—Somal. Ital.
oxyosprion *Chiov. l. c.* 188.—Somal. Ital.

ACACIA :—
Passargei *Harms apud Passarge*; *Harms in Engl. Pflanzenw.* Afr. iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 384 (1915), in obs.—Bechuanaland Protect.
platyosprion (*Chiov.*) *Chiov. Fl. Somala*, II. 187 (1932), in ic.: A. Senegal var. platyosprion.
plumosa *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* ii. 267 (1834).—Bras.
pseudoglauca *Chiov. Fl. Somala*, II. 191 (1932), in obs.—Somaliland.
pterocarpa *Bert. ex Colla, Herb. Pedem.* ii. 265 (1834).—Ind. occ. (Guadaloupe).
ramosissima *Mart. ex Colla, l. c.* 268.—Bras.
Rorudiana *Christoph. in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo*, lxx. 76 (1932).—Ins. Galapag.
rubiginosa *Colla, Herb. Pedem.* ii. 268 (1834).—Bras.
Schliebenii *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 507 (1935).—Tanganyika Terr.
Sennii *Chiov. Fl. Somala*, II. 200 (1932).—Somal. Ital.
Shrevei (*Britton & Rose*) *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 40: Acaciella Shrevei.
sinuata (*Lour.*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n.s. xxiv. ii. 186 (1935): Mimosa sinuata.
stenocarpa *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 13, 46 (1931).—Bras. (Matto Grosso).

ACACIELLA Britton & Rose (Legumin.).
curassavica *Britton & Killip in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1934, xxiv. 47.—Ind. occ. (Curaçao).

ACALYPHA L. (Euphorbiac.).
brachystachya *Hornem. Cat. Hort. Hafn.* 1; *Willd. Enum. Hort. Berol.* 992 (1809).—China.
compacta *Hort. ex C. T. White in Gard. Chron.* 1933, Ser. III. xciv. 343.—Austral. (Queensland).
cupricola *Robyns in Nat. Tijdschr.* xiv. (Congr. Num.) 103 (1932), nomen.—Congo Belg.
hirsuta *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* v. 114 (1836), in obs.—Bras.
Hookeri *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 26 (1931): A. cordifolia *Hook. f.*
pauciflora *Hornem. Cat. Hort. Hafn.* 1; *Willd. Enum. Hort. Berol.* 992 (1809).—China.
pulchrespicata *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1932, lxxvii. Beibl. 19, 228.—Ins. Loyauté.
raivavensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 145 (1935).—Ins. Austral. (Raivavae).
rapensis *Forest Brown, l. c.* 146.—Polynes. (Ins. Rapa).
ruderalis *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* v. 114 (1836), in obs.—Bras.
Stokesii *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 146 (1935).—Polynes. (Ins. Rapa).
subsana *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* v. 113 (1836).—Bras.
suirebiensis *Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1933, v. 178.—Formosa.
Wilderi *Merrill in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 86, 64 (1931).—Ins. Cook (Rarotonga).

ACAMPE Lindl. (Orchidac.).
praemorsa (*Roxb.*) *Blatter & McCann in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxv. 495 (1932): Epidendrum praemorsum.

ACANTHEPHIPPIUM Blume (Orchidac.).
pictum *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 666.—Formosa.
unguiculatum (*Hayata*) *Fukuyama, l. c.* 1934, xlviii. 301: Tainia unguiculata.

ACANTHOCALYCIUM Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC, 224, 412 (1935). *CACTACEAE.*
chionanthum (*Speg.*) *Backeb. l. c.* 225: Echinocactus chionanthus.
formosum (*Hort. ex Pfeiff.*) *Backeb. l. c.* 224: Echinocactus formosus.
hyalacanthum (*Speg.*) *Backeb. l. c.* 225: Lobivia hyalacantha.
Klimpelianum (*Weidl. & Werderm.*) *Backeb. l. c.*: Echinopsis Klimpeliana.
oreopogon (*Speg.*) *Backeb. l. c.*: Lobivia oreopepon.
Peitscherianum *Backeb. l. c.* 225, 412.—Argent.
spiniflorum (*K. Schum.*) *Backeb. l. c.* 226: Echinocactus spiniflorus.

ACANTHOCALYCIUM :—
thionanthum (*Speg.*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 227 (1935): Echinocactus thionanthus.
violaceum (*Werderm.*) *Backeb. l. c.* 226: Echinopsis violacea.

ACANTHOCEREUS Britton & Rose (Cactac.).
acutangulus (*Hort. ex Pfeiff.*) *A. Berger, Kakteen*, 337, indice, 124 (1929); *Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 303 (1935): Cereus acutangulus.
maculatus (*Weing.*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, l. c.*: Cereus maculatus.

ACANTHOGONUM Torr. (Polygonac.).
polygonoides (*Torr. & A. Gray*) *Goodman in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1934, xxi. 91: Chorizanthe polygonoides.

ACANTHOLIMON Boiss. (Plumbaginac.).
balchanicum *Korovin in Trans. Sc. Soc. Turk.* i. 79 (1923).—Transcasp.
compactum *Korovin, l. c.* 83.—Turkestan.
creticum (*Boiss.*) *K. H. Rechinger in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1935, lxxxiv. 180: A. androsaceum var. creticum.
gramineum *Korovin in Trans. Sc. Soc. Turk.* i. 82 (1923).—Turkestan.
khorassanicum *Czerniak. in Bull. Applied Bot., Leningrad*, 1929–30, xxiii. No. 5, 61 (1931), in obs.—Persia.
marmoreum *Korovin in Trans. Sc. Soc. Turk.* i. 80 (1923).—Turkestan.
purpureum *Korovin, l. c.* 81.—Turkestan.
schemachense *Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 216 (1932).—Caucas.
talassicum *Korovin in Trans. Sc. Soc. Turk.* i. 83 (1923).—Turkestan.

ACANTHOPALE C. B. Clarke (Acanthac.).
Labordei (*Léveillé*) *Hand.-Mazz. in Sinensia*, v. 20 (1934): Strobilanthes Labordei.

ACANTHOPANAX Miq. (Araliac.).
longipes *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 696 (1933).—China (Yunnan).
malayanus *M. R. Henderson in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 105 (1933).—Penins. Mal.
pentaphyllus (*Sieb. & Zucc.*) *Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg.* xx. 79 (1881): Aralia pentaphylla.
phanerophlebius *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 12 (1934).—China (Kwangtung).

ACANTHOPHIPPIUM Blume (Orchidac.).
[Vide ACANTHEPHIPPIUM.]

ACANTHOPHYLLUM C. A. Mey. (Caryophyllac.).
Korshinskyi *Schischk. in Trav. Mus. Bot. Acad. Sc. URSS*, xxiv. 39 (1932).—Transcasp.
tadshikistanicum *Schischk. l. c.* 40, in syn.: Allochrusa tadshikistanica.

ACANTHOPYXIS Miq. ex Lanj. Euphorbiac. Surinam, 128 (1931); et in Pulle, Fl. Surinam, ii. (Meded. K. Ver. Kol. Amst. xxx.) 42 (1932), pro syn.: **Caperonia** St. Hil. (Euphorbiac.).
crotonoides *Miq. ex Lanj. ll. cc.*, pro syn.: Caperonia corchoroides.

ACANTHORRHIZA H. Wendl. in Gartenflora, xviii. 241 (1869), in adnot.; et in Kerch. Palm. 230 (1878); et in Bot. Zeit. 1879, xxxvii. 147. *PALMAE.*
aculeata (*Liebm.*) *H. Wendl. in Gartenflora*, xviii. 241 (1869), in obs.: Trithrinax aculeata.
Kalbreyeri *Dammer ex Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 313 (1932).—Colomb.
Warscewiczii *H. Wendl. in Gartenflora*, xviii. 242 (1869), in adnot.—Costa Rica; Panamá.

ACANTHOSTACHYS Klotzsch (Bromeliac.).
exilis *Bertoni in An. Cient. Parag.* Ser. II. No. 4, 301 (1919); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 141.—Argent.; Parag.

ACARPHA Griseb. (Calycerac.).
agglomerata (*Miers*) *Stapf in Bot. Mag.* sub t. 9272 (1932): Nastanthus agglomeratus.
laciniata (*Ball*) *Stapf, l. c.* t. 9272: Boopis laciniata.

ACER L. (Acerac.; Sapindac., Gen. Pl.).
acinatum *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 186 (1894), in syn.: A. Ginnala.
acutum *Fang in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., viii. 164 (1932).—China (Chekiang).

ACER :—
angustilobum *Hu in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 154.—China (Kwangsi).
assyriacum *Pojark. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 145 (1933).—Cappadocia; Kurdistan.
×Avilae *Font Quer & Rothmaler in Sched. Fl. Iber. Select.* Cent. 1. No. 56 (1934).—Hispan.
coreanum cf. *Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. p. (1), japonice.—Corea.
decandrum *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xi. 47 (1932).—China (Hainan).
dimorphifolium *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* xi. 201 (1932).—China (Fokien).
Fenzelianum *Hand.-Mazz. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1933, lxxxii. 250.—Indo-China (Tonkin).
heptalobum *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 211 (1931).—China (Yunnan).
Keckianum *Aschers. & Sint. ex Pojark. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 351 (1933), in syn.: A. tauricola.
kobakoënse *Nakai, Rep. Veg. Daisetsusan Mts.* 13, 21 (1930), nomen seminudum; *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 123, descr.—Japon. (Yezo).
lucidum *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* xi. 197 (1932).—China (Kwangtung).
Metcalfi *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 221.—China (Hunan; Kwangtung).
micro-Sieboldianum *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 124.—Corea.
pauciflorum *Fang in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., vii. 166 (1932).—China (Chekiang).
pedunculatum *Hao in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, ii. 178 (1934); *et in Fedde, Repert.* xxxvi. 196 (1934).—China (Shensi).
pentaphyllum *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 212 (1931).—China (Szechuan).
×Peronai *Schwerin in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1901, 59.—Ital.
persicum *Pojark. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 147 (1933).—Persia.
pseudolaetum *Radde-Fomin in Journ. Bot. Akad. Sc., Ukraine*, Nos. 3–4, 44 (1932); *Pojark. l. c.* 281, in syn.: A. turkestanicum.
pubipalmatum *Fang in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., viii. 169 (1932).—China (Chekiang).
sino-oblongum *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* xi. 202 (1932).—China (Hongkong).
sinopurpurascens *Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., vi. 62 (1931).—China (Chekiang).
Stevenii *Pojark. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 150 (1933).—Crimea.
subglaucum *Bush in Am. Midl. Nat.* 1931, xii. 502.—U.S.A. (E. States).
subintegrum *Pojark. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 152 (1933).—Japon.
subtrinervium *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* xi. 200 (1932).—China (Fokien).
sycopseoides *Chun in Hook. Ic. Pl.* xxxii. t. 3160 (1932).—China (Kwangsi).
taiwanense *Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1933, v. 180.—Formosa.
talyschense *Radde-Fomin in Bull. Jard. Bot. Kieff*, xii–xiii. 73 (1931).—Transcaucas.
Treleaseanum *Bush in Am. Midl. Nat.* 1931, xii. 502.—Am. bor.-or.
turcomanicum *Pojark.*; *Pojark. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 143 (1933), descr.—Transcasp.
Yui *Fang in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., ix. 235 (1934).—China (Szechuan).

ACERAS R. Br. (Orchidac.).
fragrans *Kotschy ex Soó in Bot. Archiv*, xxiii. 147 (1928), pro syn.: Orchis punctulata.

ACERATES Ell. (Asclepiadac.).
delticola *Small, Man. Southeast. Fl.* 1067 (1933).—U.S.A. (Louisiana).

ACERATIUM DC. (Elaeocarpac.; Tiliac., Gen. Pl.).
concinnum (*S. Moore*) *C. T. White in Kew Bull.* 1932, 42: Elaeocarpus concinnus.

ACERATIUM :—
Doggrellii *C. T. White in Kew Bull.* 1932, 42.—Austral. (Queensland).
ferrugineum *C. T. White, l. c.* 43.—Austral. (Queensland).
ochraceum (*Ridley*) *Schlechter in Engl. Jahrb.* lv. 194 (1918), in obs.: Elaeocarpus ochraceus.

ACETOSELLA (Meissn.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, n.s. xvii. 145 (1869). *POLYGONACEAE.* [RUMEX sect. ACETOSELLA Meissn.].
Acetosella (*L.*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 446 (1933): Rumex Acetosella.

ACHANIA Sw. (Malvac.).
Hunnemannii *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 142 (1894), in syn.: Malvaviscus mollis.

ACHILLEA L. (Compos.).
× adulterina *Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1906, xii. 91.—Hort.
Alexandri-Regis *Bornm. & Rudsky in Journ. Russ. Sc. Inst. Belgrad.* x. 198; *et in Fedde, Repert.* xxxviii. 390 (1935).—Serbia.
× ambigua *Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1906, xii. 91.—Hort.
× Bilekii *Sünderm. l. c.*—Hort.
× cinerascens *Sünderm. l. c.*—Hort.
× confusa *Sünderm. l. c.*—Hort.
crassifolia *Dietr. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 463 (1834).—Hab. ?
croatica *Hornem. ex Colla, l. c.*—Hab. ?
dubia *Fisch. ex Colla, l. c.*—Hab. ?
flava *Hort. ex Colla, l. c.* 462.—Ital. ?
foliosa *Sennen in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xv. Ser. Bot. No. 1, 21 (1931), in obs., nomen.—Hispan.
× Frivaldskyana *Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1906, xii. 91.—Hort.
gracilis *E. Perrier, Cat. Pl. Vasc. Savoie*, i. (*Mém. Acad. Sc. Savoie*, Sér. V. iv.) 391 (1917).—Gallia.
× Grisebachii *Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1906, xii. 91.—Hort.
× Haenkeana *Sünderm. l. c.*—Hort.
× helvetica *Pavarino in Chanousia*, i. 132 (1928).—Hort.
× Huteri *Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1906, xii. 91.—Hort.
× Kellereri *Sünderm. l. c.*—Hort.
× Kolbiana *Sünderm. l. c.*—Hort.
× Obristii *Sünderm. l. c.*—Hort.
paradoxa *Bernh. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 462 (1834).—Hab. ?
Pellati *Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* v. 106 [1921].—Gallia.
× pinnata *Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1906, xii. 91.—Hort.
× Portae *Sünderm. l. c.*—Hort.
× pseudo-Genepi *Delavay ex E. Perrier, Cat. Pl. Vasc. Savoie*, i. (*Mém. Acad. Sc. Savoie*, Sér. V. iv.) 392 (1917), in syn.: A. Laggeri.
purpurea *Herb. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 462 (1834).—Hab. ?
Sachokiana *Sosn. in Trud. Azerb. Otdyel. Zakavk. Fil. Akad. Nauk SSSR*, Sect. Bot., i. 46 (1933).—Transcaucas.
Schischkinii *Sosn. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 123 (1934).—Caucas.
sibirica *Desf. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 461 (1834).—Hab. ?
× similis *Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1906, xii. 91.—Hort.
sipylea *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxvi. 143 (1934).—As. Min. (Lydia).
Smithii *Hayek in Fedde, Repert. Beih.* xxx. II. 644 (1931): A. pubescens *Sibth. & Sm.*
× thessalica *J. Wagner in Fedde, Repert.* xxxviii. 285 (1935).—Thessal.
× tomentella *Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1906, xii. 91.—Hort.
virgata *Bellard. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 461 (1834).—Ital. ?
× Wilczeki *Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1906, xii. 91.—Hort.

ACHIMENES P. Br. (Gesneriac.).
Chirita *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 792 (1895), in syn.: A. mexicana.

ACHIMENES :—
Hillii *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 794 (1895), in syn.: Isoloma bogotense.
kewensis *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in syn.: Isoloma bogotense.
Margarita *Voss in Vilmorin, l. c.* 791, in syn.: A. longiflora.
mexicana *Benth. & Hook. f. ex Vilmorin, l.c.* 792.—Mexico.
mimuliflora (*Regel*) *Hort. ex Vilmorin, l. c.*: Guthnickia mimuliflora.
tyrianthina *Voss in Vilmorin, l. c.*, in obs.—Hab. ?

ACHRADOTYPUS Baill. (Sapotac.).
decandrus (*Montrouz.*) *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1933, lxxviii. Beibl. 19, 357: Chrysophyllum decandrum.

ACHUDEMIA Blume (Urticac.).
insignis *Migo in Journ. Shanghai Sc. Inst.* Sect. III. ii. 91 (1935).—China (Chekiang).

ACHYRANTHES L. (Amaranthac.).
acuminata *Hort. ex Schinz in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 82 (1934), in syn.: Iresine Lindenii.
aquatica *R. Br.*; *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 497 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 673 (1832).—Ind. or.
Biemuelleri *Haage & Schmidt ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 872 (1895), in syn.: Iresine Biemuelleri.
diandra *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 504 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 677 (1832).—Zeylan.
ferruginea *Roxb. l. c.* 502; *et l. c.* 675.—Ind. or.
Fischeri *Schinz in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 63 (1934), in syn.: A. fruticulosa.
incana *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 495 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 671 (1832).—Ind. or.
japonica (*Miq.*) *Nakai in Mori, Enum. Pl. Cor.* 139 (1922); *Okuyama in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 262: A bidentata var. japonica.
lanata (*Willd.*) *L.*; *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 503 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 676 (1832): Illecebrum lanatum.
lanata *Schinz in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 141, non praec.—Congo Belg.
Lindenii *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 872 (1895), in syn.: Iresine Lindenii.
marchionica *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 70 (1935).—Ins. Marquesas (Eiao).
nodiflora (*Willd.*) *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 505 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 678 (1832): Celosia nodiflora.
nuda *Heyne ex Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 507 (1824).—Ind. or.
obovata *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. Anhang, 25 (1932).—Tanganyika Terr.
orbiculata *Heyne ex Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 507 (1824).—Ind. or.
paronychioides *Hort. ex Schinz in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 76 (1934), in syn.: Alternanthera paronychioides.
scandens *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 503 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 676 (1832).—Ind. or.
sequax *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 506 (1824).—Nepal.
sericea *Koen. ex Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 502 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 675 (1832).—Ind. or.
triandra *Roxb. l. c.* 505; *et l. c.* 678.—Ind. or. (Bengal).

ACHYROPSIS Hook. f. (Amaranthac.).
conferta (*Schinz*) *Schinz in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 63 (1934): Achyranthes conferta.
Robynsii *Schinz in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 143.—Congo Belg.

ACIANTHUS R. Br. (Orchidac.).
tenuissimus *Nicholls & Goadby in Vict. Nat.* l. 22 (1933).—W. Austral.

ACIDANTHERA Hochst. (Iridac.).
roseoalba *Lewis in S. Afr. Gard.* 1933, xxiii. 255, 266.—Afr. austr. (Cape Prov.).

ACIOA Aubl. (Rosac.).
Johnstonei *Hoyle in Kew Bull.* 1932, 258.—Cameroons.
Tessmannii *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 311 (1915), in obs.—Guinea Hispan.

ACIOTIS D. Don (Melastomatac.).
ornata (*Miq.*) *Gleason in Brittonia*, i. 149 (1932): Spennera ornata.

ACISANTHERA P. Br. (Melastomatac.).
Bartlettii *Gleason in Papers Mich. Acad. Sc.* 1932, xvii. 145 (1933).—Brit. Honduras.
erecta *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 412.—Venez.
tetraptera (*Cogn.*) *Gleason in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1935, xxxii. 206: Comolia tetraptera.

ACMADENIA Bartl. & Wendl. (Rutac.).
gracilis *Compton in Journ. Bot.* 1932, lxx. 285.—Afr. austr. (Cape Prov.).
macropetala (*Glover*) *Compton, l.c.* 286: A. obtusata var. macropetala.

ACNISTUS Schott (Solanac.).
floccosus *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 372 (1935).—Ecuador.

ACOELORRAPHE H. Wendl. (Palmae).
Cookii *H. H. Bartlett in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 32 (1935).—Guatem.
Pimo (*Becc.*) *H. H. Bartlett, l. c.*: Brahea Pimo.
pinetorum *H. H. Bartlett, l. c.* 33.—Mexico; Brit. Honduras.
salvadorensis (*H. Wendl. ex Becc.*) *H. H. Bartlett, l. c.* 32: Brahea salvadorensis.

ACOMASTYLIS Greene; Bolle in Fedde, Repert. Beih. lxxii. 78 (1933), descr. emend. *ROSACEAE.*
calthifolia (*Sm.*) *Bolle, l. c.* 81: Geum calthifolium.
elata (*Royle*) *Bolle, l. c.* 83: Sieversia elata.
macrantha (*Kearney*) *Bolle, l. c.* 82: Sieversia macrantha.
nipponica *Bolle, l. c.*—Japon. (Hondo).
nivalis *Bolle, l. c.* 87, nomen provis., in adnot.: A. turbinata.
Peckii (*Pursh*) *Bolle, l. c.* 81: Geum Peckii.
radiata (*Michx.*) *Bolle, l. c.*: Geum radiatum.
sikkimensis (*Prain*) *Bolle, l. c.* 83: Geum sikkimense.

ACONITUM L. (Ranunculac.).
austro-koreënse *Koidz. in Hatsusima, Bot. Surv. S. Chosen*, Rep. v. (1934); cf. *Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 369; *Koidz. ex Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 48 (1934).—Corea.
calthifolium *Comber in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 222 (1934).—Upper Burma.
chiisanense *Nakai, Veg. Mt. Chiisan*, 32, 78, 83 (1915), japonice; *Mori, Enum. Cor. Pl.* 149 (1922), nomen; *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 147, latine.—Corea.
chrysopilum *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 579.—Japon. (Hondo).
crassifolium *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 283 (1931).—China (Yunnan).
crassipes *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 500.—Japon. (Hondo).
deflexum *Nakai, l. c.*—Japon. (Hondo).
Dielsianum *Airy-Shaw in Kew Bull.* 1932, 244: A. acaule *Diels*, non A. Napellus var. acaule *Finet & Gagnep.*
Dominii *Sillinger in Mém. Soc. Sc. Bohême*, 1932, No. 16, 2 (1933).—Carpath.
fudjisanense *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 579.—Japon. (Hondo).
Georgei *Comber in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 223 (1934).—China (Yunnan).
grossedentatum (*Nakai*) *Nakai ex Morio in Madzima, Suginome & Morio, Hôsan Odzuz. Shokub. Alkal.* (*Alkaloid Jap. Acon.*) 81 (1925), nomen; *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 501, descr.: A. Zigzag f. grossedentatum.
hakonense *Nakai, l. c.* 504, in syn.: A. senenense var. hakonense *Nakai.*
Handelianum *Comber in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 224 (1934).—China (Yunnan).
huiliense *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 289 (1931).—China (Szechuan).

ACONITUM:—
ibukiense *Nakai ex Morio in Madzima, Suginome & Morio, Hôsan Odzuz. Shokub. Alkal.* (*Alkaloid Jap. Acon.*) 59 (1925), nomen; *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 502, descr.—Japon. (Hondo).
Ito-Seiyanum *Miyabe & Tatewaki in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.* xiii. 105 (1934).—Japon. (Yezo).
jeholense *Nakai & Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. 1. (*Pl. Nov. Jehol.* 1.) 24 (1934).—Manchur. (Jehol).
kashmiricum *Stapf ex Coventry, Wild Fl. Kashmir*, Ser. III. 25 (1930).—Kashmir.
kirinense *Nakai in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. II. (*Contrib. Cogn. Fl. Mansh.*) 147 (1935).—Manchur.
kitadakense *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 499.—Japon. (Hondo).
Kitagawai *Nakai in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. II. (*Contrib. Cogn. Fl. Mansh.*) 156 (1935).—Manchur.
koisikawense *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 580.—Hab. ?
liaotungense *Nakai in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. II. (*Contrib. Cogn. Fl. Mansh.*) 158 (1935).—Manchur.
montanum *Hort. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 67 (1833).—Hab. ?
napelloides *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 287 (1931).—China (Szechuan).
nemorum *Popov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n. s. xliv. 131.—Turkestan. (Thian Shan).
neotortuosum *Nakai in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. II. (*Contrib. Cogn. Fl. Mansh.*) 154 (1935).—Corea.
odaiense *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 501, in syn.: A. grossedentatum var. odaiense *Nakai*.
Ouvrardianum *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 285 (1931).—China (Yunnan).
oyamense *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 502.—Japon. (Hondo).
piepunense *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 290 (1931).—China (Yunnan).
proliferum *Nakai in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. II. (*Contrib. Cogn. Fl. Mansh.*) 150 (1935).—Corea.
pseudolaeve *Nakai, l. c.* 139, in clavi.—Corea.
pulcherrimum *Nakai, l. c.* 161.—Manchur.; Corea.
quelpaertense *Nakai, l. c.* 145.—Corea (Quelpaert).
rishiriense *Tatewaki ex Miyabe & Tatewaki in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.* xiii. 106 (1934), in syn.: A. sachalinense var. compactum *Miyabe & Tatewaki*.
sanyoënse *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 503.—Japon. (Hondo).
sichotense *Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 201 (1932).—Sibir. or.
sinanomontanum *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 580.—Japon. (Hondo).
sinomontanum *Nakai in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. II. (*Contrib. Cogn. Fl. Mansh.*) 146 (1935).—China (Chihli).
siroumense *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 581.—Japon. (Hondo).
Stapfianum *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 294 (1931).—China (Yunnan).
tanguticum (*Maxim.*) *Stapf in Ann. Bot. Gard., Calc.* x. 151 (1905), in obs.: A. rotundifolium var. tanguticum.
Tatewakii *Miyabe in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.* xiv. 71 (1935).—Japon. (Yezo).
Tokii *Nakai in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. II. (*Contrib. Cogn. Fl. Mansh.*) 160 (1935).—Manchur. (Jehol).
umbrosum *Hort. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 68 (1833).—Hab. ?
villiferum *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 504.—Japon. (Hondo).
wulingense *Nakai in Rep. 1st. Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. II. (*Contrib. Cogn. Fl. Mansh.*) 157 (1935).—Manchur. (Jehol).
Yamamotoanum *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 49 (1934).—Formosa.
Yamatsutae *Nakai in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. II. (*Contrib. Cogn. Fl. Mansh.*) 153 (1935).—Manchur.

ACOSMUS Desv. ex Desf. Tabl. École Bot. ed. 2, 267 (1815), nomen; Desv. Journ. de Bot. iii. [No. 5] 229–33 [1816], descr. *MALPIGHIACEAE*.
pruriens *Desv. ex Desf. l. c.*, nomen; *Desv. l. c.* 231–3, descr.—Am. trop.

ACRACHNE Wight & Arn. ex Lindl.; Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma, viii. 361 (1908), descr. *GRAMINEAE*.
verticillata (*Roxb.*) *B. D. Jackson in Ind. Kew.* i. 32 (1895); *Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma*, viii. 361 (1908), cum descr.: Eleusine verticillata.

ACRANTHERA Arn. (Rubiac.).
longipes *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 194 (1934).—Sumatra.
Yatesii *Merrill, l. c.*—Sumatra.

ACRIDOCARPUS Guill. & Perr. (Malpighiac.).
pondoënsis *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 830 (1915), in obs.—Pondoland.
zanzibarensis *Chiov. Fl. Somala*, II. 44 (1932), in ic.: A. zanzibaricus.

ACROBLASTUM Soland. in Seem. Fl. Vit. 99 (1865), in syn.; Setchell in Univ. Calif. Publ. Bot. xix. 144 (1935), descr. *BALANOPHORACEAE*.
Fawcettii (*Elmer*) *Setchell, l. c.* 146: Balanophora Fawcettii.
hexamerum (*Van Tiegh.*) *Setchell, l. c.*: Polyplethia hexamera.
insulare (*Ridley*) *Setchell, l. c.* 147: Balanophora insularis.
pallens (*Setchell*) *Soland. in Seem. Fl. Vit.* 99 (1865), in syn.; *Setchell, l. c.* 144: Balanophora pallens.
parvius (*Hayata*) *Setchell & Yamamoto, l. c.* 146: Balanophora parvior.
polyandrum (*Griff.*) *Setchell, l. c.* 147: Balanophora polyandra.
spicatum (*Hayata*) *Setchell, l. c.*: Balanophora spicata.
subglobosum (*Elmer*) *Setchell, l. c.*: Balanophora subglobosa.
Wilderi (*Setchell*) *Setchell, l. c.* 145: Balanophora Wilderi.

ACROCEPHALUS Benth. (Labiat.).
canonensis *G. Taylor in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl. 2, 150.—Angola.
cubanquensis *Good in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl. 2, 149.—Angola.
kipilaënsis *Robyns in Ann. Soc. Sc. Brux.* li. Sér. B, 163 (1931).—Congo Belg.
pseudosericeus *G. Taylor in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl. 2, 149.—Angola.
Robertii *Robyns in Ann. Soc. Sc. Brux.* li. Sér. B, 164 (1931).—Congo Belg.

ACROCERAS Stapf (Gramin.).
crassiapiculatum (*Merrill*) *Alston in Trimen, Handbook Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 324 (1931): Panicum crassiapiculatum.
zizanioides (*H. B. & K.*) *Dandy in Journ. Bot.* 1931, lxix. 54: Panicum zizanioides.

ACRODICLIDIUM Nees (Laurac.).
debile *Mez*; *Sandwith in Kew Bull.* 1933, 337, descr. ampl.—Guiana Brit. et Gall.
latifolium *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 100.—Peruv.
limbatum (*Nees*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 18 (1931): Nectandra limbata.
macrophyllum *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 101.—Peruv.

ACROLOPHIA Pfitz. (Orchidac.).
capensis (*Berg.*) *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 81 (1932): Limodorum capense.

ACRONEMA Falcon. ex Edgew. (Umbellif.).
muscicola (*Hand.-Mazz.*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 715 (1933): Pimpinella muscicola.

ACRONYCHIA J. R. & G. Forst. (Rutac.).
Boweriana *Christoph. in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 128, 106 (1935).—Samoa.

ACRONYCHIA:—
Chooreechillum (*F. M. Bailey*) *C. T. White in Contrib. Arn. Arb.* No. IV. 49 (1933): Melicope Chooreechillum.
Muelleri (*Engl.*) *Francis in Kew Bull.* 1931, 190: Evodia Muelleri.
parviflora *C. T. White in Contrib. Arn. Arb.* No. IV. 51 (1933).—Austral. (Queensland).
suberosa *C. T. White in Proc. Roy. Soc. Queensl.* 1931, xliii. 47 (1932).—Austral. (Queensland).

ACROSPELION Bess. ex Roem. & Schult. Syst. Veg. ii. Addit. I. 526 [1827], in obs. *GRAMINEAE*.

ACROSTEPHANUS Van Tiegh. (Loranthac.).
rubro-viridis *Van Tiegh. ex A. Cheval. in Act. Congr. Internat. Bot., Paris*, 1900, 269, nomen. —Sudan. (Haut Sénégal).

ACROTOME Benth. (Labiat.).
angustifolia *G. Taylor in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 9.—N. Rhodesia; Bechuanaland Protect.; Transvaal.
lancifolia *Bremek. & Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xvi. 431 (1935).—Bechuanaland Protect.
mozambiquensis *G. Taylor in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 12.—Afr. Lusit. Or.
tenuis *G. Taylor, l. c.* 1932, lxx. 106.—N. Rhodesia.

ACTEPHILA Blume (Euphorbiac.).
Merrilliana *Chun in Sunyatsenia*, iii. 26 (1935).—China (Hainan).

ACTINEA Juss. (Compos.).
helenioides (*Rydb.*) *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 335: Picradenia helenioides.

ACTINELLA Pers. (Compos.).
[ACTINEA Juss.]
anthemidoides (*Juss.*) *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 6, 73 (1932): Hymenopappus anthemoides.
Tweediei (*Hook. & Arn.*) *Malme, l. c.*: Hymenoxys Tweediei.

ACTINIDIA Lindl. (Actinidiac.; Ternstroemiac., Gen. Pl.).
Gagnepaini *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 258.—Tibet; China (Szechuan).
Kengiana *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* xi. 16 (1932).—China (Chekiang).
Lecomtei *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 253.—Tibet; China (Szechuan; Hupeh).
lutea *Stapf in Bot. Mag.* sub t. 9140 (1928), in adnot.—China austr.-occ.
megalocarpa *Nakai apud Nakai & Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. 1. (*Pl. Nov. Jehol.* 1. 9 (1934).—Manchur. (Jehol).
Petelotii *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 213 (1931).—Indo-China (Tonkin).
pilosula (*Finet & Gagnep.*) *Stapf ex Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 390 (1931): A. callosa var. pilosula.
subglaucifolia *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* xi. 15 (1932).—China (Fokien).

ACTINODAPHNE Nees (Laurac.).
ferruginea *H. Liou, Laurac. Chine et Indo-chine*, 160 (1932).—Indo-China (Anam).
grandis *Miq. Fl. Ind. Bat.* Suppl. 1, 147 (1860), sphalm.: A. gracilis.
pilosa (*Lour.*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 165 (1935): Laurus pilosa.
Tsaii *Hu in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* v. 307 (1934).—China (Yunnan).

ACTINOPHLOEUS Becc. (Palmae).
angustifolius *Hort. ex L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, iii. 424 (1935).—Hab. ?
cuneatus *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 205 (1931).—N. Guin.
hospitus *Burret, l. c.* 206.—Hort.
linearis *Burret in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 268.—N. Guin.
macrospadix *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 343 (1935).—N. Guin.
microcarpus *Burret in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 267.—N. Guin.

ACTINOPHORA Wall. (Tiliac.).
Buurmanni (*Koord. & Valeton*) *Koord. in Koord. & Valeton, Atlas Baumart. Java*, iv. Verbess. u. Einfüg., 10 (1918): Schoutenia Buurmanni.

ACYNTHA Medik. (Liliac.).
elliptica *Chiov. Fl. Somala,* II. 421 (1932).—Somal. Ital.
polyrhytis *Chiov. l. c.* 423.—Somal. Ital.
Powellii (*N. E. Brown*) *Chiov. l. c.* 422: Sansevieria Powellii.
robusta (*N. E. Brown*) *Chiov. l. c.*: Sansevieria robusta.
Stuckyi (*Godef.-Leb.*) *Chiov. l. c.*: Sansevieria Stuckyi.

ADANSONIA L. (Bombacac.; Malvac., Gen. Pl.).
somalensis *Chiov. Fl. Somala,* II. 29, in ic., 30, in obs. (1932).—Somal. Ital.

ADELOBOTRYS DC. (Melastomatac.).
guianensis (*DC.*) *Gleason in Brittonia,* i. 141 (1932): Davya guianensis.
macrantha *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 220.—Peruv.
monticola *Gleason in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1935, xxxii. 207.—Guiana Bat.
subsessilis *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 222.—Peruv.

ADELONENGA Becc. (Palmae).
Kasesa *Becc. ex Martelli in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1935, n. s. xlii. 19, 77, corr.: A. Rasesa.

ADELOSTEMMA Hook. f. (Asclepiadac.).
microcentrum *Tsiang in Sunyatsenia,* ii. 184 (1934). —China (Chekiang).

ADENANTHERA L. (Legumin.).
Klainei *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 843 (1921), nomen, in obs.—Gabon.

ADENIA Forsk. (Passiflorac.).
apiculata (*De Wild. & Th. Dur.*) *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 603 (1921), in obs.: Ophiocaulon apiculatum.
Buchananii *Harms ex Engl. l. c.* 605, in obs.—Nyasaland.
Catharinae *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 110 (1934).—Sumatra.
Keramanthus *Harms ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 605 (1921), in obs.—Tanganyika Terr.
Poggei *Engl. l. c.* 603, in obs.—Afr. trop. occ.
stricta (*Mast.*) *Engl. l. c.* 605, in obs.: Modecca stricta.

ADENIUM Roem. & Schult. (Apocynac.).
tricholepis *Chiov. Fl. Somala,* II. 288 (1932).—Somal. Ital.

ADENOCALYX Bert. ex H. B. & K. (Legumin.).
racemosus *Bert.*; *Bert. apud Vign.-Lutati in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1931, n. s. xxxviii. 132, descr. ampl.—Colomb.

ADENOCARPUS DC. (Legumin.).
artemisiifolius *Jahandiez, Maire & Weiller in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord,* 1931, xxii. 286.—Marocc.
Bacquei *Battand. & Pitard in Pitard, Contrib. Étude Fl. Maroc,* 10 (1918).—Marocc.
bracteatus *Font Quer & Pau in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 281 [1928].—Marocc.
Rodriguezi *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 143 [1933], nomen.—Marocc.
Segonnei *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord,* 1932, xxiii. 174.—Marocc.

ADENOCAULON Hook. Bot. Misc. i. 19 (1829). *COMPOSITAE.*
bicolor *Hook. l. c.*—Am. bor.-occ.
lyratum *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1934, xxiv. 435.—Guatem.

ADENONCOS Blume (Orchidac.).
suborbicularis *Carr in Journ. As. Soc. Mal.* xi. 99 (1933).—Sumatra.
triloba *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements,* viii. 123 (1935).—Borneo.
vesiculosa *Carr, l. c.* vii. 37 (1932).—Penins. Mal.

ADENOPHAEDRA Muell.-Arg. (Euphorbiac.).
minor *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro,* ii. 56 (1935).—Bras. (Amaz.).

ADENOPHORA Fisch. (Campanulac.).
Golubinzevaeana *Reverd. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1935, Nos. 3–4, p. 4.—Ross. asiat. centr.
insolens *Reverd. l. c.* p. 3.—Ross. asiat. centr.
manshurica *Nakai ex Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933,* Sect. IV. 11. (*Contrib. Cogn. Fl. Mansh.*) 106 (1935), in syn.: A. divaricata var. manshurica *Kitagawa.*
petrophila *Hara in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 826.—Japon.
pinifolia *Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933,* Sect. IV. 11. (*Contrib. Cogn. Fl. Mansh.*) 110 (1935).—Manchur.
rupestris *Reverd. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1935, Nos. 3–4, p. 2.—Ross. asiat. centr.
Thunbergiana *Kudo, Rep. Veg. N. Saghal.* 224 (1924); cf. *Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 371.—Japon. (Hondo).
Uehatae *Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan,* 1932, iv. 484.—Formosa.
uryuensis *Miyabe & Tatewaki in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.* xiv. 80 (1935).—Japon. (Yezo).
Uyemurae *Kudo in Bull. Exp. For. Kyûshû Imp. Univ.* i. 88 (1931); cf. *Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.* xiv. 81 (1935).—Sakhalin.

ADENOPLUSIA Radlk. (Loganiac.).
ulugurensis *Melch. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xii. 203 (1934).—Tanganyika Terr.

ADENOPUS Benth. (Cucurbitac.).
guineënsis (*G. Don*) *Exell in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 42: Bryonia guineënsis.

ADENOSMA R. Br. (Scrophulariac.).
indiana (*Lour.*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. 11. 351 (1935): Manulea indiana.

ADENOSTEGIA Benth. (Scrophulariac.).
eremica *Coville & Morton in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1932, xxii. 161.—U.S.A. (Calif.).

ADENOSTEMMA J. R. & G. Forst. (Compos.).
Renschii *Koster in Blumea,* i. 482 (1935).—Ins. Sunda (Flores).

ADENOSTYLIS Blume (Orchidac.).
Merrillii *Ames & Quisumb. in Philipp. Journ. Sc.* 1931, xliv. 370.—Ins. Philipp. (Luzon).

ADENOTHAMNUS Keck in Madroña, iii. 6 (1935). *COMPOSITAE.*
validus (*T. S. Brandegee*) *Keck, l. c.*: Madia valida.

ADESMIA DC. (Legumin.).
Fuentesii *Grandj. in Verh. Deutsch. Wiss. Ver. Santiago (Chile),* n. f. ii. 124 (1934); *et in Rev. Chil. Hist. Nat.* 1934, xxxviii. 91.—Chile.

ADHATODA Mill. (Acanthac.).
oreophila (*C. B. Clarke*) *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1935, 575: Justicia oreophila.

ADINA Salisb. (Rubiac.).
dissimilis *Craib in Kew Bull.* 1931, 208.—Siam.
polycephaloides *Craib, l. c.* 209.—Siam.

ADINANDRA Jack (Theac.; Ternstroemiac., Gen. Pl.).
chinensis *Merrill ex Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* xi. 19 (1932), in obs., nomen.—Hab.?
Chingii *Metcalf, l. c.*—China (Chekiang).
Drakeana *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., Paris,* Sér. II. v. 208 (1883).—China (Kiangsi).
Hemsleyi *Hand.-Mazz. ex Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* xi. 19 (1932), in obs., nomen.—Hab.?
macrosepala *Metcalf, l. c.* 18.—China (Chekiang; Fokien).
megaphylla *Hu in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 172 (1935).—China (Yunnan).
obscurinervia *Merrill & Chun in Sunyatsenia,* ii. 283 (1935).—China (Hainan).
obtusissima *Hayata in Sasaki, Cat. Governm. Herb.* 346 (1930), nomen; *Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan,* 1933, v. 347, descr.—Formosa.
ryukyuensis *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa,* 1934, xxiv. 210.—Ins. Liukiu.
Schliebenii *Melch. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 1076, 1097 (1934).—Tanganyika Terr.

ADINANDRELLA Exell (Theac.).
africana (*Melch.*) *Melch. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 1093 (1934), in obs.: Ternstroemia africana.

ADLUMIA Rafin. (Papaverac.).
asiatica *Ohwi in Bot. Mag., Tokyo,* 1931, xlv. 387. —Corea.

ADONIS L. (Ranunculac.).
distortoides *Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* i. 19 [1912].—Alpes Marit.
Margaritae *Butkov in Bull. Univ. As. Centr.* xix. 117 (1934).—Turkestan. (Thian Shan).

ADROMISCHUS Lem. (Crassulac.).
Keilhackii *Werderm. in Fedde, Repert.* xxx. 52 (1932).—Afr. austr. vel Afr. austr.-occ.?
montium-klinghardtii (*Dinter*) *A. Berger in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xviii a. 416 (1931): Cotyledon montium-klinghardtii.
van-der-Heydeni *Hort. ex Jacobsen, Sukkulent.* 14 (1933), in syn.: A. clavifolius.

AECHMEA Ruiz & Pav. (Bromeliac.).
Dryanderae *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xii. 529 (1935).—Colomb.
eurycorymbus *Harms, l. c.* 528.—Bras. (Pernambuco).
ferruginea *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcviii. 5 (1932).—Peruv.
fraudulosa *Mez in Engl. Pflanzenreich, Bromeliac.* 636 (1935): A. Blanchetii *Mez.*
involucrifera *Mez, l. c.* 157 (1934): A. involucrata *Rusby.*
lutea (*Regel & Linden*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.,* ed. 3, *Sieb. & Voss,* i. 968 (1895): Macrochordion luteum.
recurvata (*Klotzsch*) *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcviii. 5 (1932): Macrochordion recurvatum.
Reukartiana *Hort. ex C. Cheval. in Bull. Soc. Nat. Hort. France,* 1935, Sér. VI. ii. 200, in syn.: A. ramosa.
rubra *Alv. Silv. Fl. Mont.* ii. Addenda, 1 (1931).—Bras. (Minas Geraes).
rupestris *Mez in Engl. Pflanzenreich, Bromeliac.* 153 (1934), in syn.: A. Benrathii.
splendida *Hort. ex Kuhnt in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1932, xlvii. 331, in obs.—Hort.
Standleyi *Cufod. in Archiv. Bot., Forlì,* 1933, ix. 182.—Costa Rica.
tricolor *Alv. Silv. Fl. Mont.* ii. Addenda, 2 (1931). —Bras. (Minas Geraes).
Werdermannii *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xii. 529 (1935).—Bras. (Pernambuco).

AEGINETIA L. (Orobanchac.).
boninensis *Nakai in Bot. Mag., Tokyo,* 1931, xlv. 134.—Ins. Bonin.
mirabilis (*Blume*) *Bakh. in Trop. Natuur,* No. 10, 156 (1921), in obs.; *et l. c.* No. 11, 172 (1921): Centronia mirabilis.
saccharicola *Bakh. in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 87 (1933).—Java.
selebica *Bakh. l. c.* 89.—Celebes.

AEGIPHILA Jacq. (Verbenac.).
aculeifera *Moldenke in Fedde, Repert.* xxxvii. 209 (1934).—Colomb.
acutangula *Widgren ex Moldenke in Brittonia,* i. 471 (1934), in syn.: Cornutia pyramidata.
Bangii *Moldenke, l. c.* 432, in syn.: A. spicata.
barbadensis *Moldenke in Fedde, Repert,* xxxiii. 113 (1933).—Ind. occ. (Barbados).
bogotensis (*Spreng.*) *Moldenke, l. c.* 114: Ehretia bogotensis.
boliviana *Moldenke, l. c.*—Boliv.
bracteolosa *Moldenke, l. c.* 115.—Guiana Brit.
brasiliensis *Moldenke, l. c.*—Bras. (Rio de Janeiro).
breviflora (*Rusby*) *Moldenke in Phytologia,* i. 95 (1934): Pseudaegiphila breviflora.
Buchtienii *Moldenke in Fedde, Repert.* xxxiii. 116 (1933).—Boliv.
capitata *Moldenke, l. c.*—Bras.
caucensis *Moldenke, l. c.* 117.—Colomb.
cayennensis *v. Rohr ex Moldenke in Brittonia,* i. 471 (1934), in syn.: Ixora spp.
caymanensis *Moldenke in Fedde, Repert.* xxxiii. 118 (1933).—Ind. occ. (Ins. Cayman).

AEGIPHILA :—
congesta *Standley ex Moldenke in Brittonia*, i. 471 (1934), in syn.: Dermatocalyx parviflorus.
conturbata *Moldenke in Fedde, Repert.* xxxvii. 210 (1934).—Bras. (Maranhão).
cordifolia (*Ruiz & Pav.*) *Moldenke in Brittonia*, i. 185 (1932): Callicarpa cordifolia.
coriacea *Moldenke in Fedde, Repert.* xxxiii. 118 (1933).—Bras.
costaricensis *Moldenke, l. c.* 119.—Panamá; Costa Rica.
crenata *Moldenke, l. c.*—Bras.
cuneata *Moldenke in Brittonia*, i. 185 (1932).—Peruv.
dentata *Moldenke in Fedde, Repert.* xxxiii. 120 (1933).—Bras. (S. Paulo).
dubia *Moldenke, l. c.*—Trinidad; Tobago.
elegans *Moldenke in Brittonia*, i. 186 (1932).—Peruv.
elongata *Moldenke in Fedde, Repert.* xxxiii. 121 (1933).—Boliv.
Fendleri *Moldenke, l. c.*—Venez.
ferrea *Soland. ex Moldenke in Brittonia*, i. 471 (1934), in syn.: Ixora ferrea.
floribunda *Moritz & Moldenke in Fedde, Repert.* xxxiii. 122 (1933).—Venez.
fusca *Oerst. ex Moldenke in Brittonia*, i. 351 (1934), in syn.: A. odontophylla.
glabrata *Moldenke, l. c.* i. 186 (1932).—Peruv.
glandulifera *Moldenke, l. c.* 187.—Am. trop.
Gleasonii *Moldenke in Fedde, Repert.* xxxiii. 123 (1933).—Guiana Brit.
gloriosa *Moldenke, l. c.*—Bras. (Bahia).
Goeldiana *Huber & Moldenke, l. c.* 124.—Bras. (Pará).
Goudotiana *Moldenke, l. c.*—Colomb.
grandis *Moldenke, l. c.* 125.—Colomb.
guianensis *Moldenke, l. c.*—Colomb.; Venez.; Guiana Brit.
Herzogii *Moldenke, l. c.* 126.—Boliv.
hirsuta *Moldenke, l. c.* 127.—Boliv.
hirsutissima *Moldenke, l. c.*—Colomb.; Venez.
insignis *Moldenke in Brittonia*, i. 188 (1932).—Peruv.
intermedia *Moldenke in Fedde, Repert.* xxxiii. 128 (1933).—Bras. (Maranhão).
Killipii *Moldenke, l. c.*—Colomb.
lanata *Moldenke, l. c.* 129.—Bras. (Goyaz).
lanceolata *Moldenke, l. c.*—Bras. austr.; Parag.
laxicupulis *Moldenke, l. c.* 130.—Guatem.; Salvador; Nicarag.
Lehmannii *Moldenke, l. c.* 131.—Colomb.
Lewisiana *Moldenke, l. c.*—Venez.
longipetiolata *Moldenke in Brittonia*, i. 188 (1932).—Peruv
magnifica *Moldenke in Fedde, Repert.* xxxiii. 132 (1933).—Nicarag.
medullosa *Moldenke, l. c.*—Bras. (Rio de Janeiro).
minutiflora *Rusby ex Moldenke in Brittonia*, i. 472 (1934), in syn.: Callicarpa acuminata.
monstrosa *Moldenke in Tropical Woods*, 1931, No. 25, 12.—Guatem.; Brit. Honduras; Honduras.
montana *Moldenke in Fedde, Repert.* xxxiii. 133 (1933).—Colomb.
monticola *Moldenke, l. c.* xxxvii. 210 (1934).—Ecuador.
novofriburgensis *Moldenke, l. c.* xxxiii. 134 (1933).—Bras. (Rio de Janeiro).
novogranatensis *Moldenke, l. c.*—Colomb.
ovata *Moldenke in Brittonia*, i. 189 (1932).—Peruv.
panamensis *Moldenke in Tropical Woods*, 1931, No. 25, 14.—Panamá.
paniculata *Moldenke, l. c.* 16.—Nicarag.; Panamá; Colomb.
parviflora *Moldenke in Fedde, Repert.* xxxiii. 135 (1933).—Venez.; Bras. (Pará).
Pavoniana *Moldenke in Brittonia*, i. 190 (1932).—Peruv.
pendula *Moldenke in Fedde, Repert.* xxxiii. 135 (1933).—Panamá; Venez.
Pennellii *Moldenke, l. c.* 136.—Colomb.
perplexa *Moldenke, l. c.*—Tobago; Trinidad; Venez.
puberulenta *Moldenke, l. c.* 137.—Colomb.
pulcherrima *Moldenke in Brittonia*, i. 191 (1932).—Peruv.

AEGIPHILA :—
quinduensis (*H. B. & K.*) *Moldenke in Fedde, Repert.* xxxiii. 138 (1933): Petitia quinduensis.
reticulata *Moldenke, l. c.*—Colomb.
roraimensis *Moldenke, l. c.*—Guiana (Roraima).
rotundifolia *Sellow ex Moldenke in Brittonia*, i. 329 (1934), in syn.: A. verticillata.
salticola *Moldenke in Fedde, Repert.* xxxvii. 211 (1934).—Bras. (Pará).
scandens *Moldenke, l. c.* 212.—Bras. (Amaz.).
sessiliflora *Moldenke, l. c.* xxxiii. 139 (1933).—Colomb.
Smithii *Moldenke in Brittonia*, i. 191 (1932).—Peruv.
sordida *Moldenke, l. c.* 192.—Peruv.
spicata (*Rusby*) *Moldenke in Fedde, Repert.* xxxiii. 139 (1933): Citharexylum spicatum.
Spruceana *Moldenke, l. c.*—Bras. (Amaz.).
Standleyi *Moldenke, l. c.* 140.—Costa Rica.
sufflava *Moldenke in Brittonia*, i. 193 (1932).—Peruv.
Surfaceana *Moldenke in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 462.—Guiana Brit.; Bras. (Amaz.; Pará).
sylvatica *Moldenke in Fedde, Repert.* xxxiii. 140 (1933).—Colomb.
ternifolia (*H. B. & K.*) *Moldenke, l. c.* 141: Ehretia ternifolia.
triflora *Moldenke, l. c.* xxxvii. 212 (1934).—Peruv.
truncata *Moldenke, l. c.* xxxiii. 141 (1933).—Colomb.
variabilis *Moldenke in Brittonia*, i. 377 (1934), in syn.: A. martinicensis.
velutina *Huber ex Moldenke, l. c.* 406, in syn.: A. Surfaceana.
velutinosa *Moldenke, l. c.* i. 194 (1932).—Peruv.
villosissima *Moldenke in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 392.—Bras. (Matto Grosso).

AEGLOPSIS Swingle (Rutac.).
alexandrae *Chiov. Fl. Somala*, II. 50 (1932).—Somal. Ital.

AEGOPODIUM L. (Umbellif.).
Handelii *H. Wolff in Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 717 (1933).—China (Hunan).

AELLENIA Ulbr. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, xvi c. 567 (1934). *CHENOPODIACEAE.*
auricula (*Moq.*) *Ulbr. l. c.*: Salsola auricula.
lancifolia (*Boiss.*) *Ulbr. l. c.*: Salsola lancifolia.

AEOLANTHUS Mart. (Labiat.).
Cassawa *G. Taylor in Journ. Bot.* 1932, lxx. 106.—N. Rhodesia.
Gamwelliae *G. Taylor, l. c.* 105.—N. Rhodesia.

AEONIUM Webb & Berth. (Crassulac.).
Burchardii (*Praeger*) *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.* xxxviii. Sect. B, 465 (1929): Sempervivum Burchardii.
gomerense (*Praeger*) *Praeger, l. c.* 473: Sempervivum gomerense.
lancerottense (*Praeger*) *Praeger, Sempervivum*, 190 (1932): Sempervivum lancerottense.
nobile (*Praeger*) *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.* xxxviii. Sect. B, 477 (1929): Sempervivum nobile.
spathulatum (*Hornem.*) *Praeger, l. c.* 482: Sempervivum spathulatum.
valverdense (*Praeger*) *Praeger, l. c.* 484: Sempervivum valverdense.
velutinum *Hort. ex Praeger, l. c.* xxxviii. Sect. B, 22 (1928), in syn.: Sempervivum velutinum.

AËRANGIS Reichb. f. (Orchidac.).
brachyceras *Summerhayes in Kew Bull.* 1934, 213.—Congo Belg.; Uganda.
calodictyon *Summerhayes, l. c.* 214.—Tanganyika Terr.
floribunda (*Rolfe*) *Summerhayes, l. c.* 1932, 509: Listrostachys floribunda.
lutambae *Mansf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 704 (1935).—Tanganyika Terr.
ugandensis *Summerhayes in Kew Bull.* 1931, 390.—Uganda.

AËRIDES Lour. (Orchidac.).
Dayanum *Hort. ex Guillaumin in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, vi. 466 (1933), in syn.: A. odoratum.

AËRIDES:—
Micholitzii *Rolfe in Orch. Rev.* 1904, xii. 181, in obs.—Indo-China (Anam).
pedunculatum *Kerr in Journ. Siam. Soc., Nat. Hist. Suppl.* x. 59 (1935).—Cambodia.

×**AËRIDOVANDA** Hort. ex Orch. Rev. 1918, xxvi. 68. *ORCHIDACEAE.*
[AËRIDES × VANDA.]
Mundyi *Hort. l. c.*—Cult.

AERVA Forsk. (Amaranthac.).
coriacea *Schinz in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 141.—Madag.

AESCHRION Vell. (Simaroubac.).
cubensis (*Radlk. & Urb.*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 389 (1931): Picrasma cubensis.
selleana (*Urb.*) *Engl. l. c.*: Picrasma selleana.

AESCHYNANTHUS Jack (Gesneriac.).
Boschianus *De Vriese in Ann. Soc. Agric. & Bot. Gand*, i. 403 (1845).—Java.
deleiensis *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1935, 320.—Ind. or. (Assam).
linearifolius *C. E. C. Fischer, l. c.* 321.—Ind. or. (Assam).
stenosepalus *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 191 (1934).—Upper Burma.
tubulosus *Anthony, l. c.* 192.—Upper Burma.

AESCHYNOMENE L. (Legumin.).
arbuscula *E. G. Baker in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxi. 302 (1932).—Congo Belg.
Burttii *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 79.—Tanganyika Terr.
guadalajarana *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 46 (1933–5).—Mexico.
mexicana *Biroli ex Colla, Herb. Pedem.* ii. 195 (1834).—Hab. ?
nematopoda *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 813 (1933).—Tanganyika Terr.
nicaraguensis (*Oerst.*) *Standley in Tropical Woods*, 1933, No. 34, 41: Brya nicaraguensis.
speciosa *Soland. ex Seem. Fl. Vit.* 55 (1865), in syn., in adnot.: Sesbania coccinea.
stipitata *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xvii. 426 (1932).—Swaziland.
Wittei *E. G. Baker in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxi. 302 (1932).—Congo Belg.
Youngii *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 295.—Congo Belg.

AETANTHUS Engl. (Loranthac.).
colombianus *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1932, lix. 513.—Colomb.

AETHEOPAPPUS Cass. (Compos.).
Balansae *Boiss. Fl. Or.* iii. 604 (1875).—Oriens.
concinnus (*Boiss. & Huet*) *Sosn. in Monit. Jard. Bot. Tiflis*, 1928–30, n. s. Pt. v. 28 (1931), in adnot.: Amblyopogon concinnus.

AETHIONEMA R. Br. (Crucif.).
cardiophylloides *Bornm. & Gauba in Fedde, Repert.* xxxix. 84 (1935).—Persia.
fruticulosum *Bordz.*; *Bordz. in Bull. Jard. Bot. Kieff*, xii–xiii. 113 (1931), descr. emend.—Armen.
latifolium *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 56 (1932).—Marocc.
paphlagonicum *Czecz. & Beauverd in Acta Soc. Bot. Polon.* 1932, ix. 31.—As. Min. (Paphlagonia).
Roopianum *Bordz. in Bull. Jard. Bot. Kieff*, xii–xiii. 113 (1931), in syn.: A. fruticulosum.
Schelkownikowi *Bordz. l. c.* 112.—Armen.

AFRAMOMUM K. Schum. (Zingiberac.).
korarima *Pereira ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 386 (1908), in obs.—Somaliland.
sceleratum *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 304 (1917).—Dahomey.
simiarum *A. Cheval. l. c.* 303.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).

AFROLIGUSTICUM C. Norman (Umbellif.).
Elliotii (*Engl.*) *C. Norman in Journ. Linn. Soc., Bot.* xlix. 516 (1934): Peucedanum Elliotii.

AFRORMOSIA Harms (Legumin.).
Schliebenii *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 509 (1935).—Tanganyika Terr.

AFZELIA Sm. (Legumin.).
caudata *Hoyle in Kew Bull.* 1933, 170.—Nigeria; Gabon.

AFZELIELLA Gilg (Melastomatac.).
intermedia (*Cogn.*) *Gilg in Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. 1907–8*, ii. 582 (1913): Guyonia intermedia.

AGALINIS Rafin. (Scrophulariac.).
Wrightii (*A. Gray*) *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 43: Gerardia Wrightii.

AGALOMA Rafin. (Euphorbiac.).
purpurea *Rafin. Autikon Botanikon*, 94 (1840); cf. *Fernald in Rhodora*, 1932, xxxiv. 25.—U.S.A. (Pennsylvania).

AGANOSMA G. Don (Apocynac.).
odora *Tsiang in Sunyatsenia*, ii. 154 (1934).—China (Hainan).
radiata *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 51 (1935).—China (Hainan).

AGAPANTHUS L'Hérit. (Liliac.).
campanulatus *Leighton in S. Afr. Gard.* 1934, xxiv. 71, 82, in adnot.—Natal.
Hollandii *Leighton, l. c.*—Transvaal.
longispathus *Leighton, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).

AGAPETES G. Don (Ericac.; Vacciniac., Gen. Pl.).
adenobotrys *Airy-Shaw in Kew Bull.* 1935, 46.—Upper Burma.
angustifolia (*Knagg*) *Airy-Shaw, l. c.* 40, in obs.: Desmogyne angustifolia.
brachypoda *Airy-Shaw, l. c.* 51.—Upper Burma.
corallina *Cowan in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 36 (1933).—Burma.
hyalocheilos *Airy-Shaw in Kew Bull.* 1935, 42.—Ind. or. (Assam).
Kanjilali *Das in Assam Forest Rec., Bot.* i. 13 (1934); *Airy-Shaw in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3259 (1935), descr. emend.—Ind. or. (Assam).
neriifolia (*King & Prain*) *Airy-Shaw in Kew Bull.* 1935, 39: Desmogyne neriifolia.
pensilis *Airy-Shaw, l. c.* 52.—Upper Burma; China (Yunnan).
pseudo-Griffithii *Airy-Shaw, l. c.* 40.—Upper Burma.
pubiflora *Airy-Shaw, l. c.* 27.—Tibet; Upper Burma.
saxicola *Craib apud Kerr in Kew Bull.* 1935, 334.—Siam.
sikkimensis *Airy-Shaw in Kew Bull.* 1935, 29.—Ind. or. (Sikkim).
spissa *Airy-Shaw, l. c.* 49.—Ind. or. (Assam).
stenantha *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 350.—Burma.

AGASTACHE Kuntze (Labiat.).
formosana (*Hayata*) *Hayata ex Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1006 (1931): Lophanthus formosanus.

AGATHIS Salisb. (Pinac.; Conif., Gen. Pl.).
Brownii (*Lem.*) *L. H. Bailey, Cult. Conif. N. Amer.* 18, in adnot., 151 (1933): Dammara Brownii.
robusta *F. Muell. in Trans. Pharm. Soc. Vict.* ii. 174 (1860); *L. H. Bailey, l. c.* 151, in syn.: A. Brownii.

AGATHOSMA Willd. (Rutac.).
Barnesiae *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 296 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
bicornuta *R. A. Dyer in Kew Bull.* 1934, 269.—Afr. austr. (Cape Prov.).
clavisepala *R. A. Dyer, l. c.* 270.—Afr. austr. (Cape Prov.).
cryptocarpa *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 98 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
delicatula *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 297 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
perdita *Hutchinson in Bot. Mag.* t. 9377 (1934).—Afr. austr.
phylicoides *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 98 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).

AGATHOSMA:—
puberula (*Steud.*) *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 99 (1932): Diosma puberula.
roodebergensis *Compton in Journ. Bot.* 1932, lxx. 284.—Afr. austr. (Cape Prov.).

AGAVE L. (Amaryllidac.).
amaniensis *Trelease & Nowell in Kew Bull.* 1933, 465.—Cult.
chrysantha *Peebles in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 139.—U.S.A. (Arizona).
Dyckii *Hort. ex Jacobsen, Sukkulent.* 24 (1933), in syn.: A. Salmiana.
Murpheyi *F. Gibson in Contrib. Boyce Thompson Inst.* 1935, vii. 83.—U.S.A. (Arizona).
reginae *Hort. ex Jahandiez in Rev. Hort.* 1932–3, n. s. xxiii. 475 (1933), in syn.: A. megalacantha.
Whitackeri *Hort. ex Jacobsen, Sukkulent.* 24 (1933), in syn.: A. Salmiana.

AGELAEA Soland. (Connarac.).
trifolia (*Lam.*) *Gilg ex Schellenb. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 323 (1915), in obs.: Cnestis trifolia.
ugandensis *Schellenb. l. c.* 322, in obs.—Uganda; Tanganyika Terr.

AGERATINASTRUM Mattf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xi. 412 (1932): **Ageratina** O. Hoffm. (Compos.).
fruticosum (*O. Hoffm.*) *Mattf. l. c.*: Ageratina fruticosa.
glomeratum *Mattf. l. c.*—Tanganyika Terr.
Goetzeanum (*O. Hoffm.*) *Mattf. l. c.*: Ageratina Goetzeana.
polyphyllum (*Baker*) *Mattf. l. c.*: Ageratum polyphyllum.
virgatum *Mattf. l. c.* 413.—Tanganyika Terr.

AGERATUM L. (Compos.).
glaucum *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 448 (1894), in syn.: Eupatorium ligustrinum.
panamense *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 5 (1934): A. rivale *B. L. Robinson.*

AGLAIA Lour. (Meliac.).
decandra *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 427 (1824).—Nepal.
elegans *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 83, 11 (1931).—Ins. Viti.
insignis *Schwartz in Mitt. Inst. Bot. Hamburg*, vii. 235 (1931).—Borneo.
ochneocarpa *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 83 (1934).—Sumatra.
palauensis *Kanehira, Fl. Micrones.* 162 (1933), japonice; *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 671, latine.—Ins. Palau.
polystachya *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.* ii. 429 (1824).—Ind. or. (Assam).
ponapensis *Kanehira, Fl. Micrones.* 163 (1933), japonice; *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 672, latine.—Ins. Carolin. (Ponape).
tembelingensis *M. R. Henderson in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 94 (1933).—Penins. Mal.

×**AGROPOGON** P. Fourn. in Le Monde des Plantes, 1935, xxxvi. No. 213, 20. *GRAMINEAE.*
[AGROSTIS × POLYPOGON.]
lutosus (*Poir.*) *P. Fourn. l. c.*: Agrostis lutosa.

×**AGROPYROHORDEUM** G. Camus ex A. Camus in Riv. Scient. 1934, xxi. 44. *GRAMINEAE.*
[AGROPYRON × HORDEUM.]
Rouxii (*Gren. & Duval*) *G. Camus ex A. Camus, l. c.*: Agropyron Rouxii.

AGROPYRON J. Gaertn. (Gramin.).
×acutum *Simonet in Compt. Rend.* 1935, cci. 1210, in obs.—Cult.
ambigens (*Hausskn.*) *Roshev. in B. Fedtsch. et al. Fl. Turkm.* i. 191 (1932): A. trichophorum var. ambigens.
amgunense *Nevski in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 494, in obs., 505 (1932).—As. or. extr.
angulare *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 639 (1934).—Hab.?
angustiglume *Nevski in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 607, in obs., 615 (1932).—Ross. bor.; Sibir. occ.

AGROPYRON:—
antiquum *Nevski in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 515 (1932).—Tibet; China (Szechuan).
armenum *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 640 (1934).—Hab.?
attenuatiglume *Nevski, l. c.* 636.—Hab.?
burchan-buddae *Nevski in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 514 (1932).—Tibet.
Buschianum *Roshev. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 301 (1932).—Caucas.
canaliculatum *Nevski in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 509 (1932).—As. centr.
caninoides (*Pound*) *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 640 (1896): A. violaceum f. caninoides.
ciliolatum *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 650 (1934).—Hab.?
cimmericum *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 56 (1934), in clavi.—Hab.?
cretense *Coust. & Gandoger in Gandoger, Fl. Cret.* 107 (1916).—Creta.
curvatiforme *Nevski in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 633 (1932), in adnot.—Afghan.
curvatum *Nevski, l. c.* 629.—Turkestan.
Drobovii *Nevski, l. c.* 626: A. turkestanicum *Drob.*
dshungaricum *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 641 (1934).—Hab.?
×Duvalii *Simonet in Compt. Rend.* 1935, cci. 1212.—Gallia.
fibrosum (*Schrenk*) *Nevski in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 614 (1932), in obs.: Triticum fibrosum.
firmiculme *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 646 (1934).—Hab.?
flexuosissimum *Nevski in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 510 (1932).—Bokhara.
fragile (*Roth*) *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 53 (1934); *et in Komarov, Fl. URSS*, ii. 656 (1934): Triticum fragile.
gracillimum *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 638 (1934).—Hab.?
interruptum *Nevski in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 632 (1932), in adnot.—Turkestan.
jacutorum *Nevski, l. c.* 490, in obs., 502.—Sibir. (Yakutsk).
japonense *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 698: A. japonicum *Honda.*
Komarovi *Nevski in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 610, in obs., 620 (1932).—Sibir.; Mongol.
koryoënse *Honda*; cf. *Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 74, japonice.—Hab.?
Leersianum (*Wulfen*) *Rydb. in Brittonia*, i. 85 (1931): Triticum Leersianum.
marginatum *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 9 (1932).—Marocc.
maroccanum *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 136 [1933], nomen.—Marocc.
mite *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 699.—Japon. (Hondo).
nodosum (*Stev. ex M. Bieb.*) *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 646 (1934): Triticum nodosum.
novae-angliae *Scribn. in Brainerd, L. R. Jones & Egglest. Fl. Verm.* (*Contrib. Bot. Verm.* VIII.) 9, 103 (1900).—Am. bor.-or.
pachyrhizum *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 773 (1934).—Mongol.
Palmeri (*Scribn. & J. G. Smith*) *Rydb. Fl. Colorado*, 55 (1906): A. spicatum var. Palmeri.
pauciflorum (*Schweinitz*) *Hitchcock in Silveus, Texas Grasses*, 158 (1933); *et in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 132: Triticum pauciflorum.
pertenue (*C. A. Mey.*) *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 640 (1934): Triticum intermedium var. pertenue.
pinifolium *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 57 (1934), in clavi.—Hab.?
ponticum *Nevski, l. c.* 56, in clavi.—Hab.?
propinquum *Nevski in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 491, in obs., 498 (1932).—Sibir. (Altai).
pruiniferum *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 640 (1934).—Hab.?
pumilum (*Steud.*) *Nevski, l. c.* 650: Triticum pumilum.

AGROPYRON:—
reflexiaristatum *Nevski in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 490, in obs., 495 (1932).—Mont. Ural.
rifeum *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 136 [1933], nomen.—Marocc.
robustum *Litw. ex Nevski in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 609 (1932), in obs.—Hab.?
Roshevitzii *Nevski, l. c.* 493, in obs., 503.—Mongol.
sachalinense *Honda in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 177 (1931).—Sakhalin.
schugnanicum *Nevski in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 512 (1932).—As. centr.
sclerophyllum (*Novopokr.*) *Novopokr. in Sc. Journ. Rostov-on-Don State Univ.* vi. 39 (1935): A. cristatum subsp. sclerophyllum.
scythicum *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 638 (1934).—Hab.?
setuliferum *Nevski, l. c.* 642.—Hab.?
sinuatum *Nevski, l. c.* 639.—Hab.?
stenophyllum *Nevski in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 491, in obs., 500 (1932).—Turkestan.
stipifolium *Czerwiak.*; *Komarov, Fl. URSS*, ii. 637 (1934), descr. ross.—Rossia.
subsecundum (*Link*) *Hitchcock in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 131: Triticum subsecundum.
×Tallonii *Simonet in Compt. Rend.* 1935, cci. 1212.—Gallia.
tanaiticum *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 56 (1934), in clavi.—Hab.?
tianschanicum *Drob.*; *Nevski in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 622 (1932), descr. emend.—Turkestan.
trachycaulon (*Link*) *Hort. ex Steud. Syn. Pl. Gram.* 344 [1854], in syn.; *Malte ex H. F. Lewis in Canadian Field-Nat.* 1931, xlv. 201: Triticum trachycaulum.
transbaicalense *Nevski in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 607, in obs., 618 (1932).—Sibir. (Transbaikal.).
Tugarinovii *Reverd. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1932, No. 4, 1.—Sibir.
tunguscense *Drob. ex Nevski in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 25 (1933), in obs., pro syn.: Roegneria jacutensis.
turuchanense *Reverd. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1932, No. 4, 2.—Sibir.
varnense (*Velen.*) *Hayek in Fedde, Repert. Beih.* xxx. III. 222 (1932): Triticum varnense.
violascens (*Ramaley*) *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 635 (1896); *Hitchcock, Man. Grasses U.S.* 778 (1935): A. caninum f. violascens.
vulpinum (*Rydb.*) *Hitchcock in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 132: Elymus vulpinus.

AGROPYROPSIS A. Camus in Bull. Soc. Bot. France, 1935, lxxxii. 11. *GRAMINEAE.* [CATAPODIUM subgen. AGROPYROPSIS Battand. & Trab.]
gracilis (*Parl.*) *A. Camus in Rev. Bot. Appliq.* 1935, xv. 1050: Lolium gracile.
Lolium (*Balansa*) *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1935, lxxxii. 11: Festuca Lolium.

AGROSTEMMA L. (Caryophyllac.).
linicola *Terech. in Bull. Applied Bot., Leningrad*, 1930–1, xxv. No. 4, 283 (1931).—Rossia.

AGROSTIS L. (Gramin.).
acutiglumis *Tutin & E. F. Warb. in Journ. Bot.* 1932, lxx. 43.—Ins. Azor. (Pico; S. Miguel).
×Ambrosii *Sennen in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xv. Ser. Bot. No. 1, 38 (1931), in obs.—Hispan.
anadyrensis *Soczawa in Komarov, Fl. URSS*, ii. 176, 746 (1934).—Sibir.
anomala (*Trin.*) *Herter, Fl. Urug. Pl. Vasc.* (*Estud. Bot. Reg. Urug.* iv.) 32 (1931): Aira anomala.
arisan-montana *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 161.—Formosa.
azorica (*Hochst.*) *Tutin & E. F. Warb. in Journ. Bot.* 1932, lxx. 42: Deyeuxia azorica.
boetica *Hort. ex Colla, Herb. Pedem.* vi. 18 (1836), in obs.—Ital.?
Bolivaris *Sennen in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xv. Ser. Bot. No. 1, 38 (1931), in obs., nomen.—Hispan.
Claudii *Sennen in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xv. Ser. Bot. No. 1, 37 (1931), in obs., nomen.—Hispan.
comorensis *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 34.—Ins. Comor.
congener *Schumacher, Beskr. Guin. Pl.* 46 (1827).—Guinea super.
congestiflora *Tutin & E. F. Warb. in Journ. Bot.* 1932, lxx. 43: Deyeuxia caespitosa.
Decaryana *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 35.—Madag.
dura *Bellard. ex Colla, Herb. Pedem.* vi. 17 (1836), in obs.—Ind. or.
Font-Queri *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 320.—Marocc.
Fukuyamae *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 39 (1934).—Formosa.
×Hackelii *Fouill. in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 801 (1933), in obs.—Gallia.
Heptaseta *Koidz. in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 146, in syn.: Senisetum Hideoi.
heteropoda *Trautv. ex Komarov, Fl. URSS*, ii. 173 (1934), in syn.: A. pisidica.
jacutica *Schischk. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 179, 747 (1934).—Sibir.
koreana *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 39 (1934).—Corea.
Kudoi *Honda in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 135 (1931).—Sakhalin.
limitanea *J. M. Black in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1931, lv. 137.—S. Austral.
macilenta *Keng in Sunyatsenia*, iii. 17 (1935).—China (Kwangtung).
macrantha *Schischk. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 177, 746 (1934).—Caucas.
makoniensis *Stent & Rattray in Proc. Rhodes. Scientif. Assoc.* xxxii. (*Stent & Rattray, Grasses S. Rhodes.*) 43 (1933).—S. Rhodesia.
Mannii (*Hook. f.*) *Stapf in Dyer, Fl. Cap.* vii. 549 (1899), in obs.: Deyeuxia Mannii.
Mauritii *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 126 [1933], nomen.—Marocc.
maxima *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 319 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 317 (1832).—Ind. or.
×Murbeckii *Fouill. in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 799 (1933), in obs.—Gallia.
Navarroi *Sennen in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xv. Ser. Bot. No. 1, 38 (1931), in obs., nomen.—Hispan.
Perezi *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 126 [1933], nomen.—Marocc.
rapensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 84, 80 (1931).—Polynes. (Ins. Rapa).
retroflexa *Balb. ex Colla, Herb. Pedem.* vi. 17 (1836).—Ital.?
Schmidii (*Hook. f.*) *C. E. C. Fischer in Gamble, Fl. Madras*, 1810 (1934): Calamagrostis Schmidii.
spicigera *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 10 (1932).—Marocc.
subaseta *Koidz. in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 146, in obs., japonice.—Hab.?
tsaratananensis *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 35.—Madag.
wulingensis *Honda in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. 11. (*Contrib. Cogn. Fl. Mansh.*: *Pl. Nov. Jehol.* 11. i.) 10 (1935).—Manchur. (Jehol).

AGROSTISTACHYS Dalz. (Euphorbiac.).
coriacea *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 265 (1931): A. longifolia *Trimen, l. c.* iv. 56 (1898), non *Benth.*

AGROSTOPHYLLUM Blume (Orchidac.).
luzonense *Ames & Quisumb. in Philipp. Journ. Sc.* 1932, xlvii. 197.—Ins. Philipp. (Luzon).
saccatilabium *Ames & Quisumb. l. c.* 1932, xlix. 487.—Ins. Philipp. (Luzon).
ventricosum *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 28 (1935).—N. Guin.

AGUIARIA Ducke in Ann. Acad. Bras. Sc. 1935, vii. 329. *BOMBACACEAE.*
excelsa *Ducke, l. c.*—Bras. (Amaz.).

AÏCHRYSON Webb & Berth. (Crassulac.).
divaricatum (*Ait.*) *Praeger, Sempervivum*, 125 (1932): Sedum divaricatum.
dumosum (*Lowe*) *Praeger, Sempervivum*, 127 (1932): Sempervivum dumosum.
molle *J. Gay ex Stapf in Bot. Mag.* sub t. 9294 (1933), in obs., nomen.—Hab.?

AILANTHUS Desf. (Simaroubac.).
triphysa (*Dennst.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 41 (1931): Adenanthera triphysa.

AINSLIAEA DC. (Compos.).
angustata *Chang in Sinensia*, v. 158 (1934).—China (Kansu; Szechuan).
cleistogama *Chang, l. c.* iv. 225 (1934).—China (Kwangtung).
Hui *Diels ex Mattf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 109 (1931).—China (Hunan; Kiangsi; Chekiang).
multibracteata *Mattf. l. c.* 106.—China (Szechuan).
plantaginifolia *Mattf. l. c.* 107.—China (Hunan).
rubrinervis *Chang in Sinensia*, iv. 226 (1934).—China (Szechuan).
Smithii *Mattf. in Acta Hort. Gothoburg.* 1933, viii. 79.—China (Szechuan).
tenuicaulis *Mattf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 108 (1931).—China (Hupeh).

AIOUEA Aubl. (Laurac.).
rubra *A. C. Smith in Phytologia*, i. 115 (1935).—Bras. (Amaz.).

AÏPHANES Willd. (Palmae).
acanthophylla (*Mart.*) *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 558 (1932): Bactris acanthophylla.
deltoidea *Burret, l. c.* 568.—Peruv.
disticha (*Linden*) *Burret, l. c.* 575: Martinezia disticha.
Eggersii *Burret, l. c.* 563.—Ecuador.
Ernesti (*Burret*) *Burret, l. c.* 560: Martinezia Ernesti.
erosa (*Linden*) *Burret, l. c.* 558: Martinezia erosa.
gracilis *Burret, l. c.* 566.—Peruv.
hirsuta *Burret, l. c.* 573.—Colomb.
horrida (*Jacq.*) *Burret, l. c.* 575: Caryota horrida.
Kalbreyeri *Burret, l. c.* 572.—Colomb.
Killipii (*Burret*) *Burret, l. c.* 562: Martinezia Killipii.
leiospatha *Burret, l. c.* 571.—Colomb.
leiostachys *Burret, l. c.* 570.—Colomb.
linearis *Burret, l. c.* 577.—Colomb.
macroloba *Burret, l. c.* 576.—Colomb.
minima (*Gaertn.*) *Burret, l. c.* 558: Bactris minima.
monostachys *Burret, l. c.* 574.—Colomb.
orinocensis *Burret, l. c.* 561.—Venez.
pachyclada *Burret, l. c.* 574.—Colomb.
parvifolia *Burret, l. c.* 569.—Colomb.
praemorsa (*Poepp. ex Mart.*) *Burret, l. c.* 575: Bactris praemorsa.
simplex *Burret, l. c.* 567.—Colomb.
Tessmannii *Burret, l. c.* 564.—Peruv.
Ulei (*Dammer*) *Burret, l. c.* 568: Martinezia Ulei.
Weberbaueri *Burret, l. c.* 565.—Peruv.

AIRA L. (Gramin.).
filiformis *Koen. ex Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 328 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 326 (1832).—Ind. or.
Fioriana *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 128 [1933], nomen.—Marocc.
Fontqueriana *Sennen, l. c.*, nomen.—Marocc.
intermedia *Guss. Suppl. Fl. Sic. Prodr.* 16 (1832).—Sicil.
ligulata (*Stapf*) *Henrard in Blumea*, i. 310 (1935), in obs.: Deschampsia flexuosa var. ligulata.
mucronulata *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 128 [1933], nomen.—Marocc.
Sukatschewii *Popl. ex Roshev. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 246 (1934), in syn.: Deschampsia Sukatschewii.

AIROPSIS Desv. (Gramin.).
laevis (*Brot.*) *P. Fourn. in Le Monde des Plantes*, 1934, xxxv. 30, in obs.: Aira laevis.

AÏSTOCAULON v. Poelln. ex Jacobsen, Succ. Pl. 123 (1935): **Acaulon** N. E. Brown (Ficoidac.).
rosulatum (*N. E. Brown*) *v. Poelln. ex Jacobsen, l. c.*: Acaulon rosulatum.

AÏZOANTHEMUM Dinter in Kakteenk. 1935, 27. *CACTACEAE.*
membrumconnectens *Dinter, l. c.*—Afr. austr.-occ.

AÏZOÖN L. (Ficoidac.).
karooicum *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 283 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).

AJUGA L. (Labiat.).
glabrifolia (*St. Lager*) *Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* ix. 31 [1927]: A. genevensis var. glabrifolia.
grandiflora *Stapf in Bot. Mag.* t. 9320 (1933).—Austral.
lanosa *Sun in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., vii. 14 (1932).—China (Kiangsu).
Matsumurana *Kudo in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1931, iii. 225.—Formosa.
pachyrrhiza *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 614.—Manchur.
pallescens (*Maxim.*) *Price & Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 135 (1934): A. genevensis var. pallescens.
shikotanensis *Miyabe & Tatewaki in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.* xiv. 7 (1935).—Ins. Kuril.

ALAFIA Thou. (Apocynac.).
jasminiflora *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 43 (1931), in syn.: Holalafia jasminiflora.

ALANGIUM Lam. (Alangiac.; Cornac., Gen. Pl.).
Havilandii *Bloemb. in Blumea*, i. 277 (1935).—Borneo.
hirsutum *Bloemb. l. c.* 254.—Borneo.
kenyense *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 47 (1935).—Kenya Col.
maliliense *Bloemb. in Blumea*, i. 286 (1935).—Celebes.
rotundifolium (*Hassk.*) *Bloemb. l. c.* 258: Diacicarpium rotundifolium.
scandens *Bloemb. l. c.* 264.—Sumatra; Borneo.
tomentosum (*Blume*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 684 (1933): Diacicarpium tomentosum.

ALATOSETA Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr. xix. 314 (1931). *COMPOSITAE.*
tenuis *Compton, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).

ALBERTA E. Mey. (Rubiac.).
Humbloti *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxxvi. (*Hist. Nat. Pl.* vi. Atlas iv.) t. 439 (1897).—Madag.

ALBERTINIA Spreng. (Compos.).
incanescens *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 290 (1834).—Bras.
Martii *Colla, l. c.* 291.—Bras.

ALBIZZIA Durazz. (Legumin.).
amaniensis *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1932, lxx. 255.—Tanganyika Terr.
Evansii *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. ii. p. xvii. 349 (1932).—Transvaal.
falcata (*L.*) *Backer, Voorl. Schoolfl. Java*, 109 (1908): Adenanthera falcata.
flavovirens *Hoyle in Kew Bull.* 1933, 173.—Nigeria.
Laui *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 7 (1935).—China (Hainan).
ogadensis (*Chiov.*) *E. G. Baker ex Chiov. Fl. Somala*, ii. 182 (1932): Acacia ogadensis.
parvifolia *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. ii. p. xvii. 348 (1932).—Transvaal.
rhodesica *Burtt Davy, l. c.* p. xviii. 348.—Rhodesia.
Rogersii *Burtt Davy, l. c.*—Transvaal.
rubiginosa *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 58 (1935).—Mexico.
struthiophylla *Milne-Redhead in Kew Bull.* 1933, 144.—Rhodesia.
sumatrana *v. Steenis in Encycl. Ned.-Ind.* ed. 2, Suppl. Vol. vi. 864 (1931).—Sumatra.
turgida (*Merrill*) *Merrill ex Chung in Mem. Sc. Soc. China*, i. 105 (1924), nomen; *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* vii. 310 (1931): Pithecellobium turgidum.

ALBUCA L. (Liliac.).
abyssinica *Welw. ex Baker in Gard. Chron. & Agric. Gaz.* 1872, 392, sphalm. typ.: A. angolensis.
asclepiadea *Chiov. Fl. Somala*, II. 426 (1932).—Somal. Ital.
bifoliata *R. A. Dyer in Rec. Albany Mus.* iv. 113 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).

ALCEA Mill. (Malvac.).
tiliacea *Bornm. in Fedde, Repert.* xxxvi. 169 (1934), in syn.: Althaea tiliacea.

ALCHEMILLA L. (Rosac.).
adscendens *Rothmaler in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 31, 25 (1935); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 150.—Colomb.
aemula *Juzepczuk in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 120 (1933).—Crimea.
Alexandri *Juzepczuk in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 325 (1934).—Caucas.
altaica *Juzepczuk in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1932, Nos. 5–6, p. 5.—Altai.
andina (*Perry*) *Macbride in Candollea*, v. 366 (1934): A. procumbens var. andina.
anisopoda *Juzepczuk in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1932, Nos. 5–6, p. 7.—Sibir. austr.-or.
appressipila *Juzepczuk, l. c.* p. 10.—Sibir.
argutiserrata *H. Lindb. ex Juzepczuk, l. c.* p. 4, in adnot.—Sibir. occ.
aroanica (*Buser*) *Rothmaler in Fedde, Repert.* xxxiii. 345 (1934): A. acutiloba subsp. aroanica.
× aspleniifolia *Rothmaler in Rev. Sudamer. Bot.* 1935, ii. 13.—Argent.
atlantica *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 72 (1932).—Marocc.
australiana *Rothmaler in Fedde, Repert.* xxxviii. 42 (1935).—Austral.; Tasman.
barbatiflora *Juzepczuk in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 329 (1934).—Caucas.
barbulata *Juzepczuk in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1932, Nos. 5–6, p. 4.—Sibir.
Bornmuelleri *Rothmaler in Fedde, Repert.* xxxiii. 348 (1934).—Armen.
Bungei *Juzepczuk in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1932, Nos. 5–6, p. 2.—Altai.
Buschii *Juzepczuk in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 128 (1933).—Crimea.
Buseriana *Rothmaler in Fedde, Repert.* xxxiii. 345 (1934).—As. Min.
canadensis *Rothmaler, l. c.* xxxviii. 41 (1935).—Ins. Vancouver.
cartalinica *Juzepczuk in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 327 (1934).—Caucas.
catalaunica *Rothmaler in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.* 1934, xxxiv. 150.—Hispan.
compactilis *Juzepczuk in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 325 (1934).—Caucas.
Cuatrecasasii *Rothmaler in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 31, 24 (1935), in syn.; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 150.—Hab. ?
dagestanica *Juzepczuk in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 326 (1934).—Caucas.
debilis *Juzepczuk, l. c.* 330.—Caucas.
decalvans *Juzepczuk in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 125 (1933).—Ross. centr. et or.
depexa *Juzepczuk in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 326 (1934).—Caucas.
diversipes *Juzepczuk, l. c.* 325.—Caucas.
egens *Juzepczuk in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 119 (1933).—Ross. centr.
Elisabethae *Juzepczuk in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 322 (1934).—Caucas.
epipsila *Juzepczuk, l. c.* 328.—Caucas.
erectipila *Juzepczuk ex Lipschitz in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1931, n.s. xl. 138, nomen.—Songaria.
erythropoda *Juzepczuk in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 323 (1934).—Caucas.
Font-Querii *Rothmaler in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.* 1934, xxxiv. 151.—Hispan.
fruticulosa *Rothmaler in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 491 (1935).—Mexico.
fulvescens (*Perry*) *Rothmaler l. c.* 490, in obs.: A. venusta var. fulvescens.
georgica *Juzepczuk in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 327 (1934).—Caucas.
Grossheimii *Juzepczuk, l. c.* 323.—Caucas.
guatemalensis *Rothmaler in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 489 (1935).—Guatem.
Haraldi *Juzepczuk in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 130 (1933).—Rossia.
hebescens *Juzepczuk in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1932, Nos. 5–6, p. 3.—Sibir.
hirsutiflora (*Buser*) *Rothmaler in Fedde, Repert.* xxxiii. 344 (1934): A. acutiloba var. hirsutiflora.

ALCHEMILLA:—
hirta (*Perry*) *Rothmaler in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 31, 12 (1935); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 150: A. procumbens var. hirta.
hirtipedicellata *Juzepczuk in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 327 (1934).—Caucas.
imbricata *Rothmaler in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 31, 18 (1935); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 150.—Colomb.
insignis *Juzepczuk in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 325 (1934).—Caucas.
inyangensis *Weimarck in Bot. Notiser*, 1932, 18.—Rhodesia.
jailae *Juzepczuk in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 118 (1933).—Crimea.
Juzepczukii *Alech. in Prelim. Rep. Nijegorodsk. Bot. Exped. 1928*, iv. 92 (1929); cf. *Krylov, Fl. Sibir. Occ.* vii. 1553 (1933).—Sibir.
Killipii *Rothmaler in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 31, 26 (1935); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 150.—Colomb.
Kozlovskyi *Juzepczuk in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 325 (1934).—Caucas.
Krylovii *Juzepczuk in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1932, Nos. 5–6, p. 9.—Sibir.
leiophylla *Juzepczuk in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 127 (1933).—Ross. centr. et or.
Lidijae *Zamel. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1931, No. 3, p. 1 (1932).—Sibir. occ.
Lipschitzii *Juzepczuk ex Lipschitz in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1931, n.s. xl. 138, nomen.—Songaria.
Litardierei *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 73 (1932), in obs.—Marocc.
Litwinowii *Juzepczuk in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 122 (1933).—Ross. centr.
Looseri *Rothmaler in Rev. Sudamer. Bot.* 1935, ii. 11.—Chile; Boliv.
macrosepala (*Rydb.*) *Rothmaler in Fedde, Repert.* xxxviii. 41 (1935): Aphanes macrosepala.
Mairei *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 73 (1932), in obs.—Marocc.
microdonta *Juzepczuk in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 330 (1934).—Caucas.
mollis (*Buser*) *Rothmaler in Fedde, Repert.* xxxiii. 347 (1934): A. acutiloba var. mollis.
Mutisii *Rothmaler in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 31, 38 (1935); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 150.—Colomb.; Ecuador.
neglecta *Rothmaler in Rev. Sudamer. Bot.* 1935, ii. 12.—Chile; Boliv.
obtegens *Juzepczuk in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 327 (1934).—Caucas.
orbicans *Juzepczuk in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1932, Nos. 5–6, p. 6.—Sibir. occ.
paludicola *Rothmaler in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 31, 41 (1935); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 150.—Colomb.; Ecuador.
pedicellata *Rothmaler in Rev. Sudamer. Bot.* 1935, ii. 12.—Boliv.; Argent.
penicillata (*De Wild.*) *Hauman & Balle in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiv. 344 (1934): A. Volkensii var. penicillata.
Perryana *Rothmaler in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 31, 35 (1935); cf *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 150.—Colomb.
persica *Rothmaler in Fedde, Repert.* xxxiii. 349 (1934).—Persia.
pseudo-cartalinica *Juzepczuk in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 327 (1934).—Caucas.
pseudomicans *Böcher in Meddel. Grønland*, civ. No. 3, 16 (1933).—Groenlandia.
pseudovenusta *Rothmaler in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 489 (1935).—Peruv.
psiloneura *Juzepczuk in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 129 (1933).—Ross. centr.
ramosissima *Rothmaler in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 491 (1935).—Venez.
resupinata *Rothmaler in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 31, 22 (1935); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 150.—Colomb.
rigescens *Juzepczuk in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1932, Nos. 5–6, p. 5.—Sibir. occ.

ALCHEMILLA:—
rivulorum *Rothmaler in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 490 (1935).—Ecuador; Peruv.
rubens *Juzepczuk ex Lipschitz in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1931, n.s. xl. 138, nomen.—Songaria.
Scaettae *Staner in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiii. 216 (1933), nomen.—Congo Belg.
Schischkini *Juzepczuk in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1932, Nos. 5–6, p. 7.—Altai.
schistophylla *Juzepczuk in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 121 (1933).—Ross. centr.
Sedelmeyeriana *Juzepczuk in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 324 (1934).—Caucas.
sevangensis *Juzepczuk, l. c.* 328.—Caucas.
sibirica *Zamel. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1931, No. 3, p. 3 (1932).—Sibir. occ.
stellaris *Juzepczuk in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 126 (1933).—Ross. centr.
stricticaulis *Juzepczuk ex Lipschitz in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1931, n.s. xl. 135, in obs., nomen.—Songaria.
subcrenatiformis *Juzepczuk in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 325 (1934).—Caucas.
suberectipila *Juzepczuk, l. c.* 326.—Caucas.
Tamarae *Juzepczuk, l. c.*—Caucas.
taurica *Juzepczuk in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 118 (1933), in syn.: A. flabellata var. taurica *Buser*.
turuchanica *Juzepczuk in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1932, Nos. 5–6, p. 8.—Sibir. bor.-occ.
tytthantha *Juzepczuk in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 123 (1933).—Crimea.
venosa *Juzepczuk in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 328 (1934).—Caucas.
viridicans *Rothmaler in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.* 1934, xxxiv. 150.—Hispan.

ALCHIMILLA Mill. Gard. Dict. Abridg., ed. 4 (1754): **Alchemilla** L. (Rosac.).

ALCHORNEA Sw. (Euphorbiac.).
borneënsis *Pax & K. Hoffm. in Mitt. Inst. Bot. Hamburg*, vii. 227 (1931).—Borneo.
megalostylis *Rusby in Phytologia*, i. 63 (1934).—Boliv.
oblongifolia *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 66 (1935).—Brit. Honduras.

ALCHORNEOPSIS Muell.-Arg. (Euphorbiac.).
trimera *Lanj. Euphorbiac. Surinam*, 23 (1931).—Surinam.

ALDASOREA Hort. ex Haage & Schmidt, Gen. Cat. 203 (1930); cf. A. Berger in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, xviii a. 425 (1930), in obs. *CRASSULACEAE*.
Goochiae *Hort. ex Haage & Schmidt, Gen. Cat.* 203 (1930); *Praeger, Sempervivum*, 207 (1932), in syn.: Aeonium Goochiae.
percarnea *Hort. ex Haage & Schmidt, l. c.*; *Praeger, l. c.* 188, in syn.: Aeonium percarneum.
Saundersii *Hort. ex Haage & Schmidt, l. c.*; *Praeger, l. c.* 208, in syn.: Aeonium Saundersii.
strepsiclada *Hort. ex Haage & Schmidt, l. c.*; *Praeger, l. c.* 202, in syn.: Aeonium spathulatum.

ALECTOROLOPHUS Zinn, Cat. Pl. Gott. 288 (1757); cf. Sprague in Kew Bull. 1934, 218: **Rhinanthus** L. (Scrophulariac.).
ceretanus *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1930, xxix. 163 (1931), descr.—Hispan.
×digeneus *Widder in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1932, lxxxi. 224.—Styria.

ALECTORURUS Makino (Liliac.).
platypetalus *Masamune, Prelim. Rep. Veg. Yakus.* 53 (1929); *Masamune in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* xi., Bot. No. 4, 552 (1934), in syn.: A. yedoënsis var. platypetalus *Masamune*.

ALECTRA Thunb. (Scrophulariac.).
aberdarica *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 90 (1935).—Kenya Col.
paludosa *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 223 (1931), in syn.: A. virgata.

ALECTRYON Gaertn. (Sapindac.).
samoënsis *Christoph. in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 128, p. 130 (1935).—Samoa.

ALEPIDOCLINE Blake in Journ. Wash. Acad. Sc. 1934, xxiv. 439. *COMPOSITAE*.
annua *Blake, l. c.* 441.—Guatem.

ALETRIS L. (Liliac.; Haemodorac., Gen. Pl.).
formosana (*Hayata*) *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1534 (1931): Metanarthecium formosanum.

ALEXA Moq. (Legumin.).
bauhiniiflora *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 732.—Bras. (Amaz.).

ALHAGI Adans. (Legumin.).
brevispina *Maire in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 907, nomen provis.—Sahara Gall. (Tibesti).
canescens (*Regel*) *Shap. in Sovietsk. Bot.* 1933, Nos. 3–4, 164: A. camelorum var. canescens.
nepalensis (*D. Don*) *Shap. l. c.* 170: Manna nepalensis.

ALIBERTIA A. Rich. (Rubiac.).
acuminata (*Benth.*) *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 470: Cordiera acuminata.
benensis *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 291 (1931).—Boliv.
Gardneri *Standley, l. c.* viii. 354 (1931).—Bras. (Piauhy).
hispida *Ducke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 480 (1932).—Peruv.
iquitensis *Ducke, l. c.* 481.—Peruv.

ALISMA L. (Alismatac.).
orientale (*G. Samuelsson*) *Juzepczuk in Komarov, Fl. URSS*, i. 281 (1934): A. Plantago-aquatica var. orientale.
rariflorum *G. Samuelsson in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 7, 32 (1932).—Japon.

ALKANNA Tausch (Boraginac.).
leucantha *Bornm. in Magyar Bot. Lap.* 1931, xxx. 68.—As. Min.
tripolitana *Bornm. l. c.* 1934, xxxiii. 86.—Tripolit.

ALLAMANDA L. (Apocynac.).
salicifolia *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 655 (1895), in syn.: A. cathartica f. salicifolia *Voss*.

ALLANBLACKIA Oliv. (Guttif.).
Marienii *Staner in Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. 110 (1934).—Congo Belg.
monticola *Mildbr. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 509 (1921), in obs.—Fernando Po.

ALLIONIA Loefl. (Nyctaginac.).
Choisyi *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 310 (1931): A. incarnata var. glabra *Choisy*, non A. glabra *Kuntze*.
cristata (*Standley*) *Standley, l. c.*: Wedelia cristata.

ALLIUM L. (Liliac.).
Abdelkaderi *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 120 [1933], nomen.—Marocc.
alaicum *Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xix. 130 (1934).—As. centr.
albanum *Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 211 (1928).—Caucas.
albo-tunicatum *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxvi. 73 (1934).—As. Min. (Lydia).
Albovianum *Vved. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 187 (1935): A. gracile *Albov*.
amabile *Stapf in Bot. Mag.* t. 9257 (1931).—China (Yunnan).
anisotepalum *Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xix. 123 (1934).—As. centr.
antiatlanticum *Emberger & Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1932, xxiii. 217.—Marocc.
Antoniani *Bordz. in Fedde, Repert.* xxxvi. 303 (1934).—Armen. Ross.
aroides *Popov & Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xix. 128 (1934).—As. centr.
artvinense *Misczenko ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 203 (1928).—Caucas.
asperiflorum *Misczenko ex Grossheim, l. c.* 205.—Caucas.
atlanticum *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 120 [1933], nomen.—Marocc.
atriphoeniceum *Bornm. in Fedde, Repert.* xxxviii. 161 (1935).—Armen.

ALLIUM:—
Bischoffi *Hausskn. ex Dinsm. in Post, Fl. Syria, Palest. & Sinai*, ed. 2, ii. (*Publ. Am. Univ. Beirut*, Nat. Sc. Ser., No. 1) 645 (1933), in syn.: A. Haussknechtii.
brachyscapum *Vved. in B. Fedtsch. et al. Fl. Turkm.* i. 291 (1932); *et in Bull. Univ. As. Centr.* xix. 129 (1934).—Transcasp.
caput-Medusae *Airy-Shaw in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 140 (1931).—Upper Burma.
chalcophengos *Airy-Shaw, l. c.* 137.—S. E. Tibet; China (Szechuan; Yunnan).
confragosum *Vved. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 227 (1935).—As. centr.
Coryi *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 17, 21 (1930).—U.S.A. (Texas).
cratericola *Eastw. in Leafl. West. Bot.* i. 132 (1934).—U.S.A. (Calif.).
crystallinum *Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xix. 126 (1934).—As. centr.
daghestanicum *Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 208 (1928).—Caucas.
dolichomischum *Vved. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 160 (1935).—As. centr.
dolichostylum *Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xix. 120 (1934).—As. centr.
drepanophyllum *Vved. l. c.*—As. centr.
Drobovi *Vved. in Trans. Sc. Soc. Turk.* i. 125 (1923).—As. centr.
ebusitanum *Font Quer in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1924, xxiv. 145.—Ins. Balear. (Ibiza).
elegantulum *Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. 11. (*Contrib. Cogn. Fl. Mansh.*) 98 (1935).—Manchur.
Elmendorfi *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 20 (1933–5).—U.S.A. (Texas).
equicaeleste *St. John in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1931, xliv. 31.—U.S.A. (Washington).
Eugeni *Vved. in B. Fedtsch. et al. Fl. Turkm.* i. 286 (1932); *et in Bull. Univ. As. Centr.* xix. 127 (1934).—As. centr.
eurotophilum *Wiggins in Contrib. Dudley Herb. Stanford Univ.* i. 164 (1933).—Calif. infer.
eusperma *Airy-Shaw in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 137 (1931).—China (Yunnan).
filiforme *Colla, Herb. Pedem.* v. 387 (1836).—Sibir. (Transbaikal.).
Fomini *Misczenko ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 203 (1928).—Caucas.
funiculosum *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 573.—U.S.A. (Colorado; Arizona; N. Mexico).
glaciale *Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xix. 121 (1934).—As. centr.
Gmelinianum *Misczenko ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 209 (1928).—Caucas.
Grosii *Font Quer in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1924, xxiv. 145.—Ins. Balear. (Ibiza).
gunibicum *Misczenko ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 208 (1928).—Caucas.
helicophyllum *Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xix. 127 (1934).—Transcasp.
insufficiens *Vved. l. c.* 129.—As. centr.
jajlae *Vved. l. c.* 126.—Crimea; Caucas.
jucundum *Vved. l. c.* 122.—Turkestan. (Thian Shan).
Koenigianum *Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 200 (1928).—Caucas.
Komarovianum *Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xix. 119 (1934).—Sibir. or.
kopetdagense *Vved. in B. Fedtsch. et al Fl. Turkm.* i. 280 (1932); *et in Bull. Univ. As. Centr.* xix. 125 (1934).—Transcasp.
kujukense *Vved. in Trans. Sc. Soc. Turk.* i. 124 (1923).—Turkestan.
Kunthianum *Vved. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 207 (1935): A. lepidum *Kunth*.
lasiophyllum *Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xix. 125 (1934).—Turkestan. (Thian Shan).
lenkoranicum *Misczenko ex Grossheim*; *Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 214 (1928), descr. ross.—Caucas.
Listera *Stearn in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* v. 326 (1934).—China (Chihli).
lutescens *Vved. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 159 (1935).—As. centr.
Maackii (*Maxim.*) *Prokh. in Komarov & Klob.-Alis. Key Pl. Far East. Reg. USSR*, i. 366 (1931).—Ross. asiat. or.

ALLIUM:—
mareoticum *Bornm. & Gauba in Fedde, Repert.* xxxi. 396 (1933).—Aegypt.
Marschalianum *Vved. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 184 (1935): A. saxatile *M. Bieb.* (1808).
minutum *Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xix. 124 (1934).—As. centr.
mohavense (*Jepson*) *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 39: A. fimbriatum var. mohavense.
monophyllum *Vved.*; *Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xix. 128 (1934), descr. ampl.—Transcasp.
nanodes *Airy-Shaw in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 141 (1931).—China (Yunnan).
nothum *Vved. in Vved. et al. Key Fl. Tashkent*, 66 (1923).—Turkestan.
ochotense *Prokh. in Bull. Applied Bot., Leningrad*, 1929–30, xxiv. No. 2, 174 (1930), in adnot.—Kamchatka; Sakhalin.
oltense *Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 203 (1928).—Caucas.
omiostema *Airy-Shaw in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 144 (1931).—Sibir. (Transbaikal.); China (Chihli; Kansu).
ophiophyllum *Vved. in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 3, 8 (1928).—Bokhara.
oreodictyum *Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xix. 119 (1934).—As. centr.
oreoprasoides *Vved. in Trans. Sc. Soc. Turk.* ii. 29 (1925).—Turkestan.
Oschaninii *B. Fedtsch. in Progr. Sadov. i Ogorod.* iii. 332 (1906); cf. *Vved. in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 3, 6 (1928), in syn.: A. Cepa var. sylvestre *Regel*.
paepalanthoides *Airy-Shaw in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 142 (1931).—China (Szechuan).
parvulum *Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xix. 124 (1934).—Turkestan. (Thian Shan).
pictistamineum *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxvi. 72 (1934).—As. Min. (Lydia).
ponticum *Misczenko ex Grossheim*; *Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 206 (1928); *Vved. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 244 (1935), descr. ross.—Caucas.
Popovii *Vved. in Trans. Sc. Soc. Turk.* i. 124 (1923).—Turkestan.
pseudoampeloprasum *Misczenko ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 204 (1928).—Caucas.
pseudoflavum *Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xix. 123 (1934).—Caucas.
pseudoseravschanicum *Popov & Vved. ex Vved. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 273 (1935).—As. centr.
pumilum *Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xix. 121 (1934).—Sibir. occ.
pygmaeum *E. Perrier, Cat. Pl. Vasc. Savoie*, ii. (*Mém. Acad. Sc. Savoie*, Sér. V. v.) 250 (1928).—Gallia.
pyrrhorrhizum *Airy-Shaw in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 141 (1931).—China (Yunnan).
Regelianum *Beck. ex Iljin in Fl. Ugo-Vost.* iii. 355, 356 (1929); cf. *Vved. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 241 (1935).—Rossia.
Regnieri *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 317.—Marocc.
Rollovi *Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 205 (1928).—Caucas.
Satoanum *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 92.—Manchur.
Savarini *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 120 [1933], nomen.—Marocc.
saxatile *M. Bieb. Tabl. Prov. Casp.* 114 (1798); *Vved. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 184 (1935).—Rossia; As. centr.
scopulicola *Font Quer in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1924, xxiv. 144.—Ins. Balear. (Ibiza).
scrobiculatum *Vved. in Trans. Sc. Soc. Turk.* i. 123 (1923).—Turkestan.
Sergii *Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xix. 127 (1934).—Turkestan. (Thian Shan).
Sosnovskyanum *Misczenko ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 207 (1928).—Caucas.
stenodon *Nakai & Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. 1. (*Pl. Nov. Jehol.* 1) 18 (1934).—Manchur. (Jehol).
stylosum *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxvi. 71 (1934).—As. Min. (Lydia).
taeniopetalum *Popov & Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xix. 130 (1934).—As. centr.

ALLIUM:—
talyschense *Misczenko ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 204 (1928).—Caucas.
tel-avivense *Eig, Pl. Palest.* 75 (1931).—Palaest.
tmoleum *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxvi. 71 (1934).—As. Min. (Lydia).
transvestiens *Vved. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 228 (1935).—As. centr.
tytthanthum *Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xix. 122 (1934).—As. centr.
ugami *Vved. in Trans. Sc. Soc. Turk.* i. 123 (1923).—Turkestan.
Vavilovii *Popov & Vved. in B. Fedtsch. et al. Fl. Turkm.* i. 278 (1932), in adnot.; *et in Bull. Univ. As. Centr.* xix. 122 (1934).—Transcasp.
viride *Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 201 (1928).—Caucas.
Woronowii *Misczenko ex Grossheim, l. c.* 217.—Caucas.
yosemitense *Eastw. in Leafl. West. Bot.* i. 132 (1934).—U.S.A. (Calif.).

ALLOCARYA Greene (Boraginac.).
armeriifolia (*R. Phil.*) *A. Brand in Engl. Pflanzenreich, Borrag.-Borraginoid.-Cryptanth.* 112, 181 (1931): Eritrichium armeriifolium.
capitata (*Clos*) *A. Brand, l. c.* 74, 173: Eritrichium humile var. capitatum.
corymbosa (*Ruiz & Pav.*) *A. Brand, l. c.* 72, 173: Myosotis corymbosa.
debilis *Greene ex A. Brand, l. c.* 165, in syn.: A. charaxata var. debilis *A. Brand*.
elachnantha (*F. Muell.*) *A. Brand, l. c.* 113, 166: Heliotropium elachnanthum.
orientalis (*L.*) *A. Brand, l. c.* 74, 178: Heliotropium orientale.
plurisepala (*F. Muell.*) *A. Brand, l. c.* 114, 165: Maccoya plurisepala.

ALLOCARYASTRUM A. Brand in Engl. Pflanzenreich, Borrag.-Borraginoid.-Cryptanth. 99 (1931). *BORAGINACEAE.*
allocaryoides (*A. Brand*) *A. Brand, l. c.* 100: Plagiobothrys allocaryoides.
californicum (*A. Gray*) *A. Brand, l. c.*: Echidiocarya californica.
collinum (*R. Phil.*) *A. Brand, l. c.*: Eritrichium collinum.
gracile (*I. M. Johnston*) *A. Brand, l. c.*: Plagiobothrys californicus var. gracilis.
ursinum (*A. Gray*) *A. Brand, l. c.* 101: Echidiocarya ursina.

ALLOCHILUS Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 1932, Sér. II. iv. 591. *ORCHIDACEAE.*
Eberhardtii *Gagnep. l. c.*—Indo-China (Tonkin).

ALLOCHRUSA Bunge (Caryophyllac.).
tadshikistanica *Schischk. in Trav. Mus. Bot. Acad. Sc. URSS*, xxiv. 40 (1932).—Bokhara.

ALLOIOSEPALUM Gilg in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xi. 97 (1931). *OCHNACEAE?*
Weberbaueri *Gilg, l. c.*—Peruv.

ALLOMARKGRAFIA R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard. 1932, xix. 45. *APOCYNACEAE.*
ovalis (*Markgraf*) *R. E. Woodson, l. c.*: Echites ovalis.
plumeriiflora *R. E. Woodson, l. c.* 1933, xx. 627.—Colomb.

ALLOMORPHIA Blume (Melastomatac.).
flexuosa *Hand.-Mazz. in Sinensia*, iii. 195 (1933).—China (Kwangsi).
Howellii (*Jeffrey & W. W. Smith*) *Diels in Engl. Jahrb.* lxv. 102 (1932): Oxyspora Howellii.
urophylla *Diels, l. c.*—China (Yunnan).

ALLOPHYLUS L. (Sapindac.).
Bussei *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 270 (1921), in obs.—Afr. Lusit. Or.
Erlangeri *Gilg ex Engl. l. c.* 269, in obs.—Kenya Col.
Holstii *Gilg ex Engl. l. c.* 270, in obs.—Tanganyika Terr.
Kinlochii *Standley in Tropical Woods*, 1932, No. 32, 16.—Brit. Honduras.
laeteviridis *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 271 (1921), in obs.—Cameroons.

ALLOPHYLUS:—
marquesensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 162 (1935).—Ins. Marquesas (Fatuhiva).
oreodryadum *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 271 (1921), in obs.—Cameroons.
pachyneurus *Gilg ex Engl. l. c.*, in obs.—Cameroons.
paralleloneurus *Gilg ex Engl. l. c.*, in obs.—Cameroons.
rapensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 161 (1935).—Polynes. (Ins. Rapa).
spicatus (*Thunb.*) *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 100 (1932): Rhus spicata.
sublaxus *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 83, 16 (1931).—Ins. Viti.
Tessmannii *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 271 (1921), in obs.—Cameroons.
trichophyllus *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 270 (1935).—China (Hainan).
unifoliolatus *Radlk. in Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* i. 208 (1907).—Ins. Philipp. (Leyte).
Zimmermannianus *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 270 (1921), in obs.—Tanganyika Terr.

ALLOPLECTUS Mart. (Gesneriac.).
Schultzei *Mansf. in Fedde, Repert.* xxxvi. 124 (1934).—Colomb.
tetragonoides *Mansf. l. c.*, in obs.—Hab.?

ALLOSANTHUS Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac. 1157 (1933). *SAPINDACEAE.*
trifoliolatus *Radlk. l. c.*—Peruv.

ALLOTEROPSIS J. Presl (Gramin.).
gwebiensis *Stent & Rattray in Proc. Rhodes. Scientif. Assoc.* xxxii. (*Stent & Rattray, Grasses S. Rhodes.*) 21 (1933).—S. Rhodesia.
Homblei *Robyns in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 172 (1932).—Congo Belg.
latifolia (*Peter*) *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 382 (1935): Axonopus latifolius.

ALLUAUDIA Drake (Didiereac.).
Humberti *Choux in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. xvii. 30, 60 (1934).—Madag.

ALLUAUDIOPSIS Humbert & Choux in Compt. Rend. 1934, cxcix. 1651. *DIDIEREACEAE.*
fiherenensis *Humbert & Choux, l. c.*; *et in Bull. Soc. Bot. France*, 1935, lxxxii. 61.—Madag.

ALNUS Mill. (Betulac.; Cupulif., Gen. Pl.).
borealis (*Norrl.*) *C. Regel in Fedde, Repert. Beih.* lxxxii. 1. 88 (1935): A. incana var. borealis.
glutinosa (*L.*) *Gaertn. Fruct.* ii. 54, t. 90 (1791): Betula glutinosa.
kamschatica (*Callier*) *Kudo ex Masamune in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 498: A. sitchensis var. kamschatica.
mandschurica (*Callier*) *Hand.-Mazz. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1932, lxxxi. 306: A. fruticosa var. manshurica.

ALOCASIA Neck. (Arac.).
neoguineënsis *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1170 (1895), in syn.: Schismatoglottis neoguineënsis.

ALOË L. (Liliac.).
amoena *Pillans in S. Afr. Gard.* 1933, xxiii. 168.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Angelica *Pole Evans in Fl. Pl. S. Afr.* 1934, xiv. t. 554.—Transvaal.
ausana *Dinter*; *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 259 (1931), descr. ampl.—Great Namaq.
Boastii *Letty in Fl. Pl. S. Afr.* 1934, xiv. t. 553.—Swaziland.
Brunnthaleri *A. Berger ex Cammerl. in Kakteenk.* 1933, 131.—Afr. austr. (Cape Prov.).
caricina *A. Berger in Engl. Jahrb.* xxxviii. 85 (1905), in obs.—Afr. or.
corifolia *Pillans in S. Afr. Gard.* 1934, xxiv. 24, 25.—Afr. austr. (Cape Prov.).
defalcata *Chiov. Fl. Somala*, II. 424 (1932).—Somal. Ital.
deflexidens *Pillans in S. Afr. Gard.* 1935, xxv. 36, 37.—Zululand.

ALOË:—
elgonica *Bullock in Kew Bull.* 1932, 503.—Afr. trop. or. (Elgon).
Ellenbergeri *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 119.—Basutoland.
Forsteri *Pillans in S. Afr. Gard.* 1933, xxiii. 140.—Transvaal.
Framesii *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1933, xxiii. 140.—Namaqualand.
gariepensis *Pillans in S. Afr. Gard.* 1933, xxiii. 213.—Afr. austr.-occ.
×Hoyeri *Radl in Monatsschr. Kakteenk.* 1896, vi. 24.—Hort.
Humberti *H. Perrier in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 692.—Madag.
immaculata *Pillans in S. Afr. Gard.* 1934, xxiv. 25.—Transvaal.
isaloënsis *H. Perrier in Bull. Acad. Malgache*, 1927, n. s. x. 20 (1928).—Madag.
khamiesensis *Pillans in S. Afr. Gard.* 1934, xxiv. 25, 28, in adnot.—Namaqualand.
×Lapaixii *Radl in Monatsschr. Kakteenk.* 1896, vi. 24.—Hort.
Montemartinii *Catalano in Boll. Stud. Inform. Giard. Col. Palermo*, xi. reimpr. pp. 1, 7 (1931).—Hort.
mutabilis *Pillans in S. Afr. Gard.* 1933, xxiii. 167, 168.—Transvaal.
ortholopha *Christian & Milne-Redhead in Kew Bull.* 1933, 478.—S. Rhodesia.
petrophila *Pillans in S. Afr. Gard.* 1933, xxiii. 213.—Transvaal.
polyphylla *Schonl. ex Pillans, l. c.* 1934, xxiv. 267, 268.—Basutoland.
Reynoldsii *Letty in Fl. Pl. S. Afr.* 1934, xiv. t. 558.—Afr. austr. (Cape Prov.).
×spinosissima *Hort. ex Jahandiez in Rev. Hort.* 1932–3, n. s. xxiii. 570 (1933).—Hort.
Vanbalenii *Pillans in S. Afr. Gard.* 1934, xxiv. 25, 28, in adnot.—Zululand.
Viguieri *H. Perrier in Bull. Acad. Malgache*, 1927, n. s. x. 20 (1928).—Madag.
Woolliana *Pole Evans in Fl. Pl. S. Afr.* 1934, xiv. t. 557.—Transvaal.

ALOINOPSIS Schwantes (Ficoidac.).
Broomii *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 474 (1935).—Transvaal.
Jamesii *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 294 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Loganii *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 397 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
pallens *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 474 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Schooneesii *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 295 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Wilmaniae *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 397 (1933).—Afr. austr. (Griqualand West).

ALONSOA Ruiz & Pav. (Scrophulariac.).
albiflora *Nicholson, Ill. Dict. Gard.* i. 53 (1884).—Mexico.
compacta *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 750 (1895), in syn.: A. Warscewiczii.
grandiflora *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in syn.: A. Warscewiczii.
incisa *Hort. ex Vilmorin, l. c.* 751, in syn.: A. incisifolia.
liniflora *Hort. ex Vilmorin, l. c.* 750, in syn.: A. linearis.
pumila *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in syn.: A. linearis.

ALOPECURUS L. (Gramin.).
apiatus *Ovczinn. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 146, 744 (1934).—Turkestan.
brevifolius (*Westb.*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 75 (1928).—Caucas.
Hitchcockii *Parodi in Rev. Fac. Agron. & Vet., Buenos Aires*, vii. 366 (1931).—Peruv.; Boliv.
laxiflorus *Ovczinn. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 151, 744 (1934).—Bokhara.
pseudobrachystachyus *Ovczinn. l. c.* 153, 745.—Sibir.
Roshevitzianus *Ovczinn. l. c.* 154, 746.—Sibir.
seravschanicus *Ovczinn. l. c.* 151, 745.—Turkestan.
utriculatus (*L.*) *Pers. Syn.* i. 80 (1805): Phalaris utriculata.

ALOPHIA Herb. (Iridac.).
Lahue (*Mol.*) *Espinosa in Rev. Chil. Hist. Nat.* 1922, xxvi. 9: Ferraria Lahue.

ALOYSIA Ort. & Palau (Verbenac.).
macrostachya (*Torr.*) *Moldenke in Phytologia*, i. 95 (1934): Lippia Wrightii var. macrostachya.
pulchra (*Briq.*) *Moldenke, l. c.*: Lippia pulchra.
spathulata (*Hayek*) *Moldenke, l. c.*: Lippia spathulata.
uruguayensis *Moldenke, l. c.* i. 167 (1935): Lippia affinis *Briq.*

ALPHITONIA Reissek (Rhamnac.).
marquesensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 166 (1935).—Ins. Marquesas.

ALPHONSEA Hook. f. & Thoms. (Annonac.).
monogyna *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 26 (1934).—China (Hainan).

ALPINIA L. (Zingiberac.; Scitamin., Gen. Pl.).
bracteata *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 61 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 63 (1832).—Ind. or. (Bengal).
Cardamomum-medium *Roxb. l. c.* 72; *et l. c.* 74.—Ind. or. (Assam).
iriomotensis *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 207.—Ins. Liukiu (Iriomote).
linguiformis *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 73 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 75 (1832).—Ind. or. (Bengal).
punicea *Roxb. l. c.* 71; *et l. c.* 73.—Sumatra.

ALSEIS Schott (Rubiac.).
latifolia *Gleason in Phytologia*, i. 137 (1935).—Bras. (Maranhão).
Mutisii *Moldenke in Phytologia*, i. 95 (1934).—Colomb.

ALSEODAPHNE Nees (Laurac.).
hainanensis *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 57 (1934).—China (Hainan).
merguensis *C. E. Parkinson in Kew Bull.* 1932, 105.—Lower Burma.
rugosa *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 232 (1935).—China (Hainan).
tonkinensis *H. Liou, Laurac. Chine et Indo-Chine*, 43 (1932).—Indo-China (Tonkin).

ALSINANTHUS Desv. Journ. de Bot. iii. [No. 5] 221 [1816]. *CARYOPHYLLACEAE.*
balearicus (*L.*) *Desv. l. c.*: Arenaria balearica.
bavaricus (*L.*) *Desv. l. c.* 223: Arenaria bavarica.
biflorus (*L.*) *Desv. l. c.* 222: Arenaria biflora.
cerastioides (*Poir.*) *Desv. l. c.*: Arenaria cerastioides.
ciliatus (*Jacq.*) *Desv. l. c.*: Arenaria ciliata.
conimbricensis (*Brot.*) *Desv. l. c.* 223: Arenaria conimbricensis.
cucubaloides (*Sm.*) *Desv. l. c.* 222: Arenaria cucubaloides.
dianthoides (*Sm.*) *Desv. l. c.* 223: Arenaria dianthoides.
diffusus (*Pers.*) *Desv. l. c.* 222: Cerastium diffusum.
divaricatus *Desv. l. c.*, nomen.—Hab.?
echinatus (*Poir.*) *Desv. l. c.*: Arenaria echinata.
fasciculatus *Desv. l. c.* 223, nomen.—Hab.?
filifolius (*M. Bieb.*) *Desv. l. c.* 222: Arenaria filifolia.
gramineus (*Fisch.*) *Desv. l. c.* 223: Arenaria graminea.
grandiflorus (*L.*) *Desv. l. c.*: Arenaria grandiflora.
gypsophylloides (*Willd.*) *Desv. l. c.* 222: Arenaria gypsophylloides.
hispidus (*L.*) *Desv. l. c.* 223: Arenaria hispida.
Holostea (*M. Bieb.*) *Desv. l. c.*: Arenaria Holostea.
lateriflorus (*L.*) *Desv. l. c.* 221: Arenaria lateriflora.
longifolius (*M. Bieb.*) *Desv. l. c.* 223: Arenaria longifolia.
lychnideus (*M. Bieb.*) *Desv. l. c.*: Arenaria lychnidea.
montanus (*L.*) *Desv. l. c.* 222: Arenaria montana.
multicaulis (*Jacq.*) *Desv. l. c.*: Arenaria multicaulis.
obtusus (*All.*) *Desv. l. c.*: Arenaria obtusa.
purpurascens (*Ram. ex DC.*) *Desv. l. c.*: Arenaria purpurascens.
rigidus (*M. Bieb.*) *Desv. l. c.* 223: Arenaria rigida.
rotundifolius (*M. Bieb.*) *Desv. l. c.* 222: Arenaria rotundifolia.
ruscifolius (*Poir.*) *Desv. l. c.*: Arenaria ruscifolia.

ALSINANTHUS:—
scaber (*Poir.*) *Desv. Journ. de Bot.* iii. [No. 5] 221 [1816]: Arenaria scabra.
serpillifolius (*L.*) *Desv. l. c.* 222: Arenaria serpillifolia.
tetraqueter (*L.*) *Desv. l. c.*: Arenaria tetraquetra.
triflorus (*L.*) *Desv. l. c.* 223: Arenaria triflora.
trinervis (*L.*) *Desv. l. c.* 221: Arenaria trinervis.
verticillatus (*Willd.*) *Desv. l. c.* 223: Arenaria verticillata.

ALSINE L. (1762) emend. Gaertn. (Caryophyllac.). [MINUARTIA L.]
gracilipes *Komarov in Komarov & Klob.-Alis. Key Pl. Far East. Reg. USSR*, i. 495 (1931); *et in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 200 (1932).—Sibir. (Marit. Prov.).
procera (*Reichb.*) *Kreutzer, Anthochron. Pl. Eur. Med.* 21, 215 (1840): Sabulina procera.

ALSINE L., pro parte (Caryophyllac.). [SPERGULARIA J. & C. Presl.]
yungasensis *Rusby in Phytologia*, i. 53 (1934).—Boliv.

ALSODEIA Thou. (Violac.).
ilicifolia *Welw. ex Oliv. Fl. Trop. Afr.* i. 108 (1868).—Afr. trop.

ALSODEIOPSIS Oliv. (Icacinac.; Olacac., Gen. Pl.).
rubra *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 254 (1921), in obs.—Cameroons.
Tessmannii *Engl. l. c.*, in obs.—Cameroons.

ALSOMITRA M. Roem. (Cucurbitac.).
angustipetala (*Craib*) *Craib, Fl. Siam. Enum.* i. 767 (1931): Gynostemma angustipetalum.

ALSTONIA R. Br. (Apocynac.).
cochinchinensis *Pierre ex Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1165 (1933), in syn.: A. spathulata.
elliptica *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 39 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
fragrans *J. W. Moore, l. c.*—Ins. Societ. (Raiatea).
pachycarpa *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 310 (1935).—China (Hainan).
paupera *Hand.-Mazz.*; *Tsiang in Sunyatsenia*, ii. 98 (1934), descr. ampl.—China (Szechuan; Yunnan).
Setchelliana *Christoph. in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 128, 178 (1935).—Samoa.

ALSTROEMERIA L. (Amaryllidac.).
alba *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1040 (1895), in syn.: A. peregrina f. alba *Voss.*

ALTERNANTHERA Forsk. (Amaranthac.).
albo-squarrosa *Suesseng. in Fedde, Repert.* xxxix. 1 (1935).—Peruv.
amoena (*Regel*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 869 (1895): Telanthera amoena.
andicola (*Moq.*) *Schinz in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 75 (1934): Telanthera andicola.
aristata (*Danguy & Cherm.*) *Suesseng. in Fedde, Repert.* xxxix. 2 (1935): Telanthera aristata.
articulata *Stützer in Fedde, Repert. Beih.* lxxxviii. 43 (1935).—Ind. occ. (Tobago).
Bettzichiana (*Regel*) *Nicholson, Ill. Dict. Gard.* i. 59 (1884), nomen; *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 869 (1895): Telanthera Bettzichiana.
brasiliensis *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in syn.: A. Bettzichiana.
cana *Suesseng. in Fedde, Repert.* xxxix. 2 (1935).—Argent.
capituliflora (*Bert.*) *Schinz in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 76 (1934): Achyranthes capituliflora.
cinerella *Suesseng. in Fedde, Repert.* xxxix. 3 (1935).—Argent.
coerilis [sic] *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 870 (1895), in syn.: A. amoena.
congesta *Suesseng. & Stützer in Fedde, Repert. Beih.* lxxxviii. 44 (1935).—Colomb.
cyclophylla (*Seub.*) *Schinz in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 74 (1934): Telanthera cyclophylla.

ALTERNANTHERA :—
dentata (*Moench*) *Scheygr. in Pulle, Fl. Surinam*, i. (*Meded. K. Ver. Kol. Inst. Amst.* xxx.) 39 (1932): Gomphrena dentata.
Dominii *Schinz in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 76 (1934): Telanthera nana *Moq.*
echinocephala (*Hook. f.*) *Christoph. in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo*, lxx. 73 (1932): Brandesia echinocephala.
elongata (*Willd.*) *Schinz in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 75 (1934): Gomphrena elongata.
filifolia (*Hook. f.*) *Howell in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xxi. 102 (1933): Bucholzia filifolia.
flavicoma (*Anderss.*) *Howell, l. c.* 107: Telanthera flavicoma.
flavida *Suesseng. in Fedde, Repert.* xxxv. 300 (1934). —Peruv.
flosculosa *Howell in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xxi. 107 (1933).—Ins. Galapag.
Friesii *Schinz in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 75 (1934): A. micrantha *R. E. Fries.*
galapagensis (*Stewart*) *Howell in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xxi. 108 (1933): Telanthera galapagensis.
glaucescens (*Hook. f.*) *Howell, l. c.* 104: Bucholzia glaucescens.
Helleri (*B. L. Robinson*) *Howell, l. c.* 109: Telanthera Helleri.
Ingramiana (*Standley*) *Schinz in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 76 (1934): Achyranthes Ingramiana.
lanceolata (*Benth.*) *Schinz, l. c.* 75: Brandesia lanceolata.
laxa *Suesseng. in Fedde, Repert.* xxxv. 300 (1934).—Venez.
meridensis *Stützer in Fedde, Repert. Beih.* lxxxviii. 44 (1935).—Venez.
microcephala (*Moq.*) *Schinz in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 75 (1934): Telanthera microcephala.
minutiflora (*Seub.*) *Suesseng. in Fedde, Repert.* xxxv. 336 (1934): Telanthera minutiflora.
Moquini (*Webb ex Moq.*) *Schinz in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 76 (1934): Telanthera Moquini.
multiflora *Schinz, l. c.* 75, sphalm.; *Suesseng. in Fedde, Repert.* xxxv. 336 (1934): A. minutiflora.
nudicaulis (*Hook. f.*) *Christoph. in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo*, lxx. 73 (1932): Bucholzia nudicaulis.
ochracea *ex Suesseng. in Fedde, Repert.* xxxv. 302 (1934), in syn.: A. peruviana.
peruviana (*Moq.*) *Suesseng. l. c.*: Telanthera peruviana.
Philippo-Coburgi (*Zahlbr.*) *Suesseng. l. c.* 303: Hebanthe Philippo-Coburgi.
philoxerina *Suesseng. l. c.*—Bras. (S. Paulo).
pumila *Stützer in Fedde, Repert. Beih.* lxxxviii. 45 (1935).—Argent.
Regelii (*Seub.*) *Schinz in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 75 (1934): Telanthera Regelii.
Reinhardi *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 870 (1895), in syn.: A. amoena f. Reinhardi *Voss.*
Robinsoni *Suesseng. in Fedde, Repert.* xxxv. 304 (1934).—Venez.
rosea *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 870 (1895), in syn.: A. amoena f. rosea *Voss.*
rugulosa (*B. L. Robinson*) *Howell in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xxi. 111 (1933): Telanthera rugulosa.
serpyllifolia (*Mart.*) *Schinz in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 75 (1934): Brandesia serpyllifolia.
Snodgrassii (*B. L. Robinson*) *Howell in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xxi. 109 (1933): Telanthera Snodgrassii.
straminea (*Mart.*) *Suesseng. in Fedde, Repert.* xxxv. 305 (1934): Mogiphanes straminea.
strictiuscula (*Anderss.*) *Schinz in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 72 (1934): Telanthera strictiuscula.

ALTERNANTHERA :—
tomentosa (*Moq.*) *Schinz in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 76 (1934): Telanthera tomentosa.
vestita (*Anderss.*) *Howell in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xxi. 108 (1933): Telanthera vestita.
virgata (*Schrad.*) *Suesseng. in Fedde, Repert.* xxxv. 305 (1934): Mogiphanes virgata.

ALTHAEA L. (Malvac.).
Bertolae *Colla, Herb. Pedem.* i. 388 (1833).—Ital.?
Bertrami *Post & Beauverd in Dinsm. Pl. Post. & Dinsm.* Fasc 1. 4 (1932); *Dinsm. in Fedde, Repert.* xxxiii. 103 (1933).—Libanus.
chrysantha *G. Samuelsson in Svensk Bot. Tidskr.* 1935, xxix. 381.—Syria.
kusariensis *Iljin ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 60 (1932).—Caucas.
rugoso-stellulata *Czecz. in Acta Soc. Bot. Polon.* 1932, ix. 35.—As. Min. (Galatia).
tiliacea *Bornm. in Fedde, Repert.* xxxvi. 169 (1934). —Persia.
transcaucasica *Iljin ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 61 (1932).—Caucas.
Woronowii *Iljin ex Grossheim, l. c.* 59.—Caucas.

ALTHOFFIA K. Schum. (Tiliac.).
saccifera *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 511 (1932), nomen alternativ.—N. Guin.

ALTINGIA Nor. (Hamamelidac.).
Chingii *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* x. 413 (1931). —China (Kwangtung; Fokien).
obovata *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 238 (1935).—China (Hainan).

ALYSICARPUS Neck. (Legumin.).
Cheeli *C. A. Gardner in For. Dep. Bull., W. Austral.* No. 32, 57 (1923).—W. Austral.

ALYSSUM L. (Crucif.).
antiatlanticum *Emberger & Maire in Cavanillesia*, v. 11 (1932), nomen; *et in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1932, xxiii. 165, descr.—Marocc.
armenum *Boiss.*; *Schischk. in Bull. Mus. Géorgie*, 1920–2, i. 18 (1922), descr. emend.—Armen.
atlanticum *Emberger & Maire ex Pau in Cavanillesia*, iv. 156 (1931).—Afr. bor.
balkanicum *Nyár.*; *Markgraf in Denkschr. Akad. Wiss. Wien, Math.-Nat.* cii. 337 (1931), descr.—Albania.
Brughieri *Brein ex Colla, Herb. Pedem.* i. 142 (1833).—Ital.?
elatum *Kreutzer, Anthochron. Pl. Eur. Med.* 99, 215 (1840): A. alpestre var. argenteum *Gaudin.*
odoratum *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 77 (1894), in syn.: A. maritimum.

ALYXIA Banks ex R. Br. (Apocynac.).
annamensis *Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1121 (1933).—Indo-China (Anam).
Balansae *Pitard, l. c.* 1120.—Indo-China (Tonkin).
Bodinieri (*Léveillé*) *R. E. Woodson in Journ. Arn. Arb.* 1934, xv. 316: Daphne Bodinieri.
clusiophylla *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 458, nomen.—N. Caled.
coriacea *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 541 (1824).—Penins. Mal.
crassifolia *Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1124 (1933).—Indo-China (Anam).
divaricata *Pitard, l. c.* 1122.—Indo-China (Anam).
efatensis *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 18.—N. Hebrides.
flavescens *Pierre*; *Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1127 (1933), descr.—Siam; Cochinch.
glaucescens *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 542 (1824).—Penins. Mal.
hainanensis *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 309 (1935).—China (Hainan).
insularis *Kanehira & Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 402.—Formosa (Ins. Samasana).
Kurzii *Burkill in Kew Bull.* 1935, 317; *Burkill, Dict. Econ. Prod. Mal. Penins.* i. 122 (1935), in obs.: Gynopogon breviflorus.
lucida *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 540 (1824).—Penins. Mal.

ALYXIA :—
marginata *Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1123 (1933).—Indo-China (Anam).
Markgrafiana *Schwartz in Mitt. Inst. Bot. Hamburg*, vii. 258 (1931).—Borneo.
Markgrafii *Tsiang in Sunyatsenia*, ii. 105 (1934): A. Schlechteri *Markgraf.*
pisiformis *Pierre*; *Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1126 (1933), descr.—Indo-China (Laos; Cochinch.).
Poilanei *Pitard, l. c.* 1122.—Indo-China (Anam).
pseudosinensis *Pitard, l. c.* 1125.—Indo-China (Anam).
racemosa *Pitard, l. c.* 1124.—Indo-China (Anam).
septangularis *Christoph. in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 128, 182 (1935).—Samoa.
Yunkuniana *Tsiang in Sunyatsenia*, ii. 107 (1934). —China (Kwangtung).

AMAIOUA Aubl. (Rubiac.).
Monteiroi *Standley in Tropical Woods*, 1933, No. 33, 14.—Bras. (Pará).
urophylla *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 354 (1931).—Peruv.

AMANA Honda in Bull. Biogeogr. Soc. Jap. vi. 20 (1935). *LILIACEAE.*
edulis (*Miq.*) *Honda, l. c.*: Orithyia edulis.
latifolia (*Makino*) *Honda, l. c.* 21: Tulipa latifolia.

AMARACARPUS Blume (Rubiac.).
Kanehirae *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 35.—Ins. Carolin. (Kusai).
kusaiensis *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 276.—Ins. Carolin. (Kusai).
ladronicus (*Hosokawa*) *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 269: Psychotria ladronica.
mariannensis *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 926.—Ins. Marian. (Aramagan).
rotensis *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 35.—Ins. Marian. (Rota).

AMARANTHUS L. (Amaranthac.).
Anderssoni *Howell in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xxi. 95 (1933).—Ins. Galapag.
Balalleri *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 111, in syn.: A. Eugenii.
Brownii *Christoph. & Caum in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 81, 25 (1931).—Ins. Sandvic.
Eugenii *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 111.—Hispan.
furcatus *Howell in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xxi. 94 (1933).—Ins. Galapag.
guadeloupensis *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 866 (1895), in syn.: A. paniculatus.
× Mauritii *Sennen in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 193, in obs.—Marocc.
parvulus *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. Anhang, 25 (1932).—Tanganyika Terr.
perennis *Bellardi ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 578 (1835), pro syn.: A. prostratus.
pseudoretroflexus (*Thell.*) *Almq. in Acta Phytogeogr. Suec.* i. 538 (1929): A. chlorostachys var. pseudoretroflexus.
splendens *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 868 (1895), in syn.: A. gangeticus f. splendens *Voss.*
× turicensis *Domin in Preslia*, xiii–xv. 66 (1935).—Czechoslovak.

AMAROLEA Small, Man. Southeast. Fl. 1043 (1933). *OLEACEAE.*
americana (*L.*) *Small, l. c.*: Olea americana.
megacarpa *Small, l. c.*—U.S.A. (Florida).

AMARYLLIS L. (Amaryllidac.).
× Ackermannii *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1032 (1895), in obs.—Hort.
× Chelsonii *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in obs.—Hort.
× Cronii *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in obs.—Hort.
× Haylockii *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in obs.—Hort.
× Herbertii *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in obs.—Hort.
incarnata *Hort. ex Heydt in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1932, xlvii. 304.—Hort.
magnifica *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1031 (1895), in syn.: Hippeastrum bicolor f. magnificum *Baker.*
taeniophylla *Salisb. Gen. Pl. Fragm.* 134 (1866), nomen.—Bras.

AMASONIA L. f. (Verbenac.).
campestris (*Aubl.*) *Moldenke in Torreya*, 1934, xxxiv. 8: Taligalea campestris.
obovata *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 463.—Venez.
Spruceana *Moldenke in Fedde, Repert.* xxxvii. 213 (1934).—Venez.

AMBELANIA Aubl. (Apocynac.).
Duckei *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 296 (1935).—Bras. (Amaz.).
zschokkeiformis *Markgraf, l.c.* 295.—Bras. (Amaz.).

AMBERBOA Less. (Compos.).
biennis *Iljin in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 113 (1932), in syn.: A. glauca.
bucharica *Iljin, l. c.* 108.—As. centr.
crupina *Coss. ex Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 110, in syn.: Centaurea Murbeckiana.
glauca (*Willd.*) *Iljin in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 112 (1932): Centaurea glauca.
nana (*Boiss.*) *Iljin, l. c.* 113: A. moschata var. nana.
Sosnovskyi *Iljin, l. c.* 114.—Transcaucas.
suaveolens (*Willd.*) *Iljin, l. c.* 107: Centaurea suaveolens.
turanica *Iljin, l. c.* 110.—As. centr.

AMBLYNOTOPSIS Macbride (Boraginac.).
linifolia (*Mart. & Gal.*) *A. Brand in Engl. Pflanzenreich, Borrag.-Borraginoid.-Cryptanth.* 184 (1931): Lithospermum linifolium.

AMBLYOPOGON Fisch. & Mey. (Compos.).
Woronowii *Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 208 (1934).—Caucas.

AMBRELLA H. Perrier in Bull. Soc. Bot. France, 1934, lxxxi. 655. *ORCHIDACEAE.*
longituba *H. Perrier, l. c.*—Madag.

AMBROSIA L. (Compos.).
striata *Rydb. in Brittonia*, i. 96 (1931).—U.S.A. (Colorado; Iowa; Missouri).
variabilis *Rydb. l. c.* 97.—Canada (Saskatchewan); U.S.A. (Wyoming; N. & S. Dakota; Nebraska).

AMELANCHIER Medik. (Rosac.).
Amelanchier (*L. f.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 277 (1894), in syn.: Pyrus Amelanchier.
basalticola *Piper in Piper & Beattie, Fl. Palouse Reg.* 100 (1901).—U.S.A. (N. W. States).
Carrii *Rydb. in Brittonia*, i. 89 (1931).—U.S.A. (S. Dakota).
gaspensis (*Wieg.*) *Fernald & Weatherby in Rhodora*, 1931, xxxiii. 235: A. sanguinea var. gaspensis.
paniculata *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 449.—Mexico.

AMELLUS L. (Compos.).
capensis (*Walp.*) *Hutchinson in Kew Bull.* 1932, 510: Haenelia capensis.

AMETHYSTANTHUS Nakai in Bot. Mag., Tokyo, 1934, xlviii. 785. *LABIATAE.*
excisus (*Maxim.*) *Nakai, l. c.* 787: Plectranthus excisus.
inflexus (*Thunb.*) *Nakai, l. c.* 786: Ocimum inflexum.
japonicus (*Burm.*) *Nakai, l. c.* 788: Scutellaria japonica.
lanceus (*Nakai*) *Nakai, l. c.* 789: Plectranthus lanceus.
longitubus (*Miq.*) *Nakai, l. c.* 790: Plectranthus longitubus.
racemosus (*Hemsl.*) *Nakai, l. c.* 791: Plectranthus racemosus.
trichocarpus (*Maxim.*) *Nakai, l. c.* 792: Plectranthus trichocarpus.
umbrosus (*Makino*) *Nakai, l. c.*: Plectranthus umbrosus.

AMITOSTIGMA Schlechter (Orchidac.).
alpestre *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 664.—Formosa.
yuukianum *Fukuyama, l. c.* 1934, xlviii. 429.—Formosa.

AMMANNIA L. (Lythrac.).
crassissima *Koehne in Engl. Jahrb.* iv. 391 (1883).—Abyss.; Somaliland; Transvaal.
multiflora *Roxb. Hort. Beng.* 11 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 447 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 426 (1832).—Ind. or.

AMMANNIA:—
nana *Roxb. Hort. Beng.* 11 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 448 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 427 (1832).—Ind. or.
pentandra *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 448 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 427 (1832).—Ind. or.
rotundifolia *Buch.-Ham. ex Roxb. Hort. Beng.* 11 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 446 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 425 (1832).—Ind. or.
Schaeferi *Koehne ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 646 (1921), in obs.—Namaqualand.
vescicatoria *Roxb. Hort. Beng.* 11 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 447 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 426 (1832).—Ind. or.

×**AMMOCALAMAGROSTIS** P. Fourn. in Le Monde des Plantes, 1934, xxxv. 28. *GRAMINEAE.*
[Ammophila × Calamagrostis.]
baltica (*Flugge ex Schrad.*) *P. Fourn. l. c.*: Arundo baltica.

AMMOCHARIS Herb. (Amaryllidac.).
Herrei *Leighton in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 110.—Namaqualand.

AMMOCHLOA Boiss. (Gramin.).
unispiculata *Eig in Fedde, Repert. Beih.* lxiii. 1. 45 (1931), nomen.—Palaest.

AMMONALIA Desv. Journ. de Bot. iii. [No. 5] 223 [1816]: **Honckenia** Ehrh. (Caryophyllac.).
peploides (*L.*) *Desv. l. c.* 224: Arenaria peploides.

AMOMUM L. (Zingiberac.; Scitamin., Gen. Pl.).
aromaticum *Roxb. Hort. Beng.* 1 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 44 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 45 (1832).—Ind. or. (Bengal).
dealbatum *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 42; *et l. c.* 43.—Ind. or. (Bengal).
echinocarpum *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 283 (1931): A. echinatum *auct.*, non *Willd.*
longipetiolatum *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xi. 40 (1932).—China (Hainan).
sericeum *Roxb. Hort. Beng.* 1 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 45 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 46 (1832).—Ind. or. (Bengal).
subulatum *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 43 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 44 (1832).—Reg. Himal.
trichostachyum *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 283 (1931): A. ciliatum *Baker.*

AMORPHA L. (Legumin.).
apiculata *Wiggins in Contrib. Dudley Herb. Stanford Univ.* i. 171 (1933).—Calif. infer.
brachycarpa *Palmer in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 171.—U.S.A. (Missouri).
emarginata *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 148 (1931).—U.S.A. (Arizona).
mimosifolia *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 216 (1894), in syn.: A. fruticosa.
sensitiva *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in syn.: A. fruticosa.

AMORPHOPHALLUS Blume (Arac.).
Niimurai *Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1933, v. 346: A. hirta *Yamamoto, l. c.* 180, non *N. E. Brown.*
shichitoënsis *Makino in Journ Jap. Bot.* i. 42 (1918), nomen.—Japon.
sinensis *Belval in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 98.—China (Kiangsu).

AMPELOCISSUS Planch. (Vitac.).
africanus (*Lour.*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. 11. 253 (1935): Botria africana.
amentaceus *Ridley in Kew Bull.* 1931, 496.—Borneo.
debilis *Ridley, l. c.*—Borneo.
gourmaënsis *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 478 (1928), in syn.: A. Grantii.
longicuspis *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1073 (1934).—Tanganyika Terr.
phoenicanthus *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 50 (1931): Vitis tomentosa *Trimen, l. c.* i. 288 (1893), non *Heyne.*

AMPELOPSIS Michx. (Vitac.).
Bodinieri (*Léveillé & Vaniot*) *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1934, xv. 23: Vitis Bodinieri.
Chaffanjoni (*Léveillé*) *Rehder, l. c.* 25: Vitis Chaffanjoni.
cirrhata *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 182 (1894), in syn.: A. quinquefolia.
major *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in syn.: A. quinquefolia.
serrata *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in syn.: A. quinquefolia.
tricolor *Hort. ex Vilmorin, l. c.* 183, in syn.: A. heterophylla.

AMPELOZIZYPHUS Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro, ii. 157 (1935). *RHAMNACEAE.*
amazonicus *Ducke, l. c.* 158.—Bras. (Amaz.).

AMPHIACHYRIS Nutt. (Compos.).
spinosa *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 579, nomen alternativ.—U.S.A. (Nevada).

AMPHIBLEMMA Naud. (Melastomatac.).
erythropodum *Gilg & Lederm. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 756 (1921), in obs.—Cameroons.
grandifolium *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 209, in clavi, 210 (1927); *Hutchinson & Dalziel in Kew Bull.* 1928, 221, descr.; *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 678, descr. ampl.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
Ludwigii *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 756 (1921), in obs.—Afr. trop.
Mildbraedii *Gilg ex Engl. l. c.*, in obs.—Fernando Po.
polyanthum *Gilg ex Engl. l. c.*, in obs.—Cameroons.

AMPHIBOLOGYNE A. Brand in Engl. Pflanzenreich, Borrag.-Borraginoid.-Cryptanth. 74, 203 (1931). *BORAGINACEAE.*
mexicana (*Mart. & Gal.*) *A. Brand, l. c.*: Amsinckia mexicana.

AMPHIBROMUS Nees (Gramin.).
gracilis *P. F. Morris in Vict. Nat.* li. 145 (1934).—Austral. (Victoria).
quadridentulus (*Doell*) *Swallen in Am. Journ. Bot.* 1931, xviii. 414: Avena quadridentula.
recurvatus *Swallen, l. c.* 415.—Tasman.
scabrivalvis (*Trin.*) *Swallen, l. c.* 413: Avena scabrivalvis.

AMPHICARPA Ell. (Legumin.).
bracteata (*L.*) *Fernald in Rhodora*, 1933, xxxv. 276 in adnot.: Glycine bracteata.

AMPHICARPUM Kunth (Gramin.).
Muhlenbergianum (*Schult.*) *Hitchcock in Bartonia*, 1932, No. 14, 34: Milium Muhlenbergianum.

AMPHICOME (R. Br. ex Royle) G. Don, Gen. Syst. iv. 665 (1837). *BIGNONIACEAE.*
[Incarvillea subgen. Amphicome R. Br. ex Royle.]
arguta *G. Don, l. c.*—Himal.
diffusa (*Royle*) *Sprague in Kew Bull.* 1933, 386, in obs.: Incarvillea diffusa.

AMPHIGLOTTIS Salisb. (Orchidac.).
conopsea (*Ait.*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 391 (1933): Epidendrum conopseum.

AMPHILOPHIS Nash (Gramin.).
Foulkesii (*Hook. f.*) *C. E. C. Fischer in Gamble, Fl. Madras*, 1732 (1934): Andropogon Foulkesii.
Haenkei [sphalm. Hoenkii] (*J. Presl*) *Haines, Bot. Bihar & Orissa*, 1029 (1924), in adnot.: Andropogon Haenkei.
pseudischaemum (*Nees ex Steud.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 331 (1931): Andropogon pseudischaemum.

AMPHIOLANTHUS Griseb. (Scrophulariac.).
longipes *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 42 (1931).—Cuba.

AMPHIPAPPUS Torr. & Gray (Compos.).
spinosus *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 579.—U.S.A. (Nevada).

AMPHIPHYLLUM Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl. 1931, lviii. 332. *RAPATEACEAE.*
rigidum *Gleason, l. c.* 333.—Venez.

AMPHOROCALYX Baker (Melastomatac.).
latifolius *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. XII. 22 (1932).—Madag.
rupestris *H. Perrier, l. c.* 23.—Madag.

AMSINCKIA Lehm. (Boraginac.).
abbreviata *Suksdorf in Werdenda*, i. 56 (1931).—U.S.A. (Calif.).
Abramsii *Suksdorf, l. c.* 72.—U.S.A. (Calif.).
acuminata *Suksdorf, l. c.* 96.—U.S.A. (Calif.).
acuticarpa *Suksdorf, l. c.* 68.—U.S.A. (Calif.).
albicarpa *Suksdorf, l. c.* 90.—U.S.A. (Calif.).
ammophila *Suksdorf, l. c.* 92.—U.S.A. (Calif.).
ampla *Suksdorf, l. c.* 104.—U.S.A. (Calif.)
amplexicaulis *Suksdorf, l. c.* 83.—U.S.A. (Calif.).
Andersonii *Suksdorf, l. c.* 62.—U.S.A. (Nevada; Utah).
angulata *Suksdorf, l. c.* 109.—U.S.A. (Nevada).
angustata *Suksdorf, l. c.* 83.—U.S.A. (Calif.).
angustisepala *Suksdorf, l. c.* 64.—U.S.A. (Calif.).
anomala *Suksdorf, l. c.* 51.—U.S.A. (Calif.).
appressa *Suksdorf, l. c.* 60.—U.S.A. (Calif.).
arizonica *Suksdorf, l. c.* 91.—U.S.A. (Calif.; Arizona).
attenuata *Eastw. ex Suksdorf, l. c.* 79.—U.S.A. (Calif.).
aurantiaca (*A. Brand*) *A. Brand in Engl. Pflanzenreich, Borrag.-Borraginoid.-Cryptanth.* 112, 208 (1931): Plagiobothrys aurantiacus.
aurea *Suksdorf in Werdenda*, i. 84 (1931).—U.S.A. (Calif.).
australis *Suksdorf, l. c.* 111.—Patag.
Bakeri *Suksdorf, l. c.* 87.—U.S.A. (Calif.).
borealis *Suksdorf, l. c.* 71.—Alaska; Yukon; Brit. Columb.; Washington.
brachycalyx *Suksdorf, l. c.* 76.—U.S.A. (Calif.).
brachysantha *Suksdorf, l. c.* 111.—U.S.A. (Calif.).
Brandegeae *Suksdorf, l. c.* 81.—U.S.A. (Calif.).
brunnescens *Suksdorf, l. c.* 57.—U.S.A. (Calif.).
bullata *Suksdorf, l. c.* 76.—U.S.A. (Calif.).
caduca *Suksdorf, l. c.* 79.—U.S.A. (Calif.).
californica *Suksdorf, l. c.* 50.—U.S.A. (Calif.).
cana *Suksdorf, l. c.* 96.—U.S.A. (Calif.).
canadensis *Suksdorf, l. c.* 77.—Ins. Vancouver.
canescens *Suksdorf, l. c.* 75.—U.S.A. (Calif.).
catalinensis *Suksdorf, l. c.* 53.—U.S.A. (Calif.).
celsa *Suksdorf, l. c.* 97.—U.S.A. (Calif.).
ciliata *Suksdorf, l. c.* 87.—U.S.A. (Calif.).
cinerea *Suksdorf, l. c.* 51.—U.S.A. (Calif.).
communis *Suksdorf, l. c.* 65.—U.S.A. (Calif.).
condensata *Suksdorf, l. c.* 88.—U.S.A. (Calif.).
congesta *Suksdorf, l. c.* 82.—U.S.A. (Calif.).
congruens *Suksdorf, l. c.* 67.—U.S.A. (Calif.).
conica *Suksdorf, l. c.* 104.—U.S.A. (Calif.).
conspicua *Suksdorf, l. c.* 73.—U.S.A. (Calif.).
constricta *Suksdorf, l. c.* 98.—U.S.A. (Calif.).
Copelandii *Suksdorf, l. c.* 62.—U.S.A. (Calif.; Oregon).
cristata *Eastw. ex Suksdorf, l. c.* 58.—U.S.A. (Calif.).
ctenocarpa *Suksdorf, l. c.* 66.—U.S.A. (Calif.).
cuneata *Suksdorf, l. c.* 104 (1931), Berichtig. (1932).—U.S.A. (Calif.).
curvata *Suksdorf, l. c.* 83 (1931).—U.S.A. (Calif.).
Davyi *Suksdorf, l. c.* 101.—U.S.A. (Calif.).
decumbens *Suksdorf, l. c.* 86.—U.S.A. (Calif.).
delicata *Suksdorf, l. c.* 81.—U.S.A. (Calif.).
deltoidea *Suksdorf, l. c.* 110.—U.S.A. (Calif.).
demissa *Suksdorf, l. c.* 88.—U.S.A. (Arizona).
densiflora *Suksdorf, l. c.* 74.—U.S.A. (Calif.).
densifolia *Suksdorf, l. c.* 80.—U.S.A. (Calif.).
densirugosa *Suksdorf, l. c.* 111.—U.S.A. (Washington; Oregon).
dentata *Suksdorf, l. c.* 95.—U.S.A. (Calif.).
dictyota *Suksdorf, l. c.* 78.—Chile.
dimorpha *Suksdorf, l. c.* 95.—U.S.A. (Calif.).
disjuncta *Suksdorf, l. c.* 59.—U.S.A. (Calif.).
divaricata *Suksdorf, l. c.* 97.—U.S.A. (Calif.).
divergens *Suksdorf, l. c.* 70.—U.S.A. (Calif.).
diversifolia *Suksdorf, l. c.* 79.—U.S.A. (Calif.).
Dudleyi *Suksdorf, l. c.* 106.—U.S.A. (Calif.).
Eatonii *Suksdorf, l. c.* 64.—U.S.A. (Calif.; Utah).
elegans *Suksdorf, l. c.* 103.—U.S.A. (Calif. ?).
Elmeri *Suksdorf, l. c.* 66.—U.S.A. (Calif.).
elongata *Suksdorf, l. c.* 61.—U.S.A. (Calif.).
Evermannii *Suksdorf, l. c.* 78.—U.S.A. (Calif.).
exserta *Eastw. ex Suksdorf, l. c.* 85.—U.S.A. (Calif.).

AMSINCKIA:—
fluviatilis *Suksdorf in Werdenda*, i. 90 (1931).—U.S.A. (Calif.).
foliosa *Suksdorf, l. c.*—Ins. Vancouver; U.S.A. (Washington).
franciscana *Suksdorf, l. c.* 65.—U.S.A. (Calif.).
fulgens *Suksdorf, l. c.* 98.—U.S.A. (Calif.).
furcata *Suksdorf, l. c.* 113.—U.S.A. (Calif.).
glauca *Suksdorf, l. c.*—U.S.A. (Calif.).
glomerata *Suksdorf, l. c.* 52.—U.S.A. (Calif.).
gloriosa *Eastw. ex Suksdorf, l. c.* 103.—U.S.A. (Calif.).
granulosa *Suksdorf, l. c.* 98.—U.S.A. (Calif.).
Grayi *Suksdorf, l. c.* 83.—U.S.A. (Calif.).
Hallii *Suksdorf, l. c.* 73.—U.S.A. (Calif.).
Helleri *Suksdorf, l. c.* 72.—U.S.A. (Calif.).
Hendersonii *Suksdorf, l. c.* 107.—U.S.A. (N. W. States; Nevada).
hirsuta *Suksdorf, l. c.* 74.—U.S.A. (Calif.).
hirticaulis *Suksdorf, l. c.* 55.—U.S.A. (Calif.).
hispidula *Suksdorf, l. c.* 57.—U.S.A. (Calif.).
humilis *Suksdorf, l. c.* 81.—U.S.A. (Calif.).
hyperborea *Suksdorf, l. c.* 89.—Canada (Yukon).
incongruens *Suksdorf, l. c.* 71.—U.S.A. (Calif.).
incurva *Suksdorf, l. c.* 57.—U.S.A. (Calif.).
inflatula *Suksdorf, l. c.* 97.—U.S.A. (Calif.).
insularis *Suksdorf, l. c.* 75.—U.S.A. (Calif.).
interior (*Macbride*) *Suksdorf, l. c.* 70: A. Douglasiana var. interior.
Johnstonii *Suksdorf, l. c.* 68.—U.S.A. (Calif.).
Jonesii *Suksdorf, l. c.* 69.—U.S.A. (Calif.).
jucunda *Suksdorf, l. c.* 51.—U.S.A. (Calif.).
Keckii *Suksdorf, l. c.* 82.—U.S.A. (Calif.).
Kelloggii *Suksdorf, l. c.* 99.—U.S.A. (Calif.).
Kennedyi *Suksdorf, l. c.* 64.—U.S.A. (Idaho; Nevada).
lacunosa *Suksdorf, l. c.* 66.—U.S.A. (Calif.).
lanceolata *Suksdorf, l. c.* 82.—U.S.A. (Calif.).
lancifolia *Suksdorf, l. c.* 80.—U.S.A. (Calif.).
latiflora *Suksdorf, l. c.* 86.—U.S.A. (Calif.).
latifolia *Suksdorf, l. c.* 101.—U.S.A. (Calif.).
laxa *Suksdorf, l. c.* 87.—U.S.A. (Calif.).
leptoclada *Suksdorf, l. c.* 50.—U.S.A. (Calif.).
leptosperma *Suksdorf, l. c.* 100.—U.S.A. (Calif.).
leptostachya *Suksdorf, l. c.* 92.—U.S.A. (Calif.).
leucosperma *Suksdorf, l. c.* 85.—U.S.A. (Calif.).
linearifolia *Suksdorf, l. c.* 79.—U.S.A. (Calif.).
littoralis *Greene ex Suksdorf, l. c.* 99.—U.S.A. (Calif.).
longifolia *Suksdorf, l. c.* 59.—U.S.A. (Calif.).
longistylis *Suksdorf, l. c.* 50.—U.S.A. (Calif.).
macra *Suksdorf, l. c.* 108.—U.S.A. (Arizona).
macrantha *Suksdorf, l. c.* 102.—U.S.A. (Calif.).
macrosepala (*M. E. Jones*) *Suksdorf, l. c.* 108: A. tessalata var. macrosepala.
maculata *Suksdorf, l. c.* 99.—U.S.A. (Calif.).
Mandonii (*Ball*) *A. Brand in Engl. Pflanzenreich, Borrag.-Borraginoid.-Cryptanth.* 198, 204 (1931): Eritrichium Mandonii.
Manningiae *Suksdorf in Werdenda*, i. 64 (1931).—U.S.A. (Calif.).
marginata *Suksdorf, l. c.* 109.—U.S.A. (Calif.).
Mathewsii *Suksdorf, l. c.* 99 (1931), Berichtig. (1932).—U.S.A. (Calif.).
melanocarpa *Suksdorf, l. c.* 89 (1931).—Brit. Columb.; U.S.A. (Washington).
microphylla *Suksdorf, l. c.* 91.—U.S.A. (Arizona).
microsperma *Suksdorf, l. c.* 100.—U.S.A. (Calif.).
modesta *Suksdorf, l. c.* 93.—U.S.A. (Calif.).
mojavensis *Suksdorf, l. c.* 108.—U.S.A. (Calif.).
mollis *Suksdorf, l. c.* 54.—U.S.A. (Idaho).
multiflora *Suksdorf, l. c.* 76.—U.S.A. (Calif.).
multispicata *Suksdorf, l. c.* 54.—U.S.A. (Calif.).
Munzii *Suksdorf, l. c.* 103.—U.S.A. (Calif.).
nana *Suksdorf, l. c.* 84.—U.S.A. (Arizona).
neomexicana *Suksdorf, l. c.* 71.—U.S.A. (N. Mexico).
nephrocarpa *Suksdorf, l. c.* 91.—U.S.A. (Oregon).
nesophila *Suksdorf, l. c.* 93.—Calif. infer.
nitidicaulis *Suksdorf, l. c.*—U.S.A. (Calif.).
obliqua *Suksdorf, l. c.* 111.—U.S.A. (Calif.).
oblongifolia *Suksdorf, l. c.* 98.—U.S.A. (Calif.).
obtusifolia *Suksdorf, l. c.* 91.—U.S.A. (Idaho).
ochroleuca *Suksdorf, l. c.* 95.—U.S.A. (Calif.).
Orcuttii *Suksdorf, l. c.* 109.—Calif. infer.
oregonensis *Suksdorf, l. c.* 85.—U.S.A. (Oregon).
orthocarpa *Suksdorf, l. c.* 76.—U.S.A. (Calif.).
ovata *Suksdorf, l. c.* 95.—U.S.A. (Calif.).

AMSINCKIA:—
ovaticarpa *Suksdorf in Werdenda*, i. 108 (1931).—U.S.A. (Calif.).
oxycarpa *Suksdorf, l. c.* 52.—U.S.A. (Calif.).
Palmeri *Suksdorf, l. c.* 65.—U.S.A. (Calif.).
paludosa *Suksdorf, l. c.* 74.—U.S.A. (Calif.).
palustris *Suksdorf, l. c.* 86.—U.S.A. (Calif.).
papillata *Suksdorf, l. c.* 51.—U.S.A. (Calif.).
Parishii *Suksdorf, l. c.* 70.—U.S.A. (Calif.).
peltata *Suksdorf, l. c.* 66.—U.S.A. (Calif.).
peltigera *Suksdorf, l. c.* 53.—U.S.A. (Calif.).
perrugosa *Suksdorf, l. c.* 57.—U.S.A. (Calif.).
Philippii *Suksdorf, l. c.* 105.—Chile.
platycarpa *Suksdorf, l. c.* 106.—U.S.A. (Calif.).
pleurocarpa *Suksdorf, l. c.* 73.—U.S.A. (Calif.).
praecox *Suksdorf, l. c.* 55.—U.S.A. (Calif.).
pratensis *Suksdorf, l. c.* 67.—U.S.A. (Calif.).
propinqua *Suksdorf, l. c.* 55.—U.S.A. (Calif.).
pulchra *Suksdorf, l. c.* 103.—U.S.A. (Calif.).
pullata *Suksdorf, l. c.* 67.—U.S.A. (Calif.).
punctata *Suksdorf, l. c.* 89.—U.S.A. (Calif.).
Purpusii *Suksdorf, l. c.* 92.—Calif. super. et infer.
pusilla *Suksdorf, l. c.* 85.—U.S.A. (Calif.).
quercetorum *Suksdorf, l. c.* 61.—U.S.A. (Calif.).
ramosissima *Suksdorf, l. c.* 72.—U.S.A. (Calif.).
remotifructus *Suksdorf, l. c.* 107.—U.S.A. (Calif.).
rigida *Suksdorf, l. c.* 91.—U.S.A. (Arizona).
rivularis *Suksdorf, l. c.* 92.—U.S.A. (Calif.).
robusta *Suksdorf, l. c.* 61.—U.S.A. (Nevada).
rostellata *Suksdorf, l. c.* 107.—U.S.A. (Calif.).
rostrata *Suksdorf, l. c.* 106.—U.S.A. (Nevada).
rugosissima *Suksdorf, l. c.* 73.—U.S.A. (Calif.).
rupestris *Suksdorf, l. c.* 77.—U.S.A. (Calif.).
salebrosa *Suksdorf, l. c.* 110.—U.S.A. (Calif.).
scabra *Suksdorf, l. c.* 65.—U.S.A. (Calif.).
scabricarpa *Suksdorf, l. c.* 93.—U.S.A. (Calif.).
Scouleri *I. M. Johnston in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 202: Lithospermum lycopsoides *Lehm.*, non Amsinckia lycopsoides *Lehm.*
setosissima *Suksdorf in Werdenda*, i. 55 (1931).—U.S.A. (Calif.).
solida *Suksdorf, l. c.* 84.—U.S.A. (Calif.).
sparsiflora *Suksdorf, l. c.* 77.—U.S.A. (Calif.).
sparsifolia *Suksdorf, l. c.* 84.—U.S.A. (Calif.).
sparsiseta *Suksdorf, l. c.* 80.—U.S.A. (Calif.).
speciosa *Suksdorf, l. c.* 50.—U.S.A. (Calif.).
Spencerae *Suksdorf, l. c.* 86.—U.S.A. (Calif.).
splendens *Suksdorf, l. c.* 68.—U.S.A. (Calif.).
stenophylla *Suksdorf, l. c.* 69.—U.S.A. (Calif.).
straminea *Suksdorf, l. c.* 54.—U.S.A. (Calif.).
strigosa *Suksdorf, l. c.* 70.—U.S.A. (Calif.).
subglabricaulis *Suksdorf, l. c.* 58.—U.S.A. (Calif.).
subintegra *Suksdorf, l. c.* 105.—U.S.A. (Calif.).
Swainiae *Suksdorf, l. c.* 72.—U.S.A. (Calif.).
truncata *Suksdorf, l. c.* 96.—U.S.A. (Calif.).
turrita *Suksdorf, l. c.* 104.—U.S.A. (Calif.).
utahensis *Suksdorf, l. c.* 106.—U.S.A. (Utah).
verna *Suksdorf, l. c.* 58.—U.S.A. (Calif.).
verrucosa *Suksdorf, l. c.* 54.—U.S.A. (Calif.).
verrucosissima *Suksdorf, l. c.* 105.—U.S.A. (Idaho).
vestita *Suksdorf, l. c.* 81.—U.S.A. (Calif.).
viridifolia *Suksdorf, l. c.* 75.—U.S.A. (Calif.).
vulgaris *Suksdorf, l. c.* 60.—U.S.A. (Calif.).
washingtonensis *Suksdorf, l. c.* 110.—U.S.A. (Washington).
yosemitensis *Suksdorf, l. c.* 60.—U.S.A. (Calif.).

AMSONIA Walt. (Apocynac.).
arizonica *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1931, xviii. 432.—U.S.A. (Arizona).
filiformis *A. Nelson, l. c.* 433.—Mexico.
grandiflora *Alexander in Torreya*, 1934, xxxiv. 116.—U.S.A. (Arizona); Mexico.
lanata *Alexander, l. c.* 117.—U.S.A. (Nevada).

AMYEMA Van Tiegh. (Loranthac.).
aneityensis (*Guillaumin*) *Danser in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 223, 224, cum descr. emend.: Loranthus aneityensis.
angustiflora (*S. Moore*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 25 (1933): Loranthus angustiflorus.
anisomeres *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 322 (1931).—Celebes.
aquilonia *Danser in Philipp. Journ. Sc.* 1935, lviii. 86.—Ins. Philipp. (Luzon).
Cumingii *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. x. 324 (1929), sphalm.: Amylotheca Cumingii.

AMYEMA:—
ficivora (*Guillaumin*) *Danser in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 223: Loranthus ficivorus.
glaucescens (*S. Moore*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 28 (1933): Loranthus glaucescens.
gracilis *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 334 (1931).—N. Guin.
gravis *Danser, l. c.* 336.—Borneo; Java.
haematodes (*O. Schwarz*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 29 (1933), cum descr. ampl.: Loranthus haematodes.
hastifolia (*Ridley*) *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 337 (1931): Loranthus hastifolius.
miraculosa *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France*, xlii. 84 (1895), in obs.—Austral.
mosea *Danser in Philipp. Journ. Sc.* 1935, lviii. 77.—Ins. Philipp. (Luzon).
obovata *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 340 (1931).—N. Guin.
ovariosa *Danser, l. c.*—N. Guin.
periclymenoides (*Engl. & K. Krause*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 32 (1933): Loranthus periclymenoides.
pilosa *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. x. 336 (1929), sphalm.: Dendrophthoë curvata.
pustulata (*S. Moore*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 33 (1933): Loranthus pustulatus.
samoënsis (*Reinecke*) *Danser, l. c.*; *et in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 225, cum descr. emend.: Loranthus samoënsis.
sessiliflora *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 346 (1931).—N. Guin.
sessilifolia (*Van Tiegh.*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 34 (1933): Loranthus sessilifolius.
spathulata (*O. Schwarz*) *Danser, l. c.*: Loranthus spathulatus.
speciosa *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 347 (1931).—N. Guin.
subalata (*De Wild.*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 34 (1933): Loranthus subalatus.
timorana *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 350 (1931).—Ins. Sunda.
umbellata *Danser, l. c.* 352.—Ins. Molucc.
Xylochlamys *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 35 (1933): Xylochlamys queenslandica.

AMYGDALUS L. (Rosac.).
gjarnyensis *Tamamsch. in Fedde, Repert.* xxxviii. 391 (1935).—Armen. Ross.
Grossheimii *Tamamsch. l. c.*—Armen. Ross.
† nemausensis *Cabanès in Mém. Acad. Nîmes*, 1928–30 (1932); cf. *P. Fourn. in Le Monde des Plantes*, 1933, xxxiv. 18, in obs.—Gallia.
Urartu *Tamamsch. in Fedde, Repert.* xxxviii. 166 (1935).—Armen.

AMYLOTHECA Van Tiegh. (Loranthac.).
amplexicaulis *Danser in Philipp. Journ. Sc.* 1935, lviii. 14.—Ins. Philipp. (Mindanao).
apodotrias *Danser, l. c.* 8.—Ins. Philipp. (Mindanao).
borneana *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 240 (1931).—Borneo.
breviflora *Danser, l. c.* 241.—Ins. Molucc.
canalensis (*S. Moore*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 36 (1933): Loranthus canalensis.
Comptonii (*S. Moore*) *Danser, l. c.*: Loranthus Comptonii.
djamuensis (*K. Krause*) *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 243 (1931): Loranthus djamuensis.
Francii (*Schlechter*) *Danser, l. c.* 320, in obs.: Loranthus Francii.
parvifolia *Danser, l. c.* 248.—N. Guin.
signata (*F. Muell. ex Benth.*) *Danser, l. c.* 244, in obs.: Loranthus signatus.
tenuis *Danser in Philipp. Journ. Sc.* 1935, lviii. 9.—Ins. Philipp. (Luzon).

AMYLOTHECA:—
triflora *Danser*; *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 250 (1931), descr. emend.—Ins. Sunda; Ins. Molucc.; N. Guin.

AMYRIS P. Br. (Rutac.; Burserac., Gen. Pl.).
attenuata *Standley in Tropical Woods*, 1934, No. 37, 28.—Honduras.
dioica *Bellardi ex Pasch. in Colla, Herb. Pedem.* ii. 39 (1834), in obs.—Ital.?
granulata *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 15 (1932).—Santo Domingo.
rhomboidea *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 65 (1935).—Brit. Honduras.

AMYXA Van Tiegh. in Ann. Sc. Nat. Sér. VII. xvii. 247 (1893). *THYMELAEACEAE.*
kutcinensis *Van Tiegh. l. c.* 248, in obs.—Borneo.
pluricornis (*Radlk.*) *Domke in Biblioth. Bot.* cxi. 117 (1934): Gonystylus pluricornis.

ANABASIS L. (Chenopodiac.).
africana *Murb. ex H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 42 (1932).—Tunisia.
depressa *Korovin in Bull. Univ. As. Centr.* xx. 189 (1935), in obs., nomen.—Ross. asiat. (Kasakstan.).
ebracteata *Korovin, l. c.*, in obs., nomen.—Ross. asiat. (Kasakstan.).
elatior (*C. A. Mey.*) *Schischk. in Krylov, Fl. Sibir. Occ.* iv. 961 (1930): Brachylepis elatior.
iliensis (*Iljin*) *Korovin & Mironov in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 29, 22 (1935): Arthrophytum iliense.
inconspicua *Korovin in Bull. Univ. As. Centr.* xx. 189 (1935), in obs., nomen.—Ross. asiat. (Kasakstan.).
naryensis *Korovin, l. c.*, in obs., nomen.—Ross. asiat. (Kasakstan.).
ramosissima *Dingler ex Oppenheimer in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1930, Sér. II. xxii. 291 (1931).—Palaest.
saxaul *Fisch. ex Ulbr. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 572 (1934), in syn.: Haloxylon persicum.
turkestanica *Korovin in Bull. Univ. As. Centr.* xx. 189 (1935), in obs., nomen.—Ross. asiat. (Kasakstan.).

ANACAMPSEROS Sims (Portulacac.).
albiflora *N. E. Brown ex v. Poelln. in Engl. Jahrb.* lxv. 425 (1933), in syn.: A. Nebrownii.
Buderiana *v. Poelln. l. c.* 407.—Namaqualand.
decipiens *v. Poelln. l. c.* 415.—Afr. austr. (Cape Prov.).
depauperata (*A. Berger*) *v. Poelln. l. c.* 435: A. filamentosa var. depauperata.
Juttae *Dinter ex v. Poelln. l. c.* 431, in syn.: A. tomentosa var. Margaretae *v. Poelln.*
Nebrownii *v. Poelln. l. c.* 425.—Afr. austr. (Cape Prov.).
neglecta *v. Poelln. l. c.* 407.—Great Namaq.
nitida *v. Poelln. l. c.* 438.—Namaqualand.
ombonensis *Dinter & v. Poelln. l. c.* 414.—Afr. austr.-occ.
omburensis *Dinter ex v. Poelln. l. c.* 415, pro syn., in obs.: A. ombonensis.
paradoxa *v. Poelln. in Fedde, Repert.* xxxiii. 72 (1933).—Afr. austr.-occ.
Poellnitziana *Dinter*; *v. Poelln. in Engl. Jahrb.* lxv. 438 (1933), descr.—Afr. austr.-occ.
rubroviridis *v. Poelln. in Fedde, Repert.* xxxiii. 72 (1933).—Namaqualand.
Schmidtii (*A. Berger*) *v. Poelln. in Engl. Jahrb.* lxv. 412 (1933): A. quinaria var. Schmidtii.
somaliensis *v. Poelln. l. c.* 411.—Somaliland.
Starkiana *v. Poelln. l. c.* 427.—Transvaal.
subnuda *v. Poelln. l. c.* 429.—Afr. austr.
truncata *v. Poelln. l. c.* 430.—Namaqualand.
variabilis *v. Poelln. l. c.* 405.—Namaqualand.

× **ANACAMPT-ORCHIS** G. Camus (Orchidac.).
Duquesnei (*Reichb. f.*) *Soó in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 124 (1932): Aceras Duquesnei.
Guetroti (*Labrie*) *Soó, l. c.* 125: Orchidanacamptis Guetroti.
Kelleri *Duffort ex G. Keller & Soó, l. c.* 124, in syn.: A. Klingei.

ANACHARIS L. C. Rich. (Hydrocharitac.).
densa (*Planch.*) *Marie-Vict. in Contrib. Lab. Bot. Univ. Montréal*, No. 18, 41 (1931): Elodea densa.
linearis (*Rydb.*) *Marie-Vict. l. c.*: Philotria linearis.
Naias (*Planch.*) *Marie-Vict. l. c.* 42: Egeria Naias.
occidentalis (*Pursh*) *Marie-Vict. l. c.* 40: Serpicula occidentalis.
Potamogeton (*Bert.*) *Marie-Vict. l. c.* 41: Diplandra Potamogeton.

ANACLANTHE N. E. Brown in Trans. Roy. Soc. S. Afr. xx. 269 (1932). *IRIDACEAE.*
namaquensis *N. E. Brown, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).
plicata (*L. f.*) *N. E. Brown, l. c.*: Antholyza plicata.

ANACOLOSA Blume (Olacac.).
insularis *Christoph. in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 128, 80 (1935).—Samoa.
lutea *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 91, 5 (1932).—Ins. Viti.

ANACYCLUS L. (Compos.).
altissimus (*L.*) *G. Sampaio in Ann. Acad. Polyt. Porto*, xiv. 162 (1921), in obs.: Anthemis altissima.
austriacus (*Jacq.*) *G. Sampaio, l. c.*, in obs.: Anthemis austriaca.
capillifolius *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 296.—Marocc.
ifniensis *Caballero in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 28, 24 (1935).—Marocc.
Kruegerianus *Pampan. in Archiv. Bot., Forlì*, 1933, ix. 101.—Tripolit.
tinctorius (*L.*) *G. Sampaio in Ann. Acad. Polyt. Porto*, xiv. 162 (1921), in obs.: Anthemis tinctoria.
Triumfetti (*All.*) *G. Sampaio, l. c.*: Anthemis Triumfetti.

ANADELPHIA Hackel (Gramin.).
Chevalieri *Reznik in Rev. Bot. Appliq.* 1934, xiv. 199.—Guinea Gall.
triseta *Reznik, l. c.* 198.—Guinea Gall.

ANAGALLIS L. (Primulac.).
myrtifolia *Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl.* iii. 992 (1834).—Chile.
Schliebenii *Knuth & Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 672 (1932).—Tanganyika Terr.
ulugurensis *Knuth, l. c.* xii. 88 (1934).—Tanganyika Terr.

ANAMORPHA Karst. & Triana in Triana, Nuev. Jen. i Esp. Fl. Neo-Granad. 9 (1854); Karst. in Linnaea, xxviii. 443 (1857); Sprague in Kew Bull. 1934, 395. *STERCULIACEAE.*
melochiodes *Karst. & Triana, l. c.* 10; *Sprague, l. c.* 395, 396.—Colomb.
walthérioides [sphalm. walteroides] *Karst. & Triana, l. c.*; *Karst. in Linnaea*, xxviii. 443 (1857); *Sprague, l. c.* 395.—Colomb.

ANAMTIA Koidz. (Myrsinac.).
Mezii *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1931, iii. 22: Myrsine marginata *Mez.*

ANANAS Mill. (Bromeliac.).
Ananas (*L.*) *Karst. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 964 (1895): Bromelia Ananas.
microcarpus *Hort. ex C. Cheval. in Bull. Soc. Nat. Hort. France*, 1935, Sér. VI. ii. 195, in syn.: A. microcephalus.
microcephalus *Hort. ex C. Cheval. l. c.* 195.—Hort.
strictus *Bertoni in Agronomia*, v. No. 7, 257 (1913), nomen; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 142.—Parag.

ANAPALINA N. E. Brown in Trans. Roy. Soc. S. Afr. xx. 274 (1932). *IRIDACEAE.*
Burchellii (*N. E. Brown*) *N. E. Brown, l. c.* 275: Antholyza Burchellii.
longituba *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 76 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
pulchra (*Schlechter*) *N. E. Brown in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xx. 275 (1932): Homoglossum pulchrum.
revoluta (*Burm.*) *N. E. Brown, l. c.*: Antholyza revoluta.
triticea (*Burm.*) *N. E. Brown, l. c.*: Ixia triticea.

ANAPHALIS DC. (Compos.).
maxima (*Kuntze*) *v. Steenis in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 185 (1934): Gnaphalium maximum.
possietica *Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 218 (1932).—Sibir. or.
todaiensis *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 373.—Japon.
viscosissima *Honda in Journ. Jap. Bot.* 1933, ix. 279.—Japon. (Hondo).
yakusimensis *Masamune, Prelim. Rep. Veg. Yakus.* 125 (1929); *Masamune in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* xi., Bot. No. 4, 442 (1934).—Ins. Liukiu (Yakusima).

ANAPHORA Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 1932, Sér. II. iv. 592. *ORCHIDACEAE.*
liparioides *Gagnep. l. c.*—Indo-China (Anam; Cambodia).

ANAPHRENIUM E. Mey. (Anacardiac.).
Kienerae *Sacleux in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 454.—Afr. trop. or.

ANASTRAPHIA D. Don (Compos.).
obovata *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 94 (1931).—Haiti.

ANAXAGOREA A. St.-Hil. (Annonac.).
brachycarpa *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* xii. 14 (1934).—Venez.
costaricensis *R. E. Fries, l. c.* 25.—Costa Rica.
macrantha *R. E. Fries, l. c.* 27.—Bras. (Amaz.).
megalophylla *R. E. Fries, l. c.* 20.—Peruv.
minor *Diels ex R. E. Fries, l. c.* 22.—Peruv.
multiflora *R. E. Fries, l. c.* 13.—Guiana Brit.; Bras. (Pará).
mutica *R. E. Fries, l. c.* 19.—Bras. (Amaz.).
pachypetala (*Diels*) *R. E. Fries, l. c.* x. 175 (1931), in obs.: Oxandra pachypetala.
pallida *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 79 (1931).—Peruv.
silvatica *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* xii. 10 (1934).—Bras. (Minas Geraes).

ANCHONIUM DC. (Crucif.).
ramosissimum *O. E. Schulz in Engl. Jahrb.* lxvi. 97 (1933).—Transcasp.

ANCHUSA L. (Boraginac.).
acaulis *Bellardi ex Bert. in Colla, Herb. Pedem.* iv. 249 (1835).—Aegypt.
mesatlantica *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 122 (1932), in obs.—Marocc.
pseudo-granatensis (*Braun-Blanquet & Maire*) *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 80 [1933]: A. undulata var. pseudo-granatensis.

ANCISTROCARPUS Oliv. (Tiliac.).
Bequaerti *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 398 (1932).—Congo Belg.
Wellensi *De Wild. l. c.* 400.—Congo Belg.

ANCISTRORHYNCHUS Finet (Orchidac.).
laxiflorus *Mansf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 705 (1935).—Tanganyika Terr.

ANCISTROTHYRSUS Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xi. 146 (1931). *FLACOURTIACEAE.*
Tessmannii *Harms, l. c.* 147.—Peruv.

ANDENEA Kreuzinger, Verzeichn. Amer. Sukkulent. 34 (1935); cf. Fedde, Repert. Sonder-Beih. C, sub t. 104 (1935). *CACTACEAE.*
Gregeri *Kreuzinger, ll. cc.*—Argent.

ANDERSSONIOPIPER Trelease in Proc. Am. Phil. Soc. 1934, lxxiii. 329. *PIPERACEAE.*
panamense *Trelease, l. c.*—Panamá.

ANDIRA Lam. (Legumin.).
micrantha *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 48 (1935).—Bras. (Amaz.).
parviflora *Ducke, l. c.* 47.—Bras. (Amaz.).

ANDRACHNE L. (Euphorbiac.).
pumila (*Rafin.*) *House in Bull. N. Y. State Mus.* 1920, Nos. 233–4, 66 (1921): Synexemia pumila.

ANDROCERA Nutt. (Solanac.).
citrullifolia (*A. Br.*) *Rydb. in Brittonia*, i. 96 (1931): Solanum citrullifolium.

ANDROMEDA L. (Ericac.).
corymbosa *Huguen. ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 73 (1835).—Hab.?
myrifica *Pabrez ex Hryniew. in Arch. Biol. Soc. Sc. Varsov.* iv. 53 (1933), pro syn.: A. Polifolia var. latifolia *Pall.*
nuda *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 593 (1895), in syn.: A. speciosa.
purpurea *Ruiz & Pav. ex Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 290 (1935), in obs., pro syn.: Pernettya purpurea.

ANDROPOGON L. (Gramin.).
baddadae *Chiov. Fl. Somala*, II. 440 (1932), in syn.: Hyparrhenia baddadae.
bicolor (*L.*) *Roxb. Hort. Beng.* 21 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 272 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 268 (1832): Holcus bicolor.
cernuus (*Willd.*) *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 273 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 270 (1832): Holcus cernuus.
Chevalieri *Reznik in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1933, Sér. II. v. 497.—Guinea Gall.
comosus *Spreng. Nov. Provent. Hort. Hal. & Berol.* 5 (1819).—Austral.
conjugatus *Roxb. Hort. Beng.* 6 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 260 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 255 (1832).—Ind. or. (Bengal).
divergens (*Hackel*) *Anderss. ex Hitchcock in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1933, xxiii. 456: A. scoparius var. divergens.
fascicularis *Roxb. Hort. Beng.* 82 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 269 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 265 (1832).—Ind. or.
Felicis *Reznik in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1933, Sér. II. v. 499.—Guinea Gall.
filiformis *Roxb. Hort. Beng.* 6 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 260 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 256 (1832).—Ind. or.
gambiensis *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1933, xiii. 870.—Senegal.
geminatus *Hackel ex Beal, Grasses N. Amer.* ii. 55 (1896): A. Hallii var. bispicata *Vasey.*
glaber *Roxb. Hort. Beng.* 7 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 271 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 267 (1832).—Ind. or. (Bengal).
infrasulcatus *Reznik in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1933, Sér. II. v. 496.—Sudan. Gall.
lanceolatus *Roxb. Hort. Beng.* 6 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 262 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 257 (1832).—Ind. or.
Martini *Roxb. l. c.* 7, nomen; *et l. c.* 280; *et l. c.* 277.—Ind. or.
miliaceus *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 276; *et l. c.* 272.—Ind. or.
monandrus *Roxb. l. c.* 82, nomen; *et l. c.* 264; *et l. c.* 260.—Ind. or.
montanus *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 271; *et l. c.* 267.—Ind. or.
parviflorus *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 277; *et l. c.* 274.—Ind. or.
pellitus (*Hackel*) *Herter, Fl. Urug. Pl. Vasc.* (*Estud. Bot. Reg. Urug.* iv.) 27 (1931): A. nutans var. pellitus.
plumosus (*R. Br.*) *Backer in K. Heyne, Nutt. Pl. Ned. Ind.* ed. 2, i. 189 (1927): Holcus plumosus.
polystachyos *Roxb. Hort. Beng.* 82 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 265 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 261 (1832).—Ind. or.
pumilus *Roxb. l. c.* 7, nomen; *et l. c.* 277; *et l. c.* 273.—Ind. or.
punctatus *Roxb. l. c.* 82, nomen; *et l. c.* 268; *et l. c.* 264.—Ind. or.
saccharatus (*Willd.*) *Roxb. l. c.* 7, nomen; *et l. c.* 274; *et l. c.* 271: Holcus saccharatus.
scandens *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 262; *et l. c.* 258.—Ind. or.
Schliebenii *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 650 (1932).—Tanganyika Terr.
secundus *Elliott, Bot. South-Carol. & Georgia*, i. 580 (1821).—U.S.A. (Georgia).
Shimadae *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 58.—Formosa.
Sorghum *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 273 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 269 (1832).—Ind. or.

ANDROPOGON:—
strictus *Roxb. Hort. Beng.* 82 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 265 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 260 (1832).—Ind. or.
tenellus *Roxb. l. c.* 6, nomen; *et l. c.* 259; *et l. c.* 254.—Ind. or. (Bengal).
tenuiculmus *Reznik in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1933, Sér. II. v. 495.—Guinea Gall.
tridentatus *Roxb. Hort. Beng.* 82 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 261 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 257 (1832).—Ind. or.
tristachyos *Roxb. l. c.* 6, nomen; *et l. c.*; *et l. c.* 256.—Ind. or.
verticillatus *Roxb. l. c.* 82, nomen; *et l. c.* 267; *et l. c.* 263.—Ind. or.
vohiboryensis *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 9.—Madag.
yucatanus *Swallen in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 436, 353 (1934).—Mexico.

ANDROSACE L. (Primulac.).
brahmaputrae *Hand.-Mazz. in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 164 (1931): A. bisulca *Hand.-Mazz. l. c.* xv. 280 (1927), non *Bur. & Franch.*
Fedtschenkoi *Ovczinn. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 369, in obs., 374 (1932).—As. centr.
incisa *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 16 (1824).—Hab.?
lanuginosa *Wall. l. c.* 15.—Ind. or.
refracta *Hand.-Mazz. in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 162 (1931).—China (Kweichau).
runcinata *Hand.-Mazz. l. c.* 161.—China (Kweichau).
sarmentosa *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 14 (1824).—Nepal.
stenophylla (*Petitmengin*) *Hand.-Mazz. in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 165 (1931): A. sarmentosa var. stenophylla.

ANDRYALA L. (Compos.).
atlanticola *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 151 (1932).—Marocc.
× Caballeroi *Font Quer in Cavanillesia*, vii. 83 (1935).—Marocc.
humilis *Pau in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 728 [1928].—Marocc.
maroccana *Pau ex Caballero in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 11, 37 (1917), in syn.: Paua maroccana.

ANEILEMA R. Br. (Commelinac.).
Hallbergii *Blatter in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxiii. 74 (1928).—Ind. or. (Bombay).
medicum (*Lour.*) *Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl.* i. 127 (1831): Commelina medica.
rigidum *Blatter in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxiii. 73 (1928).—Ind. or. (Bombay).
sienneum *Blatter, l. c.* 75.—Ind. or. (Bombay).
terminale (*Blume*) *Boldingh, Zakfl. Landbouwstr. Java*, 47 (1916); *Haines, Bot. Bihar & Orissa*, Pt. VI. 1080 (1924): Tradescantia terminalis.

ANEMONE L. (Ranunculac.).
Adamsiana *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 141 (1931).—U.S.A. (Calif.).
amagisanensis *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 1.—Japon.
Assisbrasiliana *Kuhlm. & C. Porto in Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro*, vi. 114 (1933).—Bras. (Mons Itatiaia).
australis *Soó in Journ. Ecol.* 1929, xvii. 337, in obs., nomen.—Hungar.
× autanensis *Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1932–3, Sér. II. xxv. 315 (1934).—Gallia.
chrysantha (*C. A. Mey.*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 105 (1930): A. narcissiflora var. chrysantha.
Delmasi *Luzzatto in Archiv. Bot., Forlì*, 1934, x. 114, in obs.—Eur.
felix *Peck in Torreya*, 1932, xxxii. 149.—U.S.A. (Oregon).
Gayeri *Soó in Bot. Közl.* 1932, xxix. 127, in syn.: Pulsatilla Gayeri.
hungarica *Soó in Journ. Ecol.* 1929, xvii. 340, in obs., nomen; *et in Bot. Közl.* 1932, xxix. 124, in syn.: Pulsatilla pratensis subsp. hungarica *Soó.*
hupehensis (*Hort.*) *Hort. ex Boynton in Addisonia*, 1931, xvi. 33: A. japonica var. hupehensis.
× hybrida (*Hort. ex L. H. Bailey*) *Makino in Journ. Jap. Bot.* vii. 4 (1931): A. japonica var. hybrida.

ANEMONE:—
jenisseënsis (*Korsh.*) *Krylov, Fl. Sibir. Occ.* v. 1157 (1931): A. ranunculoides subsp. jenisseënsis.
Kusnetzowii *Woronow ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 105 (1930).—Caucas.
×Lesseri *Wehrh. in Gartenfl.* 1932, lxxxi. 247.—Hort.
magellanica *Hort. ex Wehrh. l. c.*, in obs.—Hab.?
multifida *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 310 (1931): Pulsatilla multiceps.
oligantha *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 142 (1931).—U.S.A. (Calif.).
oligocarpa *P'ei in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., ix. 3 (1933).—China (Szechuan).
ovalifolia (*Brühl*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 315 (1931): A. obtusiloba subsp. ovalifolia.
petiolulata *P'ei in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., ix. 5 (1933).—China (Szechuan).
primuliflora *Colla, Herb. Pedem.* i. 22 (1833).—Ital.?
Tagawae *Ohwi in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 387.—Japon.
tenuicaulis (*Cheesem.*) *Parkin & Sledge in Journ. Linn. Soc., Bot.* xlix. 647 (1935): Ranunculus tenuicaulis.
tomentosa (*Maxim.*) *P'ei in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., ix. 2 (1933): A. vitifolia var. tomentosa.
×Weberi *Widder in Fedde, Repert.* xxxv. 62 (1934).—Styria.

ANEMOPAEGMA Mart. (Bignoniac.).
rugosum (*Schlecht.*) *Sprague in Kew Bull.* 1931, 223: Bignonia rugosa.

ANERINCLEISTUS Korth. (Melastomatac.).
caudatus *Diels in Engl. Jahrb.* lxv. 101 (1932).—China (Yunnan).
setulosus *Schwartz in Mitt. Inst. Bot. Hamburg*, vii. 242 (1931).—Borneo.
suffruticosus *Schwartz, l. c.* 243.—Borneo.

ANEULOPHUS Benth. (Erythroxylac.; Linac., Gen. Pl.).
congoënsis *Gram in Bot. Tidsskr.* xlii. 416 (1934).—Congo Belg.

ANEUROLEPIDIUM Nevski in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS, Ser. I. Fasc. 1, 14, in obs., 27 (1933). *GRAMINEAE.*
aemulans *Nevski, l. c.* 17, in obs.; *et in Komarov, Fl. URSS*, ii. 711 (1934).—Hab.?
akmolinense (*Drobov*) *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 708 (1934): Elymus akmolinensis.
alaicum (*Korsh.*) *Nevski, l. c.* 704: Elymus alaicus.
angustum (*Trin.*) *Nevski, l. c.* 700: Elymus angustus.
baldschuanicum (*Roshev.*) *Nevski, l. c.* 703: Elymus baldschuanicus.
condensatum (*J. & C. Presl*) *Nevski in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 14 (1933), in obs.: Elymus condensatus.
dasystachys (*Trin.*) *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 706 (1934): Elymus dasystachys.
divaricatum (*Drobov*) *Nevski, l. c.* 709: Elymus divaricatus.
fasciculatum (*Roshev.*) *Nevski, l. c.*: Elymus fasciculatus.
flexile *Nevski, l. c.* 705.—Hab.?
karataviense (*Roshev.*) *Nevski, l. c.*: Elymus karataviensis.
kopetdaghense (*Roshev.*) *Nevski, l. c.* 703: Elymus kopetdaghensis.
multicaule (*Kar. & Kir.*) *Nevski, l. c.* 708: Elymus multicaulis.
ovatum (*Trin.*) *Nevski, l. c.* 707: Elymus ovatus.
Paboanum (*Claus*) *Nevski, l. c.*: Elymus Paboanus.
petraeum *Nevski, l. c.* 705.—Hab.?
pseudoagropyrum (*Griseb.*) *Nevski in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 25 (1933), in obs.: Triticum pseudoagropyrum.
ramosum (*Trin.*) *Nevski, l. c.* 14, in obs.: Triticum ramosum.
Regelii (*Roshev.*) *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 709 (1934): Elymus Regelii.
tianschanicum (*Drobov*) *Nevski, l. c.* 703: Elymus tianschanicus.

ANEUROLEPIDIUM:—
ugamicum (*Drobov*) *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 704 (1934): Elymus ugamicus.

ANGELICA L. (Umbellif.).
boninensis *Tuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 451.—Ins. Bonin.
edulis *Miyabe in Journ. Coll. Sc. Tokyo*, xvi. ii. 77 (1902).—Japon.
longipes *H. Wolff in Fedde, Repert.* xxxiii. 75 (1933).—China (Yunnan).
oncosepala *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 726 (1933).—China (Yunnan).
porphyrocaulis *Nakai & Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. 1. (*Pl. Nov. Jehol.* 1) 33 (1934).—Manchur. (Jehol).
Tatianae *Bordz. in Fedde, Repert.* xxxvi. 304 (1934).—Caucas.
trichocarpa *Hara in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 624.—Japon.

ANGIANTHUS Wendl. (Compos.).
filifolius (*Benth.*) *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 135 (1931): Gnaphalodes filifolium.

ANGOSESELI Chiov. (Umbellif.).
mossamedensis (*Welw. ex Hiern*) *C. Norman in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 206: Caucalis mossamedensis.

ANGRAECUM Bory (Orchidac.).
forcipatum (*Kraenzl.*) *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* ii. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 420 (1908), in obs.: Listrostachys forcipata.
graminifolium (*Kraenzl.*) *Engl. l. c.*, in obs.: Listrostachys graminifolia.
urostachyum (*Kraenzl.*) *Engl. l. c.*, in obs.: Listrostachys urostachya.
Zenkeri (*Kraenzl.*) *Engl. l. c.* 421, in obs.: Listrostachys Zenkeri.

ANGULOA Ruiz & Pav. (Orchidac.).
sagittata *Summerhayes in Kew Bull.* 1931, 102.—Colomb.?

ANGURIA L. (Cucurbitac.).
Vogliana *Suesseng. in Fedde, Repert.* xxx. 278 · (1932).—Venez.

ANGYLOCALYX Taub. (Legumin.).
Talbotii *E. G. Baker ex Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 371 (1928); *Hutchinson & Dalziel in Kew Bull.* 1928, 402.—Nigeria.

ANIBA Aubl. (Laurac.).
anisosepala *Sandwith in Kew Bull.* 1933, 336.—Guiana Brit.
compacta *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 97.—Peruv.
Cujumary (*Nees*) *Lyons, Plant Names Scientific & Popular*, ed. 2, 40 (1907): Aydendron Cujumary.
elliptica *A. C. Smith in Phytologia*, i. 115 (1935).—Bras. (Amaz.).
flexuosa *A. C. Smith, l. c.* 117.—Bras. (Amaz.).
hypoglauca *Sandwith in Kew Bull.* 1932, 222.—Guiana Brit.
juruensis *A. C. Smith in Phytologia*, i. 116 (1935).—Bras. (Amaz.).
Krukovii *A. C. Smith, l. c.* 117.—Bras. (Amaz.).
Lehmannii *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxxi. 170 (1933).—Colomb.
opaca *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1934, lxi. 191.—Bras. (Maranhão).
Pittieri *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxxi. 168 (1933).—Venez.
reticulata *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 99.—Peruv.
sericea (*Nees*) *Brooks in Leafl. For. Dep., Trinidad & Tobago*, No. 4, pp. 3, 19, 42 (1931): Ocotea sericea.
Williamsii *Brooks, l. c.* pp. 3, 19, 43, nomen.—Trinidad; Tobago.
Williamsii *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxxi. 169 (1933).—Peruv.

ANINGERIA Aubrév. & Pellegr. in Bull. Soc. Bot. France, 1934, lxxxi. 795 (1935). *SAPOTACEAE.*
altissima (*A. Cheval.*) *Aubrév. & Pellegr. l. c.* 796: Hormogyne altissima.
Pierrei (*A. Cheval.*) *Aubrév. & Pellegr. l. c.*: Hormogyne Pierrei.

ANINGERIA:—
robusta (*A. Cheval.*) *Aubrév. & Pellegr. in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 797 (1935): Malacantha robusta.

ANISANTHA K. Koch (Gramin.).
fasciculata (*Presl*) *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 21 (1934), in clavi: Bromus fasciculatus.
Gussonii (*Parl.*) *Nevski, l. c.* 20, in clavi: Bromus Gussonii.
madritensis (*L.*) *Nevski, l. c.* 21, in clavi: Bromus madritensis.
rigens (*L.*) *Nevski, l. c.* 20, in clavi: Bromus rigens.
rubens (*L.*) *Nevski, l. c.* 19: Bromus rubens.
sericea (*Drobov*) *Nevski, l. c.* 20, in clavi: Bromus sericeus.
sterilis (*L.*) *Nevski, l. c.*: Bromus sterilis.
tectorum (*L.*) *Nevski, l. c.* 22: Bromus tectorum.

ANISOMERIS C. Presl (Rubiac.).
barbata (*Standley*) *Standley in N. Am. Fl.* xxxii. 226 (1934): Chomelia barbata.
bella *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 364 (1931).—Bras. (S. Paulo).
brasiliana (*A. Rich.*) *Standley, l. c.* 361: Chomelia brasiliana.
Englesingii (*Standley*) *Standley, l. c.* 360: Chomelia Englesingii.
estrellana (*Muell.-Arg.*) *Standley, l. c.* 361: Chomelia estrellana.
juruensis *Standley, l. c.*—Bras. (Amaz.).
Klugii *Standley, l. c.* 360.—Peruv.
malaneoides (*Muell.-Arg.*) *Standley, l. c.* 361: Chomelia malaneoides.
modesta *Standley, l. c.* 363.—Bras. (S. Paulo).
monantha *Schum. ex Standley, l. c.*—Bras. (Rio de Janeiro).
occidentalis (*Muell.-Arg.*) *Standley, l. c.* 361: Chomelia occidentalis.
oligantha (*Muell.-Arg.*) *Standley, l. c.*: Chomelia oligantha.
parviflora (*Muell.-Arg.*) *Standley, l. c.*: Chomelia parviflora.
parvifolia *Standley, l. c.* 362.—Bras. (Paraná).
pedunculosa (*Benth.*) *Standley, l. c.* 361: Chomelia pedunculosa.
pubescens (*Cham. & Schlecht.*) *Standley, l. c.*: Chomelia pubescens.
randioides *Standley, l. c.* 364.—Bras. (Ceará).
Recordii (*Standley*) *Standley in N. Am. Fl.* xxxii. 227 (1934): Chomelia Recordii.
sessilis (*Muell.-Arg.*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 361 (1931): Chomelia sessilis.
sylvicola (*Standley*) *Standley in N. Am. Fl.* xxxii. 225 (1934): Chomelia sylvicola.
transiens (*Muell.-Arg.*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 361 (1931): Chomelia transiens.
tristis (*Muell.-Arg.*) *Standley, l. c.*: Chomelia tristis.
vulpina (*Muell.-Arg.*) *Standley, l. c.*: Chomelia vulpina.

ANISOPAPPUS Hook. & Arn. (Compos.).
abercornensis *G. Taylor in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 164.—N. Rhodesia.
anemonifolius (*DC.*) *G. Taylor, l. c.* 165, in adnot.: Epallage anemonifolia.
aureus *Hutchinson & B. L. Burtt in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiii. 40 (1932).—Congo Belg.
Dalzielii *Hutchinson in Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 156 (1931).—Sudan. Gall.; Nigeria.
inuloides *Hutchinson & B. L. Burtt in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiii. 41 (1932).—Congo Belg.
Rogersii *G. Taylor in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 165, in adnot.: Epallage africana *S. Moore*, non Anisopappus africanus *Oliv. & Hiern.*
Smutsii *Hutchinson in Kew Bull.* 1933, 425, in adnot.—Transvaal.
suborbicularis *Hutchinson & B. L. Burtt in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiii. 41 (1932).—Congo Belg.

ANISOPHYLLEA R. Br. (Rhizophorac.).
Buettneri *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 677 (1921), in obs.—Congo Belg.

ANISOPHYLLEA:—
cinnamomoides (*Gardn. & Champ.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 108 (1931): Tetracrypta cinnamomoides.
Poggei *Engl. ex De Wild. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Bot., Sér. III. (*De Wild. & Th. Dur. Reliq. Dewevr.*) 83 (1901), nomen.—Angola.

ANISOSCIADIUM DC. (Umbellif.).
isolophme *Bornm. ex Dinsm. in Post, Fl. Syria, Palest. & Sinai*, ed. 2, i. (*Publ. Am. Univ. Beirut*, Nat. Sc. Ser., No. 1) 541 (1932), in syn.: A. isosciadium.

ANISOSTACHYA Nees (Acanthac.).
haplostachya (*Nees*) *Lindau in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* iv. III B. 329 (1895): Rostellularia haplostachya.
reptans (*Nees*) *Lindau, l. c.*: Rostellularia reptans.
tenella (*Nees*) *Lindau, l. c.*: Rostellularia tenella.

ANISOTES Nees (Acanthac.).
bracteatus *Milne-Redhead in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3268 (1935).—Tanganyika Terr.
umbrosus *Milne-Redhead, l. c.* t. 3267.—Tanganyika Terr.

ANNESORHIZA Cham. & Schlecht. (Umbellif.).
flagellifolia *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xviii. 517 (1932).—Transvaal.

ANNONA L. (Annonac.).
acutifolia *Saff. ex R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* x. 286 (1931).—Chile.
amambayensis *Hassler*; *R. E. Fries, l. c.* 264, descr.—Parag.
amazonica *R. E. Fries, l. c.* 266.—Bras. (Amaz.; Pará).
Billbergii *R. E. Fries, l. c.* 248.—Colomb.
Burchellii *R. E. Fries, l. c.* 232.—Bras. (Goyaz ?).
calophylla *R. E. Fries, l. c.* 233.—Parag.
calycina *Sagot ex R. E. Fries, l. c.* xii. 69 (1934), in syn.: Duguetia calycina.
campestris *R. E. Fries, l. c.* x. 221 (1931).—Parag.
conifera *Ruiz ex R. E. Fries, l. c.* xii. 53 (1934), pro syn.: Duguetia peruviana.
deminuta *R. E. Fries, l. c.* 212.—Peruv.
domingensis *R. E. Fries, l. c.* x. 308 (1931).—Santo Domingo.
Duckei *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 86 (1931).—Peruv.
dumetorum *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* x. 308 (1931).—Santo Domingo.
excellens *R. E. Fries, l. c.* 215.—Peruv.
Friesii *Robyns & Ghesquière in Bull. Soc. Bot. Belg.* lxvii. 47 (1934).—Rhodesia.
Gardneri *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* x. 211 (1931).—Bras. (Goyaz; Pernambuco).
impressivenia *Saff. ex R. E. Fries, l. c.* 223.—Bras. (Rio de Janeiro).
insignis *R. E. Fries, l. c.* xii. 214 (1934).—Bras. (Amaz.).
iquitensis *R. E. Fries, l. c.* x. 251 (1931).—Peruv.
Klainii *Pierre ex Engl. & Diels in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* vi. 80 (1901).—Gabon.
longepetiolata (*R. E. Fries*) *Robyns & Ghesquière in Bull. Soc. Bot. Belg.* lxvii. 42 (1934): A. cuneata var. longepetiolata.
macrocalyx *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* x. 246 (1931).—Peruv.
manabiensis *Saff. ex R. E. Fries, l. c.* 267.—Ecuador.
montana *Macfad.*; *R. E. Fries, l. c.* 206, descr. emend.—Ind. occ.; Am. austr.
paraënsis *R. E. Fries, l. c.* 237.—Bras. (Pará).
Poeppigiana *Saff. ex R. E. Fries, l. c.* x. 85 (1930), in syn.: Raimondia tenuiflora.
pteropetala *Ruiz & Pav. ex R. E. Fries, l. c.* xii. 187 (1934), in syn.: Rollinia microcarpa.
Saffordiana *R. E. Fries, l. c.* x. 272 (1931).—Bras. (Alagoas; Minas Geraes).
stenophylla *Engl. & Diels in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* vi. 78 (1901).—Afr. trop.
Ulei *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* x. 243 (1931).—Bras. (Amaz.).

ANODENDRON A. DC. (Apocynac.).
punctatum *Tsiang in Sunyatsenia*, ii. 129 (1934).—China (Hainan).

ANODISCUS Benth. (Gesneriac.).
xanthophyllus (*Poepp. & Endl.*) *Mansf. in Fedde, Repert.* xxxvi. 124 (1934): Gesneria xanthophylla.

ANOECTOCHILUS Blume (Orchidac.).
chapaënsis *Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 679.—Indo-China (Tonkin).
integrilabris *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 186 (1935).—Borneo.
tonkinensis *Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 679.—China (Yunnan); Indo-China (Tonkin).

ANOGRA Spach (Onagrac.).
confusa *Rickett in Kew Bull.* 1934, 57: Oenothera pinnatifida *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 494 (1840), non *Nutt.*

ANOMALANTHUS Klotzsch (Ericac.).
Lesliei *Compton in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 47.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Salteri *Compton, l. c.* 1932, lxx. 340.—Afr. austr. (Cape Prov.).

ANOMALESIA N. E. Brown in Trans. Roy. Soc. S. Afr. xx. 270 (1932). *IRIDACEAE.*
Cunonia (*L.*) *N. E. Brown, l. c.* 271: Antholyza Cunonia.
splendens (*Sweet*) *N. E. Brown, l. c.*: Anisanthus splendens.

ANOMALOCALYX Ducke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xi. 344 (1932). *EUPHORBIACEAE.*
Uleanus (*Pax & K. Hoffm.*) *Ducke, l. c.*: Cunuria Uleana.

ANOMIANTHUS Zoll. (Annonac.).
argenteus (*Blume*) *Backer, Schoolfl. Java*, 23 (1911): Uvaria argentea.
auritus (*Blume*) *Backer, l. c.*: Uvaria aurita.

ANONIDIUM Engl. & Diels (Annonac.).
Friesianum *Exell in Journ. Bot.* 1932, lxx. Suppl. 1, 211.—Congo Lusit.
usambarense *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* x. 80 (1930).—Tanganyika Terr.

ANOPLANTHUS Endl. (Orobanchac.).
luteus (*Parry*) *Rydb. Fl. Prairies & Plains Centr. N. Amer.* 732 (1932): Phelipaea lutea.

ANOTIS DC. (Rubiac.).
Arnottiana (*Miq.*) *Hochr. in Candollea*, v. 245 (1934): Hedyotis Arnottiana.
corymbifera *Backer ex v. Steenis in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 246 (1934), nomen.—Java.
hirsuta (*L. f.*) *Hochr. in Candollea*, v. 246 (1934): Oldenlandia hirsuta.
trimera *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 59 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 137, descr. ampl.—Siam.

ANPLECTRUM A. Gray (Melastomatac.).
Yatesii *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 175 (1934).—Sumatra.
yunnanense *Kraenzl. in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 153.—China (Yunnan).

ANTENNARIA Gaertn. (Compos.).
affinis *Fernald in Rhodora*, 1931, xxxiii. 222.—Groenlandia.
alaskana *Malte in Rhodora*, 1934, xxxvi. 107.—Alaska.
arenicola *Malte, l. c.* 110.—Canada (Quebec).
atriceps *Fernald in Contrib. Arn. Arb.* No. VI. 207 (1934).—Canada bor.-occ.
Bayardi *Fernald in Rhodora*, 1933, xxxv. 333.—Newfoundland.
brevistyla *Fernald, l. c.* 1931, xxxiii. 223.—Groenlandia.
brunnescens *Fernald, l. c.* 1933, xxxv. 336.—Newfoundland.
burwellensis *Malte in Rhodora*, 1934, xxxvi. 111.—Canada (Quebec).
canescens (*Lange*) *Malte, l. c.* 109: A. alpina var. canescens.
columnaris *Fernald in Rhodora*, 1933, xxxv. 331.—Newfoundland.
compacta *Malte in Rhodora*, 1934, xxxvi. 111.—Canada (Mackenzie Distr.).
confusa *Fernald in Rhodora*, 1933, xxxv. 338.—Newfoundland.

ANTENNARIA:—
congesta *Malte in Rhodora*, 1934, xxxvi. 114.—Canada (Quebec).
Foggii *Fernald in Rhodora*, 1933, xxxv. 332.—Newfoundland.
gaspensis (*Fernald*) *Fernald, l. c.* 341: A. neodioica var. gaspensis.
×Hansii *A. Kerner in Sitz. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxxiv. Abth. I, 476 (1877), in obs.—Groenlandia.
hudsonica *Malte in Rhodora*, 1934, xxxvi. 116: A. glabrata f. tomentosa *Ekman*.
isabellina *Greene ex House in Bull. N. Y. State Mus.* 1920, Nos. 233–4, 14 (1921), in syn.: A. canadensis var. isabellina *Greene*.
megacephala *Fernald in Contrib. Arn. Arb.* No. VI. 208 (1934).—Canada bor.-occ.
subcanescens *Ostenf. ex Malte in Rhodora*, 1934, xxxvi. 112.—Canada (Mackenzie Distr.).
tomentosa *Nicholson, Ill. Dict. Gard.* i. 83 (1884).—Hab. ?
ungavensis (*Fernald*) *Malte in Rhodora*, 1934, xxxvi. 110, in adnot.: A. alpina var. ungavensis.
virginica *Stebbins in Rhodora*, 1935, xxxvii. 230.—U.S.A. (Vermont; Pennsylvania; Virginia).
viscidula *A. Nelson ex Rydb. Fl. Colorado*, 368, in clavi, 369 (1906).—U.S.A. (Wyoming; Colorado).

ANTHAENANTIOPSIS Mez; Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xi. 237 (1931), descr. *GRAMINEAE.*

×**ANTHECHRYSANTHEMUM** Domin in Preslia, xiii–xv. 233 (1935), sine descr. *COMPOSITAE.*
[ANTHEMIS × CHRYSANTHEMUM.]
Celakovskyi *Domin, l. c.*—Czechoslovak.

×**ANTHE-MATRICARIA** Geisenheyn. ex Domin in Preslia, xiii–xv. 233 (1935), in syn.: **Anthechrysanthemum** Domin (Compos.).
Celakovskyi *Geisenheyn. ex Domin, l. c.*, in syn.: Anthechrysanthemum Celakovskyi.

ANTHEMIS L. (Compos.).
brachystephana *Bornm. & Gauba in Fedde, Repert.* xxxvi. 350 (1934).—Persia.
deserticola *Kraschen. & Popov in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. I, 178 (1933).—Ross. asiat. centr.
frutescens *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 511 (1894), in syn.: Chrysanthemum frutescens.
fugax *Gay ex Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc*, iii. 762 (1934), in syn.: A. monilicostata.
genevensis *Hort. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 451 (1834).—Ital. ?
Grisleyi *G. Sampaio in Bol. Soc. Brot.* Ser. II. vii. 162 (1931): A. repanda *Brot. Fl. Lusit.* i. 394 (1804), non *L.*
Kochiana *Sosn. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 116 (1934), in syn.: A. tinctoria.
marocana *Battand. & Pitard in Pitard, Contrib. Étude Fl. Maroc*, 19 (1918).—Marocc.
mauritiana *Maire & Sennen in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1933, xxiv. 217.—Marocc.
Mauritii *Sennen ex Pau in Cavanillesia*, v. 176 (1932), nomen.—Marocc.
narbonensis *Balb. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 451 (1834).—Ital. ?
purpurea *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 501 (1894), in syn.: Anacyclus radiatus.
sachokiana *Sosn. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 117 (1934).—Caucas.
samia *K. H. Rechinger in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 16.—Graecia (Ins. Nicaria et Samos).
semperflorens *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 511 (1894), in syn.: Chrysanthemum pinnatifidum.
xylopoda *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxvi. 144 (1934).—As. Min. (Lydia).

ANTHEPHORA Schreb. (Gramin.).
aequiglumis *Goossens in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xx. 195 (1932).—Orange Free State.
angustifolia *Goossens, l. c.* 194.—Afr. austr. (Cape Prov.).
argentea *Goossens, . c.* 198.—Afr. austr. (Cape Prov.).

ANTHEPHORA:—
gracilis *Stapf & C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1933, 271.—Tanganyika Terr.
ramosa *Goossens in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xx. 192 (1932).—Afr. austr.-occ.; Cape Prov.
truncata *Robyns in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 198 (1932).—Congo Belg.

ANTHERICUM L. (Liliac.).
bulbinifolium *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 261 (1931).—Great Namaq.
caespitosum *Dinter, l. c.* 267.—Hereroland.
crassiusculum *Dinter*; *Dinter, l. c.* 266, descr.—Hereroland.
Geayanum *H. Perrier in Lecomte, Not. Syst.* v. 36 (1935).—Madag.
glandulosum *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 266 (1931).—Hereroland.
glutinosum *Dinter, l. c.* 265, non olim.—Great Namaq.
glutinosum *Dinter in Fedde, Repert. Beih.* xxiii. 55 (1923), in obs.; *et in Fedde, Repert.* xxix. 265 (1931), in obs., pro syn.: A. nigrobracteatum.
hypoxiforme *H. Perrier in Lecomte, Not. Syst.* v. 37 (1935).—Madag.
kovismontanum *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 268 (1931).—Great Namaq.
lanatum *Dinter in Fedde, Repert. Beih.* xxiii. 57 (1923), in obs.; *et in Fedde, Repert.* xxix. 261 (1931).—Great Namaq.
longibracteatum *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 267 (1931).—Great Namaq.
lusitanicum (*P. Cout.*) *G. Sampaio in Bol. Soc. Brot.* Ser. II. vii. 120 (1931): Paradisia Liliastrum var. lusitanica.
mandrarense *H. Perrier in Lecomte, Not. Syst.* v. 38 (1935).—Madag.
nigrobracteatum *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 265 (1931).—Great Namaq.
odoratissimum *Dinter, l. c.* 260.—Great Namaq.
peculiare *Dinter, l. c.* 263.—Great Namaq.
recurvatum *Dinter, l. c.* 264.—Great Namaq.
scariosum *A. Duthie in Ann. Univ. Stellenb.* 1926, iv. Sect. A, No. 1, 16; *et in Ann. Bolus Herb.* iv. 136 (1928).—Afr. austr. (Cape Prov.).
sofiense *H. Perrier in Lecomte, Not. Syst.* v. 37 (1935).—Madag.
sublanatum *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 262 (1931).—Great Namaq.
trifarium *Soland. ex Skottsb. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 2, 56 (1934), in syn.: Astelia pumila.
tuberiferum *Dinter*; *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 263 (1931), descr.—Great Namaq.
Weissianum *Dinter, l. c.* 262.—Great Namaq.

ANTHEROLOPHUS Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 1934, Sér. II. vi. 190. *LILIACEAE.*
glandulosus *Gagnep. l. c.*—Indo-China (Laos).

ANTHEROSTYLIS C. A. Gardner in Journ. Roy. Soc. W. Austral. 1932–3, xix. 91 (1934). *GOODENIACEAE.*
calcarata *C. A. Gardner, l. c.* 92.—W. Austral.

ANTHISTIRIA L. f. (Gramin.).
arundinacea *Roxb. Hort. Beng.* 6 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 256 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 251 (1832).—Ind. or. (Bengal).
cymbaria (*L.*) *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 255; *et l. c.*: Andropogon cymbarius.
heteroclita *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 253; *et l. c.* 249.—Ind. or.
polystachya *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 252; *et l. c.* 248.—Ind. or. (Bengal).
scandens *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 253; *et l. c.*—Ind. or. (Bengal).

ANTHOCERCIS Labill. (Solanac.).
aromatica *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 116 (1931), nomen.—W. Austral.

ANTHOCLEISTA Afzel. (Loganiac.).
Brieyi *De Wild. in Mém. Acad. Belg.* 8vo. Sér. II. xii. Fasc. 5, 55 (1933), in obs., nomen.—Hab. ?
micrantha *Gilg & Mildbr. ex Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 18 (1931).—Fernando Po.
squamata *De Wild. in Mém. Acad. Belg.* 8vo. Sér. II. xii. Fasc. 5, 55 (1933), in obs., nomen.—Hab. ?

ANTHODISCUS G. F. W. Mey. (Caryocarac.; Ternstroemiac., Gen. Pl.).
glaucescens *Macbride in Candollea*, v. 385 (1934).—Peruv.
montanus *Gleason in Phytologia*, i. 29 (1933).—Colomb.

ANTHOLYZA L. (Iridac.).
caffra *Baker, Handb. Irid.* 230 (1892), non olim.—Afr. austr.
Vandermerwei *L. Bolus in Journ. Bot.* 1931, lxix. 14.—Afr. austr. (Cape Prov.).

ANTHOPOGON Neck. (Gentianac.).
procerus (*Holm*) *Rydb. in Brittonia*, i. 94 (1931): Gentiana procera.

ANTHOPTERUS Hook. (Ericac.; Vacciniac., Gen. Pl.).
bracteatus *A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 409 (1932).—Colomb.
cuneatus *A. C. Smith, l. c.* 407.—Colomb.
Ericae *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 277 (1935).—Ecuador.

ANTHOSACHNE Steud. (Gramin.).
elymoides (*Hochst.*) *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 65 (1934), in clavi: Triticum elymoides.
Jacquemontii (*Hook. f.*) *Nevski, l. c.*, in clavi; *et in Komarov, Fl. URSS*, ii. 598 (1934): Agropyron Jacquemontii.
longiaristata (*Boiss.*) *Nevski, l. c.* 64; *et l. c.*: Brachypodium longiaristatum.
scabra (*Labill.*) *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 65 (1934), in clavi: Festuca scabra.

ANTHOSPERMUM L. (Rubiac.).
cameroonense *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 136 (1931).—Cameroons.

ANTHRISCUS Bernh. (Umbellif.).
Scandix (*Scop.*) *Aschers. Fl. Brand.* i. 260 (1860): Caucalis Scandix, non Anthriscus Scandix *Bieb.*

ANTHURIUM Schott (Arac.).
Albaretii *Macbride in Candollea*, v. 348 (1934): A. pulchrum *Engl.*
brevipetiolatum *Engl. ex K. Krause in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 610 (1932).—Guatem.
Burchellianum (*Engl.*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 7 (1931): A. panduratum var. Burchellianum.
concolor *K. Krause in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 606 (1932).—Panamá.
conjunctum *K. Krause, l. c.* 612.—Boliv.
fatoënse *K. Krause, l. c.* 611.—Panamá.
idmense *K. Krause, l. c.* 608.—Peruv.
latihastatum *Engl. ex K. Krause, l. c.* 612.—Costa Rica.
Muelleri *Macbride in Candollea*, v. 348 (1934): A. mexicanum *Engl.*
nervosum *K. Krause in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 608 (1932).—Peruv.
Ottonis *K. Krause, l. c.* 609.—Boliv.
petrophilum *K. Krause, l. c.* 607.—Bras. (Bahia).
Porschianum *K. Krause in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, xlvi. 231 (1932).—Costa Rica.
ramonense *Engl. ex K. Krause in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 611 (1932).—Costa Rica.
saxosum *K. Krause, l. c.* 609.—Bras. (Rio de Janeiro).
validifolium *K. Krause, l. c.* 607.—Panamá.
Williamsii *K. Krause, l. c.* 610.—Panamá.
yurimaguense *Engl.*; *K. Krause, l. c.* 613, descr.—Peruv.

ANTHYLLIS L. (Legumin.).
bicolor *Bertol. ex Colla, Herb. Pedem.* ii. 86 (1834).—Ital.
pseudo-arundana *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 77 (1932).—Hispan.
Warnieri *Emberger ex Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc*, ii. 397 (1932), nomen; *Emberger in Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc*, 1932, No. xxxiii. 35 (1933), descr.—Marocc.

ANTIARIS Leschen. (Morac.; Urticac., Gen. Pl.).
Challa (*Schweinf.*) *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 33 (1915), in obs.: Ficus Challa.
Kerstingii *Engl. l. c.*, in obs.—Guinea (Togo).

ANTIDESMA L. (Euphorbiac.).
caudatum *Pax & K. Hoffm. in Mitt. Inst. Bot. Hamburg*, vii. 223 (1931).—Borneo.
filipes *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 218 (1931).—China (Kweichau; Hunan; Kiangsi; Kwangtung).
insulare *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 91, 12 (1932).—Ins. Viti.
kusaiense *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 456.—Ins. Carolin. (Kusai).
microcarpum *Miq. Fl. Ind. Bat.*, Suppl. 1, 184 (1860), sphalm.: A. neurocarpum.
nienkui *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 263 (1935).—China (Hainan).
Paxii *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* x. 485 (1931): A. Henryi *Pax & K. Hoffm.*
urophyllum *Pax & K. Hoffm. in Mitt. Inst. Bot. Hamburg*, vii. 224 (1931).—Borneo.

ANTIRHEA Commers. ex Juss. (Rubiac.).
bifida (*Lam.*) *I. M. Johnston in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 166: Tournefortia bifida.
bifurcata (*Desr.*) *Urb. Symb. Antill.* i. 435 (1900), in obs.: Malanea bifurcata.
chinensis (*Champ.*) *Benth. & Hook. f. ex F. B. Forbes & Hemsl. in Journ. Linn. Soc., Bot.* xxiii. 384 (1888): Guettardella chinensis.
elliptica *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 52 (1932).—Santo Domingo.
inconspicua (*Seem.*) *Christoph. in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 128, 202 (1935): Guettarda inconspicua.
montecristina *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 51 (1932).—Santo Domingo.
obovata (*Britton*) *Standley in N. Am. Fl.* xxxii. 273 (1934): Stenostomum obovatum.
oligantha *Urb.*; *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 51 (1932), descr. ampl.—Santo Domingo.
panamensis *Standley in N. Am. Fl.* xxxii. 264 (1934).—Panamá.
portoricensis (*Britton & P. Wilson*) *Standley, l. c.* 268: Stenostomum portoricense.

ANTIRRHINUM L. (Scrophulariac.).
Burnati *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 85 [1933], nomen.—Marocc.
chrysothales *Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 570 [1928].—Marocc.
jamaicense *Fisch. ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 320 (1835).—Hab. ?
Lazari *Sennen in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 187, in obs., nomen.—Marocc.
Theodori *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 85 [1933], nomen.—Marocc.
Vidalianum *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 572 [1928].—Marocc.

ANTIRRHOEA Comm. corr. Endl. Ench. Bot. 272 (1841). *RUBIACEAE.*
[Vide Antirhea.]

ANTOSCHMIDTIA Steud. (Gramin.).
bulbosa (*Stapf*) *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. 1. 307 (1931): Schmidtia bulbosa.
kalahariensis (*Stent*) *Bremek. & Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xvi. 405 (1935): Schmidtia kalahariensis.

ANTROCARYON Pierre (Anacardiac.).
Schorkopfii *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 178 (1921), in obs.—Cameroons.
Soyauxii (*Engl.*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.*, Nachtr. II. 39 (1900), in obs., nomen; *De Wild. in Rev. Zool. Afr.* xiv. Suppl. Bot., 9 (1926): Spondias Soyauxii.

APAMA Lam. (Aristolochiac.).
hainanensis *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 220 (1935).—China (Hainan).

APARTEA Pellegr.; Pellegr. in Bull. Soc. Bot. France, 1931, lxxviii. 180: **Mapania** Aubl. (Cyperac.).
Le-Testui *Pellegr.*; *Pellegr. l. c.*: Mapania oblonga.

APATESIA N. E. Brown; N. E. Brown in Gard. Chron. 1932, Ser. III. xci. 262, descr. ampl. *FICOIDACEAE.*
Maughani *N. E. Brown, l. c.* 263.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Pillansii *N. E. Brown*; *N. E. Brown, l. c.* 262, descr. ampl.—Afr. austr. (Cape Prov.).

APEIBA Aubl. (Tiliac.).
surinamensis *Uitt. in Pulle, Fl. Surinam*, iii. (*Meded. K. Ver. Kol. Inst. Amst.* xxx.) 51 (1932); *et in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 184.—Guiana Bat.

APHANAMIXIS Blume (Meliac.).
pinatubensis *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3205 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
polystachya (*Wall.*) *R. N. Parker in Indian Forester*, 1931, lvii. 486: Aglaia polystachya.

APHANIA Blume (Sapindac.).
neo-ebudica *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 240.—N. Hebrides.
silvatica *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 502 (1928), in clavi; *Hutchinson & Dalziel in Kew Bull.* 1929, 26, descr.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire; Gold Coast).

APHANOSTELMA Malme in Arkiv Bot., Stockh. xxv. A. No. 7, 10 (1933): **Brachylepis** Hook. & Arn. (Asclepiadac.).
bicornutum (*Griseb.*) *Malme, l. c.* xxvi. A. No. 4, 19 (1934): Melinia bicornuta.
Candolleanum (*Hook. & Arn.*) *Malme, l. c.* xxv. A. No. 7, 11 (1933), in obs.: Brachylepis Candolleana.
parviflorum (*Malme*) *Malme, l. c.*: Mitostigma parviflorum.
tubatum (*Malme*) *Malme, l. c.*, in obs.: Mitostigma tubatum.

APHANOSTELMA Schlechter in Léveillé, Fl. Kouy-Tcheou, 39 (1914–15), in clavi, sine descr. *ASCLEPIADACEAE.*

APHELANDRA R. Br. (Acanthac.).
Alexandri *Leonard in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 438.—Colomb.
imperialis *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 820 (1895), in syn.: A. tetragona.
Lawranceae *Leonard in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 437.—Colomb.
maculata (*Tafalla ex Nees*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 819 (1895): Ruellia maculata.
parviflora *Leonard in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 439.—Colomb.

APHRAGMUS Andrz. ex DC. (Crucif.).
altaicus *Bunge ex A. Busch in Fl. Sibir. & Orient. Extr.*, Crucif. 589 (1931), in syn.: A. involucratus.
obscurus (*Dunn*) *O. E. Schulz in Fedde, Repert.* xxxi. 330 (1933): Draba obscura.
Stewartii *O. E. Schulz, l. c.*—Kashmir.

APHYLLORCHIS Blume (Orchidac.).
Evrardii *Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 680.—Indo-China (Anam).
kemulensis *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 84 (1931).—Borneo.
purpurea *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 431.—Formosa.
siantanensis *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxx. 327 (1932).—Arch. Mal. (Anamba).

APICRA Willd. (Liliac.).
humilis *Farden in Cactus Journ.* iii. 56 (1935), nomen.—Hab. ?
Huttonii *Farden, l. c.*, nomen.—Hab. ?
Neliana *Farden, l. c.*, nomen.—Hab. ?
Pillansii *Farden, l. c.*, nomen.—Hab. ?
Thunbergii *Farden, l. c.*, nomen.—Hab. ?

APIOS Moench (Legumin.).
taiwaniana *Hosokawa in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 310.—Formosa.

APIUM L. (Umbellif.).
depressum *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 63 (1933–5).—Mexico.

APLOPAPPUS Cass. (Compos.).
Bartlettii *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1932, xxii. 382.—Mexico.
Ferrisiae *Blake in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 171.—Calif. infer.
illinitus *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 155 (1931).—U.S.A. (Calif.).
martirensis (*Wiggins*) *Blake in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 173: Ericameria martirensis.
salicinus *Blake, l. c.* 171.—U.S.A. (Arizona).

APLOPAPPUS:—
Traskae *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 156 (1931).—U.S.A. (Calif.).
Tweediei (*Hook. & Arn.*) *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 6, 42 (1932): Erigeron Tweediei.
Wigginsii *Blake in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 169.—Calif. infer.

APLOPHYLLUM A. Juss. (Rutac.).
deserti *Post & Beauverd in Dinsm. Pl. Post. & Dinsm.* Fasc. I. 4 (1932); *Dinsm. in Fedde, Repert.* xxxiii. 103 (1933).—Syria.
dubium *Korovin in Trans. Sc. Soc. Turk.* i. 37 (1923).—Bokhara.
Eugenii-Korovinii *Pavlov in Bull. Univ. As. Centr.* xxi. 195 (1935).—Turkestan.
Popovii *Korovin in Trans. Sc. Soc. Turk.* i. 34 (1923), in obs.; *et in Not. Syst. Herb. Hort. Petrop.* v. 178 (1924).—Bokhara.

APLUDA L. (Gramin.).
geniculata *Roxb. Hort. Beng.* 8 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 327 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 325 (1832).—Ind. or.

APOCOPIS Nees (Gramin.).
himalayensis (*Steud.*) *W. Watson in Atkinson, Gaz. N. W. Ind.* 392 (1882): Andropogon himalayensis.

APOCYNUM L. (Apocynac.).
filiforme *L. f. Suppl.* 169 (1781).—Afr. austr.
lancifolium *Russanov in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 167 (1933).—As. centr.; China bor.
scabrum *Russanov, l. c.* 166.—Ross. asiat. centr.

APODANTHERA Arn. (Cucurbitac.).
Herrerae *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 770 (1933).—Peruv.
tumbeziana *Harms, l. c.*—Peruv.
Weberbaueri *Harms, l. c.* 771.—Peruv.

APODOCEPHALA Baker (Compos.).
angustifolia *Humbert in Bull. Soc. Bot. France*, 1930, lxxvii. 682 (1931).—Madag.

APOLEYA Gleason in Phytologia, i. 143 (1935): **Apuleia** Mart. (Legumin.), nom. conserv., non **Apuleia** Gaertn. (Compos.).
leiocarpa (*Vogel*) *Gleason, l. c.*: Leptolobium leiocarpum.
molaris (*Spruce ex Benth.*) *Gleason, l. c.*: Apuleia molaris.

APONOGETON L. f. (Aponogetonac.; Naiadac., Gen. Pl.).
Eylesii *Rendle in Journ. Bot.* 1932, lxx. 76.—S. Rhodesia.

APOROSA Blume (Euphorbiac.).
chinensis (*Champ. ex Benth.*) *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 34 (1934): Scepa chinensis.
yunnanensis (*Pax & K. Hoffm.*) *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* x. 486 (1931), cum descr. ampl.: A. Wallichii var. yunnanensis.

APORRHIZA Radlk. (Sapindac.).
nitida *Gilg*; *Milne-Redhead in Kew Bull.* 1931, 272, descr. ampl.—Afr. trop.
rugosa *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 501 (1928), in syn.: A. Talbotii.
Tessmannii *Gilg ex Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 1137 (1933).—Guinea Hispan.; Cameroons.

APOSTASIA Blume (Orchidac.).
nipponica *Masamune in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 46.—Japon.
selebica *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxv. 449 (1933).—Celebes.
Thorelii *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 350.—Indo-China (Laos).

APPENDICULA Blume (Orchidac.).
crispa *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 127 (1931).—Borneo.
hexandra (*J. Koen.*) *J. J. Smith, l. c.* Sér. III. xii. 119 (1932): Epidendrum hexandrum.
inermis *Carr in Journ. As. Soc. Mal.* xi. 77 (1933).—Sumatra.
Jacobsonii *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 121 (1932).—Sumatra.

APPENDICULA:—
Kjellbergii *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxv. 483 (1933).—Celebes.
laxifolia *J. J. Smith, l. c.* 480.—Celebes.
linearis *J. J. Smith, l. c.* 481.—Celebes.
niahensis *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 95 (1935).—Borneo.
ovalis (*Schlechter*) *J. J. Smith ex Mansf. in Fedde, Repert. Beih.* lxxiv. 3, t. 52, fig. 208 (1934): Podochilus ovalis.
recondita *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 128 (1931).—Borneo.
salicifolia *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxv. 482 (1933).—Celebes.
spathilabris *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 129 (1931).—Borneo.
vanikorensis *Ames in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 138.—Ins. Santa Cruz.

APPUNIA Hook. f. (Rubiac.).
aurantiaca (*K. Krause*) *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 472: Rudgea aurantiaca.
calycina (*Benth.*) *Sandwith, l. c.* 471: Coffea calycina.
debilis *Sandwith, l. c.*—Guiana Brit.
odontocalyx *Sandwith, l. c.* 472.—Boliv.
triphylla *Ducke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 482 (1932).—Bras. (Pará).

APTOSIMUM Burch. (Scrophulariac.).
laricinum *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 188 (1932).—Great Namaq.
patulum *Bremek. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 255 (1933).—Transvaal.

AQUILARIA Lam. (Thymelaeac.).
grandifolia *Domke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 348 (1932).—Sumatra.

AQUILEGIA L. (Ranunculac.).
Borodinii *Schischk. in Mél. Bot. Offerts à M. I. Borodin à l'occasion de son Jubilé*, 305 (1927); cf. *Krylov, Fl. Sibir. Occ.* v. 1135 (1931).—Sibir.
colchica *Kemul.-Nat. in Trav. Inst. Bot. Tiflis*, i. 113 (1934).—Caucas.
×Helenae *Hort. ex Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 66 (1924).—Hort.
japonica *Nakai & Hara in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 7.—Sakhalin; Corea; Japon.
Kozakii *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric.-Taiwan*, 1932, iv. 301.—Formosa.
montsicciana *Font Quer in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, v. Ser. Bot. No. 3, 200 (1920).—Hispan.
Paui *Font Quer, l. c.* 198.—Hispan.
Piersoniana *L. Williams in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1934, xxi. 344.—U.S.A. (Wyoming).
purpurans *Hort. ex Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. Fasc. suppl. 2, p. 2 (1935), nomen.—Hab. ?

ARABIDOPSIS Schur (Crucif.).
mollis (*Hook.*) *O. E. Schulz in Engl. Jahrb.* lxvi. 97 (1933): Turritis mollis.
multicaulis *Pampan. in Sped. Ital. De Filippi Himal. etc. 1913–14*, Ser. II. xi. (*Agg. Fl. Carac.*) 160 (1934).—Mont. Karakoram.

ARABIS L. (Crucif.).
dentipetalata *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 1.—Japon.
elata *Piper in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1924, xxxvii. 91.—U.S.A. (Oregon).
Endlichii *O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 390 (1932).—Mexico.
Greatrexii (*Miyabe & Kudo*) *Miyabe & Tatewaki in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.* xiii. 379 (1934): Cardamine Greatrexii.
Johnstonii *Munz in Bull. S. Calif. Acad. Sc.* 1932, xxxi. 63.—U.S.A. (Calif.).
leptopoda *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 236 [1928].—Marocc.
Nuttallii *Ulke in Canadian Field-Nat.* 1935, xlix. 55, nomen.—Brit. Columb.
Ottonis-Schulzii *Bornm. & Gauba in Fedde, Repert.* xxxix. 80 (1935).—Persia.
Popovii *Pavlov in Sovietsk. Bot.* 1934, No. 1, 23, in obs.—Turkestan.
pseudodecumbens *Emberger & Maire*; *Emberger & Maire in Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc*, xi. Nos. 4–6, 91 (1931).—Marocc.

ARABIS:—
Shockleyi *Munz in Bull. S. Calif. Acad. Sc.* 1932, xxxi. 62.—U.S.A. (Calif.; Nevada).
tomorensis *Markgraf in Denkschr. Akad. Wiss. Wien, Math.-Nat.* cii. 336 (1931).—Albania.
Viereckii *O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 389 (1932).—Mexico.
Werneri *Emberger & Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1933, xxiv. 196.—Marocc.

ARACHIDNA Moench (Legumin.).
trifolia *Adans. ex A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1933, xiii. 697, in obs.: Glycine subterranea.

ARACHIS L. (Legumin.).
helodes *Mart. ex A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1933, xiii. 759, in syn.: A. glabrata.
oleifera *A. Cheval. l. c.* 770.—Cult.

ARACHNOCALYX Compton in Journ. S. Afr. Bot. 1935, i. 144. *ERICACEAE.*
cereris *Compton, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).

ARACHNOSPERMUM F. W. Schmidt (Compos.).
canum (*C. A. Mey.*) *Domin in Preslia*, xiii–xv. 249 (1935): Podospermum canum.

ARAEOCOCCUS Brongn. (Bromeliac.).
pectinatus *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcv. 41 (1931).—Costa Rica.

ARALIA L. (Araliac.).
apioides *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 701 (1933).—China (Yunnan).
arizonica *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 148 (1931).—U.S.A. (Arizona).
caesia *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 702 (1933).—China (Yunnan).
continentalis *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 228.—Sibir. or.; Manchur.; Corea.
dumetorum *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 701 (1933).—China (Yunnan).
echinocaulis *Hand.-Mazz. l. c.* 704.—China (Hunan; Kiangsi).
× Lizei *Hort. ex Cochet in Rev. Hort.* 1912, n. s. xii. 562.—Hort.
quinquevulnera *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 405 (1894), in syn.: Pseudopanax crassifolius.
sachalinensis *Hort. ex Vilmorin, l. c.* 403, in syn.: A. racemosa f. sachalinensis *Regel.*
simplicifolia *Hort. ex C. Schroeter in Schweiz. Gart.* No. 7, p. 9 (1931), in syn.: Oreopanax simplicifolius.
staphyleina *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 703 (1933).—China (Yunnan).
undulata *Hand.-Mazz. l. c.* 705.—China (Hunan).

ARAUCARIA Juss. (Pinac.; Conif., Gen. Pl.).
Bidwilliana *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1234 (1895), in syn.: A. Bidwillii.
Niepraschki *Baum. ex Pynaert in Rev. Hort. Belg.* xxxi. 132 (1905).—Cult.
Van-Gaertii *Hort. ex Dallimore & A. B. Jackson, Handb. Conif.* 160 (1923), in syn.: A. Rulei.

ARCHIBACCHARIS Heering (Compos.).
prorepens *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1934, xxiv. 432.—Guatem.

ARCHIDENDRON F. Muell. (Legumin.).
Harmsii *v. Malm in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 629 (1932).—Ins. Sunda (Flores).

ARCTAGROSTIS Griseb. (Gramin.).
arundinacea (*Trin.*) *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 317 (1896): Vilfa arundinacea.
ursorum (*Komarov*) *Komarov, Fl. URSS*, ii. 168 (1934): Poa ursorum.

ARCTIUM L. (Compos.).
atlanticum (*Pomel*) *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 153 (1932): Lappa atlanticum.
crispum (*J. Wolff*) *ex Bul. Grăd. & Muz. Bot. Univ. Cluj*, 1930, x. App. 1. 8; *Cretzoiu in Acta Faun. Fl. Univ., Bucureşti*, Ser. II. Bot., i. Nos. 7–8, p. 1 (1933).—Ruman.
Degeni *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 153 (1932).—Hispan.
Palladini (*Marcowicz*) *Grossheim, Fl Kavkaza*, iv. 164 (1934): Lappa Palladini.
platylepis (*Boiss. & Balansa*) *Sosn. ex Grossheim, l. c.*: Lappa platylepis.

ARCTOPHILA Rupr. (Gramin.).
mucronata *Hackel ex Vasey, Cat. Grasses U.S.* 88 (1885), nomen.—Alaska.

ARCTOSTAPHYLOS Adans. (Ericac.).
Bakeri *Eastw. in Leafl. West. Bot.* i. 115 (1934).—U.S.A. (Calif.).
bracteosa (*DC.*) *Abrams in Leafl. West. Bot.* i. 84 (1934): Andromeda bracteosa.
Campbellae *Eastw. in Leafl. West. Bot.* i. 74 (1933).—U.S.A. (Calif.).
confertiflora *Eastw. l. c.* i. 122 (1934).—U.S.A. (Calif.).
crustacea *Eastw. l. c.* i. 74 (1933).—U.S.A. (Calif.).
Cushingiana *Eastw. l. c.* 75.—U.S.A. (Calif.).
densiflora *M. S. Baker in Leafl. West. Bot.* i. 31 (1932).—U.S.A. (Calif.).
Howellii *Eastw. in Leafl. West. Bot.* i. 123 (1934).—U.S.A. (Calif.).
imbricata *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 149 (1931).—U.S.A. (Calif.).
Jepsoni *Eastw. in Leafl. West. Bot.* i. 119 (1934).—U.S.A. (Calif.).
laevigata *Eastw. l. c.* i. 76 (1933).—U.S.A. (Calif.).
novoleontis *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 450.—Mexico.
pallida *Eastw. in Leafl. West. Bot.* i. 76 (1933).—U.S.A. (Calif.).
regismontana *Eastw. l. c.* 77.—U.S.A. (Calif.).
Rosei *Eastw. l. c.*—U.S.A. (Calif.).
setosissima *Eastw. l. c.* 78.—U.S.A. (Calif.).
sonomensis *Eastw. l. c.*—U.S.A. (Calif.).
subcordata *Eastw. l. c.* 61.—U.S.A. (Calif.).
Tracyi *Eastw. l. c.* 79.—U.S.A. (Calif.).
viscosissima *Peck in Torreya*, 1932, xxxii. 151.—U.S.A. (Oregon).
zacaënsis *Eastw. in Leafl. West. Bot.* i. 79 (1933).—U.S.A. (Calif.).

ARCTOTONIA Trelease in Proc. Am. Phil. Soc. 1930, lxix. 315. *PIPERACEAE.*
Pittieri *Trelease, l. c.* 1934, lxxiii. 328.—Panamá.
sempervirens *Trelease ex Lundell in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 436, 302 (1934), nomen.—Mexico.
stipulacea *Trelease in Proc. Am. Phil. Soc.* 1935, lxxv. 716, nomen.—Hab.?
tuxpenyana *Trelease ex Lundell in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 436, 311 (1934), nomen.—Mexico.

ARCYTOPHYLLUM Willd. ex Schultes (Rubiac.).
Andreanum *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 205 (1931).—Ecuador.
confertum (*Ruiz & Pav.*) *Standley, l. c.* vii. 37 (1930), in obs.: Hedyotis conferta.
Jamesonii *Standley, l. c.* vii. 207 (1931).—Ecuador.
juniperifolium (*Ruiz & Pav.*) *Standley, l. c.*: Hedyotis juniperifolia.
microphyllum (*Willd. ex Schultes*) *Standley, l. c.*: Houstonia microphylla.
nodosum *Rusby in Phytologia*, i. 78 (1934).—Boliv.
setosum (*Ruiz & Pav.*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 208 (1931): Hedyotis setosa.
thymifolium (*Ruiz & Pav.*) *Standley, l. c.*: Hedyotis thymifolia.
vernicosum *Standley, l. c.* 209.—Ecuador.

ARDINGHELLA Thou. Hist. Veg. Isles Austr. Afr., ed. 2, t. 29 (1805); Hiern in Journ. Bot. 1900, xxxviii. 492: **Ochrocarpos** Thou. (Guttif.).

ARDISIA Sw. (Myrsinac.).
anceps *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 280 (1824).—Ind. or. (Assam).
Banghamii *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 129 (1934).—Sumatra.
colorata *Roxb. Hort. Beng.* 16 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 271 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 581 (1832).—Ind. or. (Assam).
complanata *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 280 (1824).—Penins. Mal.
Creaghii *Ridley in Kew Bull.* 1934, 120.—Borneo.
crenata *Roxb. Hort. Beng.* 85 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 276 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 583 (1832).—Penins. Mal.

ARDISIA:—
dawnaea *C. E. Parkinson in Indian Forester*, 1934, lx. 266: A. gracilis *Lace.*
dichropetala *Standley in Tropical Woods*, 1934, No. 37, 29.—Honduras.
divergens *Roxb. Hort. Beng.* 85 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 275 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 583 (1832).—Penins. Mal.; Ins. Molucc.
glandulosa *Roxb. l. c.* 16, nomen; *et l. c.* 276; *et l. c.* 584.—Ind. or. (Assam).
hymenandra *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 282 (1824).—Ind. or. (Assam).
lanceolata *Roxb. Hort. Beng.* 85 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 275 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 583 (1832).—Penins. Mal.
Loureiriana (*G. Don*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 10, 299 (1935): Rhododendron Loureirianum.
macrocarpa *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 277 (1824).—Nepal.
Mjoebergii *Merrill in Sarawak Mus. Journ.* iii. 543 (1928).—Borneo.
nigrovirens *Macbride in Candollea*, v. 397 (1934).—Peruv.
obovatifolia *Merrill in Sarawak Mus. Journ.* iii. 544 (1928).—Borneo.
paniculata *Roxb. Hort. Beng.* 16 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 270 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 580 (1832).—Ind. or.
pauciflora *Heyne ex Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 279 (1824).—Ind. or. (Madras?).
pedunculosa *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 279 (1824).—Ind. or. (Assam).
principis (*A. DC.*) *Macbride in Candollea*, vi. 18 (1934): Cybianthus principis.
pseudoverticillata *Merrill*; *Chun in Sunyatsenia*, i. 287 (1934), descr. ampl.—China (Kwangtung).
punctipetala *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 132 (1934).—Sumatra.
scalarinervis *Walker in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 477.—China (Yunnan).
trichocarpa *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* vii. 319 (1931).—China (Kwangtung).
umbellata *Roxb. Hort. Beng.* 16 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 273 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 582 (1832).—Sumatra.
vestita *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 274 (1824), in obs.—Penins. Mal.
villosa *Roxb. Hort. Beng.* 85 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 274 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 582 (1832).—Penins. Mal.

ARDISIANDRA Hook. f. (Primulac.).
Wettsteinii *J. Wagner in Anz. Akad. Wiss. Wien, Math.-Nat.* 1932, lxix. 185.—Tanganyika Terr.

ARECA L. (Palmae).
Amdjahi *Furtado in Fedde, Repert.* xxxiii. 231, 235 (1933).—Borneo.
bongayensis *Becc. ex Furtado, l. c.* 231, 234.—Borneo.
celebica *Burret in Fedde, Repert.* xxxii. 115 (1933).—Celebes.
cuneifolia *Becc. ex Martelli in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1934, n. s. xli. 694 (1935), nomen.—Borneo.
flavescens *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1153 (1895), in syn.: Chrysalidocarpus lutescens.
Hallieriana *Becc. in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa*, Mem., 1934, xliv. 114.—Borneo.
Henrici *Furtado in Fedde, Repert.* xxxiii. 232, 237 (1933).—Celebes.
Hewittii *Furtado, l. c.* 231, 234.—Borneo.
Hullettii *Furtado, l. c.* 231, 235.—Borneo.
kinabaluensis *Furtado, l. c.* 228, 233.—Borneo.
nannospadix *Burret in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 265.—N. Guin.
Ridleyana *Becc. ex Furtado in Fedde, Repert.* xxxiii. 231, 236 (1933); *Becc. ex Martelli in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1935, n. s. xlii. 22, 27: A. furcata *Ridley, Mat. Fl. Mal. Penins.* ii. 136 (1907), non *Becc.*
rostrata *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 322 (1935).—N. Guin.

AREGELIA Kuntze (Bromeliac.).
bahiana (*Ule*) *Mez in Engl. Pflanzenreich, Bromeliac.* 42 (1934): Nidularium bahianum.
Burchellii (*Baker*) *Mez, l. c.* 51: Aechmea Burchelli.

AREGELIA:—
eleutheropetala (*Ule*) *Mez ex L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcviii. 5 (1932): Nidularium eleutheropetalum.
farinosa (*Ule*) *Mez in Engl. Pflanzenreich, Bromeliac.* 42 (1934): Nidularium farinosum.
macahensis (*Ule*) *Mez, l. c.* 45: Nidularium macahense.
Makoyana (*Regel*) *Mez, l. c.* 50: Nidularium Makoyanum.
Marechali (*Hort. ex Baker*) *Mez, l. c.* 43: Nidularium Marechali.
microps (*Morr.*) *Mez, l. c.* 51: Nidularium microps.
myrmecophila (*Ule*) *Mez, l. c.* 52: Nidularium myrmecophilum.
olens (Hook. f.) *Mez, l. c.* 42: Billbergia olens.
Pineliana (*Lem.*) *Mez, l. c.* 40: Nidularium Pinelianum.

ARENARIA L. (Caryophyllac.).
aculeata *Desv. Journ. de Bot.* iii. [No. 5] 221 [1816], nomen.—Hab.?
asiatica *Schischk. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1930, Nos. 5–6, [p. 3].—Sibir.
Bauhinorum (*Gay*) *Bonnier & Layens in Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* ii. 50 [1913]: Alsine Bauhinorum.
corymbulosa *Delastre, Fl. Dép. Vienne,* 119 (1842).—Gallia.
crilloniana *Drew in Rhodora,* 1935, xxxvii. 225.—Alaska.
cymifera (*Rouy & Fouc.*) *Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* ii. 50 [1913]: Alsine cymifera.
dasyphylla (*Bruno*) *Bonnier & Layens in Bonnier, l. c.* 51: Moehringia dasyphylla.
× decipiens *Font Quer in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1933, xxxiii. 380 (1934).—Hispan.
diantha *Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* ii. 52 [1913]: Alsine biflora.
divaricata *Desv. Journ. de Bot.* iii. [No. 5] 221 [1816], nomen.—Hab.?
ferganica *Schischk. in Trav. Mus. Bot. Acad. Sc. URSS,* xxiv. 32 (1932).—Turkestan.
filiformis *Desv. Journ. de Bot.* iii. [No. 5] 220 [1816].—U.S.A. (Carolina).
fimbriata (*E. Pritz.*) *Mattf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 335 (1932): Cerastium fimbriatum, non Arenaria fimbriata *M. Bieb.*, nec *Salzm.* (nomina nuda).
Funckii (*Jord.*) *Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* ii. 50 [1913]: Alsine Funckii.
Giraldii (*Diels*) *Mattf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 336 (1932): Lepyrodiclis Giraldii.
humifusa *Linden & Planch.*; *Sprague in Kew Bull.* 1926, 40.—Venez.
humifusa *Wahlenb.*; *Nordhagen in Bergens Mus. Årbok,* 1935, Naturvidensk. Rekke, No. 1, 24, descr. emend.—Eur. bor.; Groenlandia; Am. bor.
karakorensis *Schmid in Fedde, Repert.* xxxi. 42 (1932).—Tibet.
Kitaibelii (*Nym.*) *Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* ii. 50, 126 [1913]: Alsine Kitaibelii.
Kuschei *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 140 (1931).—U.S.A. (Calif.).
leucasteria *Mattf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 334 (1932).—China (Szechuan).
leucocephala *Bornm. & Gauba in Fedde, Repert.* xxxix. 93 (1935).—Persia.
linearifolia *Desv. Journ. de Bot.* iii. [No. 5] 220 [1816], an A. linearifolia *Poir.*
Litwinowii *Schischk. in Trav. Mus. Bot. Acad. Sc. URSS,* xxiv. 33 (1932).—Turkestan.
Mairei *Emberger ex Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc,* ii. 208 (1932), nomen; *Emberger in Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc,* 1932, No. xxxiii. 31 (1933), descr.—Marocc.
minutiflora *Loscos ex Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp.* iii. 620 (1880), in obs.—Hispan.
monilifera *Mattf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 334 (1932).—E. Tibet.
multicaulis *Jacq. Enum. Stirp.* 57 (1762); *Wulf. in Jacq. Collect.* i. 248 (1786).—Austria.
muscosa (*Crantz*) *Bonnier & Layens in Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* ii. 50 [1913]: Alsine muscosa.

ARENARIA:—
Olloixii *Jahandiez, Maire & Weiller in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord,* 1931, xxii. 281.—Marocc.
oösepala *Bordz. in Bull. Jard. Bot. Kieff,* xii–xiii. 110 (1931).—Reg. Caucas.; Armen.
quadrifaria *Desv. Journ. de Bot.* iii. [No. 5] 221 [1816].—Oriens.
Schimperi (*Hochst ex. A. Rich.*) *Oliv. Fl. Trop. Afr.* i. 142 (1868): Alsine Schimperi.
Scopolii *Colla, Herb. Pedem.* i. 361 (1833).—Ital.?
Smithiana *Mattf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 334 (1932): A. oresbia *W. W. Smith.*
Tatewakii *Nakai, Veg. Apoi,* 35, 48 (1930); *Hara in Bot. Mag., Tokyo,* 1934, xlviii. 899, in syn.: A. Katoana.
Thevenaei (*Reut.*) *Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* ii. 51 [1913]: Alsine Thevenaei.
Ulex *Desv. Journ. de Bot.* iii. [No. 5] 220 [1816]: A. juniperina *Poir.* [*in Lam.*] *Encycl.* vi. 378 (1804), non *L.*

ARGENTACER Small, Man. Southeast. Fl. 825 (1933). *ACERACEAE.*
saccharinum (*L.*) *Small, l. c.*: Acer saccharinum.

ARGOMUELLERA Pax (Euphorbiac.).
gigantea (*Baill.*) *Pax & K. Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix c. 108 (1931): Pycnocoma gigantea.
lancifolia *Pax, l. c.*, nomen.—Guinea.
reticulata (*Baill.*) *Pax & K. Hoffm. l. c.*: Pycnocoma reticulata.
rigidifolia (*Baill.*) *Pax & K. Hoffm. l. c.*: Pycnocoma rigidifolia.
trewioides (*Baill.*) *Pax & K. Hoffm. l. c.*: Pycnocoma trewioides.

ARGOPHYLLUM J. R. & G. Forst. (Saxifragac.).
vernicosum *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich,* 1931, lxxvi. 165.—N. Caled.

ARGOSTEMMA Wall. in Roxb. Fl. Ind., ed. Carey & Wall., ii. 324 (1824). *RUBIACEAE.*
condensum *Craib in Kew Bull.* 1931, 212.—Siam.
dispar *Craib, l. c.* 213.—Siam.
dulitense *Merrill in Sarawak Mus. Journ.* iii. 554 (1928).—Borneo.
fuscum *Craib in Kew Bull.* 1931, 213.—Siam.
iriomotense *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa,* 1935, xxv. 248.—Ins. Liukiu (Iriomote).
lobulatum *Craib in Kew Bull.* 1931, 214.—Siam.
maquilingense *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3242 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
Mjoebergii *Merrill in Sarawak Mus. Journ.* iii. 534 (1928).—Borneo.
murudense *Merrill, l. c.* 535.—Borneo.
parvum *Geddes*; *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 30 (1932), descr. ampl.—Siam.
pedicellatum *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3243 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
pictum *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 327 (1824).—Penins. Mal.
propinquum *Ridley*; *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 31 (1932), descr. ampl.—Penins. Mal.
rostratum *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 326 (1824).—Ind. or. (Assam).
rupestrinum *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3244 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
sarmentosum *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 324 (1824).—Nepal.
saxicola *Craib in Kew Bull.* 1931, 215.—Siam.
septatum *Craib, l. c.*—Siam.
umbellatum *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3245 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
verticillatum *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 325 (1824).—Nepal.

ARGYREIA Lour. (Convolvulac.).
campanulata (*L.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon,* vi. Suppl., 201 (1931): Stictocardia campanulata.

ARGYRODENDRON F. Muell. (Sterculiac.).
actinophyllum (*C. Moore*) *Edlin in New Phytol.* 1935, xxxiv. 10, 138, in obs.: Tarrietia actinophylla.

ARGYRODERMA N. E. Brown (Ficoidac.).
angustipetalum *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1934, xxiv. 198.—Afr. austr. (Cape Prov.).

ARGYRODERMA:—
aureum *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1934, xxiv. 198.—Afr. austr. (Cape Prov.).
australe *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 455 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
blandum *L. Bolus, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).
brevitubum *L. Bolus, l. c.* 456.—Afr. austr. (Cape Prov.).
carinatum *L. Bolus, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).
citrinum *L. Bolus, l. c.* 438.—Afr. austr. (Cape Prov.).
congregatum *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 177.—Afr. austr. (Cape Prov.).
cuneatipetalum *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 457 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
densipetalum *L. Bolus, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).
formosum *L. Bolus, l. c.* 458.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Framesii *L. Bolus, l. c.* 459, non olim.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Jacobsenianum *Schwantes in Jacobsen, Sukkulent.* 91 (1933); *Jacobsen, Succ. Pl.* 126 (1935).—Little Namaq.
Kleijnhansii *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 460 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
latipetalum *L. Bolus, l. c.* 462.—Afr. austr.
Lesliei *N. E. Brown in N. E. Brown, Tisch. & Karst. Mesembr.* 112 (1931): A. octophyllum *Schwantes*, non Mesembryanthemum octophyllum *Haw.*
leucanthum *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 460 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
longipes *L. Bolus, l. c.* 461.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Luckhoffii *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1934, xxiv. 198.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Nortieri *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 462 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
orientale *L. Bolus, l. c.* 463.—Afr. austr. (Cape Prov.).
ovale *L. Bolus, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).
Peersii *L. Bolus, l. c.* 464.—Afr. austr.
planum *L. Bolus, l. c.* 465.—Afr. austr. (Cape Prov.).
productum *L. Bolus, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).
pulvinare *L. Bolus, l. c.* 466.—Afr. austr. (Cape Prov.).
ringens *L. Bolus, l. c.* 437.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Schuldtii *Schwantes ex Jacobsen, Succ. Pl.* 129 (1935).—Hab.?
speciosum *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 466 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
splendens *L. Bolus, l. c.* 467.—Afr. austr. (Cape Prov.).
subrotundum *L. Bolus, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).
Villetii *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1934, xxiv. 198.—Afr. austr. (Cape Prov.).

ARGYROLOBIUM Eckl. & Zeyh. (Legumin.).
frutescens *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal,* Pt. II. p. xviii. 393 (1932).—Transvaal.
lancifolium *Burtt Davy, l. c.* p. xviii. 392.—Transvaal.
mucilagineum *Blatter in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxvi. 481 (1933).—Ind. or. (Waziristan).
nanum *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal,* Pt. II. p. xviii. 393 (1932).—Transvaal.
nitens *Burtt Davy, l. c.*—Transvaal.
purpurascens *Blatter in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxvi. 480 (1933).—Ind. or. (Waziristan).
Rogersii *N. E. Brown in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal,* Pt. II. p. xix. 394 (1932).—Transvaal.

ARGYRONERIUM Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine, iii. 1234 (1933). *APOCYNACEAE.*
odoratum *Pitard, l. c.*—Indo-China (Cambodia).

ARIA Jacq. f. (Rosac.).
tomentosa (*Rouy & Camus*) *Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* iv. 19 [1920]: Sorbus tomentosa.

ARIDARIA N. E. Brown (Ficoidac.).
arenicola *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 357 (1932).—Namaqualand.

ARIDARIA:—
Dejagerae *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 312 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Gratiae *L. Bolus, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).
leptopetala *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 225 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
macrosiphon *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 358 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Meyeri *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 475 (1935).—Namaq.
multiseriata *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 226 (1931).—Little Namaq.
obtusa *L. Bolus, l. c.* 227.—Little Namaq.?
oubergensis *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 417 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
ovalis *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 228 (1931).—Little Namaq.
platysepala *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 417 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
pomonae *L. Bolus, l. c.* 418.—Afr. austr.-occ.
quaterna *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 337 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
recurva *L. Bolus, l. c.* 359.—Afr. austr. (Bushmanland).
rhodandra *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 225 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
straminea *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 359 (1932), non olim.—Namaqualand.
subpetiolata *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 476 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
vernalis *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 357 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).

ARIOSORBUS Koidz. in Yuhki, Fl. Yamagata-praefect. 39, t. 1 (1934); et in Acta Phytotax. & Geobot. 1934, iii. 146. *ROSACEAE.*
tangoënsis (*Koidz.*) *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 147: Sorbus tangoënsis.
uzenensis (*Koidz.*) *Koidz. in Yuhki, Fl. Yamagata-praefect.* 39, t. 1 (1934); *et in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 146, cum descr.: Sorbus uzenensis.

ARISAEMA Mart. (Arac.).
aequinoctiale *Nakai & Maekawa in Bot. Mag., Tokyo,* 1932, xlvi. 561.—Japon.
atrolinguum *Maekawa, l. c.* 1934, xlviii. 48.—Japon. (Hondo).
Barnesii *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1933, 342.—Ind. or. (Madras).
brevistipitatum *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 19 (1934).—China (Kwangtung).
convolutum *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1934, 167.—Mont. Nilgiri.
deflexum *Nieuwl. & Th. Just in Am. Midl. Nat.* 1931, xii. 217.—U.S.A. (Indiana).
hakonecola *Nakai in Bot. Mag., Tokyo,* 1935, xlix. 586.—Japon. (Hondo).
iyoanum *Makino in Journ. Jap. Bot.* viii. 32 (1932).—Japon. (Shikoku).
koshikiense *Nakai in Bot. Mag., Tokyo,* 1935, xlix. 423.—Japon. (Kiushiu).
limbatum *Nakai & Maekawa, l. c.* 1932, xlvi. 562.—Japon.
longecaudatum *Blatter in Journ. & Proc. As. Soc. Beng.* 1930, n. s. xxvi. 362 (1931).—Ind. or. (Bombay).
magnificum *Nakai in Bot. Mag., Tokyo,* 1931, xlv. 105.—Japon.
Murrayi *Hook.*; *Blatter in Journ. & Proc. As. Soc. Beng.* 1930, n. s. xxvi. 365 (1931), descr. emend.—Ind. or.
Negishii *Makino in Journ. Jap. Bot.* i. 41 (1918).—Japon.
niveum *Nakai in Bot. Mag., Tokyo,* 1934, xlviii. 780.—Japon. (Hondo).
ovale *Nakai, l. c.* 1935, xlix. 423.—Japon. (Hondo).
Petelotii *K. Krause in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 332 (1932).—Indo-China (Tonkin).
sadoënse (sphalm. sodoënse) *Nakai in Bot. Mag., Tokyo,* 1935, xlix. 584.—Sakhalin; Japon.
solenochlamys *Nakai ex Maekawa in Bot. Mag., Tokyo,* 1932, xlvi. 565.—Japon.
stenophyllum *Nakai & Maekawa, l. c.* 564.—Japon.
Sugimotoi *Nakai, l. c.* 1935, xlix. 424.—Japon. (Hondo).
translucens *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1933, 344.—Mont. Nilgiri.

ARISAEMA:—
tuberculatum *C. E. C. Fischer in Kew. Bull.* 1935, juxta 65; 1934, 167, nomen substitutum: A. convolutum *C. E. C. Fischer.*
tylophorum *C. E. C. Fischer, l. c.* 1933, 346.—Mont. Nilgiri.
Urashima *Hara in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 822.—Japon.
Wightii *Schott*; *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1933, 342, descr. ampl.—Mont. Nilgiri.
yakusimense *Nakai in Bot. Mag., Tokyo,* 1935, xlix. 497.—Japon. (Kiushiu).

ARISTEA Soland. (Iridac.).
affinis *N. E. Brown in Kew Bull.* 1931, 192.—Transvaal.
congesta *N. E. Brown, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).
curvata *N. E. Brown, l. c.* 193.—Transvaal.
gracilis *N. E. Brown, l. c.*—Transvaal; Natal.
lignosa *Adamson in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 373 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
torulosa *Klatt*; *N. E. Brown in Kew Bull.* 1931, 191, descr. emend.—Afr. austr. (Cape Prov.).
uhehensis *Harms ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* ii. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 370 (1908), in obs.—Afr. trop.
Woodii *N. E. Brown in Kew Bull.* 1931, 192: A. torulosa *Baker in Dyer, Fl. Cap.* vi. 49 (1896), quoad descr., non *Klatt.*

ARISTIDA L. (Gramin.).
armata *Henrard in Meded. Herb. Leid.* No. 58, 20, 30 (1929), in obs.; *et l. c.* No. 58 A. 197 (1932), in clavi; *et l. c.* No. 54 C. Suppl., 703 (1933), latine.—Austral. (Queensland).
Benthami *Henrard, l. c.* No. 58 A. 246 (1932), in clavi; *et l. c.* No. 54 C. Suppl., 705 (1933), latine.—Austral. (Queensland).
biglandulosa *J. M. Black in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1933, lvii. 146.—Austral. centr.
borumensis *Henrard in Meded. Herb. Leid.* No. 58 A. 203 (1932), in clavi; *et l. c.* No. 54 C. Suppl., 706 (1933), latine.—Afr. Lusit. Or.
calcicola *Hitchcock & Ekman in N. Am. Fl.* xvii. 405 (1935).—Cuba; Santo Domingo.
canescens *Henrard in Meded. Herb. Leid.* No. 58, 29 (1929), in obs., nomen; *et l. c.* No. 58 A. 210, 309 (1932), in clavi; *et l. c.* No. 54 C. Suppl., 708 (1933), latine.—Rhodesia; Transvaal; Orange Free State.
capillifolia *Henrard, l. c.* No. 58 A. 298 (1932), in clavi; *et l. c.* No. 54 C. Suppl., 710 (1933), latine.—S. Austral.
contractinodis *Stent & Rattray in Proc. Rhodes. Scientif. Assoc.* xxxii. (*Stent & Rattray, Grasses S. Rhodes.*) 47 (1933).—S. Rhodesia.
decipiens *Henrard in Meded. Herb. Leid.* No. 58, 28 (1929), in obs., nomen; *et l. c.* No. 58 A. 221 (1932), in clavi; *et l. c.* No. 54 C. Suppl., 711 (1933), latine.—Argent.
echinata *Henrard, l. c.* 30, in obs., nomen; *et l. c.* 285, in clavi; *et l. c.* 713, latine.—Austral. (Queensland; N. S. Wales).
ecuadoriensis *Henrard, l. c.* No. 58 A. 307 (1932), in clavi; *et l. c.* No. 54 C. Suppl., 715 (1933), latine.—Ecuador.; Peruv.; Boliv.
eriophora *Henrard, l. c.* 165, in clavi; *et l. c.* 716, latine.—Rhodesia.
filiformis *Henrard, l. c.* 203, in obs.; *et l. c.* 717, latine.—S. Rhodesia.
Foëxiana *Maire & Wilczek in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord,* 1934, xxv. 322.—Marocc.; Sahara.
Fournieriana *Hitchcock in N. Am. Fl.* xvii. 384 (1935): A. geminiflora *Fourn.*
fragilis *Hitchcock & Ekman, l. c.* 393.—Cuba.
fragillina *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 189 (1932), nomen provis., in obs.—Great Namaq.
glumaris *Henrard in Meded. Herb. Leid.* No. 58 A. 247 (1932), in clavi; *et l. c.* No. 54 C. Suppl., 718 (1933), latine.—Austral. (Queensland; N. S. Wales).
Hintoni *Hitchcock in N. Am. Fl.* xvii. 382 (1935).—Mexico.
hispidula *Henrard in Meded. Herb. Leid.* No. 58 A. 195 (1932), in clavi; *et l. c.* No. 54 C. Suppl., 720 (1933), latine.—Rhodesia.

ARISTIDA:—
Karelini (*Trin. & Rupr.*) *Roshev. in Komarov, Fl. URSS,* ii. 67, 740 (1934): A. pennata var. Karelini.
kenyensis *Henrard in Meded. Herb. Leid.* No. 54 C. Suppl., 722 (1933).—Kenya Col.
laevigata *Hitchcock & Ekman in N. Am. Fl.* xvii. 390 (1935).—Cuba.
Lauriolii *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord,* 1934, xxv. 321.—Sahara.
meraukensis *Henrard in Meded. Herb. Leid.* No. 54 C. Suppl., 725 (1933).—N. Guin.
muricata *Henrard, l. c.* No. 58 A. 286 (1932), in clavi; *et l. c.* No. 54 C. Suppl., 727 (1933), latine.—Austral. (N. S. Wales).
Pardyi *Stent & Rattray in Proc. Rhodes. Scientif. Assoc.* xxxii. (*Stent & Rattray, Grasses S. Rhodes.*) 47 (1933).—S. Rhodesia.
pedroënsis *Henrard in Meded. Herb. Leid.* No. 58 A. 232 (1932), in clavi; *et l. c.* No. 54 C. Suppl., 730 (1933), latine.—Argent.
personata *Henrard, l. c.* No. 58, 30 (1929), in obs., nomen; *et l. c.* No. 58 A. 290 (1932), in clavi; *et l. c.* No. 54 C. Suppl., 731 (1933), latine.—Austral. (Queensland).
psammophila *Henrard, l. c.* No. 58 A. 229 (1932), in clavi; *et l. c.* No. 54 C. Suppl., 734 (1933), latine.—Austral. (Queensland).
pseudohordacea *Stent & Rattray in Proc. Rhodes. Scientif. Assoc.* xxxii. (*Stent & Rattray, Grasses S. Rhodes.*) 45 (1933).—S. Rhodesia.
Schliebenii *Henrard in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 807 (1933).—Tanganyika Terr.
scova *Vasey ex Beal, Grasses N. Amer.* ii. 199 (1896), in syn.: A. barbata.
succedanea *Henrard in Meded. Herb. Leid.* No. 58, 28 (1929), in obs., nomen; *et l. c.* No. 58 A. 294 (1932), in clavi; *et l. c.* 54 C. Suppl., 740 (1933), latine.—Bras.
Takeoi *Ohwi in Bot. Mag., Tokyo,* 1931, xlv. 183.—Ins. Liukiu.
tenuifolia *Hitchcock in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xxi. 296 (1935).—Mexico (Arch. Revillagigedo).
tenuissima *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France,* 1932, lxxix. 844 (1933).—Madag.
transvaalensis *Henrard in Meded. Herb. Leid.* No. 58 A. 235 (1932), in clavi; *et l. c.* No. 54 C. Suppl., 742 (1933), latine.—Transvaal.
triticoides *Henrard*; *Henrard, l. c.* No. 54 C. Suppl., 744 (1933), latine.—Somaliland.
vaginata *Hitchcock in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xxi. 297 (1935).—Mexico (Arch. Revillagigedo).
vinosa *Henrard in Meded. Herb. Leid.* No. 54 C. Suppl., 745 (1933).—S. Rhodesia.
Wachteri *Henrard, l. c.* 746.—S. Rhodesia.

ARISTOLOCHIA L. (Aristolochiac.).
carinata *Merrill & Chun in Sunyatsenia,* ii. 219 (1935).—China (Hainan).
Chalmersii *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxx. 73 (1932).—Austral. (Queensland).
Chapmaniana *Standley in Contrib. Arn. Arb.* No. v. 60 (1933).—Panamá (Ins. Barro Colorado).
domingensis *Ekman & O. C. Schmidt in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xii. 393 (1935).—Santo Domingo.
Gabrielis *Duchartre ex Briq. in Candollea,* iv. 351 (1931).—Guiana Gall.
hirta *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. Anhang, 17 (1932).—Tanganyika Terr.
Hoehneana *O. C. Schmidt in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xii. 390 (1935).—Boliv.; Bras. occ.
kankauensis *Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa,* 1931, xxi. 251.—Formosa.
Killipiana *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxxviii. 111 (1935).—Peruv.
Klugii *O. C. Schmidt, l. c.* xxx. 66 (1932).—Colomb.
mishuyacensis *O. C. Schmidt, l. c.* xxxii. 96 (1933): A. Williamsii *O. C. Schmidt.*
montana *Ekman & O. C. Schmidt, l. c.* xxix. 11 (1931).—Santo Domingo.
parensis *Engl. ex Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. 185 (1932), nomen.—Tanganyika Terr.
Petelotii *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxxii. 95 (1933).—Indo-China (Tonkin).

ARISTOLOCHIA:—
pseudotriangularis *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxxviii. 110 (1935).—Boliv.
putumayensis *O. C. Schmidt, l. c.* 112.—Peruv.
samanensis *O. C. Schmidt in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 393 (1935).—Santo Domingo.
Schultzeana *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxxii. 96 (1933).—Colomb.
Steupii *Woronow in Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 37 (1930), rossice; *et in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 214 (1933), latine.—Caucas.
Trollii *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxx. 68 (1932).—Boliv.
truncata *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. Anhang, 17 (1932).—Tanganyika Terr.
Werdermanniana *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxx. 67 (1932).—Boliv.
Williamsii *O. C. Schmidt, l. c.* 70.—Peruv.

ARMATOCEREUS Backeb. Blätter Kakteenforsch. 1934, Pt. 3, [p. 4], nomen; et l. c. 1935, Pt. 1, [p. 7], in obs., sine descr. *CACTACEAE.*
Cartwrightianus *Backeb. l. c.*, nomen; *et l. c.*, in obs.—Peruv.
jungo *Backeb. l. c.* 1935, Pt. 1. [p. 7], in obs.—Peruv.
laetus *Backeb. l. c.*, in obs.—Peruv.
matucanensis *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 176, 411 (1935).—Peruv.

ARMENIACA Mill. (Rosac.).
anomala (*Koehne*) *Koval. & Kostina in Bull. Applied Bot., Leningrad*, Ser. VIII. No. 4, 28 (1935), in obs.: Prunus anomala.
Ansu (*Komarov*) *Kostina, l. c.* 75: Prunus Ansu.
holosericea (*Batal.*) *Kostina, l. c.*: Prunus Armeniaca var. holosericea.
mandschurica (*Koehne*) *Kostina, l. c.*: Prunus mandschurica.

ARMERIA Willd. (Plumbaginac.).
alpinifolia *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 473 [1928].—Marocc.
amplifoliata *Pau in Font Quer, l. c.* 1930, No. 513 [1932].—Marocc.
Apollinaris *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 143 [1933], nomen.—Marocc.
caput-alba *Rothmaler in Cavanillesia*, vii. 118 (1935), in syn.: Statice caput-alba.
castellana *Lev. Ler. ex Rothmaler in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.* 1934, xxxiv. 154, in syn.: Statice castellana.
Quichiotis *Gonz.-Albo in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.* 1934, xxxiv. 163, in syn.: Statice Quichiotis.

ARMOURIA Lewton in Journ. Wash. Acad. Sc. 1933, xxiii. 64. *MALVACEAE.*
beata *Lewton, l. c.*—Haiti.

ARNEBIA Forsk. (Boraginac.).
asperrima (*Delile*) *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 201 (1931): Anchusa asperrima.

ARNICA L. (Compos.).
Maguirei *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 581.—U.S.A. (Utah).
trina *A. Nelson, l. c.*—U.S.A. (Utah).
Whitneyi *Fernald in Rhodora*, 1935, xxxvii. 334.—U.S.A. (Michigan).

ARNICULA Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 135 (1898); Post & Kuntze, Lexic. 45 (1903): **Arnica** L. (Compos.).

ARRABIDAEA DC. (Bignoniac.).
cuminaënsis *A. Sampaio in Ann. Acad. Bras. Sc.* 1935, vii. 114.—Bras. (Pará).
cuprea (*Cham.*) *Bornm. in Rev. Sudamer. Bot.* 1935, ii. 10: Bignonia cuprea.
Kuhlmanni *A. Sampaio in Ann. Acad. Bras. Sc.* 1935, vii. 115.—Bras. (Amaz.).

ARRACACIA Bancroft (Umbellif.).
tapalpae *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 62 (1933–5).—Mexico.

ARRHENATHERUM Beauv. (Gramin.).
bromoides (*L.*) *G. Sampaio in An. Fac. Sc. Porto*, xvii. 45 (1931), in obs.: Avena bromoides.
Hackelii (*Henriq.*) *G. Sampaio, l. c.*, in obs.: Avena Hackelii.

ARRHENATHERUM:—
murcicum *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 105.—Hispan.
pratense (*L.*) *G. Sampaio in An. Fac. Sc. Porto*, xvii. 45 (1931), in obs.: Avena pratensis.
pubescens (*Huds.*) *G. Sampaio, l. c.*, in obs.: Avena pubescens.

ARTABOTRYS R. Br. (Annonac.).
cinnamomeus *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 84 (1931).—Borneo.
collinus *Hutchinson in Kew Bull.* 1931, 245.—N. Rhodesia.
djalonis *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 54 (1927), in syn.: A. velutinus.
Pierreanus *Engl.*; *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 85 (1931), descr. ampl.—Cameroons.
pilosus *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 224 (1935).—China (Hainan).
pleianthus *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 84 (1931).—Borneo.
rubicundus *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 54 (1927), in syn.: A. oliganthus.
rupestris *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 810 (1933).—Tanganyika Terr.
stenopetalus *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 226 (1935).—China (Hainan).

ARTEMISIA L. (Compos.).
araneosa *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 171.—Corea.
Biebersteinii *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 506 (1894), in syn.: A. frigida.
brachyloba *Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 218 (1932).—Sibir. (Marit. Prov.).
Chingii *Pampan. in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1932, n. s. xxxix. 24.—China (Kwangsi).
chitachensis (*Maire*) *Coss. in Bull. Soc. Dauph.* 1883, 413, No. 3996, nomen; *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1928, xix. 56, descr.: A. alba subsp. chitachensis.
chrysolepis *Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. II. (*Contrib. Cogn. Fl. Mansh.*: *Pl. Nov. Jehol.* II. ii.) 35 (1935).—Manchur. (Jehol).
Costae *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 92: A. Barrelieri *Costa in Introd. Fl. Catal.* 125 (1864), non *Bess.*
daghestanica *Kraschen. & Poretzky in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 709 (1932).—Caucas.
debilis *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 97.—Corea.
gigantea *Kitamura, l. c.* 1933, ii. 172: A. montana *Pampan.*
glabriflora *Borza in Bul. Grăd. & Muz. Bot. Univ. Cluj*, 1933, xiii. 35 (1934).—As. centr.
Godroni *Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* v. 89 [1921]: A. insipida *Godr. in Gren. & Godr. Fl. France*, ii. 129 (1850), non *Vill.*
Godroni *Rouy ex E. Perrier, Cat. Pl. Vasc. Savoie*, i. (*Mém. Acad. Sc. Savoie*, Sér. V. iv.) 397 (1917), in syn.: A. Villarsii.
Hugueti *Caballero in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 28, p. 27 (1935).—Marocc.
liukiuensis *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 171.—Ins. Liukiu.
Macivarae *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 152 (1931).—Sudan. Gall.
maikara (*Kraschen.*) *Pavlov in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 22, p. 24 (1935), in obs.: A. pauciflora subsp. maikara.
manshurica (*Komarov*) *Komarov in Komarov & Klob.-Alis. Key Pl. Far East. Reg. USSR*, ii. 1035 (1932): A. japonica var. manshurica.
Marcelli *Pampan. in Atti Ist. Veneto*, xcii. 232 (1933).—Tripolit.
Momiyamae *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 97.—Japon.
nevadensis *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 153 (1932).—Hispan.
nutantiflora *Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 219 (1932).—Sibir. or.
Pampaninii *Kitamura in Vasc. Pl. N. Kuril.* (1934); cf. *Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 219, japonice.—Ins. Kuril.

ARTEMISIA:—
quadriauriculata *Chen in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* v. 69 (1934).—China (Chihli).
Serreana *Pampan. in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1932, n. s. xxxix. 32.—China (Shansi).
shikotaënsis *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 128.—Ins. Kuril.
simplicifolia *Pampan. in Sped. Ital. De Filippi Himal. etc. 1913–14*, Ser. II. xi. (*Agg. Fl. Carac.*) 174 (1934).—Mont. Karakoram.
sparsa *Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. II. (*Contrib. Cogn. Fl. Mansh.*: *Pl. Nov. Jehol.* II. ii.) 37 (1935).—Manchur. (Jehol).
stipularis *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 84 (1931).—Santo Domingo.
subintegra *Kitamura in Yuhki, Fl. Yamagata-praefect.* (1934); cf. *Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 173.—Japon.
taraspensis *Gremli ex E. Perrier, Cat. Pl. Vasc. Savoie*, i. (*Mém. Acad. Sc. Savoie*, Sér. V. iv.) 401 (1917), in syn.: A. Burnati.

ARTHRAXON Beauv. (Gramin.).
depressus *Stapf ex C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1933, 349.—Ind. or.
kobuna *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 697.—Japon. (Kiushiu).
villosus *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1933, 350.—Ind. or. (Mysore).

ARTHROCEREUS A. Berger (Cactac.).
Campos-Portoi (*Werderm.*) *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 4, [p. 4]: Trichocereus Campos-Portoi.
rondonianus *Backeb. & Voll in Backeb. l. c.* [p. 3].—Bras. (Minas Geraes).

ARTHROCHLAENA Boiv. ex Benth. in Journ. Linn. Soc., Bot. xix. 107 (1881), in obs. *GRAMINEAE.*

ARTHROPHYLLUM Blume (Araliac.).
Havilandii *Ridley in Kew Bull.* 1933, 494.—Borneo.

ARTHROPHYTUM Schrenk (Chenopodiac.).
affine *Korovin & Mironov in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 29, 21 (1935).—Ross. asiat. (Kasakstan).
betpakdalense *Korovin & Mironov, l. c.* 19.—Ross. asiat. (Kasakstan).
iliense *Iljin in Journ. Bot. URSS*, xix. 171 (1934).—Songaria.
leptocladum *Popov in Trans. Sc. Soc. Turk.* i. 12 (1923), in obs.—Bokhara.
Litwinowi *Korovin in Trans. Sc. Soc. Turk.* i. 27 (1923), in obs.—Bokhara.
longibracteatum *Korovin in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 29, 15 (1935).—Turkestan.
wakhanicum (*Paulsen*) *Korovin ex Iljin in Journ. Bot. URSS*, xix. 171 (1934): Anabasis wakhanica.

ARTHROPODIUM R. Br. (Liliac.).
caesioides *H. Perrier in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 822 (1935).—Madag.

ARTHROSOLEN C. A. Mey. (Thymelaeac.).
deserticola (*Gilg*) *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 300 (1931): Gnidia deserticola.

ARTHROSTEMA Ruiz & Pav. (Melastomatac.).
Parietaria *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3 *Sieb. & Voss*, i. 316 (1894), in syn.: Centradenia inaequilateralis.

ARTOCARPUS J. R. & G. Forst. (Morac.; Urticac., Gen. Pl.).
Leeuwenii *Diels in Engl. Jahrb.* lxvii. 175 (1935).—N. Guin.
lingnanensis *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* vii. 302 (1931).—China (Kwangtung).
papuanus *Diels in Engl. Jahrb.* lxvii. 175 (1935).—N. Guin.
sepicanus *Diels, l. c.* 176.—N. Guin.

ARUM L. (Arac.).
Facchini *Porta ex Hruby in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1912, Sér. II. iv. 133, in obs.; *Engl. in Engl. Pflanzenreich, Arac.-Aroid. & Pistioid.* 74 (1920), in syn.: A. italicum.

ARUNCUS Zinn, Cat. Pl. Gott. 119 (1757), in syn.; Adans. Fam. ii. 295 (1763). *ROSACEAE.*
laciniatus *Hara in Journ. Jap. Bot.* 1933, xi. 514, in syn.: A. vulgaris var. laciniatus *Hara.*
parvulus *Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS,* 1931, xxx. 203 (1932).—Sibir.
subrotundatus *Tatewaki, Vég. Apoi,* 89, 129 (1928); *Hara in Bot. Mag., Tokyo,* 1935, xlix. 115.—Japon.

ARUNDINA Blume (Orchidac.).
Kanehirae *Yamamoto in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa,* 1933, xxiii. 20.—Ins. Carolin. (Ponape).
maculata *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxv. 467 (1933).—Celebes.
stenopetala *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France,* 1932, lxxix. 32.—Anam; Cambodia.

ARUNDINARIA Michx. (Gramin.).
actinotricha *Merrill & Chun in Sunyatsenia,* ii. 206 (1935).—China (Hainan).
agrestis (*Makino*) *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 567: Pleioblastus viridi-striatus var. agrestis.
aikawensis *Nakai, l. c.* 1935, xi. 369.—Japon.
akiensis *Nakai, l. c.* 1934, x. 742.—Japon.
amabilis *McClure in Lingnan Sc. Journ.* x. 6 (1931), anglice; *et l. c.* xiii. 503 (1934), latine.—China (Kwangsi; Kwangtung).
ambositrensis *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France,* 1931, lxxviii. 8.—Madag.
amoena *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 741.—Japon.
Arakii (*Makino*) *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 161: Sasa Arakii.
atamiana *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 573.—Japon. (Hondo).
atropurpurea *Nakai, l. c.* 574.—Japon. (Hondo).
bungoënsis *Nakai, l. c.* 742.—Japon.
chikatsuafumiana *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 161.—Japon. (Hondo).
dimorpha *Hackel ex Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 805.—Japon.
epitricha *Nakai, l. c.* 1934, x. 574.—Japon. (Hondo).
exsaniosa *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 81.—Japon.
glabra *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 743.—Japon.
hakonensis *Nakai, l. c.* 749, sphalm.: A. Hisauchii.
Hashimotoi (*Makino*) *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 20: Pleioblastus Hashimotoi.
hebechlamys *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 575.—Japon. (Hondo).
hidaënsis (*Makino*) *Nakai, l. c.* 569: Sasa hidaënsis.
Hisauchii (*Makino*) *Nakai, l. c.*: Pseudosasa Hisauchii.
hortensis *Nakai, l. c.* 575.—Japon. (Hondo).
Hosidaikitiana *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 20.—Japon.
Ikegamii *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 576.—Japon. (Hondo).
incantans *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 152.—Japon.
Inuii (*Makino ex Koidz.*) *Koidz. l. c.* 151: Sasaëlla Inuii.
iwatekensis (*Makino*) *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 569: Sasaëlla iwatekensis.
kanayamensis *Nakai, l. c.* 743.—Japon.
kiboënsis *Nakai, l. c.* 577.—Japon. (Kiushiu).
kinkiensis *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 21.—Japon.
Kishinoana *Koidz. l. c.*—Japon.
kitanoënsis *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 370.—Japon.
Koboi *Nakai, l. c.* 806.—Japon.
kogasensis *Nakai, l. c.* 1934, x. 745.—Japon.
Koidzumii (*Makino ex Koidz.*) *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 20: Sasaëlla Koidzumii.
Komiyamana (*Makino & Hisauchi*) *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 569: Sasa Komiyamana.
koyana *Nakai, l. c.* 1935, xi. 807.—Japon.
laotica *A. Camus in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1931, Sér. II. iii. 760.—Indo-China (Laos).
leucorhoda (*Koidz.*) *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 151: Pleioblastus leucorhodus.
longipes *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 746.—Japon.

ARUNDINARIA:—
magnifica *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 577.—Japon. (Kiushiu).
mikurensis *Nakai, l. c.* 1935, xi. 3.—Japon.
Minaguchii (*Makino ex Koidz.*) *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 20: Sasaëlla Minaguchii.
mollissima *Koidz. l. c.* 171, in syn.: Sasa mollissima.
Muramatsuana *Koidz. l. c.* 82.—Japon.
musashiensis *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 578.—Japon. (Hondo).
nikkoënsis *Nakai, l. c.*—Japon. (Hondo).
ogamiensis *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 82.—Japon.
Okadana (*Makino*) *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 570: Sasa Okadana.
Otayana *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 162.—Japon. (Hondo).
phalerata *Koidz. l. c.* 16.—Japon.
pubescens *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 746.—Japon.
retropila *Nakai, l. c.* 747.—Japon.
rhyncantha *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 91, 161.—Japon.
sadoënsis (*Makino ex Koidz.*) *Koidz. l. c.* 19: Pleioblastus sadoënsis.
santanensis *Koidz. l. c.* 162.—Japon. (Hondo).
Sasakiana (*Makino*) *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 572: Sasaëlla Sasakiana.
Sawadai (*Makino*) *Nakai, l. c.* 573: Pleioblastus Sawadai.
shiobarensis *Nakai, l. c.* 579.—Japon. (Hondo).
siroyamensis (*Makino ex Koidz.*) *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 19: Sasa siroyamensis.
Sugimotoi *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 747.—Japon.
Suwekoana (*Makino*) *Nakai, l. c.* 573: Sasa Suwekoana.
tajimana *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 163.—Japon. (Hondo).
tangoënsis (*Koidz.*) *Koidz. l. c.* 20: Sasa tangoënsis.
Tashirozentaroana *Koidz. l. c.* 163.—Japon. (Hondo).
Teijiroana *Koidz. l. c.* 21.—Japon.
tomikusensis *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 744.—Japon.
toyomurensis *Nakai, l. c.* 748.—Japon.
trichophila *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 83.—Japon.
velutina *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 580.—Japon. (Hondo).
Yonoskei *Nakai, l. c.* 1935, xi. 808.—Japon.
Yoshinoi *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 174.—Japon. (Hondo).

ARUNDINELLA Raddi (Gramin.).
bidentata *Keng in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 159.—China (Fokien).
Taquetii *Nakai & Honda in Bot. Mag., Tokyo,* 1935, xlix. 694.—Corea.

ARUNDO L. (Gramin.).
parviflora *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 40 (1934).—Formosa.

ASAGRAEA Lindl. (Liliac.).
frigida (*Schlecht. & Cham.*) *Lyons, Plant Names Scientific & Popular,* ed. 2, 508 (1907): Veratrum frigidum.
Sabadilla (*Retz.*) *Lyons, l. c.*: Veratrum Sabadilla.

ASARUM L. (Aristolochiac.).
amagiense *Makino in Journ. Jap. Bot.* viii. 29 (1932).—Japon. (Hondo).
asperum *Maekawa in Bot. Mag., Tokyo,* 1932, xlvi. 573.—Japon.
constrictum *Maekawa, l. c.* 576.—Hab.?
crassum *Maekawa, l. c.* 568.—Japon.
curvistigma *Maekawa, l. c.* 581.—Japon.
dilatatum *Maekawa in Journ. Jap. Bot.* 1933, ix. 508, in syn.: Heterotropa dilatata.
hexalobum *Maekawa in Bot. Mag., Tokyo,* 1932, xlvi. 566.—Japon.
Hisauchii *Maekawa, l. c.* 577.—Japon.
intermedium (*C. A. Mey.*) *Grossheim, Fl. Kavkaza,* ii. 36 (1930): A. europaeum var. intermedium.
kiusianum *Maekawa in Bot. Mag., Tokyo,* 1932, xlvi. 569.—Japon.

ASARUM:—
kooyanum *Makino in Journ. Jap. Bot.* vii. 20 (1931).—Japon. (Hondo).
kumageanum *Masamune in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* xi., Bot. No. 4, 168 (1934).—Ins. Liukiu (Yakusima).
Kurokawanum *Makino in Journ. Jap. Bot.* viii. 19 (1932).—Japon. (Hondo).
longepedunculatum *O. C. Schmidt in Sunyatsenia,* i. 121 (1933).—China (Kwangtung).
megacalyx *Maekawa in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 360, in syn.: Heterotropa megacalyx.
melanosiphon *Maekawa in Bot. Mag., Tokyo,* 1932, xlvi. 570.—Hab.?
minus *Maekawa, l. c.* 575.—Japon.
Nakaianum *Maekawa, l. c.* 576.—Japon.
nankaiense *Maekawa, l. c.* 572.—Japon.
nipponicum *Maekawa, l. c.* 570.—Japon.
oblongum (*Maekawa*) *Maekawa in Journ. Jap. Bot.* 1933, ix. 370, in syn.; *O. C. Schmidt in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi b. 231 (1935): Heterotropa oblonga.
Petelotii *O. C. Schmidt in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 100 (1931).—Indo-China (Tonkin).
pseudo-Savatieri *Maekawa in Bot. Mag., Tokyo,* 1932, xlvi. 582.—Japon.
rigescens *Maekawa, l. c.* 571.—Japon.
satsumense *Maekawa, l. c.* 580.—Japon.
stoloniferum *Maekawa, l. c.* 578.—Hab.?
Takaoi *Maekawa, l. c.*—Japon.
tamaënse *Makino in Journ. Jap. Bot.* vii. 19 (1931).—Japon.
tubulosum *Maekawa in Bot. Mag., Tokyo,* 1932, xlvi. 568.—Japon.
yakusimense *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa,* 1933, xxiii. 207; *et in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* xi., Bot. No. 4, 168 (1934).—Ins. Liukiu (Yakusima).

ASCARINA J. R. & G. Forst. (Chloranthac.).
raiateënsis *J. W. Moore in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu,* x. No. 19, 7 (1934).—Ins. Societ. (Raiatea).
subfalcata *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 102, 26 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).

ASCLEPIAS L. (Asclepiadac.).
apocynifolia *R. E. Woodson in Am. Journ. Bot.* 1935, xxii. 687.—Mexico.
Bartlettiana *R. E. Woodson, l. c.* 688.—Mexico.
Emoryi (*Greene*) *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 42: Podostemma Emoryi.
fimbriata *Weimarck in Bot. Notiser,* 1935, 378.—S. Rhodesia.
fluviatilis *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France,* 1914, lxi. Mém. 8, 271 (1917).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire; Dahomey).
Giffordi *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 150 (1931).—U.S.A. (Calif.).
laxiflora *Perret ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 149 (1835).—Hab.?
lilacina *Weimarck in Bot. Notiser,* 1935, 374.—S. Rhodesia.
minuta *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France,* 1914, lxi. Mém. 8, 272 (1917).—Afr. trop. (Dahomey).
rhodesica *Weimarck in Bot. Notiser,* 1935, 381.—S. Rhodesia.
solstitialis *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France,* 1914, lxi. Mém. 8, 270 (1917).—Afr. trop. (Côte d' Ivoire).
tanganyikensis *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1934, 303.—Tanganyika Terr.

ASCLEPIODELLA Small, Man. Southeast. Fl. 1073 (1933). *ASCLEPIADACEAE.*
Feayi (*Chapm.*) *Small, l. c.*: Asclepiodora Feayi.

ASCLERUM Van Tiegh. in Ann. Sc. Nat. Sér. VII. xvii. 245 (1893). *GONYSTYLACEAE.*
borneënse *Van Tiegh. l. c.* 247, in obs.—Borneo.

ASCOCARYDION G. Taylor in Journ. Bot. 1931, lxix. Suppl. 2, 162. *LABIATAE.*
mirabile (*Briq.*) *G. Taylor, l. c.*: Coleus mirabilis.

ASCOLEPIS Nees (Cyperac.).
bellidiflora (*Welw.*) *Cherm. in Arch. Bot., Caen,* iv. Mém. No. 7, 29 (1931): A. protea var. bellidiflora.

ASCOPHOLIS C. E. C. Fischer in Kew Bull. 1931, 104. *CYPERACEAE.*
Gamblei *C. E. C. Fischer, l. c.* 105.—Mont. Nilgiri.

ASCYRUM L. (Hypericac.).
Edisonianum *Small, Man. Southeast. Fl.* 868 (1933).—U.S.A. (Florida).

ASEMEIA Rafin. (Polygalac.).
cumulicola (*Small*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 766 (1933): Polygala cumulicola.
grandiflora (*Walt.*) *Small, l. c.*: Polygala grandiflora.
leiodes (*Blake*) *Small, l. c.*: Polygala grandiflora var. leiodes.
miamiensis (*Small*) *Small, l. c.* 767: Polygala miamiensis.

ASKETANTHERA R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard. 1932, xix. 46. *APOCYNACEAE.*
calycosa (*A. Rich.*) *R. E. Woodson, l. c.* 47: Echites calycosa.
dolichopetala (*Urb.*) *R. E. Woodson, l. c.*: Echites dolichopetala.
longiflora (*Ekman & Helwig*) *R. E. Woodson, l. c.*: Echites longiflora.
Picardae (*Urb.*) *R. E. Woodson, l. c.*: Echites Picardae.

ASPALATHUS L. (Legumin.).
phylicoides *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 293 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
wittebergensis *Compton & P. E. Barnes, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).

ASPARAGUS L. (Liliac.).
aculeatus *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1047 (1895), in syn.: A. Sprengeri.
angulofractus *Iljin in Komarov, Fl. URSS*, iv. 432, 746 (1935).—Ross. asiat. (Kasakstan).
bucharicus *Iljin, l. c.* 430, 746.—As. centr. (Mont. Pamir et Alai).
calcicola *H. Perrier in Lecomte, Not. Syst.* v. 32 (1935).—Madag.
confusus *Scott Elliot ex H. Perrier, l. c.* 25, in syn.: A. consanguineus.
Fiori *Sennen in Mem. Acad. Cienc. Barcelona*, Ser. III. xx. No. 14, 9 (1928), in obs.—Hispan.
flexuosus (*Ledeb.*) *Krylov in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1928, No. 9, 1: A. officinalis var. flexuosus.
Greveanus *H. Perrier in Lecomte, Not. Syst.* v. 22 (1935).—Madag.
intangibilis *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 269 (1931).—Great Namaq.
kasakstanicus *Iljin in Komarov, Fl. URSS*, iv. 434, 747 (1935).—Ross. austr.; Kasakstan.
klinghardtianus *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 270 (1931).—Great Namaq.
kuisibensis *Dinter, l. c.*—Great Namaq.
madecassus *H. Perrier in Lecomte, Not. Syst.* v. 24 (1935).—Madag.
mahafalensis *H. Perrier, l. c.* 29—Madag.
maximus *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1047 (1895), in syn.: A. Sprengeri.
Misczenkoi *Iljin in Komarov, Fl. URSS*, iv. 431, 746 (1935).—Sibir. (Transbaikal.).
Poissoni *H. Perrier in Lecomte, Not. Syst.* v. 21 (1935).—Madag.
Popovii *Iljin in Komarov, Fl. URSS*, iv. 430, 745 (1935).—Transcasp.
rusciformis *Brongn. ex H. Perrier in Lecomte, Not. Syst.* v. 30 (1935), in syn.: A. simulans.
Schumanianus *Schlechter ex H. Perrier, l. c.* 23.—Madag.
Sennii *Chiov. Fl. Somala*, II. 418 (1932).—Somal. Ital.
setiformis *Krylov in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1928, No. 9, 2.—Sibir.
soongoricus *Iljin in Komarov, Fl. URSS*, iv. 432, 747 (1935).—Ross. asiat. (Kasakstan).
tenuissimus *Hort. ex Kudo in Rep. Dep. For. Gov. Res. Inst. Taihoku*, No. 17 (*List Cult. Pl. Dep. For.*) 28 (1934), in syn.: A. plumosus var. tenuissimus *Hort.*
ternatus *Brongn. ex H. Perrier in Lecomte, Not. Syst.* v. 30 (1935), in syn.: A. simulans.

ASPARAGUS:—
tuberculatus *Bunge ex Iljin in Komarov, Fl. URSS*, iv. 433, 747 (1935).—Transbaikal.; Mongol.; Manchur.
turkestanicus *Popov in B. Fedtsch. et alii, Fl. Turkm.* i. 312 (1932).—Transcasp.

ASPERELLA Humb. (Gramin.).
californica (*Boland. ex Thurb.*) *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 657 (1896): Gymnostichum californicum.
coreana (*Honda*) *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 693 (1934): Elymus coreanus.

ASPERULA L. (Rubiac.).
abchasica *Krecz. in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 27 (1934).—Caucas.
Aragonesi *Maire & Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 53 [1933], nomen.—Marocc.
Biebersteinii *Krecz. in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 26 (1934).—Caucas.
Bornmuelleri *Velen. Fl. Bulgar.* Suppl. 1, 143 (1898), in obs., nomen; *Bornm. in Magyar Bot. Lap.* 1931, xxx. 65, descr.—As. Min.
cristata (*Somm. & Lev.*) *Krecz. in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 26 (1934): A. Cynanchica var. cristata.
daphneola *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxvi. 139 (1934).—As. Min. (Lydia).
erecta *Hort. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 154 (1834), in obs.—Eur.
Lipskyana *Krecz. in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 26 (1934).—Caucas.
refracta *Czecz. in Acta Soc. Bot. Polon.* 1932, ix. 39.—As. Min. (Paphlagonia).
rhiphatlantica *Pau & Font Quer in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 53 [1933], nomen.—Marocc.
Steveni *Krecz. in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 25 (1934): A. Cynanchica var. elongata *Stev.*
Trabuti *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 98.—Hispan.
vestita *Krecz. in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 25 (1934).—Caucas.
Woronowii *Krecz. l. c.*—Caucas.

ASPHODELINE Reichb. (Liliac.).
Wiedemanniana *Czecz. in Acta Soc. Bot. Polon.* 1932, ix. 44.—As. Min. (Paphlagonia).

ASPHODELUS L. (Liliac.).
biflorus *Aarons. ex Oppenh. in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1930, Sér. II. xxii. 275 (1931), in syn.: A. viscidulus var. biflorus.
cedretorum *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 119 [1933], nomen.—Marocc.
dunensis *Sennen in Mem. Acad. Cienc. Barcelona*, Ser. III. xx. No. 14, 9 (1928), in obs.—Hispan.
Jacobi *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 119 [1933].—Marocc.
Mariae *Sennen & Mauricio, l. c.*, in obs., nomen.—Marocc.

ASPIDISTRA Ker-Gawl. (Liliac.).
glandulosa *Pierre ex Gagnep. in Bull. Mus Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 190, in syn.: Antherolophus glandulosus.

ASPIDOSPERMA Mart. & Zucc. (Apocynac.).
auriculatum *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 299 (1935).—Bras. (Pará).
centrale *Markgraf, l. c.* 560.—Bras. (Amaz.).
cruentum *R. E. Woodson in Am. Journ. Bot.* 1935, xxii. 684.—Guatem.
Curranii *Standley in Tropical Woods*, 1933, No. 36, 14.—Colomb.
Dugandii *Standley, l. c.* 15.—Colomb.
eteanum *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 297 (1935).—Bras. (Pará).
igapoanum *Markgraf, l. c.* 298.—Bras. (Amaz.).
Kuhlmannii *Markgraf, l. c.* 555.—Bras. (Matto Grosso).
leucocymosum *Kuhlm. in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 88 (1935).—Bras. (Amaz.).
leucostachys *Kuhlm. ex Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 558 (1935).—Bras. (Amaz.).
Lundellianum *R. E. Woodson in Am. Journ. Bot.* 1935, xxii. 684, in adnot.—Mexico.
rauwolfioides *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 300 (1935).—Peruv.; Boliv.
salgadense *Markgraf, l. c.* 554.—Bras. (Pará).

ASPIDOSPERMA:—
Sandwithianum *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 561 (1935).—Guiana Brit.
sanguinale *H. H. Bartlett in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 22 (1935), nomen.—Am. centr.
sanguineum *H. H. Bartlett, l. c.* 16, nomen.—Am. centr.
Woodsonianum *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 559 (1935).—Surinam; Guiana Brit.

ASPILIA Thou. (Compos.).
cuyabensis *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 8, 44 (1932).—Bras. (Matto Grosso).
grosseserrata *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 84 (1933–5).—Mexico.
paranensis *Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 88 (1933).—Bras. (Paraná).
Ritellii *Chiov. Fl. Somala*, II. 266 (1932).—Somal. Ital.

ASTA Klotzsch ex O. E. Schulz in Engl. Jahrb. lxvi. 91 (1933). *CRUCIFERAE.*
Pringlei *O. E. Schulz, l. c.*, in obs.—Mexico.
Schaffneri (*S. Wats.*) *O. E. Schulz, l. c.*, in obs.: Capsella Schaffneri.

ASTELIA Banks & Soland. ex R. Br. (Liliac.).
argyrocoma *A. A. Heller*; *Skottsb. in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 117, 31 (1934), descr.—Ins. Sandvic.
Degeneri *Skottsb. l. c.* 33.—Ins. Sandvic.
Forbesii *Skottsb. l. c.* 18.—Ins. Sandvic.
furfuracea *Banks & Soland. ex Skottsb. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 2, 77 (1934), in syn.: Collospermum hastatum.
macrocarpa *Colenso ex Skottsb. l. c.* 32, in syn.: A. linearis var. novae-zelandiae *Skottsb.*
monosperma *F. Muell. ex Skottsb. l. c.* 28, in syn.: A. alpina var. novae-hollandiae *Skottsb.*
montana (*T. Kirk*) *Cockayne, Rep. Bot. Surv. Tongariro Nat. Park*, 36 (1908): A. nervosa var. montana.
papuana *Skottsb. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 2, 29 (1934).—N. Guin.
raiateënsis *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 22 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
saxosa *Colenso ex Skottsb. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 2, 82 (1934), in syn.: Collospermum microspermum.
Tovii *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 84, 146 (1931).—Ins. Marquesas.

ASTEPHANUS R. Br. (Asclepiadac.).
cordatus (*Thunb.*) *R. Br. ex Roem. & Schult. Syst. Veg.* vi. 123 (1820): Apocynum cordatum.

ASTER L. (Compos.).
abchasicus *Kemul.-Nat. in Trav. Inst. Bot. Tiflis*, i. 104 (1934).—Caucas.
americanus *Onno in Biblioth. Bot.* cvi. 47 (1932), in syn.: A. alpinus subsp. Vierhapperi *Onno.*
andohahelensis *Humbert in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 1016.—Madag.
andringitrensis *Humbert, l. c.* 1018: Rochonia aspera.
angustifolius *Chang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 43 (1935).—China (Chekiang).
argillicola *Peck in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1934, xlvii. 188.—U.S.A. (Oregon).
Baroni *Humbert in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 1018: Rochonia senecioides.
Batesii *Rydb. in Brittonia*, i. 102 (1931).—U.S.A. (Nebraska).
Bodkinii *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 311 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Bojeri *Humbert in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 1018: Rochonia cuneata.
brachypholis *Small, Man. Southeast. Fl.* 1389 (1933).—U.S.A. (Florida).
brachyphyllus *Chang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 44 (1935).—China (Szechuan).
brevipedunculatus *Hutchinson in Kew Bull.* 1931, 250.—Transvaal.
buchubergensis *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 87 (1932).—Great Namaq.
calvatus (*Baker*) *Herter, Fl. Urug. Pl. Vasc.* (*Estud. Bot. Reg. Urug.* iv.) 121 (1931): Leucopsis calvata.
ciliosus *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 98.—Corea.

ASTER:
cinerarioides (*DC.*) *Humbert in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 1018: Rochonia cinerarioides.
colchicus *Alboff ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 94 (1934).—Caucas.
corymbosus (*Harv.*) *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 84 (1932), in obs.: Mairia corymbosa.
dubius (*Thunb.*) *Hultén in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. viii. No. 2, 157 (1930), in obs.: Inula dubia.
erigeronoides *Colla, Herb. Pedem.* iii. 390 (1834).—Hab.?
Eylesii (*S. Moore*) *Milne-Redhead in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. sub t. 3243, p. 2, in adnot. (1934): Felicia Eylesii.
Finkii *Rydb. in Brittonia*, i. 102 (1931).—U.S.A. (Iowa).
flexicaulis *Rafin. ex Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1932, n. s. xxxix. 420, in obs.: A. subulatus.
fontinalis *Alexander in Small, Man. Southeast. Fl.* 1382 (1933).—U.S.A. (Florida).
×Frikarti *Silva Tarouca & C. K. Schneider, Unsere Freil.-Staud.* ed. 4, 122 (1927).—Hort.
gaspensis *Marie-Vict. in Contrib. Lab. Bot. Univ. Montréal*, No. 20, 3 (1932).—Canada (Quebec).
Gattingeri *Alexander in Small, Man. Southeast. Fl.* 1391 (1933).—U.S.A. (S. E. States).
georgianus *Alexander, l. c.* 1381.—U.S.A. (Georgia; S. Carolina).
Gooddingii *Onno in Biblioth. Bot.* cvi. 18 (1932).—U.S.A. (Nevada).
gracilipes (*Wieg.*) *Alexander in Small, Man. Southeast. Fl.* 1389 (1933): A. dumosus var. gracilipes.
grossedentatus *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 86 (1932).—Great Namaq.
×Handelii *Onno in Biblioth. Bot.* cvi. 52 (1932).—China (Yunnan).
×Hashimotoi *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 130.—Japon. (Hondo).
hemisphaericus *Alexander in Small, Man. Southeast. Fl.* 1391 (1933).—U.S.A. (S. E. States).
heterotrichus *Hara in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 827, in syn.: Erigeron heterotrichus.
interior *Wieg. in Rhodora*, 1933, xxxv. 35.—U.S.A. (E. States).
itsunboshi *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 130.—Formosa.
laeviformis *Rydb. in Brittonia*, i. 103 (1931).—U.S.A. (Minnesota).
litoralis *Komarov in Komarov & Klob.-Alis. Key Pl. Far East. Reg. USSR*, ii. 1012 (1932).—Ross. asiat. or.
lucens *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 173.—Ins. Liukiu.
lucidulus (*A. Gray*) *Rydb. in Brittonia*, i. 103 (1931): A. puniceus var. lucidulus.
Luengoi *Sennen*; *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 99, descr.—Hispan.
luteus (*N. E. Brown*) *Hutchinson in Kew Bull.* 1935, 569: Felicia lutea.
madagascariensis (*Humbert*) *Humbert in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 1018: Diplostephium madagascariense.
mandrarensis *Humbert, l. c.* 1017.—Madag.
mangtaoënsis *Kitagawa in Journ. Jap. Bot.* ix. 109, 119 (1933).—Manchur.
mayasanensis *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 129, in syn.: A. ageratoides var. angustifolius *Kitamura*.
mekongensis *Onno in Biblioth. Bot.* cvi. 54 (1932).—S. E. Tibet; Yunnan.
Meyendorffii (*Regel & Maack*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 469 (1894): Galatella Meyendorffii.
Miyabeanus *Tatewaki & Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 90.—Japon. (Hokkaido).
moschatus *Hort. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 381 (1834), in syn.: A. argophyllus.
Muirii (*A. Gray*) *Onno in Biblioth. Bot.* cvi. 19 (1932): Erigeron Muirii.
Mutisianus *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 27, Cuadro 22 (1934), nomen; *et l. c.*, No. 29, p. 21 (1935), descr.—Colomb.

ASTER:—
nigrocinctus *Ling in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, ii. 461 (1934).—China (Shansi; Chihli).
nitidus *Chang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 47 (1935).—China (Szechuan).
oreaster *Farrer ex Onno in Biblioth. Bot.* cvi. 61 (1932), in syn.: A. brachytrichus var. oreaster *Onno*.
oticus *Rydb. in Brittonia*, i. 103 (1931).—U.S.A. (Minnesota).
outeniquae *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 84 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
ovalifolius *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 289.—Japon.
pantotrichus *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 327: A. missouriensis *Britton*.
pedionomus *Alexander in Small, Man. Southeast. Fl.* 1391 (1933).—U.S.A. (S. E. States).
pekinensis (*Hance*) *Chen in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* v. 41 (1934): Asteromoea pekinensis.
Perezii *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 29, 20 (1935).—Colomb.
pinifolius *Alexander in Small, Man. Southeast. Fl.* 1387 (1933).—U.S.A. (Florida).
pleiocephalus (*Harv.*) *Hutchinson in Kew Bull.* 1935, 570: Diplopappus asper var. pleiocephalus.
pseudo-AsaGrayi *Makino in Journ. Jap. Bot.* viii. 14 (1932).—Japon.
psychensis *Kemul.-Nat. in Trav. Inst. Bot. Tiflis*, i. 102 (1934).—Caucas.
Reevesii (*A. Gray*) *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 89 (1924): A. ericoides var. Reevesii.
Roylei *Onno in Biblioth. Bot.* cvi. 67 (1932).—Himal.
sachalinensis *Kudo, Kitakarafuto-Shok.-Chosa*, 226 (1924); *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 131, in syn.: A. sibiricus.
salwinensis *Onno in Biblioth. Bot.* cvi. 74 (1932).—S. E. Tibet; Yunnan.
saxomarinus *Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 217 (1932), nomen alternativ.—Sibir.
Schlechteri *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 311 (1931): Diplopappus elongatus.
Sekimotoi *Makino in Journ. Jap. Bot.* vii. 10 (1931).—Japon. (Hondo).
Sellowii *Hieron. ex Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 6, 43 (1932), in syn.: Leucopsis acuminata.
Smallii *Alexander in Small, Man. Southeast. Fl.* 1385 (1933).—U.S.A. (N. Carolina).
Sugimotoi *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 131.—Japon. (Hondo).
taiwanensis *Kitamura, l. c.* 1932, i. 145.—Formosa.
takasago-montanus *Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1931, xxi. 151.—Formosa.
Tweediei (*Hook. & Arn.*) *Herter, Fl. Urug. Pl. Vasc.* (*Estud. Bot. Reg. Urug.* iv.) 121 (1931): Erigeron Tweediei.
venustus *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 85 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
verutifolius *Alexander in Small, Man. Southeast. Fl.* 1392 (1933).—U.S.A. (Mississippi).
Walteri *Alexander, l. c.* 1382: A. squarrosus *Walt.*
Westae *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 85 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Woldeni *Rydb. in Brittonia*, i. 103 (1931).—U.S.A. (Iowa).
Yamatsutanus *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 110.—Manchur.

ASTERISCIUM Cham. & Schlecht. (Umbellif.).
Vidali *R. Phil. in Verh. Deutsch. Wiss. Ver. Santiago* (*Chile*), ii. 107 (1890), nomen; *et in An. Univ. Chile*, lxxxv. 711 (1894), descr.—Chile.

ASTERISCUS Mill. (Compos.).
×Caballeroi *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 99, in obs., nomen alternativ.—Hispan.
Cavanillesi *Caballero in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 28, 20 (1935).—Marocc.
madritensis *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 99, pro syn.: Pallenis madritensis.
Paui *Caballero in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 28, 21 (1935).—Marocc.
pinifolius *Maire & Wilczek in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1935, xxvi. 128.—Marocc.

ASTEROCEPHALUS Zinn, Cat. Pl. Gott. 381 (1757); cf. Sprague in Kew Bull. 1934, 218: **Scabiosa** L., partim (Dipsacac.).
pyrenaicus (*All.*) *Colla, Herb. Pedem.* iii. 207 (1834): Scabiosa pyrenaica.

ASTEROCHLAENA Garcke (Malvac.).
argentina (*Gürke*) *Stuckert in An. Soc. Cient. Argent.* 1932, cxiv. 111: Pavonia argentina.

ASTEROHYPTIS Epling in Bull. Torr. Bot. Cl. 1933, lx. 17 (1932). *LABIATAE.*
Mociniana (*Benth.*) *Epling, l. c.* 19: Hyptis Mociniana.
Seemanni (*A. Gray*) *Epling, l. c.* 20: Hyptis Seemanni.
stellulata (*Benth.*) *Epling, l. c.* 17: Hyptis stellulata.

ASTEROLASIA F. Muell. (Rutac.).
Dielsii *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 70 (1931), nomen; *C. A. Gardner in Journ. Roy. Soc. W. Austral.* 1932–3, xix. 84 (1934), descr.—W. Austral.

ASTEROMOEA Blume (Compos.).
koraiensis (*Nakai*) *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 37: Aster koraiensis.
mongolica (*Franch.*) *Kitamura, Compos. Nov. Jap.* 21 (1931): Aster mongolicus.
Shimadai *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 37.—Formosa.

ASTHENATHERUM Nevski in Acta Univ. As. Med. Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 8 (1934). *GRAMINEAE.*
Forskålei (*Vahl*) *Nevski, l. c.*: Avena Forskålei.
glaucum (*Nees*) *Nevski, l. c.* 9, in obs.: Danthonia glauca.

ASTILBE Buch.-Ham. (Saxifragac.).
austrosinensis *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 414 (1931).—China (Hunan; Kiangsi; Kwangsi; Kwangtung).
×crispa (*Arends*) *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 92 (1924): 'A. hybrida crispa.'
heteropetala *Mattf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 301 (1931).—China (Szechuan).
indica (*Blume*) *Backer, Schoolfl. Java*, 467 (1911): Cunonia indica.
koreana *Nakai, Veg. Diamond Mts.* 174 (1918); cf. *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 426 (1931), japonice.—Japon.
nipponica *Nakai, Kamik.-Tennenk.-Chosahok.* 39 (1928); cf. *Makino & Nemoto, l. c.*, japonice.—Japon.
sikokumontana *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 137.—Japon. (Shikoku).

ASTRAGALUS L. (Legumin.).
acmophylloides *Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 309 (1930).—Caucas.
Ahmed-Adlii *Bornm. & Gauba in Fedde, Repert.* xxxix. 107 (1935).—Persia.
aksaicus *Schischk. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1932, Nos. 7–8, p. 3.—Altai.
ammodendroides *Bornm. in Fedde, Repert.* xxxix. 109 (1935).—Persia.
antiatlanticus *Emberger & Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1932, xxiii. 182.—Marocc.
×Arnaudi (*Petitm.*) *E. Perrier, Cat. Pl. Vasc. Savoie*, i. (*Mém. Acad. Sc. Savoie*, Sér. V. iv.) 174 (1917): Oxytropis Arnaudi.
atrovinosus *Popov ex Baranov in Journ. Turkest. Branch Russ. Geogr. Soc.* 1924, xvii. 13, 33 (1925), nomen; *Popov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n. s. xliv. 34, descr.—Turkestan. (Syr Darja).
aulieatensis *Popov in Bull. Univ. As. Centr.* xiv. 141 (1926).—Turkestan. (Thian Shan).
aurantiacus *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 557 (1933).—China (Szechuan).
austro-sibiricus *Schischk. in Krylov, Fl. Sibir. Occ.* vii. 1678 (1933): A. semibilocularis *Fisch. ex Bunge*.
babatagi *Popov in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 3, 41 (1928).—Bokhara.
bachmarensis *Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 314 (1930).—Caucas.
badamensis *Popov in Bull. Univ. As. Centr.* xiv. 143 (1926).—Turkestan. (Thian Shan).

ASTRAGALUS:—

baisensis *Sumnev. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1933, Nos. 1–2, p. 8.—Turkestan.
balchaschensis *Sumnev. l. c.* 4.—Turkestan.
Baranovii *Popov ex Blagovest. in Bull. Univ. As. Centr.* vii. 12 (1924), nomen; *Popov in Journ. Turkest. Branch Russ. Geogr. Soc.* 1924, xvii. 30 (1925), descr.—Turkestan. (Thian Shan).
Bayattii *Bornm. & Gauba in Fedde, Repert.* xxxix. 102 (1935).—Persia.
Blakei *Egglest. in Brainerd, L. R. Jones & Egglest. Fl. Verm. (Contrib. Bot. Verm.* VIII.) 100 (1900), nomen.—U.S.A. (Vermont).
Blyae (*Rose*) *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 40: Xylophacos Blyae.
bossuensis *Popov in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 3, 20 (1928).—Turkestan. (Thian Shan).
brachyrhachis *Popov in Trav. Turkest. Univ., Tashkent*, No. 4 (*Vég. Monts Sary-Taou, &c.*) 52, 61 (1922).—Turkestan.
Brunetianus (*Fernald*) *Rousseau in Contrib. Lab. Bot. Univ. Montréal*, No. 24, 30 (1933): A. alpinus var. Brunetianus.
burtschumensis *Saposhn. ex Sumnev. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1933, Nos. 1–2, p. 7.—Mongol.
Butleri *Post & Beauverd in Dinsm. Pl. Post. & Dinsm.* Fasc. I. 5 (1932); *Dinsm. in Fedde, Repert.* xxxiii. 104 (1933).—Syria.
chionanthus *Popov in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 3, 21 (1928).—Turkestan. (Thian Shan).
chloridae (*Rydb.*) *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 40: Xylophacos chloridae.
compositus *Pavlov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n. s. xliv. 33.—Turkestan. (Syr Darja).
Cuatrecasasii *Font Quer & Rothmaler in Cavanillesia*, vii. 74 (1935).—Hispan.
curtilobus *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 40: A. Shortianus var. brachylobus *A. Gray*, non A. brachylobus *DC.*
daghestanicus *Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 301 (1930).—Caucas.
Dainellii *Pampan. in Sped. Ital. De Filippi Himal. &c. 1913–14*, Ser. II. xi. (*Agg. Fl. Carac.*) 167 (1934).—Mont. Karakoram.
Dicksonii *Royle, Man. Mat. Med.* 378 (1847): A. stobiliferus *Lindl.*
Dielsii *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 24 (1931).—Peruv.
dolichocarpus *Popov in Trav. Turkest. Univ., Tashkent*, No. 4 (*Vég. Monts Sary-Taou, &c.*) 52, 62 (1922).—Turkestan.
Drobovii *Popov & Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xiv. 134 (1926), in adnot.—As. centr.
dshangartensis *Sumnev. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1933, Nos. 1–2, p. 5.—Turkestan. (Thian Shan).
duanensis *Saposhn. apud Sumnev. l. c.* 6.—Turkestan. (Thian Shan).
dumetorum *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 555 (1933).—China (Szechuan).
duplostrigosus *Post & Beauverd in Dinsm. Pl. Post. & Dinsm.* Fasc. I. 5 (1932); *Dinsm. in Fedde, Repert.* xxxiii. 104 (1933).—Syria.
elgonensis *Bullock in Kew Bull.* 1932, 495.—Afr. trop. or. (Elgon).
Embergeri *Jahandiez, Maire & Weiller in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1932, xxiii. 181.—Marocc.
Ernestii *Comber in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 230 (1934): A. Wilsonii *Simpson.*
falcigerus *Popov in Bull. Univ. As. Centr.* xiv. 143 (1926).—Turkestan. (Thian Shan).
Faurei *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1932, xxiii. 179.—Marocc.
Fernaldi (*Rydb.*) *H. F. Lewis in Canadian Field-Nat.* 1932, xlvi. 36: Atelophragma Fernaldi.
Fernandezianus *Blatter in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxvi. 482 (1933).—Ind. or. (Waziristan).
Font-Queri *Maire & Sennen in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1932, xxiii. 179.—Marocc.
gaspensis *Rousseau in Contrib. Lab. Bot. Univ. Montréal*, No. 24, 51 (1933).—Canada (Quebec).

ASTRAGALUS:—

germanicopolitanus *Bornm. in Magyar Bot. Lap.* 1931, xxx. 64.—As. Min. (Paphlagonia).
gjunaicus *Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 338 (1930).—Caucas.
Gooddingii (*Rydb.*) *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 40: Hamosa Gooddingii.
heptapotamicus *Sumnev. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1933, Nos. 5–6, p. 7.—Turkestan. (Thian Shan); Songaria.
hispidissimus *Grossheim ex Popov in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 3, Addend. & Corrig., p. 112 (1928), in syn.: A. Bungei.
hololeios *Bornm. in Engl. Jahrb.* lxvi. 226 (1934).—Afghan.
ilgazensis *Czecz. in Acta Soc. Bot. Polon.* 1932, ix. 35.—As. Min. (Paphlagonia).
imputatus *Macbride in Candollea*, v. 370 (1934).—Peruv.
jaxarticus *Pavlov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n. s. xliv. 35.—Turkestan. (Syr Darja).
jemensis *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 574.—U.S.A. (N. Mexico).
kalguttensis *Sumnev. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1933, Nos. 5–6, p. 4.—Ross. asiat. (Semipalatinsk).
karataviensis *Pavlov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n. s. xliv. 37.—Turkestan. (Syr Darja).
Kaufmanni *Krylov in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1932, No. 3, p. 2.—Altai.
kazymbeticus *Saposhn. ex Sumnev. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1933, Nos. 5–6, p. 5.—Songaria.
Kelleri *Popov in Trans. Sc. Soc. Turk.* i. 36 (1923).—Bokhara.
Kozlovskyi *Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 326 (1930).—Caucas.
Krajinae *Domin in Acta Bot. Bohem.* x. 48 (1931).—Czechoslovak.
kubensis *Grossheim in Trud. Azerb. Otdyel. Zakavk. Fil. Akad. Nauk SSSR*, Sect. Bot., i. 53 (1933).—Transcaucas.
Kusnezovii *Popov in Trans. Sc. Soc. Turk.* i. 21 (1923), in obs.—Bokhara.
lasius *Blatter in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxvi. 480 (1933).—Ind. or. (Waziristan).
leiosemius (*Lipsky*) *Popov in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 3, 50 (1928): A. lasiosemius var. leiosemius.
leptopus *Popov in Bull. Univ. As. Centr.* xiv. 142 (1926).—Turkestan. (Thian Shan).
leucocalyx *Popov, l. c.* 140.—Turkestan. (Thian Shan).
Licentianus *Hand.-Mazz. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1933, lxxxii. 247.—Tibet; Kansu.
Lipschitzii *Pavlov in Sovietsk. Bot.* 1934, No. 1, 24, in obs., nomen; *et in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n. s. xliv. 38, descr.—Turkestan. (Syr Darja).
Lipskyanus *Popov in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 3, 24 (1928); *et l. c.*, Addend. & Corrig., p. 113: A. neo-Lipskyanus.
littoralis (*Hook.*) *Rousseau in Contrib. Lab. Bot. Univ. Montréal*, No. 24, 48 (1933): Phaca frigida var. littoralis.
mahoschanicus *Hand.-Mazz. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1933, lxxxii. 247.—China (Kansu).
Majevskianus *Krylov in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1932, No. 3, p. 1.—Altai.
managildensis *B. Fedtsch.*; *Popov in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 3, 51 (1928), descr. emend.—Turkestan. (Thian Shan).
Mangeri *Bornm. in Engl. Jahrb.* lxvi. 225 (1934).—Afghan.
mardabadensis *Bornm. & Gauba in Fedde, Repert.* xxxix. 99 (1935).—Persia.
maurus (*Humbert & Maire*) *Pau in Font Quer, Iter Marocc.* 1929, No. 271 [1930]: A. exscapus subsp. maurus.
Mexiae *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 44 (1933–5).—Mexico.
mogoltavicus *Popov in Bull. Univ. As. Centr.* xiv. 139 (1926).—Turkestan. (Thian Shan).
muliensis *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 554 (1933).—China (Szechuan).
multijugus (*Trautv.*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 325 (1930): A. Stevenianus var. multijugus.

ASTRAGALUS:—

Nabelekii *Czecz. in Acta Soc. Bot. Polon.* 1932, ix. 36.—As. Min. (Paphlagonia).
namanganicus *Popov in Bull. Univ. As. Centr.* xiv. 140 (1926).—Turkestan. (Thian Shan).
nankotaizanensis *Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1931, xxi. 152.—Formosa.
neo-Lipskyanus *Popov in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 3, 24 (1928); *et l. c.*, Addend. & Corrig., p. 113.—Turkestan. (Thian Shan).
nokoënsis *Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1931, xxi. 151.—Formosa.
novus *Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 321 (1930).—Caucas.
nutzotinensis *Rousseau in Contrib. Lab. Bot. Univ. Montréal*, No. 24, 14 (1933), in adnot. cum descr. ampl.: Gynophoraria falcata.
oligophylloides *Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 320 (1930).—Caucas.
oltensis *Grossheim, l. c.* 306.—Caucas.
oxyglottoides *Bornm. & Gauba in Fedde, Repert.* xxxix. 98 (1935).—Persia.
pachyrrhizus *Popov in Bull. Univ. As. Centr.* vii. 139 (1926).—Turkestan. (Thian Shan).
palaestinus *Eig in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 124.—Palaest.
papasianus *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxvi. 93 (1934).—As. Min. (Lydia).
Parvopassuae (*Parl.*) *Burnat, Fl. Alp. Marit.* ii. 162 (1896): Oxytropis Parvopassuae.
Peirsonii *Munz & McBurney in Bull. S. Calif. Acad. Sc.* 1932, xxxi. 67.—U.S.A. (Calif.).
Pilgeri *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 25 (1931).—Peruv.
pityusarum *Bornm. in Magyar Bot. Lap.* 1931, xxx. 62.—As. Min.
Politovii *Krylov in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1932, No. 3, p. 3.—Altai.
Popovi *Pavlov ex Lipschitz in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 733 (1932), in obs.; *Pavlov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n. s. xliv. 36, descr.—Turkestan. (Syr Darja).
propinquus *Schischk. in Krylov, Fl. Sibir. Occ.* vii. 1657 (1933): Phaca abbreviata *Ledeb.*, non Astragalus abbreviatus *Kar. & Kir.*
pseudocancellatus *Grossheim in Bull. Polytechn. Inst. Tiflis*, ii. 215 (1926), in obs., rossice; *et in Beih. Bot. Centralbl.* xliv. II. 221 (1927), descr.—Transcaucas.
pseudohumilis *Grossheim in Trud. Azerb. Otdyel. Zakavk. Fil. Akad. Nauk SSSR*, Sect. Bot., i. 54 (1933).—Armen.
pseudonobilis *Popov in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 3, 30 (1928).—Turkestan. (Thian Shan).
pseudo-Onobrychis *Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 328 (1930).—Caucas.
pseudopurpureus *Guşul. in Bul. Fac. Şti. Cern.* vi. 291 (1932).—Carpath.
pulcher *Korovin in Trans. Sc. Soc. Turk.* i. 73 (1923).—Bokhara.
Reesei *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1933, xxiv. 46, in obs., 210.—Marocc.
Reverdattoanus *Sumnev. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1933, Nos. 5–6, p. 6.—Turkestan. (Thian Shan).
salubris *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 25 (1931).—Peruv.
Satoi *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 99.—Manchur.
scrupulicola *Fernald & Weatherby in Rhodora*, 1931, xxxiii. 238.—Canada (Quebec).
sevangensis *Grossheim in Bull. Polytechn. Inst. Tiflis*, ii. 215 (1926), in obs.; *Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 330 (1930).—Caucas.
shagalensis *Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 312 (1930).—Caucas.
Sosnowskyi *Grossheim, l. c.* 299.—Caucas.
speciosissimus *Pavlov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n. s. xliv. 39.—Turkestan. (Syr Darja).
Steinbergianus *Sumnev. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1934, Nos. 2–3, p. 3.—Ross. asiat. (Kazakstan).
subspinescens *Popov in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 3, 21 (1928), in clavi.—As. centr.
subternatus *Pavlov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n. s. xliv. 37.—Turkestan. (Syr Darja).

ASTRAGALUS:—
Syreitschikovii *Pavlov in Sovietsk. Bot.* 1934, No. 1, 24, in obs., nomen; *et in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n. s. xliv. 34, descr.—Turkestan. (Syr Darja).
taochius *Woronow in Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 325 (1930); *et in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 215 (1933).—Caucas.
teknensis *Ball ex Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 287, pro syn.: A. bubalocerας.
triqueter *Bornm. & Gauba in Fedde, Repert.* xxxix. 106 (1935).—Persia.
tschimganicus *Popov ex Baranov in Journ. Turkest. Branch Russ. Geogr. Soc.* 1924, xvii. 13, 33 (1925), nomen; *Popov in Bull. Univ. As. Centr.* xiv. 138 (1926), descr.—Turkestan. (Thian Shan).
ugamicus *Popov in Bull. Univ. As. Centr.* xiv. 142 (1926).—Turkestan. (Thian Shan).
uncirostris *Bogdan in Sc. Journ. Rostov-on-Don State Univ.* vi. 42 (1935).—Caucas.
uninodis *Popov & Vved. in Trav. Turkest. Univ., Tashkent*, No. 4 (*Vég. Monts Sary-Taou, &c.*) 63 (1922).—Turkestan.
Veresczagini *Krylov & Sumnev. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1933, Nos. 1–2, p. 1.—Altai.
vermicularis *Hausskn. & Bornm. ex Bornm. & Gauba in Fedde, Repert.* xxxix. 97 (1935), pro syn.: A. ophiocarpus.
viarius *Eastw. in Leafl. West. Bot.* i. 178 (1935).—U.S.A. (Oregon).
virens *Pavlov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n. s. xliv. 33.—Turkestan. (Syr Darja).
Weigoldianus *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 556 (1933).—China (Szechuan).
Weilleri *Emberger, Jahandiez & Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1932, xxiii. 180.—Marocc.
xanthomeloides *Korovin & Popov in Bull. Univ. As. Centr.* vii. Suppl., 15 (1924), in obs.; *et in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 3, 57 (1928).—Turkestan.
xipholobus *Popov in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 3, 39 (1928).—Turkestan. (Thian Shan).
Yamamotoi *Miyabe & Tatewaki in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.* xiii. 380 (1934).—Japon. (Yezo).
yuccanus (*Rydb.*) *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 40: Cystium yuccanum.
zaissanensis *Sumnev. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1934, Nos. 2–3, p. 4.—Ross. asiat. (Kasakstan).
zuvanticus *Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 329 (1930).—Caucas.

ASTRANTHIUM Nutt. (Compos.).
mexicanum (*A. Gray*) *Larsen in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1933, xx. 32: Bellis mexicana.
mima (*Blake*) *Larsen, l. c.* 30: Bellis mima.
orthopodum (*B. L. Robinson & Fernald*) *Larsen, l. c.* 31: Bellis orthopoda.
purpurascens (*B. L. Robinson*) *Larsen, l. c.* 33: Bellis purpurascens.
xanthocomoides (*Less.*) *Larsen, l. c.*: Brachycome xanthocomoides.
xylopodum *Larsen, l. c.* 31: Keerlia mexicana *A. Gray ex S. Wats.*, non Bellis mexicana *A. Gray*.

ASTRANTIA L. (Umbellif.).
Prenticei *Post ex Dinsm. in Post, Fl. Syria, Palest. & Sinai*, ed. 2, i. (*Publ. Am. Univ. Beirut*, Nat. Sc. Ser., No. 1) 541 (1932), in syn.: Anisosciadium isosciadium.

ASTROCARPUS Neck. (Resedac.).
prostratus (*Boiss.*) *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 67 (1932): A. Clusii var. prostratus.

ASTROCARYUM G. F. W. Mey. (Palmae).
aculeatissimum (*Schott*) *Burret in Fedde, Repert.* xxxv. 152 (1934): Toxophoenix aculeatissima.
Chambira *Burret, l. c.* 122.—Peruv.
confertum *H. Wendl. ex Burret, l. c.* 136.—Costa Rica.
dasychaetum (*Burret*) *Burret, l. c.* 141, in obs.: A. gynacanthum var. dasychaetum.
Huebneri *Burret, l. c.* 128.—Bras. (Amaz.).

ASTROCARYUM:—
Huicungo *Dammer ex Burret in Fedde, Repert.* xxxv. 146 (1934).—Peruv.
macrocalyx *Burret, l. c.* 150.—Peruv.
polystachyum *H. Wendl. ex Hemsl. in Biol. Centr.-Amer.* Bot., iii. 414 (1885), nomen.—Costa Rica.
Standleyanum *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, iii. 88 (1933).—Panamá.
trachycarpum *Burret in Fedde, Repert.* xxxv. 138 (1934).—Ecuador.
Ulei *Burret, l. c.* 147.—Bras. (Amaz.).
urostachys *Burret, l. c.* 151.—Ecuador.

ASTRONIA Nor. (Melastomatac.).
aneityensis *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 261.—N. Hebrides.
banksiana *Guillaumin, l. c.*—N. Hebrides.
carolinensis *Kanehira in Tropical Woods*, 1932, No. 29, 5, in obs., nomen; *et in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 488, descr.—Ins. Carolin. (Truk; Kusai).
floribunda *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 83, 24 (1931).—Ins. Viti.
ligulata *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 33 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
palauensis *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 337.—Ins. Palau.
ponapensis *Kanehira, l. c.*—Ins. Carolin. (Ponape).
saccata *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 34 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
victoriae *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 83, 25 (1931).—Ins. Viti.
zambalensis *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3202 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).

ASTRONIDIUM A. Gray (Melastomatac.).
acutifolium (*Mansf.*) *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 49 (1934): Everettia acutifolia.
carolinense (*Kanehira*) *Markgraf, l. c.*: Astronia carolinensis.
confertiflorum (*A. Gray*) *Markgraf, l. c.*: Astronia confertiflora.
glabrum (*G. Forst.*) *Markgraf, l. c.* 50: Melastoma glabrum.
membranaceum (*Merrill*) *Markgraf, l. c.* 49: Astronia membranacea.
nigrescens (*Mansf.*) *Markgraf, l. c.*: Everettia nigrescens.
palauense (*Kanehira*) *Markgraf, l. c.*: Astronia palauensis.
ponapense (*Kanehira*) *Markgraf, l. c.*: Astronia ponapensis.
samoënse (*S. Moore*) *Markgraf, l. c.*: Astronia samoënsis.

ASTRONIUM Jacq. (Anacardiac.).
Gardneri *Mattick in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1007 (1934).—Bras. (Piauhy).
Glaziovii *Mattick, l. c.*—Bras. (Minas Geraes).
Ulei *Mattick, l. c.* 996.—Bras. (Amaz.).
zongolicum *Reko, El Mexico Antiguo*, i. 157 (1918); *Mattick, l. c.* 1002, in syn.: A. Conzattii.

ASTROPHYTUM Lem. (Cactac.).
coahuilense (*H. Moeller*) *Kanfer in Kakteenfreund*, i. 59 (1932); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 143: Echinocactus myriostigma subsp. coahuilensis.

ASTYDAMIA DC. (Umbellif.).
ifniensis *Caballero in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 30, 18 (1935).—Marocc.

ASYNEUMA Griseb. & Schenk (Campanulac.).
eldivenum *Czecz. in Acta Soc. Bot. Polon.* 1932, ix. 42.—As. Min. (Galatia).
fulgens (*Wall.*) *Briq. in Candollea*, iv. 334 (1931): Campanula fulgens.
japonicum (*Miq.*) *Briq. l. c.* 335: Phyteuma japonicum.
Kellererianum *Stefanoff in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 2.—Bulgar.

ASYSTASIA Blume (Acanthac.).
atriplicifolia *Bremek. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 256 (1933).—Transvaal.
Lindauiana *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 257 (1931): Filetia africana.
Ritellii *Chiov. Fl. Somala*, II. 351 (1932).—Somal. Ital.
Schliebenii *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 823 (1933).—Tanganyika Terr.

ATALANTIA Correa (Rutac.).
angulata (*Willd.*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 328 (1931): Citrus angulata.
mindanaënsis (*Merrill*) *Engl. l. c.*: Paramignya mindanaënsis.
rectispinosa (*Craib*) *Engl. l. c.*: Paramignya rectispinosa.
scandens (*Griff.*) *Engl. l. c.*: Citrus scandens.
Surasiana (*Craib*) *Engl. l. c.*: Paramignya Surasiana.

ATAMOSCO Adans. (Amaryllidac.).
candida (*Lindl.*) *Sasaki, List Pl. Formos.* 112 (1928); *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 23 (1933): Amaryllis candida.

ATERAMNUS P. Br.; H. Hallier in Meded. Herb. Leid. No. 36, 4 (1918): **Hippomane** L. (Euphorbiac.).

ATHENAEA Sendtn. (Solanac.).
glabra *Standley in Tropical Woods*, 1935, No. 42, 32.—Colomb.; Ecuador.

ATHRIXIA Ker-Gawl. (Compos.).
asteroides (*Turcz.*) *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 136 (1931): Trichostegia asteroides.

ATHROANDRA Pax & K. Hoffm. (Euphorbiac.).
atroviridis *Pax in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 3 (1921), in obs.—Tanganyika Terr.

ATRACTOCARPUS Schlechter & K. Krause (Rubiac.).
simulans *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1933, Sér. II. v. 247.—N. Caled.

ATRACTOGYNE Pierre (Rubiac.).
bracteata (*Wernh.*) *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 98 (1931): Afrohamelia bracteata.
melongenifolia *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel l. c.*, in syn.: A. bracteata.

ATRACTYLIS L. (Compos.).
caerulea *Battand. Contrib. Fl. Atlant.* 52 (1919).—Marocc.
glomerata *Caballero in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 28, p. 30 (1935), in syn.: A. cancellata subsp. glomerata *Caballero*.

ATRACTYLODES DC. (Compos.).
japonica *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 178, japonice: A. lyrata var. ternata *Koidz.*
koreana (*Nakai*) *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 178, japonice: Atractylis koreana.

ATRAPHAXIS L. (Polygonac.).
Badghysi *Kult. in Trans. Sc. Soc. Turk.* i. 118 (1923).—Transcasp.
karataviensis *Pavlov & Lipschitz in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 733 (1932), in obs.; *et in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1933, Nos. 5–6, p. 3.—Turkestan.
seravschanica *Pavlov in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1933, Nos. 5–6, p. 3.—As. centr.

ATRIPLEX L. (Chenopodiac.).
acutiloba *R. H. Anders. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, 1934, lix. 270.—Austral. (N. S. Wales).
Asplundii *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 125 (1931).—Boliv.
atrosanguinea *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 875 (1895), in syn.: A. hortensis.
Chapinii *I. M. Johnston in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 443.—Chile (Ins. San Felix).
desertorum (*Iljin*) *Sosn. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 64 (1930): A. nitens subsp. desertorum.
Herzogii *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 125 (1931): A. serpyllifolia *Herzog*.
Hochreutineri *R. H. Anders. & Aellen in Candollea*, iv. 505 (1931).—W. Austral.
integribracteata *Lillo ex Molfino in Publ. Comis. Hon. Reducc. Ind., Buenos Aires*, No. 2, 30 (1935), nomen.—Argent.
Johnstoni *C. B. Wolf in Occas. Papers, Rancho Santa Ana Bot. Gard.* Ser. I. i. 3 (1935); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 147.—U.S.A. (Calif.).
maritima *E. Hallier, Veg. Helg.* ed. 2, 47 (1863), in obs.; *E. Hallier in Bot. Zeit.* xxi. Beil. [1], 10 (1863).—Eur. (Heligoland).

ATRIPLEX:—
Perrieri *Leandri in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 330.—Madag.
purpurea *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 875 (1895), in syn.: A. hortensis.
verruculosa *Hort. ex Ulbr. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 506 (1934), in syn.: Obione verrucifera.

ATROPA L. (Solanac.).
×Martiana *Font Quer in Cavanillesia*, v. 156 (1932).—Hort.

ATROPIS Rupr. (Gramin.).
alaskana (*Scribn. & Merrill*) *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 480 (1934): Puccinellia alaskana.
angustata (*R. Br.*) *Krecz. l. c.* 472: Poa angustata.
anisoclada *Krecz. l. c.* 487, 764.—As. centr.
Canbyi (*Scribn.*) *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 580 (1896): Glyceria Canbyi.
chilochloa *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 487, 764 (1934).—Turkestan.
choresmica *Krecz. l. c.* 479, 761.—Ross. asiat.
diffusa *Krecz. l. c.* 490, 766.—Ross. asiat.
dolicholepis *Krecz. l. c.* 488, 764.—Ross. (Eur. et As.).
Embergeri *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s B, i. No. 2) 22 (1932), in syn.: Puccinellia Embergeri.
Fendleriana (*Steud.*) *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 576 (1896): Eragrostis Fendleriana.
Flahaulti *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 132 [1933], nomen.—Marocc.
Font-Queri *Maire in Cavanillesia*, vi. 21 (1933), in obs.—Marocc.
geniculata *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 471, 759 (1934).—Sibir.
glauca (*Regel*) *Krecz. l. c.* 484, 762: A. distans var. glauca.
Grossheimiana *Krecz. l. c.* 477, 761.—Armen.
Hackeliana *Krecz. l. c.* 484, 762.—Pamir.
Hauptiana *Krecz. l. c.* 485, 763.—Sibir.
humilis *Krecz. l. c.* 473, 759.—Turkestan.
iliensis *Krecz. l. c.* 485, 763.—Ross. asiat. centr.
jenisseiensis *Roshev. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 300 (1932).—Sibir. (Yeniseisk).
kamtschatica (*Holmb.*) *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 479 (1934): Puccinellia kamtschatica.
laevis (*Vasey*) *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 577 (1896): Poa laevis.
laeviuscula *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 483, 762 (1934).—Sibir. bor.-or.
Lettermani (*Vasey*) *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 579 (1896): Poa Lettermani.
limosa *Degen, Flatt & Thaisz ex Hayek in Fedde, Repert. Beih.* xxx. III. 273 (1932), in syn.: Puccinellia limosa.
macranthera *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 471, 759 (1934).—Sibir.
macropus *Krecz. l. c.* 489, 765.—Ross. asiat.
nevadensis (*Vasey*) *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 577 (1896): Poa nevadensis.
pamirica (*Roshev.*) *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 474, 760 (1934): A. distans f. pamirica.
pauciramea (*Hackel*) *Krecz. l. c.* 477, 760: A. distans f. pauciramea.
paupercula (*Holm*) *Krecz. l. c.* 480: Glyceria paupercula.
phryganodes (*Trin.*) *Krecz. l. c.* 470: Poa phryganodes.
poecilantha (*K. Koch*) *Krecz. l. c.* 472: Festuca poecilantha.
Pringlei (*Scribn.*) *Vasey ex Beal, Grasses N. Amer.* ii. 578 (1896): Poa Pringlei.
pulchella (*Vasey*) *Beal, l. c.* 574: Poa pulchella.
pulvinata (*Fries*) *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 478, 761 (1934): Glyceria distans var. pulvinata.
Roshevitsiana *Schischk. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1929, No. 3, p. 1.—Mongol.
sclerodes *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 488, 765 (1934).—Ross. asiat. (Akmolinsk).
sevangensis (*Grossheim*) *Krecz. l. c.* 486, 763: Puccinellia sevangensis.
sibirica (*Holmb.*) *Krecz. l. c.* 479: Puccinellia sibirica.
subspicata *Krecz. l. c.* 474, 760.—Bokhara.

ATROPIS:—
Suksdorfi *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 574 (1896).—U.S.A. (Washington).
tenella (*Lange*) *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 483 (1934): Glyceria tenella.
tenuissima *Litw. ex Krecz. l. c.* 489, 765.—Ross. asiat. centr.
unilateralis *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 581 (1896).—U.S.A. (Calif.).

ATTALEA H. B. & K. (Palmae).
acaulis *Burret in Fedde, Repert.* xxxii. 103 (1933).—Bras. (Bahia).
apoda *Burret, l. c.* 105.—Bras. (Minas Geraes).
ferruginea *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1044 (1934).—Am. austr. (Rio Negro).
rhynchocarpa *Burret, l. c.* xii. 617 (1935).—Colomb.

AUBREVILLEA Pellegr. in Bull. Soc. Bot. France, 1933, lxxx. 466. *LEGUMINOSAE.*
Kerstingii (*Harms*) *Pellegr. l. c.*, in obs.: Piptadenia Kerstingii.
platicarpa *Pellegr. l. c.* 467.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).

AUBRIETA Adans. (Crucif.).
×cultorum *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 97 (1924).—Hort.
glabrescens *Turrill in Gard. Chron.* 1934, Ser. III. xcv. 384.—Epirus.

AUCUBA Thunb. (Cornac.).
crotonifolia *Hort. ex Federer in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1931, xlvi. 266, in obs.—Hort.
macrodonta *Hort. ex Federer, l. c.*, in obs.—Hort.
salicifolia *Hort. ex Federer, l. c.*, in obs.—Hort.

AUGUSTA Pohl (Rubiac.).
longifolia (*Spreng.*) *Rehder in Kew Bull.* 1935, 364: Ucriana longifolia.

AULACOLEPIS Hackel (Gramin.).
agrostoides (*Merrill*) *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 30: Aniselytron agrostoides.
Clemensae *Hitchcock in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1934, xxiv. 290.—Borneo.
milioides (*Honda*) *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 161: Poa milioides.
Petelotii *Hitchcock in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1934, xxiv. 291.—Indo-China (Tonkin).

AULACOSPERMUM Ledeb. (Umbellif.).
gonocaulum *Popov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n. s. xliv. 129.—Turkestan. (Thian Shan).
rupestre *Popov, l. c.* 130.—Turkestan. (Thian Shan).

AUREOLARIA Rafin. (Scrophulariac.).
serrata (*Torr.*) *Rydb. in Brittonia*, i. 96 (1931): Gerardia serrata.

AUSTROBAILEYA C. T. White in Contrib. Arn. Arb. No. IV. 29 (1933). *MAGNOLIACEAE.*
scandens *C. T. White, l. c.*—Austral. (Queensland).

AUSTROBASSIA Ulbr. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, xvi c. 532 (1934). *CHENOPODIACEAE.*
brachyptera (*F. Muell.*) *Ulbr. l. c.*: Kochia brachyptera.
convexula (*R. H. Anders.*) *Ulbr. l. c.*: Bassia convexula.
costata (*R. H. Anders.*) *Ulbr. l. c.*: Bassia costata.
decurrens (*J. M. Black*) *Ulbr. l. c.*: Bassia decurrens.
intricata (*R. H. Anders.*) *Ulbr. l. c.*: Bassia intricata.
longicuspis (*F. Muell.*) *Ulbr. l. c.*: Bassia longicuspis.
Luehmannii (*F. Muell.*) *Ulbr. l. c.*: Bassia Luehmannii.
parallelicuspis (*R. H. Anders.*) *Ulbr. l. c.*: Bassia parallelicuspis.
parviflora (*R. H. Anders.*) *Ulbr. l. c.*: Bassia parviflora.
sclerolaenoides (*F. Muell.*) *Ulbr. l. c.*: Bassia sclerolaenoides.
stelligera (*F. Muell.*) *Ulbr. l. c.*: Kochia stelligera.
Tatei (*F. Muell.*) *Ulbr. l. c.*: Bassia Tatei.
ventricosa (*J. M. Black*) *Ulbr. l. c.*: Bassia ventricosa.

AVELEDOA Pittier (Olacac.).
Tessmanniana *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 148 (1934).—Peruv.

AVENA L. (Gramin.).
abietorum *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 162.—Formosa.
abyssinica *Hochst. in Schimper, Iter Abyss.* Sect. 3, Unit. Iter, No. 1877 [1846]; *et ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* ii. 415 (1851).—Abyss.
aemulans *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 5 (1934), in clavi.—Rossia.
altaica *Steph. ex Komarov, Fl. URSS*, ii. 254 (1934), in syn.: Trisetum altaicum.
altissima *Herb. ex St.-Yves in Candollea*, iv. 447 (1931), in obs.—Gallia.
aristelliformis *Sennen ex St.-Yves, l. c.* 456, in syn.: A. pratensis.
Bellardi *Colla, Herb. Pedem.* vi. 34 (1836), in obs.—Ital.
brevis *Roth, Bot. Abh. Beob.* 42 (1787).—German.
dahurica *Komarov, Fl. URSS*, ii. 275 (1934), in syn.: Avenastrum dahuricum.
Fedtschenkoi *Hackel*; *St.-Yves in Candollea*, iv. 393 (1931), descr. ampl.—Turkestan.
Gonzaloi *Sennen ex St.-Yves, l. c.* 454, in syn.: A. pratensis.
grandis *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 6 (1934), in clavi.—Eur. et Am. bor.
Haussknechtii *Nevski, l. c.* 7, in clavi.—Cult.
intermedia *Bellardi ex Colla, Herb. Pedem.* vi. 35 (1836), in obs.—Ital.?
longepedicellata *Sennen ex St.-Yves in Candollea*, iv. 448 (1931), in obs., nomen.—Hispan.
longespiculata *Sennen ex St.-Yves, l. c.*, in syn.: A. pratensis.
longipilosa *Sennen ex St.-Yves, l. c.*, nomen.—Hispan.
macrantha (*Hackel*) *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 6 (1934), in clavi: A. sativa var. macrantha.
melillensis *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 129 [1933], in syn.: A. Ludoviciana.
meridionalis (*Malzew*) *Roshev. in B. Fedtsch. et al. Fl. Turkm.* i. 105 (1932): A. fatua subsp. meridionalis.
mirandana *Sennen ex St.-Yves in Candollea*, iv. 457 (1931), in syn.: A. pratensis.
×mutata *G. Sampaio in Bol. Soc. Brot.* Ser. II. vii. 118 (1931).—Lusitan.
persarum *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 6 (1934), in clavi.—Persia.
praegravis (*Krause*) *Roshev. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 268 (1934): A. sativa var. praegravis.
pungens *Sennen ex St.-Yves in Candollea*, iv. 449 (1931), in syn.: A. pratensis.
sensitiva *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1205 (1895), in syn.: A. sterilis.
splendens *Colla, Herb. Pedem.* vi. 34 (1836), in obs.—Hab.?
tentoënsis *Honda in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. II. (*Contrib. Cogn. Fl. Mansh.*: *Pl. Nov. Jehol.* II. i.) 7 (1935).—Manchur. (Jehol).
Thellungii *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 6 (1934), in clavi.—Hab.?
vasconica *Sennen ex St.-Yves in Candollea*, iv. 456 (1931), in syn.: A. pratensis.
Vaviloviana (*Malzew*) *Malzew in Bull. Applied Bot., Leningrad*, Suppl. 38, 135 (1930): A. strigosa subsp. Vaviloviana.
volgensis *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 5 (1934), in clavi.—Rossia.

AVENASTRUM Jessen (Gramin.).
adzharicum (*Alboff*) *Roshev. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 274 (1934): Avena adzharica.
agropyroides (*Boiss.*) *Halácsy, Consp. Fl. Graec.* iii. 370 (1904): Avena agropyroides.
albinerve (*Boiss.*) *Vierh. in Verh. Ges. Deutsch. Naturf., Leipzig*, 1913, lxxxv. II. Heft 1, 672 (1914), in obs.: Avena albinervis.
armeniacum (*Schischk.*) *Roshev. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 274 (1934): Avena armeniaca.
asiaticum *Roshev. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 772 (1932).—Caucas.; As. centr.
asperum (*Munro ex Thwait.*) *Vierh. in Verh. Ges. Deutsch. Naturf., Leipzig*, 1913, lxxxv. II. Heft 1, 672 (1914), in obs.: Avena aspera.

AVENASTRUM:—
australe (*Parl.*) *Halácsy, Consp. Fl. Graec.* iii. 370 (1904): Avena australis.
bromoides (*Gouan*) *Vierh. in Verh. Ges. Deutsch. Naturf., Leipzig*, 1913, lxxxv. II. Heft 1, 672 (1914), in obs.: Avena bromoides.
compactum (*Boiss. & Heldr.*) *Halácsy, Consp. Fl. Graec.* iii. 370 (1904): Avena compacta.
compressum (*Heuff.*) *Vierh. in Verh. Ges. Deutsch. Naturf., Leipzig*, 1913, lxxxv. II. Heft 1, 672 (1914), in obs.: Avena compressa.
convolutum (*Presl*) *Halácsy, Consp. Fl. Graec.* iii. 369 (1904): Avena convoluta.
cycladum *K. H. Rechinger & Scheffer in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 20.—Graecia (Ins. Naxos; Ins. Amorgos).
dahuricum (*Komarov*) *Roshev. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 275 (1934): Avena planiculmis subsp. dahurica.
decorum (*Janka*) *Vierh. in Verh. Ges. Deutsch. Naturf., Leipzig*, 1913, lxxxv. II. Heft 1, 672 (1914), in obs.: Avena decora.
Fedtschenkoi (*Hackel*) *Roshev. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 280 (1934): Avena Fedtschenkoi.
Hackelii (*Henriq.*) *Vierh. in Verh. Ges. Deutsch. Naturf., Leipzig*, 1913, lxxxv. II. Heft 1, 672 (1914), in obs.: Avena Hackelii.
hissaricum *Roshev. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 772 (1932).—Bokhara.
Humbertii *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 9.—Madag.
Krylovii *Pavlov in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1933, Nos. 5–6, p. 1.—Sibir.
lachnanthum (*Hochst. ex A. Rich.*) *Vierh. in Verh. Ges. Deutsch. Naturf., Leipzig*, 1913, lxxxv. II. Heft 1, 672 (1914), in obs.: Trisetum lachnanthum.
laeve (*Hackel*) *Vierh. l. c.*, in obs.: Avena laevis.
laevigatum (*Schur*) *Domin in Preslia*, xiii–xv. 40 (1935): Avena laevigata.
longifolium (*Thore*) *G. Sampaio in Bol. Soc. Brot.* Ser. II. vii. 119 (1931): Avena longifolia.
mongolicum (*Roshev.*) *Roshev. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 280 (1934): Avena mongolica.
montanum (*Vill.*) *Vierh. in Verh. Ges. Deutsch. Naturf., Leipzig*, 1913, lxxxv. II. Heft 1, 672 (1914), in obs.: Avena montana.
nervosum (*R. Br.*) *Vierh. l. c.*, in obs.: Avena nervosa.
pallens (*Link*) *G. Sampaio in Bol. Soc. Brot.* Ser. II. vii. 119 (1931): Avena pallens.
quinquenerve *Stent & Rattray in Proc. Rhodes. Scientif. Assoc.* xxxii. (*Stent & Rattray, Grasses S. Rhodes.*) 42 (1933).—S. Rhodesia.
Schellianum (*Hackel*) *Roshev. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 274 (1934): Avena Schelliana.
sempervirens (*Vill.*) *Vierh. in Verh. Ges. Deutsch. Naturf., Leipzig*, 1913, lxxxv. II. Heft 1, 672 (1914), in obs.: Avena sempervirens.
setaceum (*Vill.*) *Vierh. l. c.*, in obs.: Avena setacea.
sulcatum (*J. Gay*) *Vierh. l. c.*, in obs.: Avena sulcata.
tianschanicum *Roshev. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 773 (1932).—Turkestan. (Thian Shan).

AXINAEA Ruiz & Pav. (Melastomatac.).
quitensis *Benoist in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 326.—Ecuador.

AXONOPUS Beauv. (Gramin.).
Arsenei *Swallen in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1933, xxiii. 459.—Mexico.
ciliatifolius *Swallen, l. c.* 458.—Brit. Honduras.
multipes *Swallen, l. c.* 459.—Mexico.
rhizomatosus *Swallen, l. c.* 458.—Brit. Honduras; Guatem.; Honduras.

AYLOSTERA Speg. (Cactac.).
deminuta (*Weber*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 274 (1935): Echinopsis deminuta.
Fiebrigii (*Gürke*) *Backeb. l. c.*: Echinocactus Fiebrigii.
Kupperiana (*Bödeker*) *Backeb. l. c.* 275: Rebutia Kupperiana.
pseudodeminuta (*Backeb.*) *Backeb. l. c* : Rebutia pseudodeminuta.

AYLOSTERA:—
Spegazziniana (*Backeb.*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 276 (1935): Rebutia Spegazziniana.
spinosissima (*Backeb.*) *Backeb. l. c.* 275: Rebutia spinosissima.

AZADIRACHTA A. Juss. (Meliac.).
integrifoliola *Merrill in Philipp. Journ. Sc.* iv. 272 (1909).—Ins. Philipp. (Palawan).

AZALEA L. (Ericac.).
amagiana *Makino in Journ. Jap. Bot.* vii. 21 (1931). —Japon. (Hondo).
Daviesii *Hort. ex Kaiser in Gartenflora*, 1932, lxxxi. 213.—Am. bor.
glauca *Lam. Encycl.* i. 340 (1783).—Am. bor.
Oldhamii *Hort. ex Bean, Trees & Shrubs Brit. Isles*, iii. 403 (1933), in syn.: Rhododendron Oldhamii.

AZARA Ruiz & Pav. (Flacourtiac.; Bixac., Gen. Pl.).
Emiliae *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 512 (1932).—Bras. (Minas Geraes).

AZORELLA Lam. (Umbellif.).
pedunculatis (*H. B. & K.*) *Weddell, Chlor. And.* ii. 196 (1860): Pectophytum pedunculare.

B

BABIANA Ker-Gawl. (Iridac.).
angusta *N. E. Brown in Gard. Chron.* 1932, Ser. III. xcii. 467.—Afr. austr. (Cape Prov.).
brachystachys (*Baker*) *Lewis in Fl. Pl. S. Afr.* 1934, xiv. t. 546: Acidanthera brachystachys.
buchubergensis *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 168, in obs., 254 (1931).—Great Namaq.
Fourcadei *Lewis in S. Afr. Gard.* 1934, xxiv. 268.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Framesii *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 275, 276.—Afr. austr. (Cape Prov.).
hiemalis *L. Bolus, l. c.* 243.—Afr. austr. (Cape Prov.).
intermedia *L. Bolus, l. c.* 275, 277.—Afr. austr. (Cape Prov.).
lata *Lewis in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 253.—Afr. austr. (Cape Prov.).
longibracteata *Lewis, l. c.* 243.—Afr. austr. (Cape Prov.).
longicollis *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 253 (1931). —Great Namaq.
odorata *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 253.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Patersoniae *L. Bolus, l. c.* 1931, xxi. 281, 293.—Afr. austr. (Cape Prov.).
patula *N. E. Brown in Gard. Chron.* 1932, Ser. III. xcii. 466.—Afr. austr. (Cape Prov.).
subglabra *Lewis in Fl. Pl. S. Afr.* 1934, xiv. t. 545. —Afr. austr. (Cape Prov.).

BACCHARIS L. (Compos.).
angusticeps *Dusén ex Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 77 (1933).—Bras. (Paraná).
arizonica *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 155 (1931).—U.S.A. (Arizona).
capitoides *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 27, Cuadro 22 (1934), nomen; *et l. c.*, No. 29, p. 28 (1935), descr.—Colomb.
curitybensis *Heering ex Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 69 (1933).—Bras. (Paraná).
Espadae *Cuatrec. in An. Univ. Madrid*, iv. Fasc. 2, 210 (1935).—Peruv.
guascensis *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 27, Cuadro 9 (1934), nomen; *et l. c.*, No. 29, p. 30 (1935), descr.—Colomb.
ibaguensis *Cuatrec. l. c.*, No. 29, p. 32 (1935).—Colomb.
Martiana *Colla, Herb. Pedem.* iii. 318 (1834).—Bras.
mattogrossensis *Heering ex Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 8, 36 (1932).—Bras. (Matto Grosso).
nummularia *Heering ex Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 68 (1933).—Bras. (Paraná).

BACCHARIS:—
oleifolia *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 318 (1834). —Bras.
oreophila *Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 75 (1933).—Bras. (Paraná).
psammophila *Malme, l. c.* 70.—Bras. (S. Catharina).
sphenophylla *Dusén ex Malme, l. c.* 78.—Bras. (Paraná).
subumbelliformis *Heering ex Malme, l. c.* 79.—Bras. (Paraná).
trimeroides *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 6, 51 (1932).—Bras. (Rio Grande do Sul).

BACHMANNIA Pax in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. Nachtr., 177 (1897). *CAPPARIDACEAE.*
major *Pax, l. c.* 178, nomen.—Pondoland.
minor *Pax, l. c.*, nomen.—Pondoland.
Woodii (*Oliv.*) *Gilg in Engl. Jahrb.* xxxiii. 204 (1902), in obs.: Niebuhria Woodii.

BACOPA Aubl. (Scrophulariac.).
erecta *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 221, in clavi, 222 (1931): Moniera decumbens *Skan*, non Herpestis decumbens *Fernald.*
lacertosa *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 140 (1932).—Brit. Honduras.
longipes (*Pennell*) *Standley, l. c.* 141: Naiadothrix longipes.
naias *Standley, l. c.*—Brit. Honduras.
occultans (*Hiern*) *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 222 (1931): Moniera occultans.
pubescens (*Skan*) *Hutchinson & Dalziel, l. c.* 221, in clavi, 222: Moniera pubescens.

BACTRIS Jacq. (Palmae).
amoena *Burret in Fedde, Repert.* xxxiv. 180 (1933). —Bras. (Amaz.).
atrox *Burret, l. c.* 182.—Bras. (Pará).
Augustinea *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, iii. 95 (1933): Augustinea ovata.
barronis *L. H. Bailey, l. c.* 101.—Panamá (Ins. Barro Colorado).
bella *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 157 (1934).—Bras. (Amaz.).
caudata *H. Wendl. ex Burret in Fedde, Repert.* xxxiv. 230 (1934).—Costa Rica.
chaetochlamys *Burret, l. c.* 208.—Bras. (Amaz.).
chlorocarpa *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 622 (1935).—Bras. (Amaz.).
coloniata *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, iii. 106 (1933).—Panamá (Ins. Barro Colorado).
coloradonis *L. H. Bailey, l. c.* 104.—Panamá (Ins. Barro Colorado).
conferta *H. Wendl. ex Burret in Fedde, Repert.* xxxv. 137 (1934), in obs., pro syn.: Astrocaryum confertum.
dasychaeta *Burret, l. c.* xxxiv. 215 (1934).—Costa Rica.
dianeura *Burret, l. c.* 217.—Nicarag.
erostrata *Burret, l. c.* 207.—Bras. (Amaz.).
Escragnollei *Glaziou ex Burret, l. c.* 223.—Bras. (Rio de Janeiro).
ferruginea *Burret, l. c.* 222.—Bras. (Pernambuco).
gracilior *Burret, l. c.* 216.—Costa Rica.
Hoppii *Burret, l. c.* xxxiv. 181 (1933).—Bras. (Pará).
Huberiana *Burret, l. c.* 174: Amylocarpus angustifolius.
Huebneri *Burret, l. c.* 182.—Bras. (Amaz.).
humilis (*Wallace*) *Burret, l. c.* xxxiv. 194 (1934): Astrocaryum humile.
Kalbreyeri *Burret, l. c.* 231.—Colomb.
Killipii *Burret, l. c.* xxxiv. 175 (1933).—Peruv.
Lakoi *Burret, l. c.* xxxiv. 187 (1934).—Bras. (Amaz.).
leptochaete *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 620 (1935).—Bras. (Amaz.).
leptospadix *Burret in Fedde, Repert.* xxxiv. 210 (1934).—Bras. (Amaz.).
leptotricha *Burret, l. c.* 207.—Guiana Brit.
longisecta *Burret, l. c.* 205.—Bras. (Amaz.).
longiseta *H. Wendl. ex Burret, l. c.* 213.—Costa Rica.
macrocalyx *Burret, l. c.* 194.—Guiana Brit.
macrotricha *Burret, l. c.* 232.—Colomb.
megistocarpa *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 623 (1935).—Bras. (Amaz.).

BACTRIS:—
microcalyx *Burret in Fedde, Repert.* xxxiv. 195 (1934).—Bras. (Pará).
naevia *Poepp. ex Burret, l. c.* xxxiv. 179 (1933).—Peruv.
oligoclada *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 325 (1932).—Guiana Brit.
paucisecta *Burret in Fedde, Repert.* xxxiv. 171 (1933).—Guiana Brit.
Pickelii *Burret, l. c.* xxxiv. 199 (1934).—Bras. (Pernambuco).
pinnatisecta *Burret, l. c.* 191.—Bras. (Amaz.).
platyspina (*Barb. Rodr.*) *Burret, l. c.* 189: Amylocarpus platyspinus.
polyclada *Burret, l. c.* 226.—Bras. (Rio de Janeiro).
Porschiana *Burret in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, xlvi. 229 (1932).—Costa Rica.
pubescens *Burret in Fedde, Repert.* xxxiv. 197 (1934).—Costa Rica.
pulchella *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 621 (1935).—Bras. (Amaz.).
sigmoidea *Burret in Fedde, Repert.* xxxiv. 206 (1934).—Colomb.
simplex *Burret, l. c.* xxxiv. 179 (1933).—Bras. (Amaz.).
Standleyana *Burret, l. c.* xxxiv. 199 (1934).—Costa Rica.
superior *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, iii. 99 (1933).—Panamá (Ins. Barro Colorado).
trichophylla *Burret in Fedde, Repert.* xxxii. 113 (1933).—Brit. Honduras.
Tucum *Burret, l. c.* xxxiv. 225 (1934).—Bras. (Bahia).
Ulei *Burret, l. c.* xxxiv. 177 (1933).—Bras. (Amaz.).
Wendlandiana *Burret, l. c.* xxxiv. 198 (1934).—Costa Rica.

BACULARIA F. Muell. (Palmae).
sessilifolia *Becc. in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa*, Mem., 1934, xliv. 133.—Austral. (Queensland).

BADUSA A. Gray (Rubiac.).
occidentalis *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 3.—N. Hebrides.

BAECKEA L. (Myrtac.).
Baileyana *C. A. Gardner in Journ. Roy. Soc. W. Austral.* 1932–3, xix. 89 (1934).—W. Austral.
gracilis (*Schau.*) *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 94 (1931): Oxymyrrhine gracilis.
taxifolia *Merrill in Sarawak Mus. Journ.* iii. 534 (1928).—Borneo.

BAEOBOTRYS J. R. & G. Forst. (Myrsinac.).
argentea *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 233 (1824).—Ind. or.
dubia *Wall. l. c.* 235.—Ind. or. (Coorg; Madras).
glabra *Roxb. Hort. Beng.* 16 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 233 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 560 (1832).—Ind. or.
indica *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 230; *et l. c.* 557.—Ind. or.
macrophylla *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 234 (1824).—Nepal.
ramentacea *Roxb. Hort. Beng.* 16 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 231 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 558 (1832).—Ind. or. (Assam).
tetrandra *Roxb. l. c.* 85, nomen; *et l. c.* 233; *et l. c.* 560.—Ins. Molucc.

BAERIA Fisch. & Mey. (Compos.).
Bakeri *Howell in Leafl. West. Bot.* i. 7 (1932).—U.S.A. (Calif.).

BAHIA Lag. (Compos.).
depressa *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 17, 31 (1930).—U.S.A. (Texas).

BAIKIAEA Benth. (Legumin.).
Suzannae *Ghesq. in Compt. Rend. Soc. Biol., Paris*, cxiv. 184 (1933).—Congo Belg.; Uganda.

BAISSEA A. DC. (Apocynac.).
aframensis *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 45, in clavi, 46 (1931).—Gold Coast.
concinna *Stapf ex Hutchinson & Dalziel, l. c.*—Liberia.
Goossensi *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 417 (1932).—Congo Belg.
likimiensis *De Wild. l. c.* 419.—Congo Belg.
subsessilis (*K. Schum.*) *Stapf ex Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 45, in clavi, 46 (1931): Oncinotis subsessilis.

BAKERANTHA L. B. Smith in Contrib. Gray Herb. n. s. civ. 72 (1934): **Bakeria** E. André (Bromeliac.).
tillandsioides (*E. André*) *L. B. Smith, l. c.*: Bakeria tillandsioides.

BALAKA Becc. (Palmae).
Burretiana *Christoph. in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 128, 32 (1935).—Samoa.
cuneata *Burret in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu*, xi. No. 4, p. 6 (1935).—Ins. Viti.
Kersteniana (*Hort.*) *Becc. ex Martelli in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1934, n. s. xli. 711, nomen; *et l. c.* 1935, n. s. xlii. 30, 54: Kentia Kersteniana.
macrocarpa *Burret in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu*, xi. No. 4, p. 5 (1935).—Ins. Viti.
siliensis *Christoph. in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 128, 34 (1935).—Samoa.
tahitensis (*H. Wendl.*) *Becc. in Webbia*, iv. 271 (1914), in obs.; *Burret in Fedde, Repert.* xxiv. 275 (1928): Ptychosperma tahitense.
tuasivica *Christoph. in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 128, 36 (1935).—Samoa.

BALANEIKON Setchell in Hong Kong Naturalist Suppl. 1932, No. 1, 10, 12. *BALANOPHORACEAE.*
tobiracola (*Makino*) *Setchell, l. c.*: Balanophora tobiracola.
Wrightii (*Makino*) *Setchell, l. c.* 11, 12: Balanophora Wrightii.

BALANIA Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France, xliii. 297 (1896), in obs.; et in Ann. Sc. Nat. Sér. IX. vi. 144 (1907). *BALANOPHORACEAE.*
Cathcartii (*Van Tiegh.*) *Setchell in Hong Kong Naturalist Suppl.* 1932, No. 1, 11: Bivolva Cathcartii.
formosana (*Hayata*) *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1933, xxiii. 204: Balanophora formosana.
involucrata (*Hook. f.*) *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France*, xliii. 297 (1896), in obs.: Balanophora involucrata.
Kawakamii (*Valeton*) *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1933, xxiii. 204: Balanophora Kawakamii.
Kudoi (*Yamamoto*) *Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1933, v. 354: Balanophora Kudoi.
mutinodes (*Hayata*) *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1933, xxiii. 204: Balanophora mutinodes.
nipponica (*Makino*) *Masamune, l. c.* 205: Balanophora nipponica.
parvior (*Hayata*) *Masamune, l. c.*: Balanophora parvior.
spicata (*Hayata*) *Masamune, l. c.*: Balanophora spicata.

BALANIELLA Van Tiegh. (Balanophorac.).
pedicellaris (*Schlechter*) *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 201: Balanophora pedicellaris.

BALANITES Delile (Zygophyllac.; Simaroubac., Gen. Pl.).
australis *Bremek. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 244 (1933).—Transvaal.
latifolia (*Van Tiegh.*) *Chiov. Fl. Somala*, II. 46 (1932): Agialida latifolia.
Quarrei *De Wild. in De Wild. & Staner, Contrib. Fl. Katanga*, Suppl. v. 33 (1933).—Congo Belg.
Suckertii *Chiov. Nuov. Contrib. Fl. Somal. Ital.* (*Atti Soc. Nat. e Mat. Modena*, lxvi.: 1935) 5 (1934).—Somaliland.

BALANOCARPUS Bedd. (Dipterocarpac.).
brevipetiolaris (*Thwait.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 26 (1931): Shorea brevipetiolaris.
grandifolius *Ridley ex Symington in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 29 (1934), in syn.: B. longiflorus.
longiflorus (*Brandis*) *Foxworthy ex Symington, l. c.*: Hopea longiflora.
multiflorus (*Burck*) *Symington, l. c.* vii. 153 (1933): Doona multiflora.
pahangensis *Foxworthy in Malayan Forest Records*, No. 10, 145 (1932).—Penins. Mal.

BALANOPHORA J. R. & G. Forst. (Balanophorac.).
distans (*Van Tiegh.*) *Harms in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi b. 332 (1935): Balaniella distans.
Elkinsi *Blatter in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxiii. 309 (1929).—Ind. or. (Bombay).
Kudoi *Yamamoto in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard.* 1931, i. 95.—Formosa.
mariannae *Hosokawa in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1934, vi. 572.—Ins. Marian.
Oshimae *Yamamoto in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard.* 1931, i. 96.—Formosa.
valida *Diels in Sunyatsenia*, i. 123 (1933).—China (Kwangtung).
Wilderi *Setchell in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 86, 47 (1931).—Ins. Cook (Rarotonga).

BALANOPS Baill. (Balanopsidac.).
montana *C. T. White in Contrib. Arn. Arb.* No. iv. 15 (1933).—Austral. (Queensland).

BALLOTA L. (Labiat.).
Kaiseri *V. Täckh. in Svensk. Bot. Tidskr.* 1932, xxvi. 378.—Penins. Sinaic.
velerea *Maire, Weiller & Wilczek in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1935, xxvi. 121, 225.—Marocc.

BALSAMODENDRUM Kunth (Burserac.).
Kua *Brown ex Royle, Man. Mat. Med.* 341 (1847), in obs.—Abyss.

BALSAMORHIZA Hook. (Compos.).
hispidula *Sharp in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1935, xxii. 137.—U.S.A. (W. States).
macrolepis *Sharp, l. c.* 132.—U.S.A. (Calif.).
platylepis *Sharp, l. c.* 131.—U.S.A. (Oregon; Calif.; Nevada).

BAMBUSA Schreb. (Gramin.).
Bambos (L.) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1189 (1895): Arundo Bambos.
fastuosa *Latour-Marliac ex Mitford in Garden*, 1894, xlvi. 547; *Mitford, Bamboo Garden*, 105 (1896).—Japon.
Mete *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1188 (1895), in syn.: B. Metake.

BANARA Aubl. (Flacourtiac.; Samydac., Gen. Pl.).
amazonica *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 50 (1934).—Peruv.; Boliv.
glabrata *Sleum. l. c.* xi. 952 (1934).—Peruv.
magnifolia *Sleum. l. c.*—Ecuador.
Tulasnei *Macbride in Candollea*, v. 389 (1934): B. mollis *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. vii. 290 (1847), non Kuhlia mollis *Poepp. & Endl.*

BANISTERIA L. (Malpighiac.).
macrophylla *Colla, Herb. Pedem.* i. 479 (1833).—Bras.
orbicularis *Niedenzu in Fedde, Repert.* xxxiii. 69 (1933).—Venez.
Usillo *Gill. ex Hook. Bot. Misc.* iii. 158 (1832), in syn.: Tricomaria Usillo.
velutina *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 479 (1833).—Bras.

BANISTERIOPSIS C. B. Robinson (Malpighiac.).
Caapi (*Spruce ex Griseb.*) *Morton in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 486, in adnot.: Banisteria Caapi.
inebrians *Morton, l. c.* 485.—Colomb.
quitensis (*Niedenzu*) *Morton, l. c.* 486, in adnot.: Banisteria quitensis.
Rusbyana (*Niedenzu*) *Morton, l. c.* 487, in adnot.: Banisteria Rusbyana.

BANKSIA L. f. (Proteac.).
Ashbyi *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 281.—W. Austral.
Burdettii *E. G. Baker, l. c.*—W. Austral.

BAPHIA Afzel. (Legumin.).
Burttii *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 79.—Tanganyika Terr.
Gomesii *E. G. Baker in Bol. Soc. Brot.* Ser. II. viii. 113 (1933).—Afr. Lusit. Or.

BAPTISIA Vent. (Legumin.).
vespertina *Small ex Rydb. Fl. Prairies & Plains Centr. N. Amer.* 456 (1932).—U.S.A. (Central States).

BARBACENIA Vand. (Velloziac.; Amaryllidac., Gen. Pl.).
boliviensis (*Baker*) *Hauman ex Molfino in Physis*, xi. 179 (1932), in obs.: Vellozia boliviensis.
Schnitzleiniana (*Baker*) *Pax ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* ii. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 353 (1908), in obs.: Xerophyta Schnitzleiniana.

BARBAREA R. Br. (Crucif.).
apoiënsis *Nakai, Veg. Apoi*, 9, 51 (1930), nomen subnudum; *Hara in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 70, in syn.: B. cochlearifolia.
auriculata *Hausskn. & Bornm. in Magyar Bot. Lap.* 1931, xxx. 55.—Armen. Turc.
lepuznica *Nyár. in Bul. Grăd. & Muz. Bot. Univ. Cluj*, 1934, xiv. 97.—Ruman.
taiwaniana *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 50 (1934).—Formosa.
trichopoda *Hausskn. & Bornm. in Magyar Bot. Lap.* 1931, xxx. 55.—As. Min. (Paphlagonia).

BARBOSELLA Schlechter (Orchidac.).
Handroi *Hoehne in Bol. Agric., S. Paulo*, 1933, xxxiv. 613 (1934).—Bras. (S. Paulo).

BARKERWEBBIA Becc. (Palmae).
elongata (*Becc.*) *Becc. ex Martelli in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1935, n. s. xlii. 31: Heterospathe elongata.
humilis (*Becc.*) *Becc. ex Martelli, l. c.*: Heterospathe humilis.

BARLERIA L. (Acanthac.).
aromatica *Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 169 (1933).—S. Rhodesia.
bicolor *Chiov. Fl. Somala*, II. 352 (1932).—Somal. Ital.
Bolusi *Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 159 (1933).—Transvaal.
Bremekampi *Oberm. l. c.* 162.—S. Rhodesia; Transvaal.
brevituba *Benoist in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 81.—Madag.
Breyeri *Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 151 (1933).—Afr. austr.-occ.; Bechuanaland.
cordata *Oberm. l. c.* 172.—S. Rhodesia.
coriacea *Oberm. l. c.* 139.—Bechuanaland; Transvaal.
delagoënsis *Oberm. l. c.* 143.—Afr. Lusit. Or.
Dinteri *Oberm. l. c.* 140.—Afr. austr.-occ.; Transvaal.
eranthemoides *R. Br.*; *C. B. Clarke in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 147 (1899), descr.—Afr. trop. or.
gibsonioides *Blatter in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxii. 733 (1928).—Ind. or. (Bombay).
hirta *Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 148 (1933).—S. Rhodesia.
insolita *Benoist in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 86.—Madag.
laeta *Benoist, l. c.* 82.—Madag.
lanceolata (*Schinz*) *Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 155 (1933): B. acanthoides f. lanceolata.
lateralis *Oberm. l. c.* 176.—S. Rhodesia.
Leandrii *Benoist in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 789 (1934).—Madag.
longipes *Benoist in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 85.—Madag.
monticola *Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 165 (1933).—Orange Free State; Natal.
mosdenensis *Oberm. l. c.* 161.—Transvaal.
namutonensis *Oberm. l. c.* 142.—Afr. austr.-occ.
parviflora *R. Br.*; *T. Anders. in Journ. Linn. Soc., Bot.* vii. 29 (1864), descr.—Abyss.
parvispina *Benoist in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 80.—Madag.
paucidentata *Benoist, l. c.* 83.—Madag.
Perrierii *Benoist, l. c.* 78.—Madag.
puberula *Benoist, l. c.* 86.—Madag.
pulchella *Benoist, l. c.* 84.—Madag.
quadriloba *Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 150 (1933).—Transvaal.
rhodesiaca *Oberm. l. c.* 144.—S. Rhodesia.
rotundifolia *Oberm. l. c.* 145.—Transvaal.
scindens *Oberm. l. c.* 171.—S. Rhodesia.
separata *Benoist in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 87.—Madag.
spinisepala *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1932, 98.—Kenya Col.

BARLERIA:—
splendens *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1934, 305.—Tanganyika Terr.
tetraglochin *Milne-Redhead in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3291 (1935).—Sudan. Brit.
transvaalensis *Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 156 (1933).—Transvaal.
variabilis *Oberm. l. c.* 174.—S. Rhodesia.
variabilis *Robyns in Nat. Tijdschr.* xiv. (Congr. Num.) 104 (1932), nomen.—Congo Belg.
venosa *Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 164 (1933).—S. Rhodesia.

BAROSMA Willd. (Rutac.).
unicarpellata *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 99 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).

BARRINGTONIA J. R. & G. Forst. (Lecythidac.; Myrtac., Gen. Pl.).
sphaerocarpa *C. A. Gardner in For. Dep. Bull., W. Austral.* No. 32, 69 (1923).—W. Austral.

BARTONIA Mühlenb. (Gentianac.).
pentandra *Barton, Fl. Virg.* 51 (1812); *Pennell in Bartonia*, 1925–6, No. 9, 28 (1926).—U.S.A. (Virginia).
verna (*Michx.*) *Rafin. ex Barton, l. c.*; *Pennell, l. c.*: Centaurella verna.

BARTSIA L. (Scrophulariac.).
altissima *Rusby in Phytologia*, i. 75 (1934).—Boliv.
Guggenheimiana *Rusby, l. c.* 76.—Boliv.

BASANACANTHA Hook. f. (Rubiac.).
altiscandens *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 172 (1935).—Bras. (Amaz.).
asperifolia *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 470.—Guiana Brit.
echinocarpa (*Sessé & Moc. ex DC.*) *Bullock in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3298 (1935): Randia echinocarpa.
hispida *Ducke in Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro*, vi. 98 (1933).—Bras. (Amaz.).

BASISTEMON Turcz. (Scrophulariac.).
silvaticum (*Herzog*) *Baehni & Macbride in Candollea*, v. 345 (1934): Saccanthus silvaticus.
violaceum (*Herzog*) *Baehni & Macbride, l. c.*: Saccanthus violaceus.

BASSIA All. (Chenopodiac.).
Andersonii *Ising in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1933, lvii. 185.—S. Austral.
articulata *J. M. Black in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1933, lvii. 150.—S. Austral.
Blackiana *Ising in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1933, lvii. 91.—S. Austral.
caspica (*A. Lehm. ex Bunge*) *Ulbr. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 531 (1934): Echinopsilon caspicus.

BASSIA Koenig (Sapotac.).
Bawun (*Scheff.*) *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 16, in obs.: Payena Bawun.
Kajewskii *Guillaumin, l. c.* 15.—N. Hebrides.

BATHYSA C. Presl (Rubiac.).
obovata *K. Schum. ex Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 280 (1931).—Peruv.; Boliv.

BATRATHERUM Nees (Gramin.).
lancifolium (*Trin.*) *W. Watson in Atkinson, Gaz. N. W. Ind.* 392 (1882): Andropogon lancifolius.
submuticum (*Steud.*) *W. Watson, l. c.*: Andropogon submuticus.

BAUDOUINIA Baill. (Legumin.).
Perrieri *Viguier ex H. Perrier in Bull. Acad. Malgache*, 1932, n. s. xv. 7 (1933), in obs.—Madag.
Rouxevillei *H. Perrier, l. c.*—Madag.

BAUHINIA L. (Legumin.).
Beguinotii *Cufod. in Archiv. Bot., Forlì*, 1933, ix. 192.—Costa Rica.
decumbens *M. R. Henderson in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 99 (1933).—Penins. Mal.
emarginella *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 60 (1935).—Brit. Honduras.
gracilipes *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 157 (1934).—Sumatra.
hondurensis *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 313 (1931).—Honduras.

BAUHINIA:—
Howii *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 243 (1935).—China (Hainan).
hunanensis *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 541 (1933).—China (Hunan).
kwangtungensis *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 29 (1934).—China (Kwangtung).
Laui *Merrill, l. c.* xiv. 9 (1935).—China (Hainan).
marowijnensis *Kleinh. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 172.—Guiana Bat.
montana *Hort. ex Lanza in Bol. Ort. Bot. Palermo*, n. s. ii. 53 (1917), in obs.—Hab.?
punctata *Jacq. Sel. Stirp. Amer. Hist. Pict.* p. 61, in textu, t. 260, fig. 32 [1780], nomen illegit.: B. glabra.
Rahmatii *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 158 (1934).—Sumatra.
riparia *Splitg. ex Kleinh. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 172, in obs.—Guiana Bat.
Runyonii (*Britton & Rose*) *Standley in Tropical Woods*, 1933, No. 34, 41: Casparea Runyonii.
scala-simiae *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 362.—Guiana Brit.
sericella *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 60 (1935).—Brit. Honduras.
stenocardia *Standley in Tropical Woods*, 1933, No. 33, 12.—Bras. (Pará).
Storkii (*Rose*) *Standley, l. c.* No. 34, 40: Schnella Storkii.
subrhombicarpa *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 9 (1935).—China (Hainan).

BDALLOPHYTON Eichl. (Rafflesiac.).
americanum (*R. Br.*) *Harms in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi b. 281 (1935): Cytinus americanus.
bambusarum (*Liebm.*) *Harms, l. c.*: Scytanthus bambusarum.
oxylepis (*B. L. Robinson*) *Harms, l. c.*: Cytinus oxylepis.

BEALIA Scribn. (Gramin.).
speciosa (*Vasey*) *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 268 (1896): Muehlenbergia speciosa.

BEAUMONTIA Wall. (Apocynac.).
campanulata *Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1235 (1933).—Indo-China (Tonkin).
fragrans *Pierre*; *Pitard, l. c.* 1236, descr.—Anam; Cambodia; Cochinch.
Pitardii *Tsiang in Sunyatsenia*, ii. 160 (1934): B. campanulata *Pitard*.
speciosa *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 660 (1895), in syn.: B. grandiflora.

BEAUPREA Brongn. & Gris (Proteac.).
penariensis *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1935, lxxxii. 276.—N. Caled.

BEBBIA Greene (Compos.).
filifolia *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 80 (1933–5).—Calif. infer.

BECIUM Lindl. (Labiat.).
affine (*Hochst.*) *Chiov. Fl. Somala*, II. 367 (1932): Ocimum affine.
Knyanum (*Vatke*) *G. Taylor in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl. 2, 146: Ocimum Knyanum.
modestum (*Briq.*) *G. Taylor, l. c.* 147, in adnot.: Ocimum modestum.
ternatum *G. Taylor, l. c.* 146.—Angola.

BECKERA Fresen. (Gramin.).
scabra *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 653 (1932).—Tanganyika Terr.

BECKEROPSIS Fig. & De Not. (Gramin.).
Pirottae (*Chiov.*) *Stapf & C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1933, 269: Pennisetum Pirottae.
procera *Stapf ex Stent & Rattray in Proc. Rhodes. Scientif. Assoc.* xxxii. (*Stent & Rattray, Grasses S. Rhodes.*) 38 (1933), nomen; *Stapf in Kew Bull.* 1933, 272, descr.—Uganda; Kenya Col.; S. Rhodesia.
uniseta (*Nees*) *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* B. 52 (1895); cf. etiam *l. c.* C. 105; *Stapf ex Robyns in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 199 (1932): Gymnothrix uniseta.

BEDFORDIA DC. (Compos.).
arborescens *Hochr. in Candollea*, v. 332 (1934).—Austral. (Victoria).

BEFARIA Mutis (Ericac.).
[Vide BEJARIA.]

BEGONIA L. (Begoniac.).
×argenteo-guttata *Hort. ex L. H. Bailey, Stand. Cycl. Hort.* i. 483 (1914).—Hort.
baramensis *Merrill in Sarawak Mus. Journ.* iii. 529 (1928).—Borneo.
bilocularis (*Wight*) *Craib, Fl. Siam. Enum.* i. 771 (1931): Diploclinium biloculare.
bipindensis *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 619 (1921), in obs.—Cameroons.
bui-montana *Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1933, v. 353.—Formosa.
Bunchii *Hort. ex L. H. Bailey, Stand. Cycl. Hort.* i. 478 (1914), in obs.—Hort.
calophylla *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 617 (1921), in obs.—Cameroons.
×caulohybrida *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 363 (1894).—Hab.?
consanguinea *Merrill in Sarawak Mus. Journ.* iii. 531 (1928).—Borneo.
crassipes *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 619 (1921), in obs.—Cameroons.
ebolowensis *Engl. l. c.*, in obs.—Cameroons.
Elliotii *Gilg ex Engl. l. c.* 620, in obs.—Sierra Leone; Gold Coast.
×Feastii *Hort. ex Am. Gard.* xxiii. 335; cf. *L. H. Bailey, Stand. Cycl. Hort.* i. 478 (1914).—Hort.
×fuscomaculata *A. Lange in Fotsch, Begonien*, 55 (1933).—Hort.
Gilgii *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 616 (1921), in obs.—Fernando Po.
gladiifolia *Engl. l. c.* 619, in obs.—Fernando Po.
hiemalis *Fotsch, Begonien*, 130 (1933).—Hort.
Hookeriana *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 617 (1921), in obs.—Cameroons.
hypolipara *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 99.—Honduras.
Johnstoni *Oliv. ex Hook. f. in Bot. Mag.* t. 6899 (1886); *Oliv. in Trans. Linn. Soc., Bot.* Ser. II. ii. 334 (1887).—Tanganyika Terr.
kribensis *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 619 (1921), in obs.—Cameroons.
Langeana *Fotsch, Begonien*, 45 (1933).—Hort.
latistipula *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 616 (1921), in obs.—Cameroons.
×Margaritae *Hort. ex Fotsch, Begonien*, 87 (1933).—Hort.
metachroa *Fotsch, l. c.* 41: B. involucrata var. purpurascens *Regel*.
murudensis *Merrill in Sarawak Mus. Journ.* iii. 530 (1928).—Borneo.
ndongensis *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 619 (1921), in obs.—Cameroons.
phrixophylla *Blatter & McCann in Journ. Ind. Bot. Soc.* 1931, x. 27.—Ind. or. (Madras).
poikilantha *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 617 (1921), in syn.: B. quadrialata.
pseudophyllomaniaca *A. Lange in Fotsch, Begonien*, 57 (1933).—Hort.
×rhizohybrida *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 363 (1894).—Hab.?
×Saundersii *Hort. ex Vilmorin, l. c.* 358, in obs.—Hab.?
Schaeferi *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 618 (1921), in obs.—Cameroons.
Schultzei *Engl. l. c.* 619, in obs.—Cameroons.
sciaphila *Gilg ex Engl. l. c.* 616, in obs.—Cameroons.
subrectangula *Rusby in Phytologia*, i. 67 (1934).—Boliv.
×Thimotei *Hort. ex Guillaumin & Paupion in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 126, nomen.—Hort.
unilateralia *Rusby in Phytologia*, i. 68 (1934).—Boliv.

BEGONIA:—
Wadei *Merrill & Quisumb. in Addisonia*, 1932, xvii. 57.—Ins. Philipp. (Coron).
Wakefieldii *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 620 (1921), in obs.—Kenya Col.
Wellmannii *Gilg ex Engl. l. c.* 615, in obs.—Angola.
Wengeri *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1932, 200.—Ind. or. (Assam).

BEHURIA Cham. (Melastomatac.).
huberioides *Brade in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 14 (1935).—Bras. (Rio de Janeiro).
Limae *Brade, l. c.* 15.—Bras. (Rio de Janeiro).

BEILSCHMIEDIA Nees (Laurac.).
ferruginea *H. Liou, Laurac. Chine et Indochine*, 107 (1932).—Indo-China (Anam).
macrocarpa *A. Cheval. ex H. Liou, l. c.* 106.—Indo-China (Anam).
macrocarpa *Jeanneney ex Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1924, lxxi. 1103 (1925), in syn.: Cryptocarya macrocarpa.
Poilanei *H. Liou, Laurac. Chine et Indochine*, 109 (1932).—Indo-China (Anam).
Tsangii *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 27 (1934).—China (Kwangtung).
yunnanensis *Hu in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* v. 306 (1934).—China (Yunnan).

BEJARIA Zea ex Vent. (Ericac.).
Dryanderae *Mansf. & Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 268 (1935).—Colomb.
pedunculata *Mart. & Gal. ex Mansf. & Sleum. l. c.* 272, in syn.: B. discolor.
peruviana *Mansf. & Sleum. l. c.* 268.—Peruv.
sandiensis *Mansf. & Sleum. l. c.* 273.—Peruv.
variabilis *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 437.—Venez.
Weberbaueriana *Mansf. & Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 261 (1935).—Peruv.

BELAMCANDA Adans. (Iridac.).
flabellata *C. H. Grey in Gard. Chron.* 1934, Ser. III. xcvi. 408.—Japon.

BELINGIA Pierre, Fl. For. Cochinch. sub t. 325 (1895), in obs.: **Zollingeria** S. Kurz (Sapindac.).
dongnaiensis *Pierre, l. c.*, pro syn.: Zollingeria dongnaiensis.

BELLARDIA All. (Scrophulariac.).
latifolia (*Sibth. & Sm.*) *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xii. 428 (1929): Bartsia latifolia.

BELLARDIOCHLOA Chiov. (Gramin.).
polychroa (*Trautv.*) *Roshev. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 426 (1934): Festuca polychroa.

BELLEVALIA Lapeyr. (Liliac.).
aperta (*Freyn & Conrath*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 233 (1928): Muscari apertum.
araxensis *Woronow ex Grossheim, l. c.* 234, in syn.: B. longistyla.
Aucheri (*Baker*) *Losinsk. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 401 (1935): Hyacinthus Aucheri.
coelestis (*Fomin*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 233 (1928): Muscari coeleste.
desertorum *Eig & Feinbrun in Fedde, Repert. Beih.* lxiii. 1. 46 (1931), nomen; *et in Beih. Bot. Centralbl.* xlix. 11. 666 (1932), descr.—Palaest.
longistyla (*Miscz.*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 234 (1928): Hyacinthus longistyla.
makuensis *Woronow ex Grossheim, l. c.*—Caucas.
Pomelii *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1935, xxvi. 231.—Alger.
pycnantha (*K. Koch*) *Losinsk. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 404 (1935): Muscari pycnanthum.
thessalonica *Bornm. in Fedde, Repert.* xxx. 357 (1932), in obs.—Macedon.
Turkewiczii (*Woronow*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 278 (1928): Hyacinthella Turkewiczii.

BELLIS L. (Compos.).
helichrysoides *Hort. ex Herb in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1932, xlvii. 413.—Hort.
Natalis-Jesu *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 56 [1933], nomen.—Marocc.
Nicolasi *Sennen & Mauricio, l. c.* 55, nomen.—Marocc.

BELLIS:—
paschalis *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 55 [1933], nomen.—Marocc.

BELLUCIA Neck. (Melastomatac.).
umbellata *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 257.—Peruv.

BELLYNKXIA Muell.-Arg. (Rubiac.).
brachycalyx *Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 277.—Guiana Bat.
calycina (*Benth.*) *Bremek. l. c.* 276: Coffea calycina.
odontocalyx (*Sandwith*) *Bremek. l. c.*: Appunia odontocalyx.
surinamensis *Bremek. l. c.*—Guiana Bat.
triphylla (*Ducke*) *Bremek. l. c.*: Appunia triphylla.

BELONOPHORA Hook. f. (Rubiac.).
coriacea *Hoyle in Kew Bull.* 1935, 263.—Nigeria.
lepidopoda (*K. Schum.*) *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 85 (1931): Kerstingia lepidopoda.
Wernhami *Hutchinson & Dalziel, l. c.* 84, in clavi, 85: Diplosporopsis coffeoides.

BELOPERONE Nees (Acanthac.).
crenata *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 88 (1935).—Brit. Honduras.
graciliflora *Standley in Contrib. Arn. Arb.* No. v. 142 (1933).—Panamá (Ins. Barro Colorado).
intermedia *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 66 (1933–5).—Calif. infer.

BELOU Adans. (Rutac.).
Marmelos (*L.*) *Lyons, Plant Names Scientific & Popular*, ed. 2, 69 (1907): Crataeva Marmelos.

BENEVIDESIA Sald. & Cogn. (Melastomatac.).
magdalenensis *Brade in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 16 (1935).—Bras. (Rio de Janeiro).

BENGUELLIA G. Taylor in Journ. Bot. 1931, lxix. Suppl. 2, 156. *LABIATAE*.
lanceolata (*Gürke*) *G. Taylor, l. c.*: Orthosiphon lanceolatus.

BENTHAMIA A. Rich. (Orchidac.).
calceolata *H. Perrier in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 32.—Madag.
Catatiana *H. Perrier, l. c.* 29.—Madag.
cinnabarina (*Rolfe*) *H. Perrier, l. c.* 38: Habenaria cinnabarina.
cuspidata *H. Perrier, l. c.* 29.—Madag.
glaberrima (*Ridley*) *H. Perrier, l. c.* 28: Holothrix glaberrima.
Humberti *H. Perrier, l. c.* 35.—Madag.
nigro-vaginata *H. Perrier, l. c.* 32.—Madag.

BENTHAMIDIA Spach (Cornac.).
Nuttallii (*Audubon*) *Moldenke in Phytologia*, i. 167 (1935): Cornus Nuttallii.

BENZOIN Nees (Laurac.).
akoënse (*Hayata*) *Kamik. in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard.* 1933, iii. 79: Lindera akoënsis.
formosanum (*Hayata*) *Kamik. l. c.*: Lindera formosana.
kariense (*W. W. Smith*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 259 (1931): Lindera kariensis.
Pricei (*Hayata*) *Kamik. in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard.* 1933, iii. 79: Lindera Pricei.

BERBERIS L. (Berberidac.).
arguta (*Hutchinson*) *Bean, Trees & Shrubs Brit. Isles*, iii. 42 (1933): Mahonia arguta.
brumalis *Macbride in Candollea*, vi. 4 (1934).—Peruv.
buceronis *Macbride, l. c.* 3.—Peruv.
calliantha *Mulligan in Gard. Chron.* 1935, See III. xcvii. 394.—Tibet.
chillanensis *Sprague ex Bean in New Fl. & Silv.* v. 50, fig. 16 (1932), anglice; *Sprague in Kew Bull.* 1932, 455, latine.—Chile; Argent.
Chingii *Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., ix. 191 (1934): B. Cavaleriei var. pruinosa *Byhouwer*.
cliffortioides *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 782 (1933).—Peruv.
dryandriphylla *Diels, l. c.* 781.—Peruv.
farinosa *Benoist in Publ. Mus. Hist. Nat., Paris*, No. 3 (*Commém. Voy. d'Orbigny Am. Sud 1826–33*), 75 (1933).—Ecuador.

BERBERIS:—
Hochreutinerana *Macbride in Candollea*, vi. 2 (1934).—Peruv.
mitifolia *Stapf in Bot. Mag.* t. 9236 (1931).—China (Hupeh).
murensis *Hort. ex Federer in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1933, xlviii. 220.—Sibir.
nutans *Linden & Planch.*; *Sprague in Kew Bull.* 1926, 35.—Venez.
papillosa *Benoist in Publ. Mus. Hist. Nat., Paris*, No. 3 (*Commém. Voy. d'Orbigny Am. Sud 1826–33*) 76 (1933).—Ecuador.
prolifica *Pittier in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 135.—Venez.
rotunda *Macbride in Candollea*, vi. 3 (1934).—Peruv.
Trollii *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 781 (1933).—Boliv.
tsarongensis *Stapf in Bot. Mag.* t. 9332 (1933).—China (Yunnan).
virgetorum *C. K. Schneider*; *Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., ix. 275 (1934), descr. ampl.—China (Kiangsi; Chekiang).

BERCHEMIA Neck. (Rhamnac.).
axilliflora *Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., x. 77 (1935).—China (Szechuan).

BERGENIA Moench (Saxifragac.).
Beesiana *Hort. ex C. Schneider in New Fl. & Silv.* iv. 136 (1932), in obs., hybr. ?—Hort.
ciliata (*Haw.*) *Sternb. Rev. Saxifrag.* Suppl. 2, p. 2 (1831): Megasea ciliata.
ciliata (*Royle*) *A. Br. ex Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* iii. 11 a. 51 (1890): Saxifraga ciliata.
thysanodes (*Lindl.*) *C. Schneider in New Fl. & Silv.* iv. 136 (1932), in obs.: Saxifraga thysanodes.
yunnanensis *Hort. ex Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. Fasc. suppl. 1, p. 2 (1931), nomen.—Hab. ?

BERGERANTHUS Schwantes (Ficoidac.).
glenensis *N. E. Brown in N. E. Brown, Tisch. & Karst. Mesembr.* 120 (1931).—Orange Free State.
longisepalus *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 476 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).

BERGIA L. (Elatinac.).
salaria *Bremek. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 248 (1933).—Transvaal.

BERKHEYA Ehrh. (Compos.).
barbata (*L. f.*) *Hutchinson in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 86 (1932): Gorteria barbata.
carduodes (*Less.*) *Hutchinson, l. c.*: Stephanocoma carduodes.
echinacea (*Harv.*) *Burtt Davy in Kew Bull.* 1935, 571: Stobaea echinacea.
onopordifolia (*DC.*) *Burtt Davy, l. c.*: Stobaea onopordifolia.
petiolata (*DC.*) *Hutchinson in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 86 (1932): Stobaea petiolata.
pinnatifida (*Thunb.*) *Thellung in Mitt. Naturf. Ges. Solothurn*, viii. Ber. XX. 77 (1928): Stobaea pinnatifida.
Radula (*Harv.*) *Burtt Davy in Kew Bull.* 1935, 571: Stobaea Radula.
rhapontica (*DC.*) *Hutchinson & Burtt Davy, l. c.*: Stobaea rhapontica.

BERKHEYOPSIS O. Hoffm. (Compos.).
Langii *Bremek. & Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xvi. 442 (1935).—Bechuanaland.
linearifolia (*Bolus*) *Burtt Davy in Kew Bull.* 1935, 571: Gazania linearifolia.

BERLINIA Soland. ex Hook. f. (Legumin.).
confusa *Hoyle in Kew Bull.* 1934, 184.—Nigeria; Cameroons.
splendida *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 343 (1928), in clavi; *Hutchinson & Dalziel in Kew Bull.* 1928, 398, descr.—Côte d'Ivoire; Gold Coast.

BERNARDIA Mill. (Euphorbiac.).
mazatlana *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 49 (1933–5).—Mexico.

BERNOULLIA Oliv. (Sterculiac.).
swietenioides *Gleason in Phytologia*, i. 109 (1934).—Bras. (Amaz.).

BERRESFORDIA L. Bolus, Notes Mesembr. Pt. II. 313 (1932). *FICOIDACEAE.*
khamiesbergensis *L. Bolus, l. c.*—Little Namaq.

BERSAMA Fres. (Melianthac.; Sapindac., Gen. Pl.).
Chippii *Sprague & Hutchinson*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 506 (1928), in syn.: B. pachythyrsa.
gracilipes *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 668 (1932).—Tanganyika Terr.
rosea *Hoyle in Kew Bull.* 1931, 96.—Tanganyika Terr.

BERTIERA Aubl. (Rubiac.).
Chevalieri *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 97 (1931).—Guinea Gall.
Maitlandii *Hutchinson & Dalziel, l. c.* 96, in clavi, 97.—Cameroons.
panamensis *Standley in N. Am. Fl.* xxxii. 180 (1934).—Panamá.

BERTOLONIA Rafin.; cf. Desv. Journ. de Bot. iv. 277 (1814). *VERBENACEAE.*

BERZELIA Brongn. (Bruniac.).
Rogersii *N. E. Brown in Kew Bull.* 1931, 449.—Afr. austr. (Cape Prov.).

BESLERIA L. (Gesneriac.).
affinis *Morton in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 75.—Venez.
angustiflora *Fritsch in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 966 (1934).—Colomb.
cestroides *Fritsch, l. c.* 962.—Colomb.
cinnabarina *Fritsch, l. c.* 976.—Colomb.
citrina *Fritsch, l. c.* 963.—Peruv.
clivorum *Morton in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 75.—Venez.
concolor *Fritsch in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 970 (1934).—Peruv.
Delvillari *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 29, 11 (1935).—Colomb.
densiflora *Fritsch in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 965 (1934).—Peruv.
disgrega *Morton in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 74.—Venez.
heterosepala *Fritsch in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 971 (1934).—Colomb.
ignea *Fritsch, l. c.* 966.—Peruv.
insolita *Morton in Phytologia*, i. 153 (1935).—Guiana Gall. et Brit.
Lehmannii *Fritsch in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 967 (1934).—Colomb.
modica *Morton in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 58.—Ecuador.
nitens *Fritsch in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 964 (1934).—Colomb.
pallidiflora *Fritsch, l. c.* 968.—Peruv.
reticulata *Fritsch, l. c.* 969.—Colomb.
rupestris *Morton in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 57.—Ecuador.; Peruv.
saxicola *Morton in Phytologia*, i. 151 (1935).—Guiana Brit.
subcarnosa *Fritsch in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 972 (1934).—Colomb.
timida *Morton in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 56.—Ecuador.
verecunda *Morton in Phytologia*, i. 152 (1935).—Guiana Brit.
vestita *Fritsch in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 971 (1934).—Colomb.
villosa *Fritsch, l. c.* 964.—Colomb.

BESSEYA Rydb. (Scrophulariac.).
arizonica *Pennell in Proc. Acad. Sc. Philad.* 1933, lxxxv. 103.—U.S.A. (Arizona; N. Mexico).
cinerea (*Rafin.*) *Pennell, l. c.* 104: Veronica cinerea.
Gooddingii *Pennell, l. c.* 101.—U.S.A. (Arizona).
oblongifolia *Pennell, l. c.*—U.S.A. (N. Mexico).

BETA L. (Chenopodiac.).
brasiliensis *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 874 (1895), in syn.: B. vulgaris.
foliosa *Hausskn. ex Scheibe in Angewandte Bot.* 1934, xvi. 331, in obs., nomen.—Armen.
Monodiana *Maire in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 526.—Sahara.

BETULA L. (Betulac.; Cupulif., Gen. Pl.).
apoiensis *Nakai, Veg. Mt. Apoi in Tenn.-kinenb.-chōsa-hōkoku, Shokub.* xii. 33, 46 (1930); *Hara in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 227, latine.—Japon. (Yezo).
atrata *Domin in Bull. Internat. Acad. Sc. Prague*, 1927, xxviii. 249.—Czechoslovak.
Cajanderii *Sukatschew in Act. For. Fenn.* xxxiv. No. 13, 3 (1929).—Sibir.
Fischeri *Hort. ex Adamow in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1932, xliv. 348, in obs., nomen.—Hort.
Guthriei *Sudworth in Am. Forests & Forest Life*, xxxiii. 286 (1927).—U.S.A. (Oregon).
kweichowensis *Hu in Sinensia*, iii. 88 (1932).—China (Kweichau).
megrelica *Sosn. in Trav. Inst. Bot. Tiflis*, i. 42 (1934).—Caucas.
Miyoshii *Nakai, Veg. Mt. Apoi in Tenn.-kinenb.-chōsa-hōkoku, Shokub.* xii. 34, 46 (1930); *Hara in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 227, in syn.: B. apoiensis.
Niijimai *Nakai, l. c.*; *Hara, l. c.*, in syn.: B. apoiensis.
oxydathifolia *Hort. ex Adamow in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1932, xliv. 348, in obs., nomen.—Hort.
Rezniczenkoana (*Litw.*) *Schischk. in Krylov, Fl. Sibir. Occ.* iv. 793 (1930): B. microphylla var. Rezniczenkoana.
touinia *Hort. ex Adamow in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1932, xliv. 348, in obs., nomen.—Hort.

BEURRERIA Jacq. (Boraginac.).
Urbanii *O. E. Schulz*; *O. E. Schulz in Fedde, Repert.* xxxii. 88 (1933), descr. ampl.—Hispaniola.

BIARUM Schott (Arac.).
carratracense (*Haensel.*) *Font Quer in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1926, xxvi. 53: Arum carratracense.

BIDENS L. (Compos.).
acrifolia *Sherff in Bot. Gaz.* xciv. 591 (1933).—Mexico.
articulata *Sherff, l. c.*: Coreopsis glaucescens.
asperata (*Hutchinson & Dalziel*) *Sherff, l. c.* 1932, xciii. 220: Coreopsis asperata.
aspilioides (*Baker*) *Sherff, l. c.* xciv. 590 (1933): Coreopsis aspilioides.
barrancae *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 82 (1933–5).—Mexico.
chaetodonta *Sherff in Bot. Gaz.* 1930, xc. 387: Coreopsis abyssinica.
chaetophylla *Sherff in Am. Journ. Bot.* 1935, xxii. 705.—Cameroons.
cirsioides *Sherff in Bot. Gaz.* 1930, xc. 393.—Cameroons.
collina *Degener & Sherff, l. c.* xcvi. 144 (1934).—Ins. Marquesas.
coreocarpoides *Sherff, l. c.* xcvii. 185 (1935).—Calif. infer.
coronata *Fisch. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 306 (1834).—Hab. ?
deltoidea *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 46 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
Dielsii *Sherff in Bot. Gaz.* 1930, xc. 388: Coreopsis chrysantha var. simplicifolia *Vatke*.
fecunda *Degener & Sherff, l. c.* 1932, xciii. 217.—Ins. Sandvic.
ferax *Degener & Sherff, l. c.* xciv. 590 (1933).—Ins. Sandvic.
fervida *Hort. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 306 (1834).—Hab. ?
filamentosa *Rydb. in Brittonia*, i. 104 (1931).—U.S.A. (N. E. States).
halawana *Degener & Sherff in Bot. Gaz.* xciv. 589 (1933).—Ins. Sandvic.
hivoana *Degener & Sherff, l. c.* xcvi. 143 (1934).—Ins. Marquesas.
kivuensis *Sherff, l. c.* 145.—Congo Belg.
magnidisca *Degener & Sherff, l. c.* 1932, xciii. 216.—Ins. Sandvic.
magnifolia *Sherff, l. c.* 1930, xc. 390: Coreopsis frondosa.
Martii *Colla, Herb. Pedem.* iii. 306 (1834).—Bras. ?
Mayebarai *Kitamura, Compos. Nov. Jap.* 21 (1931).—Japon.
microphylla *Sherff in Bot. Gaz.* 1930, xc. 390: Coreopsis pulchella.

BIDENS:—
Mildbraedii *Sherff in Bot. Gaz.* 1931, xci. 308.—Cameroons.
monophylla *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 81 (1931).—Santo Domingo.
Mossii *Sherff in Bot. Gaz.* 1931, xcii. 202: Coreopsis tripartita.
nematocera (*Sherff*) *Sherff in Am. Journ. Bot.* 1935, xxii. 705: B. Campylotheca var. nematocera.
Neumannii *Sherff in Bot. Gaz.* 1930, xc. 394.—Gallaland.
oligocarpa *Sherff, l. c.* 1931, xcii. 206.—Mexico.
onisciformis *Sherff, l. c.* xcvi. 144 (1934).—Congo Belg.
Orendainae *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 82 (1933–5).—Mexico.
personans *Degener & Sherff in Bot. Gaz.* 1931, xcii. 205.—Ins. Sandvic.
phelloptera *Sherff, l. c.* 204.—Tanganyika Terr.
praecox *Sherff, l. c.* 450.—Tanganyika Terr.
puberula (*Wieg.*) *Rydb. Fl. Prairies & Plains Centr. N. Amer.* 849 (1932): B. frondosa var. puberula.
raiateënsis *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 47 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
rhodesiana *Sherff in Bot. Gaz.* 1931, xci. 309.—S. Rhodesia.
rotata *Sherff, l. c.* 1930, xc. 391.—Abyss.
ruandensis *Sherff in Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. 285 (1935).—Congo Belg.
Rueppellii (*Sch. Bip.*) *Sherff in Bot. Gaz.* 1930, xc. 389: Coreopsis Rueppellii.
Sandbergii *Rydb. in Brittonia*, i. 104 (1931): B. connata var. pinnata *S. Wats.*
segetum *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 307 (1834).—Bras.
setigera (*Sch. Bip.*) *Sherff in Bot. Gaz.* 1930, xc. 390: Coreopsis setigera.
setigeroides *Sherff, l. c.* 1931, xci. 310.—Uganda.
Skottsbergii *Sherff, l. c.* 311.—Ins. Sandvic.
somaliensis *Sherff, l. c.* 1930, xc. 395.—Somaliland.
straminoides *Sherff in Am. Journ. Bot.* 1935, xxii. 706.—Tanganyika Terr.
superba *Sherff, l. c.* 707.—Congo Belg.
taitensis *Sherff in Bot. Gaz.* 1930, xc. 396.—Kenya Col.
ternata (*Chiov.*) *Sherff, l. c.* 391: Coreopsis ternata.
Uhligii *Sherff in Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. 286 (1935).—Tanganyika Terr.
Vatkei *Sherff in Bot. Gaz.* 1930, xc. 388: Coreopsis chrysantha *Vatke.*

BIGELOVIA Spreng. (Rubiac.).
ramulosa *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 147 (1834).—Bras.
rubescens *Colla, l. c.*—Bras.

BIGNONIA L. (Bignoniac.).
auriculigera *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 182 (1835).—Bras.?
mirabilis *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 801 (1895), in syn.: Campsidium chilense.
pyramidata *Biroli ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 184 (1835).—Hab.?

BIKKIA Reinw. (Rubiac.).
moluccana *Suesseng. ex Troll & Dragend. in Planta*, xiii. 323 (1931).—Ins. Molucc.

BILLBERGIA Thunb. (Bromeliac.).
gigantea *Hort. ex C. Cheval. in Bull. Soc. Nat. Hort. France*, 1935, Sér. VI. ii. 201, in syn.: Aechmea gigantea.
× Koechlii *Hort. ex Mez in Engl. Pflanzenreich, Bromeliac.* 199 (1935).—Hort.
maxima *C. Cheval. in Bull. Soc. Nat. Hort. France*, 1931, Sér. V. iv. 209, 211.—Hort.
quadricolor *Hort. ex C. Cheval. l. c.* 1935, Sér. VI. ii. 204, in syn.: Aechmea nudicaulis.

BINGHAMIA Britton & Rose (Cactac.).
aurivilla (*Britton & Rose*) *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 1, [p. 7], in obs.: Borzicactus aurivillus.
Cajamarquilla *Backeb. in Cact. & Succ. Journ. Amer.* iii. 132 (1932), in obs.—Peruv.
chosiquensis *Backeb. in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1931, xlvi. 207, in obs.—Peruv.

BINGHAMIA:—
Humboldtii (*H. B. & K.*) *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 10, [p. 8]: Cactus Humboldtii.
icosagona (*H. B. & K.*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 197 (1935): Cactus icosagonus.
pseudomelanostele *Backeb. in Cact. & Succ. Journ. Amer.* iv. 280 (1932): B. melanostele *Rose*, non Cephalocereus melanostele *Vaupel.*

BIOPHYTUM DC. (Oxalidac.; Geraniac., Gen. Pl.).
chocoënse *Knuth in Fedde, Repert.* xxxviii. 197 (1935).—Colomb.
Heinrichsae *Knuth, l. c.* 198.—Ecuador.
Jessenii *Knuth, l. c.*—Angola.
juninense *Knuth, l. c.*—Peruv.
kamerunense *Engl. & Knuth ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude Veg. der Erde*, ix.) 717 (1915), in obs.—Liberia; Cameroons.
Mutisii *Knuth in Fedde, Repert.* xxxviii. 199 (1935).—Colomb.

BISCUTELLA L. (Crucif.).
Degeni *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 95.—Hispan.
× Haasiana *Font Quer in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1926, xxvi. 105.—Hispan.
hirsuta *Hort. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 134 (1833).—Hab.?
rupestris *Raensch ex Colla, l. c.*—Hab.?

BISTORTA Mill. (Polygonac.).
tenuicaulis *Nakai in Rigakkai*, xxiv. IV. p. 7 (1926); cf. *Hara in Journ. Jap. Bot.* ix. 253 (1933).—Japon. (Hondo).

BIVENTRARIA Small, Man. Southeast. Fl. 1072 (1933). *ASCLEPIADACEAE.*
variegata (*L.*) *Small, l. c.*: Asclepias variegata.

BIVONAEA DC. (Crucif.).
abulensis (*Pau*) *G. Sampaio in Bol. Soc. Brot.* Sér. II. x. 222 (1935): Thlaspi abulense.

BIVONEA Rafin. Specchio, i. 156 (1814). *EUPHORBIACEAE.*
stimulosa (*Michx.*) *Rafin. l. c.*: Jatropha stimulosa.
texana (*Muell.-Arg.*) *House in Bull. N. Y. State Mus.* 1920, Nos. 233–4, 61 (1921): Jatropha texana.

BIXA L. (Bixac.).
excelsa *Gleason & Krukoff in Phytologia*, i. 107 (1934).—Bras. (Amaz.).

BLACKBURNIA J. R. & G. Forst. (Rutac.).
monadelpha *Roxb. Hort. Beng.* 83 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 435 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 415 (1832).—Ind. or.

BLACKSTONIA Huds. (Gentianac.).
acuminata (*Koch & Ziz*) *Domin in Bull. Internat. Acad. Sc. Prague*, 1933, xxxiv. 25: Chlora acuminata.
citrina (*Boiss. & Reut.*) *Domin, l. c.* 27: Chlora citrina.
intermedia (*Ten.*) *Sennen ex Martinez in Mem. Soc. Esp. Hist. Nat.* xiv. 462 (1934), in obs.: Chlora intermedia.

BLADHIA Thunb. (Myrsinac.).
humilis (*Vahl*) *Sasaki, List Pl. Formos.* 324 (1928): Ardisia humilis.
violacea *T. Suzuki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 41.—Formosa.

BLAKEA P. Br. (Melastomatac.).
bracteata *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1932, lix. 375.—Colomb.
cuneata *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 76 (1935).—Brit. Honduras.
incompta *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 182 (1934).—Ecuador.
paludosa *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 261.—Peruv.
truncata *Gleason in Phytologia*, i. 46 (1933).—Colomb.

BLANCHETIA DC. (Compos.).
heterotricha *DC. Prodr.* v. 75 (1836).—Bras. (Bahia).

BLASTOCAULON Ruhl. (Eriocaulac.).
speleicola *Alv. Silv. Fl. Mont.* 274 (1928).—Bras. (Minas Geraes).

BLASTUS Lour. (Melastomatac.).
setulosus *Diels in Engl. Jahrb.* lxv. 106 (1932).—China (Kwangsi).
tenuifolius *Diels, l. c.* 105.—China (Kwangsi).

BLEPHARIGLOTTIS Rafin. (Orchidac.).
fissa (*R. Br.*) *G. Keller & Soó in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 308 (1935): Habenaria fissa.

BLEPHARIS Juss. (Acanthac.).
Hornbyae *Milne-Redhead in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3266 (1935).—Tanganyika Terr.
menocotyle *Milne-Redhead, l. c.* xxxii. t. 3198 (1933).—N. Rhodesia.
refracta *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 821 (1933).—Tanganyika Terr.
trinervis *Dewèvre*; *C. B. Clarke in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 105 (1899), descr.—Congo Belg.

BLEPHARODON Decne. (Asclepiadac.).
bolivianus *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxv. A. No. 7, 17 (1933).—Boliv.
ciliatus *Moldenke in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 458.—Venez.
Hitchcockii *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 459.—Venez.
minimus *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1931, xviii. 557.—Colomb.
nitidus (*Vell.*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 34 (1931): Cynanchum nitidum.
venezuelensis *Moldenke in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 455.—Venez.

BLETIA Ruiz. & Pav. (Orchidac.).
Edwardsi *Ames in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1932, xlv. 1.—Honduras.
Lankesteri (*Ames & C. Schweinf.*) *Ames, F. T. Hubbard & C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* iii. 41 (1934): Limodorum Lankesteri.
papillifera *Ames, l. c.* i. No. 6, 5 (1933).—Honduras.
tenuifolia *Ames & C. Schweinf. l. c.* i. No. 10, 6 (1933).—Mexico.
tuberosa (*L.*) *Ames in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1932, xlv. 1, in obs.: Limodorum tuberosum.

BLIGHIA Konig (Sapindac.).
kamerunensis *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 1145 (1933).—Cameroons.
Welwitschii (*Hiern*) *Radlk. l. c.* 1146: Phialodiscus Welwitschii.
Wildemaniana *Gilg ex De Wild.*; *Radlk. l. c.* 1145, descr.—Congo Belg.

BLINKWORTHIA Choisy (Convolvulac.).
discostigma *Hand.-Mazz. in Sinensia*, ii. 6 (1931).—China (Kwangsi).

BLUMEA DC. (Compos.).
formosana *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 38.—Formosa.
laevis (*Lour.*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 386 (1935): Placus laevis.
microphylla *Chiov. Fl. Somala*, II. 260 (1932).—Somal. Ital.
oblongifolia *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 37.—Ins. Liukiu; Formosa.
serrata *Chiov. Fl. Somala*, II. 259 (1932).—Somal. Ital.
sinuata (*Lour.*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 388 (1935): Gnaphalium sinuatum.

BLYXA Nor. (Hydrocharitac.).
echinospermoides *Blatter in Journ. & Proc. As. Soc. Beng.* 1930, n. s. xxvi. 354 (1931).—Ind. or. (Bombay).
senegalensis *Dandy in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 42.—Senegal.

BOBUA DC. (Symplocac.; Styracac., Gen. Pl.).
adinandrifolia (*Hayata*) *Kanehira & Sasaki in Sasaki, List Pl. Formos.* 330 (1928): Symplocos adinandrifolia.
arisanensis (*Hayata*) *Kanehira & Sasaki, l. c.*: Symplocos arisanensis.
confusa (*Brand*) *Kanehira & Sasaki, l. c.*: Symplocos confusa.
divaricativena (*Hayata*) *Kanehira & Sasaki, l. c.*: Symplocos divaricativena.

BOBUA:—
Doii (*Hayata*) *Kanehira & Sasaki in Sasaki, List Pl. Formos.* 330 (1928): Symplocos Doii.
eriobotryifolia (*Hayata*) *Kanehira & Sasaki, l. c.*: Symplocos eriobotryifolia.
eriostroma (*Hayata*) *Kanehira & Sasaki, l. c.*: Symplocos eriostroma.
formosana (*Brand*) *Kanehira & Sasaki, l. c.* 331: Symplocos formosana.
glomeratiflora (*Hayata*) *Kanehira & Sasaki, l. c.*: Symplocos glomeratiflora.
heishanensis (*Hayata*) *Kanehira & Sasaki, l. c.*: Symplocos heishanensis.
ilicifolia (*Hayata*) *Kanehira & Sasaki, l. c.*: Symplocos ilicifolia.
Konishii (*Hayata*) *Kanehira & Sasaki, l. c.*: Symplocos Konishii.
lucida (*Sieb. & Zucc.*) *Kanehira & Sasaki, l. c.*: Symplocos lucida.
morrisonicola (*Hayata*) *Kanehira & Sasaki, l. c.*: Symplocos morrisonicola.
Nakaii (*Hayata*) *Kanehira & Sasaki, l. c.*: Symplocos Nakaii.
nokoënsis (*Hayata*) *Kanehira & Sasaki, l. c.* 332: Symplocos nokoënsis.
phaeophylla (*Hayata*) *Kanehira & Sasaki, l. c.*: Symplocos phaeophylla.
risekiensis (*Hayata*) *Kanehira & Sasaki, l. c.*: Symplocos risekiensis.
Sasakii (*Hayata*) *Kanehira & Sasaki, l. c.*: Symplocos Sasakii.
Somai (*Hayata*) *Kanehira & Sasaki, l. c.*: Symplocos Somai.
sozanensis (*Hayata*) *Kanehira & Sasaki, l. c.*: Symplocos sozanensis.
suishariensis (*Hayata*) *Kanehira & Sasaki, l. c.*: Symplocos suishariensis.
Tanakae (*Matsumura*) *Masamune, Prelim. Rep. Veg. Yakus.* 110 (1929); *Masamune in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* xi., Bot. No. 4, 365 (1934): Symplocos Tanakae.
theifolia (*Hayata*) *Kanehira & Sasaki in Sasaki, List Pl. Formos.* 332 (1928): Symplocos theifolia.
trichoclada (*Hayata*) *Kanehira & Sasaki, l. c.*: Symplocos trichoclada.
wikstroemiifolia (*Hayata*) *Kanehira & Sasaki, l. c.*: Symplocos wikstroemiifolia.

BOCAGEOPSIS R. E. Fries in Acta Hort. Berg. x. 143 (1931). *ANNONACEAE.*
canescens (*Spruce*) *R. E. Fries, l. c.* 147: Bocagea canescens.
mattogrossensis (*R. E. Fries*) *R. E. Fries, l. c.*: Bocagea mattogrossensis.
multiflora (*Mart.*) *R. E. Fries, l. c.* 145: Bocagea multiflora.

BOEA Comm. ex Lam. (Gesneriac.).
Evrardii *Pellegr. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 758.—Indo-China (Anam).

BOEHMERIA Jacq. (Urticac.).
anisoneura *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 107.—N. Hebrides.
Martii *Colla, Herb. Pedem.* v. 153 (1836).—Bras.
oblongata *Biroli ex Colla, l. c.* 152.—Hab.?
pallida (*Rusby*) *Killip in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 347: Phenax pallida.
paraspicata *Nakai, Rep. Veg. Mt. Apoi, Hidaka*, 19 (1930); cf. *Hara in Journ. Jap. Bot.* 1933, ix. 251.—Japon.
pseudo-Sieboldiana *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 469.—Japon.
utilis *E. André in Rev. Hort.* 1890, lxii. 184, fig. 56.—Hab.?

BOERHAVIA L. (Nyctaginac.).
acutifolia (*Choisy*) *J. W. Moore in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu*, x. No. 19, 6 (1934): B. diffusa var. acutifolia.
procumbens *Banks ex Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 148 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 146 (1832).—Ind. or. (Bengal).
Weberbaueri *Heimerl in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 460 (1932).—Peruv.

BOERLAGIODENDRON Harms (Araliac.).
mariannense *Kanehira, Fl. Micrones.* 288 (1933), japonice; *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 676, latine.—Ins. Marian. (Rota).

BOERLAGIODENDRON:—
pachyphyllum *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 401.—Ins. Palau.
truncatum *Kanehira, l. c.* 403.—Ins. Palau.

BOISDUVALIA Spach (Onagrac.).
pygmaea (*Speg.*) *Munz in Physis*, xi. 278 (1933): Oenothera pygmaea.

BOISSIERA Hochst. & Steud. (Gramin.).
squarrosa (*Soland.*) *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 30 (1934): Pappophorum squarrosum.

BOLANDRA A. Gray (Saxifragac.).
imnahaënsis *Peck in Rhodora*, 1934, xxxvi. 266.—U.S.A. (Oregon).

BOLBOSCHOENUS Palla (Cyperac.).
macrostachys (*Willd.*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 145 (1928): Scirpus macrostachys.

BOLDEA Juss. (Monimiac.).
Boldus (*Molina*) *Looser in Rev. Univ. Chile*, xx. 572 (1935); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 149: Peumus Boldus.

BOLDU Feuill. ex Adans. (Monimiac.).
Boldus (*Molina*) *Lyons, Plant Names Scientific & Popular*, 65 (1900): Peumus Boldus.

BOLIVARIA Cham. & Schlecht. (Oleac.).
longiflora *Engelm. ex Steyerm. in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1932, xix. 144, in syn.: Menodora longiflora.

BOLUSIA Benth. (Legumin.).
resupinata *Milne-Redhead in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3246 (1934).—N. Rhodesia.

BOMAREA Mirb. (Amaryllidac.).
angustissima *Killip in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1932, xxii. 60.—Peruv.
campanuliflora *Killip, l. c.* 1935, xxv. 371.—Peruv.
campylophylla *Killip, l. c.* 374.—Peruv.
caudata *Killip, l. c.* 1932, xxii. 59.—Peruv.
dolichocarpa *Killip, l. c.* 62.—Peruv.
Hazeni *Killip, l. c.* 1935, xxv. 376.—Colomb.
inaequalis *Killip, l. c.* 377.—Colomb.
incana *Killip, l. c.* 372.—Colomb.
nematocaulon *Killip, l. c.* 1932, xxii. 60.—Peruv.
Pennellii *Killip, l. c.* 1935, xxv. 374: B. longipes *Kraenzl.*
perlongipes *Killip, l. c.* 375.—Colomb.
Porschiana *Cufod. in Archiv. Bot., Forli*, 1933, ix. 187.—Costa Rica.
Schultzei *Killip in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 376.—Colomb.
speciosa *Killip, l. c.* 1932, xxii. 61.—Peruv.
subsessilis *Killip, l. c.* 1935, xxv. 373.—Boliv.
trichophylla *Killip, l. c.* 375.—Colomb.
uniflora (*M. Roem.*) *Killip, l. c.* 372: Wichaurea dulcis var. uniflora.
vegasana *Killip, l. c.* 373.—Colomb.
zosterifolia *Killip, l. c.* 372.—Peruv.

BOMBAX L. (Bombacac.; Malvac., Gen. Pl.).
Encephalartos *Hort. ex Schuster in Engl. Pflanzenreich, Cycadac.* 112 (1932), in syn.: Encephalartos Altensteinii.
minus (*Sims*) *Ducke in Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro*, vi. 65 (1933): Carolinea minor.
sclerophyllum *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 58 (1935).—Bras. (Amaz.).

BONAMIA Thou. (Convolvulac.).
multicaulis (*Brandegee*) *House in Bull. N. Y. State Mus.* 1920, Nos. 233–4, 62 (1921): Breweria multicaulis.
peruviana *v. Ooststr. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 192.—Peruv.
Vignei *Hoyle in Kew Bull.* 1934, 188.—Gold Coast.

BONATEA Willd. (Orchidac.).
ugandae *Rolfe*; *Summerhayes in Kew Bull.* 1931, 383, descr.—Congo Belg.; Uganda; Kenya Col.

BONNETIA Mart. & Zucc. (Theac.; Ternstroemiac., Gen. Pl.).
crassa *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 395.—Venez.
longifolia *Gleason, l. c.* 396.—Venez.
tristyla *Gleason, l. c.*—Venez.

BONNIERELLA R. Viguier (Araliac.).
reflexa (*J. W. Moore*) *J. W. Moore in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu*, x. No. 19, 6 (1934): Polyscias reflexa.

BONYUNIA Schomb. (Loganiac.).
aquatica *Ducke in Arquiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, i. 211 (1935).—Bras. (Amaz.).
cinchonoides *Gleason & Standley in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 448.—Venez.

BOOPIS Juss. (Calycerac.).
Juergensii *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 101 (1931).—Bras. (Rio Grande do Sul).

BORAGO L. (Boraginac.).
laxiflora (*DC.*) *Fisch. Cat. Hort. Gorenk.* 27 (1808); *Poir. Dict.* Suppl. i., 693 (1810); *Willd. Enum.* Suppl., 9 (1813); *Hornem. Hort. Bot. Hafn.* i. 181 (1813): Anchusa laxiflora.
spinulosa *Roxb. Hort. Beng.* 13 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 11 (1824): *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 459 (1832).—Ind. or. (Bengal).

BORONELLA Baill. (Rutac.).
crassifolia *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 689.—N. Caled.

BORONIA Sm. (Rutac.).
koniambiensis *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1932, lxxvii. Beibl. 19, 198.—N. Caled.

BORRERIA G. F. W. Mey. (Rubiac.).
Anderssonii *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 245 (1931).—Ecuador.
Balansae *Standley, l. c.* viii. 389 (1931).—Parag.
Bequaerti *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 432 (1932).—Congo Belg.
Brittonii *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 388 (1931): B. saxicola *Britton.*
Brownii (*Rusby*) *Standley, l. c.* vii. 333 (1931): Spermacoce Brownii.
Chodatiana *Standley, l. c.* viii. 393 (1931).—Parag.; Bras. (Paraná).
clinopodioides *Standley, l. c.* 391.—Bras. (Matto Grosso; Pernambuco).
compressa (*Afzel.*) *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 133, in clavi, 135 (1931): Spermacoce compressa.
filiformis (*Hiern*) *Hutchinson & Dalziel, l. c.*: Spermacoce filiformis.
lagunensis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 67 (1933–5).—Calif. infer.
liliifolia *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 392 (1931).—Bras. (S. Paulo).
luteovirens *Standley, l. c.*—Bras. (Rio Grande do Sul).
mitreoloides *Standley, l. c.* 395.—Bras. (Matto Grosso).
monticola *Mildbr. ex Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 135 (1931), in syn.: B. Ruelliae.
Ostenii *Standley in Ostenia*, 119 (1933).—Argent.
setidens (*Miq.*) *Boldingh, Zakfl. Landbouwstr. Java*, 156 (1916); *Ridley in Journ. As. Soc. Straits*, lxxxvi. 298 (1922): Bigelovia setidens.
Splitgerberi *Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 307.—Guiana Bat.
stachydea (*DC.*) *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 133, in clavi, 135 (1931): Spermacoce stachydea.
valens *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 390 (1931).—Bras. (Minas Geraes).
vulpina *Standley, l. c.* 389.—Bras. (Matto Grosso).
xanthophylla *Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 306.—Guiana Bat.

BORYA Labill. (Liliac.).
subulata *C. A. Gardner in For. Dep. Bull., W. Austral.* No. 32, 38 (1923).—W. Austral.

BORZICACTUS Riccob. (Cactac.).
eriotrichus (*Werderm. & Backeb.*) *Backeb. in Kakteenfreund*, iii. 121 (Nov. 1934); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 146; *Backeb. in Cact. Journ.* iii. 26 (Dec. 1934): Cereus eriotrichus.
Faustianus *Backeb. in Desert*, v. 4 (1933); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 140; *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 193, 411 (1935).—Peruv.

BORZICACTUS :—
Faustinianus *Backeb. in Cactus Journ.* iii. 26 (1934), an praec.—Peruv.
Jajoianus *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 194, 411 (1935).—Peruv.
laniceps *Backeb. in Cact. & Succ. Journ. Amer.* iii. 132 (1932), in obs.—Peruv.
Zanderi *Backeb. in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1931, xlvi. 187, in obs.—Peruv.

BOSCHIA Korth. (Bombacac.; Malvac., Gen. Pl.).
oblongifolia *Ridley in Kew Bull.* 1933, 488.—Borneo.

BOSCHNIAKIA C. A. Mey. (Orobanchac.).
rossica (*Cham. & Schlecht.*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 325 (1931): Orobanche rossica.

BOSCIA Lam. (Capparidac.).
Gossweileri *Exell in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. Suppl., 11.—Angola.
Seineri *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 242, fig. 158, d–f (1915).—Hab.?
tomentella *Chiov. Fl. Somala*, II. 464 (1932).—Somal. Ital.

BOSQUEIA Thou. (Morac.; Urticac., Gen. Pl).
Carvalhoana *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 33 (1915), in obs.—Afr. Lusit. Or.
cerasiflora *Volkens ex Engl. in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* i. 36 (1898).—Tanganyika Terr.

BOSWELLIA Roxb. (Burserac.).
Holstii *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 786 (1915), in obs.—Tanganyika Terr.
microphylla *Chiov.*; *Chiov. Fl. Somala*, II. 51 (1932), descr. ampl.—Somal. Ital.
Ruspoliana *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 423 (1931).—Somaliland.
undulato-crenata (*Engl.*) *Engl. l. c.* 422: B. Carteri var. undulato-crenata.

BOTHRIOCHLOA Kuntze (Gramin.).
decipiens (*Hackel*) *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 444: Andropogon pertusus var. decipiens.
erianthoides (*F. Muell.*) *C. E. Hubbard, l. c.*: Andropogon erianthoides.
Ewartiana (*Domin*) *C. E. Hubbard, l. c.*: Andropogon Ewartianus.
glabra (*Roxb.*) *A. Camus in Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1930, n. s. lxxvi. 164 (1931): Andropogon glaber.
insculpta (*Hochst.*) *A. Camus, l. c.* 165: Andropogon insculptus.
intermedia (*R. Br.*) *A. Camus, l. c.* 164: Andropogon intermedius.
odorata (*Lisboa*) *A. Camus, l. c.* 165: Andropogon odoratus.
pertusa (*Willd.*) *A. Camus, l. c.* 164: Andropogon pertusus.
radicans (*Lehm.*) *A. Camus, l. c.*: Andropogon radicans.
saccharoides (*Sw.*) *Rydb. in Brittonia*, i. 81 (1931): Andropogon saccharoides.
venusta (*Thwait.*) *A. Camus in Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1930, n. s. lxxvi. 165 (1931): Andropogon venustus.
Woodrovii (*Hook. f.*) *A. Camus, l. c.*: Andropogon Woodrovii.

BOTHRIOSPERMUM Bunge (Boraginac.).
majusculum (*Hayata*) *Suzuki in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard.* 1931, i. 169: B. tenellum var. majusculum.

BOTRYANTHUS Kunth (Liliac.).
amoenus *Heldr. ex Hayek in Fedde, Repert. Beih.* xxx. III. 91 (1932), in syn.: Muscari pulchellum var. amoenum *Heldr.*

BOTRYARRHENA Ducke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xi. 476 (1932). *RUBIACEAE.*
pendula *Ducke, l. c.* 477.—Bras. (Amaz.).

BOTRYOPLEURON Hemsl. (Scrophulariac.).
formosanum *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1931, iii. 114.—Formosa.
Kitamurae (*Ohwi*) *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 128: Calorhabdos Kitamurae.

BOTRYOPLEURON :—
liukiuense *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 53 (1934).—Ins. Liukiu.
Tagawae *Ohwi, l. c.*—Japon. (Hondo).

BOTRYOSTEGE Stapf in Kew Bull. 1934, 194. *ERICACEAE.*
bracteata (*Maxim.*) *Stapf, l. c.*: Tripetaleia bracteata.

BOUCEROSIA Wight & Arn. (Asclepiadac.).
Simonis *Hort. ex A. White & Sloane, Stapel.* 191 (1933), in syn.: Caralluma europaea var. Simonis *Berger.*

BOUCHEA Cham. (Verbenac.).
boliviana (*Kuntze*) *Moldenke in Phytologia*, i. 18 (1933): Valerianodes boliviana.
flabelliformis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 67 (1933–5).—Calif. infer.
inopinata *Moldenke in Fedde, Repert.* xxxvii. 214 (1934).—Bras.
notabilis *Moldenke, l. c.* 215.—Colomb.
Rusbyi *Moldenke in Torreya*, 1934, xxxiv. 8: B. incisa *Rusby.*

BOUGAINVILLEA Comm. corr. Spach (Nyctaginac.).
Lehmanniana *Heimerl in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 466 (1932).—Ecuador.
pachyphylla *Heimerl ex Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 308 (1931).—Peruv.
Trolli *Heimerl in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 464 (1932).—Boliv.

BOURDARIA A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 1932, Sér. II. iv. 681. *MELASTOMATACEAE.*
Felicis *A. Cheval. l. c.* 682.—Guinea Gall.

BOURRERIA P. Br. (Boraginac.).
[Vide BEURRERIA.]

BOUSSINGAULTIA H. B. & K. (Basellac.; Chenopodiac., Gen. Pl.).
cordifolia (*Moq.*) *Volkens in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* iii. 1 a. 128 (1893): Tandonia cordifolia.
diffusa (*Moq.*) *Volkens, l. c.*: Tandonia diffusa.
Volkensii *Ulbr. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 269 (1934): B. cordifolia *Volkens.*
Weberbaueri *Ulbr. l. c.* 270.—Peruv.

BOUTELOUA Lag. (Gramin.).
annua *Swallen in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 414.—Calif. infer.
pectinata *Featherly in Bot. Gaz.* 1931, xci. 103.—U.S.A. (Oklahoma; Texas).
rigidiseta (*Steud.*) *Hitchcock in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1933, xxiii. 453: Aegopogon rigidisetus.

BOUVARDIA Salisb. (Rubiac.).
capitata *Bullock in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3296 (1935).—Mexico.
cataphyllaris *Bullock, l. c.* t. 3297.—Mexico.
corymbiflora *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 427 (1894), in syn.: B. longiflora.
orizabensis *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 334 (1931).—Mexico.

BOWIEA Harv. ex Hook. f. (Liliac.).
kilimandscharica *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 202 (1934).—Tanganyika Terr.

BOWLESIA Ruiz & Pav. (Umbellif.).
flabilis *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 32 (1931).—Peruv.

BRACHANTHEMUM DC. (Compos.).
gobicum *Kraschen. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 177 (1933).—Mongol.

BRACHIARIA Griseb. (Gramin.).
antsirabensis *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1930, lxxvii. 640 (1931).—Madag.
Bequaertii *Robyns in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 177 (1932).—Congo Belg.
Bovonei (*Chiov.*) *Robyns, l. c.* 174: Panicum Bovonei.
clavipila (*Chiov.*) *Robyns, l. c.* 179: Panicum clavipilum.
deflexa (*Schum.*) *C. E. Hubbard ex Robyns, l. c.* 181: Panicum deflexum.

BRACHIARIA :—
Emini (*Mez*) *Robyns in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 176 (1932): Panicum Emini.
fragrans *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1935, lxxxii. 22.—Madag.
Gilesii (*Benth.*) *Chase in Contrib. U.S. Nat. Herb.* xxii. 35 (1920), in obs.: Panicum Gilesii.
Humbertiana *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 844 (1933).—Madag.
laeta (*Mez*) *A. Camus, l. c.* 1935, lxxxii. 22, in obs.: Panicum laetum.
miliiformis (*Presl*) *Chase in Contrib. U.S. Nat. Herb.* xxii. 35 (1920): Panicum miliiforme.
Perrieri *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1930, lxxvii. 639 (1931).—Madag.
platynota (*K. Schum.*) *Robyns in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 174 (1932): Panicum platynotum.
praetervisa (*Domin*) *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 446: Panicum praetervisum.
semiverticillata (*Rottl.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 318 (1931): Panicum semiverticillatum.
stipitata *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1933, 498.—Guinea Gall.
stolonifera *Goossens in Kew Bull.* 1934, 195.—Afr. austr. (Cape Prov.).
subquadripara (*Trin.*) *Hitchcock in Lingnan Sc. Journ.* vii. 214 (1931): Panicum subquadriparum.
umboënsis *Stent & Rattray in Proc. Rhodes. Scientif. Assoc.* xxxii. (*Stent & Rattray, Grasses S. Rhodes.*) 23 (1933).—S. Rhodesia.
Verdickii *Robyns in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 179 (1932).—Congo Belg.
Whiteana (*Domin*) *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 446: Panicum Whiteanum.
Wittei *Robyns in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 180 (1932).—Congo Belg.

BRACHIONIDIUM Lindl. (Orchidac.).
longicaudatum *Ames & C. Schweinf. in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 348.—Venez.

BRACHIONOSTYLUM Mattf. in Nova Guinea, xiv. 527 (1932). *COMPOSITAE.*
Pullei *Mattf. l. c.* 528.—N. Guin.

BRACHIOSTEMON Hand.-Mazz. in Sinensia, v. 9 (1934). *GESNERIACEAE.*
macrocalyx *Hand.-Mazz. l. c.* 10.—China (Kwangsi).

BRACHISTUS Miers (Solanac.).
fuscoviolaceus *Cufod. in Archiv. Bot., Forli*, 1934, x. 44.—Costa Rica.
poasensis *Cufod. l. c.* 45.—Costa Rica.

BRACHYACHNE Stapf (Gramin.).
chrysolepis *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 436.—Uganda.
ciliaris (*Benth.*) *C. E. Hubbard, l. c.* 448: Cynodon ciliaris.
fibrosa *C. E. Hubbard, l. c.* 1933, 502.—Tanganyika Terr.
obtusiflora (*Benth.*) *C. E. Hubbard, l. c.* 503, in obs.: Microchloa obtusiflora.
patentiflora (*Stent & Rattray*) *C. E. Hubbard, l. c.*, in obs.: Microchloa patentiflora.
tenella (*R. Br.*) *C. E. Hubbard, l. c.* 1934, 448: Cynodon tenellus.

BRACHYAPIUM (Baill.) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, 1932, xxiii. 186. *UMBELLIFERAE.*
[CARUM Sect. BRACHYAPIUM Baill.]
dichotomum (*L.*) *Maire, l. c.*: Pimpinella dichotoma.
Hanotei (*Braun-Blanquet & Maire*) *Maire, l. c.*: Tragiopsis Hanotei.
involucratum (*Maire*) *Maire, l. c.*: Trachyspermum involucratum.
Pomelianum (*Maire*) *Maire, l. c.*: Trachyspermum Pomelianum.

BRACHYELYTRUM Beauv. (Gramin.).
Pringlei *Vasey ex Beal, Grasses N. Amer.* ii. 266 (1896), in syn.: Muehlenbergia Trinii.

BRACHYLEPIS C. A. Mey. (Chenopodiac.).
ferganica (*Drobov*) *Ulbr. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 577 (1934): Anabasis ferganica.
ramosissima (*Minkw.*) *Ulbr. l. c.*: Anabasis ramosissima.

BRACHYLOPHON Oliv. (Malpighiac.).
acuminatus (*Engl.*) *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 829 (1915), in obs.: Triaspis acuminata.

BRACHYOTUM Triana (Melastomatac.).
barbiferum *Rusby in Phytologia*, i. 69 (1934).—Boliv.

BRACHYPODIUM Beauv. (Gramin.).
×Ambrosii *Sennen in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xv. Ser. Bot. No. 1, 41 (1931), in obs.—Hispan.
annuum *Sennen in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1932, xxiii. 265, in obs.: B. distachyum.
×Apollinaris *Sennen in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xv. Ser. Bot. No. 1, 41 (1931), in obs.—Hispan.
Arbuscula *Gay ex St.-Yves in Candollea*, v. 468 (1934), in syn.: B. ramosum var. Arbuscula *St.-Yves*.
brachystachyum *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1218 (1895), in syn.: Agropyron cristatum.
capillifolium *Sennen in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1932, xxiii. 273, in obs., nomen subnudum.—Marocc.
×Cugnacii *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 100.—Gallia.
×Diazi *Sennen in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xv. Ser. Bot. No. 1, 41 (1931), in obs.—Hispan.
×Frenchii *Sennen ex St.-Yves in Candollea*, v. 452 (1934), in obs.—Hispan.
Hickelis *Sennen ex St.-Yves, l. c.* 441, in obs.—Gallia.
manschuricum *Kitagawa in Journ. Jap. Bot.* ix. 108, 117 (1933).—Manchur.
polystachyum *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 134 [1933], in syn.: B. distachyum.
Pringlei *Scribn. ex Beal, Grasses N. Amer.* ii. 627 (1896).—Mexico.
rigidum *Sennen in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xv. Ser. Bot. No. 1, 41 (1931), in obs., nomen.—Hispan.
scoparium *Sennen, l. c.*, in obs., nomen.—Hispan.
serpentini *C. E. Hubbard in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3280 (1935).—Albania.
velutinum *Sennen in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xv. Ser. Bot. No. 1, 41 (1931), in obs., nomen; *et in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 94.—Hispan.
×Willkommii *Sennen ex St.-Yves in Candollea*, v. 467 (1934), pro syn.: B. ramosum var. gigas *St.-Yves*.
×Wilsonis *Sennen ex St.-Yves, l. c.* 466, in syn.: B. ramosum var. gigas *St.-Yves*.

BRACHYPREMNA Gleason in Rec. Trav. Bot. Néerl. 1935, xxxii. 204. *MELASTOMATACEAE.*
petiolata *Gleason, l. c.*—Guiana Bat.

BRACHYSTEGIA Benth. (Legumin.).
Schliebenii *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 508 (1935).—Tanganyika Terr.

BRACHYSTELMA R. Br. (Asclepiadac.).
atacorense *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 275 (1917).—Dahomey.
hirtellum *Weimarck in Bot. Notiser*, 1935, 406.—S. Rhodesia.

BRACISEPALUM J. J. Smith in Engl. Jahrb. lxv. 464 (1933). *ORCHIDACEAE.*
selebicum *J. J. Smith, l. c.* 465.—Celebes.

BRACTEOLA Swallen in Am. Journ. Bot. 1933, xx. 118. *GRAMINEAE.*
lucida *Swallen, l. c.*—Angola.
orientalis *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 117.—Kenya Col.; Tanganyika Terr.
subaequigluma (*Rendle*) *C. E. Hubbard, l. c.*, in obs.: Chloris subaequigluma.

BRADEA Standley in Arch. Mus. Nac. Rio de Janeiro, 1932, xxxiv. 122. *RUBIACEAE.*
brasiliensis *Standley, l. c.* 123.—Bras. (Rio de Janeiro).

BRAHEA Mart. (Palmae).
Berlandieri *H. H. Bartlett in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 31 (1935).—Mexico.
Conzattii *H. H. Bartlett, l. c.* 30.—Mexico.

BRAHEA :—
psilocalyx *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1037 (1934).—Brit. Honduras.
robusta *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1149 (1895), in syn.: Washingtonia filamentosa.

BRASILOCALAMUS Nakai in Journ. Jap. Bot. ix. 10 (1933), in adnot. *GRAMINEAE.*
pubescens (*Doell*) *Nakai, l. c.*, in adnot.: Bambusa pubescens.

BRASSAIOPSIS Decne. & Planch. (Araliac.).
gracilis *Hand.-Mazz. in Sinensia*, iii. 197 (1933).—China (Kwangsi).
tripteris (*Léveillé*) *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1934, xv. 115: Heptapleurum tripteris.

BRASSICA L. (Crucif.).
bursipastorifolia (*Pourr. ex Willk. & Lange*) *G. Sampaio in Ann. Acad. Polyt. Porto*, xiv. 148 (1921), in adnot.: Heliophila bursipastorifolia.
Christobalis *Sennen in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 184, in obs., nomen.—Marocc.
Desnottesii *Emberger & Maire; Emberger & Maire in Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc*, Nos. xxi–xxii. 23 (1930).—Marocc.
foliata *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1928, No. 129 [1929].—Marocc.
nudicaulis (*Lag.*) *Gonz.-Albo in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.* 1935, xxxv. 183: Sinapis nudicaulis.
rupicola *Bouloumoy, Fl. Lib. & Syr.* 27 (1930).—Syria.
Viciosoi *Gonz.-Albo in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.* 1935, xxxv. 184.—Hispan.

BRASSICELLA Fourr. (Crucif.).
coincyoides *Humbert & Maire, Contrib. Étude Fl. Afr. Nord*, Fasc. 11, Addend., No. 232 (1930).—Marocc.

BRASSIOPHOENIX Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xii. 345 (1935). *PALMAE.*
drymophloeoides *Burret, l. c.* 346.—N. Guin.

BRAUNERIA Neck. (Compos.).
heterophylla (*D. Don*) *Lyons, Plant Names Scientific & Popular*, ed. 2, 510 (1907): Echinacea heterophylla.
serotina (*Sweet*) *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 107 (1924): Rudbeckia serotina.

BRAUNSIA Schwantes (Ficoidac.).
edentula (*Haw.*) *N. E. Brown in N. E. Brown, Tisch. & Karst. Mesembr.* 126 (1931): Mesembryanthemum edentulum.

BRAYA Sternb. & Hoppe (Crucif.).
Boryi (*Boiss.*) *Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse et Belg.* i. 70 [1912]: Arabis Boryi.
brevicaulis *Schmid in Fedde, Repert.* xxxi. 48 (1932).—Tibet.
glaberrima *Rothmaler in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.* 1934, xxxiv. 148, in syn.: Phryne glaberrima.
Henryae *Raup in Contrib. Arn. Arb.* No. vi. 167 (1934).—Canada bor.-occ.
hirta (*L.*) *Fernald in Rhodora*, 1934, xxxvi. 338, in adnot.: Draba hirta.
kokonorica *O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 209 (1934).—Tibet.
Lapeyrousiana (*Rouy & Fouc.*) *Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse et Belg.* i. 70 [1912]: Sisymbrium Lapeyrousianum.
Trinkleri *Schmid in Fedde, Repert.* xxxi. 48 (1932).—Kashmir.

BRAYULINEA Small (Amaranthac.).
australis (*Griseb.*) *Schinz in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 65 (1934): Gossypianthus australis.
gracilis (*R. E. Fries*) *Schinz, l. c.*: Guilleminea gracilis.

BREDEMEYERA Willd. (Polygalac.).
fruticulosa *Kassau, Beitr. Syst. Polygal. Gatt. Berück. Vork. Saponin*, 37 (1931); *Kassau in Fedde, Repert.* xxxv. 160 (1934).—Argent.

BREDIA Blume (Melastomatac.).
Cavaleriei (*Léveillé*) *Diels in Engl. Jahrb.* lxv. 110 (1932): Barthea Cavaleriei.
Fordii (*Hance*) *Diels, l. c.*: Otanthera Fordii.
gracilis (*Hand.-Mazz.*) *Diels, l. c.*: Fordiophytum gracile.

BREDIA :—
longiloba (*Hand.-Mazz.*) *Diels in Engl. Jahrb.* lxv. 111 (1932): Fordiophytum gracile var. longilobum.
Pricei *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* xii. Suppl., 153 (1933).—China (Fokien).
sepalosa *Diels in Engl. Jahrb.* lxv. 109 (1932).—China (Kwangsi).
tuberculata (*Guillaumin*) *Diels, l. c.* 111: Fordiophytum tuberculatum.
velutina *Diels, l. c.* 109.—China (Yunnan).
yunnanensis (*Léveillé*) *Diels, l. c.* 111: Blastus yunnanensis.

BREVIEA Aubrév. & Pellegr. in Bull. Soc. Bot. France, 1934, lxxxi. 792 (1935). *SAPOTACEAE.*
sericea (*A. Cheval.*) *Aubrév. & Pellegr. l. c.* 793, cum descr.: Chrysophyllum sericeum.

BREXIA Nor. (Saxifragac.).
apoda *H. Perrier in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 204.—Madag.
arborea *H. Perrier, l. c.* 203.—Madag.
decurrens *H. Perrier, l. c.* 200.—Madag.
montana *H. Perrier, l. c.* 201.—Madag.

BREXIELLA H. Perrier in Bull. Soc. Bot. France, 1933, lxxx. 204. *SAXIFRAGACEAE.*
acutifolia *H. Perrier, l. c.* 210.—Madag.
cymosa *H. Perrier, l. c.* 207.—Madag.
ilicifolia *H. Perrier, l. c.*—Madag.
longipes *H. Perrier, l. c.* 209.—Madag.
obcuneata *H. Perrier, l. c.*—Madag.

BREYNIA J. R. & G. Forst. (Euphorbiac.).
fruticosa (*Muell.-Arg.*) *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. 331 (1887), in obs.: Melanthesopsis fruticosa.
Vitis-Idaea (*Burm. f.*) *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1932, 65: Rhamnus Vitis-Idaea.

BRICKELLIA Ell. (Compos.).
cayucensis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 71 (1933–5).—Calif. infer.
diffusa *M. E. Jones, l. c.*—Mexico.
megaphylla *M. E. Jones, l. c.*—Calif. infer.
Shineri *M. E. Jones, l. c.* 22.—Mexico.
umbellata (*Greene*) *Rydb. in Brittonia*, i. 98 (1931): Coleosanthus umbellatus.
undonis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 71 (1933–5).—Calif. infer.

BRIDELIA Willd. (Euphorbiac.).
Aubrevillei *Pellegr. in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 683 (1932).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
brideliifolia (*Pax*) *Fedde ex Pax in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 45 (1921), in obs.: Neogoetzea brideliifolia.
somalensis *Hutchinson in Kew Bull.* 1931, 413.—Somaliland.

BRIDGESIA Backeb. Blätter Kakteenforsch. 1934, Pt. 3, [p. 5], sine descr. *CACTACEAE.*
Cumingii (*Hopf.*) *Backeb. l. c.*: Echinocactus Cumingii.
polyrhaphis (*Pfeiff. ex Salm-Dyck*) *Backeb. l. c.* 1935, Pt. 12, [p. 2]: Echinocactus polyraphis.
villosa (*Labouret*) *Backeb. l. c.*: Echinocactus villosus.

BRIDGESIA Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. 168 (1832). *PHYTOLACCACEAE.*
[Ercilla A. Juss.]
spicata (*Bert.*) *Hook. & Arn. l. c.* 169: Galvezia spicata.

BRIGGSIA Craib (Gesneriac.).
crenulata *Hand.-Mazz. in Sinensia*, v. 20 (1934).—China (Kweichau).

BRILLANTAISIA Beauv. (Acanthac.).
bauchiensis *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 253, in clavi, 254 (1931).—Nigeria.

BRIMEURA Salisb. (Liliac.).
fastigiata (*Bertol.*) *Chouard in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 177: Hyacinthus fastigiatus.

BRINDONIA Thou. (Guttif.).
oxycarpa *Thou. Hist. Veg. Isles Austr. Afr.* ed. 2, t. 27 (1805); *Hiern in Journ. Bot.* 1900, xxxviii. 493: Garcinia indica.

BRIQUETINA Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago, Bot. Ser., xi. 26 (1931). *ICACINACEAE.*
Incarum *Macbride, l. c.*—Peruv.

BRITTONASTRUM Briq. (Labiat.).
triphyllum (*Moench*) *Lyons, Plant Names Scientific & Popular*, ed. 2, 81 (1907): Cedronella triphylla.

BRITTONIA Hort. ex Journ. Cact. & Succ. Soc. Amer. ii. 407, tab. (1931), sine descr.; Houghton ex C. A. Armstr. in Cactus Journ. ii. 64 (1934). *CACTACEAE.*
Davisii *Hort. l. c.*; *Houghton ex C. A. Armstr. l. c.* —U.S.A. (Texas); Mexico.

BRIZA L. (Gramin.).
Clusii *Foucault in Desv. Journ. de Bot.* iii. [No. 5] 211 [1816].—Gallia.
gracilis *Nicholson, Ill. Dict. Gard.* i. 212 (1884), in syn.: B. minor.

BROCCHINIA Schult. f. (Bromeliac.).
prismatica *L. B. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 337.—Venez.

BRODIAEA Sm. (Liliac.).
coronaria (*Salisb.*) *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1116 (1895), in syn.: Hookeria coronaria.
dissimulata *Peck in Torreya*, 1932, xxxii. 147.—U.S.A. (Oregon).
Felipponei (*Beauverd*) *Herter, Fl. Urug. Pl. Vasc.* (*Estud. Bot. Reg. Urug.* iv.) 47 (1931): Nothoscordum Felipponei.
Leachiae *Peck in Torreya*, 1932, xxxii. 147.—U.S.A. (Oregon).

BROMELIA L. (Bromeliac.).
daguensis *Hort. ex C. Cheval. in Bull. Soc. Nat. Hort. France*, 1935, Sér. VI. ii. 206, in syn.: Aechmea Germinyana.
macrodonta *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 964 (1895), in syn.: Ananas macrodontes.

BROMHEADIA Lindl. (Orchidac.).
crassiflora *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 149 (1931).—Borneo.
tenuis *J. J. Smith in Brittonia*, i. 110 (1931).—Borneo.

BROMUS L. (Gramin.).
atlanticus *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 13 (1932).—Marocc.
barbatoides *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 614 (1896): Trisetum barbatum *Steud.*
Bertolae *Colla, Herb. Pedem.* vi. 67 (1836).—Ital.
bonassorum *Bornm. in Verh. Bot. Ver. Brand.* 1932–3, lxxiv. 188 (1933).—Ross. occ.
Brauni *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 134 [1933], nomen.—Marocc.
coarctatus *Hort. ex Colla, Herb. Pedem.* vi. 68 (1836), in obs.—Hab.?
Dardori *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 133 [1933], nomen.—Marocc.
Degenii *Pénzes in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 23.—Mesopotam.
delicatulus *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 134 [1933], nomen.—Marocc.
× Fischeri *Cugnac & A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 339.—Gallia.
gracilis *Popov in Trans. Turkest. Univ., Tashkent*, No. 4 (*Vég. Monts Sary-Taou, etc.*) 46 (1922), nomen.—Turkestan.
× granatensis *A. Camus* in *Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 38.—Hispan.
Javorkae *Pénzes in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 23.—Aegypt.
laciniatus *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 615 (1896).—Mexico.
× Litvinovii *Roshev. ex Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 25 (1934).—As. centr.
maroccanus *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 79 [1928].—Marocc.
microchaetus *Font Quer in Cavanillesia*, iv. 26 (1931).—Marocc.
Moellendorffianus (*Aschers. & Graebn.*) *Hayek in Fedde, Repert. Beih.* xxx. III. 208 (1932): B. erectus subsp. Moellendorffianus.
Moeszii *Pénzes in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 24.—Persia.
monocladus *Domin in Mém. Soc. Sc. Bohême*, 1932, No. 14, 1 (1933).—Czechoslovak.
Pavlovii *Roshev. in North Mongol. I. Prelim. Rep. Exped. 1925*, 162 (1926); *Komarov, Fl. URSS*, ii. 559 (1934), in syn.: B. irkutensis.

BROMUS :—
pendulinus *Brouss. ex Hornem. Hort. Reg. Bot. Hafn*, i. 100 (1813).—Mexico.
pendulinus *Sessé ex Lagasca, Gen. et Sp. Pl.* 4 (1816), an praec.—Mexico.
permixtus *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 14 (1932).—Marocc.
Popovii *Drobov in Vved. et al. Key Fl. Tashkent*, 38 (1923); *et in Fedde, Repert.* xxi. 40 (1925).—Turkestan.; Bokhara.
pseudodanthoniae *Drobov, l. c.*; *et l. c.* 39.—Turkestan.
Reimanni *Aschers. & Graebn. Syn. Mitteleur. Fl.* ii. Abth. 1, 590 (1901).—Hungar.
remotiflorus (*Steud.*) *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 58: Festuca remotiflora.
× Rosettae *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 101.—Gallia.
× segoviensis *A. Camus, l. c.* 1933, lxxx. 39.—Hispan.
sericeus *Drobov in Vved. et al. Key Fl. Tashkent*, 36 (1923); *et in Fedde, Repert.* xxi. 39 (1925).—Turkestan.; Bokhara.
turkestanicus *Drobov, l. c.* 35; *et l. c.* 37.—Turkestan.
tytthanthus *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 30 (1934).—Turkestan. (Thian Shan).
tyttholepis *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 563 (1934).—As. centr.
ugamicus *Drobov in Vved. et al. Key Fl. Tashkent*, 36 (1923); *et in Fedde, Repert.* xxi. 40 (1925).—Transcasp.; Turkestan.
valdefissus *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 134 [1933], nomen.—Marocc.
Viciosoi *Sennen in Sennen & Mauricio, l. c.*—Marocc.
Victorini *Sennen & Mauricio, l. c.* 133, nomen.—Marocc.
yezoënsis *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 30.—Ins. Kuril.

BROSIMOPSIS S. Moore (Morac.).
obovata *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 722.—Bras. (Amaz.).

BROSIMUM Sw. (Morac.; Urticac., Gen. Pl.).
amplicoma *Ducke in Tropical Woods*, 1932, No. 31, 10.—Bras. (Amaz.).
latifolium *Standley in Tropical Woods*, 1935, No. 42, 26.—Ecuador.

BROTOBROMA Karst. & Triana in Triana, Nuev. Jen. i Esp. Fl. Neo-Granad. 11 (1854); Karst. in Linnaea, xxviii. 446 (1857), pro syn.; Sprague in Kew Bull. 1934, 395: **Herrania** Goud. (Sterculiac.).
asperum *Karst. & Triana in Triana, Nuev. Jen. i Esp. Fl. Neo-Granad.* 12 (1854); *Sprague in Kew Bull.* 1934, 395.—Colomb.

BROWALLIA L. (Solanac.).
Roezlii *Nicholson, Ill. Dict. Gard.* i. 214 (1884).—U.S.A. (Rocky Mts.).

BROWNEA Jacq. (Legumin.).
hybrida *Hort. ex Backer, Schoolfl. Java*, 418 (1911).—Java.

BROWNLOWIA Roxb. (Tiliac.).
gamosepala (*Turcz.*) *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 160 (1934): Columbia gamosepala.

BRUCEA J. F. Mill. (Simaroubac.).
sumatrana *Roxb. Hort. Beng.* 12 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 469 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 449 (1832).—Sumatra.

BRUECKEA Klotzsch & Karst. (Verbenac.).
eglandulosa *Klotzsch & Karst. ex Moldenke in Brittonia*, i. 286 (1934), in syn.: Aegiphila verrucosa.
verrucosa *Klotzsch & Karst. ex Moldenke, l. c.*, in syn.: Aegiphila verrucosa.

BRUGMANSIA Pers. (Solanac.).
coccinea *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 734 (1895), in syn.: Juanulloa aurantiaca.

BRUNELLIA Ruiz & Pav. (Brunelliac.; Simaroubac., Gen. Pl.).
brunnea *Macbride in Candollea*, v. 361 (1934).—Peruv.

BRUNELLIA :—
dichapetaloides *Macbride in Candollea*, v. 361 (1934).—Peruv.
dulcis *Macbride, l. c.* 362.—Peruv.

BRUNNICHIA Banks (Polygonac.).
erecta *Aschers. in Jahrb. Bot. Gart. u. Bot. Mus. Berlin*, i. 334 (1881), in adnot.—Gabon.

BRUNSVIGIA Heist. (Amaryllidac.).
appendiculata *Leighton in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 137, 143.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Bosmaniae *Leighton, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).
coranica (*Ker-Gawl.*) *Herb. in Trans. Hort. Soc.* iv. 181 [1821]; *Sweet, Hort. Brit.* ed. 1, 404 (1827): Amaryllis coranica.
undulata *Leighton in Fl. Pl. S. Afr.* 1934, xiv. t. 552.—Natal.

BRYONOPSIS Arn. (Cucurbitac.).
laciniosa (*L.*) *Naud. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xii. 141 [1860], in obs.: Bryonia laciniosa.

BUBBIA Van Tiegh. (Magnoliac.).
amplexicaulis (*Vieill. ex Parm.*) *Dandy in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 40: Drimys amplexicaulis.
Comptonii (*E. G. Baker*) *Dandy, l. c.* 41: Drimys Comptonii.
odorata (*E. G. Baker*) *Dandy, l. c.*: Drimys odorata.
pauciflora (*E. G. Baker*) *Dandy, l. c.*: Drimys pauciflora.
umbellata (*Ridley*) *Dandy, l. c.*: Drimys umbellata.

BUCERAS P. Br. (Combretac.).
angustifolium (*Jacq.*) *Lyons, Plant Names Scientific & Popular*, 71 (1900): Terminalia angustifolia.
bellirica (*Gaertn.*) *Lyons, l. c.*: Myrobalanus bellirica.
Chebula (*Retz.*) *Lyons, l. c.*: Terminalia Chebula.

BUCHANANIA Spreng. (Anacardiac.).
aruensis *Ridley in Kew Bull.* 1933, 195.—Ins. Aru.
fragrans *Ridley, l. c.*—Borneo.
glaberrima *Ridley, l. c.*—Borneo.

BUCHENAVIA Eichl. (Combretac.).
callistachya *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 64 (1935).—Bras. (Amaz.).
viridiflora *Ducke, l. c.* 63.—Bras. (Amaz.).

BUCHENROEDERA Eckl. & Zeyh. (Legumin.).
amajubica *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xix. 389 (1932).—Natal.

BUCHNERA L. (Scrophulariac.).
breviflora *Pennell in Small, Man. Southeast. Fl.* 1223 (1933).—U.S.A. (S. E. States).
cuneifolia *L. f. Suppl.* 288 (1781).—Afr. austr. (Cape Prov.).
cupricola *Robyns in Nat. Tijdschr.* xiv. (Congr. Num.) 102 (1932), nomen.—Congo Belg.
Schliebenii *Melch. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 407 (1932).—Tanganyika Terr.
usafuensis (*Engl.*) *Melch. l. c.* 680: B. mossambicensis var. usafuensis.

BUCHNERODENDRON Gürke (Flacourtiac.).
stipulatum (*Oliv.*) *Bullock in Kew Bull.* 1933, 468: Oncoba stipulata.

BUDA Adans. (Caryophyllac.).
glandulosa (*Jacq.*) *Desv. Journ. de Bot.* iii. [No. 5] 226 [1816]: Arenaria glandulosa.
media (*L.*) *Desv. l. c.*: Arenaria media.
parviflora *Desv. l. c.*, nomen.—Hab.?
rubra (*L.*) *Desv. l. c.*: Arenaria rubra.
suffructicosa *Desv. l. c.*—Hab.?

BUDDLEJA L. (Loganiac.).
blattaria *Macbride in Candollea*, v. 399 (1934).—Peruv.
corrugata *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 56 (1933–5).—Calif. infer.
× Farquharii *Farrington ex Rehder, Man. Cult. Trees & Shrubs*, 768 (1927).—Hab.?
paniculata *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 412 (1820).—Nepal.
pterocaulis *A. B. Jackson in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 81: B. longifolia *Gagnep.*
Skutchii *Morton in Phytologia*, i. 148 (1935).—Guatem.

BUETTNERIA Loefl. (Sterculiac.).
ancistrodonta *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 142 (1931).—Peruv.

BUETTNERIA :—
aspera *Colebr. ex Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 383 (1824).—Ind. or. (Bengal; Assam).
asterotricha *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 143 (1931).—Boliv.
aurantiaca *Mildbr. l. c.* 141.—Peruv.
coriacea *Britton*; *Mildbr. l. c.*, descr. ampl.—Peruv.
eriogona *Mildbr. l. c.* 144.—Peruv.
flexuosa *Killip in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1934, xxiv. 50.—Ecuador.
Jackiana *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 386 (1824).—Penins. Mal.
pilosa *Roxb. Hort. Beng.* 18 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 381 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 618 (1832).—Ind. or.
Tessmannii *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 140 (1931).—Peruv.
urosepala *Mildbr. l. c.* 144.—Peruv.
Weberbaueri *Mildbr. l. c.* 145.—Peruv.

BUFONIA L. (Caryophyllac.).
caespitosa *Hausskn. ex Bornm. in Mitt. Thüring. Bot. Ver.* n. f. xxvii. 22 (1910), pro syn.: Arenaria Pseudacantholimon.
Gottelandii *Emberger in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc*, ii. 201 (1932), nomen.—Marocc.
Murbeckii *Emberger in Compt. Rend.* 1935, cc. 1780, in obs., nomen.—Marocc.

BUFORRESTIA C. B. Clarke (Commelinac.).
glabrisepala *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 224 (1931).—Congo Belg.

BULBINE Willd. (Liliac.).
altissima (*Mill.*) *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 78 (1932): Anthericum altissimum.
inops *N. E. Brown in Kew Bull.* 1931, 196.—Afr. austr. (Cape Prov.).
lagopus (*Thunb.*) *N. E. Brown, l. c.* 195: Anthericum lagopus.
rhopalophylla *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 167, in obs., 271 (1931).—Great Namaq.
succulenta *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 275 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
tetraphylla *Dinter*; *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 272 (1931), descr. ampl.—Great Namaq.

BULBOCODIUM L. (Liliac.).
filifolium (*Cambess.*) *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xii. 244 (1929), in obs.: Merendera filifolia.
Plantii *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1119 (1895), in syn.: B. vernum f. Plantii *Voss*.

BULBOPHYLLUM Thou. (Orchidac.).
abbrevilabium *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 18 (1932).—Penins. Mal.
acuminatifolium *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxv. 493 (1933).—Celebes.
bambusifolium *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 63 (1935).—N. Guin.
brastagiense *Carr in Journ. As. Soc. Mal.* xi. 89 (1933).—Sumatra.
Brienianum (Rolfe) *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxxii. 306 (1933): Cirrhopetalum Brienianum.
carunculilabrum *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 25 (1932).—Penins. Mal.
chekaënse *Carr, l. c.* 31.—Penins. Mal.
cilioglossum *R. S. Rogers & Nicholls in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1935, lix. 204.—Austral. (Queensland).
citricolor *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 143 (1932): B. citrellum *J. J. Smith*.
connatum *Carr in Journ. As. Soc. Mal.* xi. 88 (1933).—Sumatra.
Corneri *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 16 (1932).—Penins. Mal.
cyclosepalon *Carr, l. c.* 33.—Penins. Mal.
dawongense *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 203 (1934).—N. Guin.
decurviscapum *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 139 (1932).—Hab.?
densissimum *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 116 (1935).—Borneo.
diplantherum *Carr, l. c.* vii. 27 (1932).—Penins. Mal.
dulitense *Carr, l. c.* viii. 114 (1935).—Borneo.
echinolabium *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxxvi. 118 (1934).—Celebes.

BULBOPHYLLUM :—
elassonotum *Summerhayes in Bot. Mag.* t. 9408 (1935).—Ind. or. (Assam).
ellipticifolium *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 60 (1935).—N. Guin.
Emiliorum *Ames & Quisumb. in Philipp. Journ. Sc.* 1931, xliv. 377.—Ins. Philipp. (Mindanao).
exasperatum *Schlechter*; *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 69 (1935), descr. emend.—N. Guin.
fibrosum *J. J. Smith*; *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 138 (1932), descr. ampl.—Sumatra.
filovagans *Carr in Journ. As. Soc. Mal.* xi. 91 (1933).—Sumatra.
flavidiflorum *Carr, l. c.* 93: B. obtusum var. robustum *J. J. Smith*.
flavofimbriatum *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 143 (1931).—Borneo.
gibbilingue *J. J. Smith, l. c.* 142.—Borneo.
grandilabre *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 117 (1935).—Borneo.
Haniffii *Carr, l. c.* vii. 20 (1932).—Penins. Mal.
ignobile *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 202 (1934).—N. Guin.
inclinatum *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 57 (1935).—N. Guin.
Jacobsonii *J. J. Smith in Blumea*, i. 320 (1935).—Sumatra.
kemulense *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 144 (1931).—Borneo.
Kjellbergii *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxv. 495 (1933).—Celebes.
koyanense *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 112 (1935).—Borneo.
latipes *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 65 (1935).—N. Guin.
ligulifolium *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 207 (1934), in obs.; *et in Nova Guinea*, xviii. 68 (1935).—N. Guin.
Linderi *Summerhayes in Kew Bull.* 1935, 202.—Liberia.
longhutense *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 141 (1931).—Borneo.
longipiliferum *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 204 (1934).—N. Guin.
longivagans *Carr in Journ. As. Soc. Mal.* xi. 92 (1933).—Sumatra.
Macphersonii *Rupp in Vict. Nat.* li. 81 (1934): B. purpurascens *F. M. Bailey*.
magnibracteatum *Summerhayes in Kew Bull.* 1935, 203.—Gold Coast.
malleolabrum *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 24 (1932).—Penins. Mal.
manipetalum *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxxvi. 117 (1934).—Sumatra.
maquilingense *Ames & Quisumb. in Philipp. Journ. Sc.* 1932, xlvii. 208.—Ins. Philipp. (Luzon).
marudiense *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 111 (1935).—Borneo.
Mayrii *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 205 (1934).—N. Guin.
Milesii *Summerhayes in Kew Bull.* 1935, 200.—Gold Coast.
miniatum *Hort. ex Orch. Rev.* 1904, xii. 118, in obs.; *F. W. Moore in Journ. Roy. Hort. Soc.* xxxiii. 380, t. 53 (1908); *Summerhayes in Kew Bull.* 1931, 389, descr. ampl.—Afr. trop.
morotaiense *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 140 (1932).—Ins. Molucc.
nigropurpureum *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 22 (1932).—Penins. Mal.
olivinum *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 205 (1934).—N. Guin.
Parryae *Summerhayes ex Parry, The Lakhers*, 605 (1932), nomen.—Ind. or. (Assam).
perforans *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 61 (1935).—N. Guin.
poekilon *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 15 (1932).—Penins. Mal.
pokapindjangense *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxv. 494 (1933).—Celebes.
pseudofilicaule *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 64 (1935).—N. Guin.
recurvimarginatum *J. J. Smith, l. c.* 67.—N. Guin.
refractilingue *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 145 (1931).—Borneo.

BULBOPHYLLUM :—
remiferum *Carr in Journ. As. Soc. Mal.* xi. 87 (1933).—Sumatra.
riyanum *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 668.—Formosa.
rugulosum *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 62 (1935).—N. Guin.
semiasperum *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 206 (1934).—N. Guin.
Simoni *Summerhayes in Kew Bull.* 1935, 204: Megaclinium lasianthum.
stipitatibulbum *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 148 (1931).—Borneo.
strobiliferum *Kraenzl. in Mitth. Deutsch. Schutzgeb.* ii. 155 (1889).—Cameroons.
surigaënse *Ames & Quisumb. in Philipp. Journ. Sc.* 1933, lii. 449 (1934).—Ins. Philipp. (Mindanao).
tacitum *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 110 (1935).—Borneo.
talauense (*J. J. Smith*) *Carr, l. c.* vii. 22 (1932): B. laxiflorum var. talauense.
tenompokense *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxxvi. 116 (1934).—Borneo.
teres *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 115 (1935).—Borneo.
ternatense *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 142 (1932).—Ins. Molucc. (Ternate).
Tokioi *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 439.—Formosa.
trigonidioides *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 59 (1935).—N. Guin.
trinervium *J. J. Smith, l. c.* 58.—N. Guin.
validum *Carr in Journ. As. Soc. Mal.* xi. 95 (1933).—Sumatra.
Weinthalii *R. S. Rogers in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1933, lvii. 95.—Austral. (N. S. Wales).

BULBOSTYLIS Kunth (Cyperac.).
cardiocarpoides *Cherm. in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiv. 298 (1934); *et in Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. 282 (1935).—Congo Belg.
craspedota *Chiov. Fl. Somala*, II. 437 (1932).—Somal. Ital.
cyrtathera *Cherm. in Arch. Bot., Caen*, iv. Mém. No. 7, 35 (1931).—Afr. Gall. Centr.
elegans *Cherm. l. c.* 37.—Afr. Gall. Centr.
fasciculata *Cherm. l. c.* 36.—Afr. Gall. Centr.
juncoides (*Vahl*) *Kükenth. in An. Mus. Montevid.* Ser. II. iii. 187 (1931): Schoenus juncoides.
metralis *Cherm. in Arch. Bot., Caen*, iv. Mém. No. 7, 34 (1931).—Afr. Gall. Centr.
multispiculata *Cherm. l. c.* 38.—Afr. Gall. Centr.
pilosa (*Willd.*) *Cherm. in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 266; *et l. c.* 1935, lxxxii. 341: Schoenus pilosus.
polytricha *Cherm. in Arch. Bot., Caen*, iv. Mém. No. 7, 39 (1931).—Afr. Gall. Centr.
tenuifolia (*Rudge*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 5 (1931): Scirpus tenuifolius.
togoënsis *Cherm. in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 267.—Guinea (Togo).
Vanderysti *Cherm. in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiv. 299 (1934); *et in Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. 283 (1935).—Congo Belg.
Wittei *Cherm. in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxii. 69 (1932).—Congo Belg.
yalingensis *Cherm. in Arch. Bot., Caen*, iv. Mém. No. 7, 40 (1931).—Afr. Gall. Centr.

BUMELIA Sw. (Sapotac.).
conglobata *Standley in Tropical Woods*, 1932, No. 31, 40.—Guatem.
cuneifolia *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 63 (1933–5).—Calif. infer.
lacuum *Small, Man. Southeast. Fl.* 1034 (1933).—U.S.A. (Florida).
Lankesteri *Standley in Tropical Woods*, 1932, No. 31, 40.—Costa Rica.
Mayana *Standley, l. c.* 41.—Guatem.; Brit. Honduras; Mexico.

BUNGEA C. A. Mey. (Scrophulariac.).
vesiculifera *Pavlov & Lipschitz in Sovietsk. Bot.* 1934, No. 1, 27, in obs.: B. turkestanica.

BUNIUM L. (Umbellif.).
angreni *Korovin in Bull. Univ. As. Centr.* xv. 123 (1927).—Turkestan. (Thian Shan).
cabulicum *Bornm. in Engl. Jahrb.* lxvi. 229 (1934).—Afghan.
elatum (*Battand.*) *Battand. Contrib. Fl. Atlant.* 37 (1919): B. Bulbocastanum var. elatum.
Noëanum (*Boiss.*) *Woronow ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 158 (1932): Carum Noëanum.
seravschanicum *Korovin in Bull. Univ. As. Centr.* xv. 125 (1927).—Turkestan.; Bokhara.
vaginatum *Korovin, l. c.* 122.—Turkestan.

BUPLEURUM L. (Umbellif.).
angolense *C. Norman in Journ. Bot.* 1933, lxxi. Suppl. 1, 234.—Angola.
Bolivaris *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 49 [1933], nomen.—Marocc.
Handelii *H. Wolff in Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 712 (1933).—China (Yunnan).
Krylovianum *Schischk. in Krylov, Fl. Sibir. Occ.* viii. 2010 (1935).—Sibir.
lateriflorum *Coss.*; *Battand. Contrib. Fl. Atlant.* 39 (1919), descr.—Marocc.
mesatlanticum *Litard. & Maire*; *Litard. & Maire in Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc*, No. xxvi. 16 (1930), descr. ampl.—Marocc.
Perrierii *Bréb. Fl. Normand.* ed. 4, 140 (1869).—Gallia.
rigescens *Maire & Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 49 [1933], nomen.—Marocc.
yesoënse *Nakai, Veg. Mt. Apoi in Tenn.-kinenb.-chōsa-hōkoku, Shokub.-no-bu*, xii. 30, 62 (1930); *Hara in Journ. Jap. Bot.* ix. 515 (1933), latine.—Japon. (Yezo).

BURCKELLA Pierre (Sapotac.).
erythrophylla *H. J. Lam in Nova Guinea*, xiv. 554 (1932).—N. Guin.
macropoda (*K. Krause*) *H. J. Lam, l. c.*: Illipe macropoda.
pachyphylla (*K. Krause*) *H. J. Lam, l. c.* 555: Illipe pachyphylla.
Poolei *H. J. Lam, l. c.*—N. Guin.

BURMANNIA L. (Burmanniac.).
bracteosa *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 343.—Venez.
foliosa *Gleason, l. c.*—Venez.
Urazii *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 207.—Ins. Liukiu (Iriomote).

BURMEISTERA Karst. & Triana in Triana, Nuev. Jen. i Esp. Fl. Neo-Granad. 13 (1854); Karst. in Linnaea, xxviii. 444 (1857); Sprague in Kew Bull. 1934, 395. *CAMPANULACEAE.*
armadana *E. Wimm. in Fedde, Repert.* xxix. 54 (1931).—Colomb.
Asteriscus *E. Wimm. l. c.* xxxviii. 5 (1935).—Peruv.
aurobarbata (*E. Wimm.*) *E. Wimm. l. c.* xxx. 35 (1932): Centropogon aurobarbatus.
breviflora (*Gleason*) *E. Wimm. l. c.* xxix. 52 (1931): Centropogon breviflorus.
caldasensis (*Gleason*) *E. Wimm. l. c.*: Centropogon caldasensis.
coleoides (*Vatke*) *E. Wimm. l. c.* xxx. 35 (1932): Siphocampylus coleoides.
crassifolia (*E. Wimm.*) *E. Wimm. l. c.* 33: Centropogon crassifolius.
dendrophila *E. Wimm. l. c.* 23.—Panamá.
dichlora *E. Wimm. l. c.* xxix. 56 (1931).—Colomb.
estrellana *E. Wimm. l. c.* xxx. 24 (1932).—Costa Rica.
fusco-apicata *E. Wimm. l. c.* xxix. 55 (1931).—Colomb.
globosa *E. Wimm. l. c.* 54.—Colomb.
gravida (*Gleason*) *E. Wimm. l. c.* 52: Centropogon gravidus.
ibaguensis *Karst. & Triana in Triana, Nuev. Jen. i Esp. Fl. Neo-Granad.* 13 (1854); *Karst. in Linnaea*, xxviii. 444 (1857); *Sprague in Kew Bull.* 1934, 395.—Colomb.
ignimontis *E. Wimm. in Fedde, Repert.* xxx. 17 (1932).—Ecuador.
Kalbreyeri *E. Wimm. l. c.* 12.—Colomb.
lignescens (*E. Wimm.*) *E. Wimm. l. c.* 34: Centropogon lignescens.
luteola *E. Wimm. l. c.* xxix. 57 (1931).—Colomb.
lutosa *E. Wimm. l. c.* 56.—Ecuador.

BURMEISTERA :—
macrocalyx *E. Wimm. in Fedde, Repert.* xxx. 19 (1932).—Costa Rica; Ecuador.
macrocarpa (*A. Zahlbr.*) *E. Wimm. l. c.* 41: Centropogon macrocarpus.
Millei *E. Wimm. l. c.* 15.—Ecuador.
mindoana *E. Wimm. l. c.* 27.—Ecuador.
montana *E. Wimm. l. c.* 23.—Ecuador.
Mutisiana (*H. B. & K.*) *E. Wimm. l. c.* xxix. 52 (1931): Lobelia Mutisiana.
obtusifolia *E. Wimm. l. c.* 58.—Costa Rica.
ovalis *E. Wimm. l. c.* xxx. 18 (1932).—Ecuador.
pallida (*Drake*) *E. Wimm. l. c.* 50: Centropogon pallidus.
pastoralis *E. Wimm. l. c.* xxix. 58 (1931).—Colomb.
peruviana *E. Wimm. l. c.* xxxviii. 5 (1935).—Peruv.
Pittieri *E. Wimm. l. c.* xxx. 19 (1932).—Costa Rica.
puberula *E. Wimm. l. c.* xxxviii. 3 (1935).—Colomb.
ramosa *E. Wimm. l. c.* xxx. 16 (1932).—Peruv.
refracta *E. Wimm. l. c.* 11.—Ecuador.
rivina *E. Wimm. l. c.* xxxviii. 4 (1935).—Colomb.
rubrosepala (*E. Wimm.*) *E. Wimm. l. c.* xxx. 10 (1932): Centropogon rubrosepalus.
suerrensis (*Donn. Smith*) *E. Wimm. l. c.* 14: B. cyclostigmata var. suerrensis.
tomentosula *Karst.*; *E. Wimm. l. c.* xxxviii. 5 (1935), descr. ampl.—Colomb.
tricolorata *E. Wimm. l. c.* xxx. 22 (1932).—Peruv.
variabilis (*Gleason*) *E. Wimm. l. c.* xxix. 52 (1931): Centropogon variabilis.
villosula *E. Wimm. l. c.* 57.—Ecuador.
vulgaris *E. Wimm. l. c.* xxx. 27 (1932).—Costa Rica.
xerampelina *E. Wimm. l. c.* xxix. 59 (1931).—Colomb.

BURSA Weber (Crucif.).
alandica (*Almq.*) *Druce in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1930, ix. 258 (1931): Capsella Bursa-pastoris f. alandica.
batavorum (*Almq.*) *Druce, l. c.* 1923, vii. 169 (1924): Capsella Bursa-pastoris f. batavorum.
belgica (*Almq.*) *Druce, l. c.* 1930, ix. 334 (1931): Capsella Bursa-pastoris f. belgica.
segetum (*Almq.*) *Druce, l. c.* 258: Capsella Bursa-pastoris f. segetum.
sublaevigata (*Almq.*) *Druce, l. c.* 1931, ix. 553 (1932).—Anglia.
viminalis (*Almq.*) *Druce, l. c.* 1930, ix. 335 (1931): Capsella Bursa-pastoris f. viminalis.

BURSERA Jacq. (Burserac.).
acuminata (*Rose*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 425 (1931): Elaphrium acuminatum.
aptera *Ramirez, Mat. Med. Mex.* Pt. 1, 379 (1894).—Mexico.
brachypoda (*Rose*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 426 (1931): Elaphrium brachypodum.
confusa (*Rose*) *Engl. l. c.*: Elaphrium confusum.
Covillei (*Rose*) *Engl. l. c.*: Elaphrium Covillei.
elemifera (*Royle*) *Baill. Traité Bot. Méd. Phan.* 952 (1884), in obs.: Elaphrium elemiferum.
epinnata (*Rose*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 425 (1931): Elaphrium epinnatum.
Goldmani (*Rose*) *Engl. l. c.* 428: Elaphrium Goldmani.
MacDougalii (*Rose*) *Engl. l. c.*: Elaphrium MacDougalii.
multifolia (*Rose*) *Engl. l. c.* 426: Elaphrium multifolium.
nesopola *I. M. Johnston in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 66 (1931).—Mexico (Arch. Revillagigedo).
subpubescens (*Rose*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 425 (1931): Elaphrium subpubescens.
subsessiliformis *Engl. l. c.* 426, sphalm.: B. submoniliformis.
trijuga *Ramirez, Mat. Med. Mex.* Pt. 1, 380 (1894).—Mexico.

BURTTIA E. G. Baker & Exell in Journ. Bot. 1931, lxix. 249. *CONNARACEAE.*
prunoides *E. G. Baker & Exell, l. c.*—Tanganyika Terr.

BUTOMUS L. (Butomac.; Alismatac., Gen. Pl.).
scutariensis *Rohlena in Mém. Soc. Sc. Bohême*, 1931, No. 35, 6 (1932), in syn.: B. umbellatus var. scutariensis *Rohlena*.

BUXELLA Small, Man. Southeast. Fl. 1009 (1933). *ERICACEAE*
brachycera (*Michx.*) *Small, l. c.*: Vaccinium brachycerum.

BUXUS L. (Buxac.; Euphorbiac., Gen. Pl.).
Bartlettii *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 134 (1932).—Brit. Honduras.
hainanensis *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 25 (1935).—China (Hainan).
Myrica *Léveillé*; *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 236, descr. ampl.—China (Kweichau).
riparia (*Makino*) *Makino in Journ. Jap. Bot.* vii. 14 (1931): B. sempervirens var. riparia.

BYRSOCARPUS Schumach. & Thonn. (Connarac.).
Dinklagei (*Gilg*) *Schellenb. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 325 (1915), in obs.: Rourea Dinklagei.
Foenum-Graecum (*De Wild. & Th. Dur.*) *Schellenb. l. c.*, in obs.: Rourea Foenum-Graecum.
inodorus (*De Wild. & Th. Dur.*) *Schellenb. l. c.*, in obs.: Rourea inodora.
pubescens (*Baker*) *Schellenb. l. c.* 323, in obs.: Connarus pubescens.

BYRSONIMA L. C. Rich. (Malpighiac.).
cretacea *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 378.—Venez.
cretacea *Niedenzu in Fedde, Repert.* xxxiii. 71 (1933), non praec.—Bras. (Amaz.) vel Venez.?
eugeniifolia *Sandwith in Kew Bull.* 1935, 315.—Guiana Brit.

C

CABALLEROA Font Quer in Cavanillesia, vii. 150 (1935), in obs.: **Lerrouxia** Caballero (Plumbaginac.).
ifniensis (*Caballero*) *Font Quer, l. c.*, in obs.: Lerrouxia ifniensis.

CABRALEA A. Juss. (Meliac.).
erismatica *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 360.—Bras. (Pará).

CACALIA L. (Compos.).
achyrotricha (*Diels*) *Ling in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, ii. 531 (1934): Senecio achyrotrichus.
amagiensis *Kitamura, Compos. Nov. Jap.* 23 (1931). Japon.
ambigua *Ling in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, ii. 528 (1934).—China (Shensi).
coriacea *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 80 (1933–5).—Mexico.
crucifolia *Maekawa in Ic. Pl. As. Or.* i. No. 1, 8 (1935), in syn.: C. Maximowicziana var. alata *Maekawa*.
deltophylla (*Maxim.*) *Mattf. ex Rehder & Kobuski in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 39: Senecio deltophyllus.
leucanthema (*Dunn*) *Ling in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, ii. 528 (1934): Senecio leucanthemus.
Maximowicziana *Nakai & Maekawa in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 432: Senecio farfarifolius var. farfarifolius *Maxim.*
Potanini (*C. Winkler*) *Mattf. ex Rehder & Kobuski in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 39: Senecio Potanini.
Roborowskii (*Maxim.*) *Ling in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, ii. 529 (1934): Senecio Roborowskii.
rotundifolia (*Rafin.*) *House in Bull. N. Y. State Mus.* 1920, Nos. 233–4, 67 (1921): Mesadenia rotundifolia.
subglabrata (*Yamamoto & Sasaki*) *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 148: C. intermedia var. subglabrata.
subhastata *Moris ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 290 (1834).—Ital.?

CACALIA:—
Tagawai *Kitamura, Compos. Nov. Jap.* 24 (1931), in syn.: C. aconitifolia var. Tagawai *Kitamura*.
yakusimensis *Masamune, Prelim. Rep. Veg. Yakus.* 126 (1929); *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1930, ii. 37; *et in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* xi., Bot. No. 4, 451 (1934).—Ins. Liukiu (Yakusima).

CACHRYS L. (Umbellif.).
Gaubae *Bornm. in Fedde, Repert.* xxxvi. 345 (1934).—Persia.
turbinata *Bornm. & Gauba, l. c.* 347.—Persia.

CACTUS L. (Cactac.).
Antonii *Britton in Cact. & Succ. Journ. Amer.* iv. 355 (1933).—Portoric. (Ins. Desecheo).
chilensis (sphalm. chiloënsis) *Colla, Hort. Ripul.* App. II. 342 (1827).—Chile.
Melocactus *Vell. Fl. Flum.* 205 (1825).—Bras.
monstrosus *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 374 (1894), in syn.: Cereus caerulescens f. monstrosus *DC.*
villosus *Monv. in Hort. Univ., Paris*, i. 223 (1839).—Hab.?

CADABA Forsk. (Capparidac.).
obovata *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1932, 94.—Tanganyika Terr.

CAESALPINIA L. (Legumin.).
alternifolia *Nicholson, Ill. Dict. Gard.* i. 232 (1884).—Am. centr.
aphylla *F. Phil. in Verh. Deutsch. Wiss. Ver. Santiago (Chile)*, i. 159 (1886), in obs.; *R. Phil. in An. Mus. Nac. Chile*, 1891, 19.—Chile.
Conzattii (*Rose*) *Standley in Tropical Woods*, 1934, No. 37, p. 34: Poinciana Conzattii.
decapetala (*Roth*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 89 (1931): Reichardia decapetala.
Pringlei (*Britton & Rose*) *Standley in Tropical Woods*, 1933, No. 34, 40: Brasilettia Pringlei.
velutina (*Britton & Rose*) *Standley, l. c.*: Brasilettia velutina.
violacea (*Mill.*) *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 61 (1935): Robinia violacea.

CAIOPHORA C. Presl (Loasac.).
macrophylla *Rusby in Phytologia*, i. 67 (1934).—Boliv.
Smithii *Killip in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1934, xxiv. 51.—Peruv.

CAJUPUTI Adans. (Myrtac.).
ericifolia (*Sm.*) *Lyons, Plant Names Scientific & Popular*, 74 (1900): Melaleuca ericifolia.
viridiflora (*Soland.*) *Lyons, l. c.*: Melaleuca viridiflora.

CALADENIA R. Br. (Orchidac.).
echidnachila *Nicholls in Papers & Proc. Roy. Soc. Tasman.* 1932, 13 (1933).—Tasman.
integra *Coleman in Vict. Nat.* xlix. 246 (1932).—W. Austral.
Longii *R. S. Rogers in Papers & Proc. Roy. Soc. Tasman.* 1931, 105 (1932).—Tasman.

CALADIUM Vent. (Arac.).
antiquorum *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1162 (1895), in syn.: Colocasia Colocasia.
Dussii *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in obs.—Hab.?

CALAMAGROSTIS Adans. (Gramin.).
aculeolata (*Hackel*) *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 278, in adnot.: C. stricta var. aculeolata.
adpressi-ramea *Ohwi in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 193, 389.—Japon.
Alexeenkoana *Litw. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 212, 749 (1934).—Pamir.
× aristata *Ohwi in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 194.—Japon.
austrojeholensis *Honda in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. II. (*Contrib. Cogn. Fl. Mansh.*: *Pl. Nov. Jehol.* II. i.) 8 (1935).—Manchur. (Jehol).
avenoides (*Hook. f.*) *Cockayne, Rep. Bot. Surv. Tongariro Nat. Park*, 35 (1908): Agrostis avenoides.

CALAMAGROSTIS:—
baicalensis *Steph. ex Komarov, Fl. URSS*, ii. 221 (1934), in syn.: C. Chalybaea var. baicalensis *Litw.*
blanda *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 349 (1896): C. pallida *Vasey & Scribn.*
Cainii *Hitchcock in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1934, xxiv. 480.—U.S.A. (Tennessee).
czukczorum *Soczawa in Komarov, Fl. URSS*, ii. 218, 749 (1934).—Sibir.
erecta *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 340 (1896): Achaeta plumosa.
filiformis (*G. Forst.*) *Cockayne, Rep. Bot. Surv. Tongariro Nat. Park*, 35 (1908): Avena filiformis.
fusca *Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 197 (1932).—Kamchatka.
gigantea (*Roshev.*) *Roshev. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 294 (1932): C. Epigeios var. gigantea.
hissarica *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 197, 747 (1934).—Bokhara.
Hookeri (*Druce*) *Druce, Comit. Fl. Brit. Isles*, 352 (1932): Deyeuxia Hookeri.
insperata *Swallen in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 413.—U.S.A. (Ohio).
insularis *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 2.—Japon.
lactea *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 346 (1896).—U.S.A. (Washington).
lancea *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 162.—Sakhalin.
microtis (*Ohwi*) *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 40 (1934): C. autumnalis var. microtis.
Miyabei *Honda in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 142 (1931).—Sakhalin.
monticola *Petrov ex Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 197 (1932).—Sibir. bor.-or.
Pavlovi (*Roshev.*) *Roshev. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 295 (1932): C. lapponica var. Pavlovi.
poiformis (*Fourn.*) *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 349 (1896): Cinnastrum poiforme.
Pringlei *Beal, l. c.* 345.—Mexico.
producta *Mez ex Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. 1. 294 (1931), in syn.: Agrostis producta.
Ruprechtii *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 198, 748 (1934).—Caucas.
scaberrima *Honda in Journ. Jap. Bot.* ix. 35 (1933).—Japon. (Hondo).
Scribneri *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 343 (1896): Deyeuxia dubia.
Sekimotoi *Honda in Journ. Jap. Bot.* ix. 35 (1933).—Japon. (Hondo).
setifolia (*Hook. f.*) *Cockayne, Rep. Bot. Surv. Tongariro Nat. Park*, 35 (1908): Deyeuxia setifolia.
Steinbergii *Roshev. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 296 (1932).—Sibir. arct.
Sugawarai *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 297.—Japon.
trichantha *Schischk. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 198, 748 (1934).—Armen.
Vaseyi *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 344 (1896): Arundo purpurascens.
vegeta *Nakai, Kamik.-Tennenk.-Chōsahōk.* 41 (1928); cf. *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1329 (1931), japonice.—Japon.

CALAMINTHA Mill. (Labiat.).
× acinifolia *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1933, xxxii. 32 (1934).—Hispan.
Adriani *Sennen & Teodoro in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xv. Ser. Bot. No. 1, 30 (1931), in obs., hybr.?—Hispan.
× Barolesii *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1933, xxxii. 61 (1934), in obs.—Hispan.
Bianoris *Sennen, l. c.* 54, in obs.—Hispan.
bolnokensis (*Simonk.*) *Domin in Veröff. Geobot. Inst. Rübel*, x. 110 (1933): Melissa bolnokensis.
Bonanovae *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1933, xxxii. 49 (1934), descr.—Hispan.
brevisepala *Sennen, l. c.* 51.—Hispan.
Caballeroi *Sennen*; *Sennen & Pau, l. c.* 55, descr.—Hispan.
cacondensis *G. Taylor in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl. 2, 167.—Angola.

CALAMINTHA:—
cacuminiglabra *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1933, xxxii. 52 (1934).—Hispan.
cantabrica (sphalm. cantabria) *Sennen & Elias, l. c.* 26.—Hispan.
catalaunica *Sennen, l. c.* 28.—Hispan.
× Dufouri *Sennen, l. c.* 59.—Hispan.
elgonensis *Bullock in Kew Bull.* 1932, 502.—Afr. trop. or. (Elgon).
Enriquei *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1933, xxxii. 54 (1934).—Hispan.
eriocaulis *Sennen, l. c.* 50.—Hispan.
Ferreri *Sennen*; *Sennen, l. c.* 27, descr.—Hispan.
Fontii *Sennen*; *Sennen, l. c.* 55, descr.—Hispan.
Gillesii *Sennen*; *Sennen, l. c.* 58, descr.—Hispan.
× Joffrei *Sennen in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xv. Ser. Bot. No. 1, 31 (1931), in obs.—Hispan.
Josephi *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1933, xxxii. 30 (1934).—Hispan.
Litardierei *Sennen, l. c.* 56.—Hispan.
longeracemosa *Sennen*; *Sennen, l. c.* 53, descr.—Hispan.
Mairei, *Sennen, l. c.*—Hispan.
megalantha (*Diels*) *Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 84: C. chinensis var. megalantha.
peniciliata *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1933, xxxii. 31 (1934).—Hispan.
Secondaireana *Sennen, l. c.* 54, in obs.—Hispan.
suavis *Sennen*; *Sennen, l. c.* 57, descr.—Hispan.
urticifolia (*Hance*) *Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 83: C. Clinopodium var. urticifolia.

CALAMUS L. (Palmae).
anomalus *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 320 (1935).—N. Guin.
Brassii *Burret, l. c.* 316.—N. Guin.
Burkillianus *Becc. ex Ridley*; *Furtado in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 245 (1935), descr. ampl.—Penins. Mal.
conjugatus *Furtado, l. c.* 246.—Borneo.
dachangensis *Furtado, l. c.* 247.—Borneo.
kandariensis *Becc.*; *Furtado, l. c.* 250, descr. ampl.—Celebes.
Kiahii *Furtado, l. c.* 251.—Borneo.
Kjellbergii *Furtado, l. c.* 252.—Celebes.
macrospadix *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 317 (1935).—N. Guin.
Mayrii *Burret, l. c.* xi. 704 (1933).—N. Guin.
melanochrous *Burret, l. c.* xi. 208 (1931).—China (Kwangsi).
nannostachys *Burret in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 264.—N. Guin.
orthostachyus *Furtado in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 244 (1935).—Celebes.
platyacanthoides *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 54 (1934): C. platyacanthus *Warb. ex Becc.*
pseudozebrinus *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 319 (1935).—N. Guin.
rostratus *Furtado in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 257 (1935).—Borneo.
stramineus *Furtado, l. c.* 258.—Borneo.
tenompokensis *Furtado, l. c.* 260.—Borneo.
Wageneri *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1152 (1895), in syn.: Zalacca Wageneri.

CALANDRINIA H. B. &. K. (Portulacac.).
arizonica *Rydb. in N. Am. Fl.* xxi. 292 (1932).—U.S.A. (Arizona).
Congdoni (*Rydb.*) *Pax & K. Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 251 (1934): Oreobroma Congdoni.
crenata (*Ruiz & Pav.*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 20 (1931): Talinum crenatum.
cylindrica *v. Poelln. in Fedde, Repert.* xxxv. 163 (1934).—W. Austral.
Dielsii *v. Poelln. l. c.* 162.—W. Austral.
eremaea *Ewart, Fl. Vict.* 486 (1930): C. pusilla *Lindl.*
filifolia *Rydb. in N. Am. Fl.* xxi. 293 (1932).—Calif. super. et infer.
heterophylla *Rydb. l. c.*—Calif. super. et infer.

CALANDRINIA:—
longipetala (*Piper*) *Pax & Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 251 (1934): Oreobroma longipetalum.
mexicana (*Rydb.*) *Pax & K. Hoffm. l. c.*: Oreobroma mexicanum.
microsperma *ex v. Poelln. in Fedde, Repert.* xxxv. 173 (1934), in syn.: C. volubilis.
monogyna *v. Poelln. l. c.* 163.—W. Austral.
muricata *Rydb. in N. Am. Fl.* xxi. 293 (1932).—U.S.A. (Calif.).
quivensis *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 21 (1931).—Peruv.
remota *J. M. Black; J. M. Black in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1932, lvi. 41, descr. emend.—Austral.
Ruizii *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 20 (1931): Talinum polyandrum *Ruiz & Pav.*, non Calandrinia polyandra *Benth.*
stenophylla *Rydb. in N. Am. Fl.* xxi. 292 (1931).—U.S.A. (Calif.).
tenella *Rydb. l. c.* 293.—U.S.A. (Oregon).

CALANTHE R. Br. (Orchidac.).
actinomorpha *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 668.—Formosa.
brachychila *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 162.—Indo-China (Tonkin).
caulodes *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxv. 468 (1933).—Celebes.
Chevalieri *Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 322.—Indo-China (Anam).
chlorantha *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 162.—Indo-China (Anam).
crinita *Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 322.—Indo-China (Tonkin).
dolichopoda *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 296.—Formosa.
Eberhardtii *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 162.—Indo-China (Tonkin).
epiphytica *Carr in Journ. As. Soc. Mal.* xi. 80 (1933).—Sumatra.
fimbriatomarginata *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 301.—Formosa.
integrilabris *Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 323.—Indo-China (Anam).
kemulensis *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 117 (1931).—Borneo.
Kintaroi *Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1934, vi. 550.—Formosa.
kooshunensis *Fukuyama in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard.* 1933, iii. 85.—Formosa.
nigropuncticulata *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 437.—Formosa.
obreniformis *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxv. 469 (1933).—Celebes.
padangensis *Schlechter ex Mansf. in Fedde, Repert. Beih.* lxxiv. 4, t. 54, fig. 214 (1934): C. vestita var. sumatrana *Schlechter*.
Petelotiana *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 163.—Indo-China (Tonkin).
pumila *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 438.—Formosa.
Schlechteri *Hara in Journ. Jap. Bot.* ix. 122 (1933).—Japon. (Hondo).
Schliebenii *Mansf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 808 (1933).—Tanganyika Terr.
seikooënsis *Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1931, iii. 237.—Formosa.
striata *Lindl. Gen. et Sp. Orch. Pl.* 251 (1833).—Japon.
succedanea *Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 324.—Laos; Cambodia.
Yushuni *Mori & Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 188.—Formosa.

CALATHEA G. F. W. Mey. (Marantac.; Scitamin., Gen. Pl.).
barbillana *Cufod. in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, xlvi. 235 (1932).—Costa Rica.
enclitica *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 53 (1931).—Peruv.
insignis *Petersen* (1890); *Cufod. in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, xlvi. 233 (1932), descr. ampl.—Costa Rica.
jocosa *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 53 (1931).—Peruv.

CALATHEA:—
Klugii *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 55 (1931).—Peruv.
lasiostachya *Donn. Smith; Cufod. in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, xlvi. 234 (1932), descr. ampl.—Costa Rica.
Loeseneri *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 51 (1931).—Peruv.
mishuyacu *Macbride, l. c.* 54.—Peruv.
silvosa *Macbride, l. c.* 52.—Peruv.
Standleyi *Macbride, l. c.* 54.—Peruv.
ulotricha *Macbride, l. c.* 52.—Peruv.
Williamsi *Macbride, l. c.* 54.—Peruv.

CALATHODES Hook. f. & Thoms. (Ranunculac.).
polycarpa *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 153.—Formosa.

CALCEOLARIA L. (Scrophulariac.).
aurea *Colla, Herb. Pedem.* iv. 331 (1835).—Bras.
Berteri *Colla, l. c.* 329; *Colla in Mem. Accad. Torin.* xxxix. 138 (1836).—Chile.
cryptantha *Rusby in Phytologia*, i. 77 (1934).—Boliv.
× fruticohybrida *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 777 (1895).—Hort.
herbacea *Hort. ex Vilmorin, l. c.* 775, in syn.: C. herbeohybrida.
× herbeohybrida *Voss in Vilmorin, l. c.*—Hort.
hybrida *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in syn.: C. herbeohybrida.
lechioides *Rusby in Phytologia*, i. 77 (1934).—Boliv.
nitida *Colla, Herb. Pedem.* iv. 330 (1835); *Colla in Mem. Accad. Torin.* xxxix. 138 (1836).—Chile.
nubigena *Poepp. in Froriep, Notiz. Gebiet Natur-u. Heilk.* Ser. I. xxiii. 291 (1829), in adnot.—Chile.
Reicheana *Espinosa in Rev. Chil. Hist. Nat.* 1933, xxxvii. 313, in obs., nomen.—Chile.
ribesiifolia *Rusby in Phytologia*, i. 78 (1934).—Boliv.
salviifolia *Colla, Herb. Pedem.* iv. 331 (1835), non olim.—Hab. ?
suberecta *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 775 (1895), in syn.: C. plantaginea.

CALEA L. (Compos.).
abelioides *Blake in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 488.—Venez.
acoma *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 317.—Colomb.
chapadensis *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 8, 51 (1932).—Bras. (Matto Grosso).
fluviatilis *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1932, xxii. 385.—Brit. Honduras.
Ilienii *Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 94 (1933).—Bras. (Paraná).
papposa *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 8, 50 (1932).—Bras. (Matto Grosso).
Skutchii *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1934, xxiv. 438.—Guatem.
subcordata *Blake, l. c.* 1935, xxv. 318.—Colomb.

CALEANA R. Br. (Orchidac.).
Nublingii *Nicholls in Vict. Nat.* xlviii. 15 (1931).—Austral. (N. S. Wales).

CALENDELLA Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 135 (1898); Post & Kuntze, Lexic. 89 (1903): **Calendula** L. (Compos.).

CALENDULA L. (Compos.).
aestivalis *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 144 [1933], nomen.—Marocc.
chrysantha *Hort. ex G. C. Taylor in New Fl. & Silv.* v. 109 (1933), in obs.—Austral.
ranunculodes *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 539 (1894), in syn.: C. officinalis.
× Santamariae *Font Quer in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 120.—Hort.

CALICOREMA Hook. f. (Amaranthac.).
squarrosa (*Schinz*) *Schinz in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 53 (1934): Sericocoma squarrosa.

CALLIANDRA Benth. (Legumin.).
belizensis (*Britton & Rose*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 312 (1931): Anneslia belizensis.
chapaderoana (*Britton & Rose*) *Standley, l. c.*: Anneslia chapaderoana.
Conzattiana (*Britton & Rose*) *Standley in Tropical Woods*, 1933, No. 34, 40: Anneslia Conzattiana.

CALLIANDRA:—
flavida *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, p. 4 (1932).—Ind. occ. (Grenada); Venez.; Guiana Brit.; Peruv.
izalcoënsis (*Britton & Rose*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 312 (1931): Anneslia izalcoënsis.
Juzepczukii *Standley, l. c.* 313.—Mexico.
minutifolia (*Britton & Rose*) *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, p. 6 (1932): Anneslia minutifolia.
papillosa (*Britton & Rose*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 312 (1931): Anneslia papillosa.
pilosa (*Bert.*) *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, p. 6 (1932): Acacia pilosa.
rivularis *Urb. & Ekman, l. c.* p. 5.—Haiti.
salvadorensis (*Britton & Rose*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 312 (1931): Anneslia salvadorensis.
sinaloana (*Britton & Rose*) *Standley in Tropical Woods*, 1933, No. 34, 40: Anneslia sinaloana.

CALLIANTHEMUM C. A. Mey. (Ranunculac.).
Berardi (*Vill. ex Steud.*) *P. Fourn. in Le Monde des Plantes*, 1935, xxxvi. 13, in obs.: Ranunculus Berardi.
hondoënse *Nakai & Hara in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 679.—Japon.
insigne (*Nakai*) *Nakai in Kagaku-chishiki* viii. I. 41 (1928); *et in Tennenk.-chosahok.* xii. II. 34 (1930); cf. *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 301: Isopyrum insigne.
sachalinense *Miyabe & Tatewaki in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.* xiv. 73 (1935).—Sakhalin.

CALLICARPA L. (Verbenac.).
acuminata *Roxb. Hort. Beng.* 10 (1814), nomen *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 408 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 394 (1832).—Ind. or. (Assam).
acutidens *Schau.*; *Dop in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse*, 1932, lxiv. 505, descr. ampl.—Indo-China (Anam).
alongensis *Dop, l. c.* 509.—Indo-China (Tonkin).
arborea *Roxb. Hort. Beng.* 10 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 405 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 390 (1832).—Nepal; Bengal.
bracteata *Dop in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse*, 1932, lxiv. 507.—Indo-China (Tonkin).
candicans (*Burm. f.*) *Hochr. in Candollea*, v. 190 (1934): Urtica candicans.
cuspidata *Roxb. Hort. Beng.* 83 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 409 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 394 (1832).—Ins. Molucc.
Dielsii (*Léveillé*) *P'ei in Mem. Sc. Soc. China*, i. No. 3 (*Verbenac. China*) 37 (1932): Viburnum Dielsii.
Giraldii *Hesse ex Rehder in L. H. Bailey, Standard Cycl. Hort.* ii. 629 (1914).—China occ.
incana *Roxb. Hort. Beng.* 10 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 407 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 393 (1832).—Ind. or. (Bengal).
incana (*Turcz.*) *Moldenke in Torreya*, 1934, xxxiv. 8: Aegiphila incana.
integrifolia *F. B. Forbes & Hemsl. in Journ. Linn. Soc., Bot.* xxvi. 253 (1890), sphalm.: C. integerrima.
iriomotensis *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 254.—Ins. Liukiu (Iriomote).
Jamamurasaki *Sieb. ex Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat.* ii. 98 (1865), in syn.: C. purpurea *Juss.*
koreana *Hort. ex Bull. Soc. Dendr. France*, 1933, 82, nomen.—Corea; Japon.
kwangtungensis *Chun in Sunyatsenia*, i. 302 (1934).—China (Kwangtung).
Lamii *Hosokawa in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1934, vi. 206: C. glabra *H. J. Lam.*
lanceolaria *Roxb. Hort. Beng.* 10 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 409 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 395 (1832).—Ind. or. (Assam).
lasiantha *Lem. Ill. Hort.* vi. sub t. 202 (1859), in obs.—China.
Leonis *Moldenke in Fedde, Repert.* xxxiii. 142 (1933).—Cuba.
lobo-apiculata *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* xi. 406 (1932).—Hongkong.

CALLICARPA:—
Loureiri *Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy.* 205 (1836), in obs.: C. americana *Lour.*
Merrillii *Moldenke in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 55 (1932): C. lancifolia *Merrill.*
Murasaki *Sieb. in Jaarb. Nederl. Maatsch. Tuinbouw*, 1844, 25, nomen.—Japon.
pentandra *Roxb. Hort. Beng.* 83 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 409 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 395 (1832).—Ins. Molucc.
Petelotii *Dop in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse*, 1932, lxiv. 510.—Indo-China (Tonkin).
Poilanei *Dop, l. c.* 502.—Siam; Indo-China.
purpurea *Hort. ex Lem. Ill. Hort.* vi. t. 202 (1859), non olim.—China.
resinosa *C. Wright & Moldenke in Fedde, Repert.* xxxiii. 142 (1933).—Cuba.
revoluta *Moldenke, l. c.* 143.—Cuba.
runcinata *Zipp. ex H. J. Lam, Verbenac. Arch. Mal.* 73 (1919), in syn.: C. cana var. dentata *H. J. Lam.*
serrulata *Zipp. ex H. J. Lam, l. c.* 83, in syn.: C. elegans.
Sieboldii *Zipp. ex H. J. Lam, l. c.* 85, in syn.: C. purpurea *Juss.*
Simondii *Dop in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse*, 1932, lxiv. 506.—Indo-China (Tonkin).
siong-saiensis *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* xi. 407 (1932).—China (Fokien).
taiwaniana *Suzuki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 130.—Formosa.
tonkinensis *Dop in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse*, 1932, lxiv. 508.—Indo-China (Tonkin).
violacea *Korth. ex H. J. Lam, Verbenac. Arch. Mal.* 53 (1919), in syn.: C. rubella.

CALLIGONUM L. (Polygonac.).
affine *Popov in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1928, No. 5, p. 2.—Ross. asiat. (Semipalatinsk).
alatiforme *Pavlov in Fedde, Repert.* xxxiii. 150 (1933).—Turkestan. Ross.
Azel *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1932, xxiii. 211.—Sahara; Tunisia.
Bubyri *B. Fedtsch. ex Pavlov in Fedde, Repert.* xxxiii. 150 (1933).—Turkestan. Ross.
calcareum *Pavlov, l. c.* 149.—Turkestan. Ross.
cartilagineum *Pavlov, l. c.* 144.—Turkestan. Ross.
cordatum *Korovin ex Pavlov, l. c.* 154.—Turkestan. Ross.
coriaceum *Pavlov, l. c.* 144.—Turkestan. Ross.
cristatum *Pavlov, l. c.* 149.—Turkestan. Ross.
Dielsianum *Hao in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, ii. 177 (1934); *et in Fedde, Repert.* xxxvi. 196 (1934).—Mongol.
dissectum *Popov in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1928, No. 5, p. 1.—Ross. asiat. (Semipalatinsk).
Eugenii-Korovini *Pavlov in Fedde, Repert.* xxxiii. 145 (1933).—Turkestan. Ross.
ferganense *Pavlov, l. c.* 157.—Turkestan. Ross.
ferganicum *Litw. ex Pavlov, l. c.* 149, in syn.: C. calcareum.
griseum *Korovin ex Pavlov, l. c.* 156.—Turkestan. Ross.
involutum *Pavlov, l. c.* 145.—Turkestan. Ross.
kzyl-kumi *Pavlov, l. c.* 154.—Turkestan. Ross.
lanciculatum *Pavlov, l. c.* 148.—Turkestan. Ross.
Muravljanskyi *Pavlov, l. c.* 153.—Turkestan. Ross.
orthotrichum *Pavlov, l. c.* 155.—Turkestan. Ross.
pellucidum *Pavlov, l. c.* 157.—Turkestan. Ross.
physopterum *Pavlov, l. c.* 148.—Turkestan. Ross.
plicatum *Pavlov, l. c.* 151.—Turkestan. Ross.
pulcherrimum *Korovin ex Pavlov, l. c.* 153.—Turkestan. Ross.
quadraepterum *Korovin ex Pavlov, l. c.* 147.—Turkestan. Ross.
Russanovi *Pavlov, l. c.* 146.—Turkestan. Ross.
spinosissimum *Pavlov, l. c.*—Turkestan. Ross.
squarrosum *Pavlov, l. c.* 152.—Turkestan. Ross.
tenue *Pavlov, l. c.* 147.—Turkestan. Ross.
turbineum *Pavlov, l. c.* 152.—Turkestan. Ross.
turkestanicum (*Korovin*) *Pavlov, l. c.* 155: C. comosum var. turkestanicum.

CALLISIA L. (Commelinac.).
cordifolia (*Sw.*) *E. Anders. & R. E. Woodson in Contrib. Arn. Arb.* No. ix. 117 (1935): Tradescantia cordifolia.

CALLISTACHYS Vent. (Legumin.).
ovalifolia (*Meissn.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 193 (1894): Oxylobium ovalifolium.

CALLISTEMON R. Br. (Myrtac.).
gnidioides (*Brongn. & Gris*) *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 6, in obs.: Melaleuca gnidioides.
lilacinus *Cheel in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, 1931, lvi. Abstr. p. xxxix. (1932), in obs., nomen.—Hab.?

CALLISTEPHUS Cass. (Compos.).
× sinensis *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 546 (1924), in obs.—Hort.

CALLITRICHE L. (Callitrichac.; Haloragac., Gen. Pl.).
Bolusiana *Schonl. & Pax ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 169 (1921), in obs.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Christensenii *Christoph. in Sc. Res. Norw. Antarct. Exped. 1927–8*, No. 13 (*Norske Vid.-Acad. Oslo*) 7 (1934).—Ins. Gough.

CALLITRIS Vent. (Pinac.; Conif., Gen. Pl.).
Mahoni (*Mast.*) *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* ii. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 88 (1908), in obs.: Widdringtonia Mahoni.
Whytei (*Rendle*) *Engl. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* 93 (1895): Widdringtonia Whytei.

CALLUNA Salisb. (Ericac.).
vulgaris (*L.*) *Hull, Brit. Fl.* ed. 2, i. 114 (1808): Erica vulgaris.

CALOCHILUS R. Br. (Orchidac.).
grandiflorus *Rupp in Vict. Nat.* l. 240 (1934).—Austral. (Queensland).

CALOCHORTUS Pursh (Liliac.).
maculatus *Eastw. in Leafl. West. Bot.* i. 133 (1934).—U.S.A. (Calif.).
superbus *Purdy apud Howell in Leafl. West. Bot.* i. 11 (1932).—U.S.A. (Calif.).
Westoni *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 136 (1931).—U.S.A. (Calif.).

CALOLISIANTHUS Gilg (Gentianac.).
Tatei *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 449.—Venez.

CALONCOBA Gilg (Flacourtiac.).
angolensis *Exell & Sleum. in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 228.—Angola.
cauliflora *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 86 (1934).—Tanganyika Terr.
Grotei *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 568 (1921), in obs.—Tanganyika Terr.

CALOPHACA Fisch. (Legumin.).
hispida *Regel ex Boriss. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 139 (1933), in syn.: C. grandiflora.
polystichoides *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 552 (1933).—China (Szechuan; Yunnan).
sericea *B. Fedtsch. ex Boriss. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 139 (1933).—Ross. asiat. centr.
sinica *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 210.—China (Shansi).
tianschanica (*B. Fedtsch.*) *Boriss. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 137 (1933): C. nigricans var. tianschanica.

CALOPHYLLUM L. (Guttif.).
angulare *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 379.—Bras. (Matto Grosso).
neo-ebudicum *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 227.—N. Hebrides.
samoënse *Christoph. in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 128, 147 (1935).—Samoa.
Sorapa *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxxv. (*Hist. Nat. Pl.* v. Atlas, iii.) t. 358 (1896).—Madag.
Wakamatsui *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 401.—Ins. Palau.

CALOPOGONIUM Desv. (Legumin.).
pedunculatum *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 61 (1935).—Mexico.

CALORHABDOS Benth. (Scrophulariac.).
formosana (*Masamune*) *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 54 (1934): Veronica formosana.
Kitamurae *Ohwi, l. c.*—Formosa.

CALOSTIGMA Decne. (Asclepiadac.).
Brandonianum *Alv. Silv. Fl. Mont.* ii. Indice, p. iv. (1931), sphalm.: C. Baetaeanum.
peruvianum *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 788 (1933).—Peruv.

CALPIDISCA Barnh. (Lentibulariac.).
amethystina (*Salzm. ex A. St.-Hil. & Girard*) *Barnh. in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 468: Utricularia amethystina.
hispida (*Lam.*) *Barnh. l. c.* 469: Utricularia hispida.
modesta (*A. DC.*) *Barnh. l. c.*: Utricularia modesta.
Standleyae *Barnh. in Small, Man. Southeast. Fl.* 1234 (1933).—U.S.A. (Florida).

CALPIDOCHLAMYS Diels in Engl. Jahrb. lxvii. 172 (1935). *MORACEAE.*
Branderhorstii *Diels, l. c.* 173.—N. Guin.
drupacea *Diels, l. c.*—N. Guin.

CALPOCALYX Harms (Legumin.).
Aubrevillei *Pellegr. in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 467.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
cauliflorus *Hoyle in Kew Bull.* 1933, 172.—Nigeria.

CALVOA Hook. f. (Melastomatac.).
monticola *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 209 (1927), in clavi; *Hutchinson & Dalziel in Kew Bull.* 1928, 221, descr.; *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 680, descr. ampl.—Afr. trop. occ.
pulcherrima *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 757 (1921), in obs.—Cameroons.
rosularis *Gilg ex Engl. l. c.* 759, in obs.—Cameroons.
Zenkeri *Gilg ex Engl. l. c.* 757, in obs.—Cameroons.

CALYCOGONIUM DC. (Melastomatac.).
impressum *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. a. No. 11, 25 (1931).—Santo Domingo.

CALYCOMELIA Kostel. (Oleac.).
caroliniana (*Mill.*) *Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl.* iii. 1004 (1834), in obs.: Fraxinus caroliniana.

CALYCOPHYLLUM DC. (Rubiac.).
acreanum *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 70 (1935).—Bras. (Amaz.).
Spruceanum (*Benth.*) *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* vi. vi. 191 (1889): Eukylista Spruceana.

CALYCOPHYSUM (Calycophisum) Karst. & Triana in Triana, Nuev. Jen. i Esp. Fl. Neo-Granad. 20 (1854); Karst. in Linnaea, xxviii. 427 (1857); Sprague in Kew Bull. 1934, 396. *CUCURBITACEAE.*
pedunculatum *Karst. & Triana, l. c.* 21; *Karst. l. c.* 428; *Sprague, l. c.*—Colomb.
Weberbaueri *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 773 (1933).—Peruv.

CALYCORECTES Berg (Myrtac.).
Bergii *Sandwith in Kew Bull.* 1932, 212: C. latifolius *Berg*, non Eugenia latifolia *Aubl.*

CALYCOSTYLIS Hort. ex Vilmorin's Blumeng., ed. 3, Sieb. & Voss, i. 809 (1895), in syn.: **Beloperone** Nees (Acanthac.).
aurantiaca *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in syn.: Beloperone aurantiaca.

CALYCOTOME Link (Legumin.).
Grosii *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 278 [1928].—Marocc.

CALYDOREA Herb. (Iridac.).
xyphioides (*Poepp.*) *Espinosa in Rev. Chil. Hist. Nat.* 1922, xxvi. 18: Sisyrinchium xiphioides.

CALYMMATIUM O. E. Schulz in Engl. Jahrb. lxvi. 91 (1933). *CRUCIFERAE.*
draboides (*Korsh.*) *O. E. Schulz, l. c.*, in obs.: Capsella draboides.

CALYPSO Thou. (Hippocrateac.; Celastrac., Gen. Pl.).
oppositifolia *J. St.-Hil. Expos. Fam. Nat.* ii. 341 (1805).—Madag.

CALYPTOCHLOA C. E. Hubbard in Hook. Ic. Pl. xxxiii. t. 3210 (1933). *GRAMINEAE.*
gracillima *C. E. Hubbard, l. c.*—Austral. (Queensland).

CALYPTRACORDIA Britton (Boraginac.).
abyssinica (*DC.*) *Friesen in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1931–2, Sér. II. xxiv. 180 (1933): Varronia abyssinica.
rotundifolia (*Ruiz & Pav.*) *Friesen, l. c.* 181: Cordia rotundifolia.

CALYPTRANTHES Sw. (Myrtac.).
Barkeri *Ekman & Urb.*; *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 23 (1932), descr. ampl.—Santo Domingo.
Bartlettii *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 136 (1932).—Brit. Honduras.
depressa *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 23 (1932).—Santo Domingo.
Ekmanii *Urb.*; *Urb. l. c.* 26, descr. ampl.—Haiti.
grandis *Urb. & Ekman, l. c.* 20.—Haiti.
heteroclada *Urb. & Ekman, l. c.* 21.—Haiti.
involucrata *Urb. & Ekman, l. c.* 24.—Haiti.
laevigata *Urb. & Ekman, l. c.* 21.—Santo Domingo.
Luetzelburgii *Burret ex Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste Braz.* iii. 200 (1923) [*Insp. Fed. Obras Secc.* Publ. 57], nomen; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 151.—Bras. (Parahyba).
megistophylla *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 75 (1935).—Brit. Honduras.
myrcioides *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 25 (1932).—Santo Domingo.
palustris *Urb. & Ekman, l. c.* 22.—Santo Domingo.
picachoana *Urb. & Ekman, l. c.* 26.—Santo Domingo.
yaquensis *Urb. & Ekman, l. c.* 24.—Santo Domingo.

CALYPTRIDIUM Nutt. (Portulacac.).
pygmaeum *Parish ex Rydb. in N. Am. Fl.* xxi. 320 (1932).—U.S.A. (Calif.).

CALYPTROCALYX Blume (Palmae).
Archboldianus *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 323 (1935).—N. Guin.

CALYPTROPSIDIUM Berg (Myrtac.).
Ekmanii *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 17 (1932).—Haiti.

CALYSTEGIA R. Br. (Convolvulac.).
glabrata (*H. Hallier*) *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 85 (1935): Convolvulus kilimandschari var. glabratus.
hederacea *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 94 (1824).—Nepal.

CAMASSIA Lindl. (Liliac.).
hyacinthina (*Rafin.*) *Palmer & Steyerm. in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1935, xxii. 502: Lemotris hyacinthina.

CAMCHAYA Gagnep. (Compos.).
loloana *Dunn ex Kerr in Kew Bull.* 1935, 327.—Siam.
montana (*Gagnep.*) *Kerr, l. c.* 328: Thorelia montana.
tenuiflora *Kerr, l. c.* 327.—Siam.

CAMELINA Crantz (Crucif.).
rigidula *Bornm. & Gauba in Fedde, Repert.* xxxix. 84 (1935).—Persia.

CAMELLIA L. (Theac.; Ternstroemiac., Gen. Pl.).
buisanensis *Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1931, xxi. 222.—Formosa.
caduca *C. B. Clarke ex Brandis, Indian Trees*, 61 (1906), in obs.; *U. N. & P. C. Kanj. & Das, Fl. Assam*, i. 1. 123 (1934).—Sikkim; Khasia; Bhutan.
Miyagii (*Koidz.*) *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 738 (1931): Thea Miyagii.
saluenensis *Stapf ex Bean, Trees & Shrubs Brit. Isles*, iii. 66 (1933).—China (Yunnan).
tegmentosa (*Koidz.*) *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 740 (1931): Thea tegmentosa.
vernalis (*Makino*) *Makino in Journ. Jap. Bot.* i. 40 (1918): Thea Sasanqua var. vernalis.
virgata (*Koidz.*) *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 740 (1931): Thea virgata.

CAMPANULA L. (Campanulac.).
agrestis *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 97 (1824).—Nepal.

CAMPANULA:—
argyrotricha *Wall.*; *DC. Prodr.* vii. 473 (1839), descr.—Ind. or. (Kumaon).
aristata *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 98 (1824).—Reg. Himal.
Bertolae *Colla, Herb. Pedem.* iv. 24 (1835).—Ital.
bravensis (*Bolle*) *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1935, xv. 889: C. Jacobaea var. bravensis.
burgalensis *Font Quer in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, v. Ser. Bot. No. 5, 40 (1924).—Hispan.
cana *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 101 (1824).—Reg. Himal.
carnosa *Wall. l. c.* 102.—Reg. Himal.
Cecilii *Hort. ex Gard. Chron.* 1931, Ser. III. lxxxix. 397; *Milne-Redhead in Bot. Mag.* sub t. 9349 (1934), in syn.: C. propinqua var. grandiflora *Milne-Redhead.*
colorata *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 101 (1824).—Reg. Himal.
Cuatrecasasii *Pau in Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xii. 442 (1929).—Hispan.
dehiscens *Roxb. Hort. Beng.* 85 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 96 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 505 (1832).—Ind. or. (Bengal).
elata *Colla, Herb. Pedem.* iv. 26 (1835).—Hab.?
elegantissima *Grossheim in Trud. Azerb. Otdyel. Zakavk. Fil. Akad. Nauk SSSR*, Sect. Bot., i. 56 (1933).—Armen.; Transcaucas.
Embergeri *Litard. & Maire*; *Litard. & Maire in Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc*, No. xxvi. 26 (1930), descr. ampl.—Marocc.
Fomini *Grossheim in Trud. Azerb. Otdyel. Zakavk. Fil. Akad. Nauk SSSR*, Sect. Bot., i. 56 (1933).—Transcaucas.
fulgens *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 99 (1824).—Reg. Himal.
Hernandezi *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 75 [1933], nomen.—Marocc.
hierapetrae *K. H. Rechinger in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1935, lxxxiv. 170.—Creta.
kachethica *Kantsch. in Monit. Jard. Bot. Tiflis*, 1928–30, n. s. Pt. 5, 2 (1931).—Caucas.
Ketzkhovelii *Sosn. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 69 (1934).—Caucas.
lancifolia *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 96 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 505 (1832).—Ind. or.
lapponica (*Witasek*) *C. Regel in Fedde, Repert. Beih.* lxxxii. 1. 87 (1935): C. rotundifolia f. lapponica.
leptosiphon *Pau & Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 75 [1933], nomen.—Marocc.
×Mayi *Hort. ex Gard. Chron.* 1899, Ser. III. xxvi. 96, 126.—Hab.?
migarica *Schischk. in Trud. Azerb. Otdyel. Zakavk. Fil. Akad. Nauk SSSR*, Sect. Bot., i. 49 (1933).—Transcaucas.
Molineri *Colla, Herb. Pedem.* iv. 17 (1835).—Ital.
nitida [*Soland. in*] *Ait. Hort. Kew.* ed. 1, i. 221 (1789): C. planiflora *Lam.*
Pauí *Font Quer in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, v. Ser. Bot. No. 5, 40 (1924).—Hispan.
ramulosa *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 100 (1824).—Reg. Himal.
Re *Colla, Herb. Pedem.* iv. 25 (1835).—Ital.
Reiseri *Halácsy in Österr. Bot. Zeitschr.* 1896, xlvi. 15, in obs.—Graecia.
Ruprechtii *Grossheim in Bull. Polytechn. Inst. Tiflis*, ii. 201 (1926): C. glomerata var. caucasica *Trautv.*
saxifragoides *Doumergue*; *Litard. & Maire in Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc*, No. xxvi. 28 (1930), descr. emend.—Marocc.
Sibthorpiana *Halácsy, Consp. Fl. Graec.* ii. 268 (1902).—Graecia.
sylvatica *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 97 (1824): C. stricta *Wall.*
Tillischii *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxvi. 142 (1934).—As. Min. (Lydia).
Uyemurae (*Kudo*) *Miyabe & Tatewaki in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.* xiv. 81 (1935): Adenophora Uyemurae.

CAMPHOROSMA L. (Chenopodiac.).
nestensis *Turrill in Kew Bull.* 1935, 142.—Thracia.

CAMPNOSPERMA Thwait. (Anacardiac.).
squamatum *Ridley in Kew Bull.* 1933, 197.—Borneo.

CAMPOMANESIA Ruiz & Pav. (Myrtac.).
dulcis (*Vell.*) *Macbride in Candollea*, v. 394 (1934): Psidium dulce.
sparsiflora (*DC.*) *Macbride, l. c.*: Eugenia sparsiflora.

CAMPSIDIUM Seem. (Bignoniac.).
valdivianum *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 801 (1895), in syn.: C. chilense.

CAMPSIS Lour. (Bignoniac.).
chinensis (*Lam.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 801 (1895): Bignonia chinensis.
×Tagliabuana (*Vis.*) *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 340: Tecoma Tagliabuana.

CAMPTOPUS Hook. f. (Rubiac.).
Flamignii *De Wild. Pl. Bequaert.* vi. 88 (1932).—Congo Belg.
Letestui *De Wild. l. c.* 89.—Congo Belg.

CAMPTORRHIZA Hutchinson, Fam. Fl. Pl. ii. Monocot., 101 (1934), in clavi; Phillips in Fl. Pl. S. Afr. 1935, xv. t. 575, descr. *LILIACEAE.*
Schlechteri (*Engl.*) *Phillips l. c.*: Iphigenia Schlechteri.

CAMPTOSEMA Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. 200 (1832). *LEGUMINOSAE.*
rubicundum *Hook. & Arn. l. c.* 201.—Argent.

CAMPYLANDRA Baker (Liliac.).
cauliflora *Chun in Sunyatsenia*, i. 213 (1934).—China (Kwangtung).
kwangtungensis *Dandy in Sunyatsenia*, i. 127 (1933).—China (Kwangtung).
Watanabei (*Hayata*) *Dandy, l. c.*, in adnot.: Rohdea Watanabei.

CAMPYLANTHUS Roth (Scrophulariac.).
spathulatus *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1935, xv. 897.—Ins. C. Verde.

CAMPYLOTHECA Cass. (Compos.).
Beckiana *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 359 (1935).—Ins. Marquesas (Eiao).
collina (*Degener & Sherff*) *Forest Brown, l. c.* 354: Bidens collina.
cordifolia *Sch. Bip.*; *Forest Brown, l. c.* 357, descr. ampl.—Ins. Marquesas.
Henryi (*Sherff*) *Forest Brown, l. c.* 355, cum descr. emend.: Bidens Henryi.
Mathewsii (*Sherff*) *Forest Brown, l. c.*: Bidens Mathewsii.
serrulata *Sch. Bip.*; *Forest Brown, l. c.* 356, descr. emend.—Ins. Marquesas.
uapensis *Forest Brown, l. c.* 358.—Ins. Marquesas (Uapou).

CAMPYLOTROPIS Bunge (Legumin.).
reticulata *Chien in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., viii. 129 (1932).—China (Szechuan).

CAMUNIUM Adans. (Meliac.).
chinense *Roxb. Hort. Beng.* 18 (1814); *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 425 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 636 (1832).—China.

CANARIUM L. (Burserac.).
aneityense *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 54.—N. Hebrides.
angulatum *Ridley in Kew Bull.* 1931, 493.—Borneo.
apertum *H. J. Lam in Ann. Jard. Bot. Buitenz.* xlii. 214 (1932): Santiria serrulata.
decipiens *H. J. Lam, l. c.* 209.—Arch. Mal.
Endertii *H. J. Lam, l. c.* 210.—Borneo.
Engleri *H. J. Lam, l. c.* 208: C. oleosum *Engl.*, quoad. spec. Indo-chin.
grandifolium (*Ridley*) *H. J. Lam, l. c.* 215: Trigonochlamys grandifolia.
intermedium *H. J. Lam, l. c.* 213.—Sumatra.
karoënse *H. J. Lam, l. c.* 215.—Sumatra.
Leeuwenii *H. J. Lam, l. c.* 210.—N. Guin.
lian *H. J. Lam, l. c.* 209.—Ins. Molucc.
lineistipula (*K. Schum. & Lauterb.*) *H. J. Lam, l. c.* 210: Santiria lineistipula.

CANARIUM:—
Mafoa *Christoph. in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 128, 111 (1935).—Samoa.
multifidum *H. J. Lam in Ann. Jard. Bot. Buitenz.* xlii. 215 (1932).—Borneo.
multijugum *H. J. Lam, l. c.* 212.—Celebes; Ins. Molucc. (Halmahera).
Nungi *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 236.—N. Hebrides.
oleosum (*Lam.*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* iii. iv. 241 (1896): Amyris oleosa.
papuanum *H. J. Lam in Ann. Jard. Bot. Buitenz.* xlii. 211 (1932).—N. Guin.
pseudopatentinervium *H. J. Lam, l. c.* 214.—Sumatra; Borneo.
quadrangulare *H. J. Lam, l. c.* 219.—N. Guin.
salomonense *B. L. Burtt in Kew Bull.* 1935, 302.—Ins. Solomon (Bougainville).
trigonum *H. J. Lam in Ann. Jard. Bot. Buitenz.* xlii. 219 (1932).—Celebes.
Vrieseo-Teysmannii *H. J. Lam, l. c.* 216.—Ins. Molucc.

CANAVALIA DC. (Legumin.).
raiateënsis *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 102, 29 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).

CANCRINIA Kar. & Kir. (Compos.).
paucicephala *Ling in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping,* ii. 503 (1934).—Tibet.

CANEPHORA Juss. (Rubiac.).
Humblotii *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxxvi. (*Hist. Nat. Pl.* vi. Atlas, iv.) t. 444 (1897).—Madag.

CANISTRUM E. Morr. (Bromeliac.).
minutum (*Mez*) *L. B. Smith in Proc. Am. Acad.* lxviii. 145 (1933): Nidularium minutum.
perplexum *L. B. Smith, l. c.* lxx. 148 (1935).—Bras. (S. Paulo).

CANNA L. (Cannac.; Scitamin., Gen. Pl.).
×hortensis *Guillaumin, Fl. Jard.* iii. (*Encycl. Prat. Nat.* xvii.) 54 (1934).—Hort.

CANSCORA Lam. (Gentianac.).
lucidissima (*Léveillé & Vaniot*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 234 (1931), in obs.: Euphorbia lucidissima.
melastomacea *Hand.-Mazz. in Sinensia,* ii. 131 (1932).—China (Kwangsi).

CANTHIUM Lam. (Rubiac.).
angustifolium *Roxb. Hort. Beng.* 85 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 169 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 533 (1832).—Ind. or. (Bengal; Assam).
apiculatifolium (*De Wild.*) *Robyns in Journ. Bot.* 1931, lxix. 190: Plectronia apiculatifolia.
Bakerianum *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxxvi. (*Hist. Nat. Pl.* vi. Atlas, iv.) t. 437 (1897).—Madag.
Brownii *Bullock in Kew Bull.* 1932, 370.—Uganda.
brunnescens *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 135 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 330, descr. ampl.—Siam.
Burttii *Bullock in Kew Bull.* 1933, 146.—Tanganyika Terr.
calcicola *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 136 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 331, descr. ampl.—Siam.
calvum *Craib, l. c.*; *Craib, l. c.*, descr. ampl.—Siam.
captum *Bullock in Kew Bull.* 1932, 376.—Tanganyika Terr.
charadrophilum (*K. Krause*) *Bullock, l. c.* 369: Plectronia charadrophila.
clityophyllum *Bullock, l. c.* 382.—Tanganyika Terr.
coromandelicum (*Burm. f.*) *Alston in Trimen, Handbook Fl. Ceylon,* vi. Suppl., 152 (1931): Gmelina coromandelica.
costatum *C. T. White in Contrib. Arn. Arb.* No. iv. 99 (1933).—Austral. (Queensland).
didymocarpum *Peter ex Bullock in Kew Bull.* 1932, 389, nomen.—Tanganyika Terr.
Diplodiscus (*K. Schum.*) *Bullock, l. c.* 387: Plectronia Diplodiscus.
Dunlapii *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 113, in clavi, 115 (1931).—Cameroons.

CANTHIUM:—
egregium *Bullock in Kew Bull.* 1932, 384.—Tanganyika Terr.
euryoides *Bullock ex Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 113 (1931); *Bullock in Kew Bull.* 1932, 384: C. nitens *Hiern.*
favosum *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 112, in clavi, 113 (1931).—Nigeria.
ferrugineum *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 138 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 332, descr. ampl.—Siam.
foliosum (*Burtt Davy*) *Burtt Davy in Kew Bull.* 1935, 568: Plectronia foliosa.
Greenwayi *Bullock in Kew Bull.* 1932, 387.—Tanganyika Terr.
Guidottii *Chiov. Fl. Somala,* II. 246 (1932), in syn.: Plectronia Guidottii.
horridulum *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 139 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 332, descr. ampl.—Siam.
inaequilaterum *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 112, in clavi, 115 (1931).—Nigeria.
indutum *Bullock in Kew Bull.* 1932, 366.—Tanganyika Terr.
inopinatum *Bullock, l. c.* 389.—Tanganyika Terr.
Junodii (*Burtt Davy*) *Burtt Davy in Kew Bull.* 1935, 568: Plectronia Junodii.
keniense *Bullock in Kew Bull.* 1932, 377.—Kenya Col.
korrense (*Valeton*) *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo,* 1932, xlvi. 671: Plectronia korrensis.
lacus-victoriae *Bullock in Kew Bull.* 1932, 384.—Uganda.
longipes *Geddes in Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 140 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 333, descr. ampl.—Siam.
malacocarpum (*K. Schum. & K. Krause*) *Bullock in Kew Bull.* 1932, 384: Plectronia malacocarpa.
Martinii *Dunkley in Kew Bull.* 1934, 187.—N. Rhodesia.
melanophengos *Bullock in Kew Bull.* 1932, 375.—Kenya Col.; Tanganyika Terr.
Merrillii (*Setchell*) *Christoph. in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 128, 201 (1935): Plectronia Merrillii.
micans *Bullock in Kew Bull.* 1932, 382: Plectronia lamprophylla *K. Schum.*, non Canthium lamprophyllum *F. Muell.*
moluccanum *Roxb. Hort. Beng.* 85 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 172 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 536 (1832).—Ins. Molucc.
nitidum *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 141 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 334, descr. ampl.—Siam.
oblongum (*Valeton*) *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo,* 1932, xlvi. 671: Plectronia oblonga.
ovatum (*Burtt Davy*) *Burtt Davy in Kew Bull.* 1935, 568: Plectronia ovata.
pallidum (*K. Schum.*) *Bullock in Kew Bull.* 1932, 387: Plectronia pallida.
parvifolium *Roxb. Hort. Beng.* 15 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 170 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 534 (1832).—Ind. or.
Pobeguinii *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 113, in clavi, 115 (1931).—Guinea Gall.
polyneurum (*Valeton*) *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo,* 1932, xlvi. 672: Plectronia polyneura.
purpurascens *Bullock in Kew Bull.* 1932, 368.—Tanganyika Terr.
quadratum *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 142 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 334, descr. ampl.—Siam.
recurvifolium *Bullock in Kew Bull.* 1932, 385.—Kenya Col.; Ins. Pemba.
rhamnifolium *Chiov. Fl. Somala,* II. 243 (1932), in syn.: Plectronia rhamnifolia.
Robynsianum *Bullock in Kew Bull.* 1932, 377.—Kenya Col.
rufivillosum *Robyns ex Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 112, in clavi, 113 (1931).—Sierra Leone.
ruwenzoriense *Bullock in Kew Bull.* 1932, 376.—Uganda.
sarmentosum *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 143 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 335, descr. ampl.—Siam.

CANTHIUM:—
Sarogliae *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya,* 55 (1935).—Kenya Col.
scabrosum *Bullock in Kew Bull.* 1932, 367.—Uganda; Tanganyika Terr.
sclerocarpum (*K. Schum.*) *Bullock, l. c.* 375: Plectronia sclerocarpa.
Sennii *Chiov. Fl. Somala,* II. 243 (1932), in syn.: Plectronia Sennii.
Siebenlistii (*K. Krause*) *Bullock in Kew Bull.* 1932, 379: Plectronia Siebenlistii.
simile *Merrill & Chun in Sunyatsenia,* ii. 19 (1934).—China (Kwangtung).
sordidum (*K. Schum.*) *Bullock in Kew Bull.* 1932, 366: Plectronia sordida.
sphaerocarpum *Schweinf. ex Bullock, l. c.* 371, in syn.: C. venosum.
spinosissimum *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xi. 56 (1932).—China (Hainan).
stellulatum *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 143 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 335, descr. ampl.—Siam.
strigosum *Craib, l. c.*; *Craib, l. c.* 336, descr. ampl.—Siam.
strychnoides *Craib, l. c.* 144; *Craib, l. c.* 337, descr. ampl.—Siam.
Stuhlmannii *Bullock in Kew Bull.* 1932, 376.—Tanganyika Terr.
subaureum *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 144 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 337, descr. ampl.—Siam.
subopacum (*K. Schum. & K. Krause*) *Bullock in Kew Bull.* 1932, 380: Plectronia subopaca.
syringodorum (*K. Schum.*) *Bullock, l. c.* 373: Plectronia syringodora.
tinianense (*Kanehira*) *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo,* 1935, xlix. 354: Randia tinianensis.
urophyllum *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya,* 54 (1935).—Kenya Col.
Valetonii *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo,* 1932, xlvi. 671: Plectronia obovata *Valeton*, non Canthium obovatum *Klotzsch.*
venosissimum *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 113, in clavi, 115 (1931).—Liberia; Gold Coast.
verticillatum (*Valeton*) *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo,* 1932, xlvi. 672: Plectronia verticillata.
vulgare (*K. Schum.*) *Bullock in Kew Bull.* 1932, 374: Plectronia vulgaris.

CANTUA Juss. (Polemoniac.).
splendens *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss,* i. 686 (1895), in syn.: C. buxifolia.

CAOPIA Adans. (Guttif.).
guianensis [sphalm. guaianensis] (*DC.*) *Lyons, Plant Names Scientific & Popular,* ed. 2, 94 (1907): Vismia guianensis.
parvifolia *Rusby in Phytologia,* i. 65 (1934).—Boliv.

CAPANEMIA Barb. Rodr. (Orchidac.).
Duseniana (*Kraenzl.*) *C. Porto & Brade in Rodriguesia,* i. No. 2, 20 (1935): Quekettia Duseniana.

CAPIRONA Spruce (Rubiac.).
surinamensis *Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 261.—Surinam.

CAPNOIDES Mill. (Papaverac.).
fabacea (*Pers.*) *Lyons, Plant Names Scientific & Popular,* 79 (1900): Corydalis fabacea.
tuberosa (*DC.*) *Lyons, l. c.*: Corydalis tuberosa.

CAPNOPHYLLUM Gaertn. (Umbellif.).
nodiflorum (*Coss.*) *Drude ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. ii. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 822 (1921), in obs.: Sclerosciadium nodiflorum.

CAPPARIS L. (Capparidac.).
acutifolia *Macbride in Candollea,* v. 358 (1934).—Peruv.
alexandrae *Chiov. Fl. Somala,* II. 463 (1932).—Somal. Ital.
carolinensis *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo,* 1934, xlviii. 919.—Ins. Palau.
Koi *Merrill & Chun in Sunyatsenia,* ii. 28 (1934).—China (Hainan).
Liangii *Merrill & Chun, l. c.* 29.—China (Hainan).
Lundellii *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 57 (1935).—Guatem.

CAPPARIS:—
orthacantha *Gilg-Benedict in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 504 (1935).—Tanganyika Terr.
prisca *Macbride in Candollea*, v. 358 (1934).—Peruv.
Quina *Macbride, l. c.* 357.—Peruv.
sola *Macbride, l. c.* 359.—Peruv.
surinamensis *Went in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 164.—Guiana Bat.

CAPRIFOLIUM Mill. (Caprifoliac.).
brachypodum *Gordon in Garden*, xi. 88 (1877).—Japon.
confusum (*Sweet*) *Gordon, l. c.*: Nintooa confusa.

CAPSELLA Medik. (Crucif.).
abscissa (*Almq.*) *Almq. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1920, vi. 193, t. 3, 205, t. 8, fig. b (1921); *et in Acta Hort. Berg.* vii. 69, fig. k (1921): 'C. Bursa-pastoris abscissa'.
aestivalis (*Almq.*) *Almq. in Acta Hort. Berg.* vii. 75, fig. g (1921): 'C. Bursa-pastoris aestivalis'.
alandica (*Almq.*) *Almq. l. c.* 84, fig. i: 'C. Bursa-pastoris alandica'.
algida (*Almq.*) *Almq. l. c.* 54, fig. a: 'C. Bursa-pastoris algida'.
alpestris (*Almq.*) *Almq. l. c.* 84, fig. t: 'C. Bursa-pastoris alpestris'.
altissima (*Almq.*) *Almq. l. c.* 66, fig. l: 'C. Bursa-pastoris altissima'.
angermannica (*Almq.*) *Almq. l. c.* 78, fig. m: 'C. Bursa-pastoris angermannica'.
anglica (*Almq.*) *Almq. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1920, vi. 191, t. 2, 200, t. 6, fig. d (1921); *et in Acta Hort. Berg.* vii. 51, fig. d (1921): 'C. Bursa-pastoris anglica'.
angustiloba (*Almq.*) *Almq. in Acta Hort. Berg.* vii. 75, fig. h (1921): 'C. Bursa-pastoris angustiloba'.
autumnalis (*Almq.*) *Almq. l. c.* 75, fig. b: 'C. Bursa-pastoris autumnalis'.
batavorum (*Almq.*) *Almq. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1920, vi. 197, t. 5, fig. b (1921): 'C. Bursa-pastoris batavorum'.
belgica (*Almq.*) *Almq. l. c.* 203, t. 7, fig. a: 'C. Bursa-pastoris belgica'.
bicuspis (*Almq.*) *Almq. in Acta Hort. Berg.* vii. 84, fig. a (1921): 'C. Bursa-pastoris bicuspis'.
biformis (*Almq.*) *Almq. l. c.* 61, fig. m: 'C. Bursa-pastoris biformis'.
bottnica (*Almq.*) *Almq. l. c.* 66, fig. d: 'C. Bursa-pastoris bottnica'.
bremensis (*Almq.*) *Almq. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1920, vi. 205, t. 8, fig. c (1921); *et in Acta Hort. Berg.* vii. 69, fig. l (1921): 'C. Bursa-pastoris bremensis'.
brevisiliqua (*Almq.*) *Almq. in Acta Hort. Berg.* vii. 66, fig. a (1921): 'C. Bursa-pastoris brevisiliqua'.
Brittonii (*Almq.*) *Almq. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1920, vi. 197, t. 5, fig. c (1921); *et in Acta Hort. Berg.* vii. 84, fig. o (1921): 'C. Bursa-pastoris Brittonii'.
calmariensis (*Almq.*) *Almq. in Acta Hort. Berg.* vii. 78, fig. g (1921): 'C. Bursa-pastoris calmariensis'.
caucasica (*Almq.*) *Almq. l. c.* 66, fig. k: 'C. Bursa-pastoris caucasica'.
cavata (*Almq.*) *Almq. l. c.* 56, fig. l: 'C. Bursa-pastoris cavata'.
collina (*Almq.*) *Almq. l. c.* 81, fig. d: 'C. Bursa-pastoris collina'.
compacta (*Almq.*) *Almq. l. c.* 66, fig. h: 'C. Bursa-pastoris compacta'.
concava (*Almq.*) *Almq. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1920, vi. 200, t. 6, fig. a (1921); *et in Acta Hort. Berg.* vii. 51, fig. a (1921): 'C. Bursa-pastoris concava'.
convexiformis (*Almq.*) *Almq. in Acta Hort. Berg.* vii. 61, fig. q (1921): 'C. Bursa-pastoris convexiformis'.
cordata (*Almq.*) *Almq. l. c.* 66, fig. f: 'C. Bursa-pastoris cordata'.
cordigera (*Östman*) *Almq. l. c.* 84, fig. c: 'C. Bursa-pastoris cordigera'.
Coronopus (*Almq.*) *Almq. l. c.* 61, fig. b: 'C. Bursa-pastoris Coronopus'.
cuneiformis (*Almq.*) *Almq. l. c.* 75, fig. e: 'C. Bursa-pastoris cuneiformis'.
cuneolata (*Almq.*) *Almq. l. c.* 72, fig. c: 'C. Bursa-pastoris cuneolata'.

CAPSELLA:—
curvisiliqua (*Almq.*) *Almq. in Acta Hort. Berg.* vii. 89, fig. f (1921): 'C. Bursa-pastoris curvisiliqua'.
cuspidata (*Almq.*) *Almq. l. c.* 89, fig. g: 'C. Bursa-pastoris cuspidata'.
denticulata (*Almq.*) *Almq. l. c.* 56, fig. e: 'C. Bursa-pastoris denticulata'.
difformis (*Almq.*) *Almq. l. c.* 78, fig. a: 'C. Bursa-pastoris difformis'.
diodonta (*Almq.*) *Almq. l. c.* 84, fig. d: 'C. Bursa-pastoris diodonta'.
Druceana (*Almq.*) *Almq. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1920, vi. 200, t. 6, fig. b (1921); *et in Acta Hort. Berg.* vii. 51, fig. b (1921): 'C. Bursa-pastoris Druceana'.
elegans (*Almq.*) *Almq. in Acta Hort. Berg.* vii. 61, fig. o (1921): 'C. Bursa-pastoris elegans'.
emarginata (*Almq.*) *Almq. l. c.* 84, fig. g: 'C. Bursa-pastoris emarginata'.
exotica (*Almq.*) *Almq. l. c.* 56, fig. c: 'C. Bursa-pastoris exotica'.
faucialis (*Almq.*) *Almq. l. c.* 61, fig. i: 'C. Bursa-pastoris faucialis'.
foliosa (*Almq.*) *Almq. l. c.* 54, fig. f: 'C. Bursa-pastoris foliosa'.
frigida (*Almq.*) *Almq. l. c.* 61, fig. n: 'C. Bursa-pastoris frigida'.
fucorum (*Almq.*) *Almq. l. c.* 61, fig. r: 'C. Bursa-pastoris fucorum'.
galicica (*Almq.*) *Almq. l. c.* 84, fig. s: 'C. Bursa-pastoris galicica'.
gallica (*Almq.*) *Almq. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1920, vi. 205, t. 8, fig. a (1921): 'C. Bursa-pastoris gallica'.
germanica (*Almq.*) *Almq. l. c.* 206, t. 9, fig. b; *et in Acta Hort. Berg.* vii. 72, fig. b (1921): 'C. Bursa-pastoris germanica'.
gothica (*Almq.*) *Almq. in Acta Hort. Berg.* vii. 78, fig. b (1921): 'C. Bursa-pastoris gothica'.
gotlandica (*Almq.*) *Almq. l. c.* 66, fig. g: 'C. Bursa-pastoris gotlandica'.
gracilescens (*Almq.*) *Almq. l. c.* 61, fig. e: 'C. Bursa-pastoris gracilescens'.
grossa (*Almq.*) *Almq. l. c.* 84, fig. r: 'C. Bursa-pastoris grossa'.
grosso-triangularis (*Almq.*) *Almq. l. c.* 66, fig. m: 'C. Bursa-pastoris grosso-triangularis'.
hanseatica (*Almq.*) *Almq. l. c.* 61, fig. k: 'C. Bursa-pastoris hanseatica'.
helsingica (*Almq.*) *Almq. l. c.* 69, fig. b: 'C. Bursa-pastoris helsingica'.
herjedalica (*Almq.*) *Almq. l. c.* 66, fig. b: 'C. Bursa-pastoris herjedalica'.
hians (*Almq.*) *Almq. l. c.* 89, fig. c: 'C. Bursa-pastoris hians'.
hiatula (*Almq.*) *Almq. l. c.* 78, fig. i: 'C. Bursa-pastoris hiatula'.
hiemalis (*Almq.*) *Almq. l. c.* 61, fig. a: 'C. Bursa-pastoris hiemalis'.
incisura (*Almq.*) *Almq. l. c.* 56, fig. o: 'C. Bursa-pastoris incisura'.
integrella (*Almq.*) *Almq. l. c.* 84, fig. p: 'C. Bursa-pastoris integrella'.
jemtlandica (*Almq.*) *Almq. l. c.* 69, fig. f: 'C. Bursa-pastoris jemtlandica'.
jeniseiensis (*Almq.*) *Almq. l. c.* 56, fig. b: 'C. Bursa-pastoris jeniseiensis'.
kyphosa (*Almq.*) *Almq. l. c.* 84, fig. f: 'C. Bursa-pastoris kyphosa'.
lacerata (*Almq.*) *Almq. l. c.* 69, fig. c: 'C. Bursa-pastoris lacerata'.
laevigata (*Almq.*) *Almq. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1920, vi. 197, t. 5, fig. d (1921); *et in Acta Hort. Berg.* vii. 81, fig. a (1921): 'C. Bursa-pastoris laevigata'.
lanceolato-caspica (*Almq.*) *Almq. in Acta Hort. Berg.* vii. 84, fig. n (1921): 'C. Bursa-pastoris lanceolato-caspica'.
lata (*Almq.*) *Almq. l. c.* 61, fig. g: 'C. Bursa-pastoris lata'.
latisiliqua (*Almq.*) *Almq. l. c.* 89, fig. d: 'C. Bursa-pastoris latisiliqua'.
laxa (*Almq.*) *Almq. l. c.* 81, fig. b: 'C. Bursa-pastoris laxa'.
lenaënsis (*Almq.*) *Almq. l. c.* 54, fig. e: 'C. Bursa-pastoris lenaënsis'.

CAPSELLA:—
leptoloba (*Almq.*) *Almq. in Acta Hort. Berg.* vii. 61, fig. d (1921): 'C. Bursa-pastoris leptoloba'.
linearis (*Almq.*) *Almq. l. c.* 61, fig. s: 'C. Bursa-pastoris linearis'.
lingulata (*Almq.*) *Almq. l. c.* 75, fig. l: 'C. Bursa-pastoris lingulata'.
lobulata (*Almq.*) *Almq. l. c.* 72, fig. d: 'C. Bursa-pastoris lobulata'.
longirostris (*Almq.*) *Almq. l. c.* 54, fig. d: 'C. Bursa-pastoris longirostris'.
longisiliqua (*Almq.*) *Almq. l. c.* 84, fig. e: 'C. Bursa-pastoris longisiliqua'.
lulensis (*Almq.*) *Almq. l. c.* 61, fig. p: 'C. Bursa-pastoris lulensis'.
lutetiana (*Almq.*) *Almq. l. c.* 75, fig. a: 'C. Bursa-pastoris lutetiana'.
macroclada (*Almq.*) *Almq. l. c.* 61, fig. c: 'C. Bursa-pastoris macroclada.
matura (*Almq.*) *Almq. l. c.* 78, fig. k: 'C. Bursa-pastoris matura'.
mediterranea (*Almq.*) *Almq. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1920, vi. 197, t. 5, fig. a (1921); *et in Acta Hort. Berg.* vii. 89, fig. a (1921): 'C. Bursa-pastoris mediterranea'.
microcarpa (*Almq.*) *Almq. in Acta Hort. Berg.* vii. 61, fig. t (1921): 'C. bursa-pastoris microcarpa'.
monasterialis (sphalm. monasteriensis) (*Almq.*) *Almq. l. c.* 56, fig. d, 57, 94: 'C. Bursa-pastoris monasterialis'.
nanella (*Almq.*) *Almq. l. c.* 72, fig. g: 'C. Bursa-pastoris nanella'.
nylandica (*Almq.*) *Almq. l. c.* 54, fig. b: 'C. Bursa-pastoris nylandica'.
obovata (*Östman*) *Almq. l. c.* 69, fig. a: 'C. Bursa-pastoris obovata'.
obtusa (*Almq.*) *Almq. l. c.* 84, fig. k: 'C. Bursa-pastoris obtusa'.
odontophylla (*Almq.*) *Almq. l. c.* 81, fig. f: 'C. Bursa-pastoris odontophylla'.
oelandica (*Almq.*) *Almq. l. c.* 84, fig. m: 'C. Bursa-pastoris oelandica'.
orientalis *Klokov in Bull. Soc. Nat. Voron.* i. 122 (1926).—Rossia.
origo (*Almq.*) *Almq. in Acta Hort. Berg.* vii. 61, fig. h (1921): 'C. Bursa-pastoris origo'.
oviculata (*Almq.*) *Almq. l. c.* 81, fig. g: 'C. Bursa-pastoris oviculata'.
ovifera (*Almq.*) *Almq. l. c.* 66, fig. i: 'C. Bursa-pastoris ovifera'.
patagonica (*Almq.*) *Almq. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1920, vi. 200, t. 6, fig. f (1921); *et in Acta Hort. Berg.* vii. 51, fig. f (1921): 'C. Bursa-pastoris patagonica'.
perconcava (*Almq.*) *Almq. in Acta Hort. Berg.* vii. 56, fig. m (1921): 'C. Bursa-pastoris perconcava'.
perdentata (*Almq.*) *Almq. l. c.* 75, fig. o: 'C. Bursa-pastoris perdentata'.
pergrossa (*Almq.*) *Almq. l. c.* 84, fig. q: 'C. Bursa-pastoris pergrossa'.
perhians (*Almq.*) *Almq. l. c.* 89, fig. e: 'C. Bursa-pastoris perhians'.
perversa (*Almq.*) *Almq. l. c.* 78, fig. f: 'C. Bursa-pastoris perversa'.
pinnata (*Almq.*) *Almq. l. c.* 75, fig. f: 'C. Bursa-pastoris pinnata'.
pinnato-foliosa (*Almq.*) *Almq. l. c.* 78, fig. d: 'C. Bursa-pastoris pinnato-foliosa'.
praematura (*Almq.*) *Almq. l. c.* 66, fig. c: 'C. Bursa-pastoris praematura'.
prionophylla (*Almq.*) *Almq. l. c.* 78, fig. l: 'C. Bursa-pastoris prionophylla'.
provincialis (*Almq.*) *Almq. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1920, vi. 200, t. 6, fig. c (1921); *et in Acta Hort. Berg.* vii. 51, fig. c (1921): 'C. Bursa-pastoris provincialis'.
querceti (*Almq.*) *Almq. in Acta Hort. Berg.* vii. 75, fig. m (1921): 'C. Bursa-pastoris querceti'.
ramselensis (*Almq.*) *Almq. l. c.* 56, fig. g: 'C. Bursa-pastoris ramselensis'.
rhenana *Almq. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1920, vi. 195, t. 4 (1921): C. Bursa-pastoris.
rhombea (*Almq.*) *Almq. in Acta Hort. Berg.* vii. 75, fig. k (1921): 'C. Bursa-pastoris rhombea'.
robusta (*Almq.*) *Almq. l. c.* 84, fig. h: 'C. Bursa-pastoris robusta'.

CAPSELLA:—
rubella (*Almq.*) *Almq. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1920, vi. 200, t. 6, fig. e (1921); *et in Acta Hort. Berg.* vii. 51, fig. e (1921): 'C. Bursa-pastoris rubella'.
rubelliformis (*Almq.*) *Almq. in Acta Hort. Berg.* vii. 56, fig. a (1921): 'C. Bursa-pastoris rubelliformis'.
rubiginosa (*Almq.*) *Almq. l. c.* 56, fig. k: 'C. Bursa-pastoris rubiginosa'.
salinula (*Almq.*) *Almq. l. c.* 72, fig. h: 'C. Bursa-pastoris salinula'.
savonica (*Almq.*) *Almq. l. c.* 78, fig. n: 'C. Bursa-pastoris savonica'.
scanica (*Almq.*) *Almq. l. c.* 78, fig. c: 'C. Bursa-pastoris scanica'.
scolio-caspica (*Almq.*) *Almq. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1920, vi. 200, t. 6, fig. g (1921); *et in Acta Hort. Berg.* vii. 51, fig. g (1921): 'C. Bursa-pastoris scolio-caspica'.
segetum (*Almq.*) *Almq. in Acta Hort. Berg.* vii. 81, fig. c (1921): 'C. Bursa-pastoris segetum'.
seleniaca (*Almq.*) *Almq. l. c.* 69, fig. h: 'C. Bursa-pastoris seleniaca'.
semilobata (*Almq.*) *Almq. l. c.* 54, fig. g: 'C. Bursa-pastoris semilobata'.
semirubella (*Almq.*) *Almq. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1920, vi. 197, t. 5, fig. e (1921); *et in Acta Hort. Berg.* vii. 56, fig. i (1921): 'C. Bursa-pastoris semirubella'.
sinuato-linearis (*Almq.*) *Almq. in Acta Hort. Berg.* vii. 81, fig. e (1921): 'C. Bursa-pastoris sinuato-linearis'.
sinuosa (*Almq.*) *Almq. l. c.* 89, fig. b: 'C. Bursa-pastoris sinuosa'.
smolandica (*Almq.*) *Almq. l. c.* 54, fig. c: 'C. Bursa-pastoris smolandica'.
subalgida (*Almq.*) *Almq. l. c.* 54, fig. h: 'C. Bursa-pastoris subalgida'.
subalpina (*Almq.*) *Almq. l. c.* 66, fig. e: 'C. Bursa-pastoris subalpina'.
subarctica (*Almq.*) *Almq. l. c.* 84, fig. b: 'C. Bursa-pastoris subarctica'.
subbergiana (*Almq.*) *Almq. l. c.* 69, fig. d: 'C. Bursa-pastoris subbergiana'.
subcanescens (*Almq.*) *Almq. l. c.* 75, fig. d: 'C. Bursa-pastoris subcanescens'.
subcavata (*Almq.*) *Almq. l. c.* 56, fig. h: 'C. Bursa-pastoris subcavata'.
subseleniaca (*Almq.*) *Almq. l. c.* 69, fig. i: 'C. Bursa-pastoris subseleniaca'.
tenella (*Almq.*) *Almq. l. c.* 69, fig. g: 'C. Bursa-pastoris tenella'.
tenera (*Almq.*) *Almq. l. c.* 72, fig. f: 'C. Bursa-pastoris tenera'.
teneriscens (*Almq.*) *Almq. l. c.* 72, fig. e: 'C. Bursa-pastoris teneriscens'.
tibelensis (*Almq.*) *Almq. l. c.* 78, fig. h: 'C. Bursa-pastoris tibelensis'.
tjustiana (*Almq.*) *Almq. l. c.* 56, fig. n: 'C. Bursa-pastoris tjustiana'.
trevirorum (*Almq.*) *Almq. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1920, vi. 206, t. 9, fig. a (1921); *et in Acta Hort. Berg.* vii. 72, fig. a (1921): 'C. Bursa-pastoris trevirorum'.
turoniensis (*Almq.*) *Almq. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1920, vi. 203, t. 7, fig. b (1921): 'C. Bursa-pastoris turoniensis'.
umensis (*Almq.*) *Almq. in Acta Hort. Berg.* vii. 56, fig. f (1921): 'C. Bursa-pastoris umensis'.
ursina (*Almq.*) *Almq. l. c.* 69, fig. e: 'C. Bursa-pastoris ursina'.
varia (*Almq.*) *Almq. l. c.* 78, fig. e: 'C. Bursa-pastoris varia'.
vestrogothica (*Almq.*) *Almq. l. c.* 84, fig. l: 'C. Bursa-pastoris vestrogothica'.
viaria (*Almq.*) *Almq. l. c.* 61, fig. l: 'C. Bursa-pastoris viaria'.
viarum (*Almq.*) *Almq. l. c.* 61, fig. f: 'C. Bursa-pastoris viarum'.
viminalis (*Almq.*) *Almq. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1920, vi. 206, t. 9, fig. c (1921): 'C. Bursa-pastoris viminalis'.
viridis (*Almq.*) *Almq. in Acta Hort. Berg.* vii. 75, fig. c (1921): 'C. Bursa-pastoris viridis'.

CAPSICODENDRON Hoehne in Ostenia, 294 (1933). *CANELLACEAE.*
pimenteira *Hoehne, l. c.*—Bras. (S. Paulo).

CAPSICUM L. (Solanac.).
mendax (*Heurck & Muell.-Arg.*) *Macbride in Candollea*, v. 402 (1934): Solanum mendax.
minimum *Roxb. Hort. Beng.* 17 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 261 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 574 (1832).—Ind. or.
petenense *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 84 (1935).—Guatem.
purpureum *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 259 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 573 (1832).—Ins. Molucc.
viscidum *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 84 (1935).—Guatem.

CARAGANA Lam. (Legumin.).
Licentiana *Hand.-Mazz. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1933, lxxxii. 249.—China (Kansu).

CARAIPA Aubl. (Guttif.; Ternstroemiac., Gen. Pl.).
heterocarpa *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 742.—Bras. (Amaz.).
odorata *Ducke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 588 (1932).—Bras. (Amaz.).

CARALLIA Roxb. (Rhizophorac.).
diplopetala *Hand.-Mazz. in Sinensia*, ii. 5 (1931).—China (Kwangsi).
floribunda *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 1. 1088 (1858): C. multiflora *Miq.*
Hulstijnii *Valeton in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. ii. 347 (1920).—Ins. Molucc. (Soela).

CARALLUMA R. Br. (Asclepiadac.).
adscendens (*Roxb.*) *Haw. Syn. Pl. Succ.* 47 (1812): Stapelia adscendens.
chibensis *Luckhoff in S. Afr. Gard.* 1935, xxv. 56, 57.—Rhodesia.
cincta *Luckhoff, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).
crassa *N. E. Brown in Gard. Chron.* 1935, Ser. III. xcviii. 6.—Somaliland.
edulis *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 65 (1931), in clavi.—Mauritania.
grandidens *Verdoorn in Fl. Pl. S. Afr.* 1933, xiii. t. 518.—Transvaal.
Keithii *R. A. Dyer in Fl. Pl. S. Afr.* 1935, xv. t. 600.—Swaziland.
Knobelii (*Phillips*) *Phillips in Fl. Pl. S. Afr.* 1935, xv. t. 593: Stapelia Knobelii.
Langii *A. White & Sloane, Stapel.* 61 (1933).—Kalahari.
longecornuta *Croizat ex Gomes & Sousa in Docum. Trimestr., Moçamb.* No. 4, 43, in obs., 44 (1935).—Afr. Lusit. Or.
Maughani *R. A. Dyer in Rec. Albany Mus.* iv. 115 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
mogadoxensis *Chiov. Fl. Somala*, II. 299 (1932).—Somal. Ital.
Moureti *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1934, xiv. 272, cum descr.: C. edulis *A. Cheval.*
oxyodonta *Chiov. Fl. Somala*, II. 298 (1932).—Somal. Ital.
piaranthoides *Oberm. in Fl. Pl. S. Afr.* 1935, xv. t. 599.—S. Rhodesia.
procumbens *Gravely & Mayuranathan in Bull. Madras Gov. Mus.* n. s. iv. 1. 26 (1931).—Ind. or. (Madras).
Rogersii (*L. Bolus*) *E. A. Bruce & R. A. Dyer in Kew Bull.* 1934, 303: Stapelia Rogersii.
rubiginosa *Werderm. in Fedde, Repert.* xxx. 54 (1932).—Afr. austr.-occ.?
Tapscoltii *Hort. ex Cactus Journ.* ii. 51 (1934), in obs., nomen.—Hab.?
tessellata *Pillans in Kew Bull.* 1933, 187.—Afr. austr. (Cape Prov.).
ubomboënsis *Verdoorn in Fl. Pl. S. Afr.* 1932, xii. t. 443.—Swaziland.
Vansonii *Bremek. & Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xvi. 429 (1935).—Bechuanaland Protect.
Vansonii *Hort. ex Cactus Journ.* ii. 51 (1934), in obs., nomen.—Hab.?
venenosa *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 305.—Sahara.
Villetii *Luckhoff in S. Afr. Gard.* 1935, xxv. 95, 96.—Afr. austr. (Cape Prov.).

CARAPA Aubl. (Meliac.).
Granatum (*Koenig*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 45 (1931): Xylocarpus Granatum.

CARDAMINE L. (Crucif.).
Berteriana *Colla, Herb. Pedem.* i. 175 (1833).—Hab.?
Constancei *Detl. in Madroña*, iii. 176 (1935).—U.S.A. (Idaho).
Garaventae *O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 208 (1934).—Chile.
Grandjotii *O. E. Schulz, l. c.* 39.—Chile.
Kitaibelii *Becherer in Ber. Schweiz. Bot. Ges.* xliii. 57 (1934): Dentaria polyphylla.
ocoana *O. E. Schulz in Fedde, Repert.* xxxii. 84 (1933).—Santo Domingo.
paucifolia *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 359 (1931).—China (Yunnan).
procumbens (*Beauverd*) *E. Perrier, Cat. Pl. Vasc. Savoie*, i. (*Mém Acad. Sc. Savoie*, Sér. V. iv.) 46 (1917): C. amara f. procumbens.
rariflora *Peck in Torreya*, 1932, xxxii. 150.—U.S.A. (Oregon).
×Rohlenae *Domin in Preslia*, xiii–xv. 90 (1935).—Czechoslovak.
simplex *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 361 (1931).—China (Yunnan).
trachypoda *Kern. ex Domin in Acta Bot. Bohem.* x. 40 (1931), in syn.: C. Hayneana.
uintahensis *Hermann in Rhodora*, 1934, xxxvi. 410.—U.S.A. (Utah).
Victoris *N. Busch in Bull. Acad. Sc. URSS*, 1931, Sér. VII. 454.—Sibir. or.
×Zapalowiczii *Domin in Preslia*, xiii–xv. 90 (1935).—Czechoslovak.

CARDANTHERA Buch.-Ham. (Acanthac.).
anomala *Blatter in Journ. & Proc. As. Soc. Beng.* 1930, n. s. xxvi. 350 (1931).—Ind. or. (Bombay).

CARDIOPETALUM Schlecht. (Annonac.).
surinamense *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* x. 195 (1931).—Guiana Bat.

CARDIOPTERIS Wall. (Icacinac.; Olacac., Gen. Pl.).
lobata *Wall.*; *Becc. in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1877, ix. 101, descr.—Java.

CARDIOSPERMUM L. (Sapindac.).
alatum *Bremek. & Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xvi. 422 (1935).—Bechuanaland Protect.
Caillei *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 498 (1928), in syn.: C. grandiflorum.
hexagonum *Wight ex Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 399 (1932), in syn.: C. Corindum.
keyense *Small, Man. Southeast. Fl.* 827 (1933).—U.S.A. (Florida).

CARDUNCELLUS Adans. (Compos.).
Catrouxi *Emberger in Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc*, 1932, No. XXXIII. 46 (1933).—Marocc.
maroccanus *Coss. ex Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc*, iii. 825 (1934), in syn.: C. Duvauxii.

×**CARDUOCIRSIUM** Sennen in Le Monde des Plantes, 1931, xxxii. 19, in obs., sine descr. *COMPOSITAE.*
[CARDUUS × CIRSIUM.]
Fani *Sennen in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 526.—Pyren.
Guetroti *Sennen in Le Monde des Plantes*, 1931, xxxii. 19, in obs., nomen.—Pyren.

CARDUUS L. (Compos.).
atropatanicus *Sosn. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 175 (1934).—Caucas.
×Font-Queri *Pau in Font Quer, Iter Marocc.* 1930, No. 687 [1932].—Marocc.
guadarramicus *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 100.—Hispan.
×Gyoerffyanus *J. Wagner in Fedde, Repert.* xxxviii. 285 (1935).—Thessal.
hsiaowutaishanensis *Chen in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* v. 91 (1934).—China (Chihli).
illyricus *Maly in Bull. Inst. Jard. Bot. Univ. Belgrad*, ii. 57 (1931–2).—Bosnia.
Kotovskyi *Sosn. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 176 (1934).—Caucas.
megalatlanticus *Emberger in Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc*, 1932, No. XXXIII. 48 (1933).—Marocc.
Nawaschini *Bordz. in Bull. Jard. Bot. Kieff*, xii–xiii. 141 (1931).—Armen.
×predealus *Nyár. in Bul. Grăd. & Muz. Bot. Univ. Cluj*, 1933, xiii. 68 (1934).—Ruman.

CARDUUS:—
thracicus (*Velen.*) *Hayek in Fedde, Repert. Beih.* xxx. II. 705 (1931): C. seminudus var. thracicus.
vranjanus *Adamović ex Hayek, l. c.* 709, in syn.: C. acanthoides var. polyacanthus *Reichb.*

CAREX L. (Cyperac.).
accrescens *Ohwi in Mem. Coll. Sc., Kyoto Imp. Univ.*, Ser. B, vi. 255 (1931): C. pallida *C. A. Mey.*
acrifolia *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 192, 591 (1935).—Reg. Caucas.
acutinella *Mackenzie in N. Am. Fl.* xviii. 407 (1935).—U.S.A. (Oregon).
adelostoma *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 275, 603 (1935).—Eur. arct.; Sibir. (Yalmal).
aequivoca *Krecz. l. c.* 257, 600.—Caucas.
Albowi *Leskov in Journ. Russ. Bot. Soc.* xvi. No. 1, 71; *et in Trav. Mus. Bot. Acad. Sc. URSS*, xxv. 31 (1932).—Caucas.
aleutica *Akiyama in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxxvi. 105 (1934), nomen; *et in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 69, descr.—Ins. Aleut.
algarbiensis *G. Sampaio in Ann. Acad. Polyt. Porto*, xiv. 144 (1921).—Lusitan.
algida *Turcz.*; *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 345, 612 (1935), descr.—Eur. et As. arct.
allegheniensis *Mackenzie in N. Am. Fl.* xviii. 291 (1935).—U.S.A. (Atlantic States).
×allensteiniensis *R. Gross in Jahrb. Preuss. Bot. Ver.* 1927–9, 9 (1930); cf. *Fedde, Repert.* xxix. 158 (1931).—German.
×Allorgei *Sennen in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xv. Ser. Bot. No. 1, 37 (1931), in obs.—Hispan.
alticola *Popl. in Sukatsch. Arbeit. Amur-Exped. 1910*, Bot., i. 277 (1912); *et in Trav. Mus. Bot. Acad. Sc. Pétersb.* xii. 178 (1914).—Sibir.
amami-oshimensis *Akiyama in Journ. Fac. Sc., Sapporo*, Ser. V. Bot., ii. 38, in clavi, 186 (1932): C. gentilis var. oshimensis *Kükenth.*
amblyorhyncha *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 184, 595 (1935).—Sibir.
andalusica *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 28 (1932).—Hispan.
aneurocarpa *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 369, 614 (1935).—As. centr.
anisoneura *Krecz. l. c.* 410: C. gracilenta *Litw.*
×Anselmi *Sennen in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xv. Ser. Bot. No. 1, 37 (1931), in obs.—Hispan.
antoniensis *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1935, xv. 1032.—Ins. C. Verde.
apodostachya *Ohwi in Jap. Journ. Bot.* vii. 188 (1934).—Formosa.
arctiformis *Mackenzie in N. Am. Fl.* xviii. 97 (1931).—Alaska; Brit. Columb.; Ins. Vancouver.
artitecta *Mackenzie, l. c.* xviii. 189 (1935).—U.S.A. (E. States).
aspratilis *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 398, 618 (1935).—Eur. or.; As. occ. et centr.
atlantica *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 124 [1933], nomen.—Marocc.
atlasica *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 29 (1932).—Marocc.
atroviridis *Ohwi in Mem. Coll. Sc., Kyoto Imp. Univ.*, Ser. B, vi. 241 (1931).—Ins. Liukiu (Yakushima).
autumnalis *Mackenzie in N. Am. Fl.* xviii. 66 (1931).—Mexico.
Aztecica *Mackenzie, l. c.* xviii. 229 (1935): C. fuscotincta *Mackenzie.*
bicuspidata *Regel ex Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 412 (1935), in syn.: C. melanostachya.
biegensis *Cherm. in Bull. Soc. Bot. France*, 1935, lxxxii. 343.—Congo Belg.
biwensis *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. 28 (1895).—Japon.
Bordzilowskii *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 378, 615 (1935).—Reg. Caucas.; Persia.
brachyanthera *Ohwi in Jap. Journ. Bot.* vii. 190 (1934).—Formosa.
brachystachya (*Regel & Maack*) *Akiyama in Journ. Fac. Sc., Sapporo*, Ser. V. Bot., ii. 44, in clavi, 219 (1932): C. pseudocyperus var. brachystachya.

CAREX:—
brevibracteata *K. Schum. ex Miyabe & Kudo in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 261 (1931), in syn.: C. ischnostachya.
Broteriana *G. Sampaio in An. Fac. Sc. Porto*, xix. 68 (1934).—Lusitan.
bucculenta *Krecz. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 122, in obs., 130 (1932).—Islandia.
caesariensis *Mackenzie in N. Am. Fl.* xviii. 440 (1935).—U.S.A. (N. Jersey).
callitrichos *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 364, 613 (1935).—Sibir. or.; Manchur.
camptotropa *Krecz. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 124, in adnot., 136 (1932).—Hab.?
campylorhina *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 342, 612 (1935).—Sibir. or.
caudatifrons (*Akiyama*) *Akiyama in Journ. Fac. Sc., Sapporo*, Ser. V. Bot., iii. 262 (1935): C. flavocuspis var. caudatifrons.
chalcodeta *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 279, 604 (1935).—Reg. Caucas.; Armen.
chishimana *Ohwi in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 406.—Ins. Kuril.
chlorophila *Mackenzie in N. Am. Fl.* xviii. 304 (1935).—Canada (Ontario); U.S.A. (N. E. States).
chosenica *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 73.—Corea.
×ciliatifructus *Ohwi, l. c.* 297.—Sakhalin.
Clemensii *Kükenth. in Fedde, Repert.* xxix. 202 (1931).—Borneo.
clivicola *Fernald & Weatherby in Rhodora*, 1931, xxxiii. 233.—Canada (Quebec).
clivorum *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 42 (1934).—Japon. (Hondo).
collifera *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 26.—Ins. Liukiu.
conspecta *Mackenzie in N. Am. Fl.* xviii. 294 (1935).—Mexico.
conspissata *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 326, 610 (1935).—Sibir.
copulata (*L. H. Bailey*) *Mackenzie in Rydb. Fl. Prairies & Plains Centr. N. Amer.* 181 (1932), in obs.: C. digitalis var. copulata.
×Cuatrecasasi *Sennen in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xv. Ser. Bot. No. 1, 37 (1931), in obs.—Hispan.
cuneata *Ohwi in Mem. Coll. Sc., Kyoto Imp. Univ.*, Ser. B, vi. 256 (1931).—Japon. (Hondo; Yezo).
decaulescens *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 255, 599 (1935).—Turkestan. (Thian Shan).
diastena *Krecz. l. c.* 172, 594.—Kamchatka.
dichroandra *Krecz. l. c.* 210, 596.—Transcaucas.
diplasiocarpa *Krecz. l. c.* 135, 590.—Sibir. or.; Manchur.
divulsa *Stokes in With. Bot. Arrang. Brit. Pl.* ed. 2, ii. 1035 (1787).—Eur.; Oriens; Afr. bor.
Doiana *Akiyama in Journ. Fac. Sc., Sapporo*, Ser. V. Bot., i. 59 (1931).—Japon. (Kiushiu).
duriusculiformis *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 142, 591 (1935).—As. centr.
emasculata *Krecz. l. c.* 277, 604.—Eur.; Sibir. occ.
eremopyroides *Krecz. l. c.* 384, 617.—Sibir.; Mongol.
eriophylla (*Kükenth.*) *Komarov, Mal. Opr. Rast. Dal'nevost. Kr.* 135 (1925); *Opr. Rast. Dal'nevost. Kr.* i. 316 (1931); cf. *Komarov, Fl. URSS*, iii. 455 (1935): C. aristata var. eriophylla.
euxina *Marc. ex Kneuck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1905, 33 (1906), in obs., nomen; *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 321, 609 (1935), descr.—Crimea; Caucas.
feani *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 84, 115 (1931).—Ins. Marquesas.
fissa *Mackenzie in N. Am. Fl.* xviii. 64 (1931).—U.S.A. (Oklahoma).
flavella *Krecz. in Maevskii, Fl. Centr. Russ.* ed. 6, 185 (1933); *et in Komarov, Fl. URSS*, iii. 388, 617 (1935).—Rossia.
fusanensis *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 74.—Corea.
fusco-cuprea (*Kükenth.*) *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 244, 599 (1935): C. limosa var. fusco-cuprea.
fusco-fibrosa *Ohwi in Mem. Coll. Sc., Kyoto Imp. Univ.*, Ser. B, vi. 246 (1931).—Manchur.; Corea; Japon.

CAREX:—
gagaënsis *Akiyama in Journ. Fac. Sc., Sapporo*, Ser. V. Bot., i. 61 (1931).—Japon. (Hondo).
Garberi *Fernald in Rhodora*, 1935, xxxvii. 253: C. aurea var. androgyna *Olney*, non C. androgyna *Balb.*
glabella *Pabrez apud C. Regel in Script. Hort. Bot. Univ. Vyt. Magni*, ii. 32, 64 (1932): C. caespitosa.
glabrescens (*Kükenth.*) *Ohwi in Mem. Coll. Sc., Kyoto Imp. Univ.*, Ser. B, vi. 245 (1931): C. Wallichiana f. glabrescens.
Gorodkovii *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 287, 606 (1935).—Sibir. or.
graciliculmis *Ohwi in Mem. Coll. Sc., Kyoto Imp. Univ.*, Ser. B, vi. 264 (1931).—Corea.
grandilimosa *Akiyama in Journ. Fac. Sc., Sapporo*, Ser. V. Bot., i. 57 (1931).—Japon. (Hondo).
Grossheimii *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 130, 589 (1935).—Armen.
Hartmani *Cajand. in Ann. Bot. Soc. Zool.-Bot. Fenn. Vanamo*, v. 23 (1935): C. polygama *Schkuhr.*
Hashimotoi *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 102.—Japon. (Hondo).
Hattoriana *Nakai in Rigakkwai*, xxvi. IV. p. 10, et v. p. 4 (1928), nomen; *Tuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 508, descr.—Ins. Bonin.
Hatusimana *Ohwi in Jap. Journ. Bot.* vii. 196 (1934).—Formosa.
Hohenackeriana *C. A. Mey. ex Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 304 (1935), in syn.: C. Grioletii.
Hondae *Akiyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 474.—Japon.
Humberti *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 123 [1933], nomen.—Marocc.
Humbertiana *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 102.—Corea.
hylaea *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 179, 594 (1935).—Eur. or.
hymenodon *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 298.—Japon. (Hondo).
hypaneura *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 424, 621 (1935).—Caucas.
Iljinii *Krecz. l. c.* 137, 590.—Sibir.; Mongol.
impura *Ohwi in Mem. Coll. Sc., Kyoto Imp. Univ.*, Ser. B, vi. 251 (1931).—Japon. (Hondo).
inumbrata *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 218 (1935): C. neglecta *Peterm.*
involucratella *Mackenzie in N. Am. Fl.* xviii. 50 (1931).—Mexico.
iseana *Akiyama in Journ. Fac. Sc., Sapporo*, Ser. V. Bot., iii. 261 (1935).—Japon.
jacutica *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 441, 621 (1935).—Sibir.
japoniciformis *Nakai, Rep. Veg. Kamik.* 34, 42 (1928); *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1431 (1931), japonice; *Akiyama in Journ. Fac. Sc., Sapporo*, Ser. V. Bot., ii. 40, in clavi, 196 (1932), latine.—Japon. (Hondo).
jucunda *Krecz. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 124, in obs., 136 (1932).—Newfoundland.
Kabanovii *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 166, 593 (1935).—Sakhalin.
kamikochiana *Nakai, Rep. Veg. Kamik.* 34, 42 (1928); *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1431 (1931), japonice; *Akiyama in Journ. Fac. Sc., Sapporo*, Ser. V. Bot., ii. 33, in clavi, 163 (1932), latine.—Japon. (Hondo).
karisimbiensis *Cherm. in Bull. Soc. Bot. France*, 1935, lxxxii. 344.—Congo Belg.
kasugayamensis *Akiyama in Journ. Fac. Sc., Sapporo*, Ser. V. Bot., i. 57 (1931).—Japon. (Hondo).
ketonensis *Akiyama, l. c.* iii. 262 (1935), hybr.?—Sakhalin.
kinpokusanensis *Akiyama, l. c.* 265, hybr.?—Japon.
kiyozumiensis *Akiyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 472.—Japon.
Knorringiae *Kükenth. ex B. Fedtsch.*; *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 212, 597 (1935), descr.—As. centr. (Osch).
Koidzumiana *Ohwi in Mem. Coll. Sc., Kyoto Imp. Univ.*, Ser. B, vi. 263 (1931): C. semiplena var. tenuinervis *Kükenth.*

CAREX:—

Koidzumii *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 3: C striata var. japonica *Koidz.*

kotoënsis *Hayata, Gen. Ind. Fl. Formos.* 90 (1916), nomen; *Ohwi in Jap. Journ. Bot.* vii. 189 (1934), in syn.: C. bilateralis.

×Krajinae *Domin in Preslia*, xiii–xv. 30 (1935).—Czechoslovak.

kujuzana *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 298.—Japon. (Kiushiu).

×kurilensis *Ohwi, l. c.* 1933, ii. 27.—Ins. Kuril.

laevivaginata (*Kükenth.*) *Mackenzie in Britton & Brown, Ill. Fl.* ed. 2, i. 371 (1913): C. stipata var. laevivaginata.

lagunensis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 26 (1933–5).—Calif. infer.

Langeana *Fernald in Rhodora*, 1933, xxxv. 217: C. duriuscula *Lange, Fl. Dan.* xvi. Fasc. 48, 10 (1871), non C. *A. Mey.*

laricina *Mackenzie ex Bright in Trillia*, No. 9, pp. 4, 19 (1930); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 132; *Mackenzie in N. Am. Fl.* xviii. 113 (1931).—Am. bor. (Great Lakes Region).

latifrons *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 425 (1935): C. latifolia *Boiss. & Bal.*

latisquama (*Cuatrec.*) *Pau ex Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xii. 242 (1929), in obs.: C. longiseta var. latisquama.

laxior (*Kükenth.*) *Mackenzie in N. Am. Fl.* xviii. 306 (1935): C. lepidocarpa var. laxior.

leiophylla *Mackenzie, l. c.* 365.—Canada (Yukon).

lineolata *Cham. ex Meinsh. in Acta Hort. Petrop.* xviii. 338 (1901), in obs.; *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 223, 598 (1935).—Sibir.; Kamchatka.

loncholepis *Less. ex Krecz. l. c.* 423, in syn.: C. silvatica.

longa *Mackenzie in N. Am. Fl.* xviii. 277 (1935), in obs.: C. perlonga.

longissima *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 26 (1933).—Calif. infer.

Mackenziei *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 183 (1935): C. norvegica *Willd. ex Schkuhr.*

macromollicula *Nakai, Rep. Veg. Kamik.* 34, 41 (1928); *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1436 (1931), japonice; *Akiyama in Journ. Fac. Sc., Sapporo*, Ser. V. Bot., ii. 39, in clavi, 198 (1932).—Japon. (Hondo).

Mannii *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1933, 150.—Fernando Po; Cameroons; Uganda.

Mariae-Victorini *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 105.—Hispan.

×Mastnyana *Otruba & Podpéra in Sched. Fl. Exsicc. Reip. Bohem. Slov.* Cent. vi. 21 (1931).—Czechoslovak.

Medwedewi *Leskov in Journ. Russ. Bot. Soc.* xvi. No. 1, 70; *et in Trav. Mus. Bot. Acad. Sc. URSS*, xxv. 30 (1932).—Caucas.

Meinshauseniana *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 287, 606 (1935).—Caucas.

melanostoma *Krecz. l. c.* 261, 602, cum descr.: C. melastoma *Fisch. ex Boott.*

micropodioides *Krecz. l. c.* 298, 608.—Transcaucas.

mimula *Krecz. l. c.* 266, 603.—Sibir.

minutiscabra *Kükenth. ex B. Fedtsch.*; *Krecz. l. c.* 380, 616, descr.—As. centr.

miserabilis *Mackenzie in N. Am. Fl.* xviii. 385 (1935).—U.S.A. (N. W. States).

Miyabei *K. Schum. ex Miyabe & Kudo in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 266 (1931), in syn.: C. pilosa.

Mohriana *Mackenzie in N. Am. Fl.* xviii. 106 (1931).—U.S.A. (Florida).

molesta *Mackenzie, l. c.* 151.—U.S.A. (E. States).

montis-everestii *Kükenth. in Kew Bull.* 1934, 261.—Tibet.

mukdensis *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 29.—Manchur.

musartiana *Kükenth.*; *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 261, 602 (1935), descr.—As. centr.

nachiana *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 103.—Japon. (Hondo).

nagatadakensis *Masamune in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* xi., Bot. No. 4, 526 (1934).—Ins. Liukiu (Yakushima).

nematostachya *Cham. ex Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 346 (1935), in syn.: C. falcata.

CAREX:—

neo-Chevalieri *Kükenth. ex A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 467.—Guinea Gall.

niko-montana *Akiyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 472.—Japon.

Novograblenovi *Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 199 (1932).—Kamchatka.

occultans (*Franch.*) *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 417, 620 (1935): C. filiformis var. occultans.

ochrochlamys *Ohwi in Mem. Coll. Sc., Kyoto Imp. Univ.*, Ser. B, vi. 240 (1931).—Corea.

oederoides *Tatewaki & Akiyama in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.* xiv. 107 (1935).—Japon.

Ogawai *Akiyama in Journ. Fac. Sc., Sapporo*, Ser. V. Bot., ii. 36, in clavi, 172 (1932).—Japon. (Hondo).

Ohwii *Masamune in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* xi., Bot. No. 4, 526 (1934): C. Omiana var. yakushimana *Ohwi.*

okushirensis *Akiyama in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.* xiv. 108 (1935).—Japon.

omeiensis *Tang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* 1932, iii. 361.—China (Szechuan).

orthocaula *Krecz. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 123, in obs., 131 (1932).—Sibir. (Yakutsk).

×Otayai *Ohwi in Mem. Coll. Sc., Kyoto Imp. Univ.*, Ser. B, vi. 265 (1931).—Japon. (Hondo).

ouensanensis *Ohwi, l. c.* 262.—Corea.

oxyleuca *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 284, 605 (1935).—As. centr.

pamirica (*O. Fedtsch.*) *B. Fedtsch. in Acta Hort. Petrop.* xxviii. 70, 123 (1908): C. vesicaria var. pamirica.

paralia *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 237 (1935): C. maritima *O. F. Muell.*

pauxilla *Krecz. l. c.* 260, 601.—Sibir. (Transbaikal.).

perfusca *Krecz. l. c.* 256, 600.—Sibir.; Mongol.; As. centr.

perpusilla *Meinsh. ex Krecz. l. c.* 300, in syn.: C. capituliformis.

phaeoleuca *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 68.—Corea; Japon.

phaeopoda *Ohwi, l. c.* 1933, ii. 159.—Formosa.

phaeothrix *Ohwi in Mem. Coll. Sc., Kyoto Imp. Univ.*, Ser. B, vi. 239 (1931).—Corea.

philocrena *Krecz. in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 75 (1934).—Turkestan. (Thian Shan).

platylepis *Mackenzie in N. Am. Fl.* xviii. 142 (1931).—U.S.A. (Idaho; Wyoming).

pleiandra *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 73.—Manchur.

Podperae *Otruba in Sched. Fl. Exsicc. Reip. Bohem. Slov.* Cent. viii. 22 (1933), in syn.: C. gracilis.

Popovii *Krecz. in Bull. Univ. As. Centr.* xxi. 181 (1935).—As. centr.

praeceptorium *Mackenzie in N. Am. Fl.* xviii. 95 (1931).—U.S.A. (Washington; Oregon; Calif.).

praestabilis *Ohwi in Mem. Coll. Sc., Kyoto Imp. Univ.*, Ser. B, vi. 262 (1931).—Japon. (Hondo).

prevernalis *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 15.—Manchur.

procerula *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 449, 622 (1935).—Sibir.

proposita *Mackenzie in N. Am. Fl.* xviii. 126 (1931).—U.S.A. (Idaho).

pseudo-Doenitzii *Akiyama in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 288.—Japon.

×pseudo-fulva *Fernald in Rhodora*, 1933, xxxv. 231.—Newfoundland.

pseudo-lanceolata *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 363, 613 (1935).—Sibir. (Transbaikal.).

pseudo-sadoënsis *Akiyama in Journ. Fac. Sc., Sapporo*, Ser. V. Bot., ii. 24, in clavi, 119 (1932).—Japon. (Hondo).

psychroluta *Krecz. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 138 (1932): C. incurva var. inflata *Simons.*

purpureotincta *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 159.—Formosa.

purpurifera *Mackenzie in Small, Man. Southeast. Fl.* 216 (1933); *et in N. Am. Fl.* xviii. 253 (1935).—U.S.A. (Tennessee).

CAREX:—

quadriflora (*Kükenth.*) *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 74: C. digitata var. quadriflora.

ramosipes *Cherm. in Bull. Soc. Bot. France*, 1935, lxxxii. 343.—Congo Belg.

rectior *Mackenzie in N. Am. Fl.* xviii. 261 (1935): C. granularis var. recta *Dewey*, non C. recta *Boott.*

relaxa *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 379, 616 (1935).—Sibir. (Transbaikal.).

reptabunda (*Trautv.*) *Krecz. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 124, in obs., 134 (1932): C. stenophylla var. reptabunda.

retorta (*Fries*) *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 219, 598 (1935): C. caespitosa var. retorta.

reventa *Krecz. l. c.* 367, 614.—Sibir.; Kamchatka.

rigescens (*Franch.*) *Krecz. l. c.* 142, 592: C. stenophylla var. rigescens.

rikuchiuensis *Akiyama in Journ. Fac. Sc., Sapporo*, Ser. V. Bot., iii. 268 (1935).—Japon.

rugata *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 76.—Japon. (Hondo).

ruthenica *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 325, 610 (1935).—Eur. or.; Sibir.

Ruthii *Mackenzie in N. Am. Fl.* xviii. 113 (1931).—U.S.A. (Tennessee; N. Carolina; Georgia).

sajanensis *Krecz. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 124, in obs., 133 (1932).—Sibir. (Irkutsk).

sareptana *Krecz. in Maevskii, Fl. Centr. Russ.* ed. 6, 190 (1933); *Komarov, Fl. URSS*, iii. 213, 597 (1935).—Rossia.

savaiiensis *Kükenth. in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 128, 24 (1935).—Samoa.

scabriculmis (*Kükenth.*) *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 27: C. teinogyna var. scabriculmis.

scabricuspis *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 324, 609 (1935).—Caucas.; Armen. Turc.

scabro-aristata *Akiyama in Journ. Fac. Sc., Sapporo*, Ser. V. Bot., i. 58 (1931).—Japon. (Hondo).

senanensis *Ohwi in Mem. Coll. Sc., Kyoto Imp. Univ.*, Ser. B, vi. 248 (1931).—Japon. (Hondo).

setina (*Christ*) *Krecz. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 123, in obs., 136 (1932): C. incurva var. setina.

shakushizawaënsis *Akiyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 473.—Japon.

shinanoana *Nakai, Rep. Veg. Kamik.* 34, 42 (1928); *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1453 (1931), japonice; *Akiyama in Journ. Fac. Sc., Sapporo*, Ser. V. Bot., ii. 22, in clavi, 107 (1932), latine.—Japon. (Hondo).

shiriyajirensis *Akiyama apud Tatewaki in Bull. Biogeogr. Soc. Jap.* iv. No. 4, pp. 257–334 (1934); cf. *Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 175.—Ins. Kuril.

similigena *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 193, 596 (1935).—Turkestan. (Thian Shan).

siroumensis *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 199, in obs., japonice.—Hab.?

Slobodovii *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 191, 595 (1935).—As. centr.

Smirnovii *Krecz. l. c.* 411, 619.—Sibir.

sozusensis *Ohwi in Mem. Coll. Sc., Kyoto Imp. Univ.*, Ser. B, vi. 243 (1931).—Corea.

squamoidea *Akiyama in Journ. Fac. Sc., Sapporo*, Ser. V. Bot., i. 60 (1931).—Japon. (Hokkaido).

stellata *Mackenzie in N. Am. Fl.* xviii. 226 (1935).—Mexico.

stenocarpa *Turcz. ex Bess. in Flora*, xviii. Beibl. i. 27 (1834), nomen; *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 291, 607 (1935), descr.—Sibir.; Mongol.

stenophylloides *Krecz. in B. Fedtsch. et al., Fl. Turkm.* i. 230 (1932); *et in Komarov, Fl. URSS*, iii. 141, 592 (1935).—Armen. Turc.; As. centr.; Afghan.; Persia.

stilbophaea *Krecz. in Komarov, l. c.* 283, 605.—Sibir.

Stokesii *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 84, 116 (1931).—Polynes. (Ins. Rapa).

subconcolor *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 20.—Manchur.

subebracteata (*Kükenth.*) *Ohwi in Mem. Coll. Sc., Kyoto Imp. Univ.*, Ser. B, vi. 252 (1931): C. pisiformis var. subebracteata.

CAREX:—
subtumida (*Kükenth.*) *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 75: C. ischnostachya var. subtumida.
×subviridula *Fernald in Rhodora*, 1933, xxxv. 231.—Newfoundland.
Sukaczovii *Krecz. in Fl. Transbaic.* ii. 136 (1931); *et in Komarov, Fl. URSS*, iii. 415, 620 (1935).—Sibir.
×superriparia *Hübl in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1932, lxxxii, pp. (22), (56).—Eur.
Szovitsii *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 159, 593 (1935).—Reg. Caucas.
Tangii *Kükenth. in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* 1932, iii. 144.—China (Chihli).
tatarica *Fisch. ex Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 412 (1935), in syn.: C. melanostachya.
Tatewakiana *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 299.—Formosa.
tatrorum *Racib. Fl. Polska*, i. 215 (1919); *Domin in Acta Bot. Bohem.* ix. 222 (1930), in syn.: C. sempervirens.
thymicola *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 123 [1933], nomen.—Marocc.
Titovii *Krecz. in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 20, 15, in adnot., 28, in clavi (1935).—Ross. asiat. (Kasakstan).
tosaënsis *Akiyama in Journ. Fac. Sc., Sapporo*, Ser. V. Bot., iii. 267 (1935).—Japon.
tosana *Makino in Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 1, 1373 (1925); *et l. c.* ed. 2, 1458 (1931), japonice.—Japon.
Townsendii *Mackenzie in N. Am. Fl.* xviii. 111 (1931).—Mexico.
Toyoshimae *Tuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 367.—Ins. Bonin.
trachyloma *C. A. Mey. ex Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 258 (1935), in syn.: C. koraginensis.
transmarina *Krecz. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 122, in obs., 130 (1932).—Groenlandia.
tremula (*Ohwi*) *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 28: C. arisanensis var. tremula.
×trichina *Fernald in Rhodora*, 1933, xxxv. 219.—Am. bor.-or.
trichosperma *Ohwi in Jap. Journ. Bot.* vii. 204 (1934).—Formosa.
Tsoi *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 207 (1935).—China (Hainan).
tsuishikarensis *Koidz. & Ohwi in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 273 (1931).—Japon. (Yezo).
tsushimensis (*Ohwi*) *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 67: C. chinensis var. tsushimensis.
tumidula *Ohwi in Mem. Coll. Sc., Kyoto Imp. Univ.*, Ser. B, vi. 244 (1931).—Japon. (Shikoku).
uberior (*Mohr*) *Mackenzie in N. Am. Fl.* xviii. 79 (1931): C. stipata var. uberior.
ulobasis *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 311, 608 (1935).—Sibir. or.
urbis-malorum *Popov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n. s. xliv. 131.—Turkestan. (Thian Shan).
urelytra *Ohwi in Jap. Journ. Bot.* vii. 204 (1934).—Formosa.
ushishirensis *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 63.—Ins. Kuril.
varians (*L. H. Bailey*) *Hay, Palmer & White in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1901, xiv. 196, indice; *Mackenzie in N. Am. Fl.* xviii. 257 (1935), in obs.: C. laxiflora var. varians.
viridiflora *Mackenzie, l. c.* 275: C. viridis *Schlecht. & Cham.*
vulpi-caudata *Akiyama in Journ. Fac. Sc., Sapporo*, Ser. V. Bot., i. 63 (1931).—Japon. (Hokkaido).
Wiegandii *Mackenzie in N. Am. Fl.* xviii. 108 (1931).—Am. bor.-or.
×xanthina *Fernald in Rhodora*, 1933, xxxv. 230.—Newfoundland.
yakusimensis *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 77.—Japon.
Yamatsutana *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 72.—Manchur.
yezo-alpina *Akiyama in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 498, japonice.—Japon.
yezo-montana *Akiyama in Journ. Fac. Sc., Sapporo*, Ser. V. Bot., i. 62 (1931).—Japon. (Hokkaido).

CAREX:—
Yoshinoi *Ohwi in Mem. Coll. Sc., Kyoto Imp. Univ.*, Ser. B, vi. 265 (1931).—Japon. (Hondo).

CAREYA Roxb. (Lecythidac.; Myrtac., Gen. Pl.).
arborea *Roxb.*; *Roxb. Pl. Cor.* iii. 14, t. 218 (1819).—Ind. or.
herbacea *Roxb.*; *Roxb. l. c.* 13, t. 217.—Ind. or. (Bengal).

CARICA L. (Caricac.; Passiflorac., Gen. Pl.).
Augusti *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 280 (1931).—Peruv.
Jimenezii (*Bertoni*) *Bertoni in Agronomia*, v. No. 7, 259 (1913); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 142: C. Papaya var. Jimenezii.

CARINIANA Casar. (Lecythidac.; Myrtac., Gen. Pl.).
ianeirensis *Knuth in Fedde, Repert.* xxxv. 340 (1934).—Bras. (Rio de Janeiro).
integrifolia *Ducke in Tropical Woods*, 1932, No. 31, 18.—Bras. (Amaz.).
multiflora *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 65 (1935).—Bras. (Amaz.).

CARISSA L. (Apocynac.).
axillaris *Roxb. Hort. Beng.* 84 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 526 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 691 (1832).—Ins. Molucc.
cochinchinensis *Pierre ex Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1112 (1933).—Siam; Anam; Cambodia.
cordata (*Mill.*) *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 82 (1932): Lycium cordatum.
diffusa *Roxb. Hort. Beng.* 19 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 524 (1824); *Fl. Ind.* ed. *Carey*, i. 689 (1832).—Ind. or.
laotica *Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1113 (1933).—Indo-China (Laos).
villosa *Roxb. Hort. Beng.* 19 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 525 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 690 (1832).—Ind. or.

CARLINA L. (Compos.).
maroccana *Coss. ex Battand. Contrib. Fl. Atlant.* 52 (1919).—Marocc.
Rhopalachyron *Cadevall & Sallent, Fl. Catal.* iii. 398 (1919–23), in syn.: C. acaulis.

CARLUDOVICA Ruiz & Pav. (Cyclanthac.).
angustissima *Sandwith in Kew Bull.* 1933, 497.—Guiana Brit.
irazuensis *Cufod. in Archiv. Bot., Forli*, 1933, ix. 180.—Costa Rica.
jamaicensis *Lodd.*; *Fawcett & W. Harris in Bull. Bot. Dept., Jamaica*, 1902, n. s. ix. 145, descr.—Jamaica.

CARPESIUM L. (Compos.).
Hosokawae *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 98.—Formosa.
kweichowense *Chang in Sinensia*, iii. 205 (1933).—China (Kweichau).
manshuricum *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 71.—Manchur.; Corea.
pseudotracheliifolium *Ling in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, ii. 482 (1934).—China (Shensi).
spathiforme *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1932, xxii. 225.—Formosa.
tristiforme *Hand.-Mazz. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1934, lxxxiii. 236.—China (Shensi).

CARPHA Banks & Soland. (Cyperac.).
angustissima *Cherm. in Bull. Soc. Bot. France*, 1935, lxxxii. 341.—Congo Belg.
capensis (*Steud.*) *H. Pfeiff. in Fedde, Repert.* xxix. 180 (1931): Ecklonea capensis.
solitaria (*C. B. Clarke*) *H. Pfeiff. l. c.*: Ecklonea solitaria.

CARPINUS L. (Betulac.; Cupulif., Gen. Pl.).
austro-sinensis *Hu in Sinensia*, ii. 87 (1931).—China (Kweichau).
Chowii *Hu in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 333.—China (Chihli).
Chuniana *Hu, l. c.* 334.—China (Kwangtung).

CARPINUS:—
geokczaica *O. Radde in Mém. Sc. Phys. & Math. Acad. Sc. Ukraine*, xv. 1. pp. 51–107 (1929); cf. *Raddi in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1932, xliv. 32.—Rossia.
hebestroma *Yamamoto, Suppl. Ic. Pl. Formos.* Pt. v. 14 (1932).—Formosa.
Huana *Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., ix. 68 (1933).—China (Chekiang).
hupeana *Hu in Sunyatsenia*, i. 118 (1933).—China (Hupeh).
kweichowensis *Hu in Sinensia*, ii. 79 (1931).—China (Kweichau).
kweitingensis *Hu, l. c.* 82, 83, fig. 2.—China (Kweichau).
lanceolata *Hand.-Mazz. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1931, lxxx. 338.—China (Hainan).
paohsingensis *Hsai in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, ii. 179 (1934).—China (Szechuan).
putoënsis *Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., viii. 72 (1932).—China (Chekiang).
quercifolia *Hort. ex Colla, Herb. Pedem.* v. 176 (1836), pro syn.: C. Betulus.
Sekii *Yamamoto, Suppl. Ic. Pl. Formos.* Pt. v. 12 (1932).—Formosa.
sungpanensis *Hsai in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, ii. 180 (1934).—China (Szechuan).
tientaiensis *Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., viii. 135 (1932).—China (Chekiang).
Tsiangiana *Hu in Sinensia*, ii. 90 (1931).—China (Kweichau).
tungtzeënsis *Hu, l. c.* 85.—China (Kweichau).

CARPOBROTUS N. E. Brown (Ficoidac.).
aequilateralis (*Haw.*) *J. M. Black in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1932, lvi. 40: Mesembryanthemum aequilaterale.
Pillansii *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. ii. 313 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Pulleinei *J. M. Black in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1932, lvi. 40.—S. Austral.; N.S. Wales.

CARPODINUS R. Br. (Apocynac.).
Baumannii *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 35, in clavi, 36 (1931).—Guinea (Togo).
macrophylla *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, l. c.*—Liberia; Gold Coast.

CARPOLOBIA G. Don (Polygalac.).
caudata *Burtt Davy in Kew Bull.* 1932, 257.—Gold Coast.
Conradsiana *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 839 (1915), in obs.—Tanganyika Terr.

CARPOTROCHE Endl. (Flacourtiac.; Bixac., Gen. Pl.).
apterocarpa *Kuhlm. in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 87 (1935).—Bras. (Espirito Santo).
mollis *Macbride in Candollea*, v. 390 (1934).—Peruv.
parvifolia *Macbride, l. c.*—Peruv.

CARPOXYLON H. Wendl. & Drude in Linnaea, xxxix. 177 (1875). *PALMAE.*
macrospermum *H. Wendl. & Drude, l. c.*, in adnot.—N. Hebrides.

CARRISSOA E. G. Baker in Bol. Soc. Brot. Sér. II. viii. 108 (1933). *LEGUMINOSAE.*
angolensis *E. G. Baker, l. c.* 109—Angola.

CARTHAMUS L. (Compos.).
glaucescens *Faure & Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1932, xxiii. 196.—Marocc.
gypsicola *Iljin in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 357 (1932).—Ross. asiat. (Kasakstan).
palaestinus *Eig in Fedde, Repert. Beih.* lxiii. 1. 47 (1931), nomen.—Palaest.
riphaeus *Font Quer & Pau in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 711 [1928].—Marocc.
syriacus (*Boiss.*) *Dinsm. in Post, Fl. Syria, Palest. & Sinai*, ed. 2, ii. (*Publ. Am. Univ. Beirut*, Nat. Sc. Ser., No. 1) 121 (1933); *et in Fedde, Repert.* xxxiii. 109 (1933): Kentrophyllum syriacum.

CARTIERA Greene (Crucif.).
amplexicaulis (*S. Wats.*) *O. E. Schulz in Engl. Jahrb.* lxvi. 97 (1933): Caulanthus amplexicaulis.

CARUM L. (Umbellif.).
asinorum *Litard. & Maire*; *Litard. & Maire in Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc*, No. xxvi. 18 (1930).—Marocc.
foetidum (*Coss. & Durieu*) *Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc*, ii. 539 (1932): Selinopsis foetida.
rosellum *Woronow in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 218 (1933).—Caucas.
salsum *Popov in Trans. Sc. Soc. Turk.* i. 18 (1923), nomen.—Bokhara.

CARYOCAR L. (Caryocarac.; Ternstroemiac., Gen. Pl.).
dentatum *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 380.—Bras. (Amaz.).

CARYOPHYLLUS L. (Myrtac.).
densiflorus *Vieill. ex Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 699, nomen.—N. Caled.

CARYOTA L. (Palmae).
bacsonensis *Magalon*; *Magalon in Fedde, Repert.* xxix. 23 (1931).—Indo-China (Tonkin).
plumosa *Hort. ex Voll & Brade in Rodriguesia*, i. No. 3, 56 (1935), nomen.—Hort.

CASASIA A. Rich. (Rubiac.).
Samuelssonii *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 45 (1932).—Santo Domingo.

CASCARILLA Wedd. (Rubiac.).
Spruceana *Benth. ex Ducke in Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro*, vi. 94 (1933), in obs.—Bras. (Rio Negro).

CASEARIA Jacq. (Flacourtiac.; Samydac., Gen. Pl.).
aequilateralis *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 38 (1935).—China (Hainan).
bridelioides *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 590 (1921), in obs.; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 168 (1927), in clavi; *Hutchinson & Dalziel in Kew Bull.* 1928, 213, descr.—Nigeria; Cameroons.
calodendron *Gilg ex Engl. l. c.*, in obs.—Guinea (Togo).
celastroides *Klotzsch*; *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 53 (1934), descr.—Guiana Brit.; Bras. (Amaz.).
chirindensis *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 590 (1921), in obs.—N. Rhodesia.
Ekmanii *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 954 (1934): C. Lindeniana *Urb.*
fasciculata (*Ruiz & Pav.*) *Sleum. l. c.* 955: Chaetocrater fasciculatus.
glomerata *Roxb.*; *DC. Prodr.* ii. 49 (1825).—Ind. or.
lifuana *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1933, lxxviii. Beibl. 19, 275.—Ins. Loyauté.
Luetzelburgii *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 955 (1934).—Bras. (Parahyba).
luteocarpa *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3189 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
mollipila *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 956 (1934).—Venez.
multinervosa *C. T. White & Sleum. l. c.* xii. 474 (1935).—Austral. (Queensland; N. S. Wales).
multipunctata *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 174 (1934).—Sumatra.
nigricans *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 956 (1934).—Peruv.
nigricolor *Sleum. l. c.* 957.—Peruv.
ovoidea *Sleum. l. c.* 958.—Peruv.
Pavoniana *Sleum. l. c.*—Peruv.
puberula *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 694.—N. Caled.
reflexa *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 959 (1934).—Bras. (Rio Grande do Sul).
Schulziana *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxxii. 87 (1933).—Santo Domingo.

CASSELIA Nees & Mart. (Verbenac.).
ilicifolia *Moldenke in Phytologia*, i. 97 (1934).—Argent.

CASSIA L. (Legumin.).
acaulis *Bong. ex A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1933, xiii. 764, in syn.: Arachis tuberosa.
adscendens *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* ii. 281 (1834).—Bras.
atroreticulata *Chiov. Fl. Somala*, II. 173 (1932).—Somal. Ital.
Bartlettii *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 132 (1932).—Brit. Honduras.
Benthamii *Ghesq. in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxvi. 148 (1935), in adnot.: C. gracillima *Benth.*
Burttii *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 80.—Tanganyika Terr.
cinerea *Colla, Herb. Pedem.* ii. 281 (1834).—Bras.
cyclophora *Boiv. ex Ghesq. in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxvi. 132 (1935), in syn.: C. tettensis var. Johannae *Ghesq.*
Forskalii *Royle, Man. Mat. Med.* 356 (1847): C. lanceolata *Forsk.*
garambiensis *Hosokawa in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 197.—Formosa.
Hayesiana (*Britton & Rose*) *Standley in Contrib. Arn. Arb.* No. v. 75 (1933): Chamaefistula Hayesiana.
Hochstetteri *Ghesq. in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 155 (1932).—Abyss.; Ind. or.; China (Chihli); Japon.
lancifolia *Colla, Herb. Pedem.* ii. 281 (1834).—Austral.
Leandrii *Ghesq. in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiv. 264 (1934).—Madag.
mattogrossensis *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 13, 60 (1931).—Bras. (Matto Grosso).
meridionalis *R. Viguier ex Ghesq. in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxvi. 142 (1935), in syn.: C. Viguierella var. meridionalis *Ghesq.*
ovalifolia *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* ii. 280 (1834).—Bras.
papillosa (*Britton & Rose*) *Standley in Tropical Woods*, 1933, No. 34, 40: Chamaefistula papillosa.
Perrieri *R. Viguier apud Ghesq. in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxvi. 144 (1935).—Madag.
petensis (*Britton & Rose*) *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 61 (1935): Pseudocassia petensis.
Pittieri *Ghesq. in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 162 (1932), in adnot.: C. falcinella *Standley.*
Robynsiana *Ghesq. l. c.* 149.—Congo Belg.
Rogeonii *Ghesq. in Rev. Bot. Appliq.* 1934, xiv. 238.—Sudan.
Sabak *Delile*; *Ghesq. l. c.* 240, descr. emend.—Nubia; Afr. Gall. Centr.
scarlatina *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 730.—Bras. (Amaz.).
stellata *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 40 (1933–5).—Calif. infer.
subsetosa *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 13, 62 (1931).—Bras. (Matto Grosso).
tenuicaulis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 40 (1933–5).—Mexico.
tuberosa *Riedel ex A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1933, xiii. 764, in syn.: Arachis tuberosa.
ursinoides *Harms ex Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste Braz.* iii. 269 (1923) [*Insp. Fed. Obras Secc.* Publ. 57], nomen; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 151.—Bras. (Bahia).
Viguierella *Ghesq. in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxvi. 141 (1935).—Madag.
Wildemaniana *Ghesq. in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 154 (1932).—Congo Belg.
Wilsonii (*Britton & Rose*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., x. 219 (1931): Chamaecrista Wilsonii.
Wittei *Ghesq. in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 154 (1932).—Congo Belg.; Tanganyika Terr.

CASSINE L. (Celastrac.).
discolor *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 378 (1824).—Reg. Himal.
excelsa *Wall. l. c.* 376.—Nepal.

CASSIPOUREA Aubl. (Rhizophorac.).
Broadwayi *Briq. in Candollea*, iv. 342 (1931).—Ind. occ. (Tobago).
Guildingii *Briq. l. c.* 343.—Cuba.

CASSIPOUREA:—
Poeppigii *Briq. in Candollea*, iv. 349 (1931).—Peruv.
ugandensis (*Stapf*) *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 673 (1921), in obs.: Dactylopetalum ugandense.
Ulei *Briq. in Candollea*, iv. 347 (1931).—Boliv.

CASSYTHA Mill. (Cactac.).
baccifera *Soland. ex J. Mill. Sexual Syst. Linn.* Class. 1, ord. 1 [t. 2 a] (1771).—Ind. or.

CASTALIA Salisb. (Nymphaeac.).
acutiloba (*DC.*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 334 (1931), in obs.: Nymphaea acutiloba.
colchica (*Woronow*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 87 (1930).—Caucas.
crassifolia *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 333 (1931).—Manchur.; China (Hunan).
×cultorum *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 358 (1924), in syn.: Nymphaea cultorum.

CASTANOPSIS Spach (Fagac.; Cupulif., Gen. Pl.).
birmanica *A. Camus in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 688.—Burma.
conspersispina *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 152 (1934).—Sumatra.
cryptoneuron (*Léveillé*) *Rehder in Fedde, Repert.* xxxv. 351 (1934): Quercus cryptoneuron.
goniacantha *A. Camus in Lecomte, Not. Syst.* v. 72 (1935).—Indo-China (Tonkin).
longipes *A. Camus, l. c.* 73.—Indo-China (Anam).
pachycarpa *A. Camus in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 92.—Penins. Mal.

CASTELA Turp (Simaroubac.).
Brittonii (*Small*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 385 (1931): Castelaria Brittonii.

CASTELARIA Small (Simaroubac.).
Galapagei (*Hook. f.*) *Moldenke in Phytologia*, i. 8 (1933): Castela Galapagei.

CASTELLIA Tinéo, Pl. Rar. Sicil. Fasc. 1, 17 (1846). *GRAMINEAE.*
tuberculata *Tinéo, l. c.* 18.—Sicil.

CASTILLEJA Mutis (Scrophulariac.).
Andrewsii *L. F. Henderson in Madroña*, iii. 31 (1935).—U.S.A. (Oregon).
annua *Pennell in Proc. Acad. Sc. Philad.* 1934, lxxxvi. 533.—Alaska.
chrymactis *Pennell, l. c.* 539.—Alaska.
elegans *Malte in Rhodora*, 1934, xxxvi. 187.—Canada (Mackenzie Distr.).
fulva *Pennell in Proc. Acad. Sc. Philad.* 1934, lxxxvi. 540.—Brit. Columb.
galeata *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1931, xviii. 439.—U.S.A. (Arizona).
haitiensis *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 46 (1931).—Haiti.
Henryae *Pennell in Proc. Acad. Sc. Philad.* 1934, lxxxvi. 534.—Brit. Columb.; Alberta.
hyetophila *Pennell, l. c.* 537.—Alaska.
hyperborea *Pennell, l. c.* 532.—Alaska; Yukon.
Ludoviciana *Pennell in Acad. Nat. Sc. Philad.* Monogr. 1, *Scroph.* 540 (1935).—U.S.A. (Louisiana).
lutescens (*Greenm.*) *Piper in Piper & Beattie, Fl. Palouse Reg.* 164 (1901): C. pallida var. lutescens.
Mearnsii *Pennell in Acad. Nat. Sc. Philad.* Monogr. 1, *Scroph.* 530 (1935).—U.S.A. (Texas).
Mexiae *Eastw. ex Pennell in Proc. Acad. Sc. Philad.* 1934, lxxxvi. 526, in syn.: C. pallida var. Mexiae *Pennell.*
Muelleri *Pennell, l. c.* 533.—Canada (Yukon).
multisecta *Eastw. in Leafl. West. Bot.* i. 174 (1935).—U.S.A. (Calif.).
nevadensis *Eastw. l. c.* 175.—U.S.A. (Calif.).
Peirsoni *Eastw. l. c.*—U.S.A. (Calif.).
Raupii *Pennell in Proc. Acad. Sc. Philad.* 1934, lxxxvi. 528.—Alaska; Canada.
unalaschkensis (*Cham. & Schlecht.*) *Malte in Rhodora*, 1934, xxxvi. 187: C. pallida var. unalaschkensis.
villosissima *Pennell in Proc. Acad. Sc. Philad.* 1934, lxxxvi. 532.—Canada (Yukon).

CASTILLEJA:—
Williamsii *Pennell in Acad. Nat. Sc. Philad.* Monogr. 1, *Scroph.* 530 (1935).—U.S.A. (Texas).
yukonis *Pennell in Proc. Acad. Sc. Philad.* 1934, lxxxvi. 531.—Canada (Yukon).

CASUARINA L. (Casuarinac.).
paradoxa *Mackl. in Kew Bull.* 1931, 150.—S. Austral.
pusilla *Mackl. in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1927, li. 272.—S. Austral.; Victoria.
striata *Mackl. l. c.* 267.—S. Austral.

CATABROSA Beauv. (Gramin.).
Burkartii *Hitchcock in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1934, xxiv. 481.—Argent.

CATANANCHE L. (Compos.).
bicolor *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 556 (1894), in syn.: C. caerulea f. bicolor *Hort.*

CATASETUM L. C. Rich. (Orchidac.).
Charlesworthii *Hort. ex Gard. Chron.* 1928, Ser. III. lxxxiv. 358.—Peruv.
Kraenzlinianum *Mansf. in Fedde, Repert.* xxxi. 104 (1932): C. micranthum *Kraenzl.*
Lindleyanum *Mansf. l. c.* 117.—Colomb. vel Ecuador.?

CATHORMION Hassk. (Legumin.).
mangense (*Jacq.*) *Dugand in Tropical Woods*, 1934, No. 40, 11: Mimosa mangensis.

CATOBLASTUS H. Wendl. (Palmae).
Dryanderae *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 861 (1933), in obs., nomen alternativ.—Colomb.

CATONIA P. Br.; H. Hallier in Meded. Herb. Leid. No. 36, 1 (1918): **Miconia** Ruiz & Pav. (Melastomatac.).

CATOPSIS Griseb. (Bromeliac.).
cucullata *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 72 (1934).—Mexico.
tenuis *Cufod. in Archiv. Bot., Forli*, 1933, ix. 181.—Costa Rica.

CATOSTEMMA Benth. (Bombacac.; Malvac., Gen. Pl.).
commune *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 51.—Guiana Brit.

CATOSTIGMA O. F. Cook (Palmae).
Dryanderae *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 860 (1933).—Colomb.

CAUCAEA Schlechter; Mansf. in Fedde, Repert. xxxv. 342 (1934), descr. emend. *ORCHIDACEAE.*
radiata (*Lindl.*) *Mansf. l. c.* 343: Abola radiata.

CAUCALIS L. (Umbellif.).
hordeicarpa *Makaschvili ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 136 (1932).—Caucas.
incognita *C. Norman in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 205.—Afr. centr.

CAUCANTHUS Forsk. (Malpighiac.).
argenteus *Chiov. Fl. Somala*, II. 41 (1932).—Somal. Ital.

CAULANTHUS S. Wats. (Crucif.).
annuus *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 17, 25 (1930).—U.S.A. (Oregon).
glaber (*M. E. Jones*) *O. E. Schulz in Engl. Jahrb.* lxvi. 97 (1933): C. crassicaulis var. glaber.

CAUTLEA Royle (Zingiberac.; Scitamin., Gen. Pl.).
gracilis (*Sm.*) *Dandy in Journ. Bot.* 1932, lxx. 328: Roscoea gracilis.

CAVENDISHIA Lindl. (Ericac.; Vacciniac., Gen. Pl.).
axillaris *A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 493 (1932).—Colomb.
bomareoides *A. C. Smith, l. c.* 470.—Panamá; Colomb.
bullata *A. C. Smith & Standley, l. c.* 453.—Costa Rica.
caudata *A. C. Smith, l. c.* 496.—Colomb.
caulialata (*Ruiz & Pav.*) *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 118: Thibaudia caulialata.
coccinea *A. C. Smith, l. c.* 115.—Colomb.

CAVENDISHIA:—
compacta *A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 468 (1932).—Colomb.
divaricata *A. C. Smith, l. c.* 481.—Colomb.
duidae *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 443.—Venez.
durifolia *A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 493 (1932).—Colomb.
glandulosa *A. C. Smith, l. c.* 497.—Colomb.
Gleasoniana *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 117.—Guiana Brit.
gracilis *A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 501 (1932).—Colomb.
guascensis *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 26, 8 (1933).—Colomb.
hispida *A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 469 (1932).—Colomb.
Killipii *A. C. Smith, l. c.* 483.—Colomb.
macrocephala *A. C. Smith, l. c.* 475.—Colomb.
marginata *A. C. Smith, l. c.* 499.—Colomb.
miconioides *A. C. Smith, l. c.* 503.—Colomb.
montana *A. C. Smith, l. c.* 492.—Colomb.
Mutisiana *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 26, 5 (1933).—Colomb.
nitens *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 119 (1934).—Colomb.
nitida (*H. B. & K.*) *A. C. Smith in Phytologia*, i. 131 (1935): Thibaudia nitida.
obtusa *A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 498 (1932).—Colomb.
oligantha *A. C. Smith, l. c.* 496.—Colomb.
pterocarpa (*Donn. Smith*) *A. C. Smith, l. c.* 449: Themistoclesia pterocarpa.
punctata *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 294 (1935): Thibaudia punctatifolia.
punctatifolia (*Ruiz & Pav.*) *Hoerold in Engl. Jahrb.* xlii. 279 (1909): Thibaudia punctatifolia.
Purdiei *A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 472 (1932).—Colomb.
quercina *A. C. Smith, l. c.* 450.—Costa Rica.
rhynchophylla *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 116.—Colomb.
rigidifolia *A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 500 (1932).—Colomb.
sessiliflora *A. C. Smith, l. c.* 483.—Colomb.
sophoclesioides *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 118.—Colomb.
spicata *A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 479 (1932).—Colomb.
splachnoides *A. C. Smith, l. c.* 471.—Panamá.
subamplexicaulis *A. C. Smith, l. c.* 478.—Colomb.
tolimensis *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 26, 7 (1933).—Colomb.
venosa *A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 474 (1932).—Colomb.; Ecuador.

CAYRATIA Juss. (Vitac.; Ampelidac., Gen. Pl.).
dichromocarpa (*Léveillé*) *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1934, xv. 27: Vitis dichromocarpa.
novemfolia *Herb. Kew. ex Burkill, Dict. Econ. Prod. Mal. Penins.* ii. 2246 (1935), in syn.: Vitis novemfolia.

CEANOTHUS L. (Rhamnac.).
×Burkwoodii *Hort. ex Gard. Chron.* 1931, Ser. III. lxxxix. 438, in obs.; *et l. c.* 1931, Ser. III. xc. 366, in obs.—Hort.
Ferrisae *McMinn in Madroña*, ii. 89 (1933).—U.S.A. (Calif.).
napalensis *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 375 (1824).—Nepal.
serrulatus *McMinn in Madroña*, ii. 89 (1933).—U.S.A. (Calif.).
triqueter *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 376 (1824).—Kashmir.

CECCHIA Chiov. Fl. Somala, II. 397 (1932). *EUPHORBIACEAE.*
somalensis *Chiov. l. c.*—Somal. Ital.

CECROPIA L. (Morac.; Urticac., Gen. Pl.).
Mutisiana *Mildbr. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 26, 29 (1933).—Colomb.
Standleyi *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 61 (1931).—Peruv.

CEDRELA P. Br. (Meliac.).
febrifuga *Blume, Bijdr.* i. 180 (1825).—Java.
Herrerae *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 382 (1932).—Peruv.

CEDRELA:—
pacayana *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 784 (1933).—Guatem.
Steinbachii *Harms, l. c.* xi. 381 (1932).—Boliv.

CEDRUS Trew, Cedr. Lib. Hist. pars 1, 6 (1757); Loud. Arb. Brit. iv. 2402 (1838). *PINACEAE* (*CONIFERAE*, Gen. Pl.).
Deodara (*Roxb. ex Lambert*) *G. Don in Loud. Hort. Brit.* ed. 1, 388, No. 23637 (1830): Pinus Deodara.
libani *G. Don in Loud. l. c.* No. 23636: Pinus Cedrus.

CEIBA Mill. (Bombacac.; Malvac., Gen. Pl.).
aesculifolia (*H. B. & K.*) *Britten & E. G. Baker in Journ. Bot.* 1896, xxxiv. 174, in obs., 175: Bombax aesculifolium.
occidentalis (*Spreng.*) *Burkill in Kew Bull.* 1935, 317; *Burkill, Dict. Econ. Prod. Mal. Penins.* i. 501 (1935), in obs.: Bombax occidentale.

CELASTRUS L. (Celastrac.).
aculeatus *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 37 (1934).—China (Kwangtung).
buxifolius *Wall. in Roxb. Hort. Beng.* 18 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 396 (1824), in syn.: C. rigidus *Wall.*
crenatus *G. Forst.*; *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 158 (1935), descr. emend.—Ins. Marquesas.
fasciculatus *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxxv. (*Hist. Nat. Pl.* v. Atlas, iii.) t. 280 (1896).—Madag.
hirsutus *Comber in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 233 (1934).—China (Yunnan).
jeholensis *Nakai apud Nakai & Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. 1. (*Pl. Nov. Jehol.* 1) 6 (1934).—Manchur. (Jehol).
Jodinii *Steud. ex Göpp. in Gartenflora*, 1854, iii. 312, in obs.: Ilex cuneifolia.
Liebmannii *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 316 (1931).—Mexico.
lokchongensis *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 15.—China (Kwangtung).
lucidus *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 400 (1824).—Penins. Mal.
micranthus *Roxb. Hort. Beng.* 86 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 393 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 625 (1832).—Ins. Molucc.
monospermus *Roxb. l. c.* 18, nomen; *et l. c.* 394; *et l. c.*—Ind. or. (Assam).
montanus *Roem. & Schult. Syst. Veg.* v. 427 (1819); *Roth, Nov. Pl. Sp.* 154 (1821).—Ind. or.
multiflorus *Roxb. Hort. Beng.* 18 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 389 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 622 (1832).—Nepal.
nutans *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 390; *et l. c.* 623.—Ind. or. (Mysore).
obtusifolius *Roxb. l. c.* 86, nomen; *et l. c.* 393; *et l. c.* 625.—Mauritius.
oppositus *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 398 (1824).—Ind. or.
pauciflorus *Wall. l. c.* 400.—Penins. Mal.
rigidus *Wall. l. c.* 396.—Ind. or. (Travancore).
robustus *Roxb. Hort. Beng.* 18 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 395 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 626 (1832).—Ind. or. (Assam).
rufus *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 397 (1824).—Nepal.
somalensis *Engl. ex Loes. in Engl. Jahrb.* xvii. 548 (1893), in syn.: Gymnosporia somalensis.
stylosus *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 401 (1824).—Nepal.
Vanioti (*Léveillé*) *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 249: Saurauia Vanioti.
verticillatus *Roxb. Hort. Beng.* 18 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 391 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, ii. 624 (1832).—Nepal.

CELMISIA Cass. (Compos.).
Allanii *Martin in Trans. & Proc. Roy. Soc. N. Z.* lxv. 181 (1935).—N. Zel.
Durietzii *Cockayne & Allan in Ann. Bot.* 1934, xlviii. 46: C. Sinclairii *Cheesem. Man. N. Zeal. Fl.* 306 (1906), non *Hook. f.*
insignis *Martin in Trans. & Proc. Roy. Soc. N. Z.* lxv. 182 (1935).—N. Zel.
saxifraga *Comber in New Fl. & Silv.* iii. 99 (1931), in obs., nomen.—Tasman.

CELOSIA L. (Amaranthac.).
argenteiformis (*Schinz*) *Schinz in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 30 (1934): Hermbstaedtia argenteiformis.
Bonnivaerii *Schinz in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 133.—Congo Belg.
cernua *Roxb. Hort. Beng.* 19 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 509 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 680 (1832).—Ind. or.
effusa *Hort. ex Schinz in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 29 (1934).—Hort.
globosa *Schinz in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 137.—Congo Belg.
linearis (*Schinz*) *Schinz in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 30, 586 (1934): Hermbstaedtia linearis.
namaënsis *Schinz in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 134.—Great Namaq.
plumosa *Hort. ex Burvenich in Rev. Hort. Belge*, 1903, xxix. 268.—Hab.?
plumosa *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 864 (1895), in syn.: C. argentea var. plumosa.
polysperma *Roxb. Hort. Beng.* 84 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 511 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 681 (1832).—Ins. Molucc.
scabra (*Schinz*) *Schinz in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 30, 586 (1934): Hermbstaedtia scabra.
Vanderystii *Schinz in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 135.—Congo Belg.
variegata *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 864 (1895), in syn.: C. argentea.

CELSIA L. (Scrophulariac.).
acanthifolia *Pau in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 566 [1928].—Marocc.
Joannis *Bordz. in Bull. Jard. Bot. Kieff*, xii–xiii. 135 (1931); *et in Monit. Jard. Bot. Tiflis*, 1928–30, n. s. Pt. 5, 49 (1931).—Armen.
patris *Bordz. l. c.* 136; *et l. c.* 51.—Armen.
valentina *Font Quer in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1926, xxvi. 56.—Hispan.

CELTIS L. (Ulmac.; Urticac., Gen. Pl.).
aurantiaca *Nakai in Chôsen Sanrin Kwaihô*, No. 59, 23 (1930); *Nakai, Fl. Sylvat. Koreana*, xix. 68 (1932).—China bor.-or.; Manchur.; Corea.
chekiangensis *Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., ix. 245 (1934).—China (Chekiang).
choseniana *Nakai in Chôsen Sanrin Kwaihô*, No. 59, 21 (1930); *Nakai, Fl. Sylvat. Koreana*, xix. 59 (1932).—Corea.
compressa *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 298 (1917).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
edulis *Nakai in Chôsen Sanrin Kwaihô*, No. 59, 23 (1930); *Nakai, Fl. Sylvat. Koreana*, xix. 70 (1932).—Corea.
fragifera *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 299 (1917).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
Hashimotoi *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 19.—Japon. (Hondo).
Holtzii *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 12 (1915), in obs.—Tanganyika Terr.
polyclada *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. ii. Anhang, 1 (1932).—Tanganyika Terr.
Rockii *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 199.—China (Yunnan).
scotellioides *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 299 (1917).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).

CENCHRUS L. (Gramin.).
biflorus *Roxb. Hort. Beng.* 81 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 238 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 233 (1832).—Ind. or.
leptacanthus *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 774 (1934).—Sudan.
melanostachyus *A. Camus, l. c.* 1934, lxxxi. 594.—Madag.
perinvolucratus *Stapf & C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1933, 299.—Tanganyika Terr.; Afr. Lusit. Or.; Zanzibar.

CENCHRUS:—
Prieuri (*Kunth*) *Maire in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 523: Pennisetum Prieurii.

CENTAUREA L. (Compos.).
Abdelkaridi *Sennen, Pl. d'Esp.* No. 8834; *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1935, xxvi. 215, in syn.: C. incana var. littoralis *Battand.*
aetaliae (*Somm.*) *Béguinot in Archiv. Bot., Forlì*, 1931, vii. 93: C. paniculata var. aetaliae.
albofimbriata *Stefanoff & Georgieff in Spic. Bulg. Akad. Nauk.* xliv. pp. 133–93 (1931); cf. *Engl. Jahrb.* lxv. Literaturber. p. 49 (1933).—Bulgar.
Alexandri *Bordz. in Fedde, Repert.* xxxvi. 306 (1934).—Armen. Ross.
Ali-Beyana *Font Quer & Pau in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 696 [1928].—Marocc.
appendicigera *K. Koch in Linnaea*, xxiv. 425 (1851).—Oriens.
Arnoldi *Colla, Herb. Pedem.* iii. 274 (1834).—Ital.?
atacorensis *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 261 (1917).—Dahomey.
aulieatensis *Iljin in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 205 (1933), in syn.: Rhaponticum aulieatense.
aznatinensis *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xii. 468 (1929).—Hispan.
bannatica *Colla, Herb. Pedem.* iii. 274 (1834).—Hab.?
Bellardi *Colla, l. c.* 273.—Ital.?
× beregiensis *J. Wagner & Margittai in Bot. Közl.* 1932, xxix. 138.—Carpath.
× beskidiana *J. Wagner & Margittai, l. c.* 137.—Carpath.
biennis *Iljin in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 113 (1932), in syn.: Amberboa glauca.
Bolivaris *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 64 [1933], nomen.—Marocc.
× brasoviana *Nyár. in Bul. Grăd. & Muz. Bot. Univ. Cluj*, 1934, xiv. 219 (1935).—Transylv.
bucharica *Iljin in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 108 (1932), in syn.: Amberboa bucharica.
candelabrum *Hayek & Košanin in Fedde, Repert. Beih.* xxx. ii. 746 (1931).—Albania.
caspia *Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 219 (1934).—Caucas.
caspica *Iljin in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 113 (1932), in syn.: Amberboa nana.
× Cervantesi *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 100.—Hispan.
chorionensis *Hoffm.-Grob. & Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1931–2, Sér. II. xxiv. 221 (1933).—Ins. Aegeae (Halki).
cicutifolia *Colla, Herb. Pedem.* iii. 262 (1834), non olim.—Hab.?
cyanomorpha *Stefanoff & Georgieff in Spic. Bulg. Akad. Nauk.* xliv. pp. 133–93 (1931); cf. *Engl. Jahrb.* lxv. Literaturber. p. 49 (1933).—Bulgar.
Czeczottiae *Hayek ex Czecz. in Acta Soc. Bot. Polon.* 1932, ix. 40.—As. Min. (Paphlagonia).
Degeni *Maire & Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 65 [1933], nomen.—Marocc.
× Doumerguei *Faure & Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1933, xxiv. 220.—Alger.
× ecrenensis *Nyár. in Bul. Grăd. & Muz. Bot. Univ. Cluj*, 1933, xiii. 67 (1934).—Ruman.
epirotica (*Baldacci*) *Halácsy, Consp. Fl. Graec.* ii. 134 (1902): C. deusta var. epirotica.
eriopoda *K. H. Rechinger in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 13.—Graecia (Ins. Syra).
eriosiphon *Emberger & Maire*; *Emberger & Maire in Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc*, Nos. xxi–xxii. 39 (1930).—Marocc.
Eugenii *Sosn. in Monit. Jard. Bot. Tiflis*, 1928–30, n. s. Pt. 5, 32 (1931).—Armen.
× Faurei *Maire*; *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1932, xxiii. 193, cum descr.—Alger.
Faurei *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 64 [1933], hybr. ?, non praec.—Marocc.
Gattefossei *Maire, Contrib. Étude Fl. Afr. Nord*, Fasc. 21, reimpr. p. 1 (1933); *Maire in Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc*, 1933, xiii. 269 (1934).—Marocc.
Gentyi *Thiébaut in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 116.—Syria.

CENTAUREA:—
globurensis *Nyár. in Bul. Grăd. & Muz. Bot. Univ. Cluj*, 1934, xiv. 218 (1935).—Ruman.
grbavacensis (*Rohlena*) *Stoyanoff & Achtaroff, Stud. Centaur. Bulg.* 39 (1935): C. Immanuelis-Loewii var. grbavacensis.
× Gros-Miquelii *Font Quer in Cavanillesia*, vii. 82 (1935).—Marocc.
Guilhelmi *Pau & Sennen in Sennen, Pl. d'Esp.* No. 8831; *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1935, xxvi. 215, descr.—Marocc.
× Heiniana *Hübl in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1932, lxxxii. p. (23).—Eur.
Hermanni *Hermann in Bull. Soc. Bot. Bulgar.* iv. 27 (1931).—Thracia.
Huljakii *J. Wagner in Fedde, Repert.* xxxviii. 286 (1935).—Macedon.
incanescens (*Fisch. & Mey. ex DC.*) *Sosn. in Monit. Jard. Bot. Tiflis*, 1928–30, n. s. Pt. 5, 26 (1931), cum descr. emend.: Amblyopogon incanescens.
integrifolia (*K. Koch*) *C. A. Mey.*; *Sosn. l. c.* 24, cum descr. emend.: Psephellus integrifolius.
ipecensis *K. H. Rechinger in Fedde, Repert.* xxxviii. 342 (1935).—Albania.
kopet-daghensis *Iljin in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 359 (1932).—Transcasp.
Korshinskyi *Iljin, l. c.* 354.—Eur. austr.-or.
korthiaca *Adamović ex Hayek in Fedde, Repert. Beih.* xxx. ii. 753 (1931), in syn.: C. thessalonica.
lanulata *Eig in Fedde, Repert. Beih.* lxiii. 1. 47 (1931), nomen.—Palaest.
lasiopoda *Popov & Kult. in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 3, 110 (1928).—Turkestan. (Thian Shan).
leucomelaena *Hayek in Fedde, Repert. Beih.* xxx. ii. 758 (1931).—Albania.
maculiceps *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxvi. 148 (1934).—As. Min. (Lydia).
madrensis *B. L. Robinson in G. Ortega, Apuntes Fl. Indig. Sinaloa* (*Cat. Sist. Pl. Sinaloa*) 31 (1929), nomen.—Mexico.
× maialis *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 65 [1933].—Marocc.
Maireana *Emberger in Maire, Contr.* 1269; *et Mat. Fl. Mar.* 174; cf. *Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc*, iii. 812 (1934).—Marocc.
mauritanica (*Font Quer*) *Pau in Font Quer, Iter Marocc.* 1930, No. 698 [1932]: C. sempervirens var. mauritanica.
× munkacsensis *J. Wagner & Margittai in Bot. Közl.* 1932, xxix. 138.—Carpath.
Murbeckiana *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 110: Amberboa maroccana.
namanganica *Iljin in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 206 (1933), in syn.: Rhaponticum namanganicum.
nigrotriangulata *K. H. Rechinger in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 14.—Graecia (Ins. Amorgos).
Novakii *Dostál in Preslia*, x. 61 (1931).—Penins. Balcan.
obtusiloba *Battand. Contrib. Fl. Atlant.* 52 (1919).—Alger.
Paulini *Maire & Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 65 [1933].—Marocc.
pseudoaxillaris *Stefanoff & Georgieff in Spic. Bulg. Akad. Nauk.* xliv. pp. 133–93 (1931); cf. *Engl. Jahrb.* lxv. Literaturber. p. 49 (1933).—Bulgar.
pseudobovina *Hayek*; *Hayek in Fedde, Repert. Beih.* xxx. ii. 758 (1931), descr. latine.—Bulgar.
ptarmicifolia *Halácsy ex Hayek, l. c.* 781: C. epirotica.
purpurea *Bellardi ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 275 (1834).—Hab.?
rifana *Emberger & Maire ex Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 65 [1933], pro syn.: C. Degeni.
× Sagarrae *Pau & Font Quer apud Font Quer, Nota Fitografica*, 1918; cf. *Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, v. Ser. Bot., No. 3, 230 (1920).—Hispan.
Sanctae-Annae *J. Wagner in Fedde, Repert.* xxxviii. 287 (1935).—Macedon.
Secondaireana *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 144 [1933], nomen.—Marocc.
serrulata *Bellardi ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 275 (1834).—Aegypt.

CENTAUREA:—
Shelkovnikovii *Sosn. in Trud. Azerb. Otdyel. Zakavk. Fil. Akad. Nauk SSSR*, Sect. Bot., i. 47 (1933).—Transcaucas.
Shepardi *Post & Beauverd in Dinsm. Pl. Post. & Dinsm.* Fasc. I. 7 (1932); *Dinsm. in Fedde, Repert.* xxxiii. 107 (1933).—Syria.
stellata *Bellardi ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 276 (1834).—Aegypt.
subdepressa *Stefanoff & Georgieff in Spis. Bulg. Akad. Nauk.* xliv. pp. 133–93 (1931); cf. *Engl. Jahrb.* lxv. Literaturber. p. 49 (1933).—Bulgar.
subulosa *Hornem. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 276 (1834).—Hab.?
takredensis *Coss. in Bull. Soc. Dauph.* 1883, 413, No. 3999, nomen; *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1932, xxiii. 193, descr.—Marocc.
tananica *Maire, l. c.* 194.—Marocc.
taochia *Sosn. in Monit. Jard. Bot. Tiflis*, 1928–30, n. s. Pt. 5, 30 (1931).—Armen.
tematinensis *Domin in Acta Bot. Bohem.* ix. 53 (1930).—Czechoslovak.
thasia *Hayek in Fedde, Repert. Beih.* xxx. II. 762 (1931).—Macedon.
Theryi *Emberger & Maire*; *Emberger & Maire in Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc*, Nos. XXI–XXII. 39 (1930).—Marocc.
transcaucasica *Sosn. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 212 (1934).—Caucas.
tubiformis *Haláscy ex Hayek in Fedde, Repert. Beih.* xxx. II. 795 (1931), in syn.: C. thracica.
turanica *Iljin in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 110 (1932), in syn.: Amberboa turanica.
Veneris (*Somm.*) *Béguinot in Archiv. Bot., Forlì*, 1931, vii. 90: C. Cineraria var. Veneris.
×Villaris *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 101, in obs.—Hispan.
×vistensis *Nyár. in Bul. Grăd. & Muz. Bot. Univ. Cluj*, 1934, xiv. 219 (1935).—Transylv.
vranjana *Adamović ex Hayek in Fedde, Repert. Beih.* xxx. II. 754 (1931), in syn.: C. rupestris.
Vvedenskyi *Popov in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 3, 111 (1928).—Bokhara.
xanthocephala (*Fisch. & Mey. ex Boiss.*) *Sosn. in Monit. Jard. Bot. Tiflis*, 1928–30, n. s. Pt. 5, 26 (1931): Psephellus xanthocephalus.

×**CENTAUREOPAPPUS** Hort. ex Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit. 1932, xlvii. 166, in obs. *COMPOSITAE*.
[AETHIOPAPPUS × CENTAUREA.]
hybridus *Hort. l. c.*, in obs.—Hort.

CENTAURIUM Hill (Gentianac.).
apertum *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 119 (1932).—Marocc.
candelabrum *H. Lindb. l. c.* 118.—Marocc.
laxiflorum *H. Lindb. l. c.*—Marocc.
suffruticosum (*Salzm. ex Griseb.*) *H. Lindb. l. c.* 119: Chironia suffruticosa.

CENTELLA L. (Umbellif.).
lanata *Compton in Kew Bull.* 1934, 259.—Afr. austr. (Cape Prov.).

CENTRANTHERA R. Br. (Scrophulariac.).
cochinchinensis (*Lour.*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 39, in obs., 353 (1935): Digitalis cochinchinensis.

CENTRANTHUS DC. (Valerianac.).
[Vide KENTRANTHUS.]

CENTRATHERUM Cass. (Compos.).
camporum (*Hassler*) *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 6, 15 (1932): C. punctatum subsp. camporum.

CENTROCHLOA Swallen in Journ. Wash. Acad. Sc. 1935, xxv. 192. *GRAMINEAE*.
singularis *Swallen, l. c.*—Bras. (Maranhão; Goyaz).

CENTROPOGON Presl (Campanulac.).
Albertinus *E. Wimm. in Fedde, Repert.* xxxviii. 15 (1935).—Colomb.
alens *E. Wimm. l. c.* xxix. 65 (1931).—Colomb.
altibracteolatus *E. Wimm. l. c.* xxxviii. 9 (1935).—Colomb.
altisilvanus *E. Wimm. l. c.* xxix. 71 (1931).—Colomb.
argutus *E. Wimm. l. c.* 77.—Peruv.

CENTROPOGON:—
Aristi *E. Wimm. in Fedde, Repert.* xxxviii. 10 (1935).—Colomb.
augostanus *E. Wimm. l. c.* 9.—Mexico.
belliflorus *E. Wimm. l. c.* 13.—Colomb.
brachyandrus *E. Wimm. l. c.* xxix. 68 (1931).—Colomb.
casapiensis *E. Wimm. l. c.* 66.—Peruv.
cupreus *E. Wimm. l. c.* 70.—Colomb.
erastus *E. Wimm. l. c.* xxxviii. 8 (1935).—Costa Rica.
eurystomus *E. Wimm. l. c.* xxix. 60 (1931).—Peruv.
flaviceps *E. Wimm. l. c.* xxxviii. 12 (1935).—Ecuador.
flos-Mutisii *E. Wimm. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 26, p. 27 (1933).—Colomb.
glaucotomentosus *E. Wimm. in Fedde, Repert.* xxix. 73 (1931).—Colomb.
heteropilis *E. Wimm. l. c.* 72.—Colomb.
Holtonis *E. Wimm. l. c.* 66.—Colomb.
hylephilus *E. Wimm. l. c.* 74.—Colomb.
inflatus *E. Wimm. l. c.* 60.—Peruv.
latifolius *E. Wimm. l. c.* xxxviii. 7 (1935).—Peruv.
lianeus *E. Wimm. l. c.* 12.—Colomb.
Linneanus *E. Wimm. l. c.* xxix. 61 (1931).—Colomb.
mellitus *E. Wimm. l. c.* 73.—Colomb.
microcalyx *E. Wimm. l. c.* xxxviii. 14 (1935).—Colomb.
oligitrichus *E. Wimm. l. c.* xxix. 72 (1931).—Ecuador.
ostrinus *E. Wimm. l. c.* 67.—Peruv.
palmanus (*Donn. Smith*) *E. Wimm. l. c.* xxxviii. 7 (1935): C. nematosepalus var. palmanus.
pinguis *E. Wimm. l. c.* xxix. 70 (1931).—Colomb.
puerilis *E. Wimm. l. c.* 68.—Peruv.
pyropus *E. Wimm. l. c.* xxxviii. 14 (1935).—Colomb.
quebradanus *E. Wimm. l. c.* xxix. 61 (1931).—Colomb.
quitensis *E. Wimm. l. c.* 75.—Ecuador.
rostellatus *E. Wimm. l. c.* 63.—Colomb.
rubro-aureus *E. Wimm. l. c.* xxxviii. 13 (1935).—Colomb.
silvaticus *E. Wimm. l. c.* 6.—Peruv.
Smithii *E. Wimm. in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, xlvi. 240 (1932): Siphocampylus discolor.
tenuifolius *E. Wimm. in Fedde, Repert.* xxxviii. 13 (1935).—Colomb.
trachyanthus *E. Wimm. l. c.* xxix. 65 (1931).—Ecuador.
trichodes *E. Wimm. l. c.* 69.—Colomb.
unicolor *E. Wimm. l. c.* xxxviii. 11 (1935).—Colomb.
urubambae *E. Wimm. l. c.* 7.—Peruv.
viridiuliflorus *E. Wimm. l. c.* 16.—Peruv.
vulpinus *E. Wimm. l. c.* xxix. 76 (1931).—Colomb.
xestus *E. Wimm. l. c.* 64.—Ecuador.
yarumalensis *E. Wimm. l. c.* 74.—Colomb.

CENTROSEMA Benth. (Legumin.).
magnificum *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 13, 84 (1931).—Bras. (Matto Grosso).
prehensile *Ducke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 584 (1932).—Bras. (Amaz.).
sagittatum (*Humb. & Bonpl. ex Willd.*) *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 13, 86 (1931), in obs.: Glycine sagittata.

CENTROSTACHYS Wall. in Roxb. Fl. Ind., ed. Carey & Wall., ii. 497 (1824), in obs. *AMARANTHACEAE*.
aquatica *Wall. l. c.* 579.—Nepal.

CENTROSTEGIA A. Gray (Polygonac.).
Vortriedei (*T. S. Brandegee*) *Goodman in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1934, xxi. 91: Chorizanthe Vortriedei.

CENTROSTEMMA Decne. (Asclepiadac.).
platypetalum *Merrill in Sunyatsenia*, ii. 16 (1934).—China (Kwangtung).

CEPHAËLIS Sw. (Rubiac.).
Altsoni *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 475.—Guiana Brit.
amoena *Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 297.—Guiana Bat.
anisopoda *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 424 (1931).—Venez.

CEPHAËLIS:—
appendiculata (*Muell.-Arg.*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 375 (1931): Psychotria appendiculata.
bella *Standley, l. c.* 372—Peruv.
biternata (*Muell.-Arg.*) *Standley, l. c.* 375: Psychotria biternata.
blepharophora *Standley, l. c.* vii. 425 (1931).—Venez.
Duckei *Standley, l. c.* viii. 374 (1931).—Bras. (Pará).
glabrescens (*Muell.-Arg.*) *Standley, l. c.* 375: Psychotria glabrescens.
guianensis (*Aubl.*) *Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 297, in obs.: Carapichea guianensis.
hastisepala (*Muell.-Arg.*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 375 (1931): Psychotria hastisepala.
horridula (*Muell.-Arg.*) *Standley, l. c.*: Psychotria horridula.
involucrans (*Muell.-Arg.*) *Standley, l. c.*: Psychotria involucrans.
iodotricha (*Muell.-Arg.*) *Standley, l. c.* vii. 427 (1931): Psychotria iodotricha.
jacobinioides *Standley, l. c.* 220.—Ecuador.
Jamesonii *Standley, l. c.* 221.—Ecuador.
oinochrophylla *Standley, l. c.* viii. 372 (1931).—Peruv.
phyllocalymmoides (*Muell.-Arg.*) *Standley, l. c.* 375: Psychotria phyllocalymmoides.
potaroënsis *Sandwith in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3300 (1935).—Guiana Brit.
Remyana (*Baill.*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 221 (1931): Uragoga Remyana.
silvatica *Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 299.—Guiana Bat.
stipulosa (*Muell.-Arg.*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 430 (1931): Psychotria stipulosa.
trichocephala (*Poepp. & Endl.*) *Standley, l. c.* viii. 375 (1931): Psychotria trichocephala.
umbellata (*Ruiz & Pav.*) *Standley, l. c.* vii. 301 (1931): Coffea umbellata.

CEPHALANTHERA L. C. Rich. (Orchidac.).
caucasica *Kraenzl. in Fedde, Repert. Beih.* lxv. 67 (1931).—Caucas.
kokanica *Regel ex Nevski in Komarov, Fl. URSS*, iv. 622 (1935), in syn.: Epipactis Royleana.
subaphylla *Miyabe & Kudo in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 373 (1932).—Japon. (Yezo).

CEPHALANTHUS L. (Rubiac.).
dioicus *Lour. ex Gomes in Mem. Acad. Sc. Lisb. Cl. Sc. Pol. Mor. Bel.-Let.* n. s. iv. (1), 26 (1868); *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 14, 400 (1935), in syn.: C. procumbens.
monas *Lour. ex Gomes, l. c.* (1), 28; *Merrill, l. c.* 15, 364, in syn.: C. occidentalis.

CEPHALARIA Schrad. (Dipsacac.).
hajastana *Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 49 (1934).—Caucas.
maroccana *Coss. in Bull. Soc. Dauph.* 1883, 413, No. 3995, nomen.—Marocc.
melanolepis *Fisch. & Mey. ex Bordz. in Bull. Jard. Bot. Kieff*, xii–xiii. 137 (1931), in adnot.—Hab.?
Sillingeri *Domin in Acta Bot. Bohem.* ix. 255 (1930).—Czechoslovak.

CEPHALOCEREUS Pfeiff. (Cactac.).
Dautwitzii (*Seitz*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 373 (1894): Pilocereus Dautwitzii.
Guentheri *Kupper in Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges.* 1931, iii. 159.—Boliv.
Lehmannianus *Werderm. in Fedde, Repert. Sonder-Beih.* C. t. 46 (1932); *Werderm. Bras. Säulenkakt.* 118 (1933).—Bras. (Bahia).
mezcalaënsis *Bravo in An. Inst. Biol., Mexico*, 1932, iii. 378.—Mexico.
penicillatus (*Gürke*) *Werderm. Bras. Säulenkakt.* 116 (1933): Cereus penicillatus.
polyanthus *Werderm. in Fedde, Repert. Sonder-Beih.* C. t. 43 (1932); *Werderm. Bras. Säulenkakt.* 114 (1933).—Bras. (Bahia).
rhodanthus (*Gürke*) *Werderm. in Fedde, Repert. Sonder-Beih.* C. t. 44 (1932): Cereus rhodanthus.

CEPHALOHIBISCUS Ulbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xii. 495 (1935). *MALVACEAE.*
Peekelii *Ulbr. l. c.*—N. Guin.; Ins. Bismarck; Ins. Solomon.

CEPHALONOPLOS Fourr. (Compos.).
segetum (*Bunge*) *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 8: Cirsium segetum.
setosus (*Ledeb.*) *Kitamura, l. c.*: Cirsium arvense var. setosum.

CEPHALOPHYLLUM Haw. (Ficoidac.).
ceresianum *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 359 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
compactum *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 398 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Herrei *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 314 (1932).—Little Namaq.
luxurians *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 169 (1931), in obs., nomen.—Afr. austr.-occ.
niveum *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 295 (1931). —Afr. austr. (Cape Prov.).
pulchrum *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 354 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
regale *L. Bolus, l. c.* 337.—Namaqualand.
rhodanthum *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 296 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
serrulatum *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 418 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
truncatum *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 398 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Watermeyeri *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 338 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
worcesterense *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 419 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).

CEPHALORHIZUM Popov & Korovin in Trans. Sc. Soc. Turk. i. 39 (1923). *PLUMBAGINACEAE.*
oöpodum *Popov & Korovin, l. c.*—Bokhara.
setiferum (*Bunge*) *Popov & Korovin, l. c.*: Acantholimon setifer.

CEPHALOSTACHYUM Munro (Gramin.).
burmanicum *R. N. Parker & C. E. Parkinson in Fedde, Repert.* xxxi. 127 (1932).—Burma.

CEPHALOSTEMON Rob. Schomb. (Rapateac.).
angustatus *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 9, p. 11 (1935).—Bras. (Matto Grosso).

CEPHALOSTIGMA A. DC. (Campanulac.).
fluminale *J. M. Black in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1934, lviii. 184.—S. Austral.
perotifolium (*Wight & Arn.*) *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 190, in clavi, 191 (1931): Wahlenbergia perotifolia.

CEPHALOTOMANDRA Karst. & Triana in Triana, Nuev. Jen. i Esp. Fl. Neo-Granad. 23 (1854); Karst. in Linnaea, xxviii. 429 (1857); Sprague in Kew Bull. 1934, 396. *NYCTAGINACEAE.*
fragrans *Karst. & Triana, l. c.* 24; *Karst. l. c.* 430; *Sprague, l. c.*—Colomb.

CERARIA Pearson & E. L. Stephens (Portulacac.).
Schaeferi *Engl. & Schlechter in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 157 (1915), in obs.—Great Namaq.

CERASTIUM L. (Caryophyllac.).
amurense (*Regel*) *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 32: C. pilosum var. amurense.
bambuseti (*T. C. E. Fries & Weimarck*) *Weimarck in Svensk Bot. Tidskr.* 1933, xxvii. 413: C. afromontanum var. bambuseti.
Berterianum *Colla, Herb. Pedem.* i. 368 (1833).—Chile.
brevicarpicum *Rusby in Phytologia*, i. 54 (1934).—Boliv.
brevicaule *Desv. Journ. de Bot.* iii. [No. 5] 228 [1816].—Armen.
calcicola *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 46 (1934).—Formosa.
comatum *Desv. Journ. de Bot.* iii. [No. 5] 228 [1816].—Oriens.
dentatum *Möschl in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1933, lxxxii. 230.—Eur. austr.
formosanum (*Ohwi*) *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 47 (1934): C. morrisonense var. formosanum.
hemschinicum *Schischk. in Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 381 (1930).—Caucas.

CERASTIUM:—
hyperboreum *Tolmatch. in Skrift. Svalb. og Ishavet*, No. 34, 6 (1930).—Eur. arct.
kebdanense *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 144 [1933], nomen.—Marocc.
lanigerum *Desv. Journ. de Bot.* iii. [No. 5] 228 [1816].—Alpes.
leontopodioides *Stoyanoff & Stefanoff ex Stefanoff & Jordanoff in Engl. Jahrb.* lxiv. 436 (1931), nomen.—Bulgar.
Leontopodium *Stoyanoff & Stefanoff, Fl. Bulg.* ed. 2, 378 (1933), in clavi.—Bulgar.
meridense *Linden & Planch.*; *Sprague in Kew Bull.* 1926, 40.—Venez.
parvipetalum *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1932, xxii. 227.—Formosa.
pycnophyllum *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. Anhang, 30 (1932).—Tanganyika Terr.
rishirense *Miyabe & Tatewaki in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.* xiv. 1 (1935).—Japon. (Yezo).
rubescens *Mattf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 333 (1932): C. ciliatum *Turcz.*
spurium *Birol. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 367 (1833), in obs.—Ital.?
stellatum *Herb. ex Colla, l. c.*—Ital.?
subechinulatum *Maire & Wilczek in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 280.—Marocc.
subsimile *Schischk. in Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 383 (1930).—Caucas.
trichogynum *Möschl in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1933, lxxxii. 226.—Penins. Balcan.

CERASUS Mill. (Rosac.).
crenata (*Koehne*) *Koval. & Kostina in Bull. Applied Bot., Leningrad*, Ser. VIII. No. 4, 74 (1935): Prunus crenata.
floribunda (*Koehne*) *Koval. & Kostina, l. c.*: Prunus floribunda.
Makinoana (*Koehne*) *Koval. & Kostina, l. c.*: Prunus Makinoana.
Matsumurana (*Koehne*) *Koval. & Kostina, l. c.*: Prunus Matsumurana.
microlepis (*Koehne*) *Koval. & Kostina, l. c.*: Prunus microlepis.
tenuiflora (*Koehne*) *Koval. & Kostina, l. c.*: Prunus tenuiflora.

CERATOCARPUS L. (Chenopodiac.).
utriculosus *Bluk. ex Krylov, Fl. Sibir. Occ.* iv. 905 (1930).—Sibir.

CERATOMINTHE Briq. (Labiat.).
odora (*Griseb.*) *Hauman in Bull. Soc. Bot. Belg.* lxiv. 56 (1931), in obs.: Xenopoma odorum.

CERATOPHYLLUM L. (Ceratophyllac.).
oryzetorum *Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 200 (1932).—Sibir. (Marit. Prov.).

CERATOPHYTUM Pittier (Bignoniac.).
tetragonolobum (*Jacq.*) *Sprague & Sandwith in Kew Bull.* 1934, 223, in obs.: Bignonia tetragonoloba.
tobagense (*Urb.*) *Sprague & Sandwith, l. c.* 1933, 322: Anemopaegma tobagense.

CERATOSTEMA Juss. (Ericac.; Vacciniac., Gen. Pl.).
alatum (*Hoerold*) *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 281 (1935): Englerodoxa alata.
Alberti-Smithii (*Sleum.*) *Sleum. l. c.* 282: Englerodoxa Alberti-Smithii.
colombianum *A. C. Smith in Phytologia*, i. 130 (1935).—Colomb.
dichogamum *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 26, 10 (1933).—Colomb.
fabulosum *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 120 (1934).—Boliv.
guascense *Cuatrec. ex Sleum. l. c.* xii. 289 (1935), in syn.: Pellegrinia guascensis.
Lobbii *A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 337 (1932).—Peruv.?
longepedicellatum *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 56 (1934).—Ecuador.
Pearcei (*Britton*) *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 111: Rusbya Pearcei.
Rimbachii *A. C. Smith in Phytologia*, i. 130 (1935). —Ecuador.

CERATOSTYLIS Blume (Orchidac.).
alata *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 93 (1935).—Borneo.
breviclavata *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 29 (1935).—N. Guin.
compressicaulis *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 173 (1934).—N. Guin.
curvimentum *J. J. Smith, l. c.* 172.—N. Guin.
Evrardii *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 33.—Indo-China (Anam).
macra *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 30 (1935). —N. Guin.
Mayrii *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 171 (1934). —N. Guin.
pygmaea *Evrard ex Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 33.—Indo-China (Anam).
selebensis *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxv. 475 (1933).—Celebes.
todjambuensis *J. J. Smith, l. c.* 474.—Celebes.

CERATOZAMIA Brongn. (Cycadac.).
ensiformis *Hort. ex Schuster in Engl. Pflanzenreich, Cycadac.* 130 (1932), in syn.: C. mexicana.
eriolepis *Hort. ex Schuster, l. c.* 132, in syn.: C. Kuesteriana.
fusca *Hort. ex Schuster, l. c.*, in syn.: C. mexicana.
fuscata *Hort. ex Schuster, l. c.*, in syn.: C. mexicana.
× hybrida *Schuster, l. c.* 48, in obs.—Hort.
longipinnata *Hort. ex Schuster, l. c.* 130, in syn.: C. mexicana.
Miquelii *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1246 (1895), in syn.: Zamia Loddigesii.
Ottonis *Hort. ex Schuster in Engl. Pflanzenreich, Cycadac.* 130 (1932), in syn.: C. mexicana.

CERBERA L. (Apocynac.).
fruticosa *Roxb. Hort. Beng.* 19 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 526 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 691 (1832).—Burma.
micrantha *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 343.—Ins. Palau.

CERCIDIPHYLLUM Sieb. & Zucc. (Trochodendrac.).
ovale *Maxim. in Bull. Acad. Imp. Sc. St. Pétersb.* xvii. 144 (1872).—Japon.

CERDANA Ruiz & Pav. (Boraginac.).
Gerascanthus (*L.*) *Moldenke in Phytologia*, i. 16 (1933): Cordia Gerascanthus.

CEREA Thou. Hist. Vég. Isles Austr. Afr. ed. 2, t. 28 (1805); Hiern in Journ. Bot. 1900, xxxviii. 493: **Elaeocarpus** L. (Elaeocarpac.; Tiliac., Gen. Pl.).
radicans *Thou. l. c.*; *Hiern, l. c.*: Elaeocarpus grandiflorus.

CEREUS Mill. (Cactac.).
albicaulis (*Britton & Rose*) *Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste Braz.* iii. 111 (1923) [*Insp. Fed. Obras Secc.* Publ. 57]; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 151: Acanthocereus albicaulis.
alensis (*Weber*) *Vaupel in Monatsschr. Kakteenk.* 1913, xxiii. 23, 24, 83: Pilocereus alensis.
atropurpureus *Hocay. Cactencult.* 91; cf. *Riccob. in Boll. Ort. Bot. Palermo*, 1909, viii. 245, in syn.: Eriocereus tortuosus.
atroviridis *Backeb. Neue Kakteen*, 69 (1931); *Backeb. in Fedde, Repert.* xxx. 59 (1932).—Colomb.
bahamensis (*Britton*) *Vaupel in Monatsschr. Kakteenk.* 1913, xxiii. 23, 24: Cephalocereus bahamensis.
bahiensis (*Britton & Rose*) *Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste Braz.* iii. 111 (1923) [*Insp. Fed. Obras Secc.* Publ. 57]; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 151: Leocereus bahiensis.
Bakeri (*Britton & Rose*) *Vaupel in Monatsschr. Kakteenk.* 1913, xxiii. 23, 24: Cephalocereus Bakeri.
Bergerianus *Vaupel, l. c.* 24, 82: Pachycereus grandis.
bolivianus *Hort. ex Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 174 (1935), in syn.: Erdisia melanotricha.
brasiliensis (*Britton & Rose*) *Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste, Rio de Janeiro*, iii. 52 (1924) [*Insp. Fed Obras Secc.* Publ. 57]; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 150: Cephalocereus brasiliensis.

CEREUS:—
Brittonianus *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen*, 68 (1931): Monvillea maritima.
Brookii (*Britton*) *Vaupel in Monatsschr. Kakteenk.* 1913, xxiii. 24, 57: Harrisia Brookii.
Cartwrightianus (*Britton & Rose*) *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen*, 77 (1931): Lemaireocereus Cartwrightianus.
Celsianus (*Cels*) *Orcutt in W. Am. Scient.* xiii. 63 (1902): Pilocereus Celsianus.
cephalomacrostibas *Werderm. & Backeb. in Backeb. Neue Kakteen*, 101 (1931); *et in Fedde, Repert.* xxx. 60 (1932).—Peruv.
Childsi *Blanc, Hints Cacti*, 39 (1891).—Am. austr.
chosicensis *Werderm. & Backeb. in Backeb. Neue Kakteen*, 74 (1931); *et in Fedde, Repert.* xxx. 60 (1932).—Peruv.
chotaënsis (*Weber*) *Vaupel in Monatsschr. Kakteenk.* 1913, xxiii. 25, 38: Cleistocactus chotaënsis.
claroviridis *Backeb. Neue Kakteen*, 69 (1931); *Backeb. in Fedde, Repert.* xxx. 60 (1932).—Venez.
colombianus (*Rose*) *Vaupel in Monatsschr. Kakteenk.* 1913, xxiii. 23, 25: Cephalocereus colombianus.
conglomeratus (*Först.*) *A. Berger in Rep. Missouri Bot. Gard.* xvi. 81 (1905): Echinocereus conglomeratus.
cuzcoënsis (*Britton & Rose*) *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen*, 73, 101 (1931): Trichocereus cuzcoënsis.
cyaneus *A. Berger, Hort. Mortol.* 69 (1912), nomen.—Am. austr.
Damazioi *K. Schum. Gesamtb. Kakt. Nachtr.*, 38 (1903), in obs.; *Weing. in Monatsschr. Kakteenk.* xxi. 91 (1911), descr.—Bras.
diffusus (*Britton & Rose*) *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen*, 69 (1931): Monvillea diffusa.
Ekmanii *Werderm. in Fedde, Repert.* xxix. 235 (1931).—Cuba.
eriotrichus *Werderm. & Backeb. in Backeb. Neue Kakteen*, 80 (1931); *et in Fedde, Repert.* xxx. 61 (1932).—Peruv.
Faustianus *Backeb. in Cactus Journ.* i. 53 (1933), in obs.—Peruv.
fossulatus *Backeb. l. c.* ii. 4 (1933), in obs., nomen.—Peruv.
Fouachianus (*Weber ex Rol.-Goss.*) *Vaupel in Monatsschr. Kakteenk.* 1913, xxiii. 25, 83: Pilocereus Fouachianus.
fulviceps (*Weber*) *A. Berger in Rep. Missouri Bot. Gard.* xvi. 64 (1905): Pilocereus fulviceps.
Gounellei (*Weber*) *Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste Braz.* iii. 111 (1923) [*Insp. Fed. Obras Secc.* Publ. 57]; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 151: Pilocereus Gounellei.
grandicostatus *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 460 (1935).—Hort.
Grossei *Hort. ex Weing. in Monatsschr. Kakteenk.* 1908, xviii. 8, in obs.—Hort.
Guentheri (*Kupper*) *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen*, 72 (1931): Cephalocereus Guentheri.
Hendriksenianus *Backeb. in Cact. & Succ. Journ. Amer.* v. 438 (1933), in obs.; *et in Cactus Journ.* ii. 4 (1933), in obs.—Peruv.
Hertrichianus *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 459 (1935).—Hort.
Herzogianus *Backeb. in Cactus Journ.* ii. 33 (1933), in obs.—Boliv.
Humboldtianus *Backeb. in Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges.* 1931, iii. 159.—Peruv.
Huntingtonianus *Weing. in Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges.* 1932, iv. 165.—Hab.?
Jajoianus *Backeb. in Cactus Journ.* ii. 4 (1933), in obs.—Peruv.
jalapaënsis *Vaupel in Monatsschr. Kakteenk.* 1913, xxiii. 26, 85: Selenicereus Pringlei.
jugatiflorus *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 456 (1935).—Hort.
keyensis (*Britton & Rose*) *Vaupel in Monatsschr. Kakteenk.* 1913, xxiii. 23, 26: Cephalocereus keyensis.
Lindenzweigianus *Gürke in Monatsschr. Kakteenk.* 1906, xvi. 146, 174, in obs.—Parag.
macrocephalus (*Weber*) *A. Berger in Rep. Missouri Bot. Gard.* xvi. 62 (1905): Cephalocereus macrocephalus.

CEREUS:—
maculatus *Weing. in Kakteenk.* 1933, 14.—Mexico.
matucanensis *Backeb. in Desert*, v. 3 (1933); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 140, nomen.—Peruv.
melanostele (*Vaupel*) *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen*, 72 (1931): Cephalocereus melanostele.
melocactus (*Vell.*) *A. Berger in Rep. Missouri Bot. Gard.* xvi. 62 (1905): Cactus melocactus.
Merkeri (*Hildm.*) *A. Berger, l. c.* 81: Echinocereus Merkeri.
Meyenii (*Britton & Rose*) *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen*, 79 (1931): Erdisia Meyenii.
microspermus *Werderm. & Backeb. in Backeb. l. c.* 80; *et in Fedde, Repert.* xxx. 63 (1932).—Peruv.
Mieckleyanus *Weing. in Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges.* 1931, iii. 189.—Mexico.
Mieckleyi *Hort. ex Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 326 (1935), in syn.: Lophocereus Mieckleyanus.
milesimus *Rost in Desert*, 1932, 43; *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 454 (1935).—Hort.
Millspaughii (*Britton*) *Vaupel in Monatsschr. Kakteenk.* 1913, xxiii. 23, 27: Cephalocereus Millspaughii.
minensis *Werderm. Bras. Säulenkakt.* 93 (1933).—Bras. (Minas Geraes).
minutiflorus (*Britton & Rose*) *Vaupel in Monatsschr. Kakteenk.* 1913, xxiii. 86, 87: Hylocereus minutiflorus.
Nashii (*Britton*) *Vaupel, l. c.* 27, 57: Harrisia Nashii.
nudiflorus *Engelm. apud Sauvalle in An. Acad. Ci. Habana*, vi. 98 (1869).—Cuba.
pacalaënsis *Backeb. in Cactus Journ.* ii. 4 (1933), in obs.—Peruv.
Pachanoi (*Britton & Rose*) *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen*, 73 (1931): Trichocereus Pachanoi.
papillosus (*A. Linke*) *A. Berger in Rep. Missouri Bot. Gard.* xvi. 80 (1905): Echinocereus papillosus.
paradisiacus *Vaupel in Monatsschr. Kakteenk.* 1913, xxiii. 37, 87: C. Urbanianus *Gürke & Weing.*
paulensis (*Speg.*) *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen*, 80 (1931): Leocereus paulensis.
platinospinus *Werderm. & Backeb. in Backeb. l. c.* 76; *et in Fedde, Repert.* xxx. 61 (1932).—Peruv.
Poselgerianus (*A. Linke*) *A. Berger in Rep. Missouri Bot. Gard.* xvi. 80 (1905): Echinocereus Poselgerianus.
prostratus (*Britton & Rose*) *Werderm. in Fedde, Repert.* xxix. 236 (1931), in obs.: Leptocereus prostratus.
pseudomelanostele *Werderm. & Backeb. in Backeb. Neue Kakteen*, 74 (1931); *et in Fedde, Repert.* xxx. 61 (1932).—Peruv.
pseudo-spinulosus (*Weing.*) *Weing. in Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges.* 1931, iii. 255, in obs.: Selenicereus pseudo-spinulosus.
purpureus (*Gürke*) *Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste Braz.* iii. 111 (1923) [*Insp. Fed. Obras Secc.* Publ. 57]; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 151: Cephalocereus purpureus.
Roezlii *Backeb. in Cactus Journ.* ii. 33 (1933), in obs.—Boliv.
Roseanus *Vaupel in Monatsschr. Kakteenk.* 1913, xxiii. 27, 85: Selenicereus Maxonii.
Rosei *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen*, 73, 101 (1931): Trichocereus peruvianus.
ruficeps (*Weber*) *Vaupel in Monatsschr. Kakteenk.* 1913, xxiii. 27, 83: Pilocereus ruficeps.
Sartorianus *Kupper ex A. Berger, Kakteen*, 157 (1929).—Mexico.
Schmollii *Weing. in Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges.* 1931, iii. 251; *et l. c.* 1932, iv. 189.—Mexico.
scoparius (*Poselg.*) *A. Berger in Rep. Missouri Bot. Gard.* xvi. 63 (1905): Pilocereus scoparius.
sericatus *Backeb. in Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges.* 1931, iii. 157.—Peruv.
setosus (*Gürke*) *Vaupel in Monatsschr. Kakteenk.* 1913, xxiii. 27, 83: Pilocereus setosus.
Sextonianus *Backeb. in Cactus Journ.* ii. 4 (1933), in obs.—Peruv.
Smithianus (*Britton & Rose*) *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen*, 69 (1931): Cephalocereus Smithianus.

CEREUS:—
Straussii (*Heese*) *Vaupel in Monatsschr. Kakteenk.* 1913, xxiii. 37, 83: Pilocereus Straussii.
tacuaremboënsis (*Arech.*) *Herter, Fl. Urug. Pl. Vasc.* (*Estud. Bot. Reg. Urug.* iv.) 90 (1931): Echinopsis tacuaremboënsis.
tapacalaënsis *Backeb. in Kakteenfreund*, ii. 49 (1933); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 143.—Peruv.
Taylorii (*Britton*) *Vaupel in Monatsschr. Kakteenk.* 1913, xxiii. 37, 57: Harrisia Taylorii.
tehuacanus (*Weing.*) *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen*, 71 (1931): Pilocereus tehuacanus.
tominensis *Weing. in Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges.* 1931, iii. 117.—Boliv.
torulosus *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 457 (1935).—Hort.
Treleasei (*Rose*) *Vaupel in Monatsschr. Kakteenk.* 1913, xxiii. 37, 58: Lemaireocereus Treleasei.
Tweedyanus (*Britton & Rose*) *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen*, 71 (1931): Cephalocereus Tweedyanus.
Ulei (*K. Schum.*) *A. Berger in Rep. Missouri Bot. Gard.* xvi. 70 (1905): Pilocereus Ulei.
Ulei (*Gürke*) *Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste Braz.* iii. 111 (1923) [*Insp. Fed. Obras Secc.* Publ. 57]; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 151, non praec.: Cephalocereus Ulei.
Urbanianus (*K. Schum.*) *A. Berger in Rep. Missouri Bot. Gard.* xvi. 63 (1905): Pilocereus Urbanianus.
venezuelensis (*Britton & Rose*) *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen*, 23, in obs., 67 (1931): Hylocereus venezuelensis.
ventimigliae (*Riccob.*) *Vaupel in Monatsschr. Kakteenk.* 1913, xxiii. 13, 37: Borzicactus ventimigliae.
versicolor *Werderm. & Backeb. in Backeb. Neue Kakteen*, 81 (1931); *et in Fedde, Repert.* xxx. 62 (1932).—Peruv.
victoriensis *Vaupel in Monatsschr. Kakteenk.* 1913, xxiii. 24, 37: Cephalocereus Palmeri.
Zehntneri (*Britton & Rose*) *Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste Braz.* iii. 111 (1923) [*Insp. Fed. Obras Secc.* Publ. 57]; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 151: Cephalocereus Zehntneri.

CERIOPS Arn. (Rhizophorac.).
somalensis *Chiov. Fl. Somala*, II. 205 (1932).—Somal. Ital.
timoriensis (*DC.*) *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 86 (1931): Rhizophora timoriensis.

CEROPEGIA L. (Asclepiadac.).
angustilimba *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xi. 53 (1932).—China (Hainan).
atacorensis *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 273 (1917).—Sudan.
cimiciodora *Oberm. in Fl. Pl. S. Afr.* 1933, xiii. t. 488.—Transvaal.
Deightonii *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 61, in clavi, 62 (1931).—Sierra Leone.
De-Vecchii *Chiov. Fl. Somala*, II. 301 (1932).—Somal. Ital.
filicalyx *Bullock in Kew Bull.* 1933, 145.—Tanganyika Terr.
gourmaca *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 274 (1917).—Sudan.
Hepburnii *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 61, in clavi, 62 (1931).—Nigeria.
hispida *Blatter & McCann in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxv. 409 (1931).—Ind. or. (Bombay).
panchganiensis *Blatter & McCann, l. c.* xxxvi. 534 (1933).—Ind. or. (Bombay).
polyantha *Blatter & McCann, l. c.* xxxiv. 936 (1931).—Ind. or. (Bombay).
Schliebenii *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 404 (1932).—Tanganyika Terr.
tourana *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 274 (1917).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).

CESTRUM L. (Solanac.).
acuminatum *Francey in Candollea*, vi. 348 (1935).—Costa Rica.
albotomentosum *Dammer ex Francey, l. c.* 152.—Boliv.
ambatense *Francey, l. c.* 169.—Ecuador.

CESTRUM:—
amplum *Pittier in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1932, xxii. 35.—Venez.
azuense *Urb. & Ekman*; *O. E. Schulz in Fedde, Repert.* xxxii. 89 (1933), descr. ampl.—Santo Domingo.
bigibbosum *Pittier in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1932, xxii. 35.—Venez.
bolivianum *Francey in Candollea*, vi. 230 (1935).—Boliv.
Buchtienii *Francey, l. c.* 300.—Boliv.
caloneurum *Pittier in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1932, xxii. 31.—Venez.
calycosum *Pittier, l. c.*—Venez.
campanulatum *Francey in Candollea*, vi. 294 (1935).—Bras. (Rio de Janeiro).
chimborazinum *Francey, l. c.* 178.—Ecuador.
chiriquianum *Francey, l. c.* 96.—Panamá.
cobanense *Francey, l. c.* 372.—Guatem.
colombianum *Francey, l. c.* 182.—Colomb.
confertifolium *Francey, l. c.* 354.—Mexico.
costaricense *Francey, l. c.* 369.—Costa Rica.
crassinervium *Francey, l. c.* 350.—Colomb.
cultum *Francey, l. c.* 100.—Cult.
cuneatum *Francey, l. c.* 326.—Venez.; Colomb.; Ecuador.
decurrens *Francey, l. c.* 97.—Mexico.
densiflorum *Francey, l. c.* 195.—Venez.
Diasae *Pittier in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1932, xxii. 29.—Venez.
Dielsii *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 373 (1935).—Ecuador.
diversifolium *Francey in Candollea*, vi. 320 (1935).—Colomb.; Ecuador.
Donnell-Smithii *Francey, l. c.* 247.—Costa Rica.
dubium *Pittier in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1932, xxii. 30.—Venez.
Dunalii *Francey in Candollea*, vi. 353 (1935).—Peruv.
ecuadorense *Francey, l. c.* 397.—Ecuador.
ellipticum *Francey, l. c.* 216.—Peruv.; Boliv.
Endresii *Francey, l. c.* 281.—Costa Rica.
falcatum *Francey, l. c.* 228.—Peruv.
flexuosum *Francey, l. c.* 179.—Peruv.
foliosum *Francey, l. c.* 260.—Peruv.
Galeottianum *Francey, l. c.* 117.—Mexico.
glabrum *Francey, l. c.* 363.—Colomb.
glanduliferum *Kerber ex Francey, l. c.* 386.—Mexico.
glaucophyllum *Francey, l. c.* 149.—Peruv.
gracile *Francey, l. c.* 366.—Costa Rica.
graciliflorum *Francey, l. c.* 255.—Bras. (Rio de Janeiro).
grande *Pittier in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1932, xxii. 32.—Venez.
grandifolium *Francey in Candollea*, vi. 263 (1935).—Colomb.
guatemalense *Francey, l. c.* 98.—Guatem.
Hassleri *Francey, l. c.* 307.—Parag.
Humboldtii *Francey, l. c.* 393.—Peruv.
Kellermanii *Francey, l. c.* 89.—Guatem.
laetum *Francey, l. c.* 378.—Venez.
loretense *Francey, l. c.* 225.—Peruv.
lucidum *Francey, l. c.* 333.—Colomb.
luteo-virescens *Francey, l. c.* 349.—Guatem.
Macbridei *Francey, l. c.* 262.—Peruv.
magnifolium *Francey, l. c.* 223.—Bras. (Rio de Janeiro).
melanochloranthum *Dun.*; *Pittier in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1932, xxii. 28, descr. emend.—Venez.
meridanum *Pittier, l. c.* 36.—Venez.
mexicanum *Francey in Candollea*, vi. 174 (1935).—Mexico.
micans *Francey, l. c.* 145.—Ecuador.
microcalyx *Francey, l. c.* 301.—Colomb.
Miersianum *Wedd.*; *Pittier in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1932, xxii. 37, descr. emend.—Venez.
miradorense *Francey in Candollea*, vi. 95 (1935).—Mexico.
Moritzi *Dun.*; *Pittier in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1932, xxii. 33, descr. emend.—Venez.
Moritzianum *Klotzsch & Karst. ex Francey in Candollea*, vi. 390 (1935), in syn.: C. caloneurum.
nutans *Hort. ex Francey, l. c.* 124, in syn.: C. elegans.
oaxense *Zucc. ex Francey, l. c.* 364, in syn.: C. Anagyris.
obscurum *Francey, l. c.* 302.—Peruv.

CESTRUM:—
ochraceum *Francey in Candollea*, vi. 343 (1935).—Colomb.
olivaceum *Francey, l. c.* 129.—Colomb.
ovale (*Sendtn.*) *Francey, l. c.* 197: C. subpulverulentum var. ovale.
ovalifolium *Francey, l. c.* 362.—Peruv.
ovato-lanceolatum *Francey, l. c.* 279.—Peruv.
pacayense *Francey, l. c.* 90.—Guatem.
paraguayense *Hassl. ex Francey, l. c.* 345, in syn.: C. Sendtnerianum.
paucinervium *Francey, l. c.* 101.—Guatem.
Pennellii *Francey, l. c.* 396.—Colomb.
petiolatum *Francey, l. c.* 351.—Colomb.
Pittieri *Francey, l. c.* 385.—Costa Rica.
pulverulentum *Francey, l. c.* 181.—Colomb.
pumilum *Francey, l. c.* 373.—Colomb.
Raimondianum *Francey, l. c.* 382.—Peruv.
ramulosum *Francey, l. c.* 163.—Bras. (Pernambuco).
reticulatum *Francey, l. c.* 374.—Colomb.
rubrum *Hort. ex Francey, l. c.* 124, in syn.: C. elegans.
Schiedei *Francey, l. c.* 112.—Mexico.
Schulzianum *Francey, l. c.* 272.—Bras. (Amaz.).
sesseoides *Francey, l. c.* 395.—Colomb.
silvaticum *Francey, l. c.* 316.—Peruv.
silvicola *Britton ex Francey, l. c.* 309, in syn.: C. Baenitzii.
spigelioides *Zucc. ex Francey, l. c.* 113, in syn.: C. fasciculatum.
Sprucei *Francey, l. c.* 202.—Bras. (Pará).
Standleyi *Francey, l. c.* 249.—Costa Rica.
tenuiflorum *Francey, l. c.* 251.—Bras. (Minas Geraes; Rio de Janeiro).
tenuifolium *Francey, l. c.* 324: C. pauciflorum *Nees & Mart.*
tenuissimum *Francey, l. c.* 248.—Boliv.
terminale (*Dun.*) *Pittier in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1932, xxii. 33, cum descr.: C. scandens var. terminale.
tipocochense *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 373 (1935).—Ecuador.
tovarense *Francey in Candollea*, vi. 388 (1935).—Venez.
Uhdei *Dammer ex Francey, l. c.* 105.—Mexico.
umbrosum *Francey, l. c.* 375.—Venez.
Urbanii *Francey, l. c.* 371.—Costa Rica.
Valerioi *Francey, l. c.* 93.—Costa Rica.
venezuelense *Francey, l. c.* 377.—Venez.
verbascifolium *Zucc. ex Francey, l. c.* 191.—Cult.
villosum *Herb. ex Francey, l. c.* 147, in syn.: C. brevifolium.
yucatanense *Francey, l. c.* 282.—Mexico.

CHAENOMELES Lindl. (Rosac.).
vedrariensis *Hort. ex Bull. Soc. Dendr. France*, 1934, 46, in syn.: C. japonica.

CHAENORRHINUM Reichb. (Scrophulariac.).
Berardi *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 86 [1933], nomen.—Marocc.
spicatum *Korovin ex Popov in Trav. Turkest. Univ., Tashkent*, No. 4 (*Vég. Monts Sary-Taou, etc.*), 58 (1922), nomen; *Korovin in Not. Syst. Herb. Hort. Petrop.* v. 180 (1924), descr.—Transcasp.; Turkestan.; Afghan.

CHAENOSTOMA Benth. (Scrophulariac.).
fasciculatum *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 772 (1895), in syn.: Sutera linifolia.

CHAEREFOLIUM Haller (Umbellif.).
nitidum (*Wahlenb.*) *Domin in Preslia*, xiii–xv. 157 (1935): Chaerophyllum nitidum.

CHAEROPHYLLUM L. (Umbellif.).
atlanticum *Coss. in Bull. Soc. Dauph.* 1883, p. 413, No. 3994, nomen; *Battand. Contrib. Fl. Atlant.* 37 (1919), descr.—Marocc.
confusum *Woronow in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 124 (1932); *et in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 218 (1933).—Caucas.
gilanicum (*S. G. Gmel.*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 126 (1932): Scandix gilanica.
stenophyllum (*Rouy & E. G. Camus*) *Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* v. 6 [1921]: Anthriscus stenophyllus.

CHAETANTHERA Ruiz & Pav. (Compos.).
albiflora *R. Phil. in Verh. Deutsch. Wiss. Ver. Santiago (Chile)*, ii. 107 (1890), nomen.—Chile.
australis *Cabrera in Not. Mus. La Plata*, Bot., i. 64 (1935).—Argent.
lycopodioides (*Remy*) *Cabrera ex Pérez Moreau in Rev. Centr. Estud. Cienc. Nat.* i. 58 (1935): Aldunatea lycopodioides.

CHAETOCHLOA Scribn. (Gramin.).
Forbesiana (*Nees ex Steud.*) *Keng in Nat. Centr. Univ. Sc. Rep., Nanking*, Ser. B, Biol. Sc., i. No. 2, 67 (1930): Panicum Forbesianum.
Matsumurae (*Hackel*) *Keng, l. c.* 65: Panicum Matsumurae.
Scheelei (*Steud.*) *Hitchcock in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxii. 207 (1920): Panicum Scheelii.

CHAETOCRATER Ruiz & Pav. (Flacourtiac.; Samydac., Gen. Pl.).
longifolius *Ruiz ex Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 955 (1934), in obs., pro syn.: Casearia fasciculata.
pubescens *Ruiz ex Sleum. l. c.*, in obs., pro syn.: Casearia fasciculata.
reflexus *Ruiz & Pav. ex Sleum. l. c.* 958, in syn.: Casearia Pavoniana.

CHAETOPOGON Janchen, Europ. Gatt. Farn-u. Blütenpfl. ed. 2, 33 (1913); Hayek in Fedde, Repert. Beih. xxx. III. 335 (1932): **Chaeturus** Link (Gramin.).
creticus (*Coust. & Gandoger*) *Hayek, l. c.*: Chaeturus creticus.
fasciculatus (*Link*) *Hayek, l. c.*: Chaeturus fasciculatus.

CHAETOSPIRA Blake in Journ. Wash. Acad. Sc. 1935, xxv. 311: **Spirochaeta** Turcz. (Compos.).
Funckii (*Turcz.*) *Blake, l. c.*: Spirochaeta Funckii.

CHALCAS L. (Rutac.).
omphalocarpa *Tanaka in Stud. Citrol.* v. 13 (1931), japonice.—Hab.?

CHALEPOPHYLLUM Hook. f. (Rubiac.).
latifolium *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 379 (1931).—Venez.
Tatei *Standley, l. c.* 380.—Venez.

CHAMAEANGIS Schlechter (Orchidac.).
Schliebenii *Mansf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 809 (1933).—Tanganyika Terr.

CHAMAEANTHUS Schlechter (Orchidac.).
carinatus *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 72 (1935).—N. Guin.
sarcanthoides (*Ridley*) *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 40 (1932): Bulbophyllum sarcanthoides.

CHAMAEBUXUS Spach (Polygalac.).
Balansae (*Coss.*) *Stapf in Bot. Mag.* sub t. 9009 (1923): Polygala Balansae.
Munbyana (*Boiss. & Reut.*) *Stapf, l. c.*: Polygala Munbyana.
Webbiana (*Coss.*) *Stapf, l. c.*: Polygala Webbiana.

CHAMAECEREUS Britton & Rose (Cactac.).
giganteus *Frič in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1933, xlviii. 309, in obs., nomen provis.—Argent.

CHAMAECRISTA Moench (Legumin.).
Leschenaultiana (*DC.*) *Degener, Fl. Hawaiiensis*, Fam. 169 b (1934): Cassia Leschenaultiana.

CHAMAECYPARIS Spach (Pinac.; Conif., Gen. Pl.).
Allumi *Hort. ex Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1934, xlix. 175, in obs.—Hort.
forsteckiensis *Hort. ex Heydenr. in Gartenflora*, 1934, lxxxiii. 318, in obs.—Hort.
Tsatsumi (*Slavin*) *Slavin in Rep. Conif. Conf. R.H.S. 1931* (*Conif. in Cult.*) 98 (1932), in obs.: C. obtusa var. Tsatsumi.

CHAMAEDOREA Willd. (Palmae).
adscendens (*Dammer*) *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 737 (1933): Kinetostigma adscendens
angustisecta *Burret, l. c.* xi. 318 (1932).—Peruv.
anomospadix *Burret, l. c.* xi. 763 (1933).—Guatem
columbica *Burret, l. c.* xii. 42 (1934).—Colomb.
concinna *Burret, l. c.* xi. 747 (1933).—Colomb.
Dammeriana *Burret, l. c.* 737.—Costa Rica.
Dryanderae *Burret, l. c.* 754.—Colomb.

CHAMAEDOREA:—
glaucophylla *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1155 (1895), in syn.: C. glaucifolia.
Heilbornii *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 750 (1933).—Ecuador.
Herrerae *Burret, l. c.* 748.—Peruv.
Holmgrenii *Burret, l. c.* 749.—Ecuador.
Hoppii *Burret, l. c.* 755.—Ecuador.
Kalbreyeriana *H. Wendl. ex Burret, l. c.* 753.—Colomb.
Lehmannii *Burret, l. c.* 857.—Guatem.
macroloba *Burret, l. c.* 757.—Boliv.
micrantha *Burret, l. c.* 749.—Guatem.
microspadix *Burret, l. c.* 734.—Mexico.
monostachys *Burret, l. c.* 761.—Mexico.
montana (*Humb. & Bonpl.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1155 (1895), in obs.: Kunthia montana.
neurochlamys *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 744 (1933).—Guatem.
parvifolia *Burret, l. c.* 746.—Costa Rica.
parvisecta *Burret, l. c.* 742.—Guatem.
pulchra *Burret, l. c.* 741.—Guatem.
rhombea *Burret, l. c.* 753.—Costa Rica.
Schippii *Burret, l. c.* xi. 1038 (1934).—Brit. Honduras.
simplex *Burret, l. c.* xi. 758 (1933).—Guatem.
sphaerocarpa *Burret, l. c.* 762.—Nicarag.
tenerrima *Burret, l. c.* 858.—Guatem.
Tuerckheimii (*Dammer*) *Burret, l. c.* 766: Malortiea Tuerckheimii.
variabilis *H. Wendl. ex Burret, l. c.* 726, in obs.: C. Dammeriana.
Weberbaueri *Dammer ex Burret, l. c.* 757, in syn.: C. geonomoides.

CHAMAEGASTRODIA Makino & Maekawa in Bot. Mag., Tokyo, 1935, xlix. 596. *ORCHIDACEAE.*
shikokiana (*Makino*) *Makino & Maekawa, l. c.*, cum descr.: Gastrodia shikokiana.

CHAMAEGIGAS Dinter ex Heil in Beih. Bot. Centralbl. xli. 1. 41, 49 (1924); Heil in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xlv. 555 (1927). *SCROPHULARIACEAE.*
intrepidus *Dinter ex Heil, l. c.*; *Heil, l. c.*—Afr. austr.-occ.

CHAMAENERION Adans. (Onagrac.).
angustissimum (*Weber*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 104 (1932): Epilobium angustissimum.
caucasicum (*Hausskn.*) *Sosn. ex Grossheim, l. c.*: Epilobium Dodonaei var. caucasicum.
Steveni (*Boiss.*) *Sosn. ex Grossheim, l. c.*: Epilobium Steveni.

CHAMAEPEUCE DC. (Compos.).
abylensis *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1930, No. 692 [1932].—Marocc.
leptophylla *Pau & Font Quer, l. c.* 1927, No. 691 [1928].—Marocc.
riphaea *Pau & Font Quer, l. c.* No. 690.—Marocc.
Wachtangia (*Woronow*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 190 (1934): Cirsium Wachtangia.

CHAMAERAPHIS R. Br. (Gramin.).
latiglumis (*Vasey*) *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 152 (1896): Setaria latiglumis.
magna (*Griseb.*) *Beal, l. c.*: Setaria magna.
sulcata (*Raddi*) *Beal, l. c.* 158: Setaria sulcata.
Ventenatii (*Kunth*) *Beal, l. c.* 153: Setaria Ventenatii.

CHAMAERHODIOLA Nakai apud Nakai & Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933, Sect. IV. 1. (Pl. Nov. Jehol. 1.) 27 (1934). *CRASSULACEAE.*
algida (*Ledeb.*) *Nakai apud Nakai & Kitagawa, l. c.* 29: Sedum algidum.
asiatica (*D. Don*) *Nakai apud Nakai & Kitagawa, l. c.*: Rhodiola asiatica.
atuntsuensis (*Praeger*) *Nakai apud Nakai & Kitagawa, l. c.*: Sedum atuntsuense.
Bouvieri (*Hamet*) *Nakai apud Nakai & Kitagawa, l. c.* 30: Sedum Bouvieri.
crassipes (*Wall.*) *Nakai apud Nakai & Kitagawa, l. c.*: Sedum crassipes.
Cretini (*Hamet*) *Nakai apud Nakai & Kitagawa, l. c.*: Sedum Cretini.

CHAMAERHODIOLA:—
dumulosa (*Franch.*) *Nakai apud Nakai & Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. 1. (*Pl. Nov. Jehol.* 1.) 30 (1934): Sedum dumulosum.
euphorbioides (*Schlecht.*) *Nakai apud Nakai & Kitagawa, l. c.*: Sedum euphorbioides.
eurycarpa (*Fröderstr.*) *Nakai apud Nakai & Kitagawa, l. c.*: Sedum eurycarpum.
fastigiata (*Hook. f. & Thoms.*) *Nakai apud Nakai & Kitagawa, l. c.*: Sedum fastigiatum.
gelida (*Schrenk*) *Nakai apud Nakai & Kitagawa, l. c.*: Rhodiola gelida.
himalensis (*D. Don*) *Nakai apud Nakai & Kitagawa, l. c.*: Sedum himalense.
horrida (*Praeger*) *Nakai apud Nakai & Kitagawa, l. c.*: Sedum horridum.
humilis (*Hook. f. & Thoms.*) *Nakai apud Nakai & Kitagawa, l. c.*: Sedum humile.
nobilis (*Franch.*) *Nakai apud Nakai & Kitagawa, l. c.*: Sedum nobile.
quadrifida (*Pallas*) *Nakai apud Nakai & Kitagawa, l. c.* 29: Sedum quadrifidum.
scabrida (*Franch.*) *Nakai apud Nakai & Kitagawa, l. c.* 30: Sedum scabridum.
Stephani (*Cham.*) *Nakai apud Nakai & Kitagawa, l. c.* 31: Sedum Stephani.
Stracheyi (*Hook. f. & Thoms.*) *Nakai apud Nakai & Kitagawa, l. c.*: Sedum Stracheyi.
tibetica (*Hook. f. & Thoms.*) *Nakai apud Nakai & Kitagawa, l. c.*: Sedum tibeticum.
wulingensis *Nakai apud Nakai & Kitagawa, l. c.*—Manchur. (Jehol).

CHAMAEROPS L. (Palmae).
chinensis *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1149 (1895), in syn.: Trachycarpus Fortunei.
elata *Hort. ex Vilmorin, l. c.* 1148, in syn.: C. humilis.

CHAMAESENNA Pittier (Legumin.).
didymobotrya (*Forsk.*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 662 (1933), in obs.: Cassia didymobotrya.

CHAMAESYCE S. F. Gray (Euphorbiac.).
canescens (*L.*) *Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med.* (*Trans. Rubber & Guttap. Inst.*) 15, in clavi, 19 (1933): Euphorbia canescens.
cumulicola *Small, Man. Southeast. Fl.* 794 (1933).—U.S.A. (Florida).
Mathewsii *Small, l. c.* 797.—U.S.A. (Florida).
Peplis (*L.*) *Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med.* (*Trans. Rubber & Guttap. Inst.*) 15, in obs. (1933): Euphorbia Peplis.
turcomanica (*Boiss.*) *Prokh. l. c.* 15, in clavi, 21: Euphorbia turcomanica.
vermiculata (*Rafin.*) *House in Bull. N. Y. State Mus.* 1920, Nos. 233–4, 8 (1921): Euphorbia vermiculata.

CHAMAGROSTIS Borkh. (Gramin.).
littorea *G. Sampaio in Ann. Acad. Polyt. Porto*, xiv. 145 (1921), in syn.: C. minima.

CHANGNIENIA Chien in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China, Bot. Ser., x. 89 (1935). *ORCHIDACEAE.*
amoena *Chien, l. c.* 90.—China (Kiangsu; Chekiang).

CHAPTALIA Vent. (Compos.).
anisobasis *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 324.—Colomb.
azuensis *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 95 (1931).—Santo Domingo.
crispata *Urb. & Ekman, l. c.* 97.—Haiti.
denticellata *Urb. & Ekman, l. c.* 98.—Haiti.
dolichopoda *Urb. & Ekman, l. c.* 99.—Haiti.
flavicans *Urb. & Ekman, l. c.* 101.—Haiti.
ignota *Burkart in Physis*, xi. 102 (1932).—Argent.; Urug.
Isernina *Cuatrec. in An. Univ. Madrid*, iv. Fasc. 2, 212 (1935).—Peruv.
latipes *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 99 (1931).—Haiti.
modesta *Burkart in Physis*, ix. 100 (1932).—Argent.
mornicola *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 97 (1931).—Haiti.
undulata *Urb. & Ekman, l. c.* 100.—Haiti.
vegaënsis *Urb. & Ekman, l. c.* 96.—Santo Domingo.

CHARTOLEPIS Cass. (Compos.).
finitima (*Bordz.*) *Iljin in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 353 (1932): Centaurea finitima.

CHASALLIA Comm. ex Poir. in Dict. Sc. Nat. viii. 198 (1817); Juss. in Mem. Mus. *Hist. Nat.* Paris, vi. 379 (1820). *RUBIACEAE.*
[CHASALIA DC.]
ambigua (*Wight & Arn.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 152 (1931): Psychotria ambigua.
chartacea *Craib in Kew Bull.* 1931, 279.—Siam.
cupularis *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 127 (1931).—Nigeria.
elongata *Hutchinson & Dalziel, l. c.*—Liberia.
lushaiensis (*C. E. C. Fischer*) *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1931, 282: Gaertnera lushaiensis.
membranacea *Craib in Kew Bull.* 1931, 280.—Siam.
microphylla *Craib, l. c.*—Siam.
yorubensis *K. Schum.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 125 (1931), in syn.: Psychotria Warneckei.

CHASCANUM E. Mey. (Verbenac.).
adenostachyum (*Schauer*) *Moldenke in Torreya*, 1934, xxxiv. 8: Bouchea adenostachya.
caespitosum (*H. H. W. Pearson*) *Moldenke, l. c.*: Bouchea caespitosa.
dehiscens (*L. f.*) *Moldenke, l. c.* 9: Phryma dehiscens.
glanduliferum (*H. H. W. Pearson*) *Moldenke, l. c.*: Bouchea glandulifera.
Hanningtonii (*Oliv.*) *Moldenke, l. c.*: Bouchea Hanningtonii.
hederaceum (*Sond.*) *Moldenke, l. c.*: Bouchea hederacea.
hyderobadense (*Walp.*) *Moldenke, l. c.*: Bouchea hyderobadensis.
incisum (*H. H. W. Pearson*) *Moldenke in Phytologia*, i. 18 (1933): Bouchea incisa.
integrifolium (*H. H. W. Pearson*) *Moldenke, l. c.*: Bouchea integrifolia.
Krookii (*Gürke*) *Moldenke, l. c.*: Bouchea Krookii.
latifolium (*Harv.*) *Moldenke, l. c.*: Bouchea latifolia.
longipetalum (*H. H. W. Pearson*) *Moldenke, l. c.*: Bouchea longipetala.
namaquanum (*Bolus ex H. H. W. Pearson*) *Moldenke, l. c.*: Bouchea namaquana.
rariflorum (*A. Terracc.*) *Moldenke, l. c.* i. 167 (1935): Hebenstreitia rariflora.
Schlechteri (*Gürke*) *Moldenke, l. c.* i. 18 (1933): Bouchea Schlechteri.
sessilifolium (*Vatke*) *Moldenke, l. c.*: Bouchea sessilifolia.
Wilmsii (*Gürke*) *Moldenke, l. c.*: Bouchea Wilmsii.

CHASMANTHE N. E. Brown in Trans. Roy. Soc. S. Afr. xx. 272 (1932). *IRIDACEAE.*
aethiopica (*L.*) *N. E. Brown, l. c.* 273: Antholyza aethiopica.
bicolor (*Gasp.*) *N. E. Brown, l. c.*: Antholyza bicolor.
caffra *N. E. Brown, l. c.*: Antholyza caffra *Baker*, excl. syn.
floribunda (*Salisb.*) *N. E. Brown, l. c.* 274: Antholyza floribunda.
fucata (*Baker*) *N. E. Brown, l. c.*: Antholyza fucata.
intermedia (*Baker*) *N. E. Brown, l. c.* 273: Antholyza intermedia.
Peglerae *N. E. Brown, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).
spectabilis (*Schinz*) *N. E. Brown, l. c.* 274: Antholyza spectabilis.
vittigera (*Salisb.*) *N. E. Brown, l. c.*: Antholyza vittigera.

CHASMATOPHYLLUM Dinter & Schwantes (Ficoidac.).
willowmorense *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 377, 378 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).

CHASSALIA Comm. ex Poir. in Dict. Sc. Nat. viii. 198 (1817), nomen alternativum: **Chasallia** Comm. ex Poir. (Rubiac.).

CHEILOPHYLLUM Pennell (Scrophulariac.).
dentatum *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 41 (1931).—Cuba.

CHEILOPHYLLUM :—
jamaicense *Pennell in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1935, lxii. 256.—Jamaica.
macranthum *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 39 (1931).—Cuba.
marginatum *Pennell in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1935, lxii. 255.—Cuba.
micranthum *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 40 (1931).—Cuba.
microphyllum *Pennell in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1935, lxii. 255.—Cuba.
sphaerocarpum *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 39 (1931).—Cuba.

CHEIRANTHUS L. (Crucif.).
grandiflorus (*Nutt.*) *Eastw. in Leafl. West. Bot.* i. 89 (1934), in obs.: Erysimum grandiflorum.

CHEIRIDOPSIS N. E. Brown (Ficoidac.).
acuminata *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 296 (1931).—Little Namaq.
alata *L. Bolus, l. c.* 297.—Little Namaq.
ampliata *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 361 (1932).—Namaqualand.
angustipetala *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 399 (1933).—Namaqualand.
borealis *L. Bolus, l. c.*—Afr. austr.-occ.
brachystigma *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 298 (1931).—Little Namaq.
brevipes *L. Bolus, l. c.* 269.—Little Namaq.
carinata *L. Bolus, l. c.* 299.—Little Namaq.
citrina *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 477 (1935).—Namaqualand.
crassa *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 269 (1931).—Little Namaq.
Duplessii *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 400 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
grandiflora *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 271 (1931).—Little Namaq.
Herrei *L. Bolus, l. c.* 272.—Little Namaq.
Hilmarii *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 315 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
imitans *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 477 (1935).—Namaqualand.
intrusa *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 360 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Luckhoffii *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 298 (1931).—Little Namaq.
macrocalyx *L. Bolus, l. c.* 299.—Little Namaq.
macrophylla *L. Bolus, l. c.* 300.—Little Namaq.
multiseriata *L. Bolus, l. c.* 270.—Little Namaq.
puberula *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 164 (1931), in obs., nomen.—Afr. austr.-occ.
pulverulenta *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 270 (1931).—Afr. austr. (Bushmanland).
purpurea *L. Bolus, l. c.* 245.—Little Namaq.
rudis *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 338 (1932).—Namaqualand.
Schinziana *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 169 (1931), in obs., nomen.—Afr. austr.-occ.
serrulata *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 339 (1932).—Namaqualand.
staminodifera *L. Bolus, l. c.*—Namaqualand.
subalba *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 273 (1931).—Little Namaq.
truncata *L. Bolus, l. c.* 300.—Little Namaq.
turgida *L. Bolus, l. c.* 273.—Little Namaq.

CHEIRINIA Link (Crucif.).
syrticola (*Sheldon*) *Rydb. in Brittonia*, i. 89 (1931): Erysimum syrticola.

CHEIRODENDRON Nutt. (Araliac.).
Dominii *Kraj. in Preslia*, x. 94 (1931).—Ins. Sandvic.
kauaiense *Kraj. l. c.* 96.—Ins. Sandvic.
marquesense *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 207 (1935).—Ins. Marquesas.
wahiawense *Kraj. in Preslia*, x. 98 (1931).—Ins. Sandvic.

CHEIRORCHIS Carr in Gard. Bull. Straits Settlements, vii. 40 (1932). *ORCHIDACEAE.*
breviscapa *Carr, l. c.* 41.—Penins. Mal.
filiformis (*Hook. f.*) *Carr, l. c.* 46: Sarcochilus filiformis.
fulgens (*Ridley*) *Carr, l. c.*: Dendrocolla fulgens.
major *Carr, l. c.* 43.—Penins. Mal.
pulverulenta *Carr, l. c.* 45.—Penins. Mal.

CHEIROSTYLIS Blume (Orchidac.).
kanarensis *Blatter & McCann in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxv. 732 (1932).—Ind. or. (Bombay).
nemorosa *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 760.—Formosa.
taiwanensis *Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1933, v. 54.—Formosa.
Tatewakii *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 195.—Japon.

×**CHEIRYSIMUM** Janchen in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1933, lxxxii. 153. *CRUCIFERAE.* [CHEIRANTHUS × ERYSIMUM.]
intermedium (*Wettst.*) *Janchen, l. c.*: Erysimum intermedium.

CHELIDONIUM L. (Papaverac.).
lactucoides (*Hook. f. & Thoms.*) *Prain in Ann. Roy. Bot. Gard. Calc.* ix. 7 (1901), in obs.: Dicranostigma lactucoides.

CHELONANTHUS Gilg (Gentianac.).
pyriformis *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 450.—Venez.

CHELONE L. (Scrophulariac.).
diffusa *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 769 (1895), in syn.: Penstemon diffusus.
Richardsonii *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in syn.: Penstemon Richardsonii.
venusta *Hort. ex Vilmorin, l. c.* 765, in syn.: Penstemon venustus.
Wrightii *Hort. ex Vilmorin, l. c.* 766, in syn.: Penstemon Wrightii.

CHELONISTELE Pfitz.; Carr in Gard. Bull. Straits Settlements, viii. 216 (1935), descr. emend. *ORCHIDACEAE.*
amplissima (*Ames & C. Schweinf.*) *Carr, l. c.* 218: Coelogyne amplissima.
brevilamellata (*J. J. Smith*) *Carr, l. c.* 217, in obs.: Coelogyne brevilamellata.
Clemensii (*Ames*) *Carr, l. c.* 220: Nabaluia Clemensii.
crassifolia *Carr, l. c.* 218.—Borneo.
cuneata (*J. J. Smith*) *Carr, l. c.* 217: Coelogyne cuneata.
ingloria (*J. J. Smith*) *Carr, l. c.*, in obs.: Coelogyne ingloria.
kutaiensis (*J. J. Smith*) *Carr, l. c.* 77: Coelogyne kutaiensis.
lamellulifera *Carr, l. c.* 78.—Borneo.
pinniloba (*J. J. Smith*) *Carr, l. c.* 218: Coelogyne pinniloba.
Richardsii *Carr, l. c.* 79.—Borneo.
unguiculata *Carr, l. c.* 77.—Borneo.

CHENOLEA Thunb. (Chenopodiac.).
pentagona (*R. H. Anders.*) *Ewart, Fl. Vict.* 458 (1930): Kochia pentagona.
villosa (*F. Muell.*) *Ewart, l. c.*: Enchylaena villosa.

CHENOPODIUM L. (Chenopodiac.).
×Bontei *Aellen in Verh. Nat. Ges. Basel*, xliv. 317 (1933).—Helvet.
capillare *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 17, 30 (1930).—U.S.A. (Nevada).
chenopodioides (*L.*) *Aellen in Ostenia*, 98 (1933): Blitum chenopodioides.
×Christii *Aellen in Verh. Nat. Ges. Basel*, xliv. 317 (1933).—Austral.
deltaphyllum *Osterh. in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1930, lvii. 559 (1931).—U.S.A. (Colorado).
Haumanii *Ulbr. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 491 (1934): C. bonariense *Hauman & Irigoyen.*
longidjawense *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. Anhang, 22 (1932).—Tanganyika Terr.
melanocarpum (*J. M. Black*) *J. M. Black in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1934, lviii. 173: C. carinatum var. melanocarpum.
nepalense *Link ex Colla, Herb. Pedem.* v. 25 (1836).—Hab. ?
oahuense (*Meyen*) *Aellen in Ostenia*, 100 (1933): Atriplex oahuensis.
polygonoides (*Murr*) *Aellen in Mitt. Naturf. Ges. Solothurn*, viii. Ber. xx. 57 (1928): C. triangulare var. polygonoides.

CHENOPODIUM :—
Probstii *Aellen in Mitt. Naturf. Ges. Solothurn*, viii. Ber. xx. 56 (1928); *et in Verh. Nat. Ges. Basel*, xli. 83 (1931).—S. Austral.
pseudo-ambiguum *Thellung & Aellen in Mitt. Naturf. Ges. Solothurn*, viii. Ber. xx. 57 (1928), in syn.: C. farinosum.
rostratum *Aellen ex Blom in Acta Hort. Gothoburg.* 1933, viii. 176, nomen.—Suecia; As. or. ?
stellulatum (*Benth.*) *Aellen in Mitt. Naturf. Ges. Solothurn*, viii. Ber. xx. 57 (1928); *et in Verh. Nat. Ges. Basel*, xli. 93 (1931): C. triangulare var. stellulatum.
trigonocarpum *Aellen in Verh. Nat. Ges. Basel*, xli. 99 (1931).—Helvet. (inquilin.)

CHEVALIERELLA A. Camus in Rev. Bot. Appliq. 1933, xiii. 421. *GRAMINEAE.*
congoënsis *A. Camus, l. c.* 422.—Congo Belg.

CHEVALIERIA Gaudich. (Bromeliac.).
thyrsigera (*Speg.*) *Mez in Engl. Pflanzenreich, Bromeliac.* 95 (1934): Aechmea thyrsigera.

CHIARINIA Chiov. Fl. Somala, II. 149 (1932). *SAPINDACEAE.*
jubae-fluvii *Chiov. l. c.*—Somal. Ital.

CHIDLOWIA Hoyle in Kew Bull. 1932, 101. *LEGUMINOSAE.*
sanguinea *Hoyle, l. c.*—Gold Coast; Sierra Leone.

CHIKUSICHLOA Koidz. (Gramin.).
mutica *Keng in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 527.—China (Kwangsi).

CHILENIA Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC, 299 (1935). *CACTACEAE.*
acutissima (*Otto & Dietr.*) *Backeb. l. c.* 300: Echinocactus acutissimus.
castaneoides (*Cels ex Salm-Dyck*) *Backeb. l. c.*: Echinocactus castaneoides.
chilensis (*Hildm. ex K. Schum.*) *Backeb. l. c.*: Echinocactus chilensis.
heteracantha *Backeb. l. c.* 300, 417.—Chile.
nigrihorrida *Backeb. l. c.*—Chile.
subcylindrica *Backeb. l. c.* 301, 417.—Chile.
subgibbosa (*Haw.*) *Backeb. l. c.* 301: Echinocactus subgibbosus.

CHILENIOPSIS Backeb. Blätter Kakteenforsch. 1935, Pt. 12, [p. 1], in syn.; Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC, 283, 416 (1935). *CACTACEAE.*
polyrhaphis (*Pfeiff. ex Salm-Dyck*) *Backeb. in Backeb & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 284 (1935): Echinocactus polyrhaphis.
villosa (*Monv.*) *Backeb. l. c.*: Cactus villosus.

CHILLANIA Roiv. in Ann. Bot. Soc. Zool.-Bot. Fenn. Vanamo, iv. No. 7, 2 (1933). *CYPERACEAE.*
pusilla *Roiv. l. c.*—Chile.

CHILOCARPUS Blume (Apocynac.).
obtusifolius *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 188 (1934).—Sumatra.

CHILOSCHISTA Lindl. (Orchidac.).
Bleeseri *Diels ex R. S. Rogers in Vict. Nat.* l. 184 (1933), in obs.—N. Austral.
glandulosa *Blatter & McCann in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxv. 488 (1932).—Ind. or. (Bombay).

CHIMAPHILA Pursh (Pyrolac.; Ericac., Gen. Pl.).
Fukuyamai *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1933, xxiii. 206.—Formosa.
taiwaniana *Masamune, l. c.* 205.—Formosa.

CHIMARRHIS Jacq. (Rubiac.).
barbata (*Ducke*) *Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 260, in obs.: Pseudochimarrhis barbata.
longistipulata *Bremek. l. c.*—Guiana Bat.

CHINGIACANTHUS Hand.-Mazz. in Sinensia, v. 11 (1934). *ACANTHACEAE.*
glaber *Hand.-Mazz. l. c.* 12.—China (Kwangsi).
patulus *Hand.-Mazz. l. c.* 11.—China (Kwangtung).

CHINGITHAMNUS Hand.-Mazz. in Sinensia, ii. 128 (1932). *CELASTRACEAE.*
osmanthoides *Hand.-Mazz. l. c.*—China (Kwangsi).

CHIONACHNE R. Br. (Gramin.).
semiteres (*Benth.*) *Henrard in Meded. Herb. Leid.* No. 67, 16 (1931): Polytoca semiteres.

CHIONANTHUS Gaertn. (Oleac.).
[LINOCIERA Sw.]
dichotomus *Roxb. Hort. Beng.* 3 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 107 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 108 (1832).—Ind. or.
ramiflorus *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 106; *et l. c.* 107.—Ins. Molucc.
smilacifolius *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 108 (1820).—Ind. or. (Bengal).

CHIONANTHUS L. (Oleac.).
roseus *Barton, Fl. Virg.* 2 (1812); cf. *Pennell in Bartonia*, 1925–6, No. 9, 28 (1926).—U.S.A. (Virginia).

CHIONODOXA Boiss. (Liliac.).
gigantea *Hort. ex L. H. Bailey, Stand. Cycl. Hort.* ii. 749 (1914), in obs.—Hort.

CHIONOGRAPHIS Maxim. (Liliac.).
sparsa *Maekawa in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 378.—Japon.

CHIONOLAENA DC. (Compos.).
columbiana *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 312.—Colomb.

CHIONOPAPPUS Benth. (Compos.).
Benthamii *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 492.—Peruv.

CHIRITA Buch.-Ham. (Gesneriac.).
acaulis *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 47 (1934).—China (Kwangtung).
annamensis *Pellegr. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 757.—Indo-China (Anam).
Elphinstonia *Craib in Kew Bull.* 1932, 149.—Siam.
Forrestii *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 192 (1934).—China (Szechuan; Yunnan).
Geoffrayi *Pellegr. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 756.—Cambodia.
heterotricha *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 71 (1934).—China (Hainan).
mishmiensis *Debbarm. ex Biswas in Assam Forest Rec., Bot.* i. 21 (1934).—Ind. or. (Assam).
semicontorta *Pellegr. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 757.—Indo-China (Tonkin).

CHIRONIA L. (Gentianac.).
carinata *Banks ex Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 284 (1824), in syn.; *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 584 (1832): C. centaureoides.
centaureoides *Roxb. Hort. Beng.* 16 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 283 (1824); *Fl. Ind.*, ed. Carey, i. 584 (1832).—Ind. or. (Bengal).
elgonensis *Bullock in Kew Bull.* 1932, 500.—Afr. trop. or. (Elgon).

CHISOCHETON Blume (Meliac.).
Kingii *Harms in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* iii. IV. 295 (1896): C. macrophyllus *King*.

CHITONANTHERA Schlechter (Orchidac.).
vinosa *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 208 (1934).—N. Guin.

CHITONIA Moc. & Sessé (Zygophyllac.).
acuminata (*Rose & Painter*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 155 (1931): Morkillia acuminata.

CHLAMYDACANTHUS Lindau (Acanthac.).
dichrostachyus *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 823 (1933).—Tanganyika Terr.

CHLAMYDOCARYA Baill. (Icacinac.).
Gossweileri *Exell in Journ. Bot.* 1932, lxx. Suppl. 1, 224.—Congo Lusit.
macrocarpa *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 456 (1928), in clavi; *Hutchinson & Dalziel in Kew Bull.* 1929, 23, descr.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
rostrata *Bullock in Kew Bull.* 1933, 469.—S. Nigeria.
Tessmannii *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 263 (1921), in obs.—Guinea infer.

CHLAMYDOSTACHYA Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xii. 101 (1934). *ACANTHACEAE.*
spectabilis *Mildbr. l. c.*—Tanganyika Terr.

CHLOACHNE Stapf (Gramin.).
oplismenoides (*Hackel*) *Stapf ex Robyns in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 173 (1932); *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 382 (1935), cum descr. ampl.: Panicum oplismenoides.

CHLORIS Sw. (Gramin.).
Boivinii *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 845 (1933).—Madag.
Brandegei (*Vasey*) *Swallen in Am. Journ. Bot.* 1935, xxii. 41: Diplachne Brandegei.
montana *Roxb. Hort. Beng.* 82 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 331 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 329 (1832).—Ind. or.
polystachya *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 332; *et l. c.* 330.—Ind. or.
Rogeoni *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1934, xiv. 127.—Sudan.
tenella *Koen. ex Roxb. Hort. Beng.* 82 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 330 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 329 (1832).—Ind. or.

CHLOROCARPA Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon, vi. Suppl., 15 (1931). *FLACOURTIACEAE.*
pentaschista *Alston, l. c.*: Hydnocarpus alpinus *Trimen, l. c.* i. 76 (1893), non *Wight*.

CHLOROCYPERUS Rikli (Cyperac.).
alopecuroides (*Rottb.*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 150 (1928): Cyperus alopecuroides.
amuricus *Palla ex Kükenth. in Engl. Pflanzenreich, Cyperac.-Scirp.-Cyp.* 152 (1935), in syn.: Cyperus amuricus.

CHLOROPHYTUM Ker-Gawl. (Liliac.).
ankarense *H. Perrier in Lecomte, Not. Syst.* v. 47 (1935).—Madag.
appendiculatum *H. Perrier, l. c.* 58.—Madag.
calateifolium *Chiov. Fl. Somala*, II. 425 (1932).—Somal. Ital.
capense (*L.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1086 (1895): Asphodelus capensis.
Decaryanum *H. Perrier in Lecomte, Not. Syst.* v. 45 (1935).—Madag.
dianellifolium (*Baker*) *H. Perrier, l. c.* 54: Anthericum dianellifolium.
distichum *H. Perrier, l. c.* 49.—Madag.
elgonense *Bullock in Kew Bull.* 1932, 503.—Afr. trop. or. (Elgon).
glaucoides *Blatter in Journ. & Proc. As. Soc. Beng.* 1930, n. s. xxvi. 361 (1931).—Ind. or. (Bombay).
gramineum (*Baker*) *H. Perrier in Lecomte, Not. Syst.* v. 56 (1935): Anthericum gramineum.
graniticum *H. Perrier, l. c.* 46.—Madag.
Humbertianum *H. Perrier, l. c.* 52.—Madag.
limurense *Rendle in Journ. Bot.* 1932, lxx. 158.—Kenya Col.
namorokense *H. Perrier in Lecomte, Not. Syst.* v. 48 (1935).—Madag.
rhodesianum *Phillips in Fl. Pl. S. Afr.* 1934, xiv. t. 540.—Rhodesia.
subligulatum *H. Perrier in Lecomte, Not. Syst.* v. 53 (1935).—Madag.
tripedale (*Baker*) *H. Perrier, l. c.* 51: Anthericum tripedale.
tuberculatum *A. Duthie in Ann. Univ. Stellenb.* 1926, iv. Sect. A, No. 1, 19; *et in Ann. Bolus Herb.* iv. 137 (1928).—Afr. austr. (Cape Prov.).

CHOMELIA Jacq. (Rubiac.).
banksiana *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 4.—N. Hebrides.
Splitgerberi *Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 272.—Guiana Bat.

CHONDODENDRON Ruiz & Pav. (Menispermac.).
hypoleucum *Standley in Contrib. Arn. Arb.* No. v. 65 (1933).—Panamá (Ins. Barro Colorado).

CHONDRILLA L. (Compos.).
arenicola *Iljin & Igolk. in Sovietsk. Bot.* 1935, No. 6, 86, 88.—Turkestan.
articulata *Rodin in Trans. Rubber & Guttap. Inst. USSR*, 5 (1932); *et in Fedde, Repert.* xxxiv. 136 (1933).—Turkestan. (Thian Shan).

CHONDRILLA :—
Bosseana *Iljin*; *Iljin, Crit. Surv. Chondr.* (*Bull. Sect. Rubber-Produc. Pl., Moscow*, No. 3) 21, 26 (1930), descr.—As. centr.
brevicollis *Iljin*; *Iljin, l. c.* 34, 45, descr.—As. centr.
coronifera *Iljin*; *Iljin, l. c.* 34, 46, descr.—As. centr.
cyanorostris *Iljin & Igolk. in Sovietsk. Bot.* 1935, No. 6, 85, 86.—Turkestan.
filifolia *Iljin*; *Iljin, Crit. Surv. Chondr.* (*Bull. Sect. Rubber-Produc. Pl., Moscow*, No. 3) 49, 60 (1930), descr.—As. centr.
gummifera *Iljin*; *Iljin, l. c.* 49, 56, descr.—As. centr.
haiastana *Sosn. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 244 (1934).—Caucas.
Hookeriana *Iljin*; *Iljin, Crit. Surv. Chondr.* (*Bull. Sect. Rubber-Produc. Pl., Moscow*, No. 3) 33, 41 (1930), descr.—As. centr.
Iljini *Igolk. & Zapr. in Sovietsk. Bot.* 1935, No. 6, 85, 86, in obs.—Turkestan.
insolens *Iljin*; *Iljin, Crit. Surv. Chondr.* (*Bull. Sect. Rubber-Produc. Pl., Moscow*, No. 3) 32, 37 (1930), descr.—As. centr.
Kareliana *Iljin, l. c.* 40, in obs.—Hab. ?
Kossinskyi *Iljin*; *Iljin, l. c.* 21, 24, descr.—As. centr.
Kusnezovii *Iljin*; *Iljin, l. c.* 20, 30, descr.—As. centr.
macra *Iljin*; *Iljin, l. c.* 22, 26, descr.—As. centr.
mujunkumensis *Iljin & Igolk. in Sovietsk. Bot.* 1935, No. 6, 86, 89.—Turkestan.
ornata *Iljin*; *Iljin, Crit. Surv. Chondr.* (*Bull. Sect. Rubber-Produc. Pl., Moscow*, No. 3) 33, 43 (1930), descr.—As. centr.
saisanensis *Iljin*; *Iljin, l. c.* 20, 29, descr.—As. centr.
sandybaica *Iljin & Zapr. in Sovietsk. Bot.* 1935, No. 6, 86, 88, in obs.—Turkestan.
squamata *Iljin*; *Iljin, Crit. Surv. Chondr.* (*Bull. Sect. Rubber-Produc. Pl., Moscow*, No. 3) 21, 27 (1930), descr.—As. centr.
thoracifera *Iljin*; *Iljin, l. c.* 22, 28, descr.—As. centr.

CHONEMORPHA G. Don (Apocynac.).
assamensis *Furtado in Gard. Bull. Straits Settlements*, ix. 115 (1935).—Ind. or. (Assam).
eriostylis *Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1247 (1933).—Indo-China (Anam).
graciliflora *Pitard, l. c.* 1248.—Indo-China (Laos).
macrantha *Pitard, l. c.* 1249.—Indo-China (Laos; Cambodia).
splendens *Chun & Tsiang in Sunyatsenia*, ii. 157 (1934).—China (Hainan).

CHORISEPALUM Gleason & Wodehouse in Bull. Torr. Bot. Cl. 1931, lviii. 451. *GENTIANACEAE.*
ovatum *Gleason, l. c.* 452.—Venez.

CHORISTYLIS Harv. (Saxifragac.).
ulugurensis *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 191 (1934).—Tanganyika Terr.

CHORIZANTHE R. Br. (Polygonac.).
biloba *Goodman in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1934, xxi. 73.—U.S.A. (Calif.).
chaetophora *Goodman, l. c.* 89.—Calif. infer.
chrysacantha *Goodman, l. c.* 57.—U.S.A. (Calif.).
Howellii *Goodman, l. c.* 44.—U.S.A. (Calif.).
insularis *R. Hoffm. in Bull. S. Calif. Acad. Sc.* 1932, xxxi. 56.—U.S.A. (Calif.).
interposita *Goodman in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1934, xxi. 32.—Calif. infer.
Jonesiana *Goodman, l. c.* 88.—Calif. infer.
leptotheca *Goodman, l. c.* 61.—Calif. super. et infer.
obovata *Goodman, l. c.* 70.—U.S.A. (Calif.).
rectispina *Goodman, l. c.* 72.—U.S.A. (Calif.).

CHORIZEMA Labill. (Legumin.).
elegans *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 193 (1894), in syn.: C. varium.

CHRYSALIDOCARPUS H. Wendl. (Palmae).
auriculatus *Jumelle in Ann. Mus. Col. Marseille*, 1933, Sér. V. i. Fasc. 1, 25.—Madag.
ruber *Jumelle, l. c.* 23.—Madag.
sambiranensis *Jumelle, l. c.* 21.—Madag.

CHRYSANTHEMUM L. (Compos.).
albanicum *Markgraf in Denkschr. Akad. Wiss. Wien, Math.-Nat.* cii. 357 (1931).—Albania.

CHRYSANTHEMUM:—
anthemoides (*Mariz*) *G. Sampaio in Bol. Soc. Brot.* Sér. II. vii. 160 (1931): Daveauana anthemoides.
Aphrodite *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 212.—Japon.
assakae *Caballero in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 28, p. 27 (1935).—Marocc.
Baranovi *Kraschen. & Poljak. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 175 (1933), in syn.: Pyrethrum Baranovii.
Bornmuelleri (*Hausskn. & Bornm.*) *Bornm. in Fedde, Repert.* xxxvi. 349 (1934), in obs.: Pyrethrum Bornmuelleri.
camphoratum (*Less.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 510 (1894): Tanacetum camphoratum.
Clusii (*Fisch. ex Reichb.*) *Kreutzer, Anthochron. Pl. Eur. Med.* 60, 219 (1840): Pyrethrum Clusii.
depressum (*Ball*) *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 158 (1932): C. Gayanum var. depressum.
eginense (*Hausskn. ex Bornm.*) *Bornm. in Fedde, Repert.* xxxvi. 350 (1934): Pyrethrum eginense.
erubescens *Stapf in Bot. Mag.* sub t. 9330 (1933).—Mongol.; Manchur.; China bor.
Galae *Popov in Trans. Sc. Soc. Turk.* i. 40 (1923), in syn.: Pyrethrum Galae.
Gaubae *Bornm. in Fedde, Repert.* xxxvi. 349 (1934).—Persia.
Haussknechtii (*Bornm.*) *Bornm. l. c.* 350: Pyrethrum Haussknechtii.
heterotomum (*Bornm.*) *Bornm. l. c.* 349, in obs.: Pyrethrum heterotomum.
hololeucum (*Bornm.*) *Bornm. l. c.* 350: Pyrethrum hololeucum.
hortorum *W. Mill. in L. H. Bailey, Stand. Cycl. Hort.* ii. 755 (1914), in obs.—Hort.
jucundum *Nakai & Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. 1. (*Pl. Nov. Jehol.* 1.) 58 (1934).—Manchur. (Jehol).
kaschgaricum *Kraschen. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 175 (1933), in syn.: Tanacetum kaschgaricum.
× Kuwashimae *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 37; *et in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 168.—Japon.
leucanthum (*Makino*) *Makino in Journ. Jap. Bot.* i. 33 (1918): C. lavandulifolium var. leucanthum.
Licentianum *Wu in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1934, lxxxiii. 237.—China (Shensi).
linearifolium *Chang in Sinensia*, v. 160 (1934).—China (Kansu).
Makinoi *Matsumura & Nakai in Cat. Sem. Hort. Bot. Imp. Tokyo*, 31 (1916); *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1214 (1931), japonice.—Japon.
matricariodes *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 507 (1894), in syn.: C. coronarium.
Merzbacherii *B. Fedtsch. in G. Merzbacher, Die Gebirgsgruppe Bogda-Ola, Munchen*, 1916; cf. *Ling in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, ii. 496 (1934).—Turkestan.
modestum (*Heimerl ex Stapf*) *Bornm. in Fedde, Repert.* xxxvi. 351 (1934), in obs.: Pyrethrum modestum.
morifolium *Ramat. in Journ. Hist. Nat., Paris*, ii. 240 (1792), in obs.—Hab. ?
neo-oreastrum *Chang in Sinensia*, v. 159 (1934).—China occ.
pamiricum (*O. Fedtsch.*) *Pampan. in Sped. Ital. De Filippi Himal., etc. 1913–14*, Ser. II. x. (*Agg. Fl. Carac.*) 205 (1930): Pyrethrum pamiricum.
partheniodes (*Bernh.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 508 (1894): Anthemis parthenioides
pectinatum (*Hausskn. ex Bornm.*) *Bornm. in Fedde, Repert.* xxxvi. 350 (1934): Pyrethrum pectinatum.
praeteritum *Horwood in Kew Bull.* 1933, 44.—Hab. ?
pulchrum (*Ledeb.*) *Ling in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, ii. 496 (1934): Pyrethrum pulchrum.
santoanum *Kraschen. Popov & Vved. in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 3, 102 (1928), in syn.: Pyrethrum santoanum.
× Shimotomaii *Makino in Journ. Jap. Bot.* viii. 13 (1932).—Japon. (Hondo).

CHRYSANTHEMUM:—
Shiwogiku *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 36, japonice, 71, latine.—Japon. (Shikoku).
sibiricoides *Uyeki in Suigen Gakuhô*, xxi. No. 2 (1928); cf. *Uyeki, Notes Woody Pl. Chosen*, 5 [1934].—Corea.
tadshikorum *Kudrj. in Bull. Univ. As. Centr.* xix. 163 (1934), in syn.: Tanacetum tadshikorum.
tenuisectum (*Boiss.*) *Bornm. in Fedde, Repert.* xxxvi. 349 (1934), in obs.: Pyrethrum tenuisectum.
tianschanicum *Kraschen. ex Pavlov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1933, n.s. xlii. 127, nomen; *Kraschen. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 176 (1933), in syn.: Pyrethrum tianschanicum.
transcaucasicum (*Sosn.*) *Bornm. in Fedde, Repert.* xxxvi. 350 (1934), in obs.: Pyrethrum transcaucasicum.
umbelliferarum (*Boiss.*) *Burkill in Kew Bull.* 1935, 317; *Burkill, Dict. Econ. Prod. Mal. Penins.* i. 532 (1935), in obs.: Tanacetum umbelliferarum.
variifolium *Chang in Sinensia*, v. 161 (1934).—China (Shensi).
vestitum (*Hemsl.*) *Stapf in Bot. Mag.* sub t. 9330 (1933): C. sinense var. vestitum.

CHRYSOGLOSSUM Blume (Orchidac.).
aneityumense *Ames in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 105.—N. Hebrides.
bicameratum *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 91 (1931).—Borneo.
pumilum *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxv. 458 (1933).—Celebes.
reticulatum *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 197 (1935).—Borneo.

CHRYSOGONUM L.; Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu, No. 130, 340 (1935), descr. emend. *COMPOSITAE*.
album *Forest Brown, l. c.* 342.—Ins. Marquesas (Hivaoa).
australe *Alexander in Small, Man. Southeast. Fl.* 1415 (1933).—U.S.A. (S. E. States).
coriaceum *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 344 (1935).—Polynes. (Ins. Rapa).
rapense *Forest Brown, l. c.* 343.—Polynes. (Ins. Rapa).

CHRYSOPHYLLUM L. (Sapotac.).
acuminatum *Roxb. Hort. Beng.* 17 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 345 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 599 (1832).—Ind. or. (Assam).
Akusae *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 267 (1917).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
ambelaniifolium *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 476.—Guiana Brit.
Augustini *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 262.—Ins. Bonin.
Beguei *Aubrév. & Pellegr. in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 795 (1935).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
calomeris *Baill. ex Guillaumin in Ann. Mus. Col. Marseille*, 1911, Sér. II. ix. 188, in syn.: Sebertia dubia.
cuspidatum *Hoehne in Ostenia*, 302 (1933).—Bras. (S. Paulo).
edule *Hoyle in Kew Bull.* 1932, 269.—S. Nigeria.
eximium *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 744.—Bras. (Amaz.).
giganteum *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 267 (1917).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
glomeruliferum *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 9 (1931).—Sierra Leone; Dahomey; Uganda.
gracile *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 268 (1917).—Dahomey.
kilimandscharicum *G. M. Schulze in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 196 (1934).—Tanganyika Terr.
Le-Testuanum *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 269 (1917).—Gabon.
metallicum *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 9 (1931).—Gold Coast.
ogowense (ogoouense) *A. Cheval. Vég. Ut. Afr. Trop. Franç.* ix. 270, 443 (1917); *et A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 266 (1917).—Gabon.

CHRYSOPHYLLUM:—
perpulchrum *Mildbr. ex Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 9, in clavi, 10 (1931).—Gold Coast; Nigeria; Cameroons; Uganda.
rufocupreum *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 67 (1935).—Bras. (Amaz.).
sericeum *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 269 (1917).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).

CHRYSOPOGON Trin. (Gramin.).
caeruleus (*Steud.*) *W. Watson in Atkinson, Gaz. N. W. Ind.* 392 (1882): Andropogon caeruleus.
echinulatus (*Steud.*) *W. Watson, l. c.*: Andropogon echinulatus.
glaucopsis (*Steud.*) *W. Watson, l. c.*: Andropogon glaucopsis.
Hackelii (*Hook. f.*) *C. E. C. Fischer in Gamble, Fl. Madras*, 1739 (1934): Andropogon Hackelii.
parvispicus (*Steud.*) *W. Watson in Atkinson, Gaz. N. W. Ind.* 392 (1882): Andropogon parvispicus.
Royleanus (*Steud.*) *W. Watson, l. c.*: Andropogon Royleanus.
subrepens (*Steud.*) *W. Watson, l. c.*: Andropogon subrepens.
Trinii (*Steud.*) *W. Watson, l. c.*: Andropogon Trinii.
villosulus (*Steud.*) *W. Watson, l. c.*: Andropogon villosulus.

CHRYSOPSIS Ell. (Compos.).
arenicola *Alexander in Small, Man. Southeast. Fl.* 1339 (1933).—U.S.A. (S. Carolina).
Ballardii *Rydb. in Brittonia*, i. 100 (1931).—U.S.A. (Minnesota).
elata *Osterh. in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1930, lvii. 560 (1931).—U.S.A. (Colorado).
lanuginosa *Small, Man. Southeast. Fl.* 1339 (1933).—U.S.A. (Florida).
subulata *Small, l. c.* 1338.—U.S.A. (Florida).

CHRYSOSCIAS E. Mey. (Legumin.).
angustifolia (*Jacq.*) *C. A. Smith in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xix. 406 (1932): Glycine angustifolia.
argentea (*Thunb.*) *C. A. Smith, l. c.*: Glycine argentea.
erecta (*Thunb.*) *C. A. Smith, l. c.*: Glycine erecta.
pauciflora (*Bolus*) *C. A. Smith, l. c.* p. xx. 406: Rhynchosia pauciflora.

CHRYSOSPLENIUM L. (Saxifragac.).
amabile *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 908.—Manchur.
aurantium *Sutô in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 257, japonice.—Japon.
divaricatum *Honda ex Sutô, l. c.* 1935, xi. 491, in syn.: C. rhabdospermum.
Doianum *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 105.—Japon. (Kiushiu).
duplocrenatum *Hand.-Mazz. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1933, lxxxii. 246.—China (Kansu).
flaviflorum *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 51 (1934).—Corea.
gracilescens *Nakai, Kamik.-Tennenk.-Chosahok.* 39 (1928); cf. *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 429 (1931), japonice; *Sutô in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 255, in syn.: C. crenulatum.
Guebriantianum *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 429 (1931).—China (Szechuan).
hebetatum *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 52 (1934).—Formosa.
holochlorum *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 152.—Formosa.
kiotoënse *Ohwi, l. c.* 105.—Japon. (Hondo).
lectus-cochleae *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 909.—Manchur.
microphyllum *Tatewaki & Sutô in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 253.—Japon. (Hondo).
naminoënse *Honda ex Sutô, l. c.* 259, japonice; *et l. c.* 1935, xi. 492, latine.—Japon.
oxygraphoides *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 428 (1931).—China (Szechuan).
Serreanum *Hand.-Mazz. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1931, lxxx. 341.—China (Shansi).
viridescens *Sutô in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 257, japonice.—Japon.

CHRYSURUS Pers. (Gramin.).
aureus (*L.*) *Spreng. Syst. Veg.* i. 296 (1825): Cynosurus aureus.

CHUSQUEA Kunth (Gramin.).
lanceolata *Hitchcock in Phytologia*, i. 145 (1935).—Guatem.
tuberculosa *Swallen in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 14.—Colomb.

CHUSUA Nevski in Komarov, Fl. URSS, iv. 670, 753 (1935). *ORCHIDACEAE.*
Donii *Nevski, l. c.* 671, in obs.: Orchis Chusua.
secunda *Nevski, l. c.* 670, 753: Orchis pauciflora *Fisch. ex Lindl.*

CHYLISMIA Nutt. (Onagrac.).
arenaria *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 575.—U.S.A. (Arizona).
aurantiaca (*S. Wats.*) *Johansen in Desert*, iii. 78 (1931); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 133: Oenothera scapoidea var. aurantiaca.
Peirsonii (*Munz*) *Johansen, l. c.*; cf. *l. c.*: Oenothera claviformis var. Peirsonii.

CHYMSYDIA Alboff (Umbellif.).
colchica (*Alboff*) *Woronow ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 174 (1932): C. agasylloides var. colchica.

CHYTRANTHUS Hook. f. (Sapindac.).
bracteosus *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 787 (1932).—Cameroons.
brunneo-tomentosus *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 273 (1921), in obs.; *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 787 (1932).—Cameroons.
calophyllus *Radlk. l. c.* 791.—Cameroons.
dasystachys *Gilg*; *Radlk. l. c.* 790, descr.—Cameroons.
Dinklagei *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 273 (1921), in obs.; *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 797 (1932).—Cameroons.
flavoviridis *Radlk. ex Engl. l. c.*, in obs.; *Radlk. l. c.* 795.—Cameroons.
Klaineanus *Radlk. ex Engl. l. c.*, in obs.; *Radlk. l. c.* 796.—Gabon.
Ledermannii *Gilg ex Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 796 (1932).—Cameroons.
longiracemosus *Gilg ex Radlk. l. c.* 788.—Cameroons.
micranthus *Gilg*; *Radlk. l. c.* 796, descr.—Cameroons.
obliquinervis *Radlk. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 274 (1921), in obs.; *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 797 (1932).—Afr. trop. or.
punctatus *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 793 (1932).—Cameroons.
Sacleuxii *Pierre apud Sacleux in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 110.—Zanzibar.
sexlocularis *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 786 (1932).—Cameroons.
strigosus *Radlk. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 273 (1921), in obs.; *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 788 (1932).—Cameroons.
subvilliger *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 794 (1932).—Cameroons.
villiger *Radlk. l. c.*—Cameroons.
xanthophyllus *Radlk. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 273 (1921), in obs.; *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 795 (1932).—Cameroons.

CHYTROMA Miers (Lecythidac.; Myrtac., Gen. Pl.).
Miersii *Knuth in Fedde, Repert.* xxxviii. 114 (1935).—Bras. (Amaz.; Pará).
rhododendrifolia *Knuth, l. c.* 116.—Bras. (Amaz.).
Tessmannii *Knuth, l. c.* 113.—Peruv.

CHYTROPSIA Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl. 1934, xxxi. 291, 292. *RUBIACEAE.*
astrellantha (*Wernh.*) *Bremek. l. c.* 292, in obs.: Psychotria astrellantha.
guianensis *Bremek. l. c.*—Guiana Bat.
sessiliflora (*Muell.-Arg.*) *Bremek. l. c.* 293, in obs.: Mapouria sessiliflora.

CIBOTARIUM O. E. Schulz in Engl. Jahrb. lxvi. 91 (1933). *CRUCIFERAE.*
stellatum (*S. Wats.*) *O. E. Schulz, l. c.* 92, in obs.: Capsella stellata.

CICCA L. (Euphorbiac.).
guyanensis *Splitg. ex Lanj. Euphorbiac. Surinam*, 109 (1931); *et in Pulle, Fl. Surinam*, ii. (*Meded. K. Ver. Kol. Inst. Amst.* xxx.) 23 (1932), pro syn.: Phyllanthus nobilis.

CICERBITA Wallr. (Compos.).
Olgae *Leskov in Trav. Mus. Bot. Acad. Sc. URSS*, xxv. 53 (1932).—Caucas.
orbelica (*Velen.*) *Hayek in Fedde, Repert. Beih.* xxx. 11. 838 (1931): Mulgedium orbelicum.
pontica (*Boiss.*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 253 (1934): Mulgedium ponticum.

CICHLANTHUS Van Tiegh. (Loranthac.).
Yadoriki (Jadoriki) (*Sieb. ex Maxim.*) *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France*, 1895, xlii. 253; *et l. c.* 1896, xliii. 188, in obs.: Loranthus Yadoriki.

CIENFUEGOSIA Cav. (Malvac.).
althaeoides *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 11 (1935).—Kenya Col.
australis (*F. Muell.*) *K. Schum. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* iii. vi. 51 (1890): Gossypium australe.
pulchella (*C. A. Gardner*) *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 79 (1931): Fugosia pulchella.
× sulphurea (*H.B. & K.*) *Hassl. in Ostenia*, 343 (1933), in obs.: Hibiscus sulphureus, non Cienfuegosia sulphurea (*St.-Hil.*) *Garcke.*

CINCHONA L. (Rubiac.).
amazonica *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 334 (1931).—Peruv.
gratissima *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 154 (1824).—Reg. Himal.
hybrida *Hort. ex Sasaki, List Pl. Formos.* 378 (1928), nomen.—Hort.
pubens (*Michx.*) *Hosack, Hort. Elgin.* ed. 2, 15 (1811): Pinckneya pubens.
thyrsiflora *Roxb. Hort. Beng.* 15 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 151 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 530 (1832).—Ind. or. (Bengal).

CINCINNOBOTRYS Gilg (Melastomatac.).
acaulis (*Cogn.*) *Gilg in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 757 (1921), in obs.: Amphiblemma acaule.

CINERARIA L. (Compos.).
ambracea *Fisch. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 398 (1834).—Sibir. (Transbaikal.).
Bequaerti *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 441 (1932).—Congo Belg.
Britteniae *Hutchinson & R. A. Dyer in Kew Bull.* 1934, 266.—Afr. austr. (Cape Prov.).
monticola *Hutchinson, l. c.* 1931, 251.—Transvaal.

CINNAMOMUM Blume (Laurac.).
cacharense *R. N. Parker in Fedde, Repert.* xxxi. 126 (1932).—Ind. or. (Bengal; Assam).
Chingii *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* x. 416 (1931); *Chang in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., ix. 287 (1934), descr. ampl.—China (Chekiang).
kwangtungense *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 25 (1934).—China (Kwangtung).
pallidum *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 91, 6 (1932).—Ins. Viti.
rigidum *Gillespie, l. c.* 7.—Ins. Viti.
sessilifolium *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 453.—Ins. Carolin. (Ponape).
Tsangii *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 26 (1934).—China (Kwangtung).

CIPADESSA Blume (Meliac.).
cinerascens (*Pellegr.*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 632 (1933): C. fruticosa var. cinerascens.

CIRCAEA L. (Onagrac.).
caulescens (*Komarov*) *Nakai ex Hara in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 588: C. alpina var. caulescens.
glabrescens (*Pampan.*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 604 (1933): C. cordata var. glabrescens.
× hybrida *Hand.-Mazz. l. c.* 605.—China (Yunnan; Chihli).
imaicola (*Aschers. & Magn.*) *Hand.-Mazz. l. c.* 603: C. alpina var. imaicola.
Kitagawae *Hara in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 595.—Manchur.; China bor.?
Maximowiczii (*Léveillé*) *Hara, l. c.* 598: C. mollis var. Maximowiczii.

CIRCAEA :—
minutula *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 151.—Formosa.

CIRRHAEA Lindl. (Orchidac.).
longiracemosa *Hoehne in Bol. Agric., S. Paulo*, 1933, xxxiv. 627 (1934).—Bras. (S. Catharina).

CIRRHOPETALUM Lindl. (Orchidac.).
autumnale *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 760.—Formosa.
campanulatum (*Rolfe*) *Rolfe in Orch. Rev.* 1910, xviii. 73: Bulbophyllum campanulatum.
chondriophorum *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 4.—China (Szechuan).
Eberhardtii *Gagnep. l. c.*—Indo-China (Anam).
fibratum *Gagnep. l. c.* 5.—Indo-China (Anam).
flavisepalum (*Hayata*) *Hayata, Gen. Ind. Fl. Formos.* 76 (1917); *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1625 (1931): Bulbophyllum flavisepalum.
hirundinis *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 5.—Indo-China (Tonkin).
Inabai (*Hayata*) *Hayata, Gen. Ind. Fl. Formos.* 76 (1917); *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1625 (1931): Bulbophyllum Inabai.
lepidum (*Blume*) *Schlechter in Fedde, Repert.* x. 185 (1911), in obs.: Ephippium lepidum.
melanoglossum (*Hayata*) *Hayata, Gen. Ind. Fl. Formos.* 76 (1917); *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1625 (1931): Bulbophyllum melanoglossum.
mirificum *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 5.—Indo-China (Anam).
omerandrum (*Hayata*) *Hayata, Gen. Ind. Fl. Formos.* 76 (1917); *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1626 (1931): Bulbophyllum omerandrum.
Pecten-Veneris *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 6.—Indo-China (Anam).
proboscideum *Gagnep. l. c.*—Indo-China (Laos).
racemosum (*Hayata*) *Hayata, Gen. Ind. Fl. Formos.* 76 (1917); *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1626 (1931): Bulbophyllum racemosum.
remotifolium *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 669.—Formosa.
rhombifolium *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 119 (1935).—Borneo.
Rivesii *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 7.—Indo-China (Tonkin).
Saruwatarii (*Hayata*) *Hayata, Gen. Ind. Fl. Formos.* 76 (1917); *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1626 (1931): Bulbophyllum Saruwatarii.
taiwanense *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 761.—Formosa.
touranense *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 7.—Indo-China (Anam).

CIRSIUM Mill. (Compos.).
abkhasicum (*Petrak*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 184 (1934): C. osseticum subsp. abkhasicum.
aidzuense *Nakai ex Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 174.—Japon. (Hondo).
albescens *Kitamura, l. c.* 1932, i. 56.—Formosa.
amplexifolium (*Nakai*) *Kitamura, Cirsium Nov. Or.-Asiat.* 16 (1931): C. nipponicum var. amplexifolium.
anatolicum (*Petrak*) *Petrak ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 182 (1934): C. lappaceum subsp. anatolicum.
apoënse *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 629.—Japon.
arisanense *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 148.—Japon. (Hondo).
asperum *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 618.—Corea.
autumnale *Kitamura, Cirsium Nov. Or.-Asiat.* 20 (1931).—Japon. (Hondo).
× bernadense *Pavarino in Chanousia*, i. 138 (1928).—Hort.
Boissieri *Strib. ex Hayek in Fedde, Repert. Beih.* xxx. 11. 712 (1931), in syn.: C. albidum.
boreale *Kitamura, Cirsium Nov. Or.-Asiat.* 2 (1931).—Japon. (Yezo).
chokaiense *Kitamura, l. c.* 5.—Japon. (Hondo).
chrysacanthum (*Ball*) *Jahandiez in Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc*, No. iv. 84 (1923): Cnicus chrysacanthus.
coccinatum *Osterh. in Torreya*, 1934, xxxiv. 45.—U.S.A. (S. Dakota).

CIRSIUM:—
congestissimum *Kitamura, Compos. Nov. Jap.* 1 (1931).—Japon. (Hondo).
× connexum *Kitamura, l. c.* 2.—Japon.
diabolicum *Kitamura, Cirsium Nov. Or.-Asiat.* 6 (1931).—Japon. (Hondo).
dimorphum *Petrak ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 180 (1934), in syn.: C. tricholoma.
ferum *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 149.—Formosa.
× Fraserianum *Druce, Comit. Fl. Brit. Isles*, 172 (1932).—Eur.
glabratum *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 39.—Japon. (Hondo).
gratiosum *Kitamura, l. c.*—Japon. (Hondo).
guatemalense *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1934, xxiv. 442.—Guatem.
hachijöense *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 620.—Japon.
hanamakiense *Kitamura, Compos. Nov. Jap.* 4 (1931).—Japon. (Hondo).
× hargitanum *Nyár. in Bul. Grăd. & Muz. Bot. Univ. Cluj*, 1933, xiii. 71 (1934).—Ruman.
× heteroanthum *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 8.—As. or.
hidaënse *Kitamura, l. c.* 7, in obs.—Japon. (Hondo).
hokkokuense *Kitamura, l. c.* 5, in obs.—Japon. (Hondo).
Hosokawai *Kitamura, l. c.* 1932, i. 57.—Formosa.
ibukiense *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 623.—Japon.
iburiense *Kitamura, Cirsium Nov. Or.-Asiat.* 7 (1931), hybr. ?—Japon. (Yezo).
indefensum *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 40.—Japon. (Hondo).
inflatum *Kitamura, Cirsium Nov. Or.-Asiat.* 8 (1931).—Japon. (Hondo).
irumtiense *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 41.—Ins. Liukiu.
isophyllum (*Petrak*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 181 (1934).—Caucas.
× Ispolatovi *Iljin in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 351 (1932).—Rossia (Samara).
kurobense *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 44.—Japon.
lacinulatum *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 622.—Corea ?; Japon. ?
Leo *Nakai & Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. 1. (*Pl. Nov. Jehol.* i.) 60 (1934).—Manchur. (Jehol).
liukiuense *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 620.—Ins. Liukiu.
longepedunculatum *Kitamura, Compos. Nov. Jap.* 6 (1931).—Japon. (Hondo).
lucens *Kitamura, Cirsium Nov. Or.-Asiat.* 14 (1931).—Japon.
Magofukui *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 6, in obs.—Japon.
maritimum (*Elmer*) *Petrak in Cirsioth. Univ.* Fasc. XII. No. 115 (1914); *et in Beih. Bot. Centralbl.* xxxv. II. 288 (1917): Carduus maritimus.
× Masferreri *Cadevall in Cadevall & Sallent, Fl. Catal.* iii. 350 (1919–23).—Hispan.
matsushimense *Kitamura, Cirsium Nov. Or.-Asiat.* 16 (1931).—Japon. (Hondo).
mirabile *Kitamura, Compos. Nov. Jap.* 7 (1931).—Japon. (Hondo).
misawaënse *Nakai ex Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 175.—Japon. (Hondo).
Muraii *Kitamura, l. c.* 1934, iii. 5, in obs.—Japon.
Otayai *Kitamura, Compos. Nov. Jap.* 8 (1931).—Japon. (Hondo).
pannoniciforme *Nyár. in Bul. Grăd. & Muz. Bot. Univ. Cluj*, 1931, xi. 98 (1932).—Ruman.
patens *Kitamura, Compos. Nov. Jap.* 9 (1931).—Japon. (Hondo).
perniveum *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 158 (1932).—Marocc.
× perplexissimum *Kitamura, Compos. Nov. Jap.* 10 (1931).—Japon. (Yezo).
Petrakianum *Domin in Preslia*, xiii–xv. 240 (1935), in adnot., in syn.: C. trigeneum.
× Petrakii *Kozl. & Woronow ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 189 (1934).—Caucas.
pilosum *Kitamura, Cirsium Nov. Or.-Asiat.* 18 (1931), hybr. ?—Japon. (Hondo).

CIRSIUM:—
polonicum (*Petrak*) *Iljin in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 350 (1932): C. eriophorum var. polonicum.
prasinolepis (*Petrak*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 181 (1934).—Caucas.
rhothophilum *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 336: C. maritimum *Petrak*.
ruderale *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 621.—Japon.
senile *Nakai, l. c.* 623.—Japon.
setigerum-pannonicum *Nyár. in Bul. Grăd. & Muz. Bot. Univ. Cluj*, 1931, xi. 98 (1932), in syn.: C. pannoniciforme.
Sidi-Guinii *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1929, No. 458 [1930].—Marocc.
sipyleum *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxvi. 145 (1934).—As. Min. (Lydia).
Souliei (*Franch.*) *Mattf. in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 42: Cnicus Souliei.
spinosum *Kitamura, Cirsium Nov. Or.-Asiat.* 19 (1931).—Japon. (Kiushiu).
subtymphaeum *K. H. Rechinger in Fedde, Repert.* xxxviii. 341 (1935), in obs.—Albania.
suzukaënse *Kitamura, Compos. Nov. Jap.* 13 (1931).—Japon. (Hondo).
Suzukii *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 58.—Formosa.
× svidovicense *Domin in Preslia*, xiii–xv. 240 (1935).—Czechoslovak.
Tashiroi *Kitamura, Compos. Nov. Jap.* 14 (1931).—Japon. (Hondo).
tenue *Kitamura, l. c.* 15.—Japon.
tenuisquamatum *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 150.—Japon.
Tobai *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 620.—Japon.
tonense *Nakai, l. c.* 625.—Japon.
trachylomum *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 322.—Calif. infer.
tristissimum *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 42.—Japon. (Hondo).
ugoënse *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 629.—Japon.
uliginosum *Delastre, Fl. Dépt. Vienne*, 255 (1842).—Gallia.
xanthacanthum *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 619.—Corea (Quelpaert); Japon.
yakusimense *Masamune, Prelim. Rep. Veg. Yakus.* 126 (1929); *Masamune in Bot. Mag., Tokyo*, 1930, xliv. 219; *et in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* xi., Bot. No. 4, 454 (1934).—Ins. Liukiu (Yakushima).

CISSAMPELOS L. (Menispermac.).
pannosa *Linden & Planch.*; *Sprague in Kew Bull.* 1926, 35: C. pannosa *Turcz.* (1854).
rigidifolia (*Engl.*) *Diels in Engl. Pflanzenreich, Menispermac.* 303 (1910): C. Pareira subvar. rigidifolia.

CISSUS L. (Vitac.; Ampelidac., Gen. Pl.).
adnatus *Roxb. Hort. Beng.* 11 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 423 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 405 (1832).—Ind. or.
anatomicus *C. A. Smith in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xx. 476 (1932).—Transvaal.
angustatus *Ridley in Kew Bull.* 1931, 498.—Borneo.
angustifolius *Roxb. Hort. Beng.* 11 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 427 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 408 (1832).—Sumatra.
auriculatus *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 430; *et l. c.* 411.—Ind. or. (Mysore).
betiformis *Chiov. Fl. Somala*, II. 142 (1932).—Somal. Ital.
capreolatus *Royle, Illustr.* t. 26, fig. 2 (1834).—Himal.
cordatus *Roxb. Hort. Beng.* 11 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 425 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 407 (1832).—Ins. Molucc. (Amboina).
dasypleurus *C. A. Smith in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xx. 476 (1932).—Transvaal.
diffusus *ex Burkill, Dict. Econ. Prod. Mal. Penins.* ii. 2244 (1935), in syn.: Vitis diffusa.

CISSUS:—
diversilobatus *C. A. Smith in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xx. 475 (1932).—Transvaal.
dolichopus *C. A. Smith, l. c.* p. xx. 476.—Transvaal.
elongatus *Roxb. Hort. Beng.* 11 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 429 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 411 (1832).—Ind. or.
femineus *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 428; *et l. c.* 410.—Ind. or.
glaucus *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 425; *et l. c.* 406.—Ind. or.
gracillimus *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 386 (1935).—Tanganyika Terr.
hispidiflorus *C. A. Smith in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xx. 476 (1932).—Transvaal.
lanceolarius *Roxb. Hort. Beng.* 11 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 430 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 412 (1832).—Ind. or. (Bengal).
lonicerifolius *C. A. Smith in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xx. 475 (1932).—Transvaal.
muhuluensis *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1075 (1934).—Tanganyika Terr.
ornatus *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 475, in clavi, 477 (1928).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
pentagonus *Roxb. Hort. Beng.* 11 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 426 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 408 (1832).—Ind. or. (Bengal).
pseudopolyanthus *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1073 (1934).—Tanganyika Terr.
puberulus *C. A. Smith in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xx. 476 (1932): C. laniger var. Sosang *Planch.*
quinquangularis *Chiov. Fl. Somala*, II. 142 (1932).—Somal. Ital.
roseus *Royle, Illustr.* t. 26, fig. 1 (1834).—Himal.
Schliebenii *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1075 (1934).—Tanganyika Terr.
segmentatus *C. A. Smith in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xx. 476 (1932).—Transvaal.
Seitzii *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 856 (1921), in obs., sphalm.: C. Seitziana *Gilg & Brandt*.
serrulatus *Roxb. Hort. Beng.* 11 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 432 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 414 (1832).—Ind. or. (Bengal).
setosus *Roxb. l. c.* 11, 83, nomen; *et l. c.* 428; *et l. c.* 410.—Ind. or. (Madras).
simulans *C. A. Smith in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xx. 476 (1932).—Hab. ?
sulcatus *C. A. Smith, l. c.* p. xx. 477.—Transvaal.
ternato-multifidus *Chiov. Fl. Somala*, II. 143 (1932): C. biternatus *Chiov.*
trilobus (*Lour.*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 254 (1935): Callicarpa triloba.
unguiformifolius *C. A. Smith in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xx. 476 (1932).—Transvaal.
viniferoides *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1074 (1934).—Tanganyika Terr.
Wittei *Staner in De Wild. & Staner, Contrib. Fl. Katanga*, Suppl. IV. 49 (1932).—Congo Belg.

CISTANCHE Hoffmgg. & Link (Orobanchac.).
Feddeana *Hao in Fedde, Repert.* xxxvi. 222 (1934); *et in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, iii. 1 (1935).—China (Szechuan).
franciscana *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 87 [1933], nomen.—Marocc.

CISTUS L. (Cistac.).
× Aguilari *O. E. Warb. in Journ. Roy. Hort. Soc.* 1931, lvi. 222, in obs.—Hab. ?
× Bernardi *Sennen in Le Monde des Plantes*, 1931, xxxii. 23.—Hispan.
× Borneti *Sennen, l. c.* 30.—Hispan.
× chantalis *Sennen, l. c.* 38.—Hispan.
× Chevalieri *Sennen, l. c.* 24.—Hispan.
× Cousturieri *Sennen, l. c.* 31.—Corsica.
× Eulaliae *Sennen, l. c.* 23.—Hispan.
× Ferreri *Sennen, l. c.* 31.—Hispan.
× Fremioti *Sennen, l. c.* 23.—Hispan.

CISTUS:—
Gardi *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 12 [1933]: C. varius *auct.*, non *Pourr.*
×Gougerotae *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 97.—Gallia.
×Lecomtei *Sennen in Le Monde des Plantes*, 1931, xxxii. 24.—Hispan.
×Lloverae *Sennen, l. c.* 23.—Hispan.
×Mariae *Sennen, l. c.* 31.—Hispan.
×Mauritii *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 13 [1933].—Marocc.
×Mercedis *Sennen in Le Monde des Plantes*, 1931, xxxii. 24.—Hispan.
×monspeliensioides *Sennen, l. c.* 31.—Hispan.
×Pascalis *Sennen, l. c.* 24.—Hispan.
Paui *Sennen, l. c.* 38, in obs.: C. macrocalyx *Sennen & Pau.*
×Philothei *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 13 [1933].—Marocc.
Pomeli *Sennen & Mauricio, l. c.* 12, nomen alternativ. —Marocc.
×prati *Sennen in Le Monde des Plantes*, 1931, xxxii. 24.—Hispan.
×riphienensis *Pau in Bol. Soc. Ibér.* 1932, xxxi. 97 (1934).—Marocc.
×Rodiei *Verguin in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 600–2.—Gallia.
×Salesi *Sennen in Le Monde des Plantes*, 1931, xxxii. 39.—Hispan.
×Salomonis *Sennen & Teodoro, l. c.*, in obs.—Hispan.
Sennenianus *Pau in Cavanillesia*, v. 175 (1932).—Marocc.
×subhirsutus *Rothmaler in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.* 1934, xxxiv. 153.—Hispan.
×Vinyalsi *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 13, 144 [1933].—Marocc.
×wintonensis *O. E. Warb. in Journ. Roy. Hort. Soc.* 1931, lvi. 219, in obs.—Hab.?

CITHAREXYLUM Mill. (Verbenac.).
amazonicum *Moldenke in Fedde, Repert.* xxxvii. 216 (1934).—Bras. (Amaz.).
ambiguum *Moldenke, l. c.*—Mexico.
andinum *Moldenke, l. c.* 217.—Boliv.
argutedentatum *Moldenke, l. c.* 218.—Peruv.
chartaceum *Moldenke, l. c.* 219.—Peruv.
costaricense *Moldenke, l. c.*—Costa Rica.
Dawei *Moldenke, l. c.* 220.—Colomb.
decorum *Moldenke, l. c.* 221.—Venez.
Endlichii *Moldenke, l. c.* 222.—Mexico.
fulgidum *Moldenke, l. c.* 223.—Mexico.
Glaziovii *Moldenke, l. c.* 224.—Bras. (Minas Geraes).
Gleasonianum *Moldenke, l. c.* 225.—Mexico.
Grenzebachianum *Moldenke, l. c.* 226.—Mexico.
Hintoni *Moldenke, l. c.*—Mexico.
integerrimum (*Kuntze*) *Moldenke in Phytologia*, i. 17 (1933): C. villosum var. integerrimum.
Karsteni *Moldenke in Fedde, Repert.* xxxvii. 227 (1934).—Colomb.
Krukovii *Moldenke, l. c.* 228.—Bras. (Maranhão).
Lankesteri *Moldenke, l. c.* 229.—Costa Rica.
linearifolium *Moldenke in Phytologia*, i. 97 (1934). —Parag.
mexicanum *Moldenke in Fedde, Repert.* xxxvii. 229 (1934).—Mexico.
mirifolium *Moldenke, l. c.* 230.—Venez.
mollicellum *Standley ex Moldenke, l. c.* xxxix. 51 (1935), in syn.: Rehdera mollicella.
montanum *Moldenke, l. c.* xxxvii. 231 (1934).— Colomb.
montevidense (*Spreng.*) *Moldenke in Phytologia*, i. 17 (1933): Ehretia montevidensis.
mucronatum *Fourn. & Moldenke in Fedde, Repert.* xxxvii. 232 (1934).—Nicarag.
pachyphyllum *Moldenke, l. c.*—Peruv.
penninervium *Standley ex Moldenke, l. c.* xxxix. 50 (1935), in syn.: Rehdera penninervia.
rigidum *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, vii–viii. 317 (1904), in syn.: C. myrianthum var. rigidum *Briq.*
Standleyi *Moldenke in Fedde, Repert.* xxxvii. 234 (1934).—Panamá.
subtruncatum *Moldenke, l. c.*—Bras. (Pará).
sulcatum *Moldenke, l. c.* 235.—Colomb.
ternatum *Moldenke, l. c.* 236.—Cuba.

CITHAREXYLUM:—
Ulei *Moldenke in Fedde, Repert.* xxxvii. 237 (1934). —Bras. (Amaz.).
venezuelense *Moldenke, l. c.*—Venez.
viride *Moldenke, l. c.* 238.—Panamá.

CITROPSIS Swingle & Kellerman (Rutac.).
Zenkeri *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 760 (1915), in obs. —Cameroons.

CITRULLUS Forsk. (Cucurbitac.).
aedulis (sic) *Pangalo in Bull. Applied Bot., Leningrad*, 1929–30, xxiii. No. 3, 44 (1930).—Hemisph. bor.
colocynthoides *Pangalo, l. c.* 66.—Hemisph. bor.

CITRUS L. (Rutac.).
Benikoji *Hort. ex Tanaka in Mem. Tanaka Citrus Exper. Stat.* i. No. 2, 31, 32 (1932), nomen.— China (Chekiang).
hsiangyuan *Hort. ex Tanaka, l. c.* 32: C. maxima var. Shanyuan *Hu.*
khasya *Markovitch in Bull. Applied Bot., Leningrad*, 1929–30, xxiv. No. 4, 434, 439 (1930).— Ind. or. (Khasia; Sikkim).
kwangsiensis *Hu in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 153. —China (Kwangsi).
macrocalyx *Tanaka in Stud. Citrol.* iv. 199 (1931), japonice.—Arch. Mal.; Indo-China.
microcarya *Tanaka, l. c.* 255, japonice.—Hab.?
polyandra (*Ridley*) *Burkill in Gard. Bull. Straits Settlements*, v. 219 (1931): Atalantia polyandra.
subcompressa (*Hort. ex Tanaka*) *Hort. ex Tanaka in Stud. Citrol.* v. 35, 98 (1931), japonice; *et in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* iv. Phytotechn. No. 1, 63 (1932): C. nobilis var. subcompressa.
Swinglei *Burkill ex Harms in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix c. 459 (1931): C. polyandra *Burkill.*
Wilsonii *Tanaka in Mem. Tanaka Citrus Exper. Stat.* i. No. 2, 37 (1932).—China (Hupeh).

CLADANTHUS Cass. (Compos.).
ifniensis *Caballero in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 28, 25 (1935).—Marocc.

CLADIUM P. Br. (Cyperac.).
brevistigma *Nakai in Rigakkwai*, xxvi. iv. p. 10, et v. p. 4 (1928), nomen; *Tuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 509, descr.—Ins. Bonin.
nukuhivense *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 84, 111 (1931).—Ins. Marquesas.

CLADOCHAETA DC. (Compos.).
caspica *Sosn. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 105 (1934).—Caucas.

CLADORHIZA Rafin. Med. Fl. i. 145 (1828), in obs., pro syn.: **Corallorrhiza** R. Br. (Orchidac.).

CLADOSTEMON A. Br. & Vatke (Capparidac.).
Kirkii (*Oliv.*) *Pax & Gilg in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C. 185 (1895): Euadenia Kirkii.
Paxianus *Gilg, l. c.*—Afr. trop. or.

CLAOXYLON A. Juss. (Euphorbiac.).
longiracemosum *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 25.—Ins. Palau.
vitiense *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 91, 13 (1932).—Ins. Viti.

CLARISIA Ruiz & Pav. (Morac.; Urticac., Gen. Pl.).
nitida (*Allem.*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 15 (1931): Soaresia nitida.

CLARKELLA Hook. f. (Rubiac.).
siamensis *Craib in Kew Bull.* 1931, 216.—Siam.

CLARKIA Pursh (Onagrac.).
neriifolia *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 326 (1894), in syn.: C. elegans.

CLATHROTROPIS Harms (Legumin.).
macrocarpa *Ducke in Tropical Woods*, 1932, No. 31, 16.—Bras. (Amaz.).

CLAUSENA Burm. f. (Rutac.).
abyssinica *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 757 (1915), in obs.— Abyss.; Tanganyika Terr.; Nyasaland; Rhodesia.
anisata *Hook. f.*; *De Wild. & Staner, Contrib. Fl. Katanga*, Suppl. iv. 46 (1932); *et l. c.* Suppl. v. 35 (1933), descr. ampl.—Congo Belg.
Engleri *Tanaka in Meded. Herb. Leid.* No. 69, 6 (1931).—Sumatra.

CLAUSENA:—
microphylla *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 251 (1935).—China (Hainan).

CLAUSENOPSIS (Engl.) Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, xix a. 298 (1931). *RUTACEAE.*
[Vepris sect. Clausenopsis Engl.]
angolensis (*Engl.*) *Engl. l. c.* 300: Vepris angolensis.
Hildebrandtii (*Engl.*) *Milne-Redhead in Kew Bull.* 1935, 278, cum descr. ampl.: Clausena Hildebrandtii.

CLAVARIOIDIA Kreuzinger, Verzeichn. (1935); cf. Werderm. in Fedde, Repert. Sonder-Beih. C. sub t. 97 (1935), in obs. *CACTACEAE.*
clavarioides (*Pfeiff.*) *Kreuzinger, l. c.*; cf. *Werderm. l. c.*, in obs.: Opuntia clavarioides.

CLAVIJA Ruiz & Pav. (Theophrastac.; Myrsinac., Gen. Pl.).
magdalenae *Killip in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 349.—Colomb.
reflexiflora *Killip, l. c.* 350.—Peruv.

CLAVISTYLUS J. J. Smith (Euphorbiac.).
peltatus *J. J. Smith*; *v. Steenis in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 201 (1932), descr. ampl.— Ind or. Bat.

CLAYTONIA L. (Portulacac.).
bellidifolia *Rydb. in N. Am. Fl.* xxi. 301 (1932).— U.S.A. (Oregon).
deltoidea *Greene ex C. F. Baker in W. Am. Pl.* [i.] 17 (1902), nomen; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 136; *Rydb. in N. Am. Fl.* xxi. 309 (1932), in syn.: Limnia rubra.
media (*DC.*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 494 (1933): C. virginica var. media.
nivalis *C. S. English in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1934, xlvii. 189.—U.S.A. (Washington).
obovata *Rydb. in N. Am. Fl.* xxi. 299 (1932).— U.S.A. (Oregon; Calif.).
rhomboidea *Greene ex C. F. Baker in W. Am. Pl.* [i.] 17 (1902), nomen; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 136; *Rydb. in N. Am. Fl.* xxi. 307 (1932), in syn.: Limnia carnosa.
robusta (*Somes*) *Rydb. in Brittonia*, i. 87 (1931): C. multicaulis var. robusta.

CLEGHORNIA Wight (Apocynac.).
dongnaiensis *Pierre ex Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1208 (1933).— Cochinch.

CLEIANTHUS Lour. ex Gomes in Mem. Acad. Sc. Lisb. Cl. Sc. Pol. Mor. Bel.-Let. n. s. iv. (1), 28 (1868); Merrill in Trans. Am. Phil. Soc. n. s. xxiv. ii. 15, 337 (1935), in syn.: **Clerodendron** L. (Verbenac.).
coccineus *Lour. ex Gomes, l. c.*; *Merrill, l. c.*, in syn.: Clerodendron paniculatum.

CLEISOSTOMA Blume (Orchidac.).
Evrardii *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 34.—Indo-China (Anam).
orbiculare *Rupp in N. Queensl. Nat.*, April (1934); cf. *Rupp in Vict. Nat.* li. 82 (1934), in obs.— Austral. (Queensland)?
pilosulum *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 35.—Cambodia.
Poilanei *Gagnep. l. c.* 34.—Cambodia.

CLEISTANTHUS Hook. (Euphorbiac.).
angularis *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 289.—Ins. Palau.
insularis *Kanehira, l. c.* 1933, xlvii. 673.—Ins. Palau.
Morii *Kanehira in Tropical Woods*, 1932, No. 29, 5, in obs., nomen; *et in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 456, descr.—Ins. Carolin. (Truk).

CLEISTES L. C. Rich. (Orchidac.).
acuminata (*Schlechter*) *Schlechter in Archiv. Bot. Estad. S. Paulo*, i. 180 (1926), in obs.: Pogonia acuminata.
elegantula (*Schlechter*) *Schlechter, l. c.*, in obs.: Pogonia elegantula.
Hoehneana *Schlechter ex Mansf. in Fedde, Repert. Beih.* lviii. 2 (1930): C. Silveirana.
nana (*Schlechter*) *Schlechter in Archiv. Bot. Estad. S. Paulo*, i. 180 (1926), in obs.: Pogonia nana.

CLEISTES:—
venusta (*Schlechter*) *Schlechter in Archiv. Bot. Estad. S. Paulo*, i. 180 (1926), in obs.: Pogonia venusta.

CLEISTOCACTUS Lem. (Cactac.).
Buchtieni *Backeb. in Cactus Journ.* iii. 25 (1934), in obs., nomen; *et in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 189, 411 (1935), descr.—Boliv.
Grossei (*Hort.*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 189 (1935): Cereus Grossei.
Herzogianus *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 6, [p. 4].—Boliv.
Roezlii (*Haage ex K. Schum.*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 190 (1935): Cereus Roezlii.
Straussii (*Heese*) *Backeb. in Kakteenfreund*, iii. 121 (Nov. 1934); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 146; *Backeb. in Cact. Journ.* iii. 25 (Dec. 1934): Pilocereus Strausii.
tominensis (*Weing.*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 190 (1935): Cereus tominensis.
tupizensis (*Vaupel*) *Backeb. in Kakteenfreund*, iii. 123 (1934); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 146: Cereus tupizensis.

CLEISTOCHLOA C. E. Hubbard in Hook. Ic. Pl. xxxiii. t. 3209 (1933). *GRAMINEAE.*
Sclerachne (*F. M. Bailey*) *C. E. Hubbard, l. c.* sub t. 3209, p. 3: Chionachne Sclerachne.
subjuncea (*Domin*) *C. E. Hubbard, l. c.* t. 3209: Panicum subjunceum.

CLEISTOGENES Keng in Sinensia, v. 147 (1934). *GRAMINEAE.*
bulgarica (*Bornm.*) *Keng, l. c.* 152: Diplachne bulgarica.
caespitosa *Keng, l. c.* 154.—China (Chihli).
chinensis (*Maxim.*) *Keng, l. c.* 152: Diplachne serotina var. chinensis.
serotina (*L.*) *Keng, l. c.* 149: Festuca serotina.
squarrosa (*Trin.*) *Keng, l. c.* 156: Molinia squarrosa.

CLEISTOPHOLIS Pierre (Annonac.).
brevipetala *Exell in Journ. Bot.* 1932, lxx. Suppl. 1, 208.—Congo Lusit.

CLELANDIA J. M. Black in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral. 1932, lvi. 46. *VIOLACEAE.*
convallis *J. M. Black, l. c.* 47.—S. Austral.

CLEMATIS L. (Ranunculac.).
albicoma *Wherry in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 198: C. ovata *auct.*, non *Pursh.*
barrancae *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 35 (1933–5).—Mexico.
chariensis *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 1012.—Afr. Gall. Centr.
djalonensis *A. Cheval. l. c.* 1010.—Guinea Gall.
floribunda (*Hayata*) *Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 188: C. uncinata var. floribunda.
Hayatai *Kudo & Masamune in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard.* 1932, ii. 77: C. Henryi var. leptaphylla *Hayata.*
×hybrida *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 7 (1894).—Hab.?
×Jouiniana *C. K. Schneider in Wein. Ill. Gart. Zeit.* 1904, 17, in obs.—Hort.
kweichouwensis *P'ei in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., ix. 305 (1934).—China (Kweichau).
micrantha *Small, Man. Southeast. Fl.* 525 (1933).—U.S.A. (Florida).
Schinziana *Engl. & Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 172 (1915), in obs.—Hereroland.
semperflorens *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 8 (1894), in syn.: C. hybrida.
serrata (*Maxim.*) *Komarov in Komarov & Klob.-Alis. Key Pl. Far East. Reg. USSR*, i. 549 (1931): C. orientalis var. serrata.
speciosa (*Makino*) *Makino in Journ. Jap. Bot.* i. 39 (1918): C. heracleifolia var. speciosa.
Teusczii (*Kuntze*) *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 170 (1915), in obs.: C. villosa var. Teuszii.
triphylla *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 65, in syn.: C. ochotensis var. triphylla *Ohwi.*

CLEMATIS:—
×troutbeckiana *Spingarn in Gard. Chron.* 1933, Ser. III. xciv. 310; *et in Nat. Hort. Mag.* 1934 (Jan.), reimpr. p. [13]; *et in Fedde, Repert.* xxxv. 399 (1934).—U.S.A. (N. York).
tsugetorum *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 153.—Formosa.
Wilfordi (*Maxim.*) *Komarov in Komarov & Klob.-Alis. Key Pl. Far East. Reg. USSR*, i. 549 (1931): C. orientalis var. Wilfordi.

CLEOME L. (Capparidac.).
Allamani *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 3 (1935).—Kenya Col.
amazonica *Heilb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 10, p. 9 (1931).—Bras. (Amaz.).
asperrima *Blatter in Journ. & Proc. As. Soc. Beng.* 1930, n. s. xxvi. 340 (1931).—Ind. or. (Bombay).
Bangiana *Gilg ex Heilb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 10, p. 12 (1931).—Boliv.
bechuanensis *Bremek. & Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xvi. 413 (1935).—Bechuanaland Protect.
chrysogyna *Gilg ex Heilb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 10, p. 13 (1931).—Ecuador.
ecuadorica *Heilb. l. c.*—Ecuador.
Friesii *Heilb. l. c.* 7.—Argent.; Boliv.
hirsuticaulis *Macbride in Candollea*, v. 360 (1934).—Peruv.
intermedia *Heilb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 10, p. 16 (1931).—Ecuador.
Jonesii (*Macbride*) *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 39: C. lutea var. Jonesii.
longistyla *Heilb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 10, p. 16 (1931).—Ecuador.
parvisepala *Heilb. l. c.* 12.—Mexico.
pichinchensis *Heilb. l. c.* 17.—Ecuador.
Sodiroi *Gilg ex Heilb. l. c.* 14.—Ecuador.
sulfurea *Bremek. & Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xvi. 414 (1935).—Bechuanaland Protect.
virens *Macbride in Candollea*, v. 360 (1934).—Peruv.
Welwitschii *Exell in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 279.—Angola.

CLERODENDRON L. (Verbenac.).
aculeatum (*L.*) *Schlecht. in Linnaea*, vi. 750 (1831): Volkameria aculeata.
adenocalyx *Dop in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iv. 883 (1935).—Indo-China (Laos).
arenarium *Baker in Journ. Bot.* 1882, xx. 243, in obs.—Madag.
bracteosum *Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl.* iii. 831 (1834).—Ind. or. (Malabar).
euryphyllum *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 679 (1932).—Tanganyika Terr.
grandicalyx *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1934, 306.—Uganda.
hainanense *Hand.-Mazz. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1931, lxxx. 343.—China (Hainan).
Henryi *P'ei in Mem. Sc. Soc. China*, i. No. 3 (Verbenac. China), 152 (1932).—China (Yunnan).
hispidum *M. R. Henderson in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 118 (1933).—Penins. Mal.
indeniense *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 274 (1931), in syn.: C. violaceum.
longilimbum *P'ei in Mem. Sc. Soc. China*, i. No. 3 (*Verbenac. China*) 151 (1932).—China (Yunnan).
longipetiolatum *P'ei, l. c.* 159.—China (Yunnan).
Morigono *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 98 (1935).—Kenya Col.
myrianthum *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 677 (1932).—Tanganyika Terr.
nhatrangense *Dop in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iv. 882 (1935).—Indo-China (Anam).
palmatolobatum *Dop, l. c.* 866.—Cambodia.
philippinense *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3223 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
Schifferi *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 275 (1931), in syn.: C. Buchholzii.
Schliebenii *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 678 (1932).—Tanganyika Terr.
streptocaulon *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 273, in clavi, 274 (1931).—Sierra Leone; Nigeria.
tatomense *Dop in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iv. 883 (1935).—Indo-China (Laos).

CLERODENDRON:—
tomentellum *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 272, in clavi, 273 (1931).—Nigeria.

CLETHRA L. (Clethrac.; Ericac., Gen. Pl.).
castanea *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3182 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
euosmoda *Dop in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse*, 1929, lviii. 146.—Indo-China (Tonkin).
Ledermannii *Schlechter in Engl. Jahrb.* lv. 194 (1918), in obs.: C. papuana *Schlechter.*
longebracteata *Sleum. in Fedde, Repert.* xxxviii. 205 (1935).—China (Chekiang).
longipedicellata *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 179 (1934).—Sumatra.
Petelotii *Dop & Y. Troch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 718.—Indo-China (Tonkin).
pubifolia *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 180 (1934).—Sumatra.

CLEYERA DC. (Theac.; Ternstroemiac., Gen. Pl.).
longicarpa (*Yamamoto*) *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 250: Sakakia longicarpa.
Matsudai *Hayata ex Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1933, v. 350, in syn.: Sakakia Hayatai.

CLIBADIUM L. (Compos.).
psilogynum *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 329.—Peruv.

CLIDEMIA D. Don (Melastomatac.).
biformis *Gleason in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1935, xxxii. 211.—Guiana Bat.
calcarata *Cogn. & Gleason in Am. Journ. Bot.* 1932, xix. 748.—Colomb.
charadrophila *Tutin in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 307.—Guiana Brit.
duidae *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 432.—Venez.
ferox *Gleason in Phytologia*, i. 175 (1935).—Bras. (Amaz.).
fissinervia *Gleason in Am. Journ. Bot.* 1932, xix. 748.—Boliv.
foliosa *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 84.—Peruv.
guatemalensis *Berg ex Cufod. in Archiv. Bot., Forli*, 1935, n. s. i. 85, in obs., nomen.—Costa Rica.
heterophylla (*Desr.*) *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 85: Melastoma heterophyllum.
heteropila *Steud. in Flora*, xxvii. 721 (1844).—Bras.
insularis *Domin in Acta Bot. Bohem.* ix. 43 (1930): Melastoma capillare *Sw.*
juruensis (*Pilger*) *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 84: Maieta juruensis.
laevifolia *Gleason in Am. Journ. Bot.* 1932, xix. 749.—Guiana Gall.
longifolia *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 254.—Peruv.
macropetala *R. O. Williams in Fl. Trinidad & Tobago*, i. 403 (1934).—Trinidad.
manoacensis *Kraenzl. in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 157.—Venez.
microthyrsa *R. O. Williams in Fl. Trinidad & Tobago*, i. 398 (1934).—Trinidad.
ostrina *Gleason in Phytologia*, i. 45 (1933).—Venez.
peruviana *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 255.—Peruv.
piperifolia *Gleason, l. c.* 433.—Venez.
procumbens *Gleason, l. c.* 255.—Peruv.
pubescens *Gleason, l. c.* 82.—Costa Rica.
pycnaster *Tutin in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 306.—Guiana Brit.
rigida *Cogn. & Gleason in Am. Journ. Bot.* 1932, xix. 750.—Colomb.?; Ecuador?
setosa (*Triana*) *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 82: Calophysa setosa.
spectabilis *Gleason, l. c.* 83.—Costa Rica.
Sprucei *Gleason, l. c.* 85: Calophysa dentata.
testiculata (*Triana*) *Gleason, l. c.* 80: Calophysa testiculata.
tococoidea (*DC.*) *Gleason, l. c.* 81: Calophysa tococoidea.

CLIFFORTIA L. (Rosac.).
acutifolia *Weimarck, Monogr. Gen. Cliffortia*, 132 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).

CLIFFORTIA :—
atrata *Weimarck in Bot. Notiser*, 1933, 150.—Afr. austr. (Cape Prov.).
brevifolia *Weimarck, l. c.* 162.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Browniana *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxi. 316 (1932).—Transvaal.
crenulata *Weimarck in Bot. Notiser*, 1933, 154.—Afr. austr. (Cape Prov.).
curvifolia *Weimarck, l. c.* 148.—Afr. austr. (Cape Prov.).
densa *Weimarck, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).
dodecandra *Weimarck, Monogr. Gen. Cliffortia*, 61 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
erectisepala *Weimarck in Bot. Notiser*, 1933, 163.—Afr. austr. (Cape Prov.).
filicauloides *Weimarck, l. c.* 146.—Natal.
glauca *Weimarck, l. c.* 144.—Afr. austr. (Cape Prov.).
heterophylla *Weimarck, l. c.* 158.—Afr. austr. (Cape Prov.).
hexandra *Weimarck, Monogr. Gen. Cliffortia*, 88 (1934).—Afr. austr.
integerrima *Weimarck, l. c.* 104.—Afr. austr. (Cape Prov.).
lanceolata *Weimarck in Bot. Notiser*, 1933, 157.—Afr. austr. (Cape Prov.).
longifolia (*Eckl. & Zeyh.*) *Weimarck, l. c.* 158: C. strobilifera var. longifolia.
monophylla *Weimarck, l. c.* 161.—Afr. austr. (Cape Prov.).
montana *Weimarck, Monogr. Gen. Cliffortia*, 46 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
multiformis *Weimarck in Bot. Notiser*, 1933, 155.—Afr. austr. (Cape Prov.).
paucistaminea *Weimarck, l. c.* 151.—Afr. austr.-or.
Phillipsii *Weimarck, l. c.* 160.—Afr. austr. (Cape Prov.).
pterocarpa (*Harv.*) *Weimarck, l. c.* 152: C. juniperina var. pterocarpa.
Rogersii *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxi. 316 (1932).—Transvaal.
stricta *Weimarck in Bot. Notiser*, 1933, 147.—Afr. austr. (Cape Prov.).
tenuis *Weimarck, l. c.* 145.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Theodori-Friesii *Weimarck, l. c.* 156.—Afr. austr. (Cape Prov.).
tuberculata (*Harv.*) *Weimarck, l. c.* 153: C. juniperina var. tuberculata.
Tychonis *Weimarck, l. c.* 1932, 20.—Rhodesia.
uncinata *Weimarck, l. c.* 1933, 164.—Afr. austr. (Cape Prov.).
virgata *Weimarck, Monogr. Gen. Cliffortia*, 111 (1934): C. cordifolia *E. Mey.*

CLINACANTHUS Nees (Acanthac.).
Spirei *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iv. 764 (1935).—Indo-China (Laos).

CLINELYMUS Nevski in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS, 1931, xxx. 640 (1932). *GRAMINEAE.*
atratus *Nevski, l. c.* 644.—China (Kansu).
borealis (*Scribn.*) *Nevski, l. c.* 645: Elymus borealis.
canadensis (*L.*) *Nevski, l. c.* 650: Elymus canadensis.
dahuricus (*Turcz.*) *Nevski, l. c.* 645: Elymus dahuricus.
excelsus (*Turcz.*) *Nevski, l. c.* 646: Elymus excelsus.
glaucus (*Buckley*) *Nevski, l. c.* 648: Elymus glaucus.
nutans (*Griseb.*) *Nevski, l. c.* 644: Elymus nutans.
sibiricus (*L.*) *Nevski, l. c.* 641: Elymus sibiricus.
tangutorum *Nevski, l. c.* 647.—China (Kansu).
velutinus (*Scribn. & Merrill*) *Nevski, l. c.* 649: Elymus velutinus.

CLINOPODIUM L. (Labiat.).
atropurpureum *Biroli ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 471 (1835).—Hab. ?
Fauriei (*Léveillé & Vaniot*) *Hara in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 106: Calamintha Fauriei.
hortense (*L.*) *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1011 (1931): Satureja hortensis.
macranthum (*Makino*) *Hara in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 110: C. chinense var. macranthum.
minimum *Hara, l. c.* 109.—Japon.

CLINOSTIGMA H. Wendl. (Palmae).
exorrhizum *Becc. ex Martelli in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1935, n. s. xlii. 22, 53; *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 592 (1935), in obs.—Hab. ?
Mooreanum (*F. Muell.*) *H. Wendl. & Drude in Linnaea*, xxxix. 218 (1875): Kentia Mooreana.
savaiiense *Christoph. in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 128, 28 (1935).—Samoa.
Seemannii *Becc. ex Martelli in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1934, n. s. xli. 712 (1935), nomen; *et l. c.* 1935, n. s. xlii. 39, 53: Kentia exorrhiza *Seem. Fl. Vit.* 269 (1868), non *H. Wendl.*
Vaupelii *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 593 (1935), in obs., nomen alternativ.—Samoa.
Warburgii *Becc. in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa*, Mem., 1934, xliv. 155: C. samoënse *Becc. in Webbia*, iii. 144 (1910), non *H. Wendl.*

CLINOSTIGMOPSIS Becc. in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa, Mem., 1934, xliv. 161. *PALMAE.*
Harlandi (*Becc.*) *Becc. l. c.* 163: Clinostigma Harlandi.
Thurstonii (*Becc.*) *Becc. l. c.* 162: Clinostigma Thurstonii.

CLINTONIA Rafin. (Liliac.).
alleghaniensis *Harned, Wild Fl. Allegh.* 117 (1931), hybr. ?—U.S.A. (Mont. Alleghany).

CLITANDRA Benth. (Apocynac.).
ivorensis *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 34 (1931), in clavi.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).

CLITORIA L. (Legumin.).
chapadensis *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 13, 82 (1931).—Bras. (Matto Grosso).
caelestis *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 208 (1894), in syn.: C. Ternatea.

CLIVIA Lindl. (Amaryllidac.).
cyrtanthiflora (*v. Houtte*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1005 (1895), in obs.: Imatophyllum cyrtanthiflorum.

CLOËZIA Brongn. & Gris (Myrtac.).
Morierei *Vieill. ex Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 9, in syn.: Mooria canescens.

CLUSIA L. (Guttif.).
belizensis *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 72 (1935).—Brit. Honduras.
duidae *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 402.—Venez.
hexacarpa *Gleason, l. c.* 403.—Venez.
Lundellii *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 72 (1935).—Guatem.; Brit. Honduras.
Melchiori *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 403.—Venez.
pachyphylla *Gleason, l. c.* 405.—Venez.
platystigma *Eyma, Polygonac. Guttif. & Lecythidac. Surinam*, 25 (1932).—Guiana Bat. et Gall.
robusta *Eyma, l. c.* 29.—Guiana Bat.
rotundifolia *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 406.—Venez.

CLUYTIANDRA Muell.-Arg. (Euphorbiac.).
capillariformis (*Vatke & Pax*) *Pax & K. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 31 (1921), in obs.: Phyllanthus capillariformis.

CLYTOSTOMA Miers (Bignoniac.).
elegans *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 86 (1935).—Brit. Honduras.
mayanum *Standley, l. c.*—Guatem.; Brit. Honduras.
pterocalyx *Sprague ex Urb. in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 1916, xxxiv. 741, in obs.—Colomb.

CNESTIS Juss. (Connarac.).
angolensis *Schellenb. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 320 (1915), in obs.—Angola.
potatorum *Watt, Dict. Econ. Prod. Ind.* ii. 259 (1889), in obs., nomen.—Ind. or.

CNICUS L. (Compos.).
Forsteri *Sm. Engl. Fl.* iii. 390 (1825).—Anglia.
helenioides (*L.*) *Retz. Fl. Scand. Prodr.* ed. 2, 191 (1795): Carduus helenioides.
heterophyllus (*L.*) *Retz. l. c.*: Carduus heterophyllus.

CNICUS :—
turkestanicus *C. Winkler ex Petrak in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1910, xl. 355, in syn.: Cirsium turkestanicum.

CNIDIUM Cusson (Umbellif.).
filisectum *Nakai & Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. i. (*Pl. Nov. Jehol.* i), 35 (1934): Seseli Tachiroei *Komarov in Acta Hort. Petrop.* xxv. 150 (1905), non *Franch. & Sav.*
jeholense *Nakai & Kitagawa, l. c.* 38.—Manchur. (Jehol).
yakushimense *Masamune & Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 66.—Japon. (Kiushiu).

CNIDOSCOLUS Pohl (Euphorbiac.).
acrandrus (*Urb.*) *Pax & K. Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix c. 167 (1931): Jatropha acrandra.
adenophilus *Pax & K. Hoffm. l. c.* 166, nomen.—Panamá.
appendiculatus *Pax & K. Hoffm. l. c.* 164, nomen.—Parag.
bahianus (*Ule*) *Pax & K. Hoffm. l. c.*: Jatropha bahiana.
campanulatus *Pax, l. c.*, nomen.—Argent.
Hasslerianus *Pax, l. c.*, nomen.—Parag.
horridus (*Muell.-Arg.*) *Pax & K. Hoffm. l. c.*: Jatropha horrida.
hypoleucus *Pax, l. c.*, nomen.—Peruv.
Kunthianus (*Muell.-Arg.*) *Pax & K. Hoffm. l. c.* 165: Jatropha Kunthiana.
leuconeurus *Pax & K. Hoffm. l. c.* 164, nomen.—Parag.
Loefgrenii *Pax & K. Hoffm. l. c.* 166, nomen.—Bras. (S. Paulo).
maracayensis (*Chod. & Hassl.*) *Pax & K. Hoffm. l. c.* 164: Jatropha maracayensis.
oligandrus (*Muell.-Arg.*) *Pax, l. c.* 166: Jatropha oligandra.
paucistamineus *Pax, l. c.*, nomen.—Bras. (Matto Grosso).
peruvianus (*Muell.-Arg.*) *Pax & K. Hoffm. l. c.* 164: Jatropha peruviana.
phyllacanthus (*Muell.-Arg.*) *Pax & K. Hoffm. l. c.* 165: Jatropha phyllacantha.
pubescens *Pax, l. c.* 166, nomen.—Bras. (Rio de Janeiro).
serrulatus *Pax & K. Hoffm. l. c.* 164, nomen.—Parag.
subinteger (*Pax & K. Hoffm.*) *Pax & K. Hoffm. l. c.*: Jatropha subintegra.
Ulei *Pax, l. c.*, nomen.—Bras. (Bahia).
urniger *Pax, l. c.* 166, nomen.—Bras. (Bahia).

COBURGIA Herb. ex Sims in Bot. Mag. sub t. 2113 [1819]. *AMARYLLIDACEAE.*
[AMARYLLIS auct., non L.]
Belladonna (*L.*) *Herb. ex Sims, l. c.*: Amaryllis Belladonna.
blanda (*Ker-Gawl.*) *Herb. ex Sims, l. c.*: Amaryllis blanda.
ciliaris (*L.*) *Herb. ex Sims, l. c.*: Amaryllis ciliaris.
Josephinae (*Red.*) *Herb. ex Sims, l. c.*: Amaryllis Josephinae.
multiflora (*Ait.*) *Herb. ex Sims, l. c.*: Brunsvigia multiflora.
pallida (*Red.*) *Herb. in Trans. Hort. Soc.* iv. 181 [1821]: Amaryllis pallida.
pudica (*Ker-Gawl.*) *Herb. ex Sims in Bot. Mag.* sub t. 2113 [1819]: Amaryllis pudica.
Radula (*Jacq.*) *Herb. ex Steud. Nomencl. Bot.* ed. 2, i. 390 (1840): Amaryllis Radula.
reticulata *Herb. ex Sims in Bot. Mag.* sub t. 2113 [1819].—Hab. ?

COBURGIA Herb. ex Sims emend. Herb. in Herb. Appendix, 34 (1821). *AMARYLLIDACEAE.*
[LEOPOLDIA Herb.]
reticulata (*L'Hérit.*) *Herb. l. c.*: Amaryllis reticulata.
striatifolia (*Sims*) *Herb. l. c.*: Amaryllis reticulata var. striatifolia.

COBURGIA Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 17 (1829). *AMARYLLIDACEAE.*
[STENOMESSON Herb.]
acuta *Herb. in Bot. Mag.* sub t. 3865 (1841).—Hab. ?

COBURGIA:—
angusta *Herb. in Bot. Reg.* xxviii. Misc., 55 (1842). —Peruv.
chachapoyensis *Herb. l. c.* 53.—Peruv.
coccinea *Herb. in Bot. Mag.* t. 3865 (1841).—Peruv.
coccinea (*Ruiz & Pav.*) *Herb. in Bot. Reg.* xxviii. Misc., 54 (1842): Pancratium coccineum.
discolor *Herb. Amaryll.* 197 (1837).—Chile; Boliv.
flava *Hort. ex Heynh. Nomencl. Bot. Hort.* ii. 151 (1846), nomen.—Hab.?
fulva *Herb. in Bot. Reg.* xviii. t. 1497 (1832).—Am. austr.
humilis (*Herb.*) *Herb. l. c.* xxviii. Misc., 55 (1842): Clitanthes humilis.
incarnata (*H. B. & K.*) *Sweet, Brit. Flow. Gard.* Ser. II. t. 17 (1829): Pancratium incarnatum.
laeta *Herb. in Bot. Reg.* xxviii. Misc., 53 (1842).—Peruv.
langensis *Herb. l. c.*—Peruv.
lutea (*Herb.*) *Herb. l. c.* 55: Clinanthus luteus.
Macleanica (*Herb.*) *Herb. l. c.*: Clitanthes Macleanica.
miniata *Lindl. Bot. Reg.* xxx. Misc., 13 (1844).—Peruv.
obragillensis *Herb. in Bot. Reg.* xxviii. Misc., 54 (1842).—Peruv.
praecipitata *Herb. l. c.*: C. coccinea *Herb.* (1841).
quitensis (*Willd. ex Schult. f.*) *M. Roem. Syn. Ensat.* 165 (1847): Pancratium quitense.
recurvata (*Ruiz & Pav.*) *Herb. in Bot. Reg.* xxviii. Misc., 54 (1842): Pancratium recurvatum.
splendens *Herb. Amaryll.* 400 (1837).—Peruv.
stylosa *Lindl. in Journ. Hort. Soc.* ii. 310 (1847).—Ecuador.
trichroma (*Cerv.*) *Herb. Amaryll.* 196 (1837): Pancratium trichromum.
variegata (*Ruiz & Pav.*) *Herb. l. c.*: Pancratium variegatum.
venusta *Herb. in Bot. Reg.* xxviii. Misc., 54 (1842). —Peruv.
versicolor *Herb. l. c.* 53.—Peruv.

COCCINIA Wight & Arn. (Cucurbitac.).
calophylla *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 522 (1935).—Tanganyika Terr.
longipetiolata *Chiov. Fl. Somala*, II. 223 (1932).—Somal. Ital.
Schliebenii *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 685 (1932).—Tanganyika Terr.
ulugurensis *Harms, l. c.* xi. 1091 (1934).—Tanganyika Terr.

COCCOCYPSELUM Sw. (Rubiac.).
pumilio *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot Ser., viii. 346 (1931).—Bras. (Paraná).

COCCOLOBA L. (Polygonac.).
ceibensis *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxxii. 81 (1933).—Santo Domingo.
filipes *Standley in Tropical Woods*, 1934, No. 40, 14. —Colomb.
firma *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* v. 48 (1836), in obs.—Bras.
gymnorrhachis *Sandwith in Kew Bull.* 1932, 221.—Guiana Brit. et Bat.
micropunctata *Eyma, Polygonac. Guttif. & Lecythidac. Surinam*, 9 (1932).—Guiana Bat.
nalgensis *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxxii. 80 (1933).—Santo Domingo.
samanensis *O. C. Schmidt, l. c.* 81.—Santo Domingo.
squamosa *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* v. 48 (1836), in obs.—Bras.

COCHEMIEA Walton (Cactac.).
maritima *H. E. Gates ex Shurly in Cactus Journ.* iv. 12 (1935), in obs.—Calif. infer.

COCHLEARIA L. (Crucif.).
alatipes *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 370 (1931).—China (Kweichau; Hunan; Kwangsi).
campylopoda *Bornm. & Gauba in Fedde, Repert.* xxxvi. 339 (1934).—Persia.
scoriarum (*W. W. Smith*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 359, 371 (1931), in obs.: Cardamine scoriarum.

COCHLOSPERMUM Kunth (Cochlospermac.; Bixac., Gen. Pl.).
religiosum (*L.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 14 (1931): Bombax religiosum.
Williamsii *Macbride in Candollea*, v. 388 (1934).—Peruv.

COCOS L. (Palmae).
Poni *Hauman in Bull. Soc. Bot. Belg.* lxiv. 39 (1931), in obs.—Argent.

CODAZZIA Karst. & Triana in Triana, Nuev. Jen. i Esp. Fl. Neo-Granad. 17 (1854); Karst. in Linnaea, xxviii. 426 (1857); Sprague in Kew Bull. 1934, 395. *BIGNONIACEAE.*
rosea *Karst. & Triana, l. c.* 18; *Karst. l. c.* 427; *Sprague, l. c.*—Colomb.
speciosa *Karst. & Triana, l. c.*; *Karst. l. c.*; *Sprague, l. c.*—Colomb.

CODONACANTHUS Nees (Acanthac.).
spicatus *Hand.-Mazz. in Sinensia*, v. 13 (1934).—China (Kwangsi).

CODONANTHE Hanst. (Gesneriac.).
bipartita *L. B. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 657.—Guiana Brit.
confusa *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 492.—Am. trop.

CODONANTHOPSIS Mansf. in Fedde, Repert. xxxvi. 120 (1934). *GESNERIACEAE.*
Huebneri *Mansf. l. c.*—Bras. (Amaz.).
Ulei *Mansf. l. c.*—Bras. (Amaz.).

CODONOPSIS Wall. in Roxb. Fl. Ind., ed. Carey & Wall., ii. 103 (1824). *CAMPANULACEAE.*
alpina *Nannf. in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 154 (1931).—Tibet.
macrantha *Nannf. l. c.* 157.—Tibet.
purpurea *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 105 (1824).—Reg. Himal.
thalictrifolia *Roxb. l. c.* 106.—Reg. Himal.
viridis *Wall. in Roxb. l. c.* 103.—Reg. Himal.

COELACHNE R. Br. (Gramin.).
Friesiorum *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1935, 307. —Kenya Col.
Meeboldii *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1934, 169. —Ind. or. (Cochin).

COELACHYRUM Nees (Gramin.).
oligobrachiatum *A. Camus in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 546.—Sudan. Gall.

COELIDIUM Vog. ex Walp. (Legumin.).
cymbifolium *C. A. Smith in Kew Bull.* 1931, 98.—Afr. austr. (Cape Prov.).

COELOGYNE Lindl. (Orchidac.).
albobrunnea *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 103 (1931).—Borneo.
brevilamellata *J. J. Smith, l. c.* 102.—Borneo.
calcicola *Kerr in Journ. Siam Soc., Nat. Hist. Suppl.*, ix. 233 (1933).—Indo-China (Laos).
contractipetala *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 107 (1932).—Sumatra.
craticulilabris *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 214 (1935).—Borneo.
cuneata *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 97 (1931).—Borneo.
dulitensis *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 73 (1935).—Borneo.
Endertii *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 94 (1931).—Borneo.
hirtella *J. J. Smith, l. c.* 105.—Borneo.
ingloria *J. J. Smith, l. c.* 95.—Borneo.
kutaiensis *J. J. Smith, l. c.* 99.—Borneo.
lacinulosa *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxv. 463 (1933).—Celebes.
membranifolia *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 2 (1932).—Penins. Mal.
monilirachis *Carr, l. c.* viii. 206 (1935).—Borneo.
monticola *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxv. 462 (1933).—Celebes.
Naja *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 93 (1931).—Borneo.
obtusifolia *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 205 (1935).—Borneo.
pendula *Summerhayes ex Parry, The Lakhers*, 606 (1932), nomen.—Ind. or. (Assam).
pinniloba *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 98 (1931).—Borneo.

COELOGYNE:—
planiscapa *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 74 (1935).—Borneo.
radiosa *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 105 (1931).—Borneo.
Remediosae *Ames & Quisumb. in Philipp. Journ. Sc.* 1932, xlix. 484.—Ins. Philipp. (Luzon).
Ridleyi *Gagnep. in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, vi. 320 (1933): C. annamensis *Ridley*.
rupicola *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 210 (1935).—Borneo.
Steenisii *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 108 (1932).—Sumatra.
tenompokensis *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 203 (1935).—Borneo.
Zurowetzii *Carr in Orch. Rev.* 1934, xlii. 44.—Borneo.

COFFEA L. (Rubiac.).
angustifolia *Roxb. Hort. Beng.* 86 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 195 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 541 (1832).—Arch. Mal.
Becquetii *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1934, xiv. 354.—Congo Belg.
bengalensis *Roxb. Hort. Beng.* 15 (1814), nomen; *Heyne & Willd. in Roem. & Schult. Syst. Veg.* v. 200 (1819), descr.—Ind. or. (Bengal).
Claessensii *Lebrun in Ann. Soc. Sc. Brux.* liii. Sér. B, 149 (1933).—Congo Belg.
diversifolia *Jumelle in Ann. Mus. Col. Marseille*, 1933, Sér. V. i. Fasc. 4, 12.—Madag.
Dubardi *Jumelle, l. c.* 10.—Madag.
kivuensis *Lebrun in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxii. 44 (1932).—Congo Belg.
pedunculata *Roxb. Hort. Beng.* 86 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 195 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 541 (1832).—Ins. Molucc.
Pervilleana *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxxvi. (*Hist. Nat. Pl.* vi. Atlas iv.) t. 415 (1897).—Madag.
semi-exserta *Colebr. ex Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 195 (1824).—Ind. or. (Assam).
tetrandra *Roxb. Hort. Beng.* 85 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 193 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 538 (1832).—Ind. or. (Bengal).
Thonneri *Lebrun in Ann. Soc. Sc. Brux.* liii. Sér. B, 150 (1933).—Congo Belg.
van-Roechoudtii *Lebrun in Rev. Agrol. & Bot. Kivu*, No. 1, 30 (1932).—Congo Belg.

COGSWELLIA Schult. (Umbellif.).
minima *Mathias in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1932, xix. 497.—U.S.A. (Utah).

COLA Schott & Endl. (Sterculiac.).
pseudo-acuminata *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 465 (1921), in obs.: C. acuminata.
reticulata *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 254 (1917).—Guinea Gall.; Côte d'Ivoire.
Rolandi-principis *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 255 (1928), in syn.: C. angustifolia.

COLANIA Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 1934, Sér. II. vi. 190. *LILIACEAE.*
tonkinensis *Gagnep. l. c.*—Indo-China (Tonkin).

COLCHICUM L. (Liliac.).
acutifolium *Siehe ex Stefanoff, Monogr. Colch.* (*Sborn. B'lghar. Akad. Nauk.* xxii.) 34 (1926), in obs.—As. Min. (Cappadocia).
atropurpureum *Stapf ex Stearn in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 341.—Hab.?
callicymbium *Stearn & Stefanoff, l. c.* 343.—Thessal.; Macedon.
cantacujense *Heldr. ex Stefanoff, Monogr. Colch.* (*Sborn. B'lghar. Akad. Nauk.* xxii.) 40 (1926), in obs.—Macedon.
giganteum *Hort. ex Stefanoff, l. c.* 82, in obs.—Libanus.
imperatoris-Friderici *Siehe ex Stefanoff, l. c.* 80, in syn.: C. speciosum.
lenkoranicum (*Miscz.*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 191 (1928): C. speciosum var. lenkoranicum.
Lockmanni *Siehe ex Stefanoff, Monogr. Colch.* (*Sborn. B'lghar. Akad. Nauk.* xxii.) 33 (1926), in obs.—As. Min. (Cilicia).

COLCHICUM:—
pantocratoris *Spreitz. ex Stefanoff, Monogr. Colch. (Sborn. B'lghar. Akad. Nauk.* xxii.) 70 (1926), in obs.—Graecia (Ins. Cephalonia).
Pieperianum *Markgraf in Denkschr. Akad. Wiss. Wien, Math.-Nat.* cii. 328 (1931).—Albania.
Schimperi *Janka in Magyar Nov. Lapok*, vi. Nos. 69, 70, p. 117 (1882), in obs., nomen; *Stefanoff, Monogr. Colch. (Sborn. B'lghar. Akad. Nauk.* xxii.) 31 (1926), descr.—Arab.
Sieheanum *Hausskn. ex Stefanoff, l. c.* 47.—As. Min. (Cilicia).
syriacum *Siehe ex Stefanoff, l. c.* 34, in obs.—As. Min. (Cappadocia).
Szowitzianum *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1117 (1895), in syn.: C. byzantinum.
trigynum (*Adam*) *Stearn in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 344: Bulbocodium trigynum.
vranjanum *Adam. ex Stefanoff, Monogr. Colch. (Sborn. B'lghar. Akad. Nauk.* xxii.) 74 (1926), in obs.—Serbia.
zangezurum *Grossheim ex Stefanoff, l. c.* 36, in obs.; *Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 191 (1928).—Armen.

COLDENIA L. (Boraginac.).
conspicua *I. M. Johnston in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 183.—Peruv.
loretensis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 65 (1933–5).—Calif. infer.

COLEA Boj. (Bignoniac.).
pinnatifolia *Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste Braz.* iii. 119 (1923) [*Insp. Fed. Obras Secc.* Publ. 57], nomen; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 151.—Bras.

COLEOSANTHUS Cass. (Compos.).
amplexicaulis (*B. L. Robinson*) *G. Ortega, Apuntes Fl. Indig. Sinaloa (Cat. Sist. Pl. Sinaloa)* 27 (1929): Brickellia amplexicaulis.

COLEUS Lour. (Labiat.).
andongensis (*Hiern*) *G. Taylor in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl. 2, 158: Germanea andongensis.
Caillei *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 291, in clavi, 292 (1931).—Guinea Gall.
casamancicus *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, l. c.* 291, in clavi.—Senegal.
Chevalieri *Briq. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 287 (1917).—Afr. Gall. Centr.
copiosiflorus *Briq. l. c.* 288.—Afr. Gall. Centr.
Daviesii *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1933, 477.—Tanganyika Terr.
drymophilus *G. Taylor in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl. 2, 160.—Angola.
equisetiformis *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1935, 285.—Tanganyika Terr.
esculentus (*N. E. Brown*) *G. Taylor in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl. 2, 158: Plectranthus esculentus.
Frederici *G. Taylor, l. c.* 159: Neomuellera Welwitschii *Briq.*, non Coleus Welwitschii *Briq.*
herbaceus (*Briq.*) *G. Taylor, l. c.* 158: Plectranthus herbaceus.
× hybridus *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 844 (1895), in syn.: C. scutellarioides.
koualensis *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 290, in clavi, 291 (1931).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
lageniocalyx *Briq. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 292 (1917).—Afr. Gall. Centr.
luteus (*Gürke*) *Staner in Bull. Agric. Congo Belge*, 1934, xxv. 426: Plectranthus luteus.
myrianthellus *Briq. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 290 (1917).—Afr. Gall. Centr.
petiolatissimus *Briq. l. c.* 291.—Afr. Gall. Centr.
phymatodes *Briq. l. c.* 289.—Afr. Gall. Centr.
Pobeguinii *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 291, in clavi, 292 (1931).—Guinea Gall.
stachyoides (*Oliv.*) *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1934, 306: Plectranthus stachyoides.

COLLABIUM Blume (Orchidac.).
uraiense *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 300.—Formosa.

COLLADONIA DC. (Umbellif.).
longiradiata *H. Wolff ex Bornm. in Engl. Jahrb.* lxvii. 293 (1935), in obs., pro syn.: C. crenata.
macedonica *Bornm. l. c.* 291.—Macedon.

COLLAEA Bert. ex Colla, Herb. Pedem. iv. 95 (1835), in syn., sine descr.: **Ardisia** Sw. (Myrsinac.).
Laureola *Bert. ex Colla, l. c.*, in syn.: Ardisia coriacea.

COLLOCOCCUS P. Br.; H. Hallier in Meded. Herb. Leid. No. 36, 2 (1918): **Cordia** L. (Boraginac.).
glaber (*L.*) *Friesen in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1931–2, Sér. II. xxiv. 136 (1933), in obs.: Cordia glabra.

COLLOMIA Nutt. (Polemoniac.).
Hurdlei *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1931, xviii. 435.—U.S.A. (Idaho).

COLLOSPERMUM Skottsb. in Svensk. Vet.-Akad. Handl. Ser. III. xiv. No. 2, 72 (1934). *LILIACEAE.*
hastatum (*Colenso*) *Skottsb. l. c.* 77: Astelia hastata.
microspermum (*Colenso*, pro parte) *Skottsb. l. c.* 82: Astelia microsperma.
montanum (*Seem.*) *Skottsb. l. c.* 73: Astelia montana.
samoënse *Skottsb. l. c.* 75.—Samoa.
spicatum (*Colenso*) *Skottsb. l. c.* 80: Astelia spicata.

COLOCASIA Schott (Arac.).
zebrina *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1168 (1895), in syn.: Alocasia zebrina.

COLONA Cav. (Tiliac.).
isodiametrica *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 162 (1934).—Celebes.

COLPODIUM Trin. (Gramin.).
araraticum (*Lipsky*) *Woronow ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 112 (1928): Catabrosa araratica.
caucasicum (*Alboff*) *Woronow ex Grossheim, l. c.* 111: Catabrosa caucasica.
chrysanthum *Woronow in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 213 (1933).—Caucas.
colchicum (*Alboff*) *Woronow ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 111 (1928): Catabrosa colchica.
lakium *Woronow in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 214 (1933).—Caucas.
leucolepis *Nevski in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1934, n. s. xliii. 224.—Pamir.
mucronatum (*Hackel*) *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 558 (1896), cum descr.: Arctophila mucronata.
ornatum *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 441, 757 (1934).—Ross. asiat. centr.
pamiricum *Litw. ex Krecz. in Komarov, l. c.* 474, in syn.: Atropis pamirica.
Schelkownikowii *Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 277 (1928).—Caucas.
Vahlianum (*Liebm.*) *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 436 (1934): Poa Vahliana.
versicolor (*Stev.*) *Woronow ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 111 (1928): Agrostis versicolor.

COLUMBIA Pers. (Tiliac.).
Burreti *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 669: Microcos scabra.
scabra (*Sm.*) *Kanehira, l. c.* 1931, xlv. 295: Microcos scabra.

COLUMELLA Lour. (Vitac.; Ampelidac., Gen. Pl.).
palauana *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 244.—Ins. Palau.
retivenia (*Planch.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 52 (1931): Cissus retivenia.

COLUMNEA L. (Gesneriac.).
archidonae *Cuatrec. in An. Univ. Madrid*, iv. Fasc. 2, 245 (1935).—Ecuador.
Ericae *Mansf. in Fedde, Repert.* xxxvi. 123 (1934).—Ecuador.
Isernii *Cuatrec. in An. Univ. Madrid*, iv. Fasc. 2, 247 (1935).—Ecuador.
longiflora *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 798 (1895), in syn.: C. Schiedeana.
picta (*Lem.*) *Voss in Vilmorin, l. c.*: Collandra picta.
Schimpffii *Mansf. in Fedde, Repert.* xxxvi. 122 (1934).—Ecuador.
sericea *Mansf. l. c.* xxxviii. 26 (1935), in obs.—Bras.

COLUMNEA:—
spectabilis *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 798 (1895), in syn.: C. Schiedeana.
Tessmannii *Mansf. in Fedde, Repert.* xxxvi. 123 (1934).—Peruv.
Trollii *Mansf. l. c.* 122.—Boliv.
Tusilla *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 29, 14 (1935).—Colomb.
Ulei *Mansf. in Fedde, Repert.* xxxviii. 26 (1935).—Bras. (Ceará).
villosissima *Mansf. l. c.* xxxvi. 121 (1934).—Peruv.
Weberbaueri *Mansf. l. c.* xxxviii. 26 (1935).—Peruv.

COLURIA R. Br. (Rosac.).
oligocarpa (*J. Krause*) *Bolle in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 210 (1931): Geum oligocarpum.

COMANTHOSPHACE S. Moore (Labiat.).
formosana *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 67: C. stellipila *Yamamoto, Suppl. Ic. Pl. Formos.* iv. 21 (1928), non *S. Moore.*
tosaënsis *Makino ex Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 118.—Japon.

COMARELLA Rydb. (Rosac.).
multifoliolata (*Torr.*) *Rydb. in Mem. Dept. Bot. Columb. Univ.* ii. 156 (1898): Horkelia multifoliolata.

COMATOGLOSSUM (Comatoglosum) Karst. & Triana in Triana, Nuev. Jen. i Esp. Fl. Neo-Granad. 10 (1854); Karst. in Linnaea, xxviii. 436 (1857); Sprague in Kew Bull. 1934, 395. *SAPINDACEAE.*
strictum *Karst. & Triana, l. c.* 11; *Karst. l. c.* 437; *Sprague, l. c.*—Colomb.

COMBRETUM L. (Combretac.).
acutifolium *Exell in Journ. Bot.* 1933, lxxi. Suppl. 1, 232.—Angola.
andongense *Engl. & Diels in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 703 (1921), in obs.—Angola.
angustipetalum *Chiov. Fl. Somala*, II. 215 (1932).—Somal. Ital.
borneënse *Exell in Journ. Bot.* 1931, lxix. 265.—Borneo.
bracteolum *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 714 (1921), in obs.: an C. bracteosum.
Cacoucia *Exell in Kew Bull.* 1931, 469: Cacoucia coccinea *Aubl.*
copaliferum *Chiov. Fl. Somala*, II. 212 (1932).—Somal. Ital.
Eilkeri *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 705 (1921), in obs., sphalm.: C. Eilkerianum *Schinz.*
elgonense *Exell in Kew Bull.* 1932, 491.—Afr. trop. or. (Elgon).
erythrophloeum *Gilg & Lederm. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 701 (1921), in obs.—Cameroons.
Frommii *Gilg ex Engl. l. c.* 700, in obs.—Tanganyika Terr.
incertum *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 594 (1933).—China (Yunnan; Kweichau; Kwangsi).
Lebrunii *Exell in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxi. 90 (1931).—Congo Belg.
leuconeurum *Gilg & Lederm. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 702 (1921), in obs.—Cameroons.
Leutweini *Schinz in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 878 (1901).—Hereroland.
linyenense *Hand.-Mazz. in Sinensia*, iii. 195 (1933).—China (Kwangsi).
Llewelyni *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 31 (1931).—Peruv.
luluense *Exell in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxi. 90 (1931).—Congo Belg.
Luxenii *Exell in De Wild. & Staner, Contrib. Fl. Katanga*, Suppl. iv. 77 (1932); *et in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 163.—Congo Belg.
makindense *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 703 (1921), in obs.—Kenya Col.
Mardaf *Chiov. Fl. Somala*, II. 214 (1932).—Somal. Ital.

COMBRETUM:—
Mortehani *De Wild. & Exell in De Wild. Pl. Bequaert.* v. 350 (1931).—Congo Belg.
niphophilum *Gilg & Lederm. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 711 (1921), in obs.—Cameroons.
omehekae *Gilg & Dinter ex Engl. l. c.* 698, in obs. —Afr. austr.-occ.
parviflorum *Reichb. Ic. Bot. Exot.* Cent. 1. 46, t. 62 (1825).—Senegal.
psidioides *Welw. in Bol. & Ann. Conselho Ultram., Lisb.*, May 1856, Ser. I. No. 24, parte não official, p. 249, No. 108 (1856); *Engl. & Diels in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* iii. 51 (1899).—Angola.
purpurascens *Hand.-Mazz. in Sinensia*, iii. 194 (1933).—China (Kwangsi).
Riggenbachianum *Gilg & Lederm. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 699 (1921), in obs.—Nigeria; Cameroons.
Ritschardii *De Wild. & Exell in De Wild. Pl. Bequaert.* v. 366 (1932).—Congo Belg.
Sennii *Chiov. Fl. Somala*, II. 211 (1932).—Somal. Ital.
Struempellianum *Gilg & Lederm. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 701 (1921), in obs.—Cameroons.
subglomeruliflorum *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 372 (1932).—Congo Belg.
tenuifolium *Exell in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 163.—Congo Belg.
Tessmannii *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 710 (1921), in obs.—Guinea Hispan.
tibatiense *Gilg & Lederm. ex Engl. l. c.* 701, in obs. —Cameroons.
villosissimum (*Engl. & Diels*) *Engl. l. c.* 705, in obs.: C. nervosum var. villosissimum.
Wittei *Exell in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxi. 89 (1931).—Congo Belg.
Youngii *Exell in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 42.—Congo Belg.
yunnanense *Exell in Sunyatsenia*, i. 88 (1933).—China (Yunnan).

COMMELINA L. (Commelinac.).
acutispatha *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 164 (1931).—Congo Belg.
caespitosa *Roxb. Hort. Beng.* 5 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 178 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 174 (1832).—Ind. or.
Claessensi *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 173 (1931).—Congo Belg.
deflexa *Rusby in Phytologia*, i. 50 (1934).—Boliv.
elgonensis *Bullock in Kew Bull.* 1932, 506.—Afr. trop. or. (Elgon).
gigas *Small, Man. Southeast. Fl.* 264 (1933).—U.S.A. (Florida).
herbacea *Roxb. Hort. Beng.* 5 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 179 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 175 (1832).—Sumatra.
irumuensis *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 183 (1931).—Congo Belg.
kabarensis *De Wild. l. c.* 184.—Congo Belg.
kisantuensis *De Wild. l. c.* 189.—Congo Belg.
Lugardii *Bullock in Kew Bull.* 1932, 506.—Afr. trop. or. (Elgon).
luteiflora *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 193 (1931).—Congo Belg.
luzonensis *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3184 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
moluccana *Roxb. Hort. Beng.* 81 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 176 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 172 (1832).—Ins. Molucc.
nana *Roxb. l. c.* 5, nomen; *et l. c.*; *et l. c.* 173.—Ind. or.
Pynaerti *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 199 (1931).—Congo Belg.
Reygaerti *De Wild. l. c.* 201.—Congo Belg.
ruandensis *De Wild. l. c.* 204.—Congo Belg.
rupicola *Font Quer in Cavanillesia*, vii. 149 (1935). —Marocc.
salicifolia *Roxb. Hort. Beng.* 5 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 176 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 172 (1832).—Ind. or.
saxosa *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 206 (1931).—Congo Belg.

COMMELINA:—
scapiflora *Roxb. Hort. Beng.* 5 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 178 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 175 (1832).—Ind. or.
Schliebenii *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 396 (1932).—Tanganyika Terr.
Vermoeseni *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 215 (1931).—Congo Belg.

COMMICARPUS Standley (Nyctaginac.).
chinensis (*L.*) *Heimerl in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 117 (1934): Valeriana chinensis.
crassifolius *Heimerl in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 461 (1932).—Boliv.
pentandrus (*Burch.*) *Heimerl in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 117 (1934): Boerhaavia pentandra.

COMMIPHORA Jacq. (Burserac.).
acuminata *Mattick in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 656 (1935).—Tanganyika Terr.
acutifoliolata *Mattick, l. c.* 708.—Tanganyika Terr.
Agar *Chiov. Fl. Somala*, II. 119 (1932).—Somal. Ital.
airica *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 584.—Sudan. (Haut-Sénégal-Niger).
ancistrophora *Chiov. Fl. Somala*, II. 111 (1932).—Somal. Ital.
anfractuosa *Chiov. l. c.* 99.—Somal. Ital.
assaortensis *Chiov. l. c.* 64.—Erythraea.
atramentaria *Chiov. l. c.* 76.—Somal. Ital.
Bricchettii *Chiov. l. c.* 58.—Somal. Ital.
caerulea *B. D. Burtt in Kew Bull.* 1935, 111.—Tanganyika Terr.
Cassan *Chiov. Fl. Somala*, II. 122 (1932).—Somal. Ital.
cerasiformis *Chiov. ex Guidotti in Riv. Ital. Ess. e Prof.* xiii. 233 (1931), nomen; *Chiov. Fl. Somala*, II. 104 (1932), descr.—Somal. Ital.
Cornii *Chiov. apud Guidotti, l. c.*, in obs.; *Chiov. l. c.* 96.—Somal. Ital.
coronillifolia *Chiov. ex Guidotti, l. c.*, nomen; *Chiov. l. c.* 101, descr.—Somal. Ital.
crenulata (*Terracc.*) *Chiov. Fl. Somala*, II. 75 (1932), cum descr. ampl.: C. abyssinica var. crenulata.
cuneaphylla *Chiov. ex Guidotti in Riv. Ital. Ess. e Prof.* xiii. 233 (1931), nomen.—Somal. Ital.
cyclophylla *Chiov. ex Guidotti, l. c.*, nomen; *Chiov. Fl. Somala*, II. 88 (1932), descr.—Somal. Ital.
enneaphylla *Chiov. Fl. Somala*, II. 78 (1932).—Somal. Ital.
fragariifolia *Mattick in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 664 (1935).—Tanganyika Terr.
Gorinii *Chiov. Fl. Somala*, II. 108 (1932).—Somal. Ital.
Guidottii *Chiov. ex Guidotti in Riv. Ital. Ess. e Prof.* xiii. 232 (1931), in obs.; *Chiov. Fl. Somala*, II. 91 (1932).—Somal. Ital.
Gurreh *Engl.*; *Chiov. Fl. Somala*, II. 85 (1932), descr. ampl.—Somal. Ital.
hirtella *Chiov. l. c.* 110.—Somal. Ital.
Hornbyi *B. D. Burtt in Kew Bull.* 1935, 112.—Tanganyika Terr.
horrida *Chiov. Fl. Somala*, II. 87 (1932).—Somal. Ital.
julifera *Chiov. l. c.* 59.—Somal. Ital.
lughensis *Chiov. l. c.* 105.—Somal. Ital.
microcarpa *Chiov. l. c.* 126.—Somal. Ital.
missionis *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 17 (1935).—Kenya Col.
oddurensis *Chiov. ex Guidotti in Riv. Ital. Ess. e Prof.* xiii. 233 (1931), nomen; *Chiov. Fl. Somala*, II. 71 (1932), descr.—Somal. Ital.
ogadensis *Chiov. Fl. Somala*, II. 103 (1932).—Abyss.
palmatifoliolata *Chiov. l. c.* 121.—Somal. Ital.
reflexa *Chiov. l. c.* 88.—Somal. Ital.
retifolia *Chiov. l. c.* 54.—Somal. Ital.
ruahensis *Mattick in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 661 (1935).—Tanganyika Terr.
Ruspolii *Chiov. Fl. Somala*, II. 116 (1932).—Somal. Ital.
sarandensis *B. D. Burtt in Kew Bull.* 1935, 113.—Tanganyika Terr.

COMMIPHORA:—
Sennii *Chiov. Fl. Somala*, II. 74 (1932), cum descr. ampl.: C. virgata *Chiov.*
setulifera *Chiov. apud Guidotti in Riv. Ital. Ess. e Prof.* xiii. 233 (1931), in obs.; *Chiov. Fl. Somala*, II. 112 (1932).—Somal. Ital.
spathulata *Mattick in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 661 (1935).—Tanganyika Terr.
sphaerophylla *Chiov. Fl. Somala*, II. 119 (1932).—Somal. Ital.
staphyleifolia *Chiov. ex Guidotti in Riv. Ital. Ess. e Prof.* xiii. 233 (1931), nomen; *Chiov. Fl. Somala*, II. 97 (1932), descr.—Somal. Ital.
stolonifera *B. D. Burtt in Kew Bull.* 1935, 114.—Tanganyika Terr.
Suckertiana *Chiov. Nuov. Contrib. Fl. Somal. Ital.* (*Atti Soc. Nat. e Mat. Modena*, lxvi.: 1935) 7 (1934).—Somaliland.
Swynnertonii *B. D. Burtt in Kew Bull.* 1935, 115. —Tanganyika Terr.
Trollii *Mattick in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 659 (1935).—Tanganyika Terr.
viminea *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. 11. p. xxi. 485 (1932).—Transvaal.

COMOLIA DC. (Melastomatac.).
angustifolia *Gleason in Brittonia*, i. 151 (1932).—Guiana Brit.

COMORANTHUS Knobl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xi. 1032 (1934). *OLEACEAE.*
obconicus *Knobl. l. c.*—Ins. Comor.

COMPSONEURA Warb. (Myristicac.).
racemosa *Ducke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 582 (1932).—Bras. (Amaz.).

CONANTHERA Ruiz & Pav. (Amaryllidac.; Haemodorac., Gen. Pl.).
Johowi *Espinosa in Rev. Chil. Hist. Nat.* 1932, xxxvi. 239, in obs., nomen.—Chile.

CONCEVEIBA Aubl. (Euphorbiac.).
Hostmanni *Benth.*; *Lanj. Euphorbiac. Surinam*, 21 (1931), descr. ampl.—Guiana Bat.

CONICOSIA N. E. Brown (Ficoidac.).
affinis *N. E. Brown*; *N. E. Brown in Gard. Chron.* 1932, Ser. III. xci. 121, descr. ampl.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Bijlii *N. E. Brown, l. c.* 1931, Ser. III. xc. 14, in clavi; *et l. c.* 1932, Ser. III. xci. 121, descr. ampl.—Afr. austr. (Cape Prov.).
communis *N. E. Brown, l. c.* 1931, Ser. III. xc. 14, in clavi, 137.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Muirii *N. E. Brown*; *N. E. Brown, l. c.* 1932, Ser. III. xci. 104, descr. ampl.—Afr. austr. (Cape Prov.).
pulliloba *N. E. Brown, l. c.* 1931, Ser. III. xc. 14, in clavi; *et l. c.* 1932, Ser. III. xci. 104, descr. ampl.—Afr. austr. (Cape Prov.).
robusta *N. E. Brown*; *N. E. Brown, l. c.* 1932, Ser. III. xci. 144, descr. ampl.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Roodiae *N. E. Brown*; *N. E. Brown, l. c.*, descr. ampl.—Afr. austr. (Cape Prov.).

CONNARUS L. (Connarac.).
hainanensis *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 58 (1934).—China (Hainan).
lucidulus *Miq. Fl. Ind. Bat.*, Suppl. 1, 207 (1860), sphalm.: C. lucidus *Jack.*
macrourus *Gilg ex Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 518 (1928), in syn.: C. Staudtii.
odoratissimus *Gilg ex Hutchinson & Dalziel, l. c.*, in syn.: C. Staudtii.
Thonningii (*DC.*) *Schellenb. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 316 (1915), in obs.: Omphalobium Thonningii.

CONOCEPHALOPSIS, Kuntze, Rev. Gen. iii. 11. 136 (1898); Post & Kuntze, Lexic. 139 (1903): **Conocephalus** Blume (Morac.; Urticac., Gen. Pl.).

CONOCEPHALUS Blume (Morac.; Urticac., Gen. Pl.).
naucleiflorus *Lindl. Bot. Reg.* xiv. t. 1203 (1828).—Ind. or.

CONOCLINIUM DC. (Compos.).
grandiflorum *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 448 (1894), in syn.: Eupatorium vernale.

CONOMORPHA A. DC. (Myrsinac.).
curvivenia *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 444.—Venez.
dubia *Macbride in Candollea*, vi. 17 (1934).—Peruv.
duidae *Gleason & Moldenke in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 445.—Venez.
lepidota *Gleason, l. c.* 446.—Venez.
Preslii *Macbride in Candollea*, v. 398 (1934): C. verticellata (*Presl*) *Mez*, non *Zahlbr.*

CONOPHARYNGIA G. Don (Apocynac.).
humilis *Chiov. Nuov. Contrib. Fl. Somal. Ital.* (*Atti Soc. Nat. e Mat. Modena*, lxvi.: 1935) 12 (1934).—Somaliland.
ventricosa (*Hochst. ex A. DC.*) *Stapf in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. 1. 149 (1902), in obs.: Tabernaemontana ventricosa.

CONOPHYLLUM Schwantes (Ficoidac.).
Herrei *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 274 (1931).—Little Namaq.

CONOPHYTUM N. E. Brown (Ficoidac.).
albifissum *Tisch. in Cactus Journ.* iii. 63 (1935).—Hab.?
angustum *N. E. Brown in Journ. Cact. & Succ. Soc. Amer.* ii. 427 (1931).—Little Namaq.
apiculatum *N. E. Brown, l. c.*—Little Namaq.
approximatum *Lavis in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 257.—Little Namaq.
Archeri *Lavis in L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 378 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
auctum *N. E. Brown in Journ. Cact. & Succ. Soc. Amer.* ii. 429 (1931).—Little Namaq.
brevipetalum *Lavis in L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 290 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.?).
brevitubum *Lavis, l. c.* 292.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Caroli *Lavis, l. c.* Pt. II. 378 (1933).—Namaqualand.
colorans *Lavis in Fl. Pl. S. Afr.* 1933, xiii. t. 509.—Afr. austr. (Cape Prov.).
compressum *N. E. Brown in Cactus Journ.* iii. 37 (1934).—Little Namaq.
cornutum (*Schwantes*) *Schwantes ex Jacobsen, Succ. Pl.* 150 (1935): Ophthalmophyllum cornutum.
decoratum *N. E. Brown in Cactus Journ.* ii. 39 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Dennisii *N. E. Brown in Journ. Cact. & Succ. Soc. Amer.* ii. 428 (1931).—Little Namaq.
depressum *Lavis in L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 264 (1931).—Little Namaq.
divaricatum *N. E. Brown in N. E. Brown, Tisch. & Karst. Mesembr.* 148 (1931).—Little Namaq.
doornense *N. E. Brown in Cactus Journ.* ii. 39 (1933).—Little Namaq.
Edithae *N. E. Brown in Journ. Cact. & Succ. Soc. Amer.* ii. 429 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Edwardsiae *Lavis in L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 291 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Ernianum *Lösch & Tisch. in Kakteenk.* 1933, 47.—Great Namaq.
exiguum *N. E. Brown in Journ. Cact. & Succ. Soc. Amer.* ii. 428 (1931).—Little Namaq.
geometricum *Lavis in L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 438 (1934).—Namaqualand.
germanum *N. E. Brown in Cactus Journ.* ii. 7 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
gracile *N. E. Brown in Journ. Cact. & Succ. Soc. Amer.* ii. 427 (1931).—Little Namaq.
Helmutii *Lavis in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 138.—Namaqualand.
incurvum *N. E. Brown in Journ. Cact. & Succ. Soc. Amer.* ii. 427 (1931).—Little Namaq.
Joubertii *Lavis in L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 439 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Julii *Schwantes ex Jacobsen, Sukkulent.* 112 (1933).—Hab.?
laxipetalum *N. E. Brown in Cactus Journ.* iii. 37 (1934).—Little Namaq.
leucanthum *Lavis in L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 468 (1934).—Namaqualand.

CONOPHYTUM:—
lucipunctum *N. E. Brown in Cactus Journ.* i. 58 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Luckhoffii *Lavis in L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 291 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
miserum *N. E. Brown in Cactus Journ.* i. 58 (1933).—Little Namaq.
Morganii *Lavis in L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 289 (1931).—Hab.?
muscosipapillatum *Lavis, l. c.* Pt. II. 379 (1933).—Little Namaq.
namibense *N. E. Brown in Cactus Journ.* ii 39 (1933).—Great Namaq.
nanum *Tisch. in Cactus Journ.* iii. 63 (1935).—Afr. austr.
novicium *N. E. Brown in Cactus Journ.* ii. 53 (1934).—Little Namaq.
obovatum *Lavis in L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 401 (1933).—Namaqualand.
obtusum *N. E. Brown in Journ. Cact. & Succ. Soc. Amer.* ii. 427 (1931).—Little Namaq.
ornatum *Lavis in L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 265 (1931).—Little Namaq.
parviflorum *N. E. Brown in Cactus Journ.* ii. 53 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
plenum *N. E. Brown in Journ. Cact. & Succ. Soc. Amer.* ii. 428 (1931).—Little Namaq.
Pole-Evansii *N. E. Brown, l. c.* 429.—Little Namaq.
polyandrum *Lavis in L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 441 (1934).—Namaqualand.
praecox *N. E. Brown in N. E. Brown, Tisch. & Karst. Mesembr.* 183 (1931).—Little Namaq.
praeparvum *N. E. Brown*; *N. E. Brown in Cactus Journ.* iii. 63 (1935), descr. ampl.—Little Namaq.
Primosii *Lavis in L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 267 (1931).—Little Namaq.
puberulum *Lavis, l. c.* 266.—Little Namaq.
pubicalyx *Lavis, l. c.* Pt. II. 401 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
pumilum *N. E. Brown in Cactus Journ.* ii. 53 (1934).—Little Namaq.
quaesitum *N. E. Brown in Journ. Cact. & Succ. Soc. Amer.* ii. 428 (1931).—Little Namaq.
quarziticum *Tisch. in Cact. & Succ. Journ. Amer.* vii. 9 (1935).—Great Namaq.
ramosum *Lavis in L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 265 (1931).—Little Namaq.
rarum *N. E. Brown in Cactus Journ.* ii. 7 (1933).—Little Namaq.?
recisum *N. E. Brown in Journ. Cact. & Succ. Soc. Amer.* ii. 428 (1931).—Little Namaq.
regale *Lavis in L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 469 (1934).—Namaqualand.
Ricardianum *Lösch & Tisch. in Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges.* 1932, iv. 74.—Great Namaq.
simile *N. E. Brown in Journ. Cact. & Succ. Soc. Amer.* ii. 428 (1931).—Little Namaq.
simplum *N. E. Brown, l. c.* 427.—Little Namaq.
spectabile *Lavis in L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 264 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
springbokense *N. E. Brown in Journ. Cact. & Succ. Soc. Amer.* ii. 429 (1931).—Little Namaq.
subtile *N. E. Brown in Cactus Journ.* ii. 7 (1933).—Little Namaq.
tabulare *Lösch & Tisch. ex Jacobsen, Sukkul.* 117 (1933).—Hab.?
tectum *N. E. Brown in Journ. Cact. & Succ. Soc. Amer.* ii. 427 (1931).—Little Namaq.
teguliflorum *Tisch. in Cactus Journ.* iv. 38 (1935).—Little Namaq.?
tetracarpum *Lavis in L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 439 (1934).—Namaqualand.
tinctum *Lavis, l. c.* 440.—Namaqualand.
Tischleri *Schwantes ex Jacobsen, Succ. Pl.* 159 (1935).—Hab.?
tumidum *N. E. Brown in Journ. Cact. & Succ. Soc. Amer.* ii. 428 (1931).—Little Namaq.
udabibense *Lösch & Tisch. in Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges.* 1932, iv. 16.—Great Namaq.
Vanzylii *Lavis in L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 267 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
vescum *N. E. Brown in N. E. Brown, Tisch. & Karst. Mesembr.* 198 (1931).—Little Namaq.
Victoris *Lavis in L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 293 (1931).—Little Namaq.

CONOPODIUM Koch (Umbellif.).
allioides *Regel & Schmalh.*; *Korovin in Bull. Univ. As. Centr.* vii. Suppl., 24 (1924), descr. emend.—Turkestan.
Jahandiezi *Sennen & Mauricio. Cat. Fl. Rif Or.* 47 [1933]: an C. capillifolium.
polygamum *Pau & Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xii. 377 (1929).—Hispan.

CONOSTEGIA D. Don (Melastomatac.).
furfuracea *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 15 (1931).—Santo Domingo.
micromeris *Standley in Contrib. Arn. Arb.* No. v. 117 (1933).—Panamá (Ins. Barro Colorado).
petiolata *Gleason in Brittonia*, i. 184 (1932).—Guiana Brit.

CONOSTEPHIUM Benth. (Epacridac.).
Drummondii (*Stschegl.*) *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 105 (1931): Conostephiopsis Drummondii.

CONRADINA A. Gray (Labiat.).
verticillata *Jennison in Journ. E. Mitchell Sc. Soc.* xlviii. 268 (1933).—U.S.A. (Tennessee).

CONSOLEA Lem. (Cactac.).
acaulis (*Ekman & Werderm.*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 146 (1935): Opuntia acaulis.
falcata (*Ekman & Werderm.*) *F. M. Knuth, l. c.*: Opuntia falcata.
guanicana (*K. Schum.*) *F. M. Knuth, l. c.*: Opuntia guanicana.
Urbaniana (*Werderm.*) *F. M. Knuth, l. c.*: Opuntia Urbaniana.

CONSOLIDA S. F. Gray (Ranunculac.).
Hohenackeri (*Boiss.*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 101 (1930): Delphinium Hohenackeri.
persica (*Boiss.*) *Grossheim, l. c.*: Delphinium persicum.

CONSTANTIA Barb.-Rodr. (Orchidac.).
australis (*Cogn.*) *C. Porto & Brade in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 208 (1935), in obs.: Sophronitis australis.
cipoënsis *C. Porto & Brade, l. c.*—Bras. (Minas Geraes).

CONVALLARIA L. (Liliac.).
transcaucasica *Utkin ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 242 (1928).—Caucas.

CONVOLVULUS L. (Convolvulac.).
asparagoides *Pall. ex Petrov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n. s. xliv. 135, in syn.: C. erinaceus.
atropurpureus *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 54 (1824).—Nepal.
bilobatus *Roxb. Hort. Beng.* 14 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 73 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 485 (1832).—Ins. Molucc.
binectariferus *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 47 (1824).—Ind. or. (Assam).
blandus *Roxb. Hort. Beng.* 13 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 50 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 470 (1832).—Ind. or. (Madras).
bucharicus *Lipsky ex Petrov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n. s. xliv. 132, in syn.: C. leiocalycinus.
caespitosus *Roxb. Hort. Beng.* 14 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 70 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 483 (1832).—Ind. or.; Penins. Mal.
calycinus *Roxb. l. c.* 13, nomen; *et l. c.* 51; *et l. c.* 471.—Ind. or.
campanulatus *Zapr. in Trans. Tajikst. Acad. Sc.* i. 1. 73 (1933); *Petrov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n. s. xliv. 132, in syn.: C. leiocalycinus.
Carmeli *Pau & Sennen in Sennen, Pl. d'Esp.* No. 8455; cf. Maire in *Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1934, xxv. 311.—Marocc.
caspicus *Fisch. ex Petrov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n. s. xliv. 145, in syn.: C. persicus.
Charmeli *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 79 [1933], nomen.—Marocc.
chilensis *Hort. ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 205 (1835), in obs., non *Pers.*—Chile.
curassavicus (*Balb.*) *Colla, l. c.* 203, in obs.: Ipomoea curassavica.
denudatus *Petrov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n. s. xliv. 135.—Transcasp.

CONVOLVULUS:—
digitatus *Roxb. Hort. Beng.* 14 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 65 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 479 (1832).—Ind. or.
euxinus *Petrov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n. s. xliv. 142.—Caucas.
fastigiatus *Roxb. Hort. Beng.* 13 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 48 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, ii. 468 (1832).—Ind. or. (Bengal).
Fischerianus *Petrov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n. s. xliv. 147: C. sagittifolius *Fisch. ex Komarov in Acta Hort. Petrop.* xxv. 302 (1905), non aliorum.
flagelliformis *Roxb. Hort. Beng.* 14 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 68 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 481 (1832).—Ind. or. (Mysore).
gangeticus *Roxb. l. c.* 13, nomen; *et l. c.* 46; *et l. c.* 467.—Ind. or.
hamadae (*Vved.*) *Petrov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n. s. xliv. 135: C. subsericeus subsp. hamadae.
heterotrichus *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1935, xxvi. 159.—Sahara.
hirsutulus (*Jacq. f.*) *Colla, Herb. Pedem.* iv. 205 (1835), in obs.: Ipomoea hirsutula.
hirsutus *Roxb. Hort. Beng.* 14 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 65 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 479 (1832).—Ind. or.
ifniensis *Caballero in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 30, 7 (1935).—Marocc.
laurifolius *Roxb. Hort. Beng.* 13 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 50 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 470 (1832).—Ind. or. (Mysore).
linearilobus *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 152 (1931).—U.S.A. (Arizona).
Malcolmi *Roxb. Hort. Beng.* 14 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 55 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 474 (1832).—Persia.
Mazicum *Emberger & Maire*; *Emberger & Maire in Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc*, Nos. xxi–xxii. 43 (1930).—Marocc.
Michelsoni *Petrov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n. s. xliv. 136, in syn.: C. Korolkowi var. Michelsoni *Petrov*.
montanus *v. Ooststr. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 199.—Peruv.
mucurensis *Colla, Herb. Pedem.* iv. 205 (1835), in obs.—Bras.
Owsjannyi *Smirnov ex Petrov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n.s. xliv. 136, in syn.: C. Korolkowi.
pedatus *Roxb. Hort. Beng.* 14 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 63 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 478 (1832).—Hab.?
pentagonus *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 72; *et l. c.* 485.—Ins. Molucc.
pilosus *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 55; *et l. c.* 473.—Ind. or. (Mysore).
pseudodorycnium *Bornm. & Sint. ex Petrov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n. s. xliv. 141, in syn.: C. askabadensis.
Purshianus *Wherry in Proc. Penn. Acad. Sc.* vii. 163 (1933); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 144: Calystegia tomentosa *Pursh*, non Convolvulus tomentosus *L.*
reniformis *Roxb. Hort. Beng.* 14 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 67 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 481 (1832).—Ind. or. (Bengal).
Rheedii *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 70 (1824).—Nepal; Assam.
sagittifolius (*Fisch.*) *T. Liou & Ling in Fl. Ill. Nord Chine*, Fasc. 1, 17 (1931): C. arvensis var. sagittifolius.
scaber (*J. F. Gmel.*) *Colla, Herb. Pedem.* iv. 204 (1835), in obs.: Ipomoea scabra.
semidigynus *Roxb. Hort. Beng.* 13 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 47 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 468 (1832).—Kashmir.
simulans *Perry in Rhodora*, 1931, xxxiii. 76: Breweria minima.
sphaerocephalus *Roxb. Hort. Beng.* 14 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 53 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 472 (1832).—Ind. or. (Bengal).
spinifer *Popov in Trav. Turkest. Univ. Tashkent*, No. 4 (*Vég. Monts Sary-Taou, etc.*) 56 (1922).—Turkestan.

CONVOLVULUS:—
splendens *Korovin in Trans. Sc. Soc. Turk.* i. 21 (1923), in obs.—Bokhara.
stipulaceus *Roxb. Hort. Beng.* 14 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 71 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 484 (1832).—Ind. or. (Bengal).
tridactylosus *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 151 (1931).—U.S.A. (Calif.).
turcomanicus (*Kuntze*) *Petrov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n. s. xliv. 136: C. Dorycnium var. turcomanicus.

CONYZA L. (Compos.).
cylindrica *Colla, Herb. Pedem.* iii. 369 (1834).—Bras.
dichroa *Mart. ex Colla, l. c.*—Bras.
longifolia *Colla, l. c.* 368.—Hab.?
macrolasia *Mart. ex Colla, l. c.* 369.—Bras.
Martii *Colla, l. c.* 368.—Bras.
monticola *Mart. ex Colla, l. c.* 369.—Bras.
setosa (*Baker*) *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 6, 50 (1932): Aster setosus.
transvaalensis *Bremek. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 262 (1933).—Transvaal.
venosa *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 369 (1834).—Bras.

COPAIFERA L. (Legumin.).
conjugata (*Bolle*) *Milne-Redhead in Kew Bull.* 1934, 400: Gorskia conjugata.
copallifera (*Benn.*) *Milne-Redhead, l. c.*: Guibourtia copallifera.
Ehie *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 258 (1917).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
grandifolia (*Benth.*) *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 13, 56 (1931): C. Langsdorffii var. grandifolia.
panamensis (*Britton*) *Standley in Tropical Woods*, 1933, No. 34, 41: Copaiva panamensis.
Vuilletiana *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 258 (1917).—Sudan. Gall.

COPAIVA Jacq. (Legumin.).
Guibourtiana (*Benth.*) *Lyons, Plant Names Scientific & Popular*, ed. 2, 139 (1907): Copaifera Guibourtiana.

COPERNICIA Mart. (Palmae).
Baileyana *León in Rev. Soc. Geogr. Cuba*, iv. 22 (1931); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 136.—Cuba.
Brittonorum *León, l. c.* 19; cf. *l. c.*—Cuba.
clarensis *León, l. c.* 15; cf. *l. c.*—Cuba.
Curbeloi *León, l. c.* 23; cf. *l. c.*—Cuba.
× Escarzana *León, l. c.* 12; cf. *l. c.*—Cuba.
excelsa *León, l. c.* 26; cf. *l. c.*—Cuba.
fallaënsis *León, l. c.* 21; cf. *l. c.*—Cuba.
holguinensis *León, l. c.* 18; cf. *l. c.*—Cuba.
Molineti *León, l. c.* 25; cf. *l. c.*—Cuba.
Roigii *León, l. c.* 17; cf. *l. c.*—Cuba.
× Sueroana *León, l. c.* 14; cf. *l. c.*—Cuba.
textilis *León, l. c.* 24; cf. *l. c.*—Cuba.
Torreana *León, l. c.* 10; cf. *l. c.*—Cuba.
× vespertilionum *León, l. c.* 27; cf. *l. c.*—Cuba.

COPIAPOA Britton & Rose (Cactac.).
Fiedleriana (*K. Schum.*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 280 (1935): Echinocactus Fiedlerianus.
Malletiana (*Lem. ex Salm-Dyck*) *Backeb. l. c.*: Echinocactus Malletianus.
Pepiniana (*Lem. ex Salm-Dyck*) *Backeb. l. c.* 281: Cereus Pepinianus.
taltalensis (*Werderm.*) *Looser in Rev. Chil. Hist. Nat.* 1929, xxxiii. 614: Echinocactus taltalensis.

COPROSMA J. R. & G. Forst. (Rubiac.).
antipoda *W. R. B. Oliv. in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 132, 46 (1935).—N. Zel.; Ins. Antipodes.
benefica *W. R. B. Oliv. l. c.* 137.—Ins. Pitcairn.
celebica *Valeton ex v. Steenis in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 246 (1934), nomen.—Celebes.
Cheesemani *W. R. B. Oliv. in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 132, 47 (1935).—N. Zel.; Ins. Stewart.

COPROSMA:—
× Colbanksii *Cockayne, Veg. N. Zeal.* ed. 2 (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, xiv.) 150 (1928), in obs.; *W. R. B. Oliv. in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 132, 186 (1935).—N. Zel.
dodonifolia *W. R. B. Oliv. l. c.* 127.—N. Zel.
egmontiana *Cockayne, Veg. N. Zeal.* ed. 2 (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, xiv.) 269 (1928), in obs., nomen; *W. R. B. Oliv. in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 132, 52 (1935), in syn.: C. pseudocuneata.
elliptica *W. R. B. Oliv. l. c.* 150.—Ins. Sandvic.
glabrata *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 41 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
Hookeri (*G. Don*) *W. R. B. Oliv. in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 132, 141 (1935): Psychotria Hookeri.
molokaiensis *St. John in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 132, 174 (1935).—Ins. Sandvic.
nivalis *W. R. B. Oliv. in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 132, 37 (1935).—Austral. (Victoria).
novaehebridae *W. R. B. Oliv. l. c.* 140.—N. Hebrides.
oceanica *W. R. B. Oliv. l. c.* 142.—Ins. Tuamotu.
ochracea *W. R. B Oliv. l. c.* 153.—Ins. Sandvic.
papuensis *W. R. B. Oliv. l. c.* 147.—N. Guin.
polymorpha *W. R. B. Oliv. l. c.* 92.—N. Zel.
× prorobusta *Cockayne & Allan in Cockayne & Turner, Trees N. Zeal.* 142 (1928).—N. Zel.
pseudo-Colensoi *Cockayne & Allan in Ann. Bot.* 1934, xlviii. 43, in obs., nomen.—N. Zel.
raiateënsis *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 41 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
rapensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 316 (1935).—Polynes. (Ins. Rapa).
serrata *St. John in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 132, 172 (1935).—Ins. Sandvic.
setosa *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 42 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
Tadgelli *W. R. B. Oliv. in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 132, 49 (1935).—Austral. (Victoria).
ternata *W. R. B. Oliv. l. c.* 175.—Ins. Sandvic.

COPTIS Salisb. (Ranunculac.).
daisetsuensis *Tatewaki ex Miyabe & Tatewaki in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.* xiv. 2 (1935), in syn.: C. trifolia var. semiplena *Miyabe & Tatewaki*.

CORALLORRHIZA R. Br. (Orchidac.).
purpurea *L. Williams in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1932, lix. 427.—U.S.A. (Wyoming).
wyomingensis *C. E. & K. J. Hellmayr in Rhodora*, 1931, xxxiii. 133.—U.S.A. (Wyoming).

CORBICHONIA Scop. (Ficoidac.).
decumbens (*Forsk.*) *Exell in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 80: Orygia decumbens.

CORCHORUS L. (Tiliac.).
brevicaulis *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1932, xxii. 226.—Formosa.
chrozophorifolius (*Baill.*) *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 166 (1934), in obs.: Nettoa chrozophorifolia.
echinatus *Hochst. ex Garcke in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 45 (1867), in obs.—Abyss.
macropetalus (*F. Muell.*) *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 77 (1931): Triumfetta macropetala.
pachyphyllus *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 166 (1934).—W. Austral.
tiniannensis *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 125.—Ins. Marian. (Tinian).

CORDIA L. (Boraginac.).
aberrans *I. M. Johnston in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 173: C. mucronata *Fresen.*
acuminata *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 339 (1824).—Ind. or. (Assam).
angustifolia *Roxb. Hort. Beng.* 17 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 338 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 595 (1832).—Ind. or. (Mysore).
axillaris *I. M. Johnston in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcii. 35 (1930).—Bras.; Argent.
Braceliniae *I. M. Johnston in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 177.—Bras. (Minas Geraes).

CORDIA:—
campanulata *Roxb. Hort. Beng.* 17 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 336 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 593 (1832).—Ind. occ.
candidissima *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 198 (1931), in syn.: C. platythyrsa.
chaetodonta *Melch. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 676 (1932).—Tanganyika Terr.
chisimajensis *Chiov. Fl. Somala*, II. 311 (1932).—Somal. Ital.
fallax *I. M. Johnston in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 10.—Guiana Brit.
fulva *I. M. Johnston, l. c.* 20.—Guiana Bat. et Gall.
Gardneri *I. M. Johnston in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcii. 51 (1930).—Bras. (Minas Geraes).
grandis *Roxb. Hort. Beng.* 17 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 335 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 593 (1832).—Ind. or. (Bengal).
hirsuta *Fresen. in Mart. Fl. Bras.* viii. 1. 19 (1857).—Bras. (Minas Geraes).
hirta *I. M. Johnston in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 29.—Venez.; Guiana Bat. et Gall.
intonsa *I. M. Johnston in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcii. 28 (1930): C. hirsuta *Fresen.*
Johnstoni *Cufod. in Archiv. Bot., Forli*, 1934, x. 41.—Costa Rica.
laevifrons *I. M. Johnston in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 16.—Guiana Bat. et Gall.
laevior *I. M. Johnston, l. c.* 180.—Peruv.
latifolia *Roxb. Hort. Beng.* 17 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 330 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 588 (1832).—Ind. or.
latiloba *I. M. Johnston in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcii. 8 (1930).—Bras. (Rio de Janeiro).
longiflora *Colla, Herb. Pedem.* iv. 220(1835).—Bras.
marchionica *Drake*; *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 243 (1935), descr. emend.—Ins. Marquesas.
moluccana *Roxb. Hort. Beng.* 84 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 337 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 594 (1832).—Ins. Molucc.
naidophila *I. M. Johnston in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 32.—Venez.; Bras. (Amaz.).
Nevillii *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 199 (1931): C. Perrottetii *Wight.*
polycephala (*Lam.*) *I. M. Johnston in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 33: Varronia polycephala.
polygama *Roxb. Hort. Beng.* 17 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 337 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 594 (1832).—Ind. or.
Ravae *Chiov. Fl. Somala*, II. 310 (1932).—Somal. Ital.
ripicola *I. M. Johnston in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 180.—Peruv.
Sagotii *I. M. Johnston, l. c.* 27.—Guiana Bat. et Gall.
serrata *Roxb. Hort. Beng.* 17 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 333 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 591 (1832).—Ind. or. (Travancore).
setigera *I. M. Johnston in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 176.—Bras. (Minas Geraes).
Suckertii *Chiov. Nuov. Contrib. Fl. Somal. Ital.* (*Atti Soc. Nat. e Mat. Modena*, lxvi.: 1935) 13 (1934).—Somaliland.
tomentosa *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 339 (1824).—Hab. ?
ucayaliensis (*I. M. Johnston*) *I. M. Johnston in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 181: C. Ulei var. ucayaliensis.
Ulei *I. M. Johnston in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcii. 56 (1930).—Bras. (Amaz.).
uniceps *Blake*; *Blake ex Friesen in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1931–2, Sér. II. xxiv. 153 (1933), in syn.: Varronia Bonplandii.
Vignei *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 196 (1931).—Gold Coast.
Weddellii *I. M. Johnston in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 173.—Boliv.

CORDIERA A. Rich. (Rubiac.).
surinamensis *Miq. ex Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 276, in syn.: Bellynkxia surinamensis.

CORDYLA Lour. (Legumin.).
Calycandra *Hook. f. & Benth. in Hook. Niger Fl.* 325 (1849), in obs.: Calycandra pinnata.

CORDYLANTHUS Nutt. (Scrophulariac.).
eremicus (*Coville & Morton*) *Munz, Man. S. Calif. Bot.* 483, 601 (1935): Adenostegia eremica.
involutus *Wiggins in Contrib. Dudley Herb. Stanford Univ.* i. 174 (1933).—Calif. infer.
parviflorus (*Ferris*) *Wiggins, l. c.*: Adenostegia parviflora.

CORDYLOBLASTE Hensch. ex Moritzi (Symplocac.; Styracac., Gen. Pl.).
pendula (*Wight*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 188 (1931): Symplocos pendula.

CORDYLOCARPUS Desf. (Crucif.).
pumilus *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 5 [1933], nomen.—Marocc.

COREANOMECON Nakai in Journ. Jap. Bot. 1935, xi. 151. *PAPAVERACEAE.*
hylomeconoides *Nakai, l. c.*—Corea.

COREOCARPUS Benth. (Compos.).
robustior *Sherff in Bot. Gaz.* xcvii. 187 (1935).—Calif. infer.
Shrevei *Sherff, l. c.* 185.—Mexico.

COREOPSIS L. (Compos.).
asperata *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 141, in clavi, 143 (1931).—Guinea Gall.; Sierra Leone.
Bigelowii (*A. Gray*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 488 (1894): Leptosyne Bigelowii.
brasiliensis *Colla, Herb. Pedem.* iii. 479 (1834).—Bras.
corninsularis *Sherff in Bot. Gaz.* xciv. 597 (1933).—U.S.A. (Mississippi).
Curtisii *Sherff, l. c.* xcvi. 146 (1934).—Cult.
diffusa *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 73 (1933–5).—Mexico.
elegans *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 487 (1894), in syn.: C. tinctoria.
exilis *Sherff in Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. 288 (1935).—Congo Belg.
Giorgii *Sherff, l. c.* 292.—Congo Belg.
Goffardii *Sherff, l. c.* 290.—Congo Belg.
injucunda *Sherff, l. c.* 293.—Congo Belg.
Killipii *Sherff in Bot. Gaz.* xciv. 594 (1933).—Peruv.
multiflora *Sherff in Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. 292 (1935).—Congo Belg.
negriana *Sherff in Bot. Gaz.* 1930, xc. 397.—Abyss.
nodosa *Sherff, l. c.* xciv. 595 (1933).—Peruv.
picta *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 487 (1894), in syn.: C. Drummondii.
Quarrei *Sherff in Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. 289 (1935).—Congo Belg.
sambucifolia *Willd. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 478 (1834).—Hab. ?
saxicola *Alexander in Torreya*, 1932, xxxii. 161.—U.S.A. (Alabama; Georgia).
Schlechteri (*Sherff*) *Burtt Davy in Kew Bull.* 1935, 568: Bidens Schlechteri.
vulgaris *Sherff in Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. 291 (1935).—Congo Belg.

CORETHROGYNE DC. (Compos.).
leucophylla *Menzies ex Jepson, Man. Fl. Pl. Calif.* 1042 (1925).—U.S.A. (Calif.).

CORISPERMUM L. (Chenopodiac.).
platypterum *Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. 11. (*Contrib. Cogn. Fl. Mansh.*) 100 (1935).—Manchur.
stenolepis *Kitagawa, l. c.* 102.—Manchur. (Jehol).
thelelegium *Kitagawa, l. c.* 103.—Manchur. (Jehol).

CORNUS L. (Cornac.).
capitata *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 434 (1820).—Ind. or.
iberica *Woronow in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 220 (1933).—Caucas.
macrophylla *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 433 (1820).—Ind. or. (United Prov.).
oblonga *Wall. l. c.* 432.—Nepal.
parviflora *Chien in Sinensia*, ii. 99 (1931).—China (Kweichau).

COROKIA A. Cunn. (Cornac.).
variabilis *Hort. ex Bean, Trees & Shrubs Brit. Isles*, 111 (1933), in syn.: C. virgata.

CORONILLA L. (Legumin.).
arenivaga *Pau in Font Quer, Iter Marocc.* 1930, No. 363 [1932].—Marocc.
heterophylla (*Brot.*) *G. Sampaio in Ann. Sc. Nat. Porto*, x. 29 (1906): Ornithopus heterophyllus.
Perieri *Sennen ex Uhrová in Beih. Bot. Centralbl.* liii. Abt. B. 91 (1935), in syn.: C. minima f. Perieri *Uhrová.*
speciosa *Uhrová, l. c.* 77.—Alger.

CORONOPUS Zinn, Cat. Pl. Gott. 325 (1757); Boehm. in Ludw. Def. Gen. Pl. ed. 3, 226 (1760); Gaertn. Fruct. ii. 293 (1791); cf. Sprague in Kew Bull. 1934, 218: **Carara** Medik. (Crucif.).

COROZO Jacq. (Palmae).
oleifera (*H. B. & K.*) *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, iii. 59 (1933): Alfonsia oleifera.

CORRIGIOLA L. (Caryophyllac.; Illecebrac., Gen. Pl.).
paniculata *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. 11. Anhang, 31 (1932).—Tanganyika Terr.
Russelliana *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 1008.—Sudan.

CORYBAS Salisb. (Orchidac.).
erythrocarpus *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 11 (1935).—N. Guin.
kinabaluensis *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 173 (1935).—Borneo.

CORYDALIS Medik. Phil. Bot. i. 96 (1789); Vent. Choix Pl. 19 (1803). *PAPAVERACEAE.*
Aitchisonii *Popov in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 88 (1934), in clavi: C. Severtzovii var. simplicifolia *Lipsky ex Fedde.*
appendiculata *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 349 (1931).—China (Szechuan; Yunnan).
chosenensis *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 49 (1934).—Corea.
hsiaowutaishanensis *Wang in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, ii. 301 (1934).—China (Chihli).
humicola *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 341 (1931).—China (Szechuan).
Koidzumiana *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 50 (1934).—Formosa.
latiloba (*Franch.*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 342 (1931): C. albicaulis var. latiloba.
mayae *Hand.-Mazz. l. c.* 351.—China (Yunnan).
pachypoda (*Franch.*) *Hand.-Mazz. l. c.* 347: C. thibetica var. pachypoda.
Popovii *Nevski ex Popov in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 87 (1934).—Bokhara.
quadriflora *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 350 (1931).—China (Yunnan).

CORYLOPSIS Sieb. & Zucc. (Hamamelidac.).
coreana *Uyeki in Suigen Gakuhô*, No. 41 (1924); *Uyeki, Not. Dendrol. Kor.* (1), p. 1 [1935].—Corea.

CORYLUS L. (Betulac.; Cupulif., Gen. Pl.).
atrosanguinea *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 919 (1895), in syn.: C. pontica.
brevirostris (*C. K. Schneider*) *Miyabe in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 458 (1934): C. Sieboldiana var. brevirostris.
imeretica *Kemul.-Nat. in Trav. Inst. Bot. Tiflis*, i. 111 (1934).—Caucas.

CORYMBIUM L. (Compos.).
Fourcadei *Hutchinson in Kew Bull.* 1932, 510.—Afr. austr. (Cape Prov.).

CORYMBORCHIS Thou. (Orchidac.).
longiflora (*Hook. f.*) *Burkill in Kew Bull.* 1935, 317; *Burkill, Dict. Econ. Prod. Mal. Penins.* i. 666 (1935): Corymbis longiflora.
tropidiifolia *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 14 (1935).—N. Guin.

CORYNEPHORUS Beauv. (Gramin.).
Bocinoi *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 128 [1933], nomen.—Marocc.

CORYNOCARPUS J. R. & G. Forst. (Corynocarpac.; Anacardiac., Gen. Pl.).
australasicus *C. T. White in Contrib. Arn. Arb.* No. iv. 57 (1933).—Austral. (Queensland).

CORYNOPUNTIA F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC, 114, 410 (1935). *CACTACEAE.*
agglomerata (*A. Berger*) *F. M. Knuth, l. c.* 116: Opuntia agglomerata.
bulbispina (*Engelm.*) *F. M. Knuth, l. c.* 115: Opuntia bulbispina.
clavata (*Engelm.*) *F. M. Knuth, l. c.*: Opuntia clavata.
dumetorum (*A. Berger*) *F. M. Knuth, l. c.* 116: Opuntia dumetorum.
Grahamii (*Engelm.*) *F. M. Knuth, l. c.*: Opuntia Grahamii.
invicta (*T. S. Brandegee*) *F. M. Knuth, l. c.* 114: Opuntia invicta.
Moelleriana *F. M. Knuth, l. c.* 115: Opuntia Moelleri.
Parishii (*Orcutt*) *F. M. Knuth, l. c.*: Opuntia Parishii.
pulchella (*Engelm.*) *F. M. Knuth, l. c.*: Opuntia pulchella.
Schottii (*Engelm.*) *F. M. Knuth, l. c.* 114: Opuntia Schottii.
Stanlyi (*Engelm.*) *F. M. Knuth, l. c.*: Opuntia Stanlyi.
vilis (*Rose*) *F. M. Knuth, l. c.* 115: Opuntia vilis.

CORYPHA L. (Palmae).
Caranda *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1147 (1895), in syn.: Trithrinax brasiliensis *Mart.*
filifera *Hort. ex Vilmorin, l. c.* 1149, in syn.: Washingtonia filamentosa.
Guanaco *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in syn.: Copernicia robusta.
macrophylla *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in syn.: C. Gebanga.

CORYPHANTHA Lem. (Cactac.).
Altimiranoi *Frić ex Orcutt, Cactography*, 3 (1926), pro syn.: C. compacta.
Andreae (*J. A. Purpus & Bödeker*) *A. Berger, Kakteen*, 271 (1929): Mammillaria Andreae.
asterias (*Cels*) *Hübner in Kakteenfreund*, ii. 8 (1933); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 143; *Bödeker ex Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 377 (1935): Mammillaria asterias.
bella (*Britton & Rose*) *Fosberg in Bull. S. Calif. Acad. Sc.* 1931, xxx. 58, in obs.: Escobaria bella.
Borwigii (*J. A. Purpus*) *A. Berger, Kakteen*, 272 (1929): Mammillaria Borwigii.
calochlora *Bödeker, Mammill.-Vergl.-Schlüss.* 7 (1933); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 145; *Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 370 (1935).—Mexico.
Chaffeyi (*Britton & Rose*) *Fosberg in Bull. S. Calif. Acad. Sc.* 1931, xxx. 58, in obs.: Escobaria Chaffeyi.
columnaris *Lahman in Cact. & Succ. Journ. Amer.* vi. 27 (1934).—U.S.A. (Oklahoma).
densispina *Werderm. in Fedde, Repert.* xxx. 57 (1932).—Mexico.
Georgii *Bödeker in Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges.* 1931, iii. 163.—Mexico.
gladiispina (*Bödeker*) *A. Berger, Kakteen*, 271 (1929): Mammillaria gladiispina.
Hesteri *Y. Wright in Cact. & Succ. Journ. Amer.* iv. 274 (1932).—U.S.A. (Texas).
Lloydii (*Britton & Rose*) *Fosberg in Bull. S. Calif. Acad. Sc.* 1931, xxx. 58, in obs.: Escobaria Lloydii.
longicornis *Bödeker in Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges.* 1931, iii. 249.—Mexico.
minima *Baird in Am. Botanist*, 1931, xxxvii. 150.—U.S.A. (Texas).
Nellieae *Croizat in Torreya*, 1934, xxxiv. 15.—U.S.A. (Texas).
Piercei *Fosberg in Bull. S. Calif. Acad. Sc.* 1931, xxx. 58, in obs.: Escobaria Runyonii.
Pirtlei *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 226 (1934).—U.S.A. (Texas).
reduncuspina *Bödeker in Kakteenk.* 1933, 153.—Mexico.
Schwarziana *Bödeker ex Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 377 (1935).—Mexico.
varicolor *Tiegel in Monatsschr, Deutsch. Kakt.-Ges.* 1932, iv. 278.—U.S.A. (Texas).

CORYPHANTHA:—
Vogtherriana *Werderm. & Bödeker in Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges.* 1932, iv. 32.—Mexico.

CORYSANTHES R. Br. (Orchidac.).
ponapensis *Hosokawa & Fukuyama in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 17.—Ins. Carolin. (Ponape).

CORYTHOLOMA Decne. (Gesneriac.).
atrosanguineum (*Kuntze*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 788 (1895): Rechsteinera atrosanguinea.
bulbosum (*Decne.*) *Voss, l. c.* 787: Dircaea bulbosa.
Cooperi (*Paxt.*) *Voss, l. c.*: Gesneria Cooperi.
cyclophyllum *Dusén ex Laurent in Svensk Bot. Tidskr.* 1923, xvii. 165.—Bras. (Paraná).
discolor (*Lindl.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 788 (1895): Gesneria discolor.
Donkelaarii (*Lem.*) *Voss, l. c.*, in obs.: Gesneria Donkelaariana [sic].
Douglasii (*Lindl.*) *Voss, l. c.*: Gesneria Douglasii.
Leopoldi (*Scheidw. ex Planch.*) *Voss, l. c.*, in obs.: Gesneria Leopoldi.
purpureum *Voss, l. c.*—Hab. ?

COSMOS Cav. (Compos.).
atrosanguineus (*Ortg.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 485 (1894): Bidens atrosanguineus.
calvus (*Sch. Bip.*) *Sherff in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot Ser., viii. 405 (1932): Adenolepis calva.
concolor *Sherff, l. c.* 434.—Mexico.
Herzogii *Sherff in Bot. Gaz.* xcvi. 148 (1934).—Boliv.
Langlassei (*Sherff*) *Sherff in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 425 (1932): Bidens Langlassei.
Mattfeldii *Sherff in Bot. Gaz.* xcvi. 148 (1934).—Mexico.
montanus *Sherff in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 433 (1932).—Mexico.
Schaffneri *Sherff, l. c.* 445.—Mexico.

COSTERA J. J. Smith (Ericac.).
borneënsis *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 423 (1935).—Borneo.
cyclophylla (*Airy-Shaw*) *J. J. Smith & Airy-Shaw in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3281 (1935); *et in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 424 (1935): Cymothoë cyclophylla.
Endertii *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 420 (1935).—Borneo.
lanaënsis (*Merrill*) *Airy-Shaw & J. J. Smith, l. c.* 421: Vaccinium lanaënse.
Loheri (*Merrill*) *Airy-Shaw & J. J. Smith, l. c.*: Vaccinium Loheri.
lucida (*Merrill*) *Airy-Shaw & J. J. Smith, l. c.*: Diplycosia lucida.
sumatrana *J. J. Smith, l. c.*—Sumatra.

COSTUS L. (Zingiberac.; Scitamin., Gen. Pl.).
amazonicus (*Loes.*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 13 (1931): C. Malortieanus var. amazonicus.
longifolius *Rusby in Phytologia*, i. 50 (1934).—Boliv.
Puchucupango *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 49 (1931).—Peruv.
pulcherrimus *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 304 (1917).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
tarapotensis *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 50 (1931).—Peruv.
Tatei *Rusby in Phytologia*, i. 51 (1934).—Boliv.
zingiberoides *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 49 (1931).—Peruv.

COTONEASTER Medik. (Rosac.).
× Crispii *Exell in Gard. Chron.* 1928, Ser. III. lxxxiii. 44.—Hort.
megalocarpa *Popov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n. s. xliv. 128.—Turkestan. (Thian Shan).
praecox (*Bois & Berthault*) *Vilmorin ex Bois & Berthault in Rev. Hort.* 1918, n. s. xvi. 179; *Meunissier in Rev. Hort.* 1931, n. s. xxiii. 584: C. adpressa var. praecox.
pseudomultiflora *Popov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n. s. xliv. 127.—Turkestan. (Thian Shan).

COTONEASTER:—
songorica (*Regel*) *Popov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n. s. xliv. 128: C. Fontanesii var. songorica.
submultiflora *Popov, l. c.* 126.—Turkestan.
talgarica *Popov, l. c.*—Turkestan. (Thian Shan).
× Watereri *Exell in Gard. Chron.* 1928, Ser. III. lxxxiii. 44.—Hort.

COTYLEDON L. (Crassulac.).
aggregata *Makino in Bot. Mag., Tokyo*, 1910, xxiv. 72: C. malacophylla *Makino, l. c.* 1901, xv. 143; *et l. c.* 1902, xvi. 214, non *Pall.*
attenuata *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 68 (1932).—Marocc.
ausana *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 195 (1932).—Great Namaq.
candelabrum (*Rose*) *Clokey in Bull. S. Calif. Acad. Sc.* 1931, xxx. 61: Dudleya candelabrum.
ferganica *Drobov ex Popov in Trav. Turkest. Univ., Tashkent*, No. 4 (*Vég. Monts Sary-Taou, etc.*) 51 (1922).—Turkestan.
Fergusoniae *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1931, xxi. 51, 55, hybr. ?—Afr. austr. (Cape Prov.).
flavida *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 90 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Font-Queri (*Maire & Sennen*) *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 44 [1933].—Marocc.
gracilis *Sennen & Mauricio, l. c.*, nomen.—Marocc.
Greenei (*Rose*) *Clokey in Bull. S. Calif. Acad. Sc.* 1931, xxx. 61: Dudleya Greenei.
Herrei *Barker in S. Afr. Gard.* 1931, xxi. 247.—Namaqualand.
Hoerleiniana *Dinter*; *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 193 (1932), descr.—Great Namaq.
lineata (*Boiss.*) *Dinsm. in Post, Fl. Syria, Palest. & Sinai*, ed. 2, i. (*Publ. Am. Univ. Beirut*, Nat. Sc. Ser. No. 1) 490 (1932); *Dinsm. in Fedde, Repert.* xxxiii. 108 (1933): Umbilicus lineatus.
Mairei *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 69 (1932): C. hispanica *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1922, xiii. 216, non *L.*
polycephala *Makino in Iinuma, Sōmoku-Dzusetsu*, ed. 3, ii. 658 (1910), japonice.—Japon.
praealta (*Brot.*) *G. Sampaio in Ann. Sc. Nat. Porto*, x. 31 (1906): C. Umbilicus var. praealta.
ramosissima *Rothmaler in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.* 1934, xxxiv. 149.—Hispan.
rubrovenosa *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 194 (1932).—Great Namaq.
Schaeferi *Dinter, l. c.* xxix. 168 (1931), in obs., nomen.—Afr. austr.-occ.
Scheideckeri *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 304 (1894), in obs.—Hab. ?
simplicifolia *Hort. ex Gard. Chron.* 1931, Ser. III. lxxxix. 128.—Eur. austr.

COTYLELOBIUM Pierre (Dipterocarpac.).
malayanum *v. Slooten in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 43 (1932): C. flavum *v. Slooten, l. c.* Sér. III. x. 396 (1929), non *Pierre.*

COUEPIA Aubl. (Rosac.).
elata *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 35 (1935).—Bras. (Amaz.).
obovata *Ducke, l. c.*—Bras. (Amaz.).
panamensis *Standley in Tropical Woods*, 1935, No. 42, 22.—Panamá.
Schomburgkii *Hook. f. ex Sandwith in Kew Bull.* 1931, 377, in obs., pro syn.: Hirtella guyanensis.
spicata *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 36 (1935).—Bras. (Amaz.).
Williamsii *Macbride in Candollea*, v. 366 (1934).—Peruv.

COULTERELLA Van Tiegh. in Ann. Sc. Nat. Sér. IX. x. 154 (1909), in obs. *DIPSACACEAE.*

COUMA Aubl. (Apocynac.).
amara *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 338 (1932).—Bras. (Amaz.).

COUMAROUNA Aubl. (Legumin.).
ferrea *Ducke in Rev. Bot. Appliq.* 1934, xiv. 403.—Bras. (Amaz.).
magnifica *Ducke, l. c.* 405.—Bras. (Amaz.; Pará).

COURALIA Splitg. (Bignoniac.).
toxophora (*Mart.*) *Benth. & Hook. f. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* iv. iii b. 239 (1894): Tecoma toxophora.

COURATARI Aubl. (Lecythidac.; Myrtac., Gen. Pl.).
fagifolia (*Miq.*) *Eyma, Polygonac. Guttif. & Lecythidac. Surinam,* 60, 62 (1932): Lecythis fagifolia.
fumatoria (*Schrank*) *Eyma, l. c.* 60: Lecythopsis fumatoria.
Krukovii *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 384.—Bras. (Matto Grosso).
macrosperma *A. C. Smith, l. c.* 383.—Bras. (Matto Grosso).
multiflora (*Sm.*) *Eyma, Polygonac. Guttif. & Lecythidac. Surinam,* 60 (1932): Lecythis multiflora.
pulchra *Sandwith in Kew Bull.* 1932, 217.—Guiana Brit.

COURIMARI Aubl.; H. Hallier in Meded. Herb. Leid. No. 35, 24 (1918): **Sloanea** L. (Elaeocarpac.; Tiliac., Gen. Pl.).

COUROUPITA Aubl. (Lecythidac.; Myrtac., Gen. Pl.).
amazonica *Knuth in Fedde, Repert.* xxxv. 340 (1934).—Bras. (Amaz.).
Froesii *Knuth, l. c.* 341.—Bras. (Maranhão).
st.-croixiana *Knuth, l. c.*—Ind. occ. (Santa Cruz).
venezuelensis *Knuth, l. c.*—Venez.

COUSINIA Cass. (Compos.).
dissectifolia *Kult. in Trans. Sc. Soc. Turk.* i. 111 (1923).—Turkestan.
dolichophylla *Kult. l. c.* 112.—Turkestan.?
eriophylla (*Kult.*) *Bornm. in Fedde, Repert.* xxxvi. 336 (1934), in obs.: C. Freynii var. eriophylla.
Gaubae *Bornm. l. c.* 326.—Persia.
glauciifolia *Kult. in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 3, 103 (1928).—Bokhara.
gulczensis *Kult. l. c.* Bot. Fasc. 6, 16 (1929).—Turkestan.
horridula *Bornm. in Fedde, Repert.* xxxvi. 337 (1934).—Turkestan.
keredjensis *Bornm. & Gauba, l. c.* 328.—Persia.
leuconeura *Bornm. & Gauba, l. c.* 324.—Persia.
phyllocephala *Bornm. & Gauba, l. c.* 330.—Persia.
Popovii *Kult. in Trav. Turkest. Univ., Tashkent,* No. 4 (*Vég. Monts Sary-Taou, etc.*) 66 (1922).—Turkestan.
pseudaffinis *Kult. in Trans. Sc. Soc. Turk.* i. 27 (1923), in obs.; *et in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 3, 105 (1928).—Turkestan.
rosea *Kult. in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 3, 105 (1928).—Turkestan.
rubrarenosa *Kult. l. c.*, in obs., nomen.—Hab.?
syrdarjensis *Kult. l. c.* 106: C. decurrens var. turkestanica *Regel.*

COUSSAREA Aubl. (Rubiac.).
benensis *Britton ex Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., vii. 296 (1931).—Boliv.
insignis *Ducke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 482 (1932).—Bras. (Amaz.).
machadoana *Standley in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 395.—Bras. (Matto Grosso).
mapourioides *Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 282.—Guiana Bat.
megalocarpa *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., viii. 366 (1931).—Peruv.
micrococca *Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 281.—Guiana Bat.
Moritziana (*Benth.*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., vii. 415 (1931): Faramea Moritziana.
ovalis *Standley, l. c.* viii. 367 (1931).—Peruv.
pilosiflora *Standley, l. c.* vii. 218 (1931).—Ecuador.
sessilifolia *Standley, l. c.* viii. 367 (1931).—Peruv.
Sprucei *Standley, l. c.* vii. 416 (1931).—Venez.; Bras.
surinamensis *Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 280.—Guiana Bat.
tricephala *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot Ser., viii. 368 (1931).—Peruv.
urophylla *Standley, l. c.* vii. 298 (1931).—Boliv.

COUTAREA Aubl. (Rubiac.).
Andrei *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., vii. 202 (1931).—Ecuador.

COUTAREA:—
latiflora *Sessé & Moc. ex DC. Prodr.* iv. 350 (1830).—Mexico.

COUTHOVIA A. Gray (Loganiac.).
neo-ebudica *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 23.—N. Hebrides.
Toua *Kanehira in Tropical Woods,* 1932, No. 29, 5, in obs., nomen; *et in Bot. Mag., Tokyo,* 1932, xlvi. 490, descr.—Ins. Carolin. (Kusai).

CRABBEA Harv. (Acanthac.).
longipes *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xii. 718 (1935).—Tanganyika Terr.

CRACCA L. (Legumin.).
[TEPHROSIA Pers.]
apollinea (*Delile*) *Lyons, Plant Names Scientific & Popular,* 120 (1900): Galega apollinea.
constricta (*S. Wats.*) *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 40: Tephrosia constricta.
pachypoda (*Riley*) *G. Ortega, Apuntes Fl. Indig. Sinaloa* (*Cat. Sist. Pl. Sinaloa*) 15 (1929): Tephrosia pachypoda.
piscatoria (*Ait.*) *Lyons, Plant Names Scientific & Popular,* 120 (1900): Galega piscatoria.
pumila (*Rose*) *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 44 (1933–5): Benthamantha pumila.

CRAIBIA Dunn (Legumin.).
Schliebenii *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 1066 (1934).—Tanganyika Terr.

CRAMBE L. (Crucif.).
Buschii (*O. E. Schulz*) *Grossheim, Fl. Kavkaza,* ii. 179 (1930): C. tatarica var. Buschii.

CRANTZIA Scop. (Gesneriac.).
pseudocordata *Cuatrec. in An. Univ. Madrid,* iv. Fasc. 2, 249 (1935).—Ecuador.
Schlimii (*Planch. & Linden*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.,* ed. 3, *Sieb & Voss,* i. 797 (1895): Alloplectus Schlimii.
Varelana *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid,* Ser. Bot., No. 29, 13 (1935).—Colomb.

CRASPEDIA G. Forst. (Compos.).
incana *Cockayne & Allan in Ann. Bot.* 1934, xlviii. 47.—N. Zel.

CRASPEDOSTOMA Domke in Biblioth. Bot. cxi. 135 (1934). *THYMELAEACEAE.*
cephalotes (*Lichtenst. ex Meissn.*) *Domke, l. c.*: Gnidia cephalotes.
linoides (*Wikstr.*) *Domke, l. c.* 95, in obs.: Gnidia linoides.
penicillatum (*Lichtenst. ex Meissn.*) *Domke, l. c.* 146: Gnidia penicillata.
pubescens (*Berg.*) *Domke, l. c.*: Gnidia pubescens.
pulvinatum (*Bolus*) *Domke, l. c.* 12, 42, in obs.: Gnidia pulvinata.

CRASSIPES Swallen in Am. Journ. Bot. 1931, xviii. 684. *GRAMINEAE.*
annuus *Swallen, l. c.* 685.—U.S.A. (Idaho; Utah).

CRASSOCEPHALUM Moench (Compos.).
haematophyllum (*DC.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.,* ed. 3, *Sieb. & Voss,* i. 520 (1894): Gynura haematophylla.

CRASSULA L. (Crassulac.).
Archeri *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 289 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
erubescens *Bullock in Kew Bull.* 1932, 488.—Afr. trop. or. (Elgon).
fragillima *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 170 (1931), in obs., nomen.—Afr. austr.-occ.
gracilis *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.,* ed. 3, *Sieb. & Voss,* i. 301 (1894), in syn.: C. Schmidtii.
Hookeri *Hort. ex Jacobsen, Sukkulent.* 48 (1933), in syn.: C. Schmidtii.
Lettyae *Phillips in Fl. Pl. S. Afr.* 1931, xi. t. 403.—Afr. austr.
liquiritiodora *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 170 (1931), in obs., nomen.—Afr. austr.-occ.
Loganiana *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 289 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
nuda *Compton in Journ. Bot.* 1932, lxx. 283.—Afr. austr. (Cape Prov.).
parvifolia *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1932, 94.—Kenya Col.
pseudo-columnaris *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 169 (1931), in obs., nomen.—Afr. austr.-occ.

CRASSULA:—
pyrifolia *Compton in Journ. Bot.* 1932, lxx. 283.—Little Namaq.
retrorsa *Hutchinson in Kew Bull.* 1933, 420, in adnot.—Transvaal.
rubella *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 291 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Watermeyeri *Compton in Journ. Bot.* 1931, lxix. 49.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Wrightiana *Bullock in Kew Bull.* 1932, 487.—Kenya Col.; Uganda; Tanganyika Terr.

CRATAEGOMESPILUS Simon-Louis (Rosac.).
[CRATAEGUS + MESPILUS.]
Langei *Seeliger in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 1926, xliv. 508, in obs.—German.

CRATAEGOSORBUS Makino (Rosac.).
tangoënsis *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 52, in syn.: Sorbus tangoënsis.
uzenensis *Koidz. l. c.*, in syn.: Sorbus uzenensis.

CRATAEGUS L. (Rosac.).
bipinnatifida *Hort. ex Wila in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1932, xlvii. 136.—Hort.
colchica *Grossheim, Fl. Kavkaza,* iv. 290 (1934).—Caucas.
Danielsii *Palmer in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 355.—U.S.A. (Missouri).
× Degeni *Zsák in Bot. Közl.* 1935, xxxii. 191.—Hungar.
eremitagensis *Raunk. in Bot. Tidsskr.* xlii. 248 (1933).—Dania.
hannibalensis *Palmer in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 353.—U.S.A. (Iowa; Missouri; Ohio).
leonensis *Palmer, l. c.* 1932, xiii. 422.—U.S.A. (Florida).
Montesantosii *Diapulis in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 886 (1933).—Syria.
orthosepala *Hausskn. & Bornm. ex Diapulis in Fedde, Repert.* xxxiv. 61 (1933).—As. Min. (Galatia).
raavadensis *Raunk. in Bot. Tidsskr.* xlii. 248 (1933).—Dania.
scabrifolia (*Franch.*) *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 71: Pyrus scabrifolia.
Schumacheri *Raunk. in Bot. Tidsskr.* xlii. 247 (1933).—Dania.
sinensis *Lour. ex Gomes in Mem. Acad. Sc. Lisb. Cl. Sc. Pol. Mor. Bel.-Let.* n. s. iv. (1), 29 (1868); *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. ii. 17, 179 (1935), in syn.: Raphiolepis indica.
Tang-Chungchangii *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* xi. 13 (1932).—China (Fokien).

CRATERISPERMUM Benth. (Rubiac.).
gracile *A. Cheval.; Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 116 (1931), in clavi.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).

CRATEROGYNE Lanj. in Rec. Trav. Bot. Néerl. 1935, xxxii. 272. *MORACEAE.*
africana (*Baill.*) *Lanj. l. c.* 273: Trymatococcus africanus.
dorstenioides (*Engl.*) *Lanj. l. c.* 276: Trymatococcus dorstenioides.
kameruniana (*Engl.*) *Lanj. l. c.* 274: Dorstenia kameruniana.
oligogyna (*Pellegr.*) *Lanj. l. c.* 277: Trymatococcus oligogynus.

CRATEROSIPHON Engl. & Gilg (Thymelaeac.).
beniensis *Domke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 352 (1932).—Congo Belg.
djalonensis *A. Cheval.; Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 151 (1927), in syn.: C. scandens.
Klaineanus *Pierre ex Léandri in Ann. Sc. Nat.* Sér. X. xii. 152 (1930), in obs., nomen.—Gabon.
montanus *Domke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 353 (1932).—Cameroons.
pseudoscandens *Domke, l. c.*—Cameroons; Togo.
Quarrei *Staner in Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. 370 (1935).—Congo Belg.
stenurus *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 641 (1921), in obs.—Congo Belg.

CRATEROSTIGMA Hochst. (Scrophulariac.).
lindernioides *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1933, 474.—Tanganyika Terr.

CRATOXYLUM Blume (Guttif.; Hypericac., Gen. Pl.).
dasyphyllum *Hand.-Mazz. in Sinensia*, ii. 4 (1931). —China (Kwangsi).

CRAWFURDIA Wall. (Gentianac.).
Championii (*Gardn.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 198 (1931): Tripterospermum Championii.

CREATANTHA Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago, Bot. Ser., viii. 344 (1931). *RUBIACEAE.*
peruviana *Standley, l. c.*—Peruv.

CREMANTHODIUM Benth. (Compos.).
hederifolium (*Dümmer*) *Chang in Sinensia*, iv. 228 (1934): Gerbera hederifolia.
Smithianum *Hand.-Mazz. in Anz. Akad. Wiss. Wien, Math.-Nat.* 1925, lxii. 14.—China (Yunnan; Szechuan).

CREMASPORA Benth. (Rubiac.).
Wernhamiana *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 85 (1931): Coffea Talbotii.

CREMASTOSPERMA R. E. Fries in Acta Hort. Berg. x. 46 (1930). *ANNONACEAE.*
cauliflorum *R. E. Fries, l. c.* x. 330 (1931).—Peruv.
gracilipes *R. E. Fries, l. c.* 325.—Peruv.
guianense *R. E. Fries, l. c.* xii. 205 (1934).—Guiana Brit.
leiophyllum (*Diels*) *R. E. Fries, l. c.* x. 328 (1931): Guatteria leiophylla.
longicuspe *R. E. Fries, l. c.* xii. 203 (1934).—Peruv.
megalophyllum *R. E. Fries, l. c.* x. 329 (1931).—Peruv.
monospermum (*Rusby*) *R. E. Fries, l. c.* 327: Cymbopetalum monospermum.
pedunculatum (*Diels*) *R. E. Fries, l. c.* x. 48 (1930): Aberemoa pedunculata.
pendulum (*Ruiz & Pav.*) *R. E. Fries, l. c.* x. 325 (1931): Guatteria pendula.
peruvianum *R. E. Fries, l. c.* xii. 204 (1934).—Peruv.
Poiteaui (*Diels*) *R. E. Fries, l. c.* x. 328 (1931): Guatteria Poiteaui.
polyphlebum (*Diels*) *R. E. Fries, l. c.* 331: Unonopsis polyphleba.
Williamsii *R. E. Fries, l. c.* xii. 206 (1934).—Peruv.

CREMASTRA Lindl. (Orchidac.).
bifolia *Tso in Sunyatsenia*, i. 151 (1933).—China (Kwangtung).
variabilis *Nakai, Rep. Veg. Mt. Daisetsusan*, 27 (1930); *Miyabe & Kudo in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 383 (1932).—Sakhalin; Japon. (Hokkaido).

CREMOSPERMA Benth. (Gesneriac.).
album *Morton in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 290.—Colomb.
Castroanum *Morton, l. c.* 289.—Colomb.
cinnabarinum (*Fritsch*) *Morton, l. c.* 290: Besleria cinnabarina.
congruens *Morton, l. c.* 287.—Colomb.
cotejense *Morton, l. c.* 288.—Colomb.
ignotum *Morton, l. c.* 289.—Colomb.
jucundum *Morton, l. c.* 288.—Colomb.
nobile *Morton, l. c.* 290.—Colomb.
pusillum *Morton, l. c.* 287.—Colomb.

CREPIS L. (Compos.).
Abolini *Popov ex Pavlov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1933, n.s. xlii. 128, nomen.—Turkestan.
alaica *Kraschen. & Popov in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 182 (1933).—Ross. asiat. centr.
cameroonica *Babcock ex Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 178 (1931): C. Hookeriana *Oliv. & Hiern.*
Candeli *Sennen in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 187, in obs., nomen.—Marocc.
croatica *Hort. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 500 (1834), in obs.—Hab.?
darvazica *Kraschen. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 182 (1933).—Ross. asiat. centr.
disciformis *Mattf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 685 (1935).—China (Kansu; Szechuan).
distincta *Popov & Vved. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1933, n.s. xlii. 128, 147.—Turkestan.

CREPIS:—
×Holubyana *Domin in Preslia*, xiii–xv. 252 (1935). —Czechoslovak.
integrifolia *Gaud. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 500 (1834), in obs.—Ital.?
Nestmeieri *F. Hermann & Degen in Magyar Bot. Lap.* 1933, xxxii. 64.—Thracia.
parviflora (*Reichb.*) *Kreutzer, Anthochron. Pl. Eur. Med.* 27, 220 (1840): Geracium parviflorum.
rifana *Maire & Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 73 [1933], nomen.—Marocc.
scaposa *Chang in Sinensia*, iii. 201 (1933).—China (Szechuan).
Schachtii *Babcock in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 3, 5, in adnot.—Bulgar.
spinosissima *Bellardi ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 500 (1834), in obs.—Ital.?
suaveolens *Hort. ex Colla, l. c.*—Hab.?
szechuanica *Söderb. in Svensk Bot. Tidskr.* 1934, xxviii. 362, in obs.: C. scaposa *Chang.*
tsarongensis (*W. W. Smith*) *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 194 (1934): Lactuca tsarongensis.
turcomanica *Kraschen. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 181 (1933).—Transcasp.

CRINIPES Hochst. (Gramin.).
gynoglossa *Goossens in Kew Bull.* 1934, 200.—Transvaal.
longifolius *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1935, 306.—Uganda.
longipes (*Stapf & C. E. Hubbard*) *C. E. Hubbard, l. c.*, in obs.: Triraphis longipes.

CRINUM L. (Amaryllidac.).
amoenum *Roxb. Hort. Beng.* 23 (1814), nomen; *J. B. Ker in Journ. Sc. & Arts, Lond.* iii. 106 (1817), descr.—Ind. or. (Silhet).
augustum *Roxb. l. c.*, nomen; *J. B. Ker, l. c.* 113, descr.—Mauritius.
canaliculatum *Roxb. l. c.*, nomen; *J. B. Ker, l. c.* 112, descr.—Hab.?
ceruleum [sic] *Rafin. Atlant. Journ.* 164 (1833), in obs.—U.S.A. (Louisiana).
crispum *Phillips in Fl. Pl. S. Afr.* 1934, xiv. t. 532. —Transvaal.
Eleonorae *Blatter & McCann in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxii. 733 (1928).—Ind. or. (Bombay).
ensifolium *Roxb. Hort. Beng.* 23 (1814), nomen; *J. B. Ker in Journ. Sc. & Arts, Lond.* iii. 106 (1817), descr.—Burma.
heterostylum *Bullock in Kew Bull.* 1932, 505.—Afr. trop. or. (Elgon).
hydrophilum (*Thunb.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1014 (1895): Haemanthus hydrophilus.
longifolium *Roxb. Hort. Beng.* 23 (1814), nomen; *J. B. Ker in Journ. Sc. & Arts, Lond.* iii. 107 (1817), descr.—Ind. or. (Bengal).
lorifolium *Roxb. l. c.*, nomen; *J. B. Ker, l. c.* 110, descr.—Burma.
moluccanum *Roxb. l. c.*, nomen; *J. B. Ker, l. c.* 109, descr.—Ins. Molucc. (Amboina).
×Muellerianum *W. Müller in Gartenflora*, 1931, lxxx. 12.—Hort.
×Prainianum *W. Müller, l.c.*—Hort.
sumatranum *Roxb. Hort. Beng.* 23 (1814), nomen; *J. B. Ker in Journ. Sc. & Arts, Lond.* iii. 107 (1817), descr.—Sumatra.

CRISTARIA Cav. (Malvac.).
tripinnatifida *R. Phil. in Verh. Deutsch. Wiss. Ver. Santiago (Chile)*, ii. 106 (1890), nomen.—Chile.

CRITESION Rafin. (Gramin.).
jubatum (*L.*) *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 721 (1934): Hordeum jubatum.

CROCANTHEMUM Spach (Cistac.).
arenicola (*Chapm.*) *Barnhart in Small, Man. Southeast. Fl.* 879 (1933): Helianthemum arenicola.
georgianum (*Chapm.*) *Barnhart, l. c.*: Helianthemum georgianum.
Nashii (*Britton*) *Barnhart, l. c.*: Helianthemum Nashi.

CROCOSMIA Planch. (Iridac.).
crocosmiflora (*Nicholson*) *N. E. Brown in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xx. 264 (1932): Tritonia crocosmiflora.
latifolia *N. E. Brown, l. c.*—Hab.?
maculata (*Baker*) *N. E. Brown, l. c.*: C. aurea var. maculata.
Masonorum (*L. Bolus*) *N. E. Brown, l. c.*: Tritonia Masonorum.
Pottsii (*Baker*) *N. E. Brown, l. c.*: Tritonia Pottsii.

CROCUS L. (Iridac.).
artvinensis (*I. Phil.*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 248 (1928): C. biflorus var. artvinensis.
Elwesii (*Maw*) *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxvi. 74 (1934): C. sativus var. Elwesii.
Jessoppiae *Bowles, Handb. Crocus & Colch.* 146 (1924), hybr.?—Hab.?
Michelsoni *B. Fedtsch. in B. Fedtsch. & al., Fl. Turkm.* i. 328 (1932); *et in Komarov, Fl. URSS*, iv. 506, 749 (1935).—Transcasp.
orbelicus *Stoyanoff in Stoyanoff & Stefanoff, Fl. Bulg.* ed. 2, 249 (1933), in syn.: C. veluchensis var. orbelicus *Stoyanoff.*
tomoricus *Markgraf in Denkschr. Akad. Wiss. Wien, Math.-Nat.* cii. 330 (1931).—Albania.

CROMIDON Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr. xix. 308 (1931). *SELAGINACEAE.*
corrigioloides (*Rolfe*) *Compton, l. c.*, cum descr. ampl.: Selago corrigioloides.

CROPTILON Rafin. (Compos.).
Hookerianum (*Torr. & Gray*) *House in Bull. N. Y. State Mus.* 1920, Nos. 233–4, 61 (1921): Isoppappus Hookerianus.

CROSSANDRA Salisb. (Acanthac.).
afromontana *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 822 (1933).—Tanganyika Terr.
albolineata *Benoist in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 716.—Madag.
cephalostachya *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1083 (1934).—Tanganyika Terr.
citrina *Benoist in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 716.—Madag.
Humbertii *Benoist, l. c.* 713.—Madag.
longispica *Benoist, l. c.* 714.—Madag.
Poissonii *Benoist, l. c.* 715.—Madag.
spinescens *Dunkley in Kew Bull.* 1934, 190.—Rhodesia.
sulphurea *G. Taylor in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 165. —N. Rhodesia.
thomensis *Milne-Redhead in Kew Bull.* 1935, 280. —Afr. trop. occ. (S. Thomé).
vestita *Benoist in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 714.—Madag.
Wissmannii *Schwartz in Mitt. Inst. Bot. Hamburg*, viii. 420 (1931).—Arab.

CROSSOSTYLIS J. R. & G. Forst. (Rhizophorac.).
banksiana *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 252.—N. Hebrides.

CROSSOTROPIS Stapf (Gramin.).
arenaria (*Hochst. & Steud. ex Steud.*) *Rendle in Welw. Cat. Afr. Pl.* ii. 1. 226 (1899), in obs.: Leptochloa arenaria.

CROTALARIA L. (Legumin.).
albertiana *E. G. Baker in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiii. 179 (1933).—Congo Belg.
Allenii *Verdoorn in Bothalia*, ii. 417 (1928).—Rhodesia.
annua *Milne-Redhead in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3243 (1934).—N. Rhodesia.
astragalinoides *E. G. Baker in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiii. 180 (1933).—Congo Belg.
athroöphylla *Verdoorn in Bothalia*, ii. 390 (1928).—Rhodesia.
australis (*E. G. Baker*) *E. G. Baker ex Verdoorn, l. c.* 389: C. petiolaris var. australis.
Balbi *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 27 (1935).—Kenya Col.
brachycarpa (*Benth.*) *Burtt Davy ex Verdoorn in Bothalia*, ii. 412 (1928): C. globifera var. brachycarpa, non C. brachycarpa *Benth.* (1859).
Burttii *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1932, lxx. 251.—Tanganyika Terr.
Camisassae *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 27 (1935).—Kenya Col.

CROTALARIA:—
Ceciliae *Verdoorn in Bothalia*, ii. 392, 393 (1928).—Afr. Lusit. Or.
cinerea *Burtt Davy ex Verdoorn, l. c.* 411; *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. 400 (1932).—Transvaal.
citriocolorata *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 340.—Tanganyika Terr.
cytisoides *Roxb. ex DC. Prodr.* ii. 131 (1825).—Nepal.
diloloënsis *E. G. Baker in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxi. 297 (1932).—Congo Belg.
Doidgeae *Verdoorn in Bothalia*, ii. 392 (1928).—Transvaal.
Engleri *Harms in Engl. Pflanzenw. Afr.* i. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 337, fig. 303 (1910).—Tanganyika Terr.
Friesii *Verdoorn in Bothalia*, ii. 405 (1928).—Rhodesia.
gracilicaulis *E. G. Baker in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiii. 180 (1933).—Congo Belg.
Greenwayii *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 339.—Tanganyika Terr.
herpetoclada *Rossberg in Fedde, Repert.* xxxviii. 105 (1935).—Angola.
kandoënsis *E. G. Baker in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxi. 298 (1932).—Congo Belg.
kasikiensis *E. G. Baker, l. c.* 299.—Congo Belg.
kelaënsis *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1932, lxx. Suppl. 1, 228.—Angola.
Lathouwersii *E. G. Baker in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiii. 179 (1933).—Congo Belg.
Lebrunii *E. G. Baker, l. c.* 178.—Congo Belg.
Linaria *Small, Man. Southeast. Fl.* 679 (1933).—U.S.A. (Florida).
linearifoliolata *Chiov. Fl. Somala*, II. 155 (1932).—Somal. Ital.
longidens *Burtt Davy ex Verdoorn in Bothalia*, ii. 390 (1928); *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. 398 (1932).—Transvaal.
lotiformis *Milne-Redhead in Kew Bull.* 1935, 275.—Kenya Col.
Lugardiorum *Bullock in Kew Bull.* 1932, 493.—Afr. trop. or. (Elgon).
lukuluensis *E. G. Baker in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxi. 299 (1932).—Congo Belg.
Luxenii *E. G. Baker, l. c.* xxiii. 177 (1933).—Congo Belg.
minutiflora *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 339.—Kenya Col.
mongaënsis *E. G. Baker in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiii. 178 (1933).—Congo Belg.
mossamedesiana *E. G. Baker in Bol. Soc. Brot.* Sér. II. viii. 103 (1933).—Angola.
orientalis *Burtt Davy ex Verdoorn in Bothalia*, ii. 417 (1928).—Orange Free State; Transvaal.
paludosa *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1933, Sér. II. v. 230.—Senegal; Guinea Gall.
praecox *Milne-Redhead in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3244 (1934).—N. Rhodesia.
pseudo-Descampsii *E. G. Baker in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxi. 298 (1932).—Congo Belg.
Quarrei *E. G. Baker, l. c.* xxiii. 181 (1933).—Congo Belg.
Sennii *Chiov. Fl. Somala*, II. 157 (1932).—Somal. Ital.
shamvaënsis *Verdoorn in Bothalia*, ii. 405 (1928).—Rhodesia.
singuliflora *E. G. Baker in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxi. 300 (1932).—Congo Belg.
Staneriana *E. G. Baker, l. c.*—Congo Belg.
stenocladon *E. G. Baker, l. c.* 297.—Congo Belg.
streptorrhyncha *Milne-Redhead in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3245 (1934).—N. Rhodesia.
subdisperma *E. G. Baker in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiii. 177 (1933).—Congo Belg.
tanganyikensis *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 339.—Tanganyika Terr.
thaumasiophylla *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 398 (1932).—Tanganyika Terr.
unicaulis *Bullock in Kew Bull.* 1931, 271.—N. Rhodesia.
vialis *Milne-Redhead in Kew Bull.* 1933, 469.—Tanganyika Terr.
Wittei *E. G. Baker in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxi. 300 (1932).—Congo Belg.

CROTALARIA:—
Youngii *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 294.—Angola.

CROTON L. (Euphorbiac.).
aculeatus *Splitg. ex Lanj. Euphorbiac. Surinam*, 127 (1931); *et in Pulle, Fl. Surinam*, ii. (*Meded. K. Ver. Kol. Inst. Amst.* xxx.) 41 (1932), pro syn.: Caperonia chorchoroides.
Alvaradonis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 48 (1933–5).—Calif. infer.
attenuatus *M. E. Jones, l. c.* 47.—Calif. infer.
Bartlettii *Lanj. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 460.—Guiana Brit.
Benthamianus (*Muell.-Arg.*) *Lanj. Euphorbiac. Surinam*, 17 (1931): C. matourensis var. Benthamianus.
blasianus *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 49 (1933–5).—Mexico.
bogotanus *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 27, Cuadro 6 (1934), nomen; *et l. c.* No. 29, p. 8 (1935), descr.—Colomb.
boregensis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 48 (1933–5).—Calif. infer.
Briquetianus *Herter, Fl. Urug. Pl. Vasc.* (*Estud. Bot. Reg. Urug.* iv.) 79 (1931), nomen.—Urug.
campechianus *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 66 (1935).—Mexico.
crenulatus *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 48 (1933–5).—Calif. infer.
cuneatus *Klotzsch; Lanj. Euphorbiac. Surinam*, 11 (1931), descr. ampl.—Bras. (Amaz.); Giana Bat.
cyathodenus *Desv. ex Lanj. l. c.* 15, pro syn.: C. matourensis.
Decaryi *Léandri in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 370.—Madag.
Denisi *Léandri, l. c.* 367.—Madag.
galeopsifolius *Lanj. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 455.—Guiana Brit.
Geayi *Léandri in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 368.—Madag.
guerzesiensis *Beille in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 294 (1917).—Guinea Gall.
lagunensis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 55 (1933–5).—Calif. infer.
Lamarckianus *Moldenke in Phytologia*, i. 167 (1935): C. Cascarilla *Lam.*
longiradiatus *Lanj. Euphorbiac. Surinam*, 19 (1931).—Guiana Bat.; Guatem.?
Lundellii *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 67 (1935).—Mexico.
macrourus *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* v. 110 (1836), in obs.—Bras.
Masonii *I. M. Johnston in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 67 (1931).—Mexico (Arch. Revillagigedo).
mohavensis (*Ferguson*) *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 40: C. californicus var. mohavensis.
officinalis (*Klotzsch*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 264 (1931): Tiglium officinale.
Perrieri *Léandri in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 369.—Madag.
potaroënsis *Lanj. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 457.—Guiana Brit.
Pullei *Lanj. Euphorbiac. Surinam*, 18 (1931).—Guiana Bat.
splendidus *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* v. 110 (1836).—Bras.
Stahelianus *Lanj. Euphorbiac. Surinam*, 17 (1931).—Guiana Bat.

CROTONOGYNE Muell.-Arg. (Euphorbiac.).
stenophylla *Pax in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 57 (1921), in obs.—Gabon.

CRUDIA Schreb. (Legumin.).
bantamensis (*Hassk.*) *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxv. 315 (1865): Touchiroa bantamensis.
unifoliolata *Kleinh. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 170.—Guiana Bat.

CRYOPHYTUM N. E. Brown (Ficoidac.).
Dejagerae *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 315 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).

CRYOPHYTUM:—
Fulleri *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 301 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Galpinii *L. Bolus, l. c.* 231.—Afr. austr. (Cape Prov.).
pentagonum *L. Bolus, l. c.* 228.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Salterii *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 316 (1932).—Little Namaq.
subulatum *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 229 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
suffruticosum *L. Bolus, l. c.* 230.—Afr. austr. (Cape Prov.).

CRYOSOPHILA Blume (Palmae).
albida *H. H. Bartlett in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 40 (1935).—Costa Rica; Panamá.
argentea *H. H. Bartlett, l. c.*—Mexico; Guatem.; Brit. Honduras.
Cookii *H. H. Bartlett, l. c.* 39.—Costa Rica.
Warscewiczii (*Wendl.*) *H. H. Bartlett, l. c.* 38: Acanthorrhiza Warscewiczii.

CRYPTANDRA Sm. (Rhamnac.).
gracilipes (*Diels*) *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 77 (1931): Stenanthemum gracilipes.

CRYPTANTHA Lehm. (Boraginac.).
Bridgesii (*R. Phil.*) *A. Brand in Engl. Pflanzenreich, Borrag.-Borraginoid.-Cryptanth.* 30 (1931): Eritrichium Bridgesii.
Buchtienii *A. Brand, l. c.*—Chile.
clandestina (*Trev.*) *I. M. Johnston in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 195: Lithospermum clandestinum.
exigua *Osterh. in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1930, lvii. 560 (1931).—U.S.A. (Colorado).
fragilis *Peck in Torreya*, 1932, xxxii. 152.—U.S.A. (Oregon).
Hoffmannii *I. M. Johnston in Contrib. Arn. Arb.* No. 3, 90 (1932).—U.S.A. (Calif.).
longiseta (*R. Phil.*) *A. Brand in Engl. Pflanzenreich, Borrag.-Borraginoid.-Cryptanth.* 50 (1931): Eritrichium longisetum.
mendocina *I. M. Johnston in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcii. 94 (1930).—Argent.
nesiotica (*I. M. Johnston*) *A. Brand in Engl. Pflanzenreich, Borrag.-Borraginoid.-Cryptanth.* 42 (1931): C. Grayi var. nesiotica.
parvula (*R. Phil.*) *A. Brand, l. c.* 50: Eritrichium parvulum.
rudis *A. Nelson ex A. Brand, l. c.* 43, in syn.: C. Kelseyana.
talquina (*R. Phil.*) *A. Brand, l. c.* 32: Eritrichium talquinum.
Thompsonii *I. M. Johnston in Contrib. Arn. Arb.* No. III. 88 (1932).—U.S.A. (Washington).

CRYPTANTHEMIS Rupp in Proc. Linn. Soc. N.S. Wales, 1932, lvii. 58. *ORCHIDACEAE.*
Slateri *Rupp, l. c.*; *et l. c.* 1933, lviii. 225, descr. ampl.—Austral. (N. S. Wales).

CRYPTANTHUS Otto & Dietr. (Bromeliac.).
atropurpureus *Hort. ex Mez in Engl. Pflanzenreich, Bromeliac.* 18 (1934), in syn.: C. bivittatus var. atropurpureus *Mez.*

CRYPTARRHENA R. Br. (Orchidac.).
brasiliensis *Brade in Rodriguesia*, i. No. 2, 25 (1935), in obs.; *et in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 215 (1935), descr.—Bras. (S. Paulo).

CRYPTOCARYA R. Br. (Laurac.).
angulata *C. T. White in Contrib. Arn. Arb.* No. IV. 33 (1933).—Austral. (Queensland).
Fleuryi *A. Cheval. ex H. Liou, Laurac. Chine et Indochine*, 98 (1932).—Indo-China (Anam).
fusca *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 91, 8 (1932).—Ins. Viti.
Hornei *Gillespie, l. c.* No. 83, 6 (1931).—Ins. Viti.
lifuensis *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1924, lxxi. 1103, 1317 (1925), sphalm.: Cassytha lifuensis.
macrocarpa *Guillaumin, l. c.*, sphalm.: Cassytha macrocarpa.
Merrillii *C. T. White in Kew Bull.* 1933, 46: C. cinnamomifolia *Merrill.*

CRYPTOCARYA:—
robusta *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 97.—Peruv.
samoënsis *Christoph. in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 128, 91 (1935).—Samoa.
tannaënsis *Guillaumin in Journ.* Arn. Arb. 1933, xiv. 59.—N. Hebrides.
turbinata *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 83, 7 (1931).—Ins. Viti.
Wilsonii *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 84.—N. Hebrides.

CRYPTOCHILUS Wall. (Orchidac.).
ctenostachyus *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 163.—Indo-China (Tonkin).
Petelotii *Gagnep. l. c.* 164.—Indo-China (Tonkin).

CRYPTOCORYNE Fisch. (Arac.).
albida *R. N. Parker in Kew Bull.* 1931, 44.—Burma.
cognatoides *Blatter & McCann in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxv. 17 (1931).—Ind. or. (Bombay).
lutea *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 293 (1931).—Zeylan.
Nurii *Furtado in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 147 (1935).—Penins. Mal.
Petchii *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 293 (1931).—Zeylan.
tortuosa *Blatter & McCann in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxv. 16 (1931).—Ind. or. (Bombay).
Willisii *Hort. ex A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1934, xiv. 482, nomen.—Hab.?

CRYPTOLEPIS R. Br. (Asclepiadac.).
buxifolia *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 80 (1935).—Kenya Col.
orbicularis *Chiov. Fl. Somala*, II. 291 (1932).—Somal. Ital.

CRYPTOPHORANTHUS Barb.-Rodr. (Orchidac.).
spicatus *Dutra in Ostenia*, 172 (1933).—Bras. (Rio Grande do Sul).

CRYPTOPHRAGMIUM Nees (Acanthac.).
langbianense *Benoist in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 603.—Indo-China (Anam).
Pierrei *Benoist, l. c.* 604.—Cochinch.
signatum *Benoist, l. c.* 602.—Cochinch.
Thorelii *Benoist, l. c.* 604.—Indo-China (Laos).
tonkinense *Benoist, l. c.* 603.—Indo-China (Tonkin).

CRYPTOSEPALUM Benth. (Legumin.).
fruticosum *Hutchinson in Kew Bull.* 1931, 250.—N. Rhodesia.
Ritschardi *De Wild. & Staner, Contrib. Fl. Katanga*, Suppl. IV. 41 (1932).—Congo Belg.
Robynsi *De Wild. in De Wild. & Staner, l. c.* 40.—Congo Belg.

CRYPTOSPORA Kar. & Kir. (Crucif.).
inconspicua (*Komarov*) *O. E. Schulz in Engl. Jahrb.* lxvi. 97 (1933): Trichochiton inconspicuum.

CRYPTOSTEPHANUS Welw. (Amaryllidac.).
Herrei *Leighton in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 137, 143.—Namaqualand.

CRYPTOSTYLIS R. Br. (Orchidac.).
ligulata *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 163 (1934).—N. Guin.
taiwaniana *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1933, xxiii. 208.—Formosa.
tridentata *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 174 (1935).—Borneo.

CTENADENA Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med. (Trans. Rubber & Guttap. Inst.) 13, in clavi, 28 (1933). *EUPHORBIACEAE.*
lanata (*Sieb. ex Spreng.*) *Prokh. l. c.* 28: Euphorbia lanata.

CTENIUM Panz. (Gramin.).
camposum *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1934, xiv. 128.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).

CUCUMIS L. (Cucurbitac.).
chinensis (*Pangalo*) *Pangalo in Bull. Applied Bot., Leningrad*, 1929–30, xxiii. No. 3, 547, 559 (1930); *et in Zhuk. Turq. Agric.* (*Part. Asiat.: Anatolie*) 534 (1933), in adnot.: C. Melo var. chinensis.

CUCUMIS:—
Grossularia *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 344 (1894), in syn.: C. myriocarpus.
leptodermis *Schweickerdt in S. Afr. Journ. Sc.* 1933, xxx. 460.—Orange Free State; Cape Prov.
microcarpus (*Pangalo*) *Pangalo in Zhuk. Turq. Agric.* (*Part. Asiat.: Anatolie*) 534 (1933), in adnot.: C. Melo var. microcarpus.
myriocarpus *Naud.*; *Schweickerdt in S. Afr. Journ. Sc.* 1933, xxx. 459, descr. emend.—Orange Free State; Basutoland; Cape Prov.

CUCURBITA L. (Cucurbitac.).
depressa *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 347 (1894), in syn.: C. Pepo.
pyrotheca *Hort. ex Vilmorin, l. c.* 348, in syn.: Lagenaria Lagenaria.

CUFODONTIA R. E. Woodson in Archiv. Bot., Forli, 1934, x. 38. *APOCYNACEAE.*
arborea *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1934, xxi. 617.—Mexico.
Lundelliana *R. E. Woodson in Archiv. Bot., Forli*, 1934, x. 40.—Guatem.
stegomeris *R. E. Woodson, l. c.* 39.—Costa Rica.

CULCASIA Beauv. (Arac.).
loukandensis *Pellegr. in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 142.—Gabon.
reticulata *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1176 (1895), in syn.: C. Mannii.

CULCITIUM Humb. & Bonpl. (Compos.).
paramense (*Cuatrec.*) *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 29, 36 (1935), cum descr.: Senecio paramensis.
pichinchense *Cuatrec. in An. Univ. Madrid*, iv. Fasc. 2, 215 (1935).—Ecuador.

CUNONIA L. (Cunoniac.; Saxifragac., Gen. Pl.).
rotundifolia *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 164.—N. Caled.
Schinziana *Däniker, l. c.* 163.—N. Caled.

CUNURIA Baill. (Euphorbiac.).
bracteosa *Ducke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 586 (1932), in obs.; *et in Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro*, vi. 57 (1933).—Bras. (Amaz.).

CUPANIA L. (Sapindac.).
candicans *Panch. in Sebert, Not. Bois Nouv. Caléd.* 270 [1874], nomen; *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 1231 (1933), in syn.: Storthocalyx chryseus.
grandidens *Hort. ex Radlk. l. c.* 1062, nomen.—Hort.
olivacea *Gleason & A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1934, lxi. 193.—Bras. (Maranhão).
pedicellaris *Sagot in Ann. Sc. Nat.* Sér. VI. xii. 197 (1881), in syn.: Talisia pedicellaris.
polyzyga *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 1060 (1933), cum descr.: C. dentata *Glaziou.*
prisca *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 69 (1935).—Guatem.

CUPANIOPSIS Radlk. (Sapindac.).
aneityensis *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 56.—N. Hebrides.
denticulata *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 1191 (1933).—N. Guin.
Godefroyi *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 338.—N. Caled.
insularis *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 1190 (1933).—N. Guin.
neo-ebudensis *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 241.—N. Hebrides.
papuana *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 1190 (1933).—N. Guin.
Pennelii *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 338.—N. Caled.
Sebertii *Guillaumin, l. c.* 339.—N. Caled.
trigonocarpa *Radlk.*; *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 694, descr. ampl.—N. Caled.

CUPHEA P. Br. (Lythrac.).
callosa *Bacigal. in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcv. 18 (1931).—Colomb.
Ferrisiae *Bacigal. l. c.* 10.—Mexico.
flavisetula *Bacigal. l. c.* 8.—Mexico.

CUPHEA:—
Hintoni *Bullock in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3294 (1935).—Mexico.
laeviuscula *Bacigal. in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcv. 12 (1931).—Argent.
Lindmaniana *Koehne ex Bacigal. l. c.* 6.—Bras. (Paraná).
Loefgrenii *Bacigal. l. c.* 24.—Bras. (Ceará).
Mexiae *Bacigal. l. c.* 25.—Mexico.
myrtifolia *Bacigal. l. c.* 17.—Bras. (Matto Grosso).
obliqua *Bacigal. l. c.* 14.—Argent.
obtusifolia *Koehne ex Bacigal. l. c.* 5.—Bras. (Paraná).
oreophila *T. S. Brandegee ex Bacigal. in Contrib. Dudley Herb. Stanford Univ.* i. 192 (1933).—Mexico.
paranensis *Bacigal. in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcv. 15 (1931).—Bras. (Paraná).
purpurascens *Bacigal. l. c.* 23.—Mexico.
quaternata *Bacigal. l. c.* 22.—Mexico.
tenuipes *Bacigal. l. c.* 21.—Mexico.
tuberosiformis *Koehne ex Bacigal. l. c.* 16.—Parag.; Bras. (Paraná); Argent.
varia *Koehne ex Bacigal. l. c.* 7.—Bras. (Paraná).
Watsoni *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 50 (1933–5).—Mexico.

CUPHONOTUS O. E. Schulz in Engl. Jahrb. lxvi. 92 (1933). *CRUCIFERAE.*
australis (*Hook. f.*) *O. E. Schulz, l. c.*, in obs.: Capsella australis.
humistratus (*F. Muell.*) *O. E. Schulz, l. c.*, in obs.: Capsella humistrata.

CUPRESSUS L. (Pinac.; Conif., Gen. Pl.).
cashmeriana *Royle ex Carrière, Traité Conif.* ed. 2, 161 (1867).—Tibet.
gracilis *Hort. ex Biswas in Journ. & Proc. As. Soc. Beng.* 1932, n. s. xxviii. 367 (1933), nomen.—Hab.?
kongoënsis *Hort. ex Dallimore in Rep. Conif. Conf. R.H.S. 1931* (*Conif. in Cult.*) 37 (1932), in syn.: Thuja koraiensis.
koraiensis *Hort. ex Dallimore, l. c.*, in syn.: Thuja koraiensis.
montana *Wiggins in Contrib. Dudley Herb. Stanford Univ.* i. 161 (1933).—Calif. infer.

CUPULARIA Godr. & Gren. (Compos.).
Blakei *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 91.—Hispan.
Lozanoi (*Caballero*) *Caballero in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 28, 19 (1935), in obs., pro syn.: Inula Lozanoi.

CURCAS Adans. (Euphorbiac.).
lobata *Splitg. ex Lanj. Euphorbiac. Surinam*, 154 (1931); *et in Pulle, Fl. Surinam*, ii. (*Meded. K. Ver. Kol. Inst. Amst.* xxx.) 68 (1932), pro syn.: Jatropha Curcas.

CURCULIGO Gaertn. (Amaryllidac.).
annamitica *Gagnep. in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, vi. 685 (1934); *et in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 67.—Indo-China (Anam).
Conoc *Gagnep. l. c.* 683; *et l. c.*—Indo-China (Anam).
disticha *Gagnep. l. c.* 682; *et l. c.* 68.—Indo-China (Anam; Cochinch.).
pilosa (*Schum. & Thonn.*) *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* ii. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 353 (1908), in obs.: Gethyllis pilosa.
tonkinensis *Gagnep. in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, vi. 684 (1934); *et in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 68.—Indo-China (Tonkin).

CURCUMA L. (Zingiberac.; Scitamin., Gen. Pl.).
elata *Roxb. Hort. Beng.* 1 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 25 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 25 (1832).—Burma.
inodora *Blatter in Journ. & Proc. As. Soc. Beng.* 1930, n. s. xxvi. 357 (1931).—Ind. or. (Bombay).
petiolata *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 36 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 37 (1832).—Burma.
purpurea *Blatter in Journ. & Proc. As. Soc. Beng.* 1930, n. s. xxvi. 358 (1931).—Ind. or. (Bombay).

CURCUMA:—
zanthorrhiza *Roxb. Hort. Beng.* 1 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 25 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 25 (1832).—Ins. Molucc. (Amboina).

CURTONUS N. E. Brown in Trans. Roy. Soc. S. Afr. xx. 270 (1932). *IRIDACEAE.*
paniculatus (*Klatt*) *N. E. Brown, l. c.*: Antholyza paniculata.

CUSCUTA L. (Convolvulac.).
aggregata *Roxb. Hort. Beng.* 12 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 467 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 447 (1832).—Mesopotam.
alpestris *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 89 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
barbuvea (*Brot.*) *G. Sampaio in Man. Fl. Port.* 384 (1913); *et in Bol. Soc. Brot.* Sér. II. x. 242 (1935): C. europaea var. barbuvea.
bella *Yuncker in Mem. Torr. Bot. Cl.* xviii. 203 (1932).—Peruv.
bifurcata *Yuncker, l. c.* 131.—Transvaal; Cape Prov.
brachycalyx (*Yuncker*) *Yuncker, l. c.* 159: C. californica var. brachycalyx.
campestris *Yuncker, l. c.* 138: C. arvensis *auct.*, non *Beyr.*
capitata *Roxb. Hort. Beng.* 12 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 468 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 448 (1832).—Ind. or.
Cockerellii *Yuncker in Mem. Torr. Bot. Cl.* xviii. 230 (1932).—Peruv.
Convolvuli *Koch ex Yuncker, l. c.* 297, in syn.: C. approximata var. urceolata *Yuncker.*
cordofana (*Engelm.*) *Yuncker, l. c.* 127: C. obtusiflora var. cordofana.
costaricensis *Yuncker, l. c.* 227.—Costa Rica; Mexico.
fasciculata *Yuncker, l. c.* 240.—U.S.A. (N. Mexico).
Friesii *Yuncker, l. c.* 185.—Argent.
ghindensis *Schweinf. ex Yuncker, l. c.* 288, in syn.: C. abyssinica var. ghindensis *Yuncker.*
glabrior (*Engelm.*) *Yuncker, l. c.* 140: C. verrucosa var. glabrior.
globifera *Schaffner ex Yuncker in Illinois Biol. Monogr.* vi. 40 (1921), in syn.: C. potosina var. globifera *Schaffner.*
grossa *Engelm. ex Yuncker in Mem. Torr. Bot. Cl.* xviii. 194 (1932), in syn.: C. globiflora.
Haughtii *Yuncker, l. c.* 153.—Peruv.
Haussknechtii *Yuncker, l. c.* 269.—Persia.
Hitchcockii *Yuncker, l. c.* 230.—Peruv.
Keetii *Schlechter ex Yuncker, l. c.* 264, in syn.: C. africana.
madagascarensis *Yuncker, l. c.* 276.—Madag.
maritima *Makino in Journ. Jap. Bot.* i. 30 (1917).—Japon.
mexicana *Yuncker in Mem. Torr. Bot. Cl.* xviii. 215 (1932).—Mexico.
Notochlaenae *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1935, xv. 921.—Ins. C. Verde.
Ortegana *Yuncker in Mem. Torr. Bot. Cl.* xviii. 232 (1932).—Mexico.
paitana *Yuncker, l. c.* 206.—Peruv.
papillosa (*Engelm.*) *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 122 (1932): C. planiflora var. papillosa.
Parodiana *Yuncker in Mem. Torr. Bot. Cl.* xviii. 190 (1932).—Argent.
pentaptera *Engelm. ex Yuncker, l. c.* 267, in syn.: C. angulata.
peruviana *Yuncker, l. c.* 151.—Peruv.
pontica *Koch ex Yuncker, l. c.* 297, in syn.: C. approximata var. urceolata *Yuncker.*
pulverulenta *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 79 [1933]: an C. planiflora var. papillosa *Engelm.*
pusilla *Phil. ex Yuncker in Mem. Torr. Bot. Cl.* xviii. 151 (1932).—Chile.
saccharata (*Engelm.*) *Yuncker, l. c.* 239: C. gracillima var. saccharata.
sarothamniarborei *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 79 [1933], nomen.—Marocc.
Schlechteri *Yuncker in Mem. Torr. Bot. Cl.* xviii. 132 (1932).—Cameroons.
somaliensis *Yuncker, l. c.* 291.—Somaliland.
sonoriensis *Engelm. ex Yuncker, l. c.* 228, in syn.: C. odontolepis.
Suksdorfii *Yuncker, l. c.* 167.—U.S.A. (Washington; Oregon).

CUSCUTA:—
sulcata *Roxb. Hort. Beng.* 12 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 467 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 447 (1832).—Ind. or. (Bengal).
Tatei *Yuncker in Mem. Torr. Bot. Cl.* xviii. 134 (1932).—Austral. (N. Territory).
tucumana *Yuncker, l. c.* 191.—Argent.
victoriana *Yuncker, l. c.* 129.—S. Austral.; Victoria.
yucatana *Yuncker in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1935, lxii. 511.—Mexico.
zacatlasculi *Schaffner ex Yuncker in Mem. Torr. Bot. Cl.* xviii. 214 (1932), in syn.: C. tinctoria.
Zizyphi-Loti *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 101.—Hispan.

CUSPARIA Humb. (Rutac.).
Angostura (*Rich.*) *Lyons, Plant Names Scientific & Popular*, 127 (1900): Bonplandia Angostura.

CUSSONIA Thunb. (Araliac.).
jatrophoides *Hutchinson & E. A. Bruce in Kew Bull.* 1931, 273.—Tanganyika Terr.
sessilis *Lebrun in Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. 15 (1934).—Congo Belg.

CUTHBERTIA Small (Commelinac.).
ornata *Small, Man. Southeast. Fl.* 259 (1933).—U.S.A. (Florida).

CUVIERA DC. (Rubiac.).
Le-Testui *Pellegr. in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 142.—Gabon.
truncata *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 118 (1931).—Nigeria.

CYANANTHUS Wall. ex Benth. in Royle, Ill. Bot. Himal. 309 (May 1836). *CAMPANULACEAE.*
Hayanus *Hort. ex Journ. Roy. Hort. Soc.* 1934, lix. 445.—Nepal.

CYANEA Gaudich. (Campanulac.).
selachicauda *Degener, Fl. Hawaiiensis*, Fam. 339 (1932).—Ins. Sandvic. (Oahu).

CYANOCOCCUS Rydb. (Vacciniac.).
amoenus (*Ait.*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 1014 (1933): Vaccinium amoenum.
angustifolius (*Ait.*) *Rydb. in Brittonia*, i. 94 (1931): Vaccinium angustifolium.
atrococcus (*A. Gray*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 1014 (1933): Vaccinium corymbosum var. atrococcum.
corymbosus (*L.*) *Rydb. in Brittonia*, i. 94 (1931): Vaccinium corymbosum.
Cuthbertii *Small, Man. Southeast. Fl.* 1015 (1933).—U.S.A. (Georgia; S. Carolina).
Elliottii (*Chapm.*) *Small, l. c.* 1014: Vaccinium Elliottii.
fuscatus (*Ait.*) *Small, l. c.* 1013: Vaccinium fuscatum.
hirsutus (*Buckl.*) *Small, l. c.* 1016: Vaccinium hirsutum.
holophyllus *Small, l. c.* 1015.—U.S.A. (Georgia; Florida).
liparus *Small, l. c.* 1016.—U.S.A. (E. States).
Margarettae (*Ashe*) *Small, l. c.* 1015: Vaccinium Margarettae.
Myrsinites (*Lam.*) *Small, l. c.* 1013: Vaccinium Myrsinites.
pallidus (*Ait.*) *Small, l. c.* 1016: Vaccinium pallidum.
simulatus (*Small*) *Small, l. c.* 1015: Vaccinium simulatum.
subcordatus *Small, l. c.* 1016.—U.S.A. (Tennessee).
tallapusae *Coville ex Small, l. c.*—U.S.A. (Alabama; Georgia).
tenellus (*Ait.*) *Small, l. c.* 1014: Vaccinium tenellum.
vacillans (*Kalm*) *Rydb. in Brittonia*, i. 94 (1931): Vaccinium vacillans.
virgatus (*Ait.*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 1014 (1933): Vaccinium virgatum.

CYANOSTEGIA Turcz. (Verbenac.).
cyanocalyx (*F. Muell.*) *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 112 (1931): Bunnya cyanocalyx.

CYANOTIS D. Don (Commelinac.).
epiphytica *Blatter in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxiii. 76 (1928).—Ind. or. (Bombay).

CYANOTIS:—
quadricolor *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1144 (1895), in syn.: Zebrina pendula f. quadricolor *Voss.*
sahyadrica *Blatter in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxiii. 77 (1928).—Ind. or. (Bombay).

CYATHIDIUM Lindl. ex Royle, Ill. Bot. Himal. 251 (Dec. 1835). *COMPOSITAE.*

CYATHODES Labill. (Epacridac.).
mariannensis *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 734.—Ins. Marian. (Aramagan).

CYATHULA Lour. (Amaranthac.).
biflora *Schinz in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 139.—Madag.
Braunii *Gilg ex Schinz, l. c.*—Afr. or.
coriacea *Schinz, l. c.* 140.—Afr. or.
uncinulata (*Schrad.*) *Schinz in De Wild. Pl. Bequaert.* v. 386 (1932): Achyranthes uncinulata.

CYCAS L. (Cycadac.).
afra *Hort. ex Schuster in Engl. Pflanzenreich, Cycadac.* 111 (1932), in syn.: Encephalartos caffer.
aurea *Hort. ex Schuster, l. c.* 80, in syn.: C. siamensis.
basaltica *C. A. Gardner in For. Dep. Bull., W. Austral.* No. 32, p. 31 (1923).—W. Austral.
Boddami *Hort. ex Schuster in Engl. Pflanzenreich, Cycadac.* 75, 77 (1932), in syn.: Cycas spp.
Chevalieri *Léandri in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, v. 1092 (1931).—Indo-China (Tonkin; Anam).
cochinchinensis *O. Warb. ex Schuster in Engl. Pflanzenreich, Cycadac.* 81 (1932), in syn.: C. siamensis.
glaucophylla *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1244 (1895), in syn.: C. circinalis f. glauca *Miq.*
Hamelini *Hort. ex Schuster in Engl. Pflanzenreich, Cycadac.* 66 (1932), in syn.: C. circinalis.
intermedia *Hort. ex B. S. Williams, Gen. Pl. Cat.* 42 (1878); *Schuster in Engl. Pflanzenreich, Cycadac.* 80 (1932), in syn.: C. siamensis.
Kirkii *Hort. ex Schuster, l. c.* 73, in syn.: C. circinalis.
Lane-Poolei *C. A. Gardner in For. Dep. Bull., W. Austral.* No. 32, p. 30 (1923).—W. Austral.
Nathorstii *Schuster in Engl. Pflanzenreich, Cycadac.* 76 (1932).—Zeylan.
recurvata *Blume ex Schuster, l. c.* 74, in syn.: C. Rumphii.
Romanzoffiana *Hort. ex Schuster, l. c.* 68, in syn.: C. circinalis.
sundaica *Miq. ex Schuster, l. c.* 74, in syn.: C. Rumphii.

CYCLACANTHUS S. Moore (Acanthac.).
Poilanei *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iv. 762 (1935).—Indo-China (Anam).

CYCLAMINUS Hall. (Primulac.).
Coum (*Mill.*) *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 158 (1924): Cyclamen Coum.
ibericus (*Stev.*) *Bergmans, l. c.*: Cyclamen ibericum.

CYCLANTHERA Schrad. (Cucurbitac.).
elastica *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 340 (1894), in syn.: C. explodens.
phyllantha *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 776 (1933).—Peruv.

CYCLOBALANOPSIS Oerst. (Fagac.; Cupulif., Gen. Pl.).
hypophaea (*Hayata*) *Kudo in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1931, iii. 389: Quercus hypophaea.
ternaticupula (*Hayata*) *Kudo, l. c.* 390: Quercus ternaticupula.

CYCLODON Small, Man. Southeast. Fl. 1075 (1933). *ASCLEPIADACEAE.*
alabamensis (*Vail*) *Small, l. c.*: Vincetoxicum alabamense.

CYCLOPIA Vent. (Legumin.).
aurea *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 92 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).

CYCLOPTYCHIS E. Mey. (Crucif.).
Marlothii *O. E. Schulz in Engl. Jahrb.* lxvi. 97 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).

CYCLOSTEMON Blume (Euphorbiac.).
madagascariensis *Pierre ex Humbert & Léandri in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 119, in syn.: Drypetes madagascariensis.
Yamadai *Kanehira & Sasaki in Sasaki, Cat. Formos. Governm. Herb.* 303 (1930); cf. *Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1931, xxi. 145.—Formosa.

CYCLOTERIA Stapf in Ind. Lond. v. 459 (1931), in obs.; et l. c. vi. 546 (1931). *GRAMINEAE.*

CYLICODAPHNE Nees (Laurac.).
citrata *Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl.* ii. 480 (1831).—Java.

CYLINDROPHYLLUM Schwantes (Ficoidac.).
Comptonii *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 316 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).

CYLINDROPUNTIA (Engelm.) F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC, 117, 410 (1935). *CACTACEAE.*
[OPUNTIA subgen. CYLINDROPUNTIA Engelm.]
acanthocarpa (*Engelm. & Bigel.*) *F. M. Knuth, l. c.* 124: Opuntia acanthocarpa.
Alcahes (*Weber*) *F. M. Knuth, l. c.* 127: Opuntia Alcahes.
arbuscula (*Engelm.*) *F. M. Knuth, l. c.* 123: Opuntia arbuscula.
Bigelowii (*Engelm.*) *F. M. Knuth, l. c.* 125: Opuntia Bigelovii.
caerulescens (*D. Griff.*) *F. M. Knuth, l. c.* 123: Opuntia caerulescens.
californica *F. M. Knuth, l. c.* 125: Opuntia serpentina.
calmalliana (*Coult.*) *F. M. Knuth, l. c.*: Opuntia calmalliana.
Cardenche (*D. Griff.*) *F. M. Knuth, l. c.* 126, 422: Opuntia Cardenche.
caribaea (*Britton & Rose*) *F. M. Knuth, l. c.* 123: Opuntia caribaea.
Cholla (*Weber*) *F. M. Knuth, l. c.* 125: Opuntia Cholla.
Ciribe (*Engelm. ex Coult.*) *F. M. Knuth, l. c.*: Opuntia Ciribe.
clavarioides (*Hort. ex Pfeiff.*) *F. M. Knuth, l. c.* 122: Opuntia clavarioides.
clavellina (*Engelm. ex Coult.*) *F. M. Knuth, l. c.* 124: Opuntia clavellina.
congesta (*D. Griff.*) *F. M. Knuth, l. c.* 123: Opuntia congesta.
cylindrica (*Lam.*) *F. M. Knuth, l. c.* 120: Cactus cylindrica.
Davisii (*Engelm. & Bigel.*) *F. M. Knuth, l. c.* 124: Opuntia Davisii.
echinocarpa (*Engelm. & Bigel.*) *F. M. Knuth, l. c.*: Opuntia echinocarpa.
exaltata (*A. Berger*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 120: Opuntia exaltata.
fulgida (*Engelm.*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 126: Opuntia fulgida.
haematacantha *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 118, 410.—Boliv.
humahuacana *Backeb. l. c.* 119, 411.—Boliv.; Argent.
hypsophila (*Speg.*) *Backeb. l. c.* 119: Opuntia hypsophila.
imbricata (*Haw.*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 125: Cereus imbricata.
Kleiniae (*DC.*) *F. M. Knuth, l. c.* 123: Opuntia Kleiniae.
leptocaulis (*DC.*) *F. M. Knuth, l. c.* 122: Opuntia leptocaulis.
Lloydii (*Rose*) *F. M. Knuth, l. c.* 125: Opuntia Lloydii.
maldonadensis (*Arech.*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 122: Opuntia maldonadensis.
Miquelii (*Monv.*) *Backeb. l. c.* 121: Opuntia Miquelii.
molesta (*T. S. Brandegee*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 126: Opuntia molesta.
mortolensis (*Britton & Rose*) *F. M. Knuth, l. c.* 122: Opuntia mortolensis.
neoarbuscula (*D. Griff.*) *F. M. Knuth, l. c.* 123, 422: Opuntia neoarbuscula.
pachypus (*K. Schum.*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 120: Opuntia pachypus.
pallida (*Rose*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 126 (1935): Opuntia pallida.
Parryi (*Engelm.*) *F. M. Knuth, l. c.* 124: Opuntia Parryi.
prolifera (*Engelm.*) *F. M. Knuth, l. c.* 126: Opuntia prolifera.
ramosissima (*Engelm.*) *F. M. Knuth, l. c.* 122: Opuntia ramosissima.
recondita (*D. Griff.*) *F. M. Knuth, l. c.* 124: Opuntia recondita.
Salmiana (*Parmentier ex Pfeiff.*) *F. M. Knuth, l. c.* 121: Opuntia Salmiana.
Schickendantzii (*Weber*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 122: Opuntia Schickendantzii.
Shaferi (*Britton & Rose*) *Backeb. l. c.* 119: Opuntia Shaferi.
Spegazzinii (*Weber*) *Backeb. l. c.* 121: Opuntia Spegazzinii.
spinosior (*Toumey*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 126: Opuntia spinosior.
subulata (*Mühlenpf.*) *F. M. Knuth, l. c.* 121: Pereskia subulata.
teres (*Cels ex Weber*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 119: Opuntia teres.
Tesajo (*Engelm. ex Coult.*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 122: Opuntia Tesajo.
tetracantha (*Toumey*) *F. M. Knuth, l. c.* 124: Opuntia tetracantha.
Thurberi (*Engelm.*) *F. M. Knuth, l. c.*: Opuntia Thurberi.
tunicata (*Lehm.*) *F. M. Knuth, l. c.* 126: Cactus tunicata.
Verschaffeltii (*Cels ex Weber*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 119: Opuntia Verschaffeltii.
versicolor (*Engelm.*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 125: Opuntia versicolor.
vestita (*Salm-Dyck*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 119: Opuntia vestita.
viridiflora (*Britton & Rose*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 124: Opuntia viridiflora.
vivipara (*Rose*) *F. M. Knuth, l. c.*: Opuntia vivipara.
Weingartiana (*Backeb.*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 119: Opuntia Weingartiana.
Whipplei (*Engelm. & Bigel.*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 124: Opuntia Whipplei.

CYMBARIA L. (Scrophulariac.).
linearifolia *Hao in Fedde, Repert.* xxxvi. 224 (1934); *et in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, iii. 4 (1935).—Tibet; China (Kansu; Shensi).

CYMBIDIUM Sw. (Orchidac.).
aspidistrifolium *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 438.—Formosa.
gracillimum *Fukuyama in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1932, xxii. 413.—Formosa.
Poilanei *Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 681.—Cambodia.
pubescens *Lindl.*; *Ames & Quisumb. in Philipp. Journ. Sc.* 1932, xlix. 491, descr. emend.—Ins. Philipp. (Mindanao).
sagamiense (*Nakai*) *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1631 (1931): Pachyrhizanthe sagamiensis.
Syunitianum *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 757.—Formosa.
tortisepalum *Fukuyama, l. c.* 1934, xlviii. 304.—Formosa.
tosyaënse *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 14.—Formosa.

CYMBOCARPA Miers (Burmanniac.).
saccata *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 60.—Guiana Brit.

CYMBOPETALUM Benth. (Annonac.).
Baillonii *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* x. 190 (1931).—Mexico.
costaricense (*Donn. Smith*) *R. E. Fries, l. c.* 186: Asimina costaricensis.
Dielsianum *Saff. ex Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ix. 1156 (1927), in obs.—Peruv.
mirabile *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* x. 192 (1931).—Mexico.
Tessmannii *R. E. Fries, l. c.* 188.—Peruv.

CYMBOPOGON Spreng. (Gramin.).
distans (*Nees ex Steud.*) *W. Watson in Atkinson, Gaz. N. W. Ind.* 392 (1882): Andropogon distans.
flexuosus (*Nees ex Steud.*) *W. Watson, l. c.*: Andropogon flexuosus.
Martini (*Roxb.*) *W. Watson, l. c.*: Andropogon Martini.
Osmastonii *R. N. Parker in Fedde, Repert.* xxxi. 126 (1932).—Ind. or. (United Prov.).
pachnodes (*Trin.*) *W. Watson in Atkinson, Gaz. N. W. Ind.* 392 (1882): Andropogon pachnodes.
pendulus (*Nees ex Steud.*) *W. Watson, l. c.*: Andropogon pendulus.
prolixus (*Stapf*) *Phillips, S. Afr. Grasses* (*S. Afr. Agric. Ser.*, vi.) 218 (1931): Andropogon Nardus var. prolixus.
tortilis (*Presl*) *Hitchcock in Lingnan Sc. Journ.* vii. 246, 253 (1931): Anthistiria tortilis.
versicolor (*Nees ex Steud.*) *W. Watson in Atkinson, Gaz. N. W. Ind.* 392 (1882): Andropogon versicolor.

CYMOPTERUS Rafin. (Umbellif.).
Gilmani *Morton in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 309.—U.S.A. (Calif.).
Macdougali (*Coult. & Rose*) *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 42: Aletes Macdougali.
multinervatus (*Coult. & Rose*) *Tidestr. l. c.* 41: Phellopterus multinervatus.
tenuifolius (*Rydb.*) *Tidestr. l. c.* 42: Pseudocymopterus tenuifolius.

CYMOTHOË Airy-Shaw in Kew Bull. 1935, 150. *ERICACEAE.*
cyclophylla *Airy-Shaw, l. c.* 151.—Borneo.

CYNANCHUM L. (Asclepiadac.).
cabulicum *Bornm. in Engl. Jahrb.* lxvi. 233 (1934).—Afghan.
chilense (*R. Phil.*) *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 4, 23 (1934), in obs.: Holostemma chilense.
Doianum *Koidz. in Y. Doi, Fl. Satsum.* ii. 105 (1931).—Japon.
eurystephanum *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxv A. No. 7, p. 7 (1933).—Peruv.
haruna-montanum *Honda in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 569.—Japon.
Hickenii *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxv. A. No. 7, p. 5 (1933).—Peruv.
Ikema (*Sieb.*) *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 122, in adnot.: Urostelma Ikema.
Kiyohikoanum *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 676.—Japon.
papillosum *Weimarck in Bot. Notiser*, 1935, 398.—S. Rhodesia.
patagonicum (*R. Phil.*) *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 4, 24 (1934), in obs.: Cynoctonum patagonicum.
pumilum (*Decne.*) *Bornm. in Engl. Jahrb.* lxvi. 234 (1934): Vincetoxicum pumilum.
Roberti (*S. Moore*) *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 4, 28 (1934), in obs.: Vincetoxicum Roberti.
roseum *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 82 (1935).—Kenya Col.
Rusbyi *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxv. A. No. 7, p. 9 (1933): Vincetoxicum umbellatum *Rusby*, non Cynanchum umbellatum *Vell.*
Sakaianum *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 789.—Japon. (Hondo).
Samuelssonii *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 4, 21 (1934).—Argent.
Sarcostemma *Lillo*; *Malme, l. c.* 27, descr. ampl.—Argent.
streptanthum *Malme, l. c.* xxv. A. No. 7, p. 8 (1933).—Ecuador.
tiaratum *Malme, l. c.* p. 7.—Peruv.
trilobulatum *Lillo*; *Malme, l. c.* xxvi. A. No. 4, 25 (1934), descr. ampl.—Argent.
tunicatum (*Retz.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 194 (1931): Periploca tunicata.
unguiculatum *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 788 (1933).—Peruv.

CYNE Danser (Loranthac.).
capitulifera (*Merrill*) *Danser in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 466: Loranthus capituliferus.

CYNE:—
quadriangula *Danser in Philipp. Journ. Sc.* 1935, lviii. 38.—Ins. Philipp. (Mindanao).

CYNOCRAMBE Adans. (Cynocrambac.; Urticac., Gen. Pl.).
formosana *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 157.—Formosa.

CYNOGLOSSOPSIS A. Brand in Engl. Pflanzenreich, Borrag.-Borraginoid.-Cryptanth. 22 (1931). *BORAGINACEAE.*
latifolia (*Hochst. ex A. Rich.*) *A. Brand, l. c.*: Echinospermum latifolium.

CYNOGLOSSUM L. (Boraginac.).
alpestre *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 150.—Formosa.
Berteri *Colla, Herb. Pedem.* iv. 256 (1835).—Juan Fernandez.
Boscoi *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 82 [1933], nomen.—Marocc.
castrilense *Pau, Cart. Bot.* 3 a.; cf. *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona,* xii. 386 (1929), in syn.: C. nebrodense var. pustulatum *Boiss.*
controversum *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 82 [1933].—Marocc.
diffusum *Roxb. Hort. Beng.* 13 (1814), nomen; *Lehm. Asperifol.* 140 (1818), descr.—Ind. or. (Bengal).
furcatum *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 6 (1824).—Nepal.
× legionense *Rothmaler in Cavanillesia,* vii. 120 (1935).—Hispan.
marifolium *Roxb. Hort. Beng.* 13 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 8 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 457 (1832).—Ind. or. (Bengal).
racemosum *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 6; *et l. c.* 456.—Ind. or. (Bengal).
Triunfetti *Perret ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 256 (1835).—Hab.?

CYNOMETRA L. (Legumin.).
carolinensis *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo,* 1932, xlvi. 455.—Ins. Carolin.; Ins. Palau.
Dacremontii *Lebrun in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 288 (1933).—Congo Belg.
pauciflora (*Harms*) *Harms in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 435 (1915), in obs.: Zenkerella pauciflora.
Schliebenii *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xii. 84 (1934).—Tanganyika Terr.
Yokotai *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo,* 1932, xlvi. 454.—Ins. Carolin. (Truk).

CYNORCHIS Thou. (Orchidac.).
debilis (*Hook. f.*) *Summerhayes in Kew Bull.* 1933, 246: Habenaria debilis.
parva *Summerhayes, l. c.* 1932, 338.—Nigeria.
Schlechterii *H. Perrier in Arch. Bot., Caen,* Bull. 1929, iii. 198 (1931), in obs.: C. exilis *Schlechter* (1916).

CYNOSURUS L. (Gramin.).
Peltieri *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord,* 1931, xxii. 155, 321.—Alger.

CYNOXYLON Rafin. (Cornac.).
canadense (*L.*) *Schaffner in Ohio Journ. Sc.* 1931, xxxi. 305: Cornus canadensis.

CYPERUS L. (Cyperac.).
albopilosus (*C. B. Clarke*) *Kükenth. in Bot. Notiser,* 1934, 69: Mariscus albopilosus.
Altsoni *Kükenth. in Kew Bull.* 1932, 322.—Guiana Brit.
baoulensis (*A. Cheval.*) *Kükenth. in Fedde, Repert.* xxix. 199 (1931), in obs.: Pycreus baoulensis.
barrancae *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 25 (1933–5).—Mexico.
benadirensis *Chiov. Fl. Somala,* II. 434 (1932).—Somal. Ital.
bullatus *Kükenth. in Fedde, Repert.* xxix. 198 (1931).—Afr. austr.-occ.
capillaris *Koenig ex Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 198 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 194 (1832).—Ind. or.
cataractarum *K. Schum. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* ii. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 200 (1908), in obs.—Cameroons.
cayennensis (*Lam.*) *H. Pfeiff. in Fedde, Repert.* xxix. 172 (1931), in obs.: Kyllinga cayennensis.

CYPERUS:—
Chermezonii *Kükenth. in Engl. Pflanzenreich, Cyperac.-Scirp.-Cyp.* 9 (1935), in obs.: C. atropurpureus *Boeck.*
ciliato-pilosus *Mattf. & Kükenth. l. c.* 7, in obs.—Hab.?
commixtus *Kükenth. in Fedde, Repert.* xxix. 195 (1931).—Somaliland.
Cooperi (*C. B. Clarke*) *Kükenth. in Bot. Notiser,* 1934, 68: Pycreus Cooperi.
Cornelii-Ostenii *Kükenth. in Fedde, Repert.* xxix. 198 (1931).—Venez.; Parag.
Deeringianus *Britton & Small in Small, Man. Southeast. Fl.* 151 (1933).—U.S.A. (S. E. States).
dentifer *Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS,* 1931, xxx. 198 (1932).—Sibir. or.
diffusus *Roxb. Hort. Beng.* 81 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 193 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 189 (1832).—Ind. or.
digitatus *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 209; *et l. c.* 205.—Ind. or.
duripes *I. M. Johnston in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 54 (1931).—Mexico (Arch. Revillagigedo).
esphacelatus *Kükenth. in Engl. Pflanzenreich, Cyperac.-Scirp.-Cyp.* 131 (1935): C. pseudosphacelatus *Chiov.*
feani *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 84, 94 (1931).—Ins. Marquesas.
Gossweileri *Kükenth. in Engl. Pflanzenreich, Cyperac.-Scirp.-Cyp.* 7 (1935), in obs.—Angola.
gratissimus *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo,* 1935, xlix. 222, in syn.: Pycreus gratissimus.
guadalajaranus *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 25 (1933–5).—Mexico.
Herteri *Kükenth. ex Osten in An. Mus. Montevid.* Ser. II. iii. Entr. 2, 137 (1931), in syn.: C. reflexus.
hirtellus (*Chiov.*) *Kükenth. in Engl. Pflanzenreich, Cyperac.-Scirp.-Cyp.* 7 (1935), in obs.: Mariscus hirtellus.
hoppiifolius *Uitt. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 186.—Guiana Bat.
incurvatus *Roxb. Hort. Beng.* 5 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 200 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 196 (1832).—Ind. or.
inundatus *Roxb. l. c.* 6, nomen; *et l. c.* 205; *et l. c.* 201.—Ind. or. (Bengal).
javanicus *Kükenth. in Fedde, Repert.* xxix. 194 (1931).—Java.
Kerstingii *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* ii. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 204 (1908), in obs.—Sudan. Brit.
kipasensis *Cherm. in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiv. 297 (1934); *et in Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. 281 (1935).—Congo Belg.
kivuensis *Cherm. in Bull. Soc. Bot. France,* 1935, lxxxii. 337.—Congo Belg.
kottensis *Cherm. in Arch. Bot., Caen,* iv. Mém. No. 7, 23 (1931).—Afr. Gall. Centr.
laeteflorens (*C. B. Clarke*) *Kükenth. in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 81, 23 (1931), in obs.: Mariscus laeteflorens.
lapidicola *Kükenth. in Engl. Pflanzenreich, Cyperac.-Scirp.-Cyp.* 17 (1935), in obs.—Afr. austr.-or.
major (*Boeck.*) *Cherm. in Ann. Mus. Col. Marseille,* 1922, Sér. III. x. Fasc. 1, 29, in obs.: C. dichromeniformis var. major.
marquisensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 84, 98 (1931).—Ins. Marquesas.
Mayeri *Kükenth. in Fedde, Repert.* xxix. 194 (1931).—Singapore.
× mesochorus *Geise in Am. Midl. Nat.* 1934, xv. 249.—U.S.A. (Indiana).
Metzii (*Hochst. ex Steud.*) *Mattf. & Kükenth. in Engl. Pflanzenreich, Cyperac.-Scirp.-Cyp.* 25 (1935), in obs.: Kyllinga Metzii.
monocephalus *Roxb. Hort. Beng.* 5 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 193 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 188 (1832).—Ind. or. (Bengal).
Moutona *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 84, 99 (1931).—Ins. Marquesas.
multiflorus (*Britton*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 153 (1933): C. echinatus var. multiflorus.
Nduru *Cherm. in Arch. Bot., Caen,* iv. Mém. No. 7, 18 (1931).—Afr. Gall. Centr.

CYPERUS:—
× Nieuwlandii *Geise in Am. Midl. Nat.* 1934, xv. 245.—U.S.A. (Indiana).
niigatensis *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 43 (1934).—Japon. (Hondo).
nudus *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 191 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 187 (1832).—Ind. or.
nudus *Roxb. l. c.* 212; *et l. c.* 209, an praec.—Ind. or. (Bengal).
Ohwii *Kükenth. in Fedde, Repert.* xxix. 197 (1931).—Japon. (Kiushiu).
Ostenii *Kükenth. ex Osten in An. Mus. Montevid.* Ser. II. iii. Entr. 2, 135 (1931), in obs.—Urug.
pectinatus *Roxb. Hort. Beng.* 81 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 195 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 190 (1832).—Ind. or.
pennatiformis *Kükenth. in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 81, 23 (1931).—Ins. Sandvic.
pertenuis *Roxb. Hort. Beng.* 5 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 202 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 198 (1832).—Ind. or. (Bengal).
pseudokyllingioides *Kükenth. in Engl. Pflanzenreich, Cyperac.-Scirp.-Cyp.* 14 (1935), in obs.—Hab.?
pseudoleptocladus *Kükenth. in Fedde, Repert.* xxix. 196 (1931).—Afr. trop.
pseudosomaliensis *Kükenth. ex Chiov. Fl. Somala,* II. 437 (1932), in syn.: Mariscus somaliensis.
psilostachys (*C. B. Clarke*) *Kükenth. in Bot. Notiser,* 1934, 69: Mariscus psilostachys.
pubens *Kükenth. in Fedde, Repert.* xxix. 200 (1931).—Rhodesia.
punctatus *Roxb. Hort. Beng.* 5 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 197 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 193 (1832).—Ind. or.
raiateënsis *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 102, 19 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
rapensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 84, 98 (1931).—Polynes. (Ins. Rapa).
retroversus *Chapm. Fl. S. U. S.* ed. 2, Suppl., 659 (1883), sphalm.: C. retrorsus.
rubromarginatus *Drobov in Vved. et al., Key Fl. Tashkent,* 46 (1923).—Turkestan.
ruderalis *Uitt. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 185.—Guiana Bat.
semi-nudus *Roxb. Hort. Beng.* 5 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 191 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 187 (1832).—Ind. or.
serpens *Cherm. in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiv. 297 (1934); *et in Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. 280 (1935).—Congo Belg.
sesquiflorus (*Torr.*) *Mattf. & Kükenth. in Engl. Pflanzenreich, Cyperac.-Scirp.-Cyp.* 19, in obs., 39 (1935): Kyllinga sesquiflora.
Shimadai *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 300.—Formosa.
spinulosus *Roxb. Hort. Beng.* 6 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 207 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 203 (1832).—Ind. or.
Stauntoni (*C. B. Clarke*) *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 43 (1934): Scirpus Stauntoni.
Steadii *Kükenth. in Fedde, Repert.* xxix. 199 (1931).—Ind. or. (Bombay).
strictus *Lam.*; *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 203 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 200 (1832).—Ind. or.
subpapuanus *Kükenth. in Fedde, Repert.* xxix. 196 (1931).—N. Guin.
subpinnatus *Kükenth. l. c.* 199.—S. Austral.; N. S. Wales.
substramineus *Kükenth. in Engl. Pflanzenreich, Cyperac.-Scirp.-Cyp.* 10 (1935), in obs.: C. stramineus *Nees.*
subtenax *Kükenth. in Kew Bull.* 1932, 322.—Angola.
subtrigonus (*C. B. Clarke*) *Kükenth. in Engl. Pflanzenreich, Cyperac.-Scirp.-Cyp.* 17 (1935), in obs.: Pycreus subtrigonus.
tegetum *Roxb. Hort. Beng.* 6 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 211 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 208 (1832).—Ind. or. (Bengal).
Tisseranti *Cherm. in Arch. Bot., Caen,* iv. Mém. No. 7, 18 (1931).—Afr. Gall. Centr.
tortuosus *Koenig ex Roxb. Hort. Beng.* 5 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 201 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 197 (1832).—Ind. or.

CYPERUS:—
transitorius *Kükenth. in Engl. Pflanzenreich, Cyperac.-Scirp.-Cyp.* 35 (1935), in obs.—Hab.?
Turrillii *Kükenth. in Fedde, Repert.* xxix. 199 (1931): Mariscus laxiflorus.
verticillatus *Roxb. Hort. Beng.* 6 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 209 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 206 (1832).—Ind. or. (Bengal).
Weinlandii *Kükenth. in Engl. Pflanzenreich, Cyperac.-Scirp.-Cyp.* 131 (1935).—N. Guin.
Winkeleri *Britton & Small in Small, Man. Southeast. Fl.* 152, 1503 (1933).—U.S.A. (Florida).
Wittei *Cherm. in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxii. 64 (1932).—Congo Belg.

CYPHIA Berg. (Campanulac.).
bechuanensis *Bremek. & Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xvi. 437 (1935).—Bechuanaland Protect.; Transvaal.

CYPHOCARPA Lopriore (Amaranthac.).
Kuehlweiniana *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. Anhang, 26 (1932).—Tanganyika Terr.

CYPHOCARPUS Miers (Campanulac.).
innocuus *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 102.—Chile.

CYPHOKENTIA Brongn. (Palmae).
ponapensis *Becc. ex Martelli in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa*, Mem., 1934, xliv. 167, in syn.: Bentinckiopsis ponapensis.
Tete *Becc. in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa*, Mem., 1934, xliv. 152, in obs.—Hab.?
Thurstonii *Becc. l. c.*, in obs.—Hab.?

CYPHOSPERMA H. Wendl. (Palmae).
carolinense *Becc. ex Martelli in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa*, Mem., 1934, xliv. 165, in syn.: Bentinckiopsis carolinensis.

CYPHOSTEMMA (Planch.) Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon, vi. Suppl., 53 (1931). *AMPELIDACEAE.*
[CISSUS sect. CYPHOSTEMMA Planch.]
setosum (*Roxb.*) *Alston, l. c.*: Cissus setosus.

CYPHOSTYLA Gleason (Melastomatac.).
strigosa *Gleason in Phytologia*, i. 36 (1933).—Colomb.

CYPHOTHECA Diels in Engl. Jahrb. lxv. 103 (1932). *MELASTOMATACEAE.*
montana *Diels, l. c.*—China (Yunnan).

CYPRIPEDIUM L. (Orchidac.).
×Andrewsii *Fuller in Rhodora*, 1932, xxxiv. 100.—U.S.A. (Wisconsin).
Delenatii *Arnold in Orch. Rev.* 1933, xli. 312, in obs.—Hab.?
×Favillianum *J. T. Curtis in Rhodora*, 1932, xxxiv. 242.—U.S.A. (Wisconsin).
×Krylowi *Sjuzew in Bull. Inst. Rech. Biol. Perm*, 1926, iv. 435–6; cf. *G. Keller & Soó in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 18 (1930).—Ural Mts.
Segawai *Masamune in Trop. Hort.* iii. 31 (1933), nomen; *et in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1933, xxiii. 209, descr.—Formosa.
Victoria-Mariae *Rolfe in Orch. Rev.* 1896, iv. 110, 378.—Sumatra.
×Wellesleyanum *Hort. ex Sander, Orch. Hybr.* 54 [1906]; cf. *Bois in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 763.—Hort.

CYRTANDRA J. R. & G. Forst. (Gesneriac.).
Elstonii *Hochr. in Candollea*, v. 216 (1934).—Ins. Sandvic.
feaniana *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 272 (1935).—Ins. Marquesas.
fiamoiensis *Hochr. in Candollea*, v. 218 (1934).—Samoa.
Kajewskii *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 25.—N. Hebrides.
kotoënsis *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 412.—Formosa (Ins. Botel Tobago).
kusaimontana *Hosokawa, l. c.* 1934, xxiv. 203.—Ins. Carolin. (Kusai).
lillianae *Setchell in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 86, 98 (1931).—Ins. Cook (Rarotonga).
longiflora *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 40 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).

CYRTANDRA:—
nukuhivensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 274 (1935).—Ins. Marquesas.
oötensis *Forest Brown, l. c.* 273.—Ins. Marquesas.
pinatubensis *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3191 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
ponapensis *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 492.—Ins. Carolin. (Ponape).
Quisumbingii *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3193 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
raiateënsis *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 40 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
todaiensis *Kanehira, Fl. Micrones.* 349 (1933), japonice; *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 679, latine.—Ins. Palau.
toviana *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 271 (1935).—Ins. Marquesas (Nukuhiva).

CYRTANDROIDEA Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu, No. 130, 323 (1935). *CAMPANULACEAE.*
Jonesii *Forest Brown, l. c.* 324.—Ins. Marquesas.

CYRTANDROPSIS Lauterb. (Gesneriac.).
kaululuensis *Hochr. in Candollea*, v. 215 (1934).—Ins. Sandvic.

CYRTANTHUS Ait. (Amaryllidac.).
Fergusoniae *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1931, xxi. 77.—Afr. austr. (Cape Prov.).
flavus *Barnes in S. Afr. Gard.* 1931, xxi. 77.—Afr. austr. (Cape Prov.).

CYRTOCOCCUM Stapf (Gramin.).
chaetophoron (*Roem. & Schult.*) *Dandy in Journ. Bot.* 1931, lxix. 55: Panicum chaetophoron.
deltoideum (*Hackel*) *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1930, lxxvii. 640 (1931): Panicum deltoideum.

CYRTOPODIUM R. Br. (Orchidac.).
paludicola *Hoehne in A. Sampaio, List. Orch. Herv. Mus. Nac., Rio de Janeiro*, 11 (1923), nomen.—Bras. (Matto Grosso).

CYRTORCHIS Schlechter (Orchidac.).
aberrans *Mansf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 705 (1935).—Tanganyika Terr.

CYRTOSPERMA Griff. (Arac.).
Nadeaudianum *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 22 (1933): C. Merkusii var. gigantea *Nadeaud.*

CYRTOSTACHYS Blume (Palmae).
Brassii *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 328 (1935).—N. Guin.

CYSTACANTHUS T. Anders. (Acanthac.).
yangtsekiangensis (*Léveillé*) *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 315: Strobilanthes yangtsekiangensis.

CYSTIDOSPERMUM Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med. (Trans. Rubber & Guttap. Inst.) 13, in clavi, 25 (1933). *EUPHORBIACEAE.*
cheirolepis (*Fisch. & Mey. ex Ledeb.*) *Prokh. l. c.* 26: Euphorbia cheirolepis.
Postii (*Boiss.*) *Prokh. l. c.* 28, in obs.: Euphorbia Postii.

CYSTOPUS Blume (Orchidac.).
humilis *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 307.—Formosa.

CYSTORCHIS Blume (Orchidac.).
ranaiensis *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxx. 329 (1932).—Ind. or. Bat. (Ins. Natuna).

CYTINUS L. (Rafflesiac.; Cytinac., Gen. Pl.).
glandulosus *Jumelle in Compt. Rend.* 1923, clxxvii. 1432.—Madag.
sanguineus (*Thunb.*) *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 97 (1932): Phelypaea sanguinea.

CYTISUS L. (Legumin.).
bracteolatus (*Link*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 204 (1894): Genista bracteolata.
haplophyllus *Sennen in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1932, xxiii. 270, in obs., nomen.—Marocc.

CYTISUS:—
lusitanicus (*Mill.*) *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 286: Spartium lusitanicum.
maderensis (*Webb*) *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1935, xv. 971, in obs.: Genista maderensis.
Reverchonii (*Degen & Herv.*) *Bean in Kew Bull.* 1934, 224: Sarothamnus Reverchonii.
Rudolphi *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 203 (1894), in syn.: C. canariensis.
Urumoffii *Davidoff ex Stoyanoff in Bull. Soc. Bot. Bulgar.* v. 102 (1932), in syn.: C. austriacus var. Urumoffii.
Welwitschii (*Boiss. & Reut.*) *A. B. Jackson in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 81: Sarothamnus Welwitschii.

CZERNIAEVIA Turcz. (Gramin.).
rupestris *Turcz. ex Komarov, Fl. URSS*, ii. 297 (1934), in syn.: Pappophorum boreale.

D

DABOËCIA D. Don (Ericac.).
azorica *Tutin & E. F. Warb. in Journ. Bot.* 1932, lxx. 12.—Ins. Azor. (Pico).

DACRYODES Vahl (Burserac.).
Afzelii (*Engl.*) *H. J. Lam in Ann. Jard. Bot. Buitenz.* xlii. 202 (1932): Pachylobus Afzelii.
angulata (*Ridley*) *H. J. Lam, l. c.* 204: Canarium angulatum.
Barteri (*Engl.*) *H. J. Lam, l. c.* 202: Pachylobus Barteri.
Buettneri (*Engl.*) *H. J. Lam, l. c.*: Canarium Buettneri.
costata (*A. W. Benn.*) *H. J. Lam, l. c.* 204: Santiria costata.
dahomensis (*Engl.*) *H. J. Lam, l. c.* 202: Pachylobus dahomensis.
edulis (*G. Don*) *H. J. Lam, l. c.* 119, in adnot., 202: Pachylobus edulis.
Elmeri *H. J. Lam, l. c.* 203.—Borneo.
expansa (*Ridley*) *H. J. Lam, l. c.* 204: Canarium expansum.
ferruginea (*A. Cheval.*) *H. J. Lam, l. c.* 202: Pachylobus ferrugineus.
floribunda (*King*) *H. J. Lam, l. c.* 162, in obs., 204: Santiria floribunda.
fraxinifolia (*Engl.*) *H. J. Lam, l. c.* 202: Pachylobus fraxinifolius.
fusca (*Engl.*) *H. J. Lam, l. c.*: Pachylobus fuscus.
heterotricha (*Pellegr.*) *H. J. Lam, l. c.*: Pachylobus heterotrichus.
incurvata (*Engl.*) *H. J. Lam, l. c.* 204: Canarium incurvatum.
Klaineana (*Pierre*) *H. J. Lam, l. c.* 202: Santiriopsis Klaineana.
laxa (*A. W. Benn.*) *H. J. Lam, l. c.* 204: Canarium laxum.
Ledermannii (*Engl.*) *H. J. Lam, l. c.* 202: Pachylobus Ledermannii.
Letestui (*Pellegr.*) *H. J. Lam, l. c.*: Pachylobus Letestui.
longifolia (*King*) *H. J. Lam, l. c.*: Santiria longifolia.
macrocarpa (*King*) *H. J. Lam, l. c.* 203: Santiria macrocarpa.
macrophylla (*Oliv.*) *H. J. Lam, l. c.* 202: Canarium macrophyllum.
Osika (*Guillaumin*) *H. J. Lam, l. c.*: Pachylobus Osika.
peruviana (*Loes.*) *H. J. Lam, l. c.*: Pachylobus peruvianus.
pseudorostrata *H. J. Lam, l. c.*, in syn.: D. longifolia.
puberula (*A. W. Benn.*) *H. J. Lam, l. c.* 204: Santiria puberula.
pubescens (*Vermoes.*) *H. J. Lam, l. c.* 202: Pachylobus pubescens.
rostrata (*Blume*) *H. J. Lam, l. c.* xlii. 50 (1931), in obs.; *et l. c.* xlii. 203 (1932): Santiria rostrata.
rubiginosa (*A. W. Benn.*) *H. J. Lam, l. c.* xlii. 204 (1932): Canarium rubiginosum.
rugosa (*Blume*) *H. J. Lam, l. c.* 203: Santiria rugosa.
Tessmannii (*Engl.*) *H. J. Lam, l. c.* 202: Pachylobus Tessmannii.

DACRYODES:—
trimera (*Oliv.*) *H. J. Lam in Ann. Jard. Bot. Buitenz.* xlii. 202 (1932): Sorindeia trimera.
viridiflora (*Engl.*) *H. J. Lam, l. c.*: Pachylobus viridiflorus.
Zenkeri (*Engl.*) *H. J. Lam, l. c.*: Pachylobus Zenkeri.

DACTYLICAPNOS Wall. (Papaverac.).
lichiangensis (*Fedde*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 338 (1931): Dicentra lichiangensis.

DACTYLIOPHORA Van Tiegh. (Loranthac.).
globiflora (*Blume*) *Danser*; *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 356 (1931), cum descr.: Loranthus globiflorus.
salomonia *Danser in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 206.—Ins. Solomon.

DACTYLIS L. (Gramin.).
atlantica *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 131 [1933], nomen.—Marocc.
Woronowii *Ovczinn. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 362, 752 (1934).—Transcaucas.; Transcasp.

DACTYLOCTENIUM Willd. (Gramin.).
aegyptium *Beauv. Agrost.*, Expl. Pl. p. 10 (1812): D. aegyptiacum.

DACTYLORHIZA Neck. (Orchidac.).
baltica (*Klinge*) *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, iv. 713 (1935), in obs.: Orchis baltica.

DAEDALACANTHUS T. Anders. (Acanthac.).
varians (*Vent.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 806 (1895): Ruellia varians.

DAEMONOROPS Blume (Palmae).
Beguinii *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 204 (1931).—Ins. Molucc. (Halmahera).
brachystachys *Furtado in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 344 (1935).—Penins. Mal.
calothyrsus *Furtado, l. c.* 345.—Borneo.
confusus *Furtado, l. c.* 347.—Sumatra.
lasiospathus *Furtado, l. c.* 351.—Penins. Mal.; Borneo.
longipedunculatus *Furtado, l. c.* 353.—Borneo.
Margaritae (*Hance*) *Becc. in Rec. Bot. Surv. Ind.* ii. 220 (1902); *et in Ann. Bot. Gard. Calc.* xii. 1. 56 (1911): Calamus Margaritae.

DAHLIA Cav. (Compos.).
×hortensis *Guillaumin, Fl. Jard.* iii. (*Encycl. Prat. Nat.* xvii.) 37 (1934).—Hort.
Jaurezii *Hort. ex Sasaki, List Pl. Formos.* 408 (1928), nomen.—Hort.
mexicana *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 489 (1894), in syn.: D. pinnata.
pruinosa *Hort. ex Bull. Ort. Bot. Napoli*, x. p. VI. (1930), nomen.—Hort.

DALBERGIA L. f. (Legumin.).
acariaeantha *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 511 (1935).—Tanganyika Terr.
albiflora *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 374 (1928), in clavi; *Hutchinson & Dalziel in Kew Bull.* 1928, 403, descr.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
glandulosa *Dunkley in Kew Bull.* 1935, 260.—Rhodesia.
hainanensis *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 32 (1934).—China (Hainan).
oligophylla *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 415.—Ins. Palau.
oöpala *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* ii. 251 (1834), in obs.—Bras.
palauensis *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 415.—Ins. Palau.
pinatubensis *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3198 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
Riedeli (*Radlk.*) *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 358: Hecastophyllum Riedeli.
Tsoi *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 244 (1935). —China (Hainan).

DALEA L. (Legumin.).
barrancae *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 43 (1933–5).—Mexico.
decipiens *M. E. Jones, l. c.*—Mexico.
dispar *Morton in Phytologia*, i. 147 (1935).—Guatem.
Hutchinsoniae *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 42 (1933–5).—U.S.A. (N. Mexico).

DALEA:—
nummularia *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 41 (1933–5).—U.S.A. (Utah; Arizona).

DALECHAMPIA L. (Euphorbiac.).
parvibracteata *Lanj. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 463; *et l. c.* 1935, xxxii. 236, descr. ampl.—Guiana Brit. et Bat.
Schippii *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 133 (1932).—Brit. Honduras.

DAMASONIUM Mill. (Alismatac.).
constrictum *Juzepczuk in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 99 (1933).—Ross. asiat. (Kasakstan; Altai).

DAMNACANTHUS Gaertn. f. (Rubiac.).
biflorus *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 160, in syn.: Tetraplasia biflora.
formosanus (*Nakai*) *Koidz. l. c.* 1933, ii. 225: D. indicus var. formosanus.
lancifolius (*Makino*) *Koidz. l. c.*: D. indicus var. lancifolius.
minutispinus (*Koidz.*) *Koidz. l. c.* 1935, iv. 158: D. major var. minutispinus.
moniliformis *Koidz. l. c.* 1933, ii. 225.—Japon.
Tsaii *Hu in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 178 (1935).—China (Yunnan).

DANAIS Comm. (Rubiac.).
obovata *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxxvi. (*Hist. Nat. Pl.* vi. Atlas, iv.) t. 453 (1897). —Madag.

DANIELLIA J. J. Benn. (Legumin.).
Caillei *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 341 (1928), in syn.: D. thurifera.
ealaënsis (sphalm. calaënois) *E. G. Baker in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxi. 305 (1932).—Congo Belg.

DANTHONIA A. DC. (Gramin.).
brachyathera (*Stapf*) *Pilger in Engl. Pflanzenw. Afr.* ii. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 182 (1908), in obs.: Pentaschistis brachyathera.
Duttoniana *Cashm. in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1933, lvii. 72.—Austral. (N. S. Wales; Victoria).
euadenia (*Stapf*) *Pilger in Engl. Pflanzenw. Afr.* ii. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 182 (1908), in obs.: Pentaschistis euadenia.
mexicana *Scribn. in Proc. Acad. Nat. Sc. Philad.* 1891, 301.—Mexico.
nudiflora *P. F. Morris in Vict. Nat.* lii. 111 (1935). —Austral. (Victoria).
Richardsonii *Cashm. in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1933, lvii. 72.—Austral. (Victoria).
Thomsonii *J. Buch. Man. Indig. Grasses N. Zeal.* 175 (1880).—N. Zel.

DANTHONIOPSIS Stapf (Gramin.).
barbata (*Nees*) *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 435: Tristachya barbata.
Chevalieri *A. Camus & C. E. Hubbard in Rev. Bot. Appliq.* 1934, xiv. 780.—Guinea Gall.
Dinteri (*Pilger*) *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 436: Trichopteryx Dinteri.
pruinosa *C. E. Hubbard, l. c.*—Rhodesia.
viridis (*Rendle*) *C. E. Hubbard, l. c.* 1935, 310: Trichopteryx viridis.
wasaënsis (*Vanderyst*) *C. E. Hubbard, l. c.*: Trichopteryx wasaënsis.

×**DANTHOSIEGLINGIA** Domin in Preslia, xiii–xv. 39 (1935). *GRAMINEAE.*
[DANTHONIA × SIEGLINGIA.]
breviaristata (*Vierh.*) *Domin, l. c.*: Danthonia breviaristata.

DAPHMANTHUS F. K. Ward in Gard. Chron. 1933, Ser. III. xciv. 417, in obs., sine descr. techn. FAMILIA IGNOTA.

DAPHNE L. (Thymelaeac.).
clivicola *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 588 (1933).—China (Szechuan).
pilosa (*Lange*) *Font Quer in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, v. Ser. Bot., No. v. 28 (1924): Passerina calycina var. pilosa.

DAPHNIPHYLLUM Blume (Euphorbiac.).
longistylium *Chien in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., viii. 239 (1933).—China (Kwangsi).
oblongum *Chien, l. c.* 241.—China (Szechuan).
salicifolium *Chien, l. c.* 242.—China (Kwangsi).
subverticillatum *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 34 (1934).—China (Kwangtung).

DAPHNOPSIS Mart. & Zucc. (Thymelaeac.).
anomala (*H. B. & K.*) *Domke in Biblioth. Bot.* cxi. 57 (1934), in obs.: Daphne anomala.
decidua *Domke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 726 (1935).—Mexico.
Ekmanii *Domke in Fedde, Repert.* xxxii. 85 (1933). —Santo Domingo.
longipedunculata *Gilg ex Ule*; *Domke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 723 (1935), descr.—Guiana (Roraima).
longiracemosa *Gilg ex Domke in Biblioth. Bot.* cxi. 13, 147 (1934), in obs.; *et in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 728 (1935).—Bras. (Ceará).
loranthifolia *Standley in Tropical Woods*, 1935, No. 42, 30.—Ecuador.
pseudosalix *Domke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 724 (1935).—Bras. (S. Catharina).
Ulei *Gilg ex Domke, l. c.* 725.—Bras. (Rio de Janeiro).
umbelluligera *Domke, l. c.* 730.—Bras. (Rio de Janeiro).
Weberbaueri *Domke, l. c.* 722.—Peruv.
zamorensis *Domke, l. c.* 729.—Ecuador.

DARWINIA Rudge (Myrtac.).
Porteri *C. T. White in Proc. Roy. Soc. Queensl.* 1931, xliii. 15 (1932).—Austral. (Queensland).

DASIPHORA Rafin. (Rosac.).
dahurica (*Nestl.*) *Komarov in Komarov & Klob.-Alis. Key Pl. Far East. Reg. USSR*, ii. 641 (1932): Potentilla davurica.
fruticosa (*L.*) *Rydb. Fl. Prairies & Plains Centr. N. Amer.* 417 (1932): Potentilla fruticosa.

DASYLEPIS Oliv. (Flacourtiac.; Bixac., Gen. Pl.).
assinensis *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 159 (1927), in clavi; *Hutchinson & Dalziel in Kew Bull.* 1928, 30, descr.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
Burtt-Davyi *Edlin in Kew Bull.* 1935, 255.—Nyasaland.

DASYLIRION Zucc. (Liliac.).
filiforme *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1062 (1895), in syn.: D. longifolium.

DASYMASCHALON Dalla Torre & Harms (Annonac.).
glaucum *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 227 (1935).—China (Hainan).
rostratum *Merrill & Chun, l. c.* ii. 8 (1934).—China (Kwangsi; Kwangtung).

DATURA L. (Solanac.).
×Cabanesi *P. Fourn. in Le Monde des Plantes*, 1934, xxxv. 14.—Gallia.
carthaginensis *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 728 (1895), in syn.: D. Metel.
×ferocissima *Cabanès & P. Fourn. in Le Monde des Plantes*, 1934, xxxv. 14.—Gallia.
frutescens *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 727 (1895), in syn.: D. Knightii.
Knightii (*Hort.*) *Voss in Vilmorin, l. c.*, in obs.: Brugmansia Knightii.

DAUCUS L. (Umbellif.).
hispidissimus *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 51 [1933], nomen.—Marocc.
Mauritii *Sennen, l. c.*, nomen.—Marocc.
Reboudii *Coss. ex Battand. & Trab.*; *Battand. Contrib. Fl. Atlant.* 40 (1919), descr. ampl.—Marocc.
virgatus (*Poir.*) *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1932, xxiii. 187: Caucalis virgata.

DAVILLA Vand. (Dilleniac.).
densa *Macbride in Candollea*, vi. 15 (1934).—Peruv.

DAWEA Sprague ex Dawe, Rep. Bot. Miss. Uganda Protect. 14, in obs., 37 (1906); Sprague in Journ. Linn. Soc., Bot. xxxvii. 499 (1906), in syn.: **Warburgia** Sprague (Canellac.).

DAWEA:—
ugandensis *Sprague ex Dawe, Rep. Bot. Miss. Uganda Protect.* 14, in obs., 37 (1906); *Sprague in Journ. Linn. Soc., Bot.* xxxvii. 499 (1906), in syn.: Warburgia ugandensis.

DECACHAENA Torr. & Gray (Ericac.; Vacciniac., Gen. Pl.).
baccata (*Wangenh.*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 1008 (1933): Andromeda baccata.
nana (*Small*) *Small, l. c.*: Gaylussacia nana.
tomentosa (*Pursh ex A. Gray*) *Small, l. c.* 1007: Vaccinium tomentosum.
ursina (*Torr. & Gray*) *Small, l. c.* 1008: Gaylussacia ursina.

DECAMERIUM Nutt. (Ericac.; Vacciniac., Gen. Pl.).
brachycerum (*Michx.*) *Ashe in Rhodora*, 1931, xxxiii. 197: Vaccinium brachycerum.
nanum (*Small*) *Ashe, l. c.* 198: Gaylussacia nana.
tomentosum (*Pursh*) *Ashe, l. c.*: Vaccinium tomentosum.
ursinum (*M. A. Curtis*) *Ashe, l. c.*: Vaccinium ursinum.

DECARYELLA A. Camus in Bull. Soc. Bot. France, 1931, lxxviii. 177. *GRAMINEAE.*
madagascariensis *A. Camus, l. c.* 178.—Madag.

DECARYIA (DECARYA) Choux; Choux in Mém. Acad. Malgache, Fasc. xvii. 39, 62 (1934), descr. *DIDIEREACEAE.*
madagascariensis *Choux, l. c.*—Madag.

DECASPERMUM J. R. & G. Forst. (Myrtac.).
hainanense (*Merrill*) *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 42 (1935): Eugenia hainanensis.
lanceolatum *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 32 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
neo-ebudicum *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 254.—N. Hebrides.
vitiense (*A. Gray*) *Guillaumin, l. c.*, in obs.: Nelitris vitiensis.

DECLIEUXIA H. B. & K. (Rubiac.).
Dusenii *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 369 (1931).—Bras. (S. Paulo; Paraná).

DECORSEA R. Viguier ex Basse in Ann. Sc. Nat. 1934, Sér. X. xvi. 116, nomen. Quid?
Grandidieri *R. Viguier ex Basse, l. c.*, nomen.—Madag.

DECORSELLA A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France, 1914, lxi. Mém. 8, 297 (1917). *URTICACEAE.*
paradoxa *A. Cheval. l. c.* 298.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).

DEDEA Baill. (Saxifragac.).
neo-ebudica *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 250.—N. Hebrides.

DEERINGIA R. Br. (Amaranthac.).
arvensis *Hort. ex Schinz in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 41 (1934), in syn.: Digera alternifolia.
salicifolia *Schinz, l. c.* 27, nomen.—Celebes.
spicata (*Thou.*) *Schinz, l. c.*: Lestibudesia spicata.
tetragyna *Roxb. Hort. Beng.* 19 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 512 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 683 (1832).—Ins. Molucc.

DEGUELIA Aubl. (Legumin.).
amazonica *Killip in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1934, xxiv. 48, in obs.: Lonchocarpus negrensis.

DEILANTHE N. E. Brown; N. E. Brown in Gard. Chron. 1931, Ser. III. lxxxix. 259, descr. ampl. *FICOIDACEAE.*
Peersii (*L. Bolus*) *N. E. Brown, l. c.*: Nananthus Peersii.

DEINA Alef. Landwirthsch. Fl. 335 (1866). *GRAMINEAE.*
polonica (*L.*) *Alef. l. c.* 336: Triticum polonicum.

DEINBOLLIA Schum. & Thonn. (Sapindac.).
adusta *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 681 (1932).—Tanganyika Terr.
albidokermesina *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 272 (1921), in obs.—Cameroons.

DEINBOLLIA:—
calophylla *Gilg & Dinkl. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 272 (1921), in obs.; *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 684 (1932).—Liberia.
cuspidata *Radlk. l. c.* 680.—Congo Belg.
dasybotrys *Gilg ex Radlk. l. c.* 685.—Cameroons.
leptophylla *Gilg*; *Radlk. l. c.* 679, descr.—Guinea super.
macrantha *Radlk. l. c.* 681.—Cameroons.
macroura *Gilg ex Radlk. l. c.* 684.—Cameroons.
marginata *Radlk. l. c.* 673.—Nyasaland.
patentinervis *Radlk. l. c.* 683.—Congo Belg.
pycnophylla *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg der Erde*, ix.) 272 (1921), in obs.; *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 683 (1932).—Cameroons.
reticulata *Gilg ex Engl. l. c.*, in obs.; *Radlk. l. c.* 679.—Guinea Hispan.
revoluta *Radlk. l. c.* 688.—Madag.

DELOPYRUM Small (Polygonac.).
articulatum (*L.*) *Small ex Rydb. Fl. Prairies & Plains Centr. N. Amer.* 281 (1932): Polygonum articulatum.
filiforme *Small, Man. Southeast. Fl.* 451 (1933).—U.S.A. (Georgia; Florida).

DELOSPERMA N. E. Brown (Ficoidac.).
alticola *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 383 (1933).—Natal.
annulare *L. Bolus, l. c.* 385.—Transvaal.
Ashtonii *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 317 (1932).—Basutoland.
Brunnthaleri (*A. Berger*) *Schwantes ex Jacobsen, Sukkul.* 120 (1933): Mesembryanthemum Brunnthaleri.
Carterae *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 478 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
concavum *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 340 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
denticulatum *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 383 (1933).—Transvaal.
erectum *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 420 (1934).—Hab.?
Galpinii *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 380 (1933).—Natal.
Gerstneri *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 441 (1934).—Basutoland.
grandiflorum *L. Bolus, l. c.* 420.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Gratiae *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 317 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
intonsum *L. Bolus, l. c.* 318.—Afr. austr. (Cape Prov.).
karrooicum *L. Bolus, l. c.* 340.—Afr. austr. (Cape Prov.).
luteum *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 387 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Mariae *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 245 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Muirii *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 479 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
obtusum *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 388 (1933).—Orange Free State.
ornatulum *N. E. Brown ex Stapf in Bot. Mag.* t. 9240 (1931).—Orange Free State; Cape Prov.
pachyrhizum *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 381 (1933).—Zululand.
pallidum *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 246 (1931).—Hab.?
Pontii *L. Bolus, l. c.* 247.—Orange Free State.
prasinum *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 385 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
repens *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 421 (1934).—Afr. austr. (Transkei).
scabripes *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 388 (1933).—Afr. austr. (Transkei).
sulcatum *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 341 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
uniflorum *L. Bolus, l. c.* 342.—Afr. austr. (Cape Prov.).
vernicolor *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 381 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
versicolor *L. Bolus, l. c.* 386.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Vogtsii *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 301 (1931).—Transvaal.
Zeederbergii *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 422 (1934).—Transvaal.
Zoeae *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 479 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).

DELPHINIUM L. (Ranunculac.).
albomarginatum *Simonova in Vved. et al., Key Fl. Tashkent*, 124 (1924).—Turkestan.
apachense *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 142 (1931).—U.S.A. (Arizona).
autumnale *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 276 (1931).—China (Szechuan).
× Belladonna (*Kelw.*) *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 168 (1924): 'D. elatum Belladonna'.
Buschianum *Grossheim in Trud. Azerb. Otdyel. Zakavk. Fil. Akad. Nauk SSSR*, Sect. Bot., i. 51 (1933).—Armen.
coleopodum *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 275 (1931).—China (Yunnan).
crassicaule *Hort. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 61 (1833), in obs.—Hab.?
cyaneum *Hort. ex Colla, l. c.* 60, in obs.—Hab.?
dubium (*Rouy & Fouc.*) *Pawl. in Bull. Acad. Crac.* 1933 B, i. 39 (1934), cum descr. ampl.: D. elatum var. dubium.
Georgei *Comber in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 236 (1934).—China (Yunnan).
Gombaultii *J. Thiéb. in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 114.—Syria.
inconspicuum *Sergievsk. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1930, Nos. 3–4, p. 6.—Sibir.
Ironorum *N. Busch in Bull. Acad. Sc. URSS*, 1931, Sér. VII. 450.—Transcaucas.
jugorum *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 273 (1931).—China (Yunnan).
labrangense *Ulbr. ex Rehder & Kobuski in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 11, nomen.—Tibet.
lilacinum *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 277 (1931).—China (Yunnan).
mirabile *Sergievsk. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1930, Nos. 3–4, p. 5.—Sibir.
mitzugense *Ulbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 358 (1935).—China (Szechuan).
osseticum *N. Busch in Bull. Acad. Sc. URSS*, 1931, Sér. VII. 449.—Transcaucas.
paludicola *Ulbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 357 (1935).—China (Szechuan).
pediforme *Comber in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 237 (1934).—Tibet; China (Yunnan).
pogonanthum *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 279 (1931).—China (Yunnan).
× Ruysii *Hort. ex Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1934, xlix. 329.—Hort.
Simonkaianum *Pawl. in Bull. Acad. Crac.* 1933 B, i. 149 (1934).—Transylv.
sordidecaerulescens *Ulbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 356 (1935).—China (Szechuan).
spirocentrum *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 280 (1931).—China (Szechuan; Yunnan).
sulcatum *Burd. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 60 (1833).—Hab.?
umbrosum *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 278 (1931).—China (Yunnan).

DELPYDORA Pierre (Sapotac.).
gracilis *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 263 (1917).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).

DEMAZERIA Dumort. (Gramin.).
capensis (*Trin.*) *Phillips, S. Afr. Grasses* (*S. Afr. Agric. Ser.*, vi.) t. 101 (1931): Brizopyrum capense.

DENDROBIUM Sw. (Orchidac.).
Aliciae *Ames & Quisumb. in Philipp. Journ. Sc.* 1933, lii. 443 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
allioides *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 49 (1935).—N. Guin.
angustispathum *J. J. Smith, l. c.* 44.—N. Guin.
aridum *J. J. Smith, l. c.* 42.—N. Guin.
atjehense *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 137 (1932).—Sumatra.
auriculatum *Ames & Quisumb. in Philipp. Journ. Sc.* 1932, xlix. 488.—Ins. Philipp. (Luzon).
Banghamii *Ames & C. Schweinf. in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 30 (1934).—Sumatra.
bariense *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 187 (1934): Cadetia sepikana.
batanense *Ames & Quisumb. in Philipp. Journ. Sc.* 1932, xlvii. 200.—Ins. Philipp. (Batan).
bicornutum (*Schlechter*) *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 188 (1934): Cadetia bicornuta.

DENDROBIUM :—
cadetiiflorum *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 54 (1935).—N. Guin.
calcariferum *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 107 (1935).—Borneo.
clavuligerum *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 192 (1934).—N. Guin.
codonosepalum *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 51 (1935).—N. Guin.
connexicostatum *J. J. Smith, l. c.* 39.—N. Guin.
corallorhizon *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 140 (1931).—Borneo.
cuneilabium (*Schlechter*) *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 187 (1934): Cadetia cuneilabia.
cystopoides *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxix. 249 (1931).—Java.
Denneanum *Kerr in Journ. Siam Soc., Nat. Hist. Suppl.* ix. 229 (1933): D. clavatum *Lindl. & Paxt. Fl. Gard.* ii. 104 (1851–2), non *Roxb.*
Devosianum *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxxvi. 113 (1934).—N. Guin.?
ditschiense *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 188 (1934).—N. Guin.
emarginatum *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 24 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
Endertii *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 138 (1931).—Borneo.
evaginatum *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 164.—Indo-China (Tonkin).
exilifolium *Ames & C. Schweinf. in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 32 (1934).—Sumatra.
Fairchildae *Ames & Quisumb. in Philipp. Journ. Sc.* 1932, xlvii. 202.—Ins. Philipp. (Luzon).
fluctuosum *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 186 (1934).—N. Guin.
fulgescens *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 46 (1935).—N. Guin.
gnomus *Ames in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 106.—Ins. Santa Cruz.
Grimesii *C. T. White & Summerhayes in Kew Bull.* 1934, 106.—Austral. (Queensland).
Guerreroi *Ames & Quisumb. in Philipp. Journ. Sc.* 1932, xlix. 489.—Ins. Philipp. (Dinagat).
Guttenbergii *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 133 (1932).—Sumatra.
gynoglottis *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 105 (1935).—Borneo.
incurvociliatum *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 137 (1931).—Borneo.
intricatum *Gagnep. in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, vi. 243 (1932).—Cambodia; Java?
irayense *Ames & Quisumb. in Philipp. Journ. Sc.* 1933, lii. 446 (1934).—Ins. Philipp. (Batan).
isthmiferum *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 41 (1935).—N. Guin.
iteratum *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 193 (1934).—N. Guin.
junceum *Lindl.*; *Ames & Quisumb. in Philipp. Journ. Sc.* 1932, xlvii. 203, descr. emend.—Ins. Philipp. (Luzon).
junzaingense *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 197 (1934).—N. Guin.
Kajewskii *Ames in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 131.—Ins. Santa Cruz.
Kestevenii *Rupp in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, 1931, lvi. 135, 137.—Austral. (N. S. Wales).
Kjellbergii *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxv. 489 (1933).—Celebes.
kontumense *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 165.—Indo-China (Anam).
Kosepangii *Tso in Sunyatsenia*, i. 141 (1933).—China (Kwangtung).
kwangtungense *Tso, l. c.* 140.—China (Kwangtung).
lactiflorum (*Schlechter*) *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 187 (1934): Cadetia lactiflora.
lancilabium *J. J. Smith, l. c.* 198.—N. Guin.
lasianthera *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxxi. 78 (1932).—N. Guin.
latoureoides (*Schlechter*) *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 187 (1934): Cadetia latoureoides.
laurifolium (*Kraenzl.*) *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxxii. 286 (1933): Sarcopodium laurifolium.
laxiflorum *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 135 (1932).—Ins. Molucc. (Halmahera).

DENDROBIUM :—
ledifolium *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 37 (1935).—N. Guin.
macrifolium *J. J. Smith, l. c.* 50.—N. Guin.
maliliense *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxv. 487 (1933).—Celebes.
maluense *J. J. Smith, l. c.* lxvi. 187 (1934): Cadetia quadriquetra.
Marseillei *Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 119.—Indo-China (Laos).
Mayrii *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 185 (1934).—N. Guin.
Miyasakii *Ames & Quisumb. in Philipp. Journ. Sc.* 1931, xliv. 373.—Ins. Philipp. (Luzon).
modestum *Reichb. f.*; *Ames & Quisumb. l. c.* 1932, xlvii. 205, descr. emend.—Ins. Philipp. (Palawan).
multilineatum *Kerr in Journ. Siam Soc., Nat. Hist. Suppl.* ix. 230 (1933).—Indo-China (Laos).
Nienkui *Tso in Sunyatsenia*, i. 142 (1933).—China (Kwangtung).
occultum *Ames in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 108.—Ins. Santa Cruz.
ovatipetalum *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 134 (1932).—Ins. Molucc. (Halmahera).
Paathii *J. J. Smith in De Orchidee*, iv. 183 (1935); *et ex Orch. Rev.* 1935, xliii. 290, in obs.; *et in Gard. Bull. Straits Settlements*, ix. 90 (1935).—Borneo.
Parryae *Summerhayes ex Parry, The Lakhers*, 607 (1932), nomen.—Ind. or. (Assam).
paspalifolium *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 52 (1935).—N. Guin.
Phillipsii *Ames & Quisumb. in Philipp. Journ. Sc.* 1935, lvi. 457.—Ins. Philipp. (Mindanao).
platylobum (*Schlechter*) *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 187 (1934): Cadetia platyloba.
plumilobum *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 45 (1935).—N. Guin.
procumbens *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 11 (1932).—Penins. Mal.
Quaifei *Rolfe ex Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1927, lxxiv. 707 (1928), nomen; *Ames in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 109, descr.—N. Hebrides.
Rantii *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxxvi. 114 (1934).—Celebes.
Robertsii *F. Muell. ex Rupp in Queensl. Nat.* ix. 52 (1934), in obs., pro syn.: D. tenuissimum.
ruginosum *Ames in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 109.—Ins. Santa Cruz.
ruidilobum *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxxvi. 111 (1934).—N. Guin.
salicifolium *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 48 (1935).—N. Guin.
scotiiferum *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 196 (1934).—N. Guin.
separatum *Ames in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 133.—Ins. Santa Cruz.
singkawangense *J. J. Smith in Gard. Bull. Straits Settlements*, ix. 91 (1935).—Borneo.
spathilabium *Ames & C. Schweinf. in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 34 (1934).—Sumatra.
Steinii *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 194 (1934).—N. Guin.
stenoglossum *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 165.—Indo-China (Anam).
striatellum *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 10 (1932).—Penins. Mal.
Stueberi *Stüber ex Zurow. in Orch. Rev.* 1934, xlii. 204, in syn.: D. lasianthera.
Takahashii *Carr in Orch. Rev.* 1934, xlii. 14.—Borneo.
textile *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 132 (1932).—Celebes.
ustulatum *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 13 (1932).—Penins. Mal.
vacciniifolium *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 53 (1935).—N. Guin.
vanikorense *Ames in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 134.—Ins. Santa Cruz.
Vanleeuwenii *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 40 (1935).—N. Guin.
ventripes *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 103 (1935).—Borneo.
vestigiiferum *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 190 (1934).—N. Guin.

DENDROBIUM :—
villosulum *Wall.*; *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 86 (1830), descr.—Penins. Mal.
Wangii *Tso in Sunyatsenia*, i. 138 (1933).—China (Kwangtung).
Waterhousei *Carr in Kew Bull.* 1934, 379.—Ins. Solomon.
Yeageri *Ames & Quisumb. in Philipp. Journ. Sc.* 1933, lii. 447 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).

DENDROCALAMUS Nees (Gramin.).
birmanicus *A. Camus in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 1044.—Burma.

DENDROCHILUM Blume (Orchidac.).
acuiferum *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 227 (1935).—Borneo.
alpinum *Carr, l. c.* 235.—Borneo.
angustilobum *Carr, l. c.* 222.—Borneo.
anomalum *Carr, l. c.* 87.—Borneo.
carinatum *Carr in Journ. As. Soc. Mal.* xi. 74 (1933).—Sumatra.
carnosulilabrum *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxxii. 177 (1933): D. ovatum *J. J. Smith* (1928).
Devoogdii *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 109 (1932).—Sumatra.
dulitense *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 84 (1935).—Borneo.
gracilipes *Carr, l. c.* 81.—Borneo.
graminoides *Carr, l. c.* 229.—Borneo.
hologyne *Carr, l. c.* 89.—Borneo.
integrilabium *Carr, l. c.* 85.—Borneo.
lacteum *Carr, l. c.* 223.—Borneo.
lyriforme *J. J. Smith in Brittonia*, i. 107 (1931).—Borneo.
Mantis *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 108 (1931).—Borneo.
microscopicum *J. J. Smith, l. c.* 110.—Borneo.
minimiflorum *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 90 (1935).—Borneo.
mucronatum *J. J. Smith in Brittonia*, i. 106 (1931).—Borneo.
planiscapum *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 228 (1935).—Borneo.
pterogyne *Carr, l. c.* 236.—Borneo.
scriptum *Carr, l. c.* 234.—Borneo.
sublobatum *Carr, l. c.* 86.—Borneo.
subulibrachium *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 109 (1931).—Borneo.
tenompokense *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 225 (1935).—Borneo.
transversum *Carr, l. c.* 233.—Borneo.
vestitum *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxx. 331 (1932).—Ind. or. Bat. (Ins. Natuna).
Weberi *Ames*; *Ames & Quisumb. in Philipp. Journ. Sc.* 1932, xlix. 485, descr. emend.—Ins. Philipp. (Mindanao).

DENDROCHLOA C. E. Parkinson in Indian Forester, 1933, lix. 707. *GRAMINEAE.*
distans *C. E. Parkinson, l. c.*—Burma.

DENDROPHTHOË Blume (Loranthac.).
atropurpurea (*Blume*) *G. Don, Gen. Syst.* iii. 420 (1834): Loranthus atropurpureus.
carinata *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 399 (1931).—Java.
chrysantha (*Blume ex DC.*) *G. Don, Gen. Syst* iii. 420 (1834): Loranthus chrysanthus.
cuneata (*Heyne*) *G. Don, l. c.*: Loranthus cuneatus.
erecta (*Engl.*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 44 (1933): Loranthus erectus.
fasciculata (*Blume*) *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 1. 815 (1856): Loranthus fasciculatus.
ferruginea (*Roxb.*) *G. Don, Gen. Syst.* iii. 420 (1834): Loranthus ferrugineus.
flosculosa *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 408 (1931).—Sumatra.
Forsteriana (*Schult. f.*) *G. Don, Gen. Syst.* iii. 419 (1834): Loranthus Forsterianus.
fusca (*Blume*) *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 1. 814 (1856): Loranthus fuscus.
incarnata (*Jack*) *Miq. l. c.* 821: Loranthus incarnatus.
indica (*Desr.*) *Miq. l. c.* 820: Loranthus indicus.
locellata *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 414 (1931).—Celebes.

DENDROPHTHOË:—
longituba (*Elmer*) *Danser*; *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 415 (1931), cum descr. latine: Loranthus longitubus.
luzonensis (*Presl ex Schult. f.*) *G. Don, Gen. Syst.* iii. 419 (1834): Loranthus luzonensis.
magna *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 416 (1931).—Java.
malifolia (*Presl ex Schult. f.*) *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 1. 822 (1856): Loranthus malifolius.
mirifica *Danser in Philipp. Journ. Sc.* 1935, lviii. 115.—Ins. Philipp. (Basilan).
obovata (*Blume*) *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 1. 817 (1856): Loranthus obovatus.
pauciflora *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 417 (1931).—Celebes.
pendens (*Engl. & K. Krause*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 47 (1933): Loranthus pendens.
pentandra (*L.*) *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 1. 818 (1856): Loranthus pentandrus.
philippensis (*Cham. & Schlecht.*) *Miq. l. c.* 817: Loranthus philippensis.
praelonga (*Blume*) *Miq. l. c.* 819: Loranthus praelongus.
repanda (*Blume*) *G. Don, Gen. Syst.* iii. 420 (1834): Loranthus repandus.
Schultesii (*Blume ex DC.*) *G. Don, l. c.*: Loranthus Schultesii.
sphenoides (*Blume*) *G. Don, l. c.*: Loranthus sphenoides.
tetrapetala (*L. f.*) *G. Don, l. c.* 419: Loranthus tetrapetalus.
villosa *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 425 (1931).—Sumatra.
virescens (*N. E. Brown*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 48 (1933): Loranthus virescens.

DENDROSIPANEA Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro, ii. 69 (1935). *RUBIACEAE.*
spigelioides *Ducke, l. c.* 70.—Bras. (Amaz.).

DENDROSTIGMA Gleason in Phytologia, i. 29 (1933). *FLACOURTIACEAE.*
hystricinum *Gleason, l. c.* 30.—Colomb.

DENDROSTYLIS Karst. & Triana in Triana, Nuev. Jen. i Esp. Fl. Neo-Granad. 26 (1854); Karst. in Linnaea, xxviii. 431 (1857); Sprague in Kew Bull. 1934, 396. *FLACOURTIACEAE.*
apeibifolia *Karst. & Triana, l. c.* 28; *Karst. l. c.* 432; *Sprague, l. c.*—Colomb.; Venez.
pubescens *Karst. & Triana, l. c.*; *Karst. l. c.*; *Sprague, l. c.*—Colomb.
suaveolens *Karst. & Triana, l. c.* 27; *Karst. l. c.*; *Sprague, l. c.*—Colomb.

DENSLOVIA Rydb. in Brittonia, i. 85 (1931). *ORCHIDACEAE.*
clavellata (*Michx.*) *Rydb. l. c.* 86: Orchis clavellata.

DENTELLA J. R. & G. Forst. (Rubiac.).
asperata *Airy-Shaw in Kew Bull.* 1934, 297.—W. Austral. vel N. Austral.?
concinna *Airy-Shaw, l. c.* 1932, 291.—Lower Burma.
dioeca *Airy-Shaw, l. c.* 1934, 296.—N. Austral.
linearis *R. Br. ex Airy-Shaw, l. c.* 294, pro syn., cum descr.: D. Browniana.
misera *Airy-Shaw, l. c.* 298.—W. Austral.
pulvinata *Airy-Shaw, l. c.* 299.—S. Austral.; Queensland.
repens *J. R. & G. Forst.*; *R. Br. ex Airy-Shaw, l. c.* 292, descr. ampl.—N. Austral.; Queensland.
serpyllifolia *Wall. ex Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 27 (1932); *Airy-Shaw, l. c.* 1932, 289, latine.—Ind. or.; Lower Burma; Siam; Ins. Sunda (Lombok).

DEPLANCHEA Vieill. (Bignoniac.).
montana (*Vieill. ex Beauvisage*) *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1935, lxxxii. 48: Diplanthera montana.

DERENBERGIA Schwantes (Ficoidac.).
densipuncta (*L. Bolus*) *Tisch. ex L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1930, xx. 212, in obs.: Conophytum densipunctum.

DERRIS Lour. (Legumin.).
amazonica *Killip in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1934, xxiv. 48: Lonchocarpus negrensis.

DERRIS:—
glauca *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 246 (1935).—China (Hainan).
mariannensis *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 124.—Ins. Marian. (Rota).
microphylla (*Miq.*) *Jackson, Index Kewensis*, i. 332 (1895); *Valeton ex Backer, Voorl. Schoolfl. Java*, 95 (1908), in clavi: Brachypterum microphyllum.
zambalensis *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3199 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).

DESCHAMPSIA Beauv. (Gramin.).
aleutica *Tatewaki & Ohwi in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxxvi. 95 (1934).—Ins. Aleut.
borealis (*Trautv.*) *Roshev. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 246, 750 (1934): D. caespitosa var. borealis.
crassifolia *Font Quer & Maire*; *Emberger & Maire in Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc*, xi. Nos. 4–6, 112 (1931).—Marocc.
ligulata (*Stapf*) *Henrard in Blumea*, i. 309 (1935), in obs.: D. flexuosa var. ligulata.
Mairei *Sennen in Cat. Fl. Rif Or.* 128 [1933], nomen.—Marocc.
obensis *Roshev. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 771 (1932).—Eur. et As. arct.
pacifica *Tatewaki & Ohwi in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxxvi. 97 (1934): Vahlodea atropurpurea subsp. paramushirensis *Hultén*.
pamirica *Roshev. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 252, 750 (1934).—Pamir.
pumila (*Stev.*) *Woronow ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 84 (1928).—Caucas.
Sukatschewii *Roshev. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 246 (1934).—Hab.?

DESCURAINIA Webb & Berth. (Crucif.).
Bartschii *O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 391 (1932).—As. Min.
chubutica *O. E. Schulz in Fedde, Repert.* xxxiii. 184 (1933).—Patag.

DESMANTHUS Willd. (Legumin.).
Bernierianus (*Baill.*) *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxx. (*Hist. Nat. Pl.* i. texte) 55 (1902): Dichrostachys Bernierianus.
brachypus (*Baill.*) *Drake, l. c.* 56: Dichrostachys brachypus.
Cooleyi (*Eaton*) *Rydb. in Brittonia*, i. 90 (1931): Acacia Cooleyi.
Richardianus (*Baill.*) *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxx. (*Hist. Nat. Pl.* i. texte) 55 (1902): Dichrostachys Richardianus.

DESMODIUM Desv. (Legumin.).
album (*Schindl.*) *Macbride in Candollea*, vi. 10 (1934): Meibomia alba.
Aparine *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 32 (1935).—Kenya Col.
Dunnii *Merrill ex Metcalf in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 270: Lespedeza lanceolata.
guaraniticum (*Chod. & Hassler*) *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 13, 78 (1931): Meibomia guaranitica.
immerens *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 23 (1931).—Peruv.
setigerum (*E. Mey.*) *Benth. ex Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* ii. 229 (1861–2): Nicolsonia setigera.
Zenkeri *Schindl. in Fedde, Repert.* xxi. 8 (1925).—Cameroons.

DESMONCUS Mart. (Palmae).
anomalus *H. H. Bartlett in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 84.—Guatem.
brevisectus *Burret in Fedde, Repert.* xxxvi. 215 (1934).—Bras. (Pará).
campylacanthus *Burret, l. c.* 210.—Bras. (Rio de Janeiro).
costaricensis (*Kuntze*) *Burret, l. c.* 202: Atitara costaricensis.
dasyacanthus *Burret, l. c.* 213.—Venez.
ferox *H. H. Bartlett in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 87.—Guatem.
glaber *Mart. ex Burret in Fedde, Repert.* xxxvi. 211 (1934), in syn.: D. longifolius.
granatensis *Bull, Cat.* 1876, 142.—Colomb.
Huebneri *Burret in Fedde, Repert.* xxxvi. 200 (1934).—Bras. (Amaz.).
latisectus *Burret, l. c.* 215.—Boliv.

DESMONCUS:—
leiorhachis *Burret in Fedde, Repert.* xxxvi. 203 (1934).—Brit. Honduras.
leptochaete *Burret, l. c.* 204.—Costa Rica.
longisectus *Burret, l. c.* 212.—Bras. (Alagoas).
Lundellii *H. H. Bartlett in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 84.—Guatem.
peruvianus *Dammer ex Burret in Fedde, Repert.* xxxvi. 211 (1934), in syn.: D. longifolius.
quasillarius *H. H. Bartlett in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 85.—Brit. Honduras.
Schippii *Burret in Fedde, Repert.* xxxvi. 202 (1934).—Brit. Honduras.
tenerrimus (*Mart. ex Drude*) *Mart. ex Burret, l. c.* xxxiv. 236 (1934): Bactris tenerrima.
uaxactunensis *H. H. Bartlett in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 86.—Guatem.
Werdermannii *Burret in Fedde, Repert.* xxxii. 114 (1933).—Bras. (Bahia).

DESMONEMA Miers (Menispermac.).
Gossweileri *Exell in Journ. Bot.* 1932, lxx. Suppl. 1, 216.—Angola.

DESMOPSIS Saff. (Annonac.).
heteropetala *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* x. 316 (1931).—Costa Rica.
microcarpa *R. E. Fries, l. c.* x. 23 (1930).—Costa Rica.
Schippii *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 130 (1932).—Brit. Honduras.
stenopetala (*Donn. Smith*) *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* x. 26 (1930): Porcelia stenopetala.

DESMOS Lour. (Annonac.).
hainanensis (*Merrill*) *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 229 (1935): Fissistigma hainanense.

DESMOTRICHUM Blume (Orchidac.).
compressibulbum *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 7 (1932).—Penins. Mal.
luxurians (*J. J. Smith*) *Carr, l. c.* 9: Dendrobium luxurians.
Poilanei *Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 681.—Indo-China (Anam).
thysanochilum (*Schlechter*) *Carr in Kew Bull.* 1934, 380: Dendrobium thysanochilum.
trifurcatum *Carr in Journ. As. Soc. Mal.* xi. 85 (1933).—Sumatra.

DESPLATSIA Bocq. (Tiliac.).
Dewevrei (*De Wild. & Th. Dur.*) *Burret in Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. 1907–8*, ii. 496 (1912): Grewiopsis Dewevrei.
lutea *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 240 (1927), in clavi; *Hutchinson & Dalziel in Kew Bull.* 1928, 229, descr.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire; Nigeria).
Trillesiana (*Pierre ex De Wild.*) *Pierre ex A. Cheval. Vég. Ut. Afr. Trop. Franç.* ix. 81 (1917), in obs.: Grewiopsis Trillesiana.

DEUTZIA Thunb. (Saxifragac.).
amurensis (*Regel*) *Airy-Shaw in Kew Bull.* 1934, 179: D. parviflora var. amurensis.
Bunyardii *Hort. ex Bull. Soc. Dendr. France*, 1935, 78, in obs., nomen.—Hab.?
Esquirolii (*Léveillé*) *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 202: Styrax Esquirolii.
glauca *Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., x. 71 (1935).—China (Anhwei; Chekiang).
Hookeriana (*C. K. Schneider*) *Airy-Shaw in Kew Bull.* 1934, 180: D. corymbosa var. Hookeriana.
kongoa *Airy-Shaw, l. c.* 179.—Corea.
Nagurai (*Makino*) *Makino in Journ. Jap. Bot.* i. 1 (1916): D. gracilis var. Nagurai.
staurothrix *Airy-Shaw in Kew Bull.* 1934, 181.—Himal. bor.-occ.
subulata *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 439 (1931).—China (Yunnan).
teradakensis *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 497.—Japon. (Kiushiu).

DEYEUXIA Clar. ex Beauv. (Gramin.).
crassifolia *Hackel ex Sodiro in Rev. Col. Nac. Vicente Rocafuerte*, xi. Nos. 40–1, 64, in clavi, 73 (1930).—Ecuador.
lactea *Suksdorf ex Beal, Grasses N. Amer.* ii. 346 (1896), in syn.: Calamagrostis lactea.

DEYEUXIA:—
montanensis *Scribn. in Proc. Soc. Promot. Agric. Sc.* 6 (1883); cf. *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 342 (1896).—U.S.A. (Montana).
Pringlei *Scribn. ex Beal, Grasses N. Amer.* ii. 345 (1896), in syn.: Calamagrostis Pringlei.
Sodiroana *Hackel ex Sodiro in Rev. Col. Nac. Vicente Rocafuerte*, xi. Nos. 40–1, 64, in clavi, 70 (1930); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 134.—Ecuador.

DIALIUM L. (Legumin.).
Aubrevillei *Pellegr. in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 463.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
connaroides *Harms ex De Wild.*; *E. G. Baker, Legum. Trop. Afr.* 645, in clavi, 649 (1930), descr.—Cameroons.
Corbisieri *Staner in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxii. 242 (1932).—Congo Belg.
reticulatum *Burtt Davy & MacGregor in Kew Bull.* 1932, 261.—Kenya Col.

DIALYANTHERA Warb. (Myristicac.).
olacoides *A. C. Smith in Phytologia*, i. 113 (1935).—Bras. (Amaz.).

DIALYTHECA Exell & Mendonça in Journ. Bot. 1935, lxxiii. Suppl., 8. *MENISPERMACEAE.*
Gossweileri *Exell & Mendonça, l. c.* 9.—Congo Lusit.

DIANELLA Lam. (Liliac.).
lavarum *Degener, Fl. Hawaiiensis*, Fam. 68 (1932).—Ins. Sandvic. (Hawaii).
multipedicellata *Degener, l. c.*—Ins. Sandvic. (Oahu).

DIANTHERA L. (Acanthac.).
Pohliana (*Nees*) *Nicholson, Ill. Dict. Gard.* i. 461 (1884): Orthotactus Pohlianus.
setacea (*Kuntze*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 809 (1895), in obs.: Ecbolium setaceum.
strobilacea (*Nees*) *Voss, l. c.*, in obs.: Orthotactus strobilaceus.

DIANTHUS L. (Caryophyllac.).
acantholimonoides *Schischk. in Bull. Mus. Géorgie*, 1928, v. 121 (1930).—Caucas.
Allionii *Colla, Herb. Pedem.* i. 297 (1833): D. atrorubens *All.*
Arpadianus *Ade & Bornm. in Fedde, Repert.* xxxvi. 385 (1934).—Ins. Aegeae.
athous *K. H. Rechinger in Fedde, Repert.* xxxi. 159 (1932).—Bulgar.
bertisceus *K. H. Rechinger, l. c.* xxxviii. 151 (1935), in obs.—Albania.
Bolivaris *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 96.—Hispan.
brevistylus *Timb.-Lag. & Jeanb. in Timb.-Lag. Monogr. Dianth. Pyrén. Franç.* 3, in clavi, 24 (1881).—Pyren.
× callizonoides *Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1906, xii. 91.—Hort.
dentatus *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 112 (1894), in syn.: D. Seguieri.
Dostalii *Novák in Fedde, Repert.* xxxviii. 304 (1935).—Czechoslovak.
Drenowskianus *K. H. Rechinger in Fedde, Repert.* xxxi. 158 (1932).—Bulgar.
eldivenus *Czecz. in Acta Soc. Bot. Polon.* 1932, ix. 33.—As. Min. (Galatia).
Eugeniae *Kleopow in Bull. Jard. Bot. Kieff*, xii–xiii. 157, in obs., 161, in clavi (1931).—Rossia.
Grancarovii *Urumoff ex Stoyanoff & Stefanoff, Fl. Bulg.* ed. 2, 368 (1933), in syn.: D. moesiacus var. Grancarovii *Stoyanoff & Achtaroff.*
hispanicus *Colla, Herb. Pedem.* i. 305 (1833).—Hab.?
ilgazensis *Czecz. in Acta Soc. Bot. Polon.* 1932, ix. 32.—As. Min. (Paphlagonia).
imereticus (*Rupr.*) *Schischk. in Bull. Mus. Géorgie*, 1928, v. 123 (1930): D. montanus f. imereticus.
karataviensis *Pavlov in Sovietsk. Bot.* 1934, No. 1, 22, in obs.—Turkestan.
× Magyari *Dorsch in Kertészeti Szemle*, v. 241–2 (1933); cf. *Bot. Közl.* 1934, xxxi. 57.—Hab.?
nobilis *Hort. ex Gartenflora*, 1932, lxxxi. 94.—Hab.?

DIANTHUS:—
orbelicus *Pančˇ. ex Stoyanoff & Achtaroff, Krit. Stud. Nelk. Bulg.* (*Sbor. Balg. Akad. Nauk.* xxix.) 56 (1935), in syn.: D. cruentus var. Pancicii *Stoyanoff & Achtaroff.*
pineticola *Kleopow in Bull. Jard. Bot. Kieff*, xii–xiii. 156, in obs., 161, in clavi (1931).—Rossia.
Rogowiczii *Kleopow, l. c.* 156, in obs., 160, in clavi.—Rossia.
Ruprechtii *Schischk. in Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 432 (1930): D. Carthusianorum var. caucasicus *Rupr.*
× ruscinonensis *Fouc. & Gaut. in Gaut. Cat. Fl. Pyrén.-Or.* 108 [1898].—Pyren.
ruscinonensis (*Boiss.*) *Sennen in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xv. Ser. Bot. No. 1, 48 (1931), in obs.: D. brachyanthus var. ruscinonensis.
sidi-tualii *Font Quer in Cavanillesia*, vii. 149 (1935).—Marocc.
Siemienkiewiczii *Bordz. in Fedde, Repert.* xxx. 364 (1932).—Armen.
simulans *Stoyanoff & Stefanoff ex Stefanoff & Jordanoff in Engl. Jahrb.* lxiv. 536 (1931), nomen; *Stoyanoff & Stefanoff in Magyar Bot. Lap.* 1933, xxxii. 1, descr.—Macedon.
stenocalyx (*Trautv.*) *Juzepczuk in Mem. Inst. Agron. & For. Belarus*, iv. 212 (1925), in obs.: D. superbus var. stenocalyx.
subaggregatus (*Alboff*) *Schischk. ex Kemul.-Nat. in Monit. Jard. Bot. Tiflis*, 1928–30, n. s. Pt. 5, 12 (1931): D. Segueri var. subaggregatus.
subulatus *Timb.-Lag. Monogr. Dianth. Pyrén. Franç.* 2, in clavi, 13 (1881).—Pyren.
subulifolius *Kitagawa in Rep. 1st. Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. ii. (*Contrib. Cogn. Fl. Mansh.*: *Pl. Nov. Jehol.* ii. ii.) 16 (1935).—Manchur. (Jehol).
trojanus *Bornm. & Sint. ex Ade in Fedde, Repert.* xxxvi. 386 (1934), pro syn.: D. Arpadianus.
Urumoffii *Stoyanoff & Achtaroff in Stoyanoff & Stefanoff, Fl. Bulg.* ed. 2, 364 (1933), in clavi; *Stoyanoff & Achtaroff, Krit. Stud. Nelk. Bulg.* (*Sbor. Balg. Akad. Nauk.* xxix.) 42 (1935), descr.—Bulgar.
Warionii *Bucq. & Timb.-Lag. in Timb.-Lag. Monogr. Dianth. Pyrén. Franç.* 3, in clavi, 20 (1881).—Pyren.

DIAPHANANTHE Schlechter (Orchidac.).
Burttii *Summerhayes in Kew Bull.* 1934, 211.—Congo Belg.

DIARRHENA Beauv. (Gramin.).
arundinacea (*Zea*) *Rydb. Fl. Prairies & Plains Centr. N. Amer.* 114 (1932): Korycarpus arundinaceus.
festucoides (*Rafin.*) *Fernald in Rhodora*, 1932, xxxiv. 204: Diarina festucoides.
koryoënsis *Honda ex Bot. Mag., Tokyo*,' 1933, xlvii. 74, japonice.—Hab.?

DIASCIA Link & Otto (Scrophulariac.).
ausana *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 189 (1932).—Great Namaq.
avasmontana *Dinter, l. c.*—Hereroland.
karasmontana *Dinter, l. c.* 190, in obs., nomen.—Great Namaq.

DIASPIS Niedenzu (Malpighiac.).
argentea *Chiov. Fl. Somala*, II. 41 (1932), in syn.: Caucanthus argenteus.

DIASTEMA Benth. (Gesneriac.).
peruanum *Cuatrec. in An. Univ. Madrid*, iv. Fasc. 2, 250 (1935).—Peruv.
rhodotrichum *Cuatrec. l. c.* 252.—Ecuador.

DIBRACHYA Eckl. & Zeyh. (Geraniac.).
Beccariana *Baill. ex Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 1. 137 (1891), in syn.: Tribrachya Beccariana.

DICELLANDRA Hook. f. (Melastomatac.).
Escherichii *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. ii. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 760 (1921), in obs.—Cameroons.
gracilis *A. Cheval.*; *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 679, descr.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
scandens *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. ii. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 760 (1921), in obs.—Cameroons; Fernando Po.

DICENTRA Bernh. (Papaverac.).
nevadensis *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 143 (1931).—U.S.A. (Calif.).
oregona *Eastw. l. c.* 144.—U.S.A. (Oregon).

DICEROCARYUM Boj. (Pedaliac.).
zanguebarium (*Lour.*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. ii. 355 (1935): Martynia zanguebaria.

DICEROSTYLIS Blume (Orchidac.).
kinabaluensis *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 192 (1935).—Borneo.
selebica *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxv. 457 (1933).—Celebes.

DICHAETANTHERA Endl. (Melastomatac.).
amphorocalyx *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxxv. (*Hist. Nat. Pl.* v. Atlas, iii.) t. 381 (1896).—Madag.
Bojerii *Drake, l. c.* t. 380.—Madag.
cornifrons *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. xii. 38 (1932).—Madag.
Decaryi *H. Perrier, l. c.* 41.—Madag.
hirsuta *H. Perrier, l. c.* 36.—Madag.
lutescens *H. Perrier, l. c.* 29.—Madag.
pauciflora *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxxv. (*Hist. Nat. Pl.* v. Atlas, iii.) t. 382 (1896).—Madag.
sambiranensis *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. xii. 39 (1932).—Madag.
villosissima *H. Perrier, l. c.* 37.—Madag.

DICHANTHIUM Willem. (Gramin.).
pallidum (*Hook. f.*) *Stapf ex C. E. C. Fischer in Gamble, Fl. Madras*, 1741 (1934): Apocopis pallida.

DICHAPETALUM Thou. (Dichapetalac.; Chailletiac., Gen. Pl.).
albidum *A. Cheval. ex Pellegr.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 324 (1928), in syn.: D. liberiae.
amazonicum *K. Krause in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 135 (1931).—Peruv.
Howii *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 256 (1935).—China (Hainan).
keniense *Hutchinson & E. A. Bruce in Kew Bull.* 1931, 270.—Kenya Col.
kumasiense *Hoyle in Kew Bull.* 1932, 260.—Gold Coast.
Pullei *K. Krause in Nova Guinea*, xiv. 533 (1932).—N. Guin.
scandens (*Poir.*) *I. M. Johnston in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 44: Cordia scandens.
Schliebenii *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 514 (1935).—Tanganyika Terr.
stipulatum *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 68 (1931).—Peruv.

DICHILUS DC. (Legumin.).
Dallonianus *Maire in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 905.—Sahara Gall. (Tibesti).
multiflorus *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. ii. p. xxi. 391 (1932).—Transvaal.

DICHORISANDRA Mikan (Commelinac.).
macrophylla *Gleason in Am. Journ. Bot.* 1932, xix. 740.—Bras. (Minas Geraes).
Ulei *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 8 (1931): D. longifolia *Ule.*

DICHROA Lour. (Saxifragac.).
sylvatica (*Reinw.*) *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. viii. 66 (1934): Cyanitis sylvatica.

DICHROANTHUS Webb & Berth. (Crucif.).
violascens *Popov in Bull. Univ. As. Centr.* ix. Suppl., 25 (1925), in obs.—As. centr.

DICHROMENA Michx. (Cyperac.).
aberrans (*C. B. Clarke*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 6 (1931): Rhynchospora aberrans.
amazonica (*Poepp. & Kunth*) *Macbride, l. c.*: Rhynchospora amazonica.
barbata (*Vahl*) *Macbride, l. c.* 5: Schoenus barbatus.
cariciformis (*Nees*) *Macbride, l. c.* 42: Rhynchospora cariciformis.
corymbosa (*L.*) *Macbride, l. c.* 6: Scirpus corymbosus.
cymosa (*Ell.*) *Macbride, l. c.* 5: Rhynchospora cymosa.

DICHROMENA:—
cyperoides (*Sw.*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 6 (1931): Schoenus cyperoides.
distans (*Michx.*) *Macbride, l. c.* 5: Schoenus distans.
gigantea (*Link*) *Macbride, l. c.* 6: Rhynchospora gigantea.
Kuntzei (*C. B. Clarke*) *Macbride, l. c.* 42: Rhynchospora Kuntzei.
Linkii *Macbride, l. c.* 5: Rhynchospora tenuis *Link*, non Dichromena tenuis *Steud.*
Marisculus (*Lindl. & Nees*) *Macbride, l. c.*: Rhynchospora Marisculus.
nana (*Boeck.*) *Core in Brittonia*, i. 243 (1934): Scleria nana.
Pearcei (*C. B. Clarke*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 6 (1931): Pleurostachys Pearcei.
peruviana (*C. B. Clarke*) *Macbride, l. c.*: Pleurostachys peruviana.
Schoenus *Macbride, l. c.*: Scirpus cephalotes *L.*, non Dichromena cephalotes *Britton.*
setacea (*Berg.*) *Macbride, l. c.* 5: Schoenus setaceus.
triflora (*Vahl*) *Macbride, l. c.* 6: Rhynchospora triflora.

DICHROSTACHYS Wight & Arn. (Legumin.).
Commersonianus (*Baill.*) *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxx. (*Hist. Nat. Pl.* i. texte) 57 (1902): Desmanthus Commersonianus.
paucifoliolatus (*Scott Elliot*) *Drake, l. c.* 58: Desmanthus paucifoliolatus.
Pervilleanus (*Baill.*) *Drake, l. c.* 57: Desmanthus Pervilleanus.

DICHROTRICHUM Reinw. (Gesneriac.).
stenophyllum *Merrill in Sarawak Mus. Journ.* iii. 551 (1928).—Borneo.

DICLIDANTHERA Mart. (Styracac.).
octandra *Gleason in Phytologia*, i. 110 (1934).—Bras. (Amaz.).

DICLINANONA Diels (Annonac.).
calycina (*Diels*) *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* xii. 4 (1934): Xylopia calycina.

DICLIPTERA Juss. (Acanthac.).
abuensis *Blatter in Journ. & Proc. As. Soc. Beng.* 1930, n. s. xxvi. 347 (1931).—Ind. or. (Rajputana).
insignis *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 521 (1935).—Tanganyika Terr.
Lelyi *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 264, in clavi, 265 (1931).—Nigeria.
Napierae *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1932, 99.—Kenya Col.
olitoria *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1085 (1934).—Tanganyika Terr.

DICOMA Cass. (Compos.).
arenaria *Bremek. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 263 (1933).—Transvaal.
auriculata *Hutchinson & B. L. Burtt in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiii. 42 (1932).—Congo Belg.
fruticosa *Compton in Journ. Bot.* 1932, lxx. 286.—Afr. austr. (Cape Prov.).
montana *Schweickerdt in Kew Bull.* 1935, 207.—Transvaal.
prostrata *Schweickerdt, l. c.* 206.—Transvaal.

DICORYNIA Benth. (Legumin.).
macrophylla *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 731.—Bras. (Amaz.).

DICRANOLEPIS Planch. (Thymelaeac.).
adiantoides *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 639 (1921), in obs.—Cameroons.
Bussei *Gilg ex Engl. l. c.* 637, in obs.—Guinea (Togo).
glossopetala *Gilg ex Engl. l. c.* 639, in obs.—Guinea Hispan.
humillima *Gilg ex Engl. l. c.* 638, in obs.—Cameroons.
montana *Gilg & Lederm. ex Engl. l. c.* 637, in obs.—Cameroons.
myriantha *Gilg & Lederm. ex Engl. l. c.*, in obs.—Cameroons.
polyloba *Gilg ex Engl. l. c.*, in obs.—Cameroons.
speciosa *Gilg ex Engl. l. c.*, in obs.—Cameroons.
stenura *Gilg ex Engl. l. c.*, in obs.—Fernando Po.

DICRANOSTYLES Benth. (Convolvulac.).
ampla *Ducke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 590 (1932).—Bras. (Matto Grosso).
integra *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 68 (1935).—Bras. (Amaz.).
laxa *Ducke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 590 (1932).—Bras. (Amaz.).
longifolia *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 69 (1935).—Bras. (Amaz.).
sericea *Gleason in Am. Journ. Bot.* 1932, xix. 751.—Peruv.

DICTAMNUS L. (Rutac.).
davuricus *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 169 (1894), in syn.: D. albus.
major *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in syn.: D. albus.

DICTAMNUS Zinn, Cat. Pl. Gott. 316 (1757); cf. Sprague in Kew Bull. 1934, 218, nomen illegit.: **Amaracus** Gled. (Labiat.).

DICTYANTHUS Decne. (Asclepiadac.).
aeneus *R. E. Woodson in Am. Journ. Bot.* 1935, xxii. 691.—Mexico.

DICTYOPHRAGMUS O. E. Schulz in Engl. Jahrb. lxvi. 92 (1933). *CRUCIFERAE.*
Englerianus (*Muschl.*) *O. E. Schulz, l. c.*, in obs.: Streptanthus Englerianus.

DICYMANTHES Danser (Loranthac.).
apodanthes *M. L. T[ardieu] in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 695; *Danser in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 224, nomen, sphalm.: Helixanthera apodanthes.
breviflora *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 363 (1931).—Java; Celebes.
elliptica *Danser, l. c.* 364.—Ins. Sunda.
hexameres *Danser, l. c.*—Ins. Molucc.
longipes *Danser, l. c.* 365.—Ins. Sunda.
suluana *Danser in Philipp. Journ. Sc.* 1935, lviii. 97.—Ins. Philipp. (Luzon; Jolo).

DIDISCUS DC. (Umbellif.).
acerifolius (*C. Norman*) *v. Steenis in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 255 (1934): Trachymene acerifolia.
erodioides *Buwalda ex v. Steenis, l. c.*, nomen.—Celebes.
odontocoleus *Buwalda ex v. Steenis, l. c.*, nomen.—N. Guin.
scabriusculus *Buwalda ex v. Steenis, l. c.*, nomen.—N. Guin.

DIDISSANDRA C. B. Clarke (Gesneriac.).
Clemensiae *Pellegr. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 256.—Indo-China (Anam).
Evrardi *Pellegr. l. c.* 255.—Indo-China (Anam).
Forrestii *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 195 (1934).—China (Yunnan).
parviflora *Ridley in Arch. Hydrobiol.*, Suppl.-Band, xi. 327 (1932).—Sumatra.
Petelotii *Pellegr. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 255.—Indo-China (Tonkin).

DIDYMELES Thou. (Gen. dub. aff.).
integrifolia *J. St.-Hil. Expos. Fam. Nat.* ii. 388 (1805).—Madag.

DIDYMOCARPUS Wall. (Gesneriac.).
Horsfieldii *Schinz in Verz. Tausch Samer. u. Früchte Bot. Gart. Univ. Zürich*, 25 (1920); cf. *Bois in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 765, in adnot.—Hab.?
longipetiolatus *Merrill in Sarawak Mus. Journ.* iii. 549 (1928).—Borneo.
pinnatifidus *Hand.-Mazz. in Sinensia*, v. 8 (1934).—China (Kwangsi).
Poilanei *Pellegr. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 756.—Indo-China (Anam).

DIDYMOECIUM Bremek. in Bull. Jard. Bot. Buitenz. Sér. III. xiii. 426 (1935). *RUBIACEAE.*
amoenum *Bremek. l. c.* 428.—Sumatra.

DIDYMOPANAX Decne. & Planch. (Araliac.).
allocotanthus *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 292 (1931).—Boliv.
cephalanthus *Harms, l. c.* xi. 488 (1932).—Bras. (Matto Grosso).
distractiflorus *Harms, l. c.*—Bras. (Matto Grosso).
Malmei *Harms, l. c.* 489.—Bras. (Matto Grosso).
montanus *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 434.—Venez.

DIDYMOPANAX:—
nebularum *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 293 (1931).—Boliv.
reticulatus *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 435.—Venez.

DIDYMOPLEXIS Griff. (Orchidac.).
kinabaluensis *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 178 (1935).—Borneo.
nipponica *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 168.—Japon.

DIDYMOSPERMA H. Wendl. & Drude (Palmae).
Engleri (*Becc.*) *Warb. Monsunia*, i. t. 2, fig. 1 (1900): Arenga Engleri.

DIEFFENBACHIA Schott (Arac.).
illustris *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1172 (1895), in obs.—Hab.?
Leopoldi *Hort. ex Gard. Chron.* 1878, n. s. ix. 439, in obs., 441, fig. 77.—Hab.?

DIERAMA K. Koch (Iridac.).
grandiflorum *Lewis in Fl. Pl. S. Afr.* 1934, xiv. t. 542.—Afr. austr. (Cape Prov.).
longiflorum *Lewis, l. c.* t. 541.—Afr. austr. (Cape Prov.).

DIERVILLA Mill. (Caprifoliac.).
fujisanensis *Makino in Journ. Jap. Bot.* vii. 26 (1931).—Japon. (Hondo).
nikoënsis *Makino, l. c.* 25.—Japon. (Hondo).
Sakaii *Makino & Honda, l. c.* 1935, xi. 567.—Japon.

DIGITALIS L. (Scrophulariac.).
Ballii *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 137 (1932).—Marocc.
×mertonensis *Buxton & Darlington in Nature*, 1931, cxxvii. 94.—Cult.

DIGITARIA [Heist. ex] Hall. (Gramin.).
adscendens (*H. B. & K.*) *Henrard in Blumea*, i. 92 (1934), in obs.: Panicum adscendens.
albomarginata *Stent in Kew Bull.* 1934, 110.—Natal.
Benthamiana *Henrard in Blumea*, i. 99 (1934), in obs.: Panicum papposum var. leiostachyum *Benth.*
caledonica *Henrard, l. c.* 100.—N. Caled.
californica (*Benth.*) *Henrard, l. c.* 99, in obs.: Panicum californicum.
campestris *Henrard, l. c.* 97: Panicum ramosum *Arech.*
collina (*Balansa*) *Henrard, l. c.*, in obs.: Panicum collinum.
Dinteri *Henrard, l. c.*—Great Namaq.
dispar *Henrard, l. c.*: Panicum heteranthum *Nees & Meyen.*
divaricata *Henrard, l. c.* 96.—Nyasaland.
dolichophylla *Henrard, l. c.* 94.—U.S.A. (Florida).
Eggersii (*Hackel*) *Henrard, l. c.* 97: Panicum Eggersii.
eriostachya *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. 1. 216 (1931), sphalm.: D. lasiostachya.
extensa (*Hook. f.*) *Henrard in Blumea*, i. 100 (1934): Paspalum sanguinale var. extensum.
fuscescens (*J. & C. Presl*) *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 19 (1933): Paspalum fuscescens.
Gardneri *Henrard in Blumea*, i. 105 (1934).—Bras. (Piauhy).
Griffithii (*Hook. f.*) *Henrard, l. c.* 100: Paspalum sanguinale var. Griffithii.
hainanensis *Hitchcock in Sunyatsenia*, iii. 18 (1935).—China (Hainan).
Homblei *Robyns, Esp. Congol. Digit.* (*Mém. Inst. Roy. Col. Belge*, 4to, Sect. Sc. Nat. & Méd., i. Fasc. 1) 27 (1931).—Congo Belg.
jubata (*Griseb.*) *Henrard in Blumea*, i. 100 (1934): Paspalum jubatum.
katangensis *Robyns, Esp. Congol. Digit.* (*Mém. Inst. Roy. Col. Belge*, 4to, Sect. Sc. Nat. & Méd., i. Fasc. 1) 33 (1931).—Congo Belg.
lancifolia *Henrard in Blumea*, i. 102 (1934).—Tanganyika Terr.
latronum *Henrard, l. c.* 97: D. marianensis *Mez.*
Lehmanniana *Henrard, l. c.* 107.—Colomb.
livida *Henrard, l. c.* 101.—Rhodesia.
macroblephara (*Hackel*) *Paoli in Stefan. & Paoli, Miss. Somal. Ital. Merid., 1913*, Relaz., 245 (1916): Panicum macroblepharum.

DIGITARIA:—
manongarivensis *A. Camus in Blumea*, i. 110 (1934); *et in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 594.—Madag.
masambaënsis *Vanderyst*; *Vanderyst & Robyns in Robyns, Esp. Congol. Digit.* (*Mém. Inst. Roy. Col. Belge*, 4to, Sect. Sc. Nat. & Méd., i. Fasc. 1) 44 (1931), descr. ampl.—Congo Belg.
Mezii *Kanehira, Fl. Micrones.* 401 (1933): D. marianensis *Mez.*
mollicoma (*Kunth*) *Henrard in Blumea*, i. 97 (1934): Paspalum mollicomum.
Nealleyi *Henrard, l. c.* 94.—U.S.A. (Texas).
Neesiana *Henrard, l. c.* 99: Trichachne velutina *Nees.*
patens (*Swallen*) *Henrard, l. c.*, in obs.: Trichachne patens.
patula (*Hornem.*) *Henrard, l. c.* 101: Paspalum patulum.
pennata (*Hochst.*) *T. Cooke, Fl. Bombay*, ii. 941 (1908): Panicum pennatum.
Petelotii *Henrard in Blumea*, i. 109 (1934).—Cambodia.
phaeotricha (*Chiov.*) *Robyns, Esp. Congol. Digit.* (*Mém. Inst. Roy. Col. Belge*, 4to, Sect. Sc. Nat. & Méd., i. Fasc. 1) 28 (1931): D. Parlatorei var. phaeotricha.
Pittieri (*Hackel*) *Henrard in Blumea*, i. 99 (1934): Panicum Pittieri.
planiculmis *Henrard, l. c.* 112.—Madag.
polybotrya *Stapf*; *Robyns, Esp. Congol. Digit.* (*Mém. Inst. Roy. Col. Belge*, 4to, Sect. Sc. Nat. & Méd., i. Fasc. 1) 34 (1931), descr. ampl.—Congo Belg.
polyphylla *Henrard in Blumea*, i. 97 (1934): D. foliosa *Stent.*
proxima *Henrard, l. c.* 104.—Tanganyika Terr.
psammophila *Henrard, l. c.* 112.—Madag.
ramularis (*Trin.*) *Henrard, l. c.* 101: Panicum ramulare.
rhachitricha *Henrard, l. c.* 95.—Colomb.
Runyoni *Hitchcock in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1933, xxiii. 455.—U.S.A. (Texas).
sabulicola *Henrard in Blumea*, i. 108 (1934).—Bras. (Espirito Santo).
Scaettae *Robyns, Esp. Congol. Digit.* (*Mém. Inst. Roy. Col. Belge*, 4to, Sect. Sc. Nat. & Méd., i. Fasc. 1) 31 (1931).—Congo Belg.
Sellowii (*C. Muell.*) *Henrard in Blumea*, i. 99 (1934), in obs.: Trichachne Sellowii.
Stentiana *Henrard, l. c.* 97: D. glauca *Stent.*
Stolzii *Mez*; *Robyns, Esp. Congol. Digit.* (*Mém. Inst. Roy. Col. Belge*, 4to, Sect. Sc. Nat. & Méd., i. Fasc. 1) 46 (1931), descr. ampl.—Congo Belg.
subcalva *Hitchcock in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 138.—U.S.A. (Florida).
tangaënsis *Henrard in Blumea*, i. 103 (1934).—Tanganyika Terr.
tenuis (*Nees*) *Henrard, l. c.* 99, in obs.: Trichachne tenuis.
Thwaitesii (*Hackel*) *Henrard, l. c.* 101: Panicum Thwaitesii.
tomentosa (*Koenig*) *Henrard, l. c.* 100: Milium tomentosum.
tricostulata (*Hackel*) *Henrard, l. c.* 101: Panicum puberulum var. tricostulatum.
truncata *Henrard & A. Camus, l. c.* 111.—Madag.
villiculmis *Henrard, l. c.* 106.—Venez.
Zeyheri (*Nees*) *Henrard, l. c.* 105: Panicum Zeyheri.

DIGLOSSOPHYLLUM H. Wendl. ex Drude in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. ii. III. 165 (1889), in syn.: **Serenoa** Hook. f. (Palmae).

DIGNATHIA Stapf (Gramin.).
ciliata *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 114.—Somaliland.
pilosa *C. E. Hubbard in Hutchinson, Fam. Fl. Pl.* ii. Monocot., 216 (1934), sphalm.: D. ciliata.

DIHETEROPOGON Stapf (Gramin.).
kindunduensis (*Vanderyst*) *Lebrun in Bull. Agric. Congo Belge*, 1934, xxv. 409: Andropogon kindunduensis.

DILLENIA L. (Dilleniac.).
andamanica *C. E. Parkinson in Indian Forester*, 1935, lxi. 452.—Ins. Andaman; Ins. Nicobar?
hainanensis *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 64 (1934).—China (Hainan).

DILLENIA:—
ingens *B. L. Burtt in Kew Bull.* 1935, 299.—Ins. Solomon.
neo-ebudica *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 222.—N. Hebrides.
nicobarica *Kurz ex C. E. Parkinson in Indian Forester*, 1935, lxi. 449, in obs., nomen.—Ins. Nicobar.
ovata *Wall.*; *Hook. f. & Thoms. Fl. Ind.* 70 (1855), descr.—Penins. Mal.

DILLONIA Sacleux in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 1932, Sér. II. iv. 602. *HIPPOCRATEACEAE.*
abyssinica *Sacleux, l. c.* 603.—Abyss.

DILOCHIA Lindl. (Orchidac.).
gracilis (*Ames & C. Schweinf.*) *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 91 (1935): Arundina gracilis.
longilabris *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 111 (1931).—Borneo.
parviflora *J. J. Smith, l. c.* 112.—Borneo.

DILOPHIA T. Thoms. (Crucif.).
Hopkinsonii *O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 211 (1934).—Tibet.

DIMERANDRA Schlechter (Orchidac.).
emarginata (*G. F. W. Mey.*) *Hoehne in Bol. Agric., S. Paulo*, 1933, xxxiv. 618 (1934): Oncidium emarginatum.

DIMERIA R. Br. (Gramin.).
avenacea (*Retz.*) *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1932, 72: Anthoxanthum avenaceum.
bialata *C. E. C. Fischer, l. c.* 1933, 351.—Ind. or. (Kanara).
Lawsoni (*Hook. f.*) *C. E. C. Fischer in Gamble, Fl. Madras*, 1713 (1934): D. pusilla var. Lawsoni.
Mikii *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 634.—Japon.
taiwaniana *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 58.—Formosa.

DIMEROCOSTUS Kuntze (Zingiberac.).
Williamsi *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 50 (1931).—Peruv.

DIMOCARPUS Lour. (Sapindac.).
longus *Dietr. ex Steud. Nomencl. Bot.* 328 (1821), in syn.: Euphoria Longan.

DIMORPHANDRA Schott (Legumin.).
coccinea *Ducke in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 197.—Bras. (Amaz.).
congestiflora *Sprague & Sandwith in Kew Bull.* 1932, 401.—Guiana Brit.
conjugata (*Splitg.*) *Sandwith, l. c.* 406: Mora conjugata.
cuprea *Sprague & Sandwith, l. c.* 402.—Guiana Brit.
Davisii *Sprague & Sandwith, l. c.* 400.—Guiana Brit.
ferruginea *Ducke in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 197.—Bras. (Amaz.).
gigantea *Ducke, l. c.* 198.—Bras. (Amaz.).
glabrifolia *Ducke, l. c.* 196.—Bras. (Pará).
Hohenkerkii *Sprague & Sandwith in Kew Bull.* 1932, 403.—Guiana Brit.
ignea *Ducke in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 196.—Bras. (Amaz.).

DIMORPHANTHERA F. Muell. (Ericac.).
moluccana *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxx. 174 (1932).—Ins. Molucc. (Buru; Ceram).

DIMORPHOTHECA Moench (Compos.).
nervosa *Hutchinson in Kew Bull.* 1933, 426, in adnot.—Transvaal.

DINKLAGEËLLA Mansf. in Fedde, Repert. xxxvi. 63 (1934). *ORCHIDACEAE.*
liberica *Mansf. l. c.* 64.—Liberia.

DINOCANTHIUM Bremek. in Ann. Transvaal Mus. xv. 259 (1933). *RUBIACEAE.*
hystrix *Bremek. l. c.*—Transvaal.

DIOCLEA H. B. & K. (Legumin.).
ornithoryncha *Rusby in Phytologia*, i. 56 (1934).—Boliv.
pulchra *Moldenke in Phytologia*, i. 6 (1933).—Colomb.

DIODIA L. (Rubiac.).
Harperi *Small, Man. Southeast. Fl.* 1264 (1933).—U.S.A. (Georgia).
ocimifolia (*Willd.*) *Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 305, in obs.: Spermacoce ocimifolia.
subulata (*DC.*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 386 (1931): Borreria subulata.

DIOGENESIA Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xii. 121 (1934). *ERICACEAE.*
octandra *Sleum. l. c.*—Peruv.

DIOMMA Engl. ex Ule in Engl. Jahrb. lii. Beibl. 115, 49 (1914), in obs., sine descr.; Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xi. 282 (1931), descr. *SIMAROUBACEAE.*
Ulei *Engl. ex Ule, l. c.*, in obs., nomen; *Harms, l. c.*, descr.—Venez.; Bras.

DIONYCHA Naud. (Melastomatac.).
boinensis *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. xii. 20 (1932).—Madag.

DIOÖN Lindl. (Cycadac.).
Dohenyii *E. A. Howard in Travel*, lxi. 33 (1933), nomen; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 141.—Guatem.

DIOSCOREA L. (Dioscoreac.).
ainensis *Knuth in Fedde, Repert.* xxix. 93 (1931).—Peruv.
angolensis *Knuth, l. c.* xxxviii. 119 (1935).—Angola.
apurimacensis *Knuth, l. c.* xxix. 94 (1931).—Peruv.
balsapuertensis *Knuth, l. c.* xxxviii. 117 (1935).—Peruv.
Bonii *Prain & Burkill in Kew Bull.* 1933, 244.—Indo-China (Tonkin).
Bonnetii *A. Cheval. in Bull. Écon. Indo-Chine*, 1918, n. s. xx. 328.—Indo-China (Tonkin).
calcensis *Knuth in Fedde, Repert.* xxx. 159 (1932).—Peruv.
chaponensis *Knuth, l. c.* xxxviii. 117 (1935).—Colomb.
Chingii *Prain & Burkill in Kew Bull.* 1931, 425.—China (Kwangsi).
codonopsidifolia *Kamikoti in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 115.—Formosa.
coripatensis *Macbride in Candollea*, vi. 2 (1934): D. glauca *Rusby.*
Craibiana *Prain & Burkill in Kew Bull.* 1931, 425.—Siam.
depauperata *Prain & Burkill, l. c.* 1933, 245.—Siam; Indo-China (Laos).
dissimulans *Prain & Burkill, l. c.* 241.—Indo-China (Anam).
Dusenii *Uline ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* ii. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 362 (1908), in obs.—Cameroons.
Esquirolii *Prain & Burkill in Kew Bull.* 1931, 426.—China (Kweichau).
filicaulis *Prain & Burkill, l. c.* 1933, 242.—Siam.
Gossweileri *Knuth in Fedde, Repert.* xxxviii. 120 (1935).—Angola.
helmiicarpa *Knuth, l. c.* xxxvi. 125 (1934).—Peruv.?
heptaphylla *Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1931, xxi. 147.—Formosa.
Hitchcockii *Knuth in Fedde, Repert.* xxxviii. 118 (1935).—Guiana Brit.
hondurensis *Knuth, l. c.* 120.—Brit. Honduras.
huallagensis *Knuth, l. c.* xxix. 95 (1931).—Peruv.
intempestiva *Prain & Burkill in Kew Bull.* 1933, 243.—Indo-China (Anam).
iquitosensis *Knuth in Fedde, Repert.* xxix. 94 (1931).—Peruv.
irupanensis *Knuth, l. c.* xxx. 160 (1932).—Boliv.
Kjellbergii *Knuth, l. c.* xxxvi. 128 (1934).—Celebes.
Klugii *Knuth, l. c.* xxx. 158 (1932).—Peruv.
kweichowensis *Knuth, l. c.* xxxvi. 125 (1934).—China (Kweichau).
lamprocaula *Prain & Burkill in Kew Bull.* 1933, 245.—Sumatra; Penins. Mal.
Lawrancei *Knuth in Fedde, Repert.* xxxviii. 118 (1935).—Colomb.
lindiensis *Knuth in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 703 (1935).—Tanganyika Terr.
longicuspis *Knuth, l. c.* xi. 1059 (1934).—Tanganyika Terr.
longirachis *Knuth in Fedde, Repert.* xxx. 159 (1932).—Peruv.

DIOSCOREA:—
macroura *Hort. ex Bull. Ort. Bot. Napoli*, x. p. VII. (1930), nomen.—Hort.
maliliensis *Knuth in Fedde, Repert.* xxxvi. 127 (1934).—Celebes.
Mildbraediana *Knuth in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1059 (1934).—Tanganyika Terr.
monadelphoides *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 12 (1931): Helmia monadelpha *Kunth*, non Dioscorea monadelpha *Griseb.*
mosqueirensis *Knuth in Fedde, Repert.* xxix. 92 (1931).—Bras. (Pará).
nicolasensis *Knuth, l. c.* 94.—Peruv.
palopoënsis *Knuth, l. c.* xxxvi. 128 (1934).—Celebes.
perenensis *Knuth, l. c.* xxix. 92 (1931).—Peruv.
Petelotii *Prain & Burkill in Kew Bull.* 1933, 240.—Indo-China (Tonkin).
pinedensis *Knuth in Fedde, Repert*, xxix. 95 (1931); *et l. c.* xxxvi. 126 (1934), descr. ampl.—Peruv.
Poilanei *Prain & Burkill in Kew Bull.* 1933, 240.—Indo-China (Anam).
Potanini *Prain & Burkill, l. c.* 243.—China (Szechuan; Yunnan; Honan; Hupeh).
psammophila *Knuth in Fedde, Repert.* xxxviii. 120 (1935).—Bras. (Bahia).
putumayensis *Knuth, l. c.* xxx. 160 (1932).—Colomb.
quispicanchensis *Knuth, l. c.* xxix. 93 (1931).—Peruv.
ramonensis *Knuth, l. c.* 95.—Peruv.
sandakanensis *Knuth, l. c.* xxxvi. 127 (1934).—Borneo.
Schliebenii *Knuth in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 659 (1932).—Tanganyika Terr.
simulans *Prain & Burkill in Kew Bull.* 1931, 427.—China (Kwangsi).
Skottsbergii *Knuth in Fedde, Repert.* xxxvi. 125 (1934).—Chile.
subnigra *Knuth, l. c.* 126.—Santo Domingo.
sumatrana *Prain & Burkill in Kew Bull.* 1931, 90.—Sumatra.
sumbawensis *Knuth in Fedde, Repert.* xxxviii. 119 (1935).—Ins. Sunda (Sumbawa).
tequendamensis *Knuth, l. c.* xxx. 159 (1932).—Colomb.
Trollii *Knuth, l. c.* 161.—Boliv.
ulugurensis *Knuth in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1060 (1934).—Tanganyika Terr.

DIOSCOREOPHYLLUM Engl. (Menispermac.).
Gossweileri *Exell in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. Suppl., 10.—Congo Lusit.

DIOSMA L. (Rutac.).
filiformis *Hort. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 552 (1833).—Ital.?
plumosa *Colla, l. c.*, in obs.—Ital.?
wittebergensis *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 297 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).

DIOSPYROS L. (Ebenac.).
adenophora *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 164 (1933).—Penins. Mal.
aequoris *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 80 (1935): Maba latifolia.
albiflora *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 180 (1931).—Zeylan.; Java; Burma.
amboinensis *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 164 (1933).—Ins. Molucc. (Amboina).
atrata (*Thwait.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 180 (1931): D. Embryopteris var. atrata.
Baloen-Idjoek *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 165 (1933).—Sumatra.
bangkana *Bakh. l. c.*—Ins. Sunda (Banca).
bantamensis *Koord. & Valeton ex Bakh. l. c.*—Java.
bibracteata *Bakh. l. c.*—Penins. Mal.
campanulata *Bakh. l. c.* 166.—Borneo.
caribaea (*A. DC.*) *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 80 (1935): Macreightia caribaea.
carpinifolia (*Ridley*) *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 162 (1933): Maba carpinifolia.
Caucheana *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1934, xiv. 957.—Madag.
celebica *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 166 (1933).—Celebes.

DIOSPYROS:—
Chunii *Metcalf & Chen in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 618 (1935).—China (Hainan).
clavipes *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 166 (1933).—Borneo.
Clementium *Bakh. l. c.* 167.—Borneo.
confertiflora (*Hiern*) *Bakh. l. c.* 162: Maba confertiflora.
conformis *Bakh. l. c.* 167.—Penins. Mal.
confusa *Bakh. l. c.*—Penins. Mal.
Consolatae *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 77 (1935).—Kenya Col.
cordata (*Hiern*) *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 167 (1933): Maba cordata.
Cornii *Chiov. Fl. Somala*, II. 276 (1932).—Somal. Ital.
crassinervis (*Krug & Urb.*) *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 80 (1935): Maba caribaea var. crassinervis.
crassipes *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 167 (1933).—Borneo.
cubica *Bakh. l. c.* 168.—Borneo.
curraniopsis *Bakh. l. c.*—Borneo.
dajakensis *Bakh. l. c.*—Borneo.
demona *Bakh. l. c.* 169.—Penins. Mal.
densa *Bakh. l. c.*—Borneo.
dichroa *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 482.—Guiana Brit.
diversilimba *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 300 (1935).—China (Hainan).
durionoides *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 169 (1933).—Borneo.
elegantissima *Bakh. l. c.*: Maba elegans.
ellipticifolia (*Stokes*) *Bakh. l. c.* 162: Ferreola ellipticifolia.
Enderti *Bakh. l. c.* 169.—Borneo.
eucalyptifolia *Bakh. l. c.* 170.—Borneo.
evena *Bakh. l. c.* 163.—Borneo.
Evila *Pierre ex A. Cheval.*; *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 270 (1917), descr.—Gabon.
ferox *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 170 (1933).—Borneo.
ferrea (*Willd.*) *Bakh. l. c.* 162: Ehretia ferrea.
foochowensis *Metcalf & Chen in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 617 (1935).—China (Fokien).
Forbesii *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 170 (1933).—Borneo.
Forrestii *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 196 (1934).—China (Yunnan).
Foxworthyi *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 171 (1933).—Penins. Mal.
Gambleana *Bakh. l. c.*—Penins. Mal.
glaucifolia *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* xi. 22 (1932).—China (Chekiang).
glaucophylla *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 171 (1933).—Sumatra.
Greshoffiana *Koord. ex Bakh. l. c.* 172.—Celebes.
Grisebachii (*Hiern*) *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 80 (1935): Maba Grisebachii.
Hallierii *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 172 (1933).—Borneo.
Havilandi *Bakh. l. c.*—Borneo.
Hayatai *Odashima in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1935, vii. 82: D. Oldhami var. chartacea *Hayata.*
hermaphroditica (*Zoll.*) *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 162 (1933): Maba hermaphroditica.
Hierniana (*King & Gamble*) *Bakh. l. c.* 173: Maba Hierniana.
Holttumii *Bakh. l. c.* 162.—Penins. Mal.
Howii *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 299 (1935).—China (Hainan).
insculpta *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 3, in clavi, 4 (1931).—Nigeria.
insidiosa *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 173 (1933).—Penins. Mal.
insularis *Bakh. l. c.*—N. Guin.
intricata (*A. Gray*) *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 80 (1935): Macreightia intricata.
Jaherii *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 173 (1933).—Borneo.
Janowskyi *Bakh. l. c.* 163.—N. Guin.
javanica *Bakh. l. c.* 174.—Java.
Kingii *Bakh. l. c.*—Penins. Mal.
koeboeënsis *Bakh. l. c.* 175.—Sumatra.

DIOSPYROS:—
Krukovii *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 390.—Bras. (Matto Grosso).
Leonis (*Britton & P. Wilson*) *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 80 (1935): Maba Leonis.
levigata *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 175 (1933).—Borneo.
liberiensis *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 3, in clavi, 4 (1931).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
lissocarpoides *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 483.—Guiana Brit.
Lolin *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 175 (1933).—Ins. Molucc.
longicaudata *Gürke*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 2, in clavi, 4 (1931).—Nigeria; Cameroons.
macassar *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1934, xiv. 950: D. utilis *Koord. & Valeton.*
Maingayi (*Hiern*) *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 164 (1933): Maba Maingayi.
malaccensis *Bakh. l. c.* 176.—Penins. Mal.
Malam *Bakh. l. c.*—Borneo.
malayana *Bakh. l. c.* 163: Maba punctata.
marmorata *R. N. Parker in Indian Forester*, 1931, lvii. 210.—Ins. Andaman.
Melinoni (*Hiern*) *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 390: Maba Melinoni.
micromera *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 176 (1933).—Penins. Mal.
minahasae *Bakh. l. c.* 177.—Celebes.
minutiflora *Bakh. l. c.*—Sumatra.
muricata *Bakh. l. c.*—Borneo.
myristicoides (*Hiern*) *Macbride in Candollea*, vi. 18 (1934): Maba myristicoides.
myrmecocalyx (*Hiern*) *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 178 (1933): Maba myrmecocalyx.
nana *Bakh. l. c.*—Penins. Mal.
nemorosa *Bakh. l. c.*—Borneo.
neurosepala *Bakh. l. c.*—Borneo
nicaraguensis (*Standley*) *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 80 (1935): Maba nicaraguensis.
novoguineënsis *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 179 (1933).—N. Guin.
oleifera *Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., x. 80 (1935).—China (Anhwei; Kiangsi; Chekiang).
pahangensis *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 179 (1933).—Penins. Mal.
palembanica *Bakh. l. c.* 180.—Sumatra.
papuana *Valeton*; *Bakh. l. c.*, descr.—Ins. Molucc.; N. Guin.
Paraoesi *Bakh. l. c.*—Borneo.
Pavonii (*DC.*) *Macbride in Candollea*, vi. 18 (1934): Macreightia Pavonii.
perakensis *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 181 (1933).—Penins. Mal.
perfida *Bakh. l. c.*—Borneo.
poiënsis *Bakh. l. c.*—Borneo.
portus *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 80 (1935): Maba Rekoi.
pseudo-malabarica *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 182 (1933).—Penins. Mal.
pubicalyx *Bakh. l. c.*—Siam.
pulchra *Bakh. l. c.* 183.—N. Guin.
puncticulosa *Bakh. l. c.* 164: Maba Beccari.
retrofracta *Bakh. l. c.* 183.—Siam; Penins. Mal.
Ridleyi *Bakh. l. c.*—Penins. Mal.
rostrata (*Merrill*) *Bakh. l. c.* 163: Maba rostrata.
Rumphii *Bakh. l. c.* 184: D. utilis *Koord. & Valeton.*
sarawakana *Bakh. l. c.*—Borneo.
Schippii *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 80 (1935).—Brit. Honduras.
selangorensis *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 184 (1933).—Penins. Mal.
setosa *Bakh. l. c.*—Borneo.
Siamang *Bakh. l. c.*—Sumatra.
simaloerensis *Bakh. l. c.* 185.—Ins. Simaloer.
singaporensis *Bakh. l. c.*—Penins. Mal.
Sintenisii (*Krug & Urb.*) *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 80 (1935): Maba Sintenisii.
sogeriensis *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 185 (1933).—N. Guin.
soporifera *Bakh. l. c.* 186.—Borneo.

DIOSPYROS:—
sundaica *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 186 (1933): D. pseudo-Ebenum *Koord. & Valeton*.
sunyiensis *Chun & Chen in Sunyatsenia*, iii. 21 (1935).—China (Kwangtung).
tahanensis *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 163 (1933).—Penins. Mal.
taitoënsis *Odashima in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1935, vii. 83.—Formosa.
Thomasii *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 4, in clavi, 6 (1931).—Sierra Leone; Liberia.
transitoria *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 186 (1933).—Siam; Penins. Mal.
trichophylla *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 181 (1931): D. pruriens *Trimen, l. c.* iii. 95 (1895), non *Dalz.*
Tsangii *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 43 (1934).—China (Kwangtung).
tuberculata *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 187 (1933).—Borneo.
Vaughaniae *Dunkley in Kew Bull.* 1935, 262.—Afr. trop. or.
venenosa *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 187 (1933).—Celebes.
verae-crucis (*Standley*) *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 80 (1935): Maba veraecrucis.
vestita *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 187 (1933).—Penins. Mal.
Wilsoni *Hort. ex Bull. Soc. Dendr. France*, 1933, 82, nomen.—China.
Yatesiana *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 81 (1935).—Mexico.
Yeobi *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 188 (1933).—Penins. Mal.

DIPCADI Medik. (Liliac.).
brevifolium (*Thunb.*) *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 78 (1932): Hyacinthus brevifolius.
Cowani (*Ridley*) *H. Perrier in Lecomte, Not. Syst.* v. 63 (1935): Drimia Cowani.
saxorum *Blatter in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxii. 736 (1928).—Ind. or. (Bombay).
Ursulae *Blatter, l. c.* 735.—Ind. or. (Bombay).

DIPHASIA Pierre (Rutac.).
Mildbraedii *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 304 (1931).—Cameroons.

DIPHOLIS A. DC. (Sapotac.).
durifolia *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 78 (1935).—Brit. Honduras.
ferruginea *Ekman & O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxxii. 94 (1933).—Santo Domingo.

DIPLACHNE Beauv. (Gramin.).
bulgarica (*Bornm.*) *Roshev. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 310, 751 (1934): D. serotina subsp. bulgarica.
malabarica (*L.*) *Merrill in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 635: Poa malabarica.
malayana *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 106.—Siam; Penins. Mal.; Borneo.
Pringlei *Vasey ex Beal, Grasses N. Amer.* ii. 436 (1896), in syn.: Leptochloa Pringlei.
songarica *Roshev. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 311, 752 (1934).—Ross. asiat. (Kasakstan).

DIPLACORCHIS Schlechter (Orchidac.).
ashantensis *Summerhayes in Kew Bull.* 1931, 378.—Gold Coast.

DIPLACUS Nutt. (Scrophulariac.).
aurantiacus *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 762 (1895), in syn.: Mimulus glutinosus.

DIPLADENIA A. DC. (Apocynac.).
achrestogyne *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1931, xviii. 543.—Colomb.
bella *Pittier in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 141.—Venez.
oblongifolia *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1931, xviii. 544.—Boliv.
upatae *R. E. Woodson, l. c.* 545.—Venez.

DIPLANTHERA Banks & Soland. (Bignoniac.).
montana *Vieill. ex Beauvisage in Ann. Soc. Bot. Lyon*, xxvi. 91 (1901), in obs., nomen.—N. Caled.
sessilifolia *Vieill. ex Pancher apud Beauvisage, l. c.*, in obs., nomen.—N. Caled.

DIPLANTHERA Rafin. Herb. Rafinesq. 73 (1833), in obs., in syn.: **Platanthera** L. C. Rich. (Orchidac.).

DIPLANTHERA Thou. (Potamogetonac.; Naiadac., Gen. Pl.).
pinifolia *Miki in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 787.—Ins. Liukiu; Formosa.
Wrightii (*Aschers.*) *Aschers. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.*, Nachtr., 37 (1897): Halodule Wrightii.

DIPLOCAULOBIUM Kraenzl. (Orchidac.).
arachnoideum (*Schlechter*) *Carr in Kew Bull.* 1934, 381, in obs.: Dendrobium arachnoideum.
araneola (*Schlechter*) *Carr, l. c.*, in obs.: Dendrobium araneola.
fariniferum (*Schlechter*) *Carr, l. c.*, in obs.: Dendrobium fariniferum.
malayanum *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 6 (1932).—Penins. Mal.
solomonense *Carr in Kew Bull.* 1934, 380.—Ins. Solomon.

DIPLODISCUS Turcz. (Tiliac.).
longifolius (*Merrill*) *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 161 (1934): Brownlowia longifolia.

DIPLOLABELLUM Maekawa in Journ. Jap. Bot. 1935, xi. 305. *ORCHIDACEAE.*
coreanum (*Finet*) *Maekawa, l. c.* 306: Oreorchis coreana.

DIPLOMORPHA Meissn. (Thymelaeac.).
Kudoi (*Makino*) *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1933, xxiii. 205: Wikstroemia Kudoi.
yakushimensis (*Makino*) *Masamune, l. c.*: Wikstroemia pauciflora var. yakushimensis.

DIPLOPANAX Hand.-Mazz. in Sinensia, iii. 197 (1933). *ARALIACEAE.*
stachyanthus *Hand.-Mazz. l. c.* 198.—China (Kwangsi).

DIPLOPTERA C. A. Gardner in Journ. Roy. Soc. W. Austral. 1932–3, xix. 79 (1934). *PROTEACEAE.*
stenocarpoides (*Benth.*) *C. A. Gardner, l. c.* 80: Hakea stenocarpoides.

DIPLOPTERYS A. Juss. (Malpighiac.).
microcarpa *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 183.—Guiana Brit.

DIPLOSPORA DC. (Rubiac.).
Schmidtii (*K. Schum.*) *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 128 (1932): Coffea Schmidtii.

DIPLOSTEPHIUM H. B. & K. (Compos.).
Mutisii *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 27, Cuadro 22 (1934), nomen; *et l. c.* No. 29, p. 25 (1935), descr.—Colomb.
tolimense *Cuatrec. l. c.* nomen; *et l. c.* p. 26, descr.—Colomb.

DIPLOSTYLIS (sphalm. Dyplostylis) Karst. & Triana in Triana, Nuev. Jen. i Esp. Fl. Neo-Granad. 25 (1854); Karst. in Linnaea, xxviii. 433 (1857); Sprague in Kew Bull. 1934, 396. *BORAGINACEAE.*
fasciculata *Karst. & Triana, l. c.* 26; *Karst. l. c.*; *Sprague, l. c.*—Colomb.

DIPLOTAXIS DC. (Crucif.).
Siettiana *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1933, xxiv. 29, in obs., 198.—Mediterr. (Ins. Alboran).
vinealis *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 9 [1933]: D. viminea.

DIPLOTHEMIUM Mart. (Palmae).
Henryanum *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 84, 128 (1931), in obs.—Ins. Marquesas.

DIPLOTROPIS Benth. (Legumin.).
guianensis *Record in Record & Mell, Timbers Trop. Amer.* 272 (1924), in obs.—Guiana Bat.
triloba *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 355.—Bras. (Matto Grosso).

DIPLYCOSIA Blume (Ericac.).
apiculifera *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxxv. 296 (1934).—Sumatra.

DIPLYCOSIA:—
Bartlettii *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 182 (1934).—Sumatra.
Endertii *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 458 (1935).—Borneo.
kemulensis *J. J. Smith, l. c.* 459.—Borneo.
kerintjiensis *J. J. Smith, l. c.* 456.—Sumatra.
Kingii *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 182 (1934): Vaccinium microphyllum *King in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiv. ii. 62 (1906), non *Blume.*
luzonica (*A. Gray*) *Merrill; H. F. Copeland in Philipp. Journ. Sc.* 1932, xlvii. 71, descr. emend.—Ins. Philipp. (Luzon).
patenticalyx *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxxv. 295 (1934).—Sumatra.
pittosporifolia *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 460 (1935).—Borneo.
rubidiflora *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxx. 172 (1932).—Celebes.
saurauioides *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 456 (1935).—Borneo.
sumatrensis *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 181 (1934).—Sumatra.
undata *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxx. 171 (1932).—Celebes.

DIPODIUM R. Br. (Orchidac.).
Fevrellii *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxv. 497 (1933).—Celebes.

DIPOMA Franch. (Crucif.).
tibeticum *O. E. Schulz in Fedde, Repert.* xxxviii. 32 (1935).—S. E. Tibet.

DIPSACUS L. (Dipsacac.).
inermis *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 367 (1820).—Reg. Himal.

DIPTERANTHUS Barb. Rodr. (Orchidac.).
ovatipetalus *Brade in Arch. Mus. Nac. Rio de Janeiro*, 1932, xxxiv. 118.—Bras. (Rio de Janeiro).

DIPTEROCARPUS Gaertn. f. (Dipterocarpac.).
apterus *Foxworthy in Malayan Forest Records*, No. 10, 77 (1932).—Penins. Mal.
concavus *Foxworthy, l. c.* 90.—Penins. Mal.
Mannii *King ex U. N. & P. C. Kanj. & Das, Fl. Assam*, i. No. 1, 133 (1934).—Ind. or. (Assam).
penangianus *Foxworthy in Malayan Forest Records*, No. 10, 72 (1932).—Penins. Mal.
pseudo-fagineus *Foxworthy, l. c.* 82.—Penins. Mal.
rotundifolius *Foxworthy, l. c.* 73.—Penins. Mal.
sublamellatus *Foxworthy, l. c.* 92.—Penins. Mal.

DIPTERYX Schreb. (Legumin.).
panamensis (*Pittier*) *Record & Mell, Timbers Trop. Amer.* 303 (1924), in obs.: Coumarouna panamensis.

DIRCAEA Decne. (Gesneriac.).
purpurea *Planch. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb & Voss*, i. 788 (1895), in syn.: Corytholoma purpureum.

DISA Berg. (Orchidac.).
Newdigatae *L. Bolus in Fl. Pl. S. Afr.* 1931, xi. sub t. 415.—Afr. austr. (Cape Prov.).

DISCARIA Hook. Bot. Misc. i. 156 (1829). *RHAMNACEAE.*
americana *Gill. & Hook. in Hook. l. c.*—Argent.
australis *Hook. l. c.* 157, in adnot.: Colletia pubescens.

DISCHIDIA R. Br. (Asclepiadac.).
bisetulosa *Schwartz in Mitt. Inst. Bot. Hamburg*, vii. 259 (1931).—Borneo.
meleagridiflora *Schwartz, l. c.* 260.—Borneo.
minor (*Vahl*) *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 67 (1934): Collyris minor.
Vidallii *Hort. ex Cactus Journ.* ii. 52, in obs., 79 (1934).—Hab. ?

DISCIPHANIA Eichl. (Menispermac.).
coriacea *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 55 (1935).—Brit. Honduras.
Killipii *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 782 (1933).—Peruv.
remota *Diels, l. c.*—Peruv.

DISCOCOFFEA A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 1931, Sér. II. iii. 187. *RUBIACEAE.*
lasiodelphys (*K. Schum. & K. Krause*) *A. Cheval. l. c.* 188: Coffea lasiodelphys.

DISCOPODIUM Hochst. (Solanac.).
eremanthum *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 89 (1935).—Kenya Col.

DISEPALUM Hook. f. (Annonac.).
platypetalum *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 58 (1934).—Sumatra.

DISPARAGO Gaertn. (Compos.).
Kolbei (*Bolus*) *Hutchinson in Kew Bull.* 1932, 511, in obs.: Amphiglossa Kolbei.
rosea *Hutchinson, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).

DISPERIS Sw. (Orchidac.).
cardiopetala *Summerhayes in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3270 (1935): D. cordata *Summerhayes.*
cordata *Summerhayes in Kew Bull.* 1933, 252.—S. Nigeria.
dicerochila *Summerhayes in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3272 (1935).—Uganda; Kenya Col.
katangensis *Summerhayes in Kew Bull.* 1931, 384.—Congo Belg.
Mildbraedii *Schlechter*; *Summerhayes, l. c.* 1933, 253, descr.—Fernando Po.

DISPERMA C. B. Clarke (Acanthac.).
crenatum (*Lindau*) *Milne-Redhead in Kew Bull.* 1933, 477: Hygrophila crenata.
eremophilum *Milne-Redhead, l. c.* 1935, 282.—Kenya Col.
nudantherum (*C. B. Clarke*) *Milne-Redhead, l. c.* 1934, 304: Dyschoriste nudanthera.
trachyphyllum *Bullock in Kew Bull.* 1933, 476.—Tanganyika Terr.

DISPHYMA N. E. Brown (Ficoidac.).
australe (*Soland.*) *J. M. Black in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1932, lvi. 40: Mesembryanthemum australe.
Dunsdonii *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 247 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).

DISPORUM Salisb. (Liliac.).
flavens *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 92.—Manchur.; Corea.
hallaisanense (*Léveillé*) *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 142: Tovaria hallaisanensis.
oreganum (*S. Wats.*) *Howell, Fl. N.W. Amer.* i. 659 (1902): Prosartes oregana.
ovale *Ohwi in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 385.—Corea.
Schaffneri *Moldenke in Phytologia*, i. 167 (1935).—U.S.A. (Ohio).
trabeculatum *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 286.—Yunnan; Kweichau; Tonkin; Anam.
viridescens (*Maxim.*) *B. Fedtsch. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 454 (1935): Uvularia viridescens.

DISSANTHELIUM Trin. (Gramin.).
Trollii *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 778 (1933).—Boliv.

DISSOCHAETA Blume (Melastomatac.).
Johannis-Winkleri *Schwartz in Mitt. Inst. Bot. Hamburg*, vii. 251 (1931).—Borneo.
setosa *Schwartz, l. c.* 250.—Borneo.

DISSOTIS Benth. (Melastomatac.).
aprica *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 749 (1921), in obs.—Tanganyika Terr.
bambutorum *Gilg & Lederm. ex Engl. l. c.* 750, in obs.—Cameroons.
Bussei *Gilg ex Engl. l. c.* 749, in obs.—Tanganyika Terr.
caloneura *Gilg ex Engl. l. c.*, in obs.—Congo Belg.
Chevalieri *Gilg ex Engl. l. c.* 750, in obs.—Congo Gall.
Conraui *Gilg ex Engl. l. c.* 752, in obs.—Cameroons.
controversa (*A. Cheval. & Jacques-Félix*) *Jacques-Félix in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1935, Sér. II. vii. 372: Tristemma controversum.
dasytricha (sphalm. dasystricha) *Gilg & Lederm. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 749 (1921), in obs.—Cameroons.
dasytricha *Gilg ex Engl. l. c.* 751, in obs., non praec.—Cameroons.

DISSOTIS:—
Deistelii *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 748 (1921), in obs.—Cameroons.
Gilgiana *Hutchinson & Dalziel*; *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 682, descr. ampl.—Guinea super.
grandiceps *Kraenzl. in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 149.—Tanganyika Terr.
Hildebrandtii *Kraenzl. l. c.* 151.—Madag.
humilis *A. Cheval. & Jacques-Félix in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 684.—Guinea Gall.
Jacquesii *A. Cheval. l. c.* 686.—Guinea Gall.
Kassneriana *Kraenzl. in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 151.—Kenya Col.
Kerstingii *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 752 (1921), in obs.—Guinea (Togo).
longisetosa *Gilg & Lederm. ex Engl. l. c.*, in obs.—Cameroons.
mirabilis *Bullock in Kew Bull.* 1931, 99.—Uganda.
Muenzneri *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 751 (1921), in obs.—Nyasaland; Tanganyika Terr.
pachytricha *Gilg ex Engl. l. c.* 750, in obs.—Congo Belg.; N. Rhodesia.
paludosa *Gilg ex Engl. l. c.* 748, in obs.—Congo Belg.
pygmaea *A. Cheval. & Jacques-Félix in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 685.—Guinea Gall.
riparia *Gilg & Lederm. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 749 (1921), in obs.—Cameroons.
ruandensis *Engl. l. c.* 750, in obs.—Congo Belg.; Tanganyika Terr.
rupicola *Gilg ex Engl. l. c.* 748, in obs.—Liberia.
Schliebenii *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 716 (1935).—Tanganyika Terr.
splendens *A. Cheval. & Jacques-Félix in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. ii. iv. 686.—Guinea Gall.
tanganjikae *Kraenzl. in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 150.—Tanganyika Terr.
Vorwerkiana *Gilg & Lederm. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 752 (1921), in obs.—Cameroons.
Wildemanniana *Gilg ex Engl. l. c.* 749, in obs.—Congo Belg.

DISTERIGMA Niedenzu (Ericac.).
pallidum *A. C. Smith in Brittonia*, i. 222 (1933).—Boliv.

DISTIACANTHUS Linden (Bromeliac.).
basilateralis *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 964 (1895), in syn.: Ananas macrodontes.

DISTICTELLA Kuntze (Bignoniac.).
campinae *A. Sampaio in Ann. Acad. Bras. Sc.* 1935, vii. 120.—Bras. (Pará).
Parkeri (*DC.*) *Sprague & Sandwith in Kew Bull.* 1932, 90: Bignonia Parkeri.

DISTYLIUM Sieb. & Zucc. (Hamamelidac.).
Chungii (*Metcalf*) *Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., viii. 140 (1932): Sycopsis Chungii.
guatemalense *Radlk. apud Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 716 (1933).—Guatem.
Tsiangii *Chun ex Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot Ser., viii. 142 (1932), in obs., pro syn.: D. Chungii.

DITASSA R. Br. (Asclepiadac.).
duidae *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 459.—Venez.
Schlechteri *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 34 (1931): D. montana *Schlechter.*
Tatei *Gleason & Moldenke in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 456.—Venez.

DITEILIS Rafin. Herb. Rafinesq. 73 (1833). *ORCHIDACEAE.*
nepalensis *Rafin. l. c.* 74: Liparis bituberculata.

DIZYGOTHECA N. E. Brown (Araliac.).
ouveana *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1933, lxxviii. Beibl. 19, 327.—Ins. Loyauté.

DOCYNIA Decne. (Rosac.).
rufifolia (*Léveillé*) *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 310: Pyrus rufifolia.

DOCYNIOPSIS (C. K. Schneider) Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot. 1934, iii. 162. *ROSACEAE.*
[MALUS sect. DOCYNIOPSIS C. K. Schneider.]
formosana (*Koidz.*) *Koidz. l. c.* 196: Macromeles formosana.
laoënsis (*A. Cheval.*) *Koidz. l. c.*: Malus laoënsis.
Prattii (*C. K. Schneider*) *Koidz. l. c.*: Malus Prattii.
Tschonoskii (*Maxim.*) *Koidz. l. c.* 162: Pyrus Tschonoskii.
yunnanensis (*C. K. Schneider*) *Koidz. l. c.* 196: Malus yunnanensis.

DODECASTIGMA Ducke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xi. 343 (1932). *EUPHORBIACEAE.*
amazonicum *Ducke, l. c.*—Bras. (Amaz.).

DODECATHEON L. (Primulac.).
amethystinum (*Fassett*) *Fassett in Rhodora*, 1931, xxxiii. 224: D. Meadia var. amethystinum.
Frenchii (*Vasey*) *Rydb. Fl. Prairies & Plains Centr. N. Amer.* 626 (1932): D. Meadia var. Frenchii.
speciosum *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 641 (1895), in syn.: D. frigidum.
viscidum *Piper in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1901, xxviii. 43.—U.S.A. (Washington).

DODONAEA Mill. (Sapindac.).
arizonica *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 576.—U.S.A. (Arizona).
lagunensis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 57 (1933–5).—Calif. infer.

DOLIA Lindl. (Nolanac.; Convolvulac., Gen. Pl.).
macrocalyx *R. Phil. in Verh. Deutsch. Wiss. Ver. Santiago* (*Chile*), ii. 108 (1890), nomen; *et in An. Univ. Chile*, xci. 45 (1895), descr.—Chile.

DOLICHOLOBIUM A. Gray (Rubiac.).
aneityense *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 2.—N. Hebrides.
hirsutum *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3247 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).

DOLICHOPTERYS Kosterm. in Rec. Trav. Bot. Néerl. 1935, xxxii. 279. *MALPIGHIACEAE.*
surinamensis *Kosterm. l. c.*—Guiana Bat.

DOLICHOS L. (Legumin.).
appendiculatus *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII 585 (1933).—China (Yunnan).
carnosus *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 410 (1928), in syn.: D. Lelyi.
ficifolius (*Benth. ex Harv.*) *Harms in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 681 (1915), in obs.: Rhynchosia ficifolia.
Galpinii *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxi. 423 (1932).—Transvaal.
hastifolius *Stokes, Bot. Mat. Med.* iv. 27 (1812): D. hastatus.
kosyunensis *Hosokawa in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 312.—Formosa.
occidentalis (*Harms*) *Harms in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 677 (1915), in obs.: D. biflorus var. occidentalis.
rhombifolius (*Hayata*) *Hosokawa in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 488: Dolichovigna rhombifolia.
Schlechteri *Harms ex Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. 423 (1932), nomen.—Transvaal.
zanzibarensis *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 342.—Zanzibar.

DOLICHOTHELE Britton & Rose (Cactac.).
melaleuca (*Karw. ex Salm-Dyck*) *Bödeker, Mammill.-Vergl.-Schluss.* 19 (1933): Mammillaria melaleuca.

DOLICHOVIGNA Hayata (Legumin.).
pilosa *Hosokawa in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 488, in syn.: Dolichos pilosus *Klein.*

DOLIOCARPUS Roland. (Dilleniac.).
amazonicus *Sleum. in Fedde, Repert.* xxxix. 44 (1935).—Peruv.
aptus *Macbride in Candollea*, vi. 13 (1934).—Peruv.
curtipes *Macbride, l. c.*—Peruv.

DOLIOCARPUS:—
densiflorus *Sprague & R. O. Williams ex Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 388.—Venez.; Peruv.
magnificus *Sleum. in Fedde, Repert.* xxxix. 45 (1935).—Peruv.; Boliv.
olivaceus *Sprague & R. O. Williams ex Standley in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxvii. 265 (1928), in clavi.—Panamá.
paraënsis *Sleum. in Fedde, Repert.* xxxix. 45 (1935).—Bras. (Pará).
pulcher *Sleum. l. c.* 46.—Peruv.
rufescens *Sleum. l. c.*—Boliv.

DOMBEYA Cav. (Sterculiac.).
brachystemma *Milne-Redhead in Hook. Ic. Pl.* xxxii. t. 3195 (1933).—N. Rhodesia.
emarginata *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1932, 94.—Uganda.
Gamwelliae *Exell in Journ. Bot.* 1932, lxx. 104.—N. Rhodesia.
globiflora *Staner in Ann. Soc. Sc. Brux.* Sér. B, lv. 59 (1935).—Congo Belg.
heterotricha *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 195 (1934).—Tanganyika Terr.
kandoënsis *De Wild. & Staner, Contrib. Fl. Katanga*, Suppl. iv. 59 (1932).—Congo Belg.
praetermissa *Dunkley in Kew Bull.* 1934, 182.—Kenya Col.; Tanganyika Terr.
quinqueseta (*Delile*) *Exell in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 263: Xeropetalum quinquesetum.
trichoclada *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 196 (1934).—Tanganyika Terr.
velutina *De Wild. & Staner, Contrib. Fl. Katanga*, Suppl. iv. 62 (1932).—Congo Belg.
Wittei *De Wild. & Staner, l. c.* 63.—Congo Belg.

DONACOPSIS Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 1932, Sér. II. iv. 593. *ORCHIDACEAE.*
laotica *Gagnep. l. c.*—Indo-China (Laos).

DONAX Beauv. (Gramin.).
Donax (*L.*) *Aschers. & Graebn. Fl. Nordostdeutsch. Flachl.* 101 (1898), in obs.: Arundo Donax.

DONKELAARIA Lem. (Rubiac.).
floribunda *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 316 (1894), in syn.: Centradenia floribunda.

DOPATRIUM Buch.-Ham. (Scrophulariac.).
Dawei *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 229, in clavi, 230 (1931).—Sierra Leone.

DOREMA D. Don (Umbellif.).
elymaitica (*Boiss.*) *K.-Pol. in Bull. Soc. Nat. Voron.* i. 37 (1925), in obs.: Haussknechtia elymaitica.

DORISIA Gillespie in Hook. Ic. Pl. xxxii. t. 3190 (1933). *CORNACEAE.*
rarissima *Gillespie, l. c.*—Ins. Viti.

×**DORITAENOPSIS** Guillaumin in Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, Sér. VI. xii. 613 (1935), in obs. *ORCHIDACEAE.*
[Doritis × Phalaenopsis.]

DORONICUM L. (Compos.).
× Fritschii *Widder in Mitt. Nat. Ver. Steiermark*, 1934, lxxi. 141.—Hort.
× Grafii *Widder, l. c.* 134.—Austria.

DOROTHEA Wernham (Rubiac.).
divergens *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 76 (1931).—Guinea Gall.; Sierra Leone.
minor *Wernham ex A. Cheval. Expl. Bot. Afr. Occ. Franç.* 324 (1920), nomen; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 76 (1931), in syn.: D. divergens.

DORSTENIA L. (Morac.; Urticac., Gen. Pl.).
Achteni *De Wild. in De Wild. & Staner, Contrib. Fl. Katanga*, Suppl. iv. 100 (1932).—Congo Belg.
amboniensis *De Wild. Pl. Bequaert.* vi. 19 (1932).—Tanganyika Terr.
asperifolia *Rossb. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 172 (1934).—Haiti.
benguellensis *Welw. ex Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. ii. Anhang, 7 (1932), in obs., in syn.: D. Poggei.
Bequaerti *De Wild. Pl. Bequaert.* vi. 23 (1932).—Congo Belg.

DORSTENIA:—
bicaudata *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. ii. Anhang, 6 (1932).—Tanganyika Terr.
binzaënsis *De Wild. Pl. Bequaert.* vi. 25 (1932).—Congo Belg.
brevifolia *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. ii. Anhang, 3 (1932).—Tanganyika Terr.
carnosula *De Wild. Pl. Bequaert.* vi. 27 (1932).—Tanganyika Terr.
cordato-acuminata *Cufod. in Archiv. Bot., Forlì*, 1934, x. 27.—Costa Rica.
denticulata *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. ii. Anhang, 3 (1932).—Tanganyika Terr.
Goossensi *De Wild. Pl. Bequaert.* vi. 33 (1932).—Congo Belg.
haitiensis *Rossb. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 173 (1934).—Haiti.
hispida *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. ii. Anhang, 4 (1932).—Tanganyika Terr.
jamaicensis *Britton*; *Rossb. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 176 (1934), descr. ampl.—Jamaica; Hispaniola.
katubensis *De Wild. in De Wild. & Staner, Contrib. Fl. Katanga*, Suppl. iv. 102 (1932).—Congo Belg.
kyimbilaënsis *De Wild. Pl. Bequaert.* vi. 39 (1932).—Tanganyika Terr.
lactifera *De Wild. in De Wild. & Staner, Contrib. Fl. Katanga*, Suppl. iv. 105 (1932).—Congo Belg.
librevillensis *De Wild. Pl. Bequaert.* vi. 42 (1932).—Gabon.
longipedunculata *De Wild. l. c.* 44.—Afr. trop. or.
maoungouensis *De Wild. l. c.* 46.—Kenya Col.
marambensis *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. ii. Anhang, 6 (1932).—Tanganyika Terr.
Mildbraediana *Peter, l. c.* 7.—Tanganyika Terr.
obanensis *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 425, in clavi, 427 (1928); *Hutchinson & Dalziel in Kew Bull.* 1929, 18.—Nigeria.
orientalis *De Wild. Pl. Bequaert.* vi. 49 (1932).—Tanganyika Terr.
paucibracteata *De Wild. l. c.* 50.—Congo Belg.
pectinata *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. ii. Anhang, 5 (1932).—Tanganyika Terr.
penduliflora *Peter, l. c.* 4.—Tanganyika Terr.
Pierrei *De Wild. Pl. Bequaert.* vi. 53 (1932).—Gabon.
piscaria *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 425, in clavi, 427 (1928); *Hutchinson & Dalziel in Kew Bull.* 1929, 19.—Nigeria.
polyactis *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. ii. Anhang, 8 (1932).—Tanganyika Terr.
Quarrei *De Wild. in De Wild. & Staner, Contrib. Fl. Katanga*, Suppl. iv. 106 (1932).—Congo Belg.
reducta *De Wild. Pl. Bequaert.* vi. 58 (1932).—Congo Belg.
rhomboidea *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. ii. Anhang, 7 (1932).—Tanganyika Terr.
rugosa *Peter, l. c.* 5.—Tanganyika Terr.
ruwenzoriensis *De Wild. Pl. Bequaert.* vi. 59 (1932).—Congo Belg.
Sacleuxi *De Wild. l. c.* 61.—Tanganyika Terr.
Schliebenii *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 396 (1932).—Tanganyika Terr.
Sereti *De Wild. Pl. Bequaert.* vi. 64 (1932).—Congo Belg.
stipitata *De Wild. in De Wild. & Staner, Contrib. Fl. Katanga*, Suppl. iv. 108 (1932).—Congo Belg.
Tanneriana *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. ii. Anhang, 6 (1932).—Tanganyika Terr.
tenuiradiata *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1065 (1934).—Tanganyika Terr.
tetractis *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. ii. Anhang, 8 (1932).—Tanganyika Terr.
umbricola *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 87.—Peruv.
Vermoeseni *De Wild. Pl. Bequaert.* vi. 70 (1932).—Congo Belg.

DOVYALIS E. Mey. (Flacourtiac.; Bixac., Gen. Pl.).
acuminata *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. ii. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde* ix.) 588 (1921), in obs.—Cameroons.

DOVYALIS:—
chirindensis *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. ii. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde* ix.) 587 (1921), in obs.—N. Rhodesia.
maliformis *Gilg ex Engl. l. c.* 589, in obs.—Tanganyika Terr.

DOWNINGIA Torr. (Campanulac.).
willamettensis *Peck in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1934, xlvii. 187.—U.S.A. (Oregon).

DRABA L. (Crucif.).
Allenii *Fernald in Rhodora*, 1934, xxxvi. 289.—Canada (Quebec).
azorellicola *O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 40 (1934).—Chile.
Burkartiana *O. E. Schulz, l. c.* xi. 873 (1933).—Argent.
clivicola *Fernald in Rhodora*, 1934, xxxvi. 326.—Canada (Quebec).
Demareei *Wiggins in Contrib. Dudley Herb. Stanford Univ.* i. 168 (1933).—Calif. infer.
exalata *Ekman in Svensk Bot. Tidskr.* 1931, xxv. 489 (1932).—Alaska.
farsetioides *Linden & Planch.*; *Sprague in Kew Bull.* 1926, 37.—Venez.
Funckeana *Linden & Planch.*; *Sprague, l. c.*—Venez.
Gredini *Ekman in Skrift. Svalb. og Ishavet*, No. 48, 31 (1932), nomen; *et in Svensk Bot. Tidskr.* 1933, xxvii. 102, descr., hybr. ?—Groenlandia.
Kjellmanii *Lid ex Ekman in Svensk Bot. Tidskr.* 1931, xxv. 478 (1932).—N. Zemlya.
laujarica *O. E. Schulz in Fedde, Repert.* xxxviii. 109 (1935).—Tibet.
laurentiana *Fernald in Rhodora*, 1934, xxxvi. 328.—Quebec; Newfoundland.
Lindeni (*Hook.*) *Planch. in Linden & Planch.*; *Sprague in Kew Bull.* 1926, 38: Leptonema Lindeni.
longipes *Raup in Contrib. Arn. Arb.* No. vi. 165 (1934).—Canada bor.-occ.
minganensis (*Victorin*) *Fernald in Rhodora*, 1934, xxxvi. 302: D. luteola var. minganensis.
mingrelica *Schischk. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 191 (1930).—Caucas.
multiceps *Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. ii. (*Contrib. Fl. Cogn. Mansh.*: *Pl. Nov. Jehol.* ii. ii.) 18 (1935).—Manchur. (Jehol).
Nakaiana *Hara in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 622.—Japon.
× nichanaica *O. E. Schulz in Fedde, Repert.* xxxi. 331 (1933).—Kashmir.
norica *Widder in Sitz. Akad. Wiss. Wien, Math.-Nat.* 1931, cxl. Abt. i, 620.—Eur. centr.
Oiana *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 297.—Japon.
parvisiliquosa *Tolmatch. ex N. Busch in Fl. Sibir. & Orient. Extr.*, Crucif. 713 (1931), in obs.; *Tolmatch. in Trav. Mus. Bot. Acad. Sc. URSS*, xxiv. 271 (1932).—Sibir. arct. (Penins. Taimyr).
Peasei *Fernald in Rhodora*, 1934, xxxvi. 298.—Canada (Quebec).
Pohlei *Tolmatch. in Trav. Mus. Bot. Acad. Sc. URSS*, xxiv. 272 (1932).—Sibir. arct. (Penins. Taimyr).
Prozorovskii *Tolmatch. in Compt. Rend. Acad. Sc. URSS*, Ser. A, No. 7, 173 (1930); *et in Fl. Sibir. & Orient. Extr.*, Crucif. 712 (1931).—Sibir.
reptans (*Lam.*) *Fernald in Rhodora*, 1934, xxxvi. 368: Arabis reptans.
Riveti *Benoist in Publ. Mus. Hist. Nat., Paris*, No. 3 (*Commém. Voy. d'Orbigny Am. Sud, 1826–33*) 77 (1933).—Ecuador.
× Salomonii *Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1906, xii. 91.—Hort.
sanctae-martae *O. E. Schulz*; *O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 874 (1933), descr. ampl.—Colomb.
Sekiyana *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 51 (1934).—Formosa.
Sornborgeri *Fernald in Rhodora*, 1934, xxxvi. 319.—Labrador.
subalpina *Goodman & C. L. Hitchcock in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1932, xix. 77.—U.S.A. (Utah).
tenerrima *O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 640 (1932).—Himal. occ.

DRABA:—
tucumanensis *O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 875 (1933).—Argent.
yesoënsis *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 56.—Japon.

DRABOPSIS Koch (Crucif.).
nuda (*Bélang. ex Boiss.*) *Stapf in Denkschr. Math.-Nat. Akad. Wiss.* li. (*Bot. Ergebn. Polak'sch. Exped. Persien, 1882*, II.) 30 (1886); *Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 196 (1930): Arabis nuda.

DRACAENA Vand. (Liliac.).
afromontana *Mildbr. in Sitzb. Akad. Wiss. Berlin*, xxxix. 1004 (1909), in obs., nomen; *et in Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. 1907–8*, ii. 62 (1910), descr.—Congo Belg.; Afr. trop. or.
alliaria *Lour. ex Gomes in Mem. Acad. Sc. Lisb. Cl. Sc. Pol. Mor. Bel.-Let.* n. s. iv. (1), 29 (1868); *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 16, 107 (1935), in syn.: Scilla sinensis.
cambodiana *Pierre ex Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 286.—Anam; Cambodia.
cannifolia *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1060 (1895), in syn.: Cordyline terminalis var. cannifolia *R. Br.*
erythrorrhachis *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in syn.: Cordyline Banksii f. erythrorrhachis *Baker.*
Forbesii *Degener, Fl. Hawaiiensis*, Fam. 68 (1932), in syn.: Pleomele Forbesii.
Loureiri *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 287: Aletris cochinchinensis.
Orabet *Kotschy & Peyr. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* ii. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 293 (1908), in obs.: an D. Ombet *Kotschy & Peyr.*
Parrei *Hort. ex Federer in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1931, xlvi. 232.—Hort.
petenensis *Lundell in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 230.—Guatem.
Veitchii *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1061 (1895), in syn.: Cordyline calocoma f. Veitchii *Voss.*
violascens *Hort. ex Vilmorin, l. c.* 1062, in syn.: Cordyline rubra f. violascens *Regel.*

DRACOCEPHALUM L. (Labiat.).
formosius (*Lunell*) *Rydb. in Brittonia*, i. 95 (1931): Physostegia formosior.
kafiristanicum *Bornm. in Engl. Jahrb.* lxvi. 247 (1934).—Afghan.
karataviense *Lipsch. & Pavlov in Sovietsk. Bot.* 1934, No. 1, 27, in obs., nomen.—Turkestan.
Prattii (*Léveillé*) *Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 79: Nepeta Prattii.
pyrenaicum *Biroli ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 459 (1835).—Hab. ?
Regelii *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 856 (1895), in syn.: Physostegia virginiana.
robustum *Nakai & Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. Pt. 1. (*Pl. Nov. Jehol.* 1.) 46 (1934).—Manchur. (Jehol).
Souliei (*Léveillé*) *Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 80, in obs.: Nepeta Souliei.
veroniciforme (*Small*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 1156 (1933): Physostegia veroniciformis.

DRACONTIUM L. (Arac.).
loretense *K. Krause in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 617 (1932).—Peruv.

DRACONTOMELON Blume (Anacardiac.).
brachyphyllum *Ridley in Kew Bull.* 1933, 202.—Borneo.

DRACOPHILUS Dinter & Schwantes (Ficoidac.).
foetens *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 169 (1931), in obs., nomen.—Afr. austr.-occ.

DRACOPHYLLUM Labill. (Epacridac.).
alticola *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1933, lxxviii. Beibl. 19, 339.—N. Caled.

DRACUNCULUS Mill. (Arac.).
Dracunculus (*L.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1166 (1895): Arum Dracunculus.

DREPANOCARPUS G. F. W. Mey. (Legumin.).
paludicola *Standley in Tropical Woods*, 1933, No. 33, 12.—Bras. (Pará).

DRIESSENIA Korth. (Melastomatac.).
minutiflora *Schwartz in Mitt. Inst. Bot. Hamburg*, vii. 238 (1931).—Borneo.

DRIMIA Jacq. (Liliac.).
congesta *Bullock in Kew Bull.* 1932, 504.—Afr. trop. or. (Elgon).
elgonica *Bullock, l. c.*—Afr. trop. or. (Elgon).

DRIMYS J. R. & G. Forst. (Magnoliac.).
amplexicaulis *Vieill. ex Parmentier in Bull. Sc. France & Belg.* 1895, xxvii. 231, in obs., 308 (1896).—N. Caled.
colorata *Raoul in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. ii. 121 (1844).—N. Zel.
Lenormandii *Vieill. ex Parmentier in Bull. Sc. France & Belg.* 1895, xxvii. 231, in obs., 308 (1896).—N. Caled.

DROOGMANSIA De Wild. (Legumin.).
munamensis *De Wild. in De Wild. & Staner, Contrib. Fl. Katanga*, Suppl. v. 28 (1933).—Congo Belg.
Quarrei *De Wild. l. c.* 30.—Congo Belg.

DROSANTHEMUM Schwantes (Ficoidac.).
ambiguum *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 321 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
austricola *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 480 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Barkerae *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 361 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Bredai *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 481 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
breve *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 321 (1932).—Little Namaq.
chrysum *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 423 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
croceum *L. Bolus, l. c.* 424.—Afr. austr. (Cape Prov.).
cymiferum *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 231 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Dejagerae *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 318 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Duplessiae *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 482 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Edwardsiae *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 319 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Jamesii *L. Bolus, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).
Lavisii *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 482 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
lignosum *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 322 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
marinum *L. Bolus, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).
Mathewsii *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 248 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
montaguense *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 320 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
oculatum *L. Bolus, l. c.* 323.—Little Namaq.
prostratum *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 302 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
pulchrum *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 424 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
salicola *L. Bolus, l. c.* 425.—Afr. austr. (Cape Prov.).
semiglobosum *L. Bolus, l. c.* 426.—Afr. austr. (Cape Prov.).
splendens *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 483 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
subalbum *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 248 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
subplanum *L. Bolus, l. c.* 232.—Afr. austr. (Cape Prov.).
worcesterense *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 484 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).

DROSERA L. (Droserac.).
Makinoi *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 11.—Japon. austr.
nipponica *Masamune, l. c.* 1932, xxii. 195, nomen; *et l. c.* 1933, xxiii. 207, descr.—Formosa.

DRUSA DC. (Umbellif.).
glandulosa (*Poir.*) *H. Wolff ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 795 (1921), in obs.: Sicyos glandulosa.

DRYANDRA R. Br. (Proteac.).
petrophiloides *C. A. Gardner in Journ. Roy. Soc. W. Austral.* 1932–3, xix. 82 (1934).—W. Austral.

DRYMARIA Willd. (Caryophyllac.).
barrancae *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 65 (1933–5).—Mexico.
gerontogea *F. Muell. Descript. Notes Papuan Pl.* i. 87 (1877), in obs.: D. diandra.
Ladewii *Rusby in Phytologia*, i. 54 (1934).—Boliv.
monticola *Howell in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xxi. 329 (1935).—Ins. Galapag.
stricta *Rusby in Phytologia*, i. 55 (1934).—Boliv.
stylosa *Backer in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. II. xii. 15 (1913).—Java.

DRYMOPHLOEUS Zipp. (Palmae).
pauciflorus (*H. Wendl.*) *Becc. in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa*, Mem., 1934, xliv. 151: Ptychosperma pauciflorum.
samoënsis (*Rechinger*) *Becc. ex Martelli in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1934, n. s. xli. 711 (1935), nomen; *et l. c.* 1935, n. s. xlii. 44: Solfia samoënsis.
Seemannii (*Becc.*) *Becc. ex Martelli, l. c.* 1934, n. s. xli. 711 (1935), nomen; *et l. c.* 1935, n. s. xlii. 44: Balaka Seemannii.

DRYOBALANOPS Gaertn. f. (Dipterocarpac.).
fusca *v. Slooten in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 39 (1932).—Borneo.
oöcarpa *v. Slooten, l. c.* 33.—Borneo.

DRYPETES Vahl (Euphorbiac.).
Aquifolium (*Scott Elliott*) *Pax & K. Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix c. 73 (1931): Cyclostemon Aquifolium.
Aubrevillei *Léandri in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 458.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
carolinensis *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 457.—Ins. Carolin. (Yap).
Chevalieri *Beille in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 293 (1917).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
confertiflora *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 259 (1935).—China (Hainan).
dolichocarpa *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 400.—Ins. Marian. (Saipan).
hieranensis (*Hayata*) *Sasaki, List Pl. Formos.* 260 (1928): Cyclostemon hieranensis.
madagascariensis (*Lam.*) *Humbert & Léandri in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 119: Ilex madagascariensis.
Mottikoro *Léandri in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 459.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
Nienkui *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 258 (1935).—China (Hainan).
nitida *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 400.—Ins. Palau.
Pellegrini *Léandri in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 459.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
rotensis *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 733.—Ins. Marian. (Rota).
sclerophylla *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 515 (1935).—Tanganyika Terr.
subdentata *Mildbr. in Siebenl. Forstw. Deutsch-Ostafr.* 93 (1914); *Pax & K. Hoffm. in Engl. Pflanzenreich, Euphorb.-Phyllanthoid.-Phyllanth.* 253 (1922).—Tanganyika Terr.
urophylla *Pax & K. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 34 (1921), in obs.—Cameroons.
Vignei *Hoyle in Kew Bull.* 1935, 257.—Gold Coast.
Yamadai *Kanehira & Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1931, xxi. 145.—Formosa.

DUABANGA Buch.-Ham. (Sonneratiac.; Lythrac., Gen. Pl.).
borneënsis *Knuth in Fedde, Repert.* xxxviii. 121 (1935).—Borneo.

DUBAUTIA Gaudich. (Compos.).
×fallax *Sherff in Bot. Gaz.* xcvi. 150 (1934).—Ins. Sandvic.
×fucosa *Sherff, l. c.* 149.—Ins. Sandvic.
magnifolia *Sherff in Am. Journ. Bot.* 1933, xx. 616.—Ins. Sandvic.
×media *Sherff, l. c.* 617.—Ins. Sandvic.
×mendax *Sherff, l. c.*—Ins. Sandvic.

DUCHESNEA Sm. (Rosac.).
formosana *Odashima in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1935, vii. 79.—China (Fokien); Formosa.

DUCHESNEA:—
Wallichiana (*Ser.*) *Nakai ex Hara in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 22: Potentilla Wallichiana.

DUCKEANTHUS R. E. Fries in Acta Hort. Berg. xii. 106 (1934). *ANNONACEAE.*
grandiflorus *R. E. Fries, l. c.* 107.—Bras. (Amaz.).

DUCROSIA Boiss. (Umbellif.).
stenocarpa *Bornm. & Gauba in Fedde, Repert.* xxxvi. 344 (1934).—Persia.

DUDLEYA Britton & Rose (Crassulac.).
Brittonii *Johansen in Cact. & Succ. Journ. Amer.* iv. 311 (1933).—Calif. infer.
Collomae *Rose ex Morton in Desert*, vi. 68 (1934); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 144.—U.S.A. (Arizona).
echeverioides *Johansen in Cact. & Succ. Journ. Amer.* vi. 122 (1935).—Calif. (Ins. Santa Rosa).
eximia *Johansen, l. c.*—Calif. infer.
Gatesii *Johansen, l. c.* iv. 286 (1932).—Calif. infer.
Hoffmannii *Johansen, l. c.* 243.—Calif. (Ins. Prince).
lagunensis (*Munz*) *Walth. in Leafl. West. Bot.* i. 29 (1932): Echeveria lagunensis.
Moranii *Johansen in Cact. & Succ. Journ. Amer.* iv. 244 (1932).—Calif. infer.
murina *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 147 (1931).—U.S.A. (Calif.).
regalis *Johansen in Cact. & Succ. Journ. Amer.* iv. 287 (1932).—Calif. (Ins. Prince).
viridicata *Johansen, l. c.* iv. 312 (1933).—Calif. infer.

DUGUETIA A. St.-Hil. (Annonac.).
amazonica *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* xii. 61 (1934).—Bras. (Amaz.).
asterotricha (*Diels*) *R. E. Fries, l. c.* 87: Aberemoa asterotricha.
cauliflora *R. E. Fries, l. c.* 57.—Guiana Brit. et Bat.
cuspidata *R. E. Fries, l. c.* 73.—Guiana Brit.
Duckei *R. E. Fries, l. c.* 77.—Bras. (Pará).
echinophora *R. E. Fries, l. c.* 40.—Bras. (Pará; Maranhão).
elegans *R. E. Fries, l. c.* 75.—Guiana Brit.
elliptica *R. E. Fries, l. c.* 55.—Bras.?
eximia *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 79 (1931).—Guiana Gall.
glabriuscula (*R. E. Fries*) *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* xii. 46 (1934): Aberemoa lanceolata var. glabriuscula.
hadrantha (*Diels*) *R. E. Fries, l. c.* 65: Aberemoa hadrantha.
Hemmendorffii *R. E. Fries, l. c.* 37.—Bras. (S. Paulo).
insculpta *R. E. Fries, l. c.* 91.—Guiana Bat.
latifolia *R. E. Fries, l. c.* 103.—Peruv.
macrocalyx *R. E. Fries, l. c.* 88.—Guiana Brit.
macrophylla *R. E. Fries, l. c.* 63.—Peruv.
oblongifolia *R. E. Fries, l. c.* 61.—Bras. (Amaz.).
obovata *R. E. Fries, l. c.* 66.—Guiana Bat.
rigida *R. E. Fries, l. c.* 54.—Guiana Brit. (vel Venez.?).
salicifolia *R. E. Fries, l. c.* 48.—Bras. (S. Paulo).
Sandwithii *R. E. Fries, l. c.* 80.—Guiana Brit.
Spruceana *R. E. Fries, l. c.* 64.—Bras.
surinamensis *R. E. Fries, l. c.* 50.—Guiana Bat.
Tessmannii *R. E. Fries, l. c.* 52.—Peruv.
tobagensis (*Urb.*) *R. E. Fries, l. c.* 93: Alcmene tobagensis.
Ulei (*Diels*) *R. E. Fries, l. c.* 67: Aberemoa Ulei.

DUIDAEA Blake in Bull. Torr. Bot. Cl. 1931, lviii. 496. *COMPOSITAE.*
pinifolia *Blake, l. c.* 499.—Venez.
rubriceps *Blake, l. c.* 500.—Venez.
Tatei *Blake, l. c.* 498.—Venez.

DUIDANIA Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago, Bot. Ser., vii. 408 (1931). *RUBIACEAE.*
montana *Standley, l. c.* 409.—Venez.

DULICHIUM Pers. (Cyperac.).
confervoides (*Poir.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 310 (1931): Scirpus confervoides.

DUMERILIA Lag. ex DC. (Compos.).
frutescens *Colla, Herb. Pedem.* iii. 361 (1834).—Chile.

DUMULA Lour. ex Gomes in Mem. Acad. Sc. Lisb. Cl. Sc. Pol. Mor. Bel.-Let. n. s. iv. (1), 29 (1868); Merrill in Trans. Am. Phil. Soc. n. s. xxiv. II. 16, 224 (1935), in syn.: **Atalantia** Correa (Rutac.).
sinensis *Lour. ex Gomes, l. c.*; *Merrill, l. c.*, in syn.: Atalantia buxifolia.

DUPERREA Pierre ex Pitard (Rubiac.).
scabrida *Craib in Kew Bull.* 1932, 430.—Siam.

DURANTA L. (Verbenac.).
recurvistachys *Rusby in Phytologia*, i. 73 (1934).—Boliv.

DURIALA (R. H. Anders.) Ulbr. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, xvi c. 537 (1934). *CHENOPODIACEAE.*
[Kochia sect. Duriala R. H. Anders.]
villosa (*F. Muell.*) *Ulbr. l. c.*: Enchylaena villosa.

DURIO Adans. (Bombacac.; Malvac., Gen. Pl.).
spontaneus *Bakh. ex v. Steenis in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 14 (1933), in obs.—Sumatra.

DUROIA L. f. (Rubiac.).
aquatica (*Aubl.*) *Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 270, cum descr. emend.: Coupoui aquatica.
Martiniana (*Miers*) *Bremek. l. c.*: Cupirana Martiniana.
oöcarpa *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 395 (1931).—Venez.
palustris *Ducke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 480 (1932).—Bras. (Amaz.).
Steinbachii *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 290 (1931).—Boliv.
stenophylla *Standley, l. c.* viii. 353 (1931).—Peruv.
trichocarpa *Standley, l. c.*—Peruv.

DUSSIA Krug & Urb. (Legumin.).
sanguinea *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 9 (1932).—Haiti.

DUTAILLYEA Baill. (Rutac.).
sessilifoliola *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 690, 703.—N. Caled.

DUVALIA Haw. (Asclepiadac.).
Emiliana *A. White in A. White & Sloane, Stapel.* 126 (1933).—Hab.?

DUVERNOYA E. Mey.; Nees in DC. Prodr. xi. 322 (1847), descr. *ACANTHACEAE.*
adhatodoides *E. Mey.*; *Nees, l. c.* 323.—Afr. austr. (Cape Prov.).
brevicaulis (*S. Moore*) *Lindau in Warb. Kunene-Sambesi-Exped.* 381 (1903): Justicia brevicaulis.

DYBOWSKIA Stapf (Gramin.).
Dybowskii (*Franch.*) *Dandy in Journ. Bot.* 1931, lxix. 54: Andropogon Dybowskii.

DYCKIA Schult. f. (Bromeliac.).
Chaguar *Castellanos in An. Mus. Nac. Buenos Aires*, xxxvi. 373 (1931).—Argent.
Dusenii *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcviii. 6 (1932).—Bras. (Paraná).
velascana *Mez*; *Castellanos in An. Mus. Nac. Buenos Aires*, xxxvi. 374 (1931), descr. emend.—Argent.

DYPSIS Noronha (Palmae).
gracilis *Becc. ex Martelli in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1935, n. s. xlii. 65: Phloga polystachya *Becc. in Journ. Linn. Soc., Bot.* xxix. 62 (1891), non *Noronha.*
sambiranensis (*Jumelle*) *Jumelle in Ann. Mus. Col. Marseille*, 1933, Sér. V. i. Fasc. 3, 15: Chrysalidocarpus sambiranensis.

DYSCHORISTE Nees (Acanthac.).
actinotricha *Chiov. Fl. Somala*, II. 348 (1932).—Somal. Ital.
bayatensis (*Urb.*) *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 35 (1932): Hygrophila bayatensis.
decumbens *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1932, 99.—Kenya Col.
procumbens *E. A. Bruce, l. c.* 1934, 304: D. decumbens *E. A. Bruce.*

DYSOXYLUM Blume (Meliac.).
aneityense *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 237.—N. Hebrides.

DYSOXYLUM:—
Corneri *M. R. Henderson in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 92 (1933).—Penins. Mal.
dzumacense *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 243.—N. Caled.
Francii *C. DC. ex Bonati apud Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1933, Sér. II. v. 244, nomen; *et in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 244, descr.—N. Caled.
hongkongense (*Tutcher*) *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 33 (1934): Chisocheton hongkongensis.
Hornei *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 83, 12 (1931).—Ins. Viti.
humile *C. DC.*; *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 244, in obs., descr.—N. Caled.
lenticellare *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 83, 13 (1931).—Ins. Viti.
Le-Ratianum *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 244.—N. Caled.
obliquum *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 83, 13 (1931).—Ins. Viti.
Seemanni *Gillespie, l. c.* 14: Aglaia multijuga *Seem.*, non Dysoxylum multijugum *Arn.*
sericiflorum *C. T. White in N. Queensland Nat.* iii. 35 [1935].—Austral. (Queensland).
undulatum *M. R. Henderson in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 90 (1933).—Penins. Mal.

DYSSODIA Cav. (Compos.).
bracteata (*S. Wats.*) *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 321: Pectis bracteata.
fimbriata *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 81 (1933–5).—Mexico.
remota *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 335.—Peruv.
tephroleuca *Blake, l. c.* 1935, xxv. 320.—U.S.A. (Texas).

E

EATONIA Rafin. (Gramin.).
longiflora (*Vasey*) *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 494 (1896): E. pennsylvanica var. longiflora.

EBERLANZIA Schwantes (Ficoidac.).
triticiformis (*L. Bolus*) *v. Poelln. in Fedde, Repert.* xxxii. 40 (1933), in obs.: Mesembryanthemum triticiforme.

ECBOLIUM Kuntze (Acanthac.).
[Justicia L.]
Ecbolium (*L.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 812 (1895), in obs.: Justicia Ecbolium.
viride (*Forsk.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 229 (1931): Justicia viridis.

ECCLINUSA Mart. (Sapotac.).
abbreviata *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 743.—Bras. (Amaz.).
Balata *Ducke*; *Ducke in Tropical Woods*, 1932, No. 31, 19; *et in Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro*, vi. 76 (1933), latine.—Bras. (Amaz.; Pará).
psilophylla *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 481.—Guiana Brit.
spuria *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 743.—Bras. (Amaz.).

ECCREMOCARPUS Ruiz & Pav. (Bignoniac.).
Mutisianus *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 26, 15 (1933).—Colomb.

ECDYSANTHERA Hook. & Arn. (Apocynac.).
parameroides *Tsiang in Sunyatsenia*, ii. 123 (1934), in obs., nomen.—China (Kwangsi).

ECHEVERIA DC. (Crassulac.).
aequatorialis *Rose ex v. Poelln. in Fedde, Repert.* xxxviii. 185 (1935).—Ecuador.
akontiophylla *Werderm. in Fedde, Repert.* xxx. 53 (1932).—Mexico.
alpina *Walth. in Cact. & Succ. Journ. Amer.* vii. 70 (1935).—Mexico.
arizonica *Hort. ex Jacobsen, Sukkulent.* 198 (1933), in syn.: Sedum Weinbergii.
Backebergii *v. Poelln. in Fedde, Repert.* xxxviii. 185 (1935).—Peruv.

ECHEVERIA:—
bicolor (*H. B. & K.*) *Walth. in Cact. & Succ. Journ. Amer.* vii. 39 (1935): Sedum bicolor.
Buchtienii *v. Poelln. in Fedde, Repert.* xxxvi. 193 (1934).—Boliv.
chihuahuaënsis *v. Poelln. l. c.* xxxviii. 29 (1935).—Mexico.
chilonensis (*Kuntze*) *Walth. in Cact. & Succ. Journ. Amer.* vii. 40 (1935); *v. Poelln. in Fedde, Repert.* xxxviii. 191 (1935): Sedum chilonense.
columbiana *v. Poelln. l. c.* 186.—Colomb.
crassicaulis *Walth. in Cact. & Succ. Journ. Amer.* vii. 36 (1935).—Mexico.
cuencaënsis *v. Poelln. in Fedde, Repert.* xxxviii. 187 (1935).—Ecuador.
devensis (*N. E. Brown*) *M. L. Green in Hand-List Tender Dicot. & Gnetac. Roy. Bot. Gard. Kew*, ed. 2, 71 (1931): Cotyledon devensis.
discolor *L. de Smet ex E. Morr.*; *v. Poelln. in Fedde, Repert.* xxxviii. 29 (1935), descr. emend.—Mexico.
elatior *Walth. in Cact. & Succ. Journ. Amer.* vii. 72 (1935).—Mexico.
gerbella *Hort. ex Cactus Journ.* ii. 51 (1934), in obs., nomen.—Hab.?
gibba *Burchard in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1935, l. 303, in obs.—Ins. Canar.
gilva *Walth. in Cact. & Succ. Journ. Amer.* vii. 61 (1935).—Hab.?
gracilis *Rose apud Walth. l. c.* 40.—Mexico.
Harmsii *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 22 (1931): Oliverella elegans *Rose*, non Echeveria elegans *Rose*.
lagunensis *Munz in Bull. S. Calif. Acad. Sc.* 1932, xxxi. 64.—U.S.A. (Calif.).
laurifolia *Hort. ex Cactus Journ.* ii. 51 (1934), in obs., nomen.—Hab.?
longipes *Walth. in Cact. & Succ. Journ. Amer.* vii. 36 (1935).—Mexico.
minutifoliata *v. Poelln. in Fedde, Repert.* xxxviii. 30 (1935).—Mexico.
neglecta *v. Poelln. l. c.*—Am. austr.
nudicaulis (*Abrams*) *Munz, Man. S. Calif. Bot.* 214, 598 (1935): Cotyledon nudicaulis.
oaxacana *Walth. in Cact. & Succ. Journ. Amer.* vi. 189 (1935), nomen.—Mexico.
oviformis *Hort. ex Cactus Journ.* ii. 51 (1934), in obs., nomen.—Hab.?
Pachanoi *Rose ex v. Poelln. in Fedde, Repert.* xxxviii. 187 (1935).—Ecuador.
potosina *Walth. in Cact. & Succ. Journ. Amer.* vii. 61 (1935).—Mexico.
Runyonii *Rose in Cact. & Succ. Journ. Amer.* vii. 69 (1935).—Cult.
tepeacensis *v. Poelln. in Fedde, Repert.* xxxviii. 30 (1935).—Mexico.
uniflora *Hort. ex Cactus Journ.* ii. 51 (1934), in obs., nomen.—Hab.?
viridiflora *Rose ex Walth. in Cact. & Succ. Journ. Amer.* vii. 70 (1935), in syn.: Pachyphytum heterosepalum.

ECHIDNOPSIS Hook. f. (Asclepiadac.).
atlantica *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 191 (1932).—Great Namaq.
tesselata (*Pillans*) *A. White & Sloane, Stapel.* 168 (1933), in obs., nomen alternativ.: Caralluma tesselata.

ECHINACEA Moench (Compos.).
hybrida *Hort. ex Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. Fasc. suppl. 1, p. 5 (1931), nomen.—Hab.?
tennesseënsis (*Beadle*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 1421 (1933): Brauneria tennesseënsis.

ECHINOCACTUS Link & Otto (Cactac.).
amambayensis *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen*, 88 (1931): Parodia paraguayensis.
bahiensis (*Britton & Rose*) *Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste Braz.* iii. 111 (1923) [*Insp. Fed. Obras Secc.* Publ. 57]; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 151: Discocactus bahiensis.
Boedekerianus *A. Berger*; *Bödeker in Kakteenk.* 1933, 94, latine.—Mexico.
Borchersii *Bödeker, l. c.* 112.—Peruv.
brachypetalus (*Speg.*) *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen*, 89 (1931): Gymnocalycium brachypetalum.

ECHINOCACTUS:—
brasiliensis (*Speg.*) *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen*, 88 (1931): Parodia brasiliensis.
calochlorus *Bödeker in Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges.* 1932, iv. 260.—Argent.
colombianus *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 271 (1931).—Colomb.
deminutus *Gürke in Monatsschr. Kakteenk.* 1906, xvi. 103, in syn.: Echinopsis deminuta.
Fidaianus (*Backeb.*) *Backeb. in Kakteenfreund*, ii. 104, 117 (1933); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 143: Spegazzinia Fidaiana.
Haagei *Hort. ex Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 243 (1935), in syn.: Lobivia neohaageana.
hastifer *Werderm. & Bödeker in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 274 (1931).—Mexico.
Hertrichii *Weinb.*; *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen*, 102 (1931).—U.S.A. (Arizona).
Leopoldii *Morren, Belg. Hort.* 1876, xxvi. 132, in obs.—Hab.?
leptanthus *K. Schmidt in Kakteenfreund*, iv. 10 (1935); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 146.—Argent.
macrochele *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 270 (1931).—Mexico.
maldonadensis *Herter, Fl. Urug. Pl. Vasc.* (*Estud. Bot. Reg. Urug.* iv.) 90 (1931): E. Arechavaletai *K. Schum.*
Mandragora *Frič ex A. Berger, Kakteen*, 255 (1929).—Mexico.
mazanensis *Backeb. in Kakteenfreund*, i. 133 (1932); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 143.—Argent.
Neumannianus *Backeb. l. c.* ii. 90 (1933); *et l. c.*—Argent.
prolifer *Backeb. l. c.* i. 132 (1932); *et l. c.*—Argent.
rectispinus (*Engelm. ex Coult.*) *Britton & Rose in Journ. N. Y. Bot. Gard.* 1911, xii. 269, in adnot.: E. Emoryi var. rectispinus.
rhodantherus *Bödeker in Kakteenk.* 1934, 13.—Argent.
sanguiniflorus *Werderm. in Fedde, Repert.* xxx. 56 (1932).—Argent.
santa-maria *Rose ex Schick in Monatsschr. Kakteenk.* 1919, xxix. 13, in obs.—Calif. infer.
Stuemeri *Werderm. in Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges.* 1931, iii. 122.—Argent.
subnudus (*Britton & Rose*) *Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste Braz.* iii. 111 (1923) [*Insp. Fed. Obras Secc.* Publ. 57]; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 151: Discocactus subnudus.
subterraneus *Backeb. in Kakteenfreund*, i. 110 (1932); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 143.—Mexico.
tilcarensis *Backeb. l. c.* 35, nomen; *et l. c.*—Hab.?
Umadeave (*Frič*) *Werderm. in Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges.* 1931, iii. 223; *et in Backeb. Neue Kakteen*, 88 (1931): Friesia Umadeave.
Urselianus *Hort. ex Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1935, l. 367.—Hort.
Vaupelianus *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 273 (1931).—Mexico.
Viereckii *Werderm. in Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges.* 1931, iii. 175.—Mexico.
villosus *Lem. ex Salm-Dyck*; *Labouret, Monogr. Cact.* 239 [1853], descr.—Peruv.
Vorwerkianus *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen*, 87, 101 (1931); *et in Fedde, Repert.* xxx. 65 (1932).—Colomb.
Zehntneri (*Britton & Rose*) *Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste Braz.* iii. 111 (1923) [*Insp. Fed. Obras Secc.* Publ. 57]; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 151: Discocactus Zehntneri.

ECHINOCEREUS Engelm. (Cactac.).
albiflorus *Weing. in Kakteenk.* 1933, 156.—Mexico.
albispinus *Lahman in Cact. & Succ. Journ. Amer.* vi. 143 (1935).—U.S.A. (Oklahoma).
angusticeps *Clover in Rhodora*, 1935, xxxvii. 79.—U.S.A. (Texas).
Barcena *Rebut ex Hirscht in Monatsschr. Kakteenk.* 1896, vi. 127, in obs., nomen; *A. Berger, Kakteen*, 175 (1929), in obs.—Hab.?
Davisii *Houghton in Journ. Cact. & Succ. Soc. Amer.* ii. 466 (1931).—U.S.A. (Texas).
oklahomensis *Lahman in Cact. & Succ. Journ. Amer.* vi. 141 (1935).—U.S.A. (Oklahoma).

ECHINOCEREUS:—
Ortegae *Rose in G. Ortega, Apuntes Fl. Indig. Sinaloa*, Fam. Cact. O. [No. 3] (1929).—Mexico.
purpureus *Lahman in Cact. & Succ. Journ. Amer.* vi. 141 (1935).—U.S.A. (Oklahoma).
Reichii *Frič in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1931, xlvi. 267, in obs.—Chile.
Viereckii *Werderm. in Kakteenk.* 1934, 188.—Mexico.

ECHINOCHLOA Beauv. (Gramin.).
glabrescens *Munro ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 31 (1896), in obs.—Ind. or.
macrocarpa *Vasinger in Komarov, Fl. URSS*, ii. 34, 739 (1934).—Ross. asiat. centr.
microstachya (*Wieg.*) *Rydb. in Brittonia*, i. 82 (1931): E. muricata var. microstachya.
occidentalis (*Wieg.*) *Rydb. l. c.*: E. muricata var. occidentalis.
oryzetorum (*A. Cheval.*) *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1934, xiv. 18: Panicum oryzetorum.
oryzicola (*Vasinger*) *Vasinger in Komarov, Fl. URSS*, ii. 33 (1934): Panicum oryzicola.
pungens (*Poir.*) *Rydb. in Brittonia*, i. 81 (1931): Panicum pungens.
spiralis *Vasinger in Komarov, Fl. URSS*, ii. 34, 739 (1934).—Caucas.

ECHINODORUS L. C. Rich. (Alismatac.).
palifolius (*Nees & Mart.*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 4 (1931): Sagittaria palifolia.
Ridleyi *v. Steenis in Arch. Hydrobiol.*, Suppl.-Band, xi. 240 (1932), in adnot.: E. rostratus *Gagnep.*

ECHINOLAENA Desv. (Gramin.).
gracilis *Swallen in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1933, xxiii. 457.—Guatem.
minarum (*Nees*) *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 246 (1931): Oplismenus minarum.

ECHINOMASTUS Britton & Rose (Cactac.).
uncinatus (*Galeotti*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 358 (1935): Echinocactus uncinatus.

ECHINOPOGON Beauv. (Gramin.).
caespitosus *C. E. Hubbard in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. sub t. 3261, p. 6 (1935).—Austral. (Queensland; N. S. Wales).
Cheelii *C. E. Hubbard, l. c.* p. 3.—Austral. (N. S. Wales).
intermedius *C. E. Hubbard, l. c.* t. 3261.—Austral. (Queensland; N. S. Wales).
McKiei *C. E. Hubbard, l. c.* sub t. 3261, p. 9.—Austral. (N. S. Wales).
nutans *C. E. Hubbard, l. c.* p. 4.—Austral. (Queensland).
phleoides *C. E. Hubbard, l. c.* p. 10.—Austral. (N. S. Wales).

ECHINOPS L. (Compos.).
Claessensi *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 447 (1932).—Congo Belg.
colchicus *Sosn. ex Kemul.-Nat. in Bull. Mus. Géorgie*, 1927, iv. 138 (1928).—Caucas.
dagestanicus *Iljin in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 157 (1934).—Caucas.
dissectus *Kitagawa in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 171, japonice; *et in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. ii. (*Contrib. Cogn. Fl. Mansh.*) 118 (1935): E. Gmelini *Komarov in Acta Hort. Petrop.* xxv. 713 (1907), non *Ledeb.*
dumosus *Panč. ex Hayek in Fedde, Repert. Beih.* xxx. ii. 688 (1931), in syn.: E. microcephalus var. virescens *Petrov.*
elegans *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 177 (1931).—Guinea Gall.; Côte d'Ivoire.
Fontqueri *Pau in Font Quer, Iter Marocc.* 1928, No. 409 [1929].—Marocc.
Grossheimii *Iljin in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 160 (1934).—Caucas.
lineari-lancifolius *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 448 (1932).—Congo Belg.
maurus *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 52.—Marocc.
Meyeri *Iljin in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 343 (1932).—Ross. asiat. (Uralsk).
minimus *Eig in Fedde, Repert. Beih.* lxiii. 1. 114 (1931), nomen.—Palaest.

ECHINOPS:—
opacifolius *Iljin in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 159 (1934).—Caucas.
pseudo-setifer *Kitagawa in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 171, japonice; *et in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. 11. (*Contrib. Cogn. Fl. Mansh.*) 120 (1935).—Manchur.

ECHINOPSIS Zucc. (Cactac.).
Backebergii *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen*, 84 (1931); *et in Fedde, Repert.* xxx. 64 (1932).—Boliv.
Chereauniana *Schlumb. in Rev. Hort.* Sér. IV. v. 402 (1856), nomen alternativ.—Hab.?
chionantha (*Speg.*) *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 264 (1931), in obs.: Echinocactus chionanthus.
chrysantha *Werderm. in Gartenflora*, 1931, lxxx. 302, in obs.; *et in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 264 (1931).—Argent.
densispina *Werderm. in Kakteenk.* 1934, 142.—Argent.
× Droegeana *R. M[eyer] ex Monatsschr. Kakteenk.* i. 55 (1891), in obs.; *Britton & Rose, Cactaceae*, iii. 67 (1922).—Hab.?
× Duvalli *R. M[eyer] l. c.* 54, in obs.; *Britton & Rose, l. c.* 76.—Hab.?
famatimensis (*Speg.*) *Werderm. in Gartenflora*, 1931, lxxx. 301; *et in Backeb. Neue Kakteen*, 84 (1931): Echinocactus famatimensis.
ferox (*Britton & Rose*) *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 3, [p. 4]: Lobivia ferox.
hamatacantha [sphalm. hamtacantha] *Backeb. l. c.* 1935, Pt. 11, [p. 7], in obs., nomen.—Argent.
hamatispina *Werderm. in Kakteenk.* 1934, 141.—Argent.
Hossei *Werderm. in Gartenflora*, 1931, lxxx. 301, fig., 302, in obs.; *et in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 265 (1931).—Argent.
hyalacantha (*Speg.*) *Werderm. in Gartenflora*, 1931, lxxx. 302, in obs.; *et in Backeb. Neue Kakteen*, 85 (1931): Lobivia hyalacantha.
imperialis *Hort. ex Hummel in Cact. & Succ. Journ. Amer.* vii. 82 (1935).—Hort.
korethroides *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen*, 84 (1931); *et in Fedde, Repert.* xxx. 64 (1932).—Argent.
Kratochviliana *Backeb. in Kakteenfreund*, iii. 62 (1934); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 144; *et in Kaktusář*, 1934, Juni; cf. *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 9, [p. 3].—Argent.
× Lagemanni *A. Dietr. in Otto & Dietr. Allg. Gartenzeit.* xiv. 307 (1846).—Hort.
leucorhodantha *Backeb. in Kaktusář*, 1934, Juni; *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 9, [p. 4].—Argent.
lobivioides *Backeb. in Kaktusář*, v. 64 (1934); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 147.—Argent.
longispina (*Britton & Rose*) *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen*, 84 (1931): Lobivia longispina.
macrodiscus *Frič in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1933, xlviii. 309, in obs.—Mexico.
Marsoneri *Werderm. in Fedde, Repert.* xxx. 55 (1932); *et in Fedde, Repert. Sonder-Beih.* C. t. 26 (1932).—Argent.
Mihanovichii *Frič & Gürcke in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1933, xlviii. 317, in obs.—Hab.?
mistiensis *Werderm. & Backeb. in Backeb. Neue Kakteen*, 84 (1931); *et in Fedde, Repert.* xxx. 64 (1932).—Peruv.
× Muelleri *Hort. ex Hirscht in Monatsschr. Kakteenk.* 1896, vi. 144, in obs.; *et ex Cact. Journ.* ii. 6 (1899); *Britton & Rose, Cactaceae*, iii. 76 (1922).—Hort.
× nigerrima *Schelle, Handb. Kakteenk.* 112 (1907); *Britton & Rose, Cactaceae*, iii. 65 (1922).—Hab.?
nigra *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 221, 412 (1935).—Argent.
oreopogon *Werderm. in Gartenflora*, 1931, lxxx. 302, in obs.; *et in Backeb. Neue Kakteen*, 85 (1931): Lobivia oreopepon.
pelecyrhachis *Backeb. in Kaktusář*, v. 65 (1934); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 147; *et in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 223 (1935).—Argent.
polyancistra *Backeb. in Kakteenfreund*, ii. 18 (1933); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 143; *et in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 223, 412 (1935).—Argent.

ECHINOPSIS:—
× Poselgeri *R. Meyer in Monatsschr. Kakteenk.* 1895, v. 36; *Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 424, indice, 219 (1935).—Hab.?
potosina *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 267 (1931).—Boliv.
pugionacantha *Rose & Bödeker in Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges.* 1931, iii. 272.—Boliv.
× Quehlii *R. M[eyer] ex Monatsschr. Kakteenk.* i. 55 (1891), in obs.; *Britton & Rose, Cactaceae*, iii. 76 (1922).—Hab.?
Ritteri *Bödeker in Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges.* 1932, iv. 141.—Boliv.
Robinsoniana *Werderm. in Fedde, Repert. Sonder-Beih.* C. t. 80 (1934).—Argent. vel Parag.?
× Rohlandii *Hort. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* 235 (1897).—Hort.
Rossii *Bödeker in Kakteenk.* 1933, 167.—Boliv.
rubescens *Backeb. in Kakteenfreund*, i. 122 (1932); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 143.—Argent.
Schreiteri (*Castellanos*) *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen*, 85 (1931): Lobivia Schreiteri.
scoparia *Werderm. in Kakteenk.* 1934, 144.—Argent.
Smrziana *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 219, 412 (1935).—Boliv.
sphacelata *Gravis in Mém. Acad. Belg.* 8vo, Sér. II. xiv. Fasc. 6, 29 (1935).—Hab.?
tephracantha *Hort. ex Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 219 (1935), in obs.—Hab.?
× Tettavii *Kratz. in Neubert's Deutsch. Gart. Mag.* viii. 111 (1855); cf. *Index Londin.* iii. 12 (1930).—Hab.?
thionantha (*Speg.*) *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 264 (1931), in obs.: Echinocactus thionanthus.
tucumanensis *Hort. ex Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 214 (1935), in obs.—Argent.?
× undulata *Rother in Monatsschr. Kakteenk.* 1901, xi. 61, in obs.; *Britton & Rose, Cactaceae*, iii. 76 (1922).—Hab.?
violacea *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 262 (1931).—Argent.
× Wilkensii (*Linke*) *Hort. ex Först. Handb. Cact.* 628 (1886), in syn.; *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* 235 (1897); *Britton & Rose, Cactaceae*, iii. 64 (1922), in obs.: E. Eyriesii var. Wilkensii.

ECHINOSPERMUM Sw. (Boraginac.).
Drobovii *Popov in Trav. Turkest. Univ., Tashkent*, No. 4 (*Vég. Monts Sary-Taou, etc.*) 56, 63 (1922).—Turkestan.
Forskohlii *Lehm. ex A. Brand in Engl. Pflanzenreich, Borrag.-Borraginoid.-Cryptanth.* 152 (1931), in syn.: Cynoglossum microglochin.

ECHIOCHILOPSIS Caballero in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid, Ser. Bot., No. 30, 10 (1935). *BORAGINACEAE.*
caerulea *Caballero, l. c.*—Marocc.

ECHIOSTACHYS Levyns in Journ. Linn. Soc., Bot. xlix. 445 (1934). *BORAGINACEAE.*
Ecklonianus (*DC.*) *Levyns, l. c.* 448: Echium Ecklonianum.
incanus (*Thunb.*) *Levyns, l. c.* 446: Echium incanum.
spicatus (*Burm. f.*) *Levyns, l. c.* 447: Echium spicatum.

ECHITES P. Br. (Apocynac.).
cincinnalis *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1934, xxi. 616.—Nicarag.
elegantula *R. E. Woodson in Am. Journ. Bot.* 1935, xxii. 686.—Mexico.
ovata *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 130 (1835), in obs.—Bras.
turbinata *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1934, xxi. 615.—Costa Rica.
turrigera *R. E. Woodson, l. c.* 1932, xix. 381.—Guatem.

ECHIUM L. (Boraginac.).
Abdelrhamani *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 81 [1933], nomen.—Marocc.
Augustini *Sennen & Mauricio, l. c.* 145, nomen.—Marocc.
Aurelianum *Sennen & Mauricio, l. c.* 81, nomen.—Marocc.
Briqueti *Sennen in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 185, in obs., nomen.—Marocc.

ECHIUM:—
Doderoi *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 109, nomen alternativ.—Hispan.
Doumerguei *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 81 [1933], nomen.—Marocc.
espagnolis *Sennen & Mauricio, l. c.* 145, nomen.—Marocc.
Font-Queri *Sennen & Mauricio, l. c.* 81, pro syn.: E. trigorhizum.
Hameti *Sennen & Mauricio, l. c.* 82, nomen.—Marocc.
hirsutissimum *Sennen & Mauricio, l. c.*, nomen.—Marocc.
hispidissimo-pustulatum *Sennen in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1932, xxiii. 269, in obs., nomen.—Marocc.
hispidissimum *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 81 [1933], nomen.—Marocc.
horrendum *Sennen in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1932, xxiii. 267, in obs., nomen.—Marocc.
Jahandiezi *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 81 [1933], pro syn.: E. humile.
judaicum *Eig in Fedde, Repert. Beih.* lxiii. 1. 113 (1931): an E. judaeum *Lacaita.*
Masguindali *Sennen in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 193, in obs., nomen.—Marocc.
Michaelis *Maire & Wilczek in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1934, xxv. 310.—Marocc.
nanum *Coss. in Bull. Soc. Dauph.* 1883, p. 413, No. 4003, nomen.—Marocc.
Norberti *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 102.—Hispan.
Pallari *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 81 [1933], nomen.—Marocc.
Paniaguae *Sennen & Mauricio, l. c.*, nomen.—Marocc.
permutatum *Pau in Cavanillesia*, iv. 53 (1931): E. Coincyanum.
perplexans *Maire; Emberger & Maire in Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc*, xi. Nos. 4–6, 104 (1931).—Marocc.
Philotei *Sennen in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 187, in obs., nomen.—Marocc.
pollentinum *Bert. ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 237 (1835), pro syn.: E. italicum.
proditorum *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 81 [1933], nomen.—Marocc.
pustulato-hispidum *Sennen, l. c.*, hybr.?—Marocc.
rifeum *Pau in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 11, 27 (1917).—Marocc.
Riofrioi *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 81 [1933], nomen.—Marocc.
tercianum *Sennen in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1932, xxiii. 260, in obs., nomen.—Marocc.
Thellungi *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 145 [1933], nomen.—Marocc.
versicolor *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 125 (1932).—Marocc.
Vidali *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 81 [1933], nomen.—Marocc.
vulcanorum *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1935, xv. 915.—Ins. C. Verde.

ECLIPTA L. (Compos.).
pusilla *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 70 (1933–5).—Calif. infer.

EDISONIA Small, Man. Southeast. Fl. 1078 (1933). *ASCLEPIADACEAE.*
pubiflora (*Decne*) *Small, l. c.*: Chthamalia pubiflora.

EDITHEA Standley in Tropical Woods, 1933, No. 34, 1. *RUBIACEAE.*
floribunda *Standley, l. c.* 2.—Mexico.

EDRAIANTHUS A. DC. (Campanulac.).
calaminthifolius (*Griseb.*) *Degen in Bot. Közl.* 1934, xxxi. 63, in obs.: Campanula calaminthifolia.

EDWARDSIA Salisb. (Legumin.).
unifoliata (*Rock*) *Degener, Fl. Hawaiiensis*, Fam. 169c (1932): Sophora chrysophylla var. unifoliata.

EHRETIA L. (Boraginac.).
macrophylla *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 343 (1824).—Nepal.
serrata *Roxb. Hort. Beng.* 17 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 340 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 596 (1832).—Bhutan; Bengal.

EHRETIA:—
setosa *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 342 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 598 (1832).—Samoa.
umbellulata *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 344 (1824).—Ind. or. (Assam).
uniflora *Roxb. Hort. Beng.* 84 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 342 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 598 (1832).—Ins. Molucc.

EHRHARTA Thunb. (Gramin.).
longigluma *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1933, 501.—Natal.

EICHLERODENDRON Briq. (Flacourtiac.).
intermedium (*Seem.*) *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 54 (1934): Hisingera intermedia.
mexicanum *Sleum. l. c.*—Mexico.

EINSTEINIA Ducke in Ann. Acad. Bras. Sc. 1934, vi. 105. *RUBIACEAE.*
sericantha (*Standley*) *Ducke, l. c.* 1935, vii. 181: Kotchubaea sericantha.
speciosa (*Ducke*) *Ducke, l. c.* 1934, vi. 106: Kotchubaea speciosa.

EKEBERGIA Sparrm. (Meliac.).
indeniensis (*A. Cheval.*) *Harms ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 819 (1915), in obs.: Charia indeniensis.
nana *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 401 (1932).—Tanganyika Terr.
velutina *Dunkley in Kew Bull.* 1935, 261.—Nyasaland; N. Rhodesia.

ELAEAGIA Wedd. (Rubiac.).
brasiliensis *Standley in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 395.—Bras. (Pará).
glomiflora *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 281 (1931).—Boliv.

ELAEAGNUS L. (Elaeagnac.).
Arakiana *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 161.—Japon.
arborea *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 461 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 441 (1832).—Ind. or. (Assam).
bambusetorum *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 591 (1933).—China (Yunnan).
canadensis (*L.*) *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1935, xxii. 682: Hippophaë canadensis.
conferta *Roxb. Hort. Beng.* 11 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 460 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 440 (1832).—Reg. Himal.
Courtoisi *Belval in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 97.—China (Anhwei).
emarginata *Colla, Herb. Pedem.* v. 92 (1836).—Hab.?
fasciculata (*Wall. ex Steud.*) *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1935, xxii. 682: Hippophaë fasciculata.
hypo-argentea *Hatusima ex Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 220, japonice.—Hab.?
jucundicocca *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 215.—Japon.
nikoënsis *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1930, xliv. 57, in obs., japonice; *et in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 168, latine.—Japon. (Hondo).
rhamnoides (*L.*) *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1935, xxii. 682: Hippophaë rhamnoides.
rotundifolia (*Parry*) *A. Nelson, l. c.*: Shepherdia rotundifolia.
salicifolia (*D. Don*) *A. Nelson, l. c.*: Hippophaë salicifolia.
triflora *Roxb. Hort. Beng.* 11 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 459 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 439 (1832).—Sumatra.
utilis *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1935, xxii. 682: Hippophaë argentea.

ELAEOCARPUS L. (Elaeocarpac.; Tiliac., Gen. Pl.)
chelonimorphus *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 83, 18 (1931).—Ins. Viti.
decurvatus *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 214 (1931).—China (Kwangsi).
ferruginiflorus *C. T. White in Contrib. Arn. Arb.* No. iv. 66 (1933).—Austral. (Queensland).
Hayatae *Kanehira & Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 398.—Formosa (Ins. Botel Tobago).

ELAEOCARPUS:—
hortensis *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 231.—N. Hebrides.
Johnsonii *F. Muell. ex C. T. White in Contrib. Arn. Arb.* No. iv. 67 (1933).—Austral. (Queensland).
kaalensis *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1933, lxxviii. Beibl. 19, 254.—N. Caled.
Kajewskii *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 232.—N. Hebrides.
kusaiensis *Kanehira in Tropical Woods*, 1932, No. 29, 5, in obs., nomen; *et in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 485, descr.—Ins. Carolin. (Kusai).
largiflorens *C. T. White in Contrib. Arn. Arb.* No. iv. 68 (1933).—Austral. (Queensland).
limitaneus *Hand.-Mazz. in Sinensia*, iii. 193 (1933).—China (Kwangsi).
Maclurei *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 63 (1934).—China (Hainan).
magnifolius *Christoph. in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 128, 135 (1935).—Samoa.
Michaelii *C. T. White in Kew Bull.* 1933, 45: E. longipetiolatus *C. T. White.*
murudensis *Merrill in Sarawak Mus. Journ.* iii. 527 (1928).—Borneo.
nitentifolius *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 279 (1935).—China (Hainan).
radicans (*Thou.*) *Hiern in Journ. Bot.* 1900, xxxviii. 493: Cerea radicans.
rubidus *Kanehira, Fl. Micrones.* 215 (1933), japonice; *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 673, latine.—Ins. Palau.
stenophyllus *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 168 (1934).—Sumatra.
subcapitatus *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 83, 19 (1931).—Ins. Viti.
subsessilis *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 614 (1933).—China (Hunan; Chekiang; Fokien).
tuasivicus *Christoph. in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 128, 137 (1935).—Samoa.
Ulianus *Christoph. l. c.* 138.—Samoa.
vitiensis *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 83, 20 (1931).—Ins. Viti.
yateënsis *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1933, Sér. II. v. 243.—N. Caled.
zambalensis *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3185 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).

ELAEODENDRON J. F. Jacq. ex Jacq. (Celastrac.).
albivenosum *Chiov. Fl. Somala*, II. 132 (1932).—Somal. Ital.
Stolzii *Loes. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 35 (1934).—Tanganyika Terr.

ELAEOSELINUM Koch (Umbellif.).
Cadevalli *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 145 [1933], nomen.—Marocc.
Cuatrecasasi *Sennen & Mauricio, l. c.*, nomen.—Marocc.
hispanicum (*Lange*) *Pau ex Martinez in Mem. Soc. Esp. Hist. Nat.* xiv. 459 (1934), in obs.: E. merides var. hispanicum.

ELAPHRIUM Jacq. (Burserac.).
concinnum (*Sandwith*) *G. Ortega, Apuntes Fl. Indig. Sinaloa* (*Cat. Sist. Pl. Sinaloa*) 11 (1929): Bursera concinna.
elemiferum *Royle, Man. Mat. Med.* 344 (1847).—Mexico.
lonchophyllum (*Sprague & Riley*) *G. Ortega, Apuntes Fl. Indig. Sinaloa* (*Cat. Sist. Pl. Sinaloa*) 10 (1929): Bursera lonchophylla.
stenophyllum (*Sprague & Riley*) *G. Ortega, l. c.*: Bursera stenophylla.

ELATERIOPSIS Ernst (Cucurbitac.).
Pittieri (*Cogn.*) *Cufod. in Archiv. Bot., Forlì*, 1934, x. 50: Cyclanthera Pittieri.

ELATERIUM Jacq. (Cucurbitac.).
Pickelii *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 774 (1933).—Bras. (Pernambuco).

ELATINE L. (Elatinac.).
oryzetorum *Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 206 (1932).—Sibir. or.

ELATOSTEMA J. R. & G. Forst. (Urticac.).
brunneolum *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3219 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).

ELATOSTEMA:—
bulusanense *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3227 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
fenkolense *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 243.—Ins. Carolin. (Kusai).
glabratum *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3228 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
kiwuense *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 60 (1915), in obs.—Tanganyika Terr.
kusaiense *Kanehira in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 1.—Ins. Carolin. (Kusai).
longicornutum *H. Schröter in Fedde, Repert. Beih.* lxxxiii. 29, 37 (1935), in obs., nomen.—China (Yunnan; Szechuan).
maquilingense *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3229 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
oligodon *Quisumb. in Fedde, Repert.* xxxvi. 284 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
pacificum *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3230 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
perlongifolium *Elmer, l. c.* 3232.—Ins. Philipp. (Luzon).
rupicola *Elmer, l. c.* 3233.—Ins. Philipp. (Luzon).
serratifolium *Elmer, l. c.* 3234.—Ins. Philipp. (Luzon).
sinense *H. Schröter in Fedde, Repert. Beih.* lxxxiii. 29, 37 (1935), in obs., nomen.—China (Hunan).
sorsogonense *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3235 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
stoloniforme *Kanehira in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 2.—Ins. Palau.
trichosanthum (*Gagnep.*) *H. Schröter in Fedde, Repert. Beih.* lxxxiii. 20 (1935), in obs.: Pellionia trichosantha.
Zimmermannii *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 60 (1915), in obs.—Tanganyika Terr.

ELATOSTEMATOIDES C. B. Robinson (Urticac.).
caudatum *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3236 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).

ELEOCHARIS R. Br. (Cyperac.).
ambigens *Fernald in Rhodora*, 1935, xxxvii. 394.—U.S.A. (N. England; N. Jersey; Virginia).
argyrolepidoides *Zinserl. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 79, 584 (1935).—Rossia austr.-or.
bernardina (*Munz & I. M. Johnston*) *Munz & I. M. Johnston in Munz, Man. S. Calif. Bot.* 68, 597 (1935): Scirpus bernardinus.
Brittonii *Svenson ex Small, Man. Southeast. Fl.* 164 (1933).—U.S.A. (S. E. States).
calocarpa *Cherm. in Arch. Bot., Caen*, iv. Mém. No. 7, 41 (1931).—Afr. Gall. Centr.
carolina *Small, Man. Southeast. Fl.* 165 (1933).—U.S.A. (S. Carolina).
Curtisii *Small, l. c.*—U.S.A. (N. Carolina).
ecarinata *Zinserl. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 78, 583 (1935).—Sibir.; Mongol.
fennica *Palla ex Kneuck.*; *Zinserl. l. c.* 87, 587, descr. emend.—Fennia; Sibir. or.
globularis *Zinserl. l. c.* 78, 582.—Kamchatka.
halophila (*Fernald & Brackett*) *Fernald & Brackett ex Fernald in Rhodora*, 1935, xxxvii. 395: E. uniglumis var. halophila.
× intersita *Zinserl. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 76, 581 (1935).—Eur.; As. bor.; Am. bor.
kasakstanica *Zinserl. in Komarov, l. c.* 78, 583.—Ross. asiat. (Kasakstan).
Klingei (*Meinsh.*) *B. Fedtsch.*; *B. Fedtsch. in Komarov, l. c.* 82, 585, cum descr. emend.: Scirpus Klingei.
Komarovii *Zinserl. in Komarov, l. c.* 81, 588: E. triflora *Komarov.*
Korshinskyana *Zinserl.*; *Zinserl. l. c.* 88, 588, latine.—Mont. Ural; Transcasp.
leptostylopodiata *Zinserl. l. c.* 75, 581.—Rossia; Ross. asiat.
major *Hara in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 820.—Japon.
margaritacea (*Hultén*) *Miyabe & Kudo in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 210 (1931): Scirpus margaritaceus.
Maximoviczii *Zinserl. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 88, 588 (1935).—As. bor.-or.

ELEOCHARIS:—
meridionalis *Zinserl. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 69, 580 (1935).—Transcaucas.; Turkestan.
multiseta *Zinserl. l. c.* 83, 586.—Ross. asiat. centr.; Turkestan. chin.
nudipes (*Kunth*) *H. Pfeiff. in Fedde, Repert.* xxxi. 326 (1933): Bulbostylis nudipes.
Palmeri *Svenson in Rhodora*, 1932, xxxiv. 223.—U.S.A. (Texas).
paucidentata *Zinserl. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 87, 588 (1935).—Ross. asiat. centr.
petasata (*Maxim.*) *Zinserl. l. c.* 90, 589: Scirpus petasatus.
sachalinensis (*Meinsh.*) *Komarov in Komarov & Klob.-Alis. Key Pl. Far East. Reg. USSR*, i. 266 (1931); *Komarov, Fl. URSS*, iii. 80 (1935): Scirpus sachalinensis.
Satoi *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 28.—Manchur.
scythica *Zinserl.*; *Zinserl. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 84, 586 (1935), latine.—Rossia; Ross. asiat. (Kasakstan).
septentrionalis *Zinserl. l. c.* 83, 586.—Rossia bor.
squamigera *Svenson in Rhodora*, 1934, xxxvi. 389.—Bras. (Paraná).
Svensonii *Zinserl. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 71, 580 (1935).—As. bor.-or.
transcaucasica *Zinserl. l. c.* 81, 585.—Transcaucas.
Tsurumachii *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 29.—Japon. (Hondo).
turcomanica *Zinserl. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 79, 583 (1935).—Transcasp.; Turkestan.
uniglumis *Schult.*; *Zinserl. in Acta Hort. Petrop.* xl. 278 (1929); *et in Komarov, Fl. URSS*, iii. 82, 584 (1935)., descr. emend.—Eur.; Asia.
ussuriensis *Zinserl. in Komarov, l. c.* 75, 581.—Sibir.
valleculosa *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 29.—Corea.
viridans *Kükenth. in An. Mus. Montevid.* Ser. II. iii. Entr. 2, 175 (1931).—Urug.

ELEORCHIS Maekawa in Journ. Jap. Bot. 1935, xi. 297. *ORCHIDACEAE.*
conformis *Maekawa, l. c.* 299.—Japon.
japonica (*A. Gray*) *Maekawa, l. c.*: Arethusa japonica.

ELEPHANTOPUS L. (Compos.).
erectus *Gleason in Phytologia*, i. 40 (1933).—Bras. (S. Paulo).

ELEPHANTORRHIZA Benth. (Legumin.).
Goetzei (*Harms*) *Harms in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 400 (1915), in obs.: Piptadenia Goetzei.

ELEUSINE Gaertn. (Gramin.).
aegyptica (*L.*) *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 345 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 344 (1832): Cynosurus aegypticus.
calycina *Roxb. Hort. Beng.* 8 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 347 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 346 (1832).—Ind. or.
stricta *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 344; *et l. c.* 343.—Ind. or.
verticillata *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 346; *et l. c.* 346.—Ind. or.

ELEUTHERINE Herb. (Iridac.).
longifolia *Gagnep. in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, vi. 677 (1934); *et in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 66.—Indo-China (Anam).
subaphylla *Gagnep. l. c.* 676; *et l. c.*—Indo-China (Anam).

ELEUTHEROSPERMUM Koch (Umbellif.).
rubellum *E. Busch in Trav. Mus. Bot. Acad. Sc. URSS*, xxiii. 229 (1931).—Caucas.

ELICHRYSUM Mill. (Compos.).
[Vide HELICHRYSUM.]

ELIONURUS Humb. & Bonpl. (Gramin.).
Trapnellii *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1933, 498.—N. Rhodesia.
tripsacoides *Humb. & Bonpl. in Willd. Sp. Pl.* iv. 11. 941 (1806).—Venez.

ELIZABETHA Schomb. (Legumin.).
bicolor *Ducke in Tropical Woods*, 1934, No. 37, 22.—Bras. (Pará).

ELIZABETHA:—
durissima *Ducke, in Tropical Woods*, 1934, No. 37, 26.—Bras. (Amaz.).
leiogyne *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 727.—Bras. (Amaz.).
paraënsis *Ducke*; *Ducke in Tropical Woods*, 1934, No. 37, 24, descr. emend.—Bras. (Pará; Amaz.).
speciosa *Ducke, l. c.* 21.—Bras. (Amaz.).

ELODES Adans. (Guttif.; Hypericac., Gen. Pl.).
aegyptica (*L.*) *Kimura in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 831: Hypericum aegypticum.

ELSHOLTZIA Willd. (Labiat.).
cephalantha *Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 90.—China (Szechuan).
interrupta *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 67.—Japon. (Hondo).
nipponica *Ohwi, l. c.* 232, in obs., japonice.—Japon.
serotina *Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 210 (1932).—Sibir. (Marit. Prov.).
splendens *Nakai ex Maekawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 50.—Corea; Manchur.

ELVIRA Cass. (Compos.).
atripliciformis *Howell in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xxi. 333 (1935).—Ins. Galapag.

ELYMUS L. (Gramin.).
baldschuanicus *Roshev. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 779 (1932).—Ross. asiat. (Tadjikistan).
chatangensis *Roshev. l. c.* 778.—Sibir. bor.
cretaceus *Zing. ex Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 714 (1934), in syn.: Psathyrostachys junceus.
Engelmanni *Hort. ex Avdulov in Bull. Applied Bot., Leningrad*, Suppl. 44, p. 27 (1931), nomen.—Hab.?
fasciculatus *Roshev. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 780 (1932).—Ross. asiat. (Kasakstan).
hirtiflorus *Hitchcock in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 132.—U.S.A. (Wyoming).
innovatus *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 650 (1896).—U.S.A. (Montana).
kopetdagensis *Roshev. in B. Fedtsch. & al., Fl. Turkm.* i. 211 (1932).—Transcasp.
Krascheninnikovi (*Roshev.*) *Roshev. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 780 (1932): E. sibiricus var. Krascheninnikovi.
Paboanus *Claus in Beitr. Pflanzenk. Russ. Reiches*, Pt. VIII. 170 (1851).—Rossia.
Regeli *Roshev. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 781 (1932).—As. centr.
villosulus *Ohwi in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 183.—Japon.
Wiegandii *Fernald in Rhodora*, 1933, xxxv. 192.—Am. bor.-or.

ELYTRANTHE Blume (Loranthac.).
banksiana *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 88.—N. Hebrides.
dranensis (*S. Moore*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 51 (1933): Loranthus dranensis.
globosa (*Roxb.*) *G. Don, Gen. Syst.* iii. 426 (1834): Loranthus globosus.

ELYTRARIA Michx. (Acanthac.).
angustifolia (*Small*) *Leonard in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1934, xxiv. 445: Tubiflora angustifolia.
Shaferi (*P. Wilson*) *Leonard, l. c.* 446: Tubiflora Shaferi.
tuberosa *Leonard, l. c.*—Ecuador.

ELYTRIGIA Desv. (Gramin.).
alaica (*Drobov*) *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 61 (1934), in clavi: Agropyron alaicum.
alatavica (*Drobov*) *Nevski, l. c.* 60, in clavi: Agropyron alatavicum.
argentea *Nevski, l. c.* 61, in clavi.—Turkestan.
Aucheri (*Boiss.*) *Nevski in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 24 (1933), in obs.: Agropyron Aucheri.
Batalinii (*Krassn.*) *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 61 (1934), in clavi: Triticum Batalinii.
caespitosa (*K. Koch*) *Nevski, l. c.*, in clavi: Agropyron caespitosum.

ELYTRIGIA:—
dschungarica *Nevski, l. c.*, in clavi.—As. centr.
elongata (*Host ex Beauv.*) *Nevski in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 23 (1933), in obs.: Agropyron elongatum.
elongatiformis (*Drobov*) *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 61 (1934), in clavi: Agropyron elongatiforme.
ferganensis (*Drobov*) *Nevski, l. c.*, in clavi: Agropyron ferganense.
intermedia (*Host*) *Nevski in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 14 (1933), in obs.: Triticum intermedium.
jacutorum *Nevski, l. c.* 24, in obs.—Hab.?
juncea *Nevski, l. c.* 17, in obs.—Hab.?
lolioides (*Kar. & Kir.*) *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 61 (1934), in clavi: Triticum lolioides.
propinqua (*Nevski*) *Nevski, l. c.*, in clavi: Agropyron propinquum.
pruinifera *Nevski, l. c.*, in clavi.—Ross. asiat.
pulcherrima (*Grossheim*) *Nevski, l. c.*, in clavi: Agropyron pulcherrimum.
setulifera *Nevski, l. c.*, in clavi.—Turkestan.
Smithii *Nevski in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 25 (1933), in obs.—Hab.?
stenophylla (*Nevski*) *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 61 (1934), in clavi: Agropyron stenophyllum.
trichophora (*Link*) *Nevski, l. c.* 57: Triticum trichophorum.

ELYTROPAPPUS Cass. (Compos.).
gnaphaloides (*L.*) *Levyns in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxiii. 94 (1935): Seriphium gnaphaloides.
hispidus (*L. f.*) *Levyns, l. c.* 93: Gnaphalium hispidum.
longifolius *Levyns in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 98.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Ruschianus *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 88 (1932).—Hereroland.
scaber (*L. f.*) *Levyns in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxiii. 93 (1935): Stoebe scabra.

EMBADIUM J. M. Black in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral. 1931, lv. 141. *BORAGINACEAE.*
stagnense *J. M. Black, l. c.*—S. Austral.

EMBELIA Burm. f. (Myrsinac.).
acuta (*Dennst.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 177 (1931): Dauceria acuta.
canescens *Jack ex Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 292 (1824).—Penins. Mal.
dahomensis *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 16 (1931), in syn.: E. Rowlandii.
djalonensis *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, l. c.*, in clavi.—Guinea Gall.
floribunda *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 291 (1824).—Reg. Himal.
microphylla *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 184 (1934).—Sumatra.
nutans *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 290 (1824).—Ind. or. (Assam).
obtusa (*Dennst.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 177 (1931): Dauceria obtusa.
robusta *Roxb. Hort. Beng.* 16 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 287 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 587 (1832).—Ind. or.
vestita *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 288 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 588 (1832).—Ind. or. (Assam).
villosa *Wall. in Roxb. l. c.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 289 (1824).—Ind. or.

EMELIANTHE Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk. Sect. II. xxix. No. 6, 53 (1933). *LORANTHACEAE.*
Galpinii (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus Galpinii.
panganensis (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus panganensis.

EMILIA Cass. (Compos.).
Everettii (*Hemsl.*) *v. Steenis in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 187 (1934): Senecio Everettii.
guineënsis *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 149 (1931).—Guinea Gall.

EMMENOPTERYS Oliv. (Rubiac.).
Rehderi *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* xi. 528 (1932).—Siam; Burma.

EMMOTUM Desv. (Icacinac.; Olacac., Gen. Pl.).
argenteum *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 386.—Venez.

EMPEDOCLESIA Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xii. 124 (1934). *ERICACEAE.*
brachysiphon *Sleum. l. c.*—Guatem.

ENANTIA Oliv. (Annonac.).
ambigua *Robyns & Ghesq. in Ann. Soc. Sc. Brux.* liii. Sér. B, 67 (1933); *et in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 315 (1933), descr. emend.—Congo Belg.
atrocyanescens *Robyns & Ghesq. in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 312 (1933).—Congo Belg.
kwiluensis *Robyns & Ghesq. l. c.* 315.—Afr. Gall. Centr.
Lebrunii *Robyns & Ghesq. l. c.* 311.—Congo Belg.
olivacea *Robyns & Ghesq. l. c.* 314.—Congo Belg.

ENAULOPHYTON v. Steenis in Bull. Jard. Bot. Buitenz. Sér. III. xii. 175, in obs., 194, 196 (1932). *MELASTOMATACEAE.*
lanceolatum *v. Steenis, l. c.* 175, in obs., 195, 197.—Ind. or. Bat. (Ins. Natuna).

ENCELIA Adans. (Compos.).
anomala *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 82 (1933–5).—Calif. infer.
lineariloba *M. E. Jones, l. c.* 21.—U.S.A. (Texas).

ENCELIOPSIS A. Nelson (Compos.).
Covillei (*A. Nelson*) *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 334: Helianthella Covillei.

ENCEPHALARTOS Lehm. (Cycadac.).
Almasianus *Hort. ex Schuster in Engl. Pflanzenreich, Cycadac.* 112 (1932), in syn.: E. longifolius.
Brownei *Hort. ex Schuster, l. c.* 117, in syn.: E. horridus.
crassifolius *Hort. ex Schuster, l. c.* 109, in syn.: E. caffer.
glaber *Hort. ex Schuster, l. c.* 112, in syn.: E. Altensteinii.
grandis *Hort. ex Schuster, l. c.* 113, in syn.: E. Altensteinii.
heteropterus *Miq. ex Schuster, l. c.* 123, in syn.: E. Barteri.
Katzeri *Hort. ex Schuster, l. c.* 112, 117, in syn.: Encephalartos spp.
kosiensis *Hutchinson in Kew Bull.* 1932, 512.—Zululand.
Lepeschkinei *Hort. ex Schuster in Engl. Pflanzenreich, Cycadac.* 116 (1932), in syn.: E. horridus.
macrophyllus *Hort. ex Schuster, l. c.*, in syn.: E. horridus.
regalis *Hort. ex Schuster, l. c.* 112, 119, in syn.: Encephalartos spp.
revolutus *Hort. ex Schuster, l. c.* 112, in syn.: E. longifolius.
Royeni *Miq. ex Schuster, l. c.* 109, in syn.: E. caffer.
van-den-Heckei *Hort. ex Schuster, l. c.* 113, in syn.: E. Altensteinii.

ENCYCLIA Hook. (Orchidac.).
advena (*Reichb. f.*) *C. Porto & Brade in Rodriguesia*, i. No. 2, 28 (1935): Epidendrum advenum.
albopurpurea (*Barb. Rodr.*) *C. Porto & Brade, l. c.*: Epidendrum albopurpureum.
conchichila (*Barb. Rodr.*) *C. Porto & Brade, l. c.*: Epidendrum conchichilum.
conspicua (*Lem.*) *C. Porto & Brade, l. c.*: Epidendrum conspicuum.
dichroma (*Lindl.*) *C. Porto & Brade, l. c.* 29: Epidendrum dichromum.
euosma (*Reichb. f.*) *C. Porto & Brade, l. c.*: Epidendrum euosmum.
flava (*Lindl.*) *C. Porto & Brade, l. c.*: Epidendrum flavum.
gallopavina (*Reichb. f.*) *C. Porto & Brade, l. c.*: Epidendrum gallopavinum.
jauperyensis (*Barb. Rodr.*) *C. Porto & Brade, l. c.*: Epidendrum jauperyense.
Jenischiana (*Reichb. f.*) *C. Porto & Brade, l. c.*: Epidendrum Jenischianum.
megalantha (*Barb. Rodr.*) *C. Porto & Brade, l. c.*: Epidendrum megalanthum.

ENCYCLIA:—
pauciflora (*Barb. Rodr.*) *C. Porto & Brade in Rodriguesia*, i. No. 2, 29 (1935): Epidendrum pauciflorum.
purpurachyla (*Barb. Rodr.*) *C. Porto & Brade, l. c.*: Epidendrum purpurachylum.
Randii (*Barb. Rodr.*) *C. Porto & Brade, l. c.*: Epidendrum Randii.
rufa (*Lindl.*) *C. Porto & Brade, l. c.*: Epidendrum rufum.
squamata (*Barb. Rodr.*) *C. Porto & Brade, l. c.*: Epidendrum squamatum.
xipheroides (*Kraenzl.*) *C. Porto & Brade, l. c.*: Epidendrum xipheroides.

ENDIANDRA R. Br. (Laurac.).
aneityensis *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 84.—N. Hebrides.
elaeocarpa *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 83, 7 (1931).—Ins. Viti.
Holttumii *M. R. Henderson in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 120 (1933).—Penins. Mal.
montana *C. T. White in Contrib. Arn. Arb.* No. iv. 36 (1933).—Austral. (Queensland).
reticulata *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 83, 8 (1931).—Ins. Viti.

ENDLICHERIA Nees (Laurac.).
formosa *A. C. Smith in Phytologia*, i. 118 (1935).—Bras. (Amaz.).
Klugii *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxxi. 173 (1933).—Colomb.
loretensis *O. C. Schmidt, l. c.* 178.—Peruv.
mishuyacensis *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 102.—Peruv.
Trianae *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxxi. 175 (1933).—Colomb.
Williamsii *O. C. Schmidt, l. c.* 177.—Peruv.

ENDOSPERMUM Benth. (Euphorbiac.).
Banghamii *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. viii. 89 (1934).—Sumatra.

ENDOSTEMON N. E. Brown (Labiat.).
angolensis *Good in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl. 2, 147.—Angola.
ocimoides *Bremek. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 250 (1933).—Transvaal.
tuberifer *Good in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl. 2, 148.—Angola.

ENDOTRICHA Aubrév. & Pellegr. in Bull. Soc. Bot. France, 1934, lxxxi. 794 (1935). *SAPOTACEAE.*
taïensis *Aubrév. & Pellegr. l. c.* 795.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).

ENDYMION Dumort. (Liliac.).
hispanicus (*Mill.*) *Chouard in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 623, in obs.: Scilla hispanica.

ENGLEHARDTIA Leschen. (Juglandac.).
Fenzelii *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* vii. 300 (1931).—China (Kwangtung).
permicrophylla *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3194 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
zambalensis *Elmer, l. c.* 3195.—Ins. Philipp. (Luzon).

ENGLERODAPHNE Gilg (Thymelaeac.).
subcordata (*Meissn.*) *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 640 (1921), in obs.: Gnidia subcordata.

ENGLERODOXA Hörold (Ericac.).
Alberti-Smithii *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 57 (1934).—Ecuador.
calycina *A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 351 (1932).—Ecuador.
loranthiflora (*Benth.*) *A. C. Smith, l. c.* 352: Ceratostema loranthiflorum.

ENNEAPOGON Desv. (Gramin.).
avenaceus (*Lindl.*) *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 450: Pappophorum avenaceum.
cenchroides (*Licht. ex Roem. & Schult.*) *C. E. Hubbard, l. c.* 119: Pappophorum cenchroides.
Lindleyanus (*Domin*) *C. E. Hubbard, l. c.* 450: Pappophorum Lindleyanum.
spathaceus *Goossens in Kew Bull.* 1934, 200.—Transvaal.

ENNEASTEMON Exell in Journ. Bot. 1932, lxx. Suppl. 1, 209. *ANNONACEAE.*
affinis *Robyns & Ghesq. in Ann. Soc. Sc. Brux.* liii. Sér. B, 163 (1933).—Congo Belg.
angolensis *Exell in Journ. Bot.* 1932, lxx. Suppl. 1, 210.—Angola.
ferrugineus *Robyns & Ghesq. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 90.—Gabon.
foliosus (*Engl. & Diels*) *Robyns & Ghesq. in Ann. Soc. Sc. Brux.* liii. Sér. B, 165 (1933): Popowia foliosa.
nigritanus (*E. G. Baker*) *Exell in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 281: Popowia nigritana.
Schweinfurthii (*Engl. & Diels*) *Robyns & Ghesq. in Ann. Soc. Sc. Brux.* liii. Sér. B, 165 (1933): Popowia Schweinfurthii.
Seretii (*De Wild.*) *Robyns & Ghesq. l. c.* 162: Popowia Sereti.

ENTADA Adans. (Legumin.).
Schlechteri (*Harms*) *Harms in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 402 (1915), in obs.: Piptadenia Schlechteri.
Stuhlmannii (*Taub.*) *Harms, l. c.* 401, in obs.: Pusaetha Stuhlmannii.

ENTANDROPHRAGMA C. DC. (Meliac.).
Bussei *Harms ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 807 (1915), in obs.—Tanganyika Terr.
cylindricum (*Sprague*) *Sprague*; *Hoyle in Kew Bull.* 1932, 40, cum descr. ampl.: Pseudocedrela cylindrica.
lucens *Hoyle, l. c.* 267.—Tanganyika Terr.
platanoides *Vermoesen, Man. Ess. Forest. Congo Belg.* 111, fig., 115, in obs. (1923).—Congo Belg.
Thomasii *Ledoux in Rev. Agrol. & Bot. Kivu*, No. 1, 10 (1932).—Congo Belg.

ENTEROPOGON Nees (Gramin.).
rupestris (*J. A. Schmidt*) *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1935, xv. 1048: Ctenium rupestre.
simplex (*Schum. & Thonn.*) *A. Cheval. l. c.* 1934, xiv. 125: Chloris simplex.

ENTEROSPERMUM Hiern (Rubiac.).
coriaceum (*Baker*) *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 190 (1934): Rutidea coriacea.
gracile (*A. Rich.*) *Bremek. l. c.* 193: Pavetta gracilis.
rotundifolium (*Drake*) *Bremek. l. c.* 204: Ixora rotundifolia.

ENTOLASIA Stapf (Gramin.).
subjuncea *C. E. Hubbard in Journ. Ecol.* 1933, xxi. 223, in obs., nomen; *et in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. sub t. 3209, p. 2 (1933), in syn.: Cleistochloa subjuncea.

EORA O. F. Cook in Journ. Heredity, 1927, xviii. 409, in adnot.: **Rhopalostylis** H. Wendl. & Drude (Palmae).
Baueri (*H. Wendl. & Drude*) *O. F. Cook, l. c.*, in adnot.: Rhopalostylis Baueri.
Cheesemani (*Becc.*) *O. F. Cook, l. c.*, in adnot.: Rhopalostylis Cheesemanii.
sapida (*Soland. ex G. Forst.*) *O. F. Cook, l. c.*, in adnot.: Areca sapida.
ultima *O. F. Cook, l. c.*, in adnot.—Ins. Chatham.

EPERUA Aubl. (Legumin.).
Hohenkerkii *Sprague ex Aitken in Tropical Woods*, No. 23, 1 (1930), in obs., nomen; *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 365, in syn.: E. grandiflora.
oleifera *Ducke in Rev. Bot. Appliq.* 1932, xii. 437; *et in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 728.—Bras. (Amaz.).
stipulata *Kleinh. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 171.—Guiana Bat.

EPHEDRA L. (Gnetac.).
alenda (*Stapf*) *Andreánszky in Engl. Jahrb.* lxiv. 262 (1931): E. alata var. alenda.
atlantica *Andreánszky, l. c.* 265.—Marocc.
fasciculata *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 573.—U.S.A. (Arizona).
funerea *Coville & Morton in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 307.—U.S.A. (Calif.).
Gerardiana *Wall.*; *Florin in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 1, 21 (1933), descr.—As. centr.
likiangensis *Florin, l. c.* 33.—China (Yunnan; Szechuan).

EPHEDRA:—
minima *Hao in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, ii. 178 (1934); *et in Fedde, Repert.* xxxvi. 197 (1934).—Tibet.
Regeliana *Florin in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 1, 17 (1933).—As. centr.
saxatilis (*Stapf*) *Royle ex Florin, l. c.* 25: E. Gerardiana var. saxatilis.
texana *Reed in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1935, lxii. 43.—U.S.A. (Texas).
Tilhoana *Maire in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 903.—Sahara Gall. (Tibesti).

EPHEDRANTHUS S. Moore (Annonac.).
amazonicus *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* xii. 200 (1934).—Bras. (Amaz.).
guianensis *R. E. Fries, l. c.* x. 176 (1931).—Guiana Bat.

EPIBATERIUM J. R. & G. Forst. (Menispermac.).
diversifolium (*DC.*) *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 39: Cocculus diversifolius.

EPIBLASTUS Schlechter (Orchidac.).
accretus *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 176 (1934).—N. Guin.

EPICAMPES J. Presl (Gramin.).
anomala *Scribn. ex Beal, Grasses N. Amer.* ii. 311 (1896).—Mexico.
grandis (*Vasey*) *Beal, l. c.* 309: Muehlenbergia grandis.

EPICLASTOPELMA Lindau (Acanthac.).
macranthum *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1079 (1934).—Tanganyika Terr.

EPIDENDRUM L. (Orchidac.).
allemanioides *Hoehne in Bol. Agric., S. Paulo*, 1933, xxxiv. 616 (1934).—Bras. (S. Paulo).
Broadwayi *Ames & C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* i. No. 2, 5 (1932).—Trinidad.
comayaguense *Ames, l. c.* i. No. 8, 1 (1933).—Honduras.
curvicolumna *Ames, F. T. Hubbard & C. Schweinf. l. c.* iii. 67 (1935).—Panamá.
cyanocolumna *Ames, F. T. Hubbard & C. Schweinf. l. c.* iii. 2 (1934).—Mexico.
cystosum *Ames, l. c.* ii. 106 (1934).—Honduras.
dentilobum *Ames, F. T. Hubbard & C. Schweinf. l. c.* iii. 69 (1935).—Panamá.
Edwardsii *Ames, l. c.* i. No. 2, 1 (1932); *et l. c.* No. 5, p. 6, tab. (1933).—Honduras.
eustirum *Ames, F. T. Hubbard & C. Schweinf. l. c.* iii. 70 (1935): E. carinatum *Lindl.*
Geraldoi *C. Porto & Brade in Rodriguesia*, i. No. 2, 30 (1935): E. Kuhlmannii *Schlechter.*
Ghiesbreghtianum *A. Rich. & Gal.*; *Ames, F. T. Hubbard & C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* iii. 4 (1934), descr. ampl.—Mexico.
glaucovirens *Ames, F. T. Hubbard & C. Schweinf. l. c.* iii. 70 (1935): E. glaucum *Lindl.*
Hombersleyi *Summerhayes in Kew Bull.* 1934, 105.—Trinidad.
hondurense *Ames in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* i. No. 7, 1 (1933).—Honduras.
incomptoides *Ames, F. T. Hubbard & C. Schweinf. l. c.* iii. 71 (1935).—Mexico.
inconstans *Ames ex Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 350: E. Lindenii *Lindl.* (1845).
Juergensenii *Reichb. f.*; *Ames, F. T. Hubbard & C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* iii. 6 (1934), descr. ampl.—Mexico.
Kuhlmannii *Hoehne in Comm. Linh. Telegr. Matto Grosso, Amaz.*, Annexo 5, *Bot.*, Pt. 4, 21 (1912).—Bras. (Matto Grosso).
laterale *Rolfe in Orch. Rev.* 1912, xx. 280, 319; *et l. c.* 1920, xxviii. 160.—Am. centr.
Luetzelburgii *Sandt. ex Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste Braz.* iii. 204 (1923) [*Insp. Fed. Obras Secc.* Publ. 57], nomen; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 151.—Bras.
maculosum *Ames, F. T. Hubbard & C. Schweinf. in Mus. Bot. Leafl. Harvard Univ.* iii. 72 (1935): E. guttatum *A. Rich. & Gal.*
magdalenense *C. Porto & Brade in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 207 (1935).—Bras. (Rio de Janeiro).

EPIDENDRUM:—
magnispatha *Ames, F. T. Hubbard & C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* iii. 10 (1934).—Mexico.
neoporpax *Ames, l. c.* ii. 112 (1934): E. Porpax *Reichb. f.* (1865).
obliquifolium *Ames, F. T. Hubbard & C. Schweinf. l. c.* iii. 73 (1935).—Costa Rica.
Oestlundii *Ames, F. T. Hubbard & C. Schweinf. l. c.* iii. 11 (1934).—Mexico.
subulatifolium *A. Rich & Gal.*; *Ames, F. T. Hubbard & C. Schweinf. l. c.* 13, descr. ampl.—Mexico.
tenuissimum *Ames, F. T. Hubbard & C. Schweinf. l. c.* 15.—Mexico.
Tuerckheimii (*Schlechter*) *Ames, F. T. Hubbard & C. Schweinf. l. c.* iii. 75 (1935): Encyclia Tuerckheimii.

EPIGENEIUM Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 1932, Sér. II. iv. 593, 594. *ORCHIDACEAE.*
chapaënse *Gagnep. l. c.* 596.—Indo-China (Tonkin).
Clemensiae *Gagnep. l. c.* 595.—Indo-China (Anam).
Delacourii *Gagnep. l. c.*—Indo-China (Laos).
Fargesii (*Finet*) *Gagnep. l. c.*, in clavi: Dendrobium Fargesii.

EPILASIA Benth. & Hook. f. (Compos.).
nana (*Boiss. & Buhse*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 242 (1934): Scorzonera nana.

EPILOBIUM L. (Onagrac.).
alpestre (*Jacq.*) *Krocker, Fl. Siles.* i. 605 (1787): E. montanum var. alpestre.
atlanticum *Litard. & Maire*; *Litard. & Maire in Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc*, No. xxvi. 15 (1930), descr. ampl.—Marocc.
×De-Marchianum *Vaccari in Riv. Cl. Alp. Ital.* xli. No. 1, pp. 7, 8 (1922); *Pavarino in Chanousia*, i. 114, 115, in adnot., 116 (1928).—Hort.
ecomosum (*Fassett*) *Fernald in Rhodora*, 1932, xxxiv. 39, in obs., et in adnot.: E. glandulosum var. ecomosum.
laetum *Popov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n. s. xliv. 130.—Turkestan. (Thian Shan).
obscurum (*Schreb.*) *Schreb. Spicil. Fl. Lips.* 147, et Addenda, fol. K 6 (1771): Chamaenerion obscurum.
parviflorum (*Schreb.*) *Schreb. l. c.* 146, et Addenda, fol. K 6: Chamaenerion parviflorum.
roseum (*Schreb.*) *Schreb. l. c.* 147, et Addenda, fol. K 6: Chamaenerion roseum.
×Rubneri *Domin in Preslia*, xiii–xv. 147 (1935).—Czechoslovak.
×Wildtianum *Domin, l. c.*—Czechoslovak.

EPIMEDIUM L. (Berberidac.).
discolor *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss.* i. 51 (1894), in syn.: E. macranthum f. versicolor *Morr.*
hunanense (*Hand.-Mazz.*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 324 (1931), cum descr. ampl.: E. Davidii var. hunanense.
leptorrhizum *Stearn in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 343: E. macranthum *Léveillé, Fl. Kouy-Tchéou*, 48 (1915), non *Morr. & Decne.*
niveum *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 51 (1894), in syn.: E. macranthum f. niveum *Voss.*
planipetalum (*Calloni*) *Citerne, Berbérid. & Érythrosperm.* 21 (1892), in obs.: Vancouveria planipetala.
purpureum *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 50 (1894), in syn.: E. alpinum.
roseum *Hort. ex Vilmorin, l. c.* 51, in syn.: E. macranthum f. roseum *Voss.*
rotundatum *Hao in Fedde, Repert.* xxxvi. 223 (1934); *et in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, iii. 3 (1935).—China (Kansu).
sempervirens *Nakai ex Maekawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 582.—Japon.
setosum *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 19.—Japon (Hondo).
sulphureum *Morr. in Ann. Soc. Roy. Agric. Gand*, v. 92, in obs., t. 243 (1849).—Hort.

EPIPACTIS [Zinn, 1757, partim] Sw. in Vet.-Akad. Handl. Stokch. xxi. 232 (1800), emend. L. C. Rich. in Mém. Mus. Paris, iv. 51, 60 (1818). *ORCHIDACEAE.*
cruenta *Bert. ex Vign.-Lutati in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1932, n. s. xxxix. 530.—Ital.
manshurica *Maxim. ex Nevski in Komarov, Fl. URSS*, iv. 622 (1935), in syn.: E. Thunbergii.
Ohwii *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 298.—Formosa.
ulugurica *Mansf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1060 (1934).—Tanganyika Terr.

EPIPHYLLUM Haw. (Cactac.).
Purpusii (*Weing.*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 161 (1935): Phyllocactus Purpusii.
Ruestii (*Weing.*) *F. M. Knuth, l. c.* 163: Phyllocactus Ruestii.

EPIPOGIUM R. Br. Prodr. 330, 331 (1810); Sw. Summa Veg. Scand. 32 (1814); Spreng. Anleit. ii. Abth. 1, 285 (1817). *ORCHIDACEAE.*
[Epipogum Gmel. 1747.]
sinicum *Tso in Sunyatsenia*, i. 132 (1933).—China (Kwangtung).

EPIPOGUM L. C. Rich. (Orchidac.).
[Vide Epipogium R. Br.]

EPISCIA Mart. (Gesneriac.).
Buchtienii *Mansf. in Fedde, Repert.* xxxviii. 25 (1935).—Boliv.
cordata *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 466.—Venez.
cuneata *Gleason, l. c.* 467.—Venez.
Hansteiniana *Mansf. in Fedde, Repert.* xxxviii. 25 (1935).—Peruv.
hastata (*Linden ex Hanst.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 796 (1895): Nautilocalyx hastatus.
silvatica *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 29, 12 (1935).—Colomb.

ERAGROSTIS Host (Gramin.).
araiostachya *Chiov. Fl. Somala*, II. 458 (1932).—Somal. Ital.
arida *Hitchcock in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1933, xxiii. 449.—U.S.A. (S. W. States); Mexico.
arundinacea (*L.*) *Roshev. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 319 (1934): Aira arundinacea.
chariis (*Schult.*) *Hitchcock in Lingnan Sc. Journ.* vii. 193 (1931): Poa chariis.
confertiflora *J. M. Black in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1931, lv. 136: E. interrupta var. densiflora *J. M. Black.*
Eragrostis (*L.*) *Beauv. Agrost.*, Expl. Planch. 10, t. 14, fig. 11 (1812): Poa Eragrostis.
erosa *Scribn. ex Beal, Grasses N. Amer.* ii. 483 (1896).—Mexico.
Holstii (*Engl. & K. Schum.*) *Engl. ex Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. 1. 336 (1931): E. chalcantha var. Holstii.
infecunda *J. M. Black in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1931, lv. 137.—S. Austral.
insulatlantica *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1935, xv. 1042.—Ins. C. Verde.
intermedia *Hitchcock in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1933, xxiii. 450.—U.S.A. (S. States); Mexico.
jeholensis *Honda in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. II. (*Contrib. Cogn. Fl. Mansh.*: *Pl. Nov. Jehol.* II. i.) 6 (1935).—Manchur. (Jehol).
lanipes *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 449.—W. Austral.
longiramea *Swallen in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 437.—Mexico.
marquisensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 84, 81 (1931).—Ins. Marquesas.
multiflora (*Forsk.*) *Aschers. Fl. Prov. Brandenb.* i. 841 (1864), in adnot.: Poa multiflora.
perennans *Keng in Sunyatsenia*, iii. 16 (1935).—China (Kwangtung).
plumbea *Scribn. ex Beal, Grasses N. Amer.* ii. 484 (1896).—Mexico.
plurigluma *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 116.—Sierra Leone.
pseudopoa *C. E. Hubbard, l. c.* 115.—Tanganyika Terr.
pusilla *Scribn. ex Beal, Grasses N. Amer.* ii. 481 (1896).—Mexico.

ERAGROSTIS:—
Rogersii *C. E. Hubbard ex Stent & Rattray in Proc. Rhodes. Scientif. Assoc.* xxxii. (*Stent & Rattray, Grasses S. Rhodes.*) 56 (1933), nomen; *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 115, descr.—Rhodesia.
Sennii *Chiov. Fl. Somala,* II. 460 (1932).—Somal. Ital.
setulifera *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 805 (1933).—Tanganyika Terr.
Silveana *Swallen in Am. Journ. Bot.* 1932, xix. 438.—U.S.A. (Texas).
Stentiae *Bremek. & Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xvi. 406 (1935).—Bechuanaland Protect.
Swalleni *Hitchcock in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1933, xxiii. 451.—U.S.A. (Texas).
Tracyi *Hitchcock in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 130.—U.S.A. (Florida).
Vansonii *Bremek. & Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xvi. 407 (1935).—Bechuanaland Protect.
xerophila *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 84, 82 (1931).—Ins. Marquesas.

ERANTHEMUM L. (Acanthac.).
barlerioides *Roxb. Hort. Beng.* 3 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 114 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 113 (1832).—Ins. Andaman.
Beyrichii *Regel ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 806 (1895), in syn.: Siphonerantheum Beyrichii.
ciliatum (*Craib*) *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine,* iv. 661 (1935): Daedalacanthus ciliatus.
diantherum *Roxb. Hort. Beng.* 3 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 112 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 112 (1832).—Ins. Molucc.
Fournieri *André in Linden, Illustr. Hort.* xxvii. 165 (1880), in obs.: E. roseum *Lindl. & Fourn.*
montanum (*Roxb.*) *Roxb. Hort. Beng.* 80 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 110 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 110 (1832): Justicia montana.
racemosum *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 113; *et l. c.* 113.—Ins. Molucc.
splendens *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 806 (1895), in syn.: Daedalacanthus splendens.
strictum *Colebr. ex Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 114 (1820).—Ind. or. (Assam).
suffruticosum *Roxb. Hort. Beng.* 3 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 112 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 111 (1832).—Ins. Andaman.
Verschaffeltii (*Coem.*) *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 812 (1895), in syn.: Fittonia Verschaffeltii.

ERDISIA Britton & Rose (Cactac.).
melanotricha (*K. Schum.*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 174 (1935): Cereus melanotrichus.
Sextoniana (*Backeb.*) *Backeb. in Cactus Journ.* ii. 4 (1933), in obs.; *et in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 174, 411 (1935), cum descr.: Cereus Sextonianus.

EREMIA D. Don (Ericac.).
calycina *Compton in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 146.—Afr. austr. (Cape Prov.).
florifera *Compton, l. c.* 149.—Afr. austr. (Cape Prov.).
peltata *Compton, l. c.* 147.—Afr. austr. (Cape Prov.).
virgata *Compton, l. c.* 148.—Afr. austr. (Cape Prov.).

EREMOCARYA Greene (Boraginac.).
Abramsiana *A. Brand in Engl. Pflanzenreich, Borrag.-Borraginoid.-Cryptanth.* 77 (1931).—U.S.A. (Calif.).

EREMOLEPIS Griseb. (Loranthac.).
angustifolia *Benth. & Hook. f. Gen. Pl.* iii. 215 (1880), in obs.—Am. austr.
Schottii (*Eichl.*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi b. 183 (1935): Ixidium Schotti.

EREMOPANAX Baill. (Araliac.).
diversifolius *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich,* 1933, lxxviii. Beibl. 19, 333.—N. Caled.

EREMOPHILA R. Br. (Myoporac.).
Dielsiana (*Kraenzl.*) *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 120 (1931): Pholidia Dielsiana.

EREMOPHILA:—
homoplastica (*S. Moore*) *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 120 (1931): Pholidia homoplastica.
Kraenzlinii *C. A. Gardner, l. c.*: Stenochilus Drummondii.
Muelleriana *C. A. Gardner, l. c.* 119, nomen; *C. A. Gardner in Journ. Roy. Soc. W. Austral.* 1932–3, xix. 90 (1934), descr.—W. Austral.
ramosissima *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 120 (1931), nomen.—W. Austral.
saligna (*S. Moore*) *C. A. Gardner, l. c.*: Pholidia saligna.
Veronica (*S. Moore*) *C. A. Gardner, l. c.*: Pholidia Veronica.

EREMOPOA Roshev. in Komarov, Fl. URSS, ii. 429, 756 (1934). *GRAMINEAE.*
altaica (*Trin.*) *Roshev. l. c.* 431: Aira altaica.
bellula (*Regel*) *Roshev. l. c.*: Festuca bellula.
multiradiata (*Trautv.*) *Roshev. l. c.* 430: Poa palustris var. multiradiata.
oxyglumis (*Boiss.*) *Roshev. l. c.* 430, 756: Poa persica var. oxyglumis.
persica (*Trin.*) *Roshev. l. c.* 430: Poa persica.
songorica (*Schrenk*) *Roshev. l. c.* 431: Glyceria songorica.

EREMOPYRUM Jaub. & Spach (Gramin.).
Buonapartis (*Spreng.*) *Nevski in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS,* Ser. I. Fasc. 1, 18 (1933), in obs.; *et in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 52 (1934), in clavi: Triticum Buonapartis.
cretense (*Coust. & Gandoger*) *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 52 (1934): Agropyron cretense.
distans (*K. Koch*) *Nevski in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS,* Ser. I. Fasc. 1, 18 (1933), in obs.; *et in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 52 (1934), in clavi: Agropyron distans.
hirsutum (*Bert.*) *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 52 (1934), in clavi; *et in Komarov, Fl. URSS,* ii. 663 (1934): Hordeum hirsutum.
triticeum (*Gaertn.*) *Nevski in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS,* Ser. I. Fasc. 1, 18 (1933), in obs.; *et in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 52 (1934): Agropyron triticeum.

EREMOSTACHYS Bunge (Labiat.).
Dielsii *Bornm. in Engl. Jahrb.* lxvi. 240 (1934).—Afghan.
hajastanica *Sosn. ex Grossheim, Fl. Kavkaza,* iii. 301 (1932).—Caucas.
pinnatifida *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 858 (1895), in syn.: E. laciniata.
uniflora *Regel*; *Korovin in Trans. Sc. Soc. Turk.* i. 75 (1923), descr. ampl.—Bokhara.

EREMURUS Bieb. (Liliac.).
kopet-daghensis *Hort. ex Karrer in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1931, xlvi. 307; *Popov in B. Fedtsch. & al., Fl. Turkm.* i. 257 (1932).—Transcasp.
Korovini *B. Fedtsch. in Komarov, Fl. URSS,* iv. 48, 733 (1935).—Ross. asiat. centr.
Regelii *Vved. in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 3, p. 3 (1928): E. turkestanicus *Regel in Gartenflora,* 1880, 2, non *Regel* (1873).
Saprjagajevi *B. Fedtsch. in Komarov, Fl. URSS,* iv. 51, 734 (1935).—Ross. asiat. centr.

EREPSIA N. E. Brown (Ficoidac.).
brevipetala *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 426 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
caledonica *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 342 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
levis *L. Bolus, l. c.* 343.—Afr. austr. (Cape Prov.).

ERIA Lindl. (Orchidac.).
brevirachis *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 134 (1931).—Borneo.
calvescens (*Ridley*) *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxxii. 246 (1933): Trichotosia calvescens.
compressoclavata *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 129 (1932).—Ins. Sunda (Banca).
consanguinea *J. J. Smith, l. c.* xi. 131 (1931).—Borneo.

ERIA:—
dulitensis *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements,* viii. 97 (1935).—Borneo.
flexuosa *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 184 (1934).—N. Guin.
Hindei *Summerhayes in Kew Bull.* 1932, 321.—Ind. or. (Assam).
Jejuna *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 133 (1931).—Borneo.
Kajewskii *Ames in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 109, 135.—N. Hebrides.
lochongensis *Tso in Sunyatsenia,* i. 150 (1933).—China (Kwangtung).
longissima *Ames & Quisumb. in Philipp. Journ. Sc.* 1931, xliv. 374.—Ins. Philipp. (Luzon).
longissima (*Kraenzl.*) *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxxii. 255 (1933), non praec.: Trichotosia longissima.
Mansfeldiana *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 183 (1934).—N. Guin.
minima *Blatter & McCann in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxv. 274 (1931).—Ind. or. (Bombay).
pholidotoides *Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1931, Sér. II. iii. 682.—Indo-China (Anam).
quinquelamellosa *Tang & Wang in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping,* ii. 135 (1934).—China (Kwangtung).
roseans *Schlechter ex Mansf. in Fedde, Repert. Beih.* lxxiv. t. 46, fig. 183 (1933), sine descr.—Ind. or. vel Arch. Mal.
rupestris *Blatter & McCann in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxv. 270 (1931).—Ind. or. (Bombay).
Sawadae *Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan,* 1931, iii. 238.—Formosa.
suborbicularis *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 131 (1932): Trichotosia integra.
unifoliata *Schlechter ex Mansf. in Fedde, Repert. Beih.* lxxiv. t. 48, fig. 189 (1933), sine descr.—Ind. or. vel Arch. Mal.
vaginifera *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxv. 486 (1933).—Celebes.
vanikorensis *Ames in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 135.—Ins. Santa Cruz.

ERIACHNE R. Br. (Gramin.).
Isingiana *J. M. Black in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1933, lvii. 148.—S. Austral.

ERIANTHEMUM Van Tiegh. (Loranthac.).
alveatum (*Sprague*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 53 (1933): Loranthus alveatus.
Commiphorae (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Commiphorae.
heterochromum (*K. Krause*) *Danser, l. c.* 54: Loranthus heterochromus (1923), non *K. Krause* (1922).
lindense (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus lindensis.
linguiforme (*Peter*) *Danser in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 223: Loranthus linguiformis.
ngamicum (*Sprague*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 54 (1933): Loranthus ngamicus.
nyikense (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus nyikensis.
occultum (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus occultus.
ulugurense (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus ulugurensis.

ERIANTHUS Michx. (Gramin.).
arundinaceus (*Retz.*) *Jesw. in Arch. Suikerind. Ned.-Ind., Meded. Proefst. Javasuikerind.* 1925, 399, in obs.: Saccharum arundinaceum.
ciliaris (*Anderss.*) *Jesw. l. c.*, in obs.: Saccharum ciliare.
elegans (*Jesw.*) *Rümke in Arch. Suikerind. Ned.-Ind., Meded. Proefst. Javasuikerind.* 1934, 214, in adnot., 229: E. ciliaris var. elegans.
Munja (*Roxb.*) *Jesw. in Arch. Suikerind. Ned.-Ind., Meded. Proefst. Javasuikerind.* 1925, 399, in obs.: Saccharum Munja.
Sara (*Roxb.*) *Rümke in Arch. Suikerind. Ned.-Ind., Meded. Proefst. Javasuikerind.* 1934, 223: Saccharum Sara.

ERICA L. (Ericac.).
Acockii *Compton in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 43.—Afr. austr. (Cape Prov.).
aestiva *Markötter in Ann. Univ. Stellenb.* 1930, viii. Sect. A, No. 1, 33.—Natal.
Andreaei *Compton in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 44.—Afr. austr. (Cape Prov.).
arctata *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 605 (1895), in syn.: E. arborea.
arcuata *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 302 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
×autumnalis *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 604 (1895), in obs.—Hab.?
Bedfordiana *Hort. ex Vilmorin, l. c.* 600, in syn.: E. lituiflora.
Bolusiae *Salter in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 125.—Afr. austr. (Cape Prov.).
capensis *Salter, l. c.* 34.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Cassonii *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 604 (1895), in syn.: E. melanthera.
concolor *Hort. ex Vilmorin, l. c.* 600, in syn.: E. versicolor.
coralliflora *Compton in Fl. Pl. S. Afr.* 1934, xiv. t. 551.—Afr. austr. (Cape Prov.).
coronanthera *Compton in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 38.—Afr. austr. (Cape Prov.).
eburnea *Salter in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 36.—Afr. austr. (Cape Prov.).
erythrotricha *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 600 (1895), in syn.: E. Meuronii.
×fontensis *Salter in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 82.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Fourcadei *L. Bolus in Kew Bull.* 1933, 185.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Galpinii *Salter in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 35.—Afr. austr. (Cape Prov.).
glandulipila *Compton in Journ. Bot.* 1932, lxx. 340.—Afr. austr. (Cape Prov.).
heleogena *Salter in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 33.—Afr. austr. (Cape Prov.).
hippurus *Compton in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 45.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Holtii *Schweickerdt in Kew Bull.* 1933, 185.—Transvaal.
humansdorpensis *Compton in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 39.—Afr. austr. (Cape Prov.).
hybrida *Hort. ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 69 (1835).—Hab.?
Iphigenia *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 602 (1895), in syn.: E. bucciniflora.
Jeppei *L. Bolus in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 46.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Keetii *L. Bolus in Kew Bull.* 1933, 186.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Krigeae *Compton in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 37.—Afr. austr. (Cape Prov.).
leucosiphon *L. Bolus in Kew Bull.* 1933, 186.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Loganii *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 302 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
lychnoidea *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 600 (1895), in syn.: E. concinna.
manifesta *Compton in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 37.—Afr. austr. (Cape Prov.).
octonaria *L. Bolus in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 45.—Afr. austr. (Cape Prov.).
orientalis *R. A. Dyer in Kew Bull.* 1932, 449.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Ottonis *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 607 (1895), in syn.: E. verticillata.
rosmarinifolia *Burd. ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 69 (1835).—Ital.?
Scaettae *Staner in Ann. Soc. Sc. Brux.* liii. Sér. B, 155 (1933).—Congo Belg.
trichostigma *Salter in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 81.—Afr. austr. (Cape Prov.).
trinitatis *Sennen & Mauricio, Ca Fl. Rif Or.* 76 [1933], nomen.—Marocc.

ERICAMERIA Nutt. (Compos.).
martirensis *Wiggins in Contrib. Dudley Herb. Stanford Univ.* i. 177 (1933).—Calif. infer.

ERICENTRODEA Blake & Sherff (Compos.).
decomposita *Blake & Sherff in Bot. Gaz.* 1931, xcii. 207.—Peruv.

ERIGERON L. (Compos.).
Allobrogorum *Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1930, Sér. II. xxii. 460 (1931).—Gallia.
bahamensis *Reusch ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 373 (1834).—Hab.?
×batumensis *Vierh. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 98 (1934), in obs.—Caucas.
×Benzii *Widder in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 1932, l. 80.—Eur. centr.
Bonjeani *Colla, Herb. Pedem.* iii. 373 (1834).—Hab.?
×Burnati *F. O. Wolf in Bull. Soc. Murith.* xxvii–xxviii. 224 (1900); cf. *Briq. & Cav. in Burnat, Fl. Alp. Marit.* v. 294 (1915).—Hab.?
Caldasii *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 27, Cuadro 22 (1934), nomen; *et l. c.* No. 29, p. 23 (1935), descr.—Colomb.
candidus *Widder in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 1932, l. 77.—Eur. centr.
×Chanousii *Vaccari ex Fiori, Nuov. Fl. Anal. Ital.* ii. 619 (1927).—Ital.
crenatus *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 101 (1931).—Mexico (Arch. Revillagigedo).
darentasiaticus *Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1931–2, Sér. II. xxiv. 237 (1933).—Gallia.
decipiens *Beauverd, l. c.* 1932–3, Sér. II. xxv. 314 (1934).—Gallia.
Fukuyamae *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 42.—Formosa.
×gypsophilus *Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1930, Sér. II. xxii. 462 (1931), in obs.—Gallia.
heterotrichus *Hara in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 827.—Japon.
×hybridus *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 211 (1924).—Hort.
Kuschei *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 158 (1931).—U.S.A. (Arizona).
lobatus *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 580.—U.S.A. (Arizona).
minusculus *Cuatrec. in An. Univ. Madrid*, iv. Fasc. 2, 218 (1935).—Peruv.
Miyabeanus *Tatewaki & Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 90, in syn.: Aster Miyabeanus.
Miyagii (*Koidz.*) *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 421: Aster Miyagii.
Naudini (*Bonnet*) *Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* v. 72 [1921]: Conyza Naudini.
ocoënsis *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 74 (1931.)—Santo Domingo.
×Palezieuxi *Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1931–2, Sér. II. xxiv. 237 (1933).—Gallia.
×Paulae *Beauverd, l. c.* 238.—Gallia.
phoenicodontus *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 327.—Mexico.
×praecox *Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1930, Sér. II. xxii. 462 (1931).—Gallia.
psilocaulis *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 74 (1931).—Santo Domingo.
×Raddeanus *Vierh. in Bull. Mus. Géorgie*, 1929–30, vi. 120 (1931).—Caucas.
rapensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 338 (1935).—Polynes. (Ins. Rapa).
Re *Colla, Herb. Pedem.* iii. 372 (1834).—Ital.
rhodopaeus (*Vierh.*) *Hayek in Fedde, Repert. Beih.* xxx. II. 587 (1931): Trimorpha rhodopaea.
×Riklii *Vaccari ex Fiori, Nuov. Fl. Anal. Ital.* ii. 619 (1927).—Ital.
Schalbusii *Vierh. in Bull. Mus. Géorgie*, 1929–30, vi. 119 (1931).—Caucas.
×Schelkovnikovii *Vierh. l. c.* 122.—Caucas.
Thompsoni *Blake in Rhodora*, 1932, xxxiv. 238.—U.S.A. (Washington).
uncialis *Blake in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1934, xlvii. 173.—U.S.A. (Calif.).
Vierhapperi (*Briq. & Cav.*) *Janchen in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1932, lxxxii. 125, in obs.: E. Burnati var. Vierhapperi.
×Wilczekii *F. O. Wolf ex Fiori, Nuov. Fl. Anal. Ital.* ii. 619 (1927).—Ital.
×Woronowii *Vierh. in Bull. Mus. Géorgie*, 1929–30, vi. 123 (1931).—Caucas.

ERINOSMA Herb. (Amaryllidac.).
carpathica *Herb. Amaryll.* 331 (1837).—Carpath.

ERIOBLASTUS Honda (Gramin.).
paramushirensis (*Kudo*) *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 215: Deschampsia atropurpurea var. paramushirensis.

ERIOBOTRYA Lindl. (Rosac.).
buisanensis (*Hayata*) *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 464 (1931): Photinia buisanensis.
Cavaleriei (*Léveillé*) *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 307: Hiptage Cavaleriei.
ochracea *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 476 (1933).—China (Yunnan).
salwinensis *Hand.-Mazz. l. c.* 475.—China (Yunnan).

ERIOCAULON L. (Eriocaulac.).
conicum (*Fyson*) *C. E. C. Fischer in Gamble, Fl. Madras*, 1620 (1931); *et in Kew Bull.* 1931, 261, in obs.: E. Dianae var. conicum.
densum *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* v. 483 (1836).—Bras.
Deslandesii *Alv. Silv. Fl. Mont.* 421 (1928).—Bras. (Rio Grande do Sul).
Friesiorum *Bullock in Kew Bull.* 1932, 507.—Kenya Col.
hananoegoënse *Masamune in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* xi., Bot. No. 4, 537 (1934).—Ins. Liukiu (Yakushima).
hydrophilum *Markötter in Ann. Univ. Stellenb.* 1930, viii. Sect. A, No. 1, 10.—Orange Free State.
inyangense *Arwidsson in Bot. Notiser*, 1934, 83.—Rhodesia.
longepedunculatum *Alv. Silv. Fl. Mont.* 15 (1928).—Bras. (Minas Geraes).
megapotamicum *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 9, p. 8 (1935).—Bras. (Rio Grande do Sul).
milhoënse *Herzog in Fedde, Repert.* xxix. 204 (1931).—Bras. (Pará?).
plumbeum *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* v. 484 (1836).—Bras.
poluense *Wang & Tang in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, ii. 133 (1934).—China (Kwangtung).
pterosepalum *Herzog in Fedde, Repert.* xxix. 204 (1931).—Bras. (Pará?).
Sekimotoi *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 299.—Japon.
sphagnicola *Ohwi in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 196, 389.—Corea.

ERIOCEPHALUS L. (Compos.).
aromaticus *C. A. Smith in Kew Bull.* 1931, 100.—Afr. austr. (Cape Prov.).
hirsutus *Burtt Davy in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 106.—Transvaal.
parviflorus *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 87 (1932).—Great Namaq.
tenuipes *C. A. Smith in Kew Bull.* 1931, 101.—Afr. austr. (Cape Prov.).
virgatus *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 87 (1932).—Great Namaq.

ERIOCEREUS Riccob. (Cactac.).
perviridis (*Weing.*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 178 (1935): Cereus Martinii var. perviridis.
Regelii (*Weing.*) *Backeb. l. c.*: Cereus Regelii.

ERIOCHLOA H. B. & K. (Gramin.).
Boxiana *Hitchcock in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 436, 339 (1934).—Ind. occ. (Antigua); Mexico; Colomb.
gracilis (*Fourn.*) *Hitchcock in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1933, xxiii. 455: Helopus gracilis.
parvispiculata *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 111.—Zanzibar.

ERIOCHRYSIS Beauv. (Gramin.).
Munroana (*Hackel*) *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 648 (1932): Saccharum Munroanum.
phaenostachys *Pilger, l. c.*—Tanganyika Terr.
Rangacharii *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1932, 246.—Mont. Nilgiri.

ERIOCOELUM Hook. f. (Sapindac.).
macrocarpum *Gilg ex Engl.*; *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 1155 (1933), descr. ampl.—Cameroons; Guinea Hispan.; Congo Belg.

ERIOCYCLA Lindl. in Royle, Ill. Bot. Himal. t. 51, fig. 2, a–c (Jan. 1835); et l. c. p. 232 (Aug. 1835). *UMBELLIFERAE.*

ERIODICTYON Benth. (Hydrophyllac.).
capitatum *Eastw. in Leafl. West. Bot.* i. 40 (1933).—U.S.A. (Calif.).

ERIOGONELLA Goodman in Ann. Missouri Bot. Gard. 1934, xxi. 90. *POLYGONACEAE.*
membranacea (*Benth.*) *Goodman, l. c.* 91: Chorizanthe membranacea.
spinosa (*S. Wats.*) *Goodman, l. c.*: Chorizanthe spinosa.

ERIOGONUM Michx. (Polygonac.).
ampullaceum *Howell in Leafl. West. Bot.* i. 179 (1935).—U.S.A. (Calif.).
argillosum *Howell, l. c.* i. 13 (1932).—U.S.A. (Calif.).
Covilleanum *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 138 (1931).—U.S.A. (Calif.).
crispum *L. Williams in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1932, lix. 427.—U.S.A. (Utah).
cupulatum *S. G. Stokes in Leafl. West. Bot.* i. 34 (1933).—U.S.A. (Calif.).
filiformum *L. Williams in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1932, lix. 428.—U.S.A. (Utah).
fruticulosum *S. G. Stokes in Leafl. West. Bot.* i. 35 (1933).—U.S.A. (Idaho).
hastatum *Wiggins in Contrib. Dudley Herb. Stanford Univ.* i. 165 (1933).—Calif. infer.
Hoffmanni *S. G. Stokes in Leafl. West. Bot.* i. 23 (1932).—U.S.A. (Calif.).
Johnstoni *S. G. Stokes, l. c.* i. 35 (1933).—U.S.A. (Oregon).
lagunense *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 34 (1933–5).—Calif. infer.
lanosum *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 140 (1931).—U.S.A. (Arizona).
Nelsonii *L. Williams in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1932, lix. 428.—U.S.A. (Utah).
panamintense *Morton in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 308.—U.S.A. (Calif.).
pulchrum *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 139 (1931).—U.S.A. (Arizona).
Rixfordii *S. G. Stokes in Leafl. West. Bot.* i. 29 (1932).—U.S.A. (Calif.).
tenuissimum *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 139 (1931).—U.S.A. (Calif.).

ERIOLAENA DC. (Sterculiac.).
kwangsiensis *Hand.-Mazz. in Sinensia,* iii. 193 (1933).—China (Kwangsi).
malvacea (*Léveillé*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 613 (1933): Sterculia malvacea.

ERIOLOBUS M. Roem. (Rosac.).
florentinus (*Zuccagn.*) *Stapf in Bot. Mag.* sub t. 9305 (1933), in obs.: Crataegus florentina.

ERIOPHORUM L. (Cyperac.).
Bellardi *Colla, Herb. Pedem.* v. 561 (1836).—Ital.
equisetiforme *Turcz. ex Schischk. in Komarov, Fl. URSS,* iii. 33 (1935), in syn.: E. humile.
scabridum *Ohwi in Bot. Mag., Tokyo,* 1931, xlv. 187.—Manchur.; Corea.

ERIOPHYLLUM Lag. (Compos.).
Parishii *Hall ex Constance in Madroña,* ii. 114 (1934), in syn.: E. ambiguum.
Rixfordi *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 158 (1931).—U.S.A. (Calif.).

ERIOPSIS Lindl. (Orchidac.).
grandibulbosa *Ames & C. Schweinf. in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 350.—Venez.

ERIOPUS D. Don in Sweet, Brit. Fl. Gard. vii. (Ser. II. iv.) sub t. 368 (1837), in adnot.: **Lasiopus** D. Don (Compos.).

ERIOSEMA Desv. (Legumin.).
angustifolium *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal,* Pt. II. p. xxii. 413 (1932).—Transvaal.
Chicamba *E. G. Baker in Bol. Soc. Brot.* Sér. II. viii. 109 (1933).—Angola.
flexuosum *Staner in Kew Bull.* 1935, 277.—Tanganyika Terr.
Galpinii *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal,* Pt. II. p. xxii. 413 (1932).—Transvaal.
Gossweileri *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1933, lxxi. Suppl. 1, 230.—Angola.

ERIOSEMA:—
Harmsianum *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 199 (1932).—Hereroland.
Humbertii *Staner & de Craene in Ann. Mus. Congo Belge, Bot.,* Sér. VI. i. 59 (1934).—Congo Belg.
humuloideum *Staner & de Craene, l. c.* 84.—Congo Belg.
intermedium *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 13, 93 (1931).—Bras. (Matto Grosso).
Jurionianum *Staner & de Craene in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiv. 287 (1934): E. polystachyum *Baker.*
Lebrunii *Staner & de Craene in Ann. Mus. Congo Belge, Bot.,* Sér. VI. i. 73 (1934).—Congo Belg.
Lejeunei *Staner & de Craene in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiv. 217 (1933), nomen; *et in Ann. Mus. Congo Belge, Bot.,* Sér. VI. i. 63 (1934), descr.—Congo Belg.
nanum *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal,* Pt. II. p. xxii. 413 (1932).—Transvaal.
pinetorum *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., viii. 315 (1931).—Brit. Honduras.
Quarrei *E. G. Baker in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiii. 182 (1933).—Congo Belg.
Richardi *Benth. ex E. G. Baker; Staner & de Craene in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiv. 284 (1934), descr. ampl.—Congo Belg.; Afr. or.
Schoutedenianum *Staner & de Craene in Ann. Mus. Congo Belge, Bot.,* Sér. VI. i. 74 (1934).—Congo Belg.
Tisserantii *Staner & de Craene in Ann. Soc. Sc. Brux.* liv. Sér. B, 69 (1934).—Afr. Gall. Centr.; Congo Belg.
uniflorum *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal,* Pt. II. p. xxii. 413 (1932).—Swaziland.
urostachyum *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 815 (1933).—Tanganyika Terr.
villosum (*Meissn.*) *C. A. Smith ex Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal,* Pt. II. p. xxii. 413 (1932): Sigmodostyles villosa.
Youngii *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 296.—Angola.

ERIOSOLENA Blume (Thymelaeac.).
composita (*L. f.*) *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. viii. 111 (1934): Scopolia composita.
pendula (*Sm.*) *Blume ex Lecomte, Not. Syst.* iii. 101 (1915); *Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine,* v. 171 (1915): Daphne pendula.

ERIOSPERMUM Jacq. (Liliac.).
angustissimum *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 82 (1932).—Hereroland.
avasmontanum *Dinter, l. c.* 83.—Hereroland.
buchubergense *Dinter, l. c.* xxix. 168 (1931), in obs., nomen; *et l. c.* xxx. 81 (1932), descr.—Great Namaq.
convallariifolium *Dinter, l. c.* xxx. 83 (1932).—Hereroland.
halenbergense *Dinter, l. c.* 81.—Great Namaq.
Volkmanniae *Dinter, l. c.* 82.—Hereroland.

ERIOSPHAERA Less. (Compos.).
salvifolia *Zipp. ex Koster in Fedde, Repert.* xxxiv. 14 (1933), in syn.: Pterocaulon sphacelatum.

ERIOSYCE Phil. (Cactac.).
Bruchii (*Britton & Rose*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 273 (1935): Lobivia Bruchii.
korethroides (*Werderm.*) *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 11, [p. 7], in obs.; *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 273 (1935): Echinopsis korethroides.

ERIOZAMIA Hort. ex Schuster in Engl. Pflanzenreich, Cycadac. 131 (1932), in syn., sine descr.—*CYCADACEAE.*
latifolia (*Miq.*) *Hort. ex Schuster, l. c.,* in syn.: Ceratozamia mexicana var. latifolia (*Miq.*) *Schuster.*

ERISMA Rudge (Vochysiac.).
bicolor *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1932, Sér. II. iv. 740.—Bras. (Amaz.).
bracteosum *Ducke, l. c.*—Bras. (Amaz.).
gracile *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro,* ii. 55 (1935).—Bras. (Amaz.).

ERISMA:—
pallidiflorum *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro,* ii. 54 (1935).—Bras. (Amaz.).
parvifolium *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 362.—Bras. (Matto Grosso).
petiolatum *Gleason, l. c.* 363.—Bras. (Matto Grosso).
Tessmannii *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 295 (1931).—Peruv.
tomentosum *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro,* ii. 55 (1935).—Bras. (Amaz.).

ERITRICHIUM Schrad. (Boraginac.).
dauricum *A. Brand in Engl. Pflanzenreich, Borrag.-Borraginoid.-Cryptanth.* 74, 193 (1931).—Sibir.
Hookeri (*C. B. Clarke*) *A. Brand, l. c.* 193: Myosotis Hookeri.
Younghusbandii (*Duthie*) *A. Brand, l. c.* 25, 188: Microula Younghusbandii.

ERLANGEA Sch. Bip. (Compos.).
angustifolia (*Benth.*) *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 170 (1931): Gymnanthemum angustifolium.
conica *Chiov. Fl. Somala,* II. 257 (1932).—Somal. Ital.
eupatorioides *Hutchinson & B. L. Burtt in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiii. 36 (1932).—Congo Belg.; Rhodesia.
paleacea *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya,* 58 (1935).—Kenya Col.
Quarrei *Hutchinson & B. L. Burtt in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3217 (1933).—Congo Belg.

ERMANIA Cham. (Crucif.).
albiflora (*T. Anders.*) *O. E. Schulz in Fedde, Repert.* xxxi. 333 (1933), in obs.; *et in Engl. Jahrb.* lxvi. 98 (1933): Cheiranthus albiflorus.
flabellata (*Regel*) *O. E. Schulz in Engl. Jahrb.* lxvi. 98 (1933): Parrya flabellata.
Koelzii *O. E. Schulz in Fedde, Repert.* xxxi. 332 (1933).—Kashmir.
lanuginosa (*Hook. f. & Thoms.*) *O. E. Schulz, l. c.* xxxiii. 185 (1933): Parrya lanuginosa.
Parkeri *O. E. Schulz, l. c.* xxxi. 333 (1933).—Kashmir.
prolifera (*Maxim.*) *O. E. Schulz in Engl. Jahrb.* lxvi. 98 (1933): Parrya prolifera.
Stewartii (*T. Anders.*) *O. E. Schulz in Fedde, Repert.* xxxi. 332 (1933), in obs.; *et in Engl. Jahrb.* lxvi. 98 (1933): Cheiranthus Stewartii.
villosa (*Maxim.*) *O. E. Schulz in Fedde, Repert.* xxxiii. 186 (1933): Parrya villosa.

ERNESTELLA Germain de Saint Pierre in Journ. des Roses, 1878, 39, in obs.; Hurst in Verh. V. Internat. Kongr. Vererbungswissensch. Berlin, 1927, ii. 902 (1928), in obs. *ROSACEAE.*
bracteata (*Wendl.*) *Germain de Saint Pierre, l. c.,* in obs.; *Hurst, l. c.,* in obs.: Rosa bracteata.

ERNESTIA DC. (Melastomatac.).
cataractae *Tutin in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 308.—Guiana Brit.
Pullei *Gleason in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1935, xxxii. 203.—Guiana Bat.

ERODIUM L'Hérit. (Geraniac.).
adenophorum *Blatter in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxvi. 476 (1933).—Ind. or. (Waziristan).
Costei *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 145 [1933], nomen.—Marocc.
deserti (*Eig*) *Eig in Beih. Bot. Centralbl.* I. II. 237 (1932), in obs.: E. moschatum subsp. deserti.
Heribaudi *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 145 [1933], nomen.—Marocc.
hesperium (*Maire*) *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 93 (1932): E. laciniatum var. hesperium.
heterosepalum *Blatter in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxvi. 478 (1933).—Ind. or. (Waziristan).
× hybridum *Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1906, xii. 91.—Hort.
Jahandiezianum *Emberger, Maire & Weiller in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord,* 1931, xxii. 283.—Marocc.
× Kolbianum *Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1906, xii. 91.—Hort.
marocanum *Battand. & Pitard in Pitard, Contrib. Étude Fl. Maroc,* 8 (1918).—Marocc.

ERODIUM:—
nanum *Blatter in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxvi. 476 (1933).—Ind. or. (Waziristan).
saxatile *Martinez in Mem. Soc. Esp. Hist. Nat.* xiv. 447 (1934): E. valentinum *Boiss. & Reut.*
schemachense *Grossheim, Fl. Kavkaza,* iii. 10 (1932).—Caucas.
subintegrifolium *Eig in Beih. Bot. Centralbl.* l. II. 230 (1932).—Palaest.
sublyratum *G. Sampaio; G. Sampaio in Bol. Soc. Brot.* Sér. II. x. 132 (1935), in clavi.—Lusitan.
telavivense *Eig in Fedde, Repert. Beih.* lxiii. I. 113 (1931), nomen; *et in Beih. Bot. Centralbl.* l. II. 233 (1932), descr.—Palaest.
×Willkommianum *Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1906, xii. 91.—Hort.

ERUCA Mill. (Crucif.).
trichocarpa *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 8 [1933], nomen.—Marocc.

ERUCARIA Gaertn. (Crucif.).
rostrata *Boiss. ex Dinsm. in Post, Fl. Syria, Palest. & Sinai,* ed. 2, i. (*Publ. Am. Univ. Beirut,* Nat. Sc. Ser. No. 1) 129 (1932), in syn.: Didesmus rostratus.

ERUCASTRUM Presl (Crucif.).
hispidum *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 9 [1933], nomen.—Marocc.
humile (*Lamotte*) *Bonnier & Layens in Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* i. 63 [1912]: Brassica humilis.
minutiflorum *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 230 [1928].—Marocc.
Paui *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 9 [1933], in syn.: E. Thellungi.
Rouyanum (*Janka*) *Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* i. 63 [1912]: Brassica Rouyana.
saxatile (*DC.*) *Bonnier & Layens in Bonnier, l. c.*: Diplotaxis saxatilis.
tenuisiliquosum *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 9 [1933]: E. varium var. hispidum *Maire & Sennen?*

ERVATAMIA Stapf (Apocynac.).
Blumeana *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xii. 547 (1935): Tabernaemontana pauciflora *Blume,* non Ervatamia pauciflora *Ridley.*
bovina (*Lour.*) *Markgraf, l. c.*: Tabernaemontana bovina.
cordata (*Merrill*) *Markgraf, l. c.* 548: Tabernaemontana cordata.
Cumingiana (*A. DC.*) *Markgraf, l. c.* 547: Tabernaemontana Cumingiana.
dichotoma (*Roxb.*) *Burkill in Kew Bull.* 1935, 317; *Burkill, Dict. Econ. Prod. Mal. Penins.* i. 940 (1935), in obs.: Tabernaemontana dichotoma.
linearifolia (*Merrill*) *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xii. 548 (1935): Tabernaemontana linearifolia.
Merrilliana *Markgraf, l. c.*: Tabernaemontana caudata *Merrill,* non Ervatamia caudata *Gamble.*
mindorensis (*Merrill*) *Markgraf, l. c.*: Tabernaemontana mindorensis.
mucronata (*Merrill*) *Markgraf, l. c.*: Tabernaemontana mucronata.
nemoralis (*Pitard*) *Markgraf, l. c.* 547: Tabernaemontana nemoralis.
obtusiuscula *Markgraf, l. c.* 547, 551.—Ins. Viti.; Ins. Tonga; Ins. Samoa.
polygama (*Blanco*) *Markgraf, l. c.* 548: Tabernaemontana polygama.
rostrata (*Wall.*) *Markgraf, l. c.* 547: Tabernaemontana rostrata.
sphaerocarpa (*Blume*) *Burkill in Kew Bull.* 1935, 317; *Burkill, Dict. Econ. Prod. Mal. Penins.* i. 940 (1935), in obs.: Tabernaemontana sphaerocarpa.
tonkinensis (*Pierre ex Pitard*) *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xii. 547 (1935): Tabernaemontana tonkinensis.

ERYCIBE Roxb. (Convolvulac.).
dolichotricha *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 189 (1934).—Sumatra.
elliptilimba *Merrill & Chun in Sunyatsenia,* ii. 45 (1934).—China (Hainan).
myriantha *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 70 (1934).—China (Hainan).

ERYCIBE:—
sumatrensis *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 190 (1934).—Sumatra.

ERYNGIUM L. (Umbellif.).
amorginum *K. H. Rechinger in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 9.—Ins. Aegeae (Amorgos).
caespitiferum *Font Quer & Pau in Cavanillesia,* iv. 30 (1931).—Marocc.
cuneifolium *Small, Man. Southeast. Fl.* 964 (1933).—U.S.A. (Florida).
Dorae *C. Norman in Journ. Bot.* 1931, lxix. 100.—Urug.
×Embergeri *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 46 [1933].—Marocc.
×hybridum *Hort. ex Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters,* 218 (1924).—Hort.
marocanum *Pitard, Contrib. Étude Fl. Maroc,* 17 (1918).—Marocc.
×Mohamedanii *Font Quer & Pau in Cavanillesia,* iv. 31 (1931).—Marocc.
supinum (*F. Muell.*) *J. M. Black in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1931, lv. 140: E. plantagineum var. supinum.
Woronowi *Bordz. in Fedde, Repert.* xxxvi. 303 (1934).—Armen. Ross.
×Zabelii *Hort. ex Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters,* 219 (1924).—Hort.

ERYSIMUM L. (Crucif.).
absconditum *O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 225 (1931).—Tibet.
croceum *Popov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n. s. xliv. 130.—Turkestan. (Thian Shan).
cyaneum *Popov in Vved. & al., Key Fl. Tashkent,* 157 (1924).—Turkestan.
Drenowskii *Degen in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 73.—Bulgar.
Eusebii *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 145 [1933], nomen.—Marocc.
hajastanicum *Wissj. & Bordz. in Bull. Jard. Bot. Kieff,* xii–xiii. 125 (1931).—Armen.
×hybridum *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters,* 219 (1924).—Hort.
Krynitzkii *Bordz. in Bull. Jard. Bot. Kieff,* xii–xiii. 127 (1931).—Caucas.
Mairei *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 145 [1933], nomen.—Marocc.
Pallasii (*Pursh*) *Tolmatch. in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo,* lxviii. 170 (1930): Cheiranthus Pallasii.
remotiflorum *O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 226 (1931).—Ind. or. (Bombay).
samarkandicum *Popov in Bull. Univ. As. Centr.* ix. Suppl., 24 (1925), in obs.: E. purpureum var. turkestanicum *Franch.*
Schlagintweitianum *O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 227 (1931).—Kumaon; Tibet.
sinuatum (*Franch.*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 357 (1931): E. cheiranthoides var. sinuatum.
strictisiliquum *N. Busch in Bull. Acad. Sc. URSS,* 1931, Sér. VII. 458.—Armen.
vitellinum *Popov in Vved. & al., Key Fl. Tashkent,* 157 (1924).—Turkestan.

ERYTHEA S. Wats. (Palmae).
loretensis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 29 (1933–5).—Calif. infer.

ERYTHRAEA Renealm. ex Borkh. (Gentianac.).
aperta *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 119 (1932), in syn.: Centaurium apertum.
brasiliensis *Gilg-Benedict in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 903 (1933).—Bras. (Minas Geraes).
×jolivetina *P. Fourn. in Le Monde des Plantes,* 1931, xxxii. 26.—Gallia.
laxiflora *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 118 (1932), in syn.: Centaurium laxiflorum.

ERYTHRINA L. (Legumin.).
Adansonii *Hort. ex Colla, Herb. Pedem.* ii. 249 (1834), in syn.: E. crista-galli.
boninensis *Tuyama in Bot. Mag., Tokyo,* 1935, xlix. 373.—Ins. Bonin.
Burttii *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1932, lxx. 254.—Tanganyika Terr.
gibbosa *Cufod. in Archiv. Bot., Forlì,* 1934, x. 34.—Costa Rica.

ERYTHRINA:—
globocalyx *Porsch & Cufod. in Archiv. Bot., Forlì,* 1934, x. 35.—Costa Rica.
lysistemon *Hutchinson in Kew Bull.* 1933, 422, in adnot.—Transvaal.
Martii *Colla, Herb. Pedem.* ii. 250 (1834).—Bras.
rotundato-obovata *E. G. Baker in Kew Bull.* 1932, 95.—Tanganyika Terr.
sandwicensis *Degener, Fl. Hawaiiensis,* Fam. 169c (1932): E. monosperma *Gaudich.*
Schliebenii *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xii. 512 (1935).—Tanganyika Terr.

ERYTHROCHITON Nees & Mart. (Rutac.).
delitescens *Morton in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 356.—Bras. (Matto Grosso).

ERYTHROCOCCA Benth. (Euphorbiac.).
sansibarica *Pax in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 7 (1921), in obs., nomen.—Afr. trop. or.

ERYTHRODES Blume (Orchidac.).
formosana *Schlechter; Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan,* 1931, iii. 239, descr. ampl.—Formosa.
triloba *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements,* viii. 181 (1935).—Borneo.

ERYTHRONIUM L. (Liliac.).
caucasicum *Woronow in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS,* Ser. I. Fasc. 1, 214 (1933).—Caucas.
helenae *Applegate in Contrib. Dudley Herb. Stanford Univ.* i. 188 (1933).—U.S.A. (Calif.).
nudopetalum *Applegate, l. c.* 189.—U.S.A. (Idaho).
oregonum *Applegate in Madroña,* iii. 99 (1935).—Brit. Columb.; Washington; Oregon.
pallidum *Geyer ex Applegate, l. c.* 86, in obs.—U.S.A. (Idaho).
sibiricum (*Fisch. & Mey.*) *Krylov, Fl. Sibir. Occ.* iii. 641 (1929): E. Dens-canis var. sibiricum.

ERYTHROPHLEUM Afzel. ex R. Br. in Tuckey, Exped. River Zaire (Congo), 430 (1818), in obs., nomen; et in Denham, Clapperton & Oudney, Trav. N. & Centr. Afr., Journ. Excurs. 235 (1826), in obs., nomen subnudum; G. Don, Gen. Syst. ii. 423 (1832), descr. *LEGUMINOSAE.*

ERYTHROPHYSA E. Mey. (Sapindac.).
alata (*Eckl. & Zeyh.*) *Hutchinson in Kew Bull.* 1932, 150: Fagara alata.

ERYTHROPSIS Lindl. (Sterculiac.).
Barteri (*Mast.*) *Ridley in Kew Bull.* 1934, 216: Sterculia Barteri.
colorata (*Roxb.*) *Burkill in Gard. Bull. Straits Settlements,* v. 231 (1931): Sterculia colorata.
erythrosiphon (*Baill.*) *Ridley in Kew Bull.* 1934, 217: Sterculia erythrosiphon.
Migeodii (*Exell*) *Ridley, l. c.* 216: Firmiana Migeodii.
pallens *Ridley, l. c.* 215.—Ind. or.

ERYTHROSELINUM Chiov. (Umbellif.).
lefeburioides *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 821 (1921), in obs.—Afr. trop.

ERYTHROSPERMUM Lam. (Flacourtiac.; Bixac., Gen. Pl.).
zeylanicum (*Gaertn.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon,* vi. Suppl., 14 (1931): Pectinea zeylanica.

ERYTHROXYLUM P. Br. (Erythroxylac.; Linac., Gen. Pl.).
amplifolium *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris,* No. 75, 599 (1886).—Madag.
Boivinianum *Baill. l. c.*—Madag.
Bradeanum *O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 722 (1933).—Bras. (Rio de Janeiro).
Carvalhoi (*Engl.*) *Phillips in S. Afr. Journ. Sc.* 1935, xxxii. 308: Nectaropetalum Carvalhoi.
cearense *Diogo in Bol. Mus. Nac. Rio de Janeiro,* i. 29 (1923).—Bras. (Ceará).
Christii *O. E. Schulz in Fedde, Repert.* xxx. 179 (1932), nomen.—Venez.
coffeifolium *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris,* No. 76, 605 (1886).—Madag.
congolense (*S. Moore*) *Phillips in S. Afr. Journ. Sc.* 1935, xxxii. 308: Nectaropetalum congolense.

ERYTHROXYLUM:—
corymbosum *Boivin ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, No. 76, 606 (1886).—Madag.
crassipes *Baill. l. c.* 605.—Madag.
Fischeri *Engl. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C. 226 (1895).—Afr. trop.
Kassneri (*Engl.*) *Phillips in S. Afr. Journ. Sc.* 1935, xxxii. 308: Nectaropetalum Kassneri.
Kirkianum *O. E. Schulz in Fedde, Repert.* xxx. 179 (1932).—Bras. (Amaz.).
Laurel *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, No. 75, 600 (1886).—Madag.
Lofgrenii *Diogo in Bol. Mus. Nac. Rio de Janeiro*, i. 30 (1923).—Bras. (Ceará).
luculentum *Macbride in Candollea*, v. 372 (1934).—Peruv.
nossibeënse *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, No. 75, 600 (1886).—Madag.
Pervillei *Baill. l. c.* No. 76, 606 (1886).—Madag.
Richardianum *Baill. l. c.* 605.—Madag.
Rignyanum *Baill. l. c.*—Madag.
Schliebenii *O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 667 (1932).—Tanganyika Terr.
Shatona *Macbride in Candollea*, v. 371 (1934).—Peruv.
Trollii *O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 723 (1933).—Boliv.

ESBLICHIA Rose in Contrib. U. S. Nat. Herb. v. 165 (1899), sphalm.: **Erblichia** Seem. (Turnerac.).

ESCALLONIA Mutis (Saxifragac.).
Atahuallpae *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 23 (1931).—Peruv.
× demissa *Eastw. in Leafl. West. Bot.* i. 68 (1933).—Hort.

ESCHWEILERA Mart. (Lecythidac.; Myrtac., Gen. Pl.).
alba *Knuth in Fedde, Repert.* xxxviii. 115 (1935).—Bras. (Amaz.; Pará).
apiculata (*Miers*) *A. C. Smith in Phytologia*, i. 124 (1935): Chytroma apiculata.
bogotensis *Knuth in Fedde, Repert.* xxxviii. 115 (1935).—Colomb.
brancoënsis *Knuth, l. c.*—Bras. (Amaz.).
Carrii *Standley in Tropical Woods*, 1932, No. 29, 7.—Bras. (Pará).
chartacea (*Berg*) *Eyma, Polygonac. Guttif. & Lecythidac. Surinam*, 70 (1932): Lecythis chartacea.
collina *Eyma, l. c.*—Guiana Bat.
congestiflora (*Benoist*) *Eyma, l. c.* 71: Lecythis congestiflora.
decolorans *Sandwith in Kew Bull.* 1932, 214.—Guiana Brit.
floribunda *Eyma, Polygonac. Guttif. & Lecythidac. Surinam*, 74 (1932).—Guiana Bat.
grata *Sandwith in Kew Bull.* 1932, 216.—Guiana Brit.
holcogyne *Sandwith, l. c.* 1935, 126.—Guiana Brit.
Krukovii *A. C. Smith in Phytologia*, i. 124 (1935).—Bras. (Amaz.).
labriculata *Eyma, Polygonac. Guttif. & Lecythidac. Surinam*, 75 (1932).—Guiana Bat.
manaosensis *Knuth in Fedde, Repert.* xxxviii. 116 (1935).—Bras. (Amaz.).
obtecta (*Miers*) *A. C. Smith in Phytologia*, i. 125 (1935): Jugastrum obtectum.
polyantha *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 381.—Bras. (Matto Grosso).
praeclara *Sandwith in Kew Bull.* 1935, 127.—Guiana Brit.
Rimbachii *Standley in Tropical Woods*, 1935, No. 42, 31.—Ecuador.
rorida (*Miers*) *A. C. Smith in Phytologia*, i. 124 (1935): Chytroma rorida.
sessilis *A. C. Smith, l. c.* i. 21 (1933).—Colomb.
simiorum (*Benoist*) *Eyma, Polygonac. Guttif. & Lecythidac. Surinam*, 81 (1932): Lecythis simiorum.
truncata *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 382.—Bras. (Matto Grosso).
Wachenheimii (*Benoist*) *Sandwith in Kew Bull.* 1932, 215, cum descr. ampl.: Lecythis Wachenheimii.

ESCOBARIA Britton & Rose (Cactac.).
Boregui *Schmoll ex Shurly in Cactus Journ.* iv. 11 (1935).—Mexico.
Leei (*Rose*) *Bödeker, Mammill.-Vergl.-Schlüss.* 17 (1933); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 145: Mammillaria Leei.
Muehlbaueriana (*Bödeker*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 380 (1935): Coryphantha Muehlbaueriana.
Orcutti *Bödeker, Mammill.-Vergl.-Schlüss.* 17 (1933); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 145.—U.S.A. (Texas)?

ESCOBEDIA Ruiz & Pav. (Scrophulariac.).
brachydonta *Pennell in Proc. Acad. Sc. Philad.* 1931, lxxxiii. 422.—Colomb.
brevipes *Pennell, l. c.* 418.—Peruv.; Boliv.
crassipes *Pennell, l. c.* 422.—Mexico.
curialis (*Vell.*) *Pennell, l. c.* 417: Silvia curialis.
foliolosa *Pennell, l. c.* 419.—Ecuador; Peruv.
longiflora *Pennell, l. c.* 423.—Mexico; Guatem.
obtusifolia *Pennell, l. c.* 419.—Boliv.
parimensis *Pennell, l. c.*—Bras. (Amaz.).
parvifolia *Pennell, l. c.* 418.—Colomb.
peduncularis *Pennell, l. c.* 423.—Mexico.
reticulata *Pennell, l. c.* 420.—Costa Rica.

ESENBECKIA H. B. & K. (Rutac.).
coriacea *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 358.—Bras. (Amaz.; Matto Grosso).
venulosa *Macbride in Candollea*, v. 376 (1934).—Peruv.

ESPELETIA Mutis ex Humb. & Bonpl. (Compos.).
alba *A. C. Smith in Brittonia*, i. 512 (1935).—Venez.
atropurpurea *A. C. Smith, l. c.* 508.—Venez.
canescens *A. C. Smith, l. c.* 516.—Colomb.
centroandina *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 26, 17 (1933), in syn.: E. Hartwegiana.
conglomerata *A. C. Smith in Brittonia*, i. 515 (1935).—Colomb.
Hartwegiana *Cuatrec. ex Herzog, Pflanzengeogr.* 11 (1933); *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 27, Cuadro 12 (1934).—Colomb.
occidentalis *A. C. Smith in Brittonia*, i. 520 (1935).—Colomb.
phaneractis (*Blake*) *A. C. Smith, l. c.* 525: E. argentea subsp. phaneractis.
santanderensis *A. C. Smith, l. c.* 527.—Colomb.
Standleyana *A. C. Smith, l. c.* 514.—Colomb.
thyrsiformis *A. C. Smith, l. c.* 513.—Venez.

ESPOSTOA Britton & Rose (Cactac.).
Dautwitzii *Backeb. in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1931, xlvi. 187, 207, in obs.—Peruv.
gigantea *Backeb. l. c.* 187, in obs., 206.—Peruv.
Humboldtiana *Backeb. in Cact. & Succ. Journ. Amer.* iii. 131 (1932), in obs.—Peruv.
Humboldtii *Backeb. in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1931, xlvi. 187, in obs., 206.—Peruv.
sericata (*Werderm. & Backeb.*) *Backeb. in Cact. & Succ. Journ. Amer.* iii. 131 (1932), in obs.; *et in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 340 (1935): Cereus lanatus subsp. sericatus.

ESQUIROLIELLA Léveillé in Le Monde des Plantes, 1916, xviii. 31, in obs.: **Martinella** Léveillé (Crucif.).

ETHULIA L. f. (Compos.).
glomerata *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 314 (1834).—Bras.
triflora *Koster in Blumea*, i. 375 (1935).—Ins. Sunda (Timor).

EUADENIA Oliv. (Capparidac.).
brevipetala *Exell in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. Suppl., 12.—Congo Lusit.

EUBOTRYOIDES (Nakai) Hara in Journ. Jap. Bot. 1935, xi. 626. *ERICACEAE.*
[LEUCOTHOË sect. EUBOTRYOIDES Nakai.]
Grayana (*Maxim.*) *Hara, l. c.* 627: Leucothoë Grayana.

EUCALYPTUS L'Hérit. (Myrtac.).
abbreviata *Blakely & Jacobs in Blakely, Key Eucalypts*, 77 (1934).—N. Austral.

EUCALYPTUS:—
acacioides *A. Cunn. ex Ewart, Fl. Vict.* 843 (1935), in syn.: E. viridis.
anceps (*R. Br.*) *Blakely, Key Eucalypts*, 118 (1934): E. conglobata var. anceps.
apodophylla *Blakely & Jacobs in Blakely, l. c.* 165.—N. Austral.
arenaria *Blakely, l. c.* 81.—W. Austral.
argentea *Cord. ex Blakely, l. c.* 315, in syn.: E. melliodora.
argophloia *Blakely, l. c.* 256.—Austral. (Queensland).
aromatica *Colla, Herb. Pedem.* ii. 423 (1834), in obs., nomen.—Hab.?
Beaselyi *Blakely, Key Eucalypts*, 234 (1934).—Austral. (Queensland).
bipileata *Blakely, l. c.* 253.—Austral. (N. S. Wales).
brachycalyx *Blakely, l. c.* 119.—S. Austral.
brachycorys *Blakely, l. c.*—W. Austral.
× brevirostris *Blakely, l. c.* 183.—Austral. (Victoria).
caliginosa *Blakely & McKie in Blakely, l. c.* 181.—Austral. (Queensland; N. S. Wales).
Cameroni *Blakely & McKie in Blakely, l. c.* 180.—Austral. (N. S. Wales).
campanifructa *Blakely, l. c.* 228.—Austral. (N. S. Wales).
cephalocarpa *Blakely, l. c.* 164: E. cinerea var. multiflora *Maiden.*
Coolabah *Blakely & Jacobs in Blakely, l. c.* 245.—Austral.
coronata *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 87 (1931), nomen; *C. A. Gardner in Journ. Roy. Soc. W. Austral.* 1932–3, xix. 86 (1934), descr.—W. Austral.
cotinifolia *Colla, Herb. Pedem.* ii. 423 (1834), in obs.—Hab.?
currabubula *Blakely, Key Eucalypts*, 229 (1934).—Austral. (N. S. Wales).
Curtisii *Blakely & C. T. White in Proc. Roy. Soc. Queensl.* 1930, xlii. 82 (1931).—Austral. (Queensland).
cyanoclada *Blakely, Key Eucalypts*, 242 (1934).—N. Austral.
cyathiformis *Blakely & McKie in Blakely, l. c.* 179.—Austral. (Queensland; N. S. Wales).
cylindrocarpa *Blakely, l. c.* 116.—W. Austral.
decepta *Blakely, l. c.* 249.—Austral. (Queensland; N. S. Wales).
Dorisiana *Blakely, l. c.* 227.—Austral. (N. S. Wales).
Ednaeana *Blakely, l. c.* 247.—Austral. (N. S. Wales).
erythrophloia *Blakely, l. c.* 80.—W. Austral.; Queensland.
firma *F. Muell. ex Miq. in Ned. Kruidk. Arch.* iv. 133 (1856), in obs.—Austral.
Fitzgeraldi *Blakely, Key Eucalypts*, 239 (1934).—W. Austral.
Froggattii *Blakely, l. c.* 225.—Austral. (Victoria).
Jacobsiana *Blakely, l. c.* 92.—N. Austral.
Kirtoniana *F. Muell. Eucalyptogr.* Dec. I. (1879), in obs., sub E. resinifera; *et l. c.* Dec. VII. (1880), in obs., sub E. robusta.—Austral.
lamprocalyx (sphalm. lamprocarpa) *Blakely, Key Eucalypts*, 87, 323 (1934).—W. Austral.
Largeana *Blakely & de Beuzev. in Blakely, l. c.* 232.—Austral. (N. S. Wales).
laurifolia *Behr. ex Blakely, l. c.* 324, in syn.: E. oleosa.
leiophloia *Blakely & Jacobs in Blakely, l. c.* 82.—W. et N. Austral.
leptocalyx *Blakely, l. c.* 118.—W. Austral.
leptocarpa *Blakely, l. c.* 230.—Austral. (N. S. Wales).
Lucasi *Blakely, l. c.* 226.—W. Austral.
macropoda *Blakely, l. c.* 87.—W. Austral.
major (*Maiden*) *Blakely, l. c.* 100: E. propinqua var. major.
malacoxylon *Blakely, l. c.* 145: E. Stuartiana var. grossa *Maiden.*
Meeboldii *Blakely, l. c.* 121.—W. Austral.
microstoma *Blakely, l. c.* 325, in syn.: E. doratoxylon.
montana (*Deane & Maiden*) *Blakely, l. c.* 207: E. haemastoma var. montana.
nesophila *Blakely, l. c.* 90.—N. Austral.
niphophloia *Blakely & Jacobs in Blakely, l. c.* 79.—N. Austral.

EUCALYPTUS:—
oxypoma *Blakely, Key Eucalypts,* 244 (1934).—Austral. (N. S. Wales).
petrophila *Blakely, l. c.* 199.—Austral. (N. S. Wales).
phaeotricha *Blakely & McKie in Blakely, l. c.* 182.—Austral. (Queensland).
pileata *Blakely, l. c.* 120.—W. Austral.
puncticulata (*Benth.*) *Blakely, l. c.* 114: E. dumosa var. puncticulata.
remota *Blakely, l. c.* 197.—S. Austral.
rhodophloia (*Benth.*) *Blakely, l. c.* 115: E. dumosa var. rhodophloia.
rigescens *Blakely, l. c.* 207.—Austral. (N. S. Wales).
rivularis *Blakely, l. c.* 253.—Austral. (Queensland; N. S. Wales).
Robsonae *Blakely & McKie in Blakely, l. c.* 236.—Austral (N. S. Wales).
rugosa *R. Br. ex Blakely, l. c.* 120.—W. Austral.
sessilis (*Maiden*) *Blakely, l. c.* 276: E. pachyphylla var. sessilis.
sparsifolia *Blakely, l. c.* 190.—Austral. (N. S. Wales).
Staeri *Maiden ex Kessell & C. A. Gardner in For. Dep. Bull., W. Austral.* No. 34, 110 (1924); *Maiden in Journ. & Proc. Roy. Soc. N. S. Wales,* 1925, lix. 197.—S. W. Austral.
Steedmanii *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 88 (1931), nomen; *C. A. Gardner in Journ. Roy. Soc. W. Austral.* 1932–3, xix. 87 (1934), descr.—W. Austral.
stellaris *Blakely, Key Eucalypts,* 192 (1934).—Austral. (N. S. Wales).
tasmanica *Blakely, l. c.* 214: E. Risdoni var. elata *Benth.*
tenuipes *Blakely & C. T. White in Proc. Roy. Soc. Queensl.* 1930, xlii. 84 (1931).—Austral. (Queensland).
tephrophloia *Blakely, Key Eucalypts,* 198 (1934).—Austral. (N. S. Wales).
triflora (*Maiden*) *Blakely, l. c.* 201: E. virgata var. triflora.
verrucosa *Huguen. ex Colla, Herb. Pedem.* ii. 422 (1834), in obs.—Ital. ?
Wandoo *Blakely, Key Eucalypts,* 112 (1934): E. redunca var. elata *Benth.*
Wiburdi *Blakely, l. c.* 177.—Austral. (N. S. Wales).
Yangoura *Blakely, l. c.* 180.—Austral. (Victoria; N. S. Wales).
zygophylla *Blakely, l. c.* 88.—W. Austral.

EUCEPHALUS Nutt. (Compos.).
bicolor *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 157 (1931).—U.S.A. (Calif.).
glandulosus *Eastw. l. c.*—U.S.A. (Oregon).

EUCHARIS Planch. (Amaryllidac.).
Castelnaeana (*Baill.*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., xi. 47 (1931): Callihruria Castelnaeana.

EUCNIDE Zucc. (Loasac.).
Parryi *House in Bull. N. Y. State Mus.* 1920, Nos. 233–4, 67 (1921): Mentzelia urens *Parry ex A. Gray.*

EUCRYPHIA Cav. (Eucryphiac.; Rosac., Gen. Pl.).
cordata *Loud. Encycl. Pl.* ii. 1394 (1855), sphalm.: E. cordifolia.
glandulosa *Reiche, Fl. Chile,* i. 268 (1896), sphalm.: E. glutinosa.
glutinosa (*Poepp. & Endl.*) *Baill. Hist. Pl.* i. 401 (1867–9), in adnot.: Fagus glutinosa.
lucida (*Labill.*) *Baill. l. c.* 402, in adnot.: Carpodontos lucida.
pinnatifida *Schnizl. Icon. Fam. Nat. Veg.* iii. t. 204* (1854), sphalm.: E. pinnatifolia.

EUFRAGIA Griseb. (Scrophulariac.).
(sphalm. Euphragia) flaviflora (*Boiss.*) *Pavlov in Sovietsk. Bot.* 1934, No. 1, 27, in obs.: E. latifolia var. flaviflora.

EUGENIA L. (Myrtac.).
albimarginata *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 28 (1932).—Haiti.
anisopetala *R. N. Parker in Fedde, Repert.* xxxi. 125 (1932).—Ind. or. (Assam).
anthera *Small, Man. Southeast. Fl.* 935 (1933).—U.S.A. (Florida).

EUGENIA:—
Arawakorum *Sandwith in Kew Bull.* 1932, 211.—Guiana Brit.
Arechavaletae *Herter, Fl. Urug. Pl. Vasc.* (*Estud. Bot. Reg. Urug.* iv.) 93 (1931): Stenocalyx oblongifolius.
bankensis (*Hassk.*) *Backer, Schoolfl. Java,* 508 (1911): Microjambosa bankensis.
Barringtonii *Hole ex Chalk & Chattaway in Tropical Woods,* 1935, No. 41, 24, nomen.—Hab. ?
belizensis *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., xi. 137 (1932).—Brit. Honduras.
bumelioides *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 75 (1935).—Brit. Honduras.
Consolatae *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya,* 45 (1935).—Kenya Col.
crucigera *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich,* 1933, lxxviii. Beibl. 19, 295.—N. Caled.
curvistyla *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 83, 21 (1931).—Ins. Viti.
djalonensis *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 200 (1927), in syn.: E. Elliottii.
erythrocalyx *C. T. White in Contrib. Arn. Arb.* No. IV. 78 (1933).—Austral. (Queensland).
essequiboënsis *Sandwith in Kew Bull.* 1932, 211.—Guiana Brit.
euneura (*Miq.*) *Craib, Fl. Siam. Enum.* i. 640 (1931): Syzygium euneuron.
euonymifolia *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* xi. 22 (1932).—China (Kwangtung).
flaviflora *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot Ser., viii. 320 (1931).—Brit. Honduras.
Gerrardii (*Harv.*) *Sim, Forest Fl. Cape of Good Hope,* 226 (1907): Acmena Gerrardi.
glabra *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon,* vi. Suppl., 120 (1931): E. decora *Thwait.*, partim.
Hookeriana *Hort. ex McMinn & Maino, Pacific Coast Trees,* 317 (1935), in syn.: E. paniculata.
jeremiensis *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 29 (1932).—Haiti.
Kleineana *Engl. in Engl. Jahrb.* liv. 339 (1917): E. Soyauxii.
koolauensis *Degener, Fl. Hawaiiensis,* Fam. 273 (1932).—Ins. Sandvic. (Oahu).
kwangtungensis *Merrill in Sunyatsenia,* i. 202 (1934).—China (Kwangtung).
latilimba *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 64 (1934).—China (Hainan).
leptalea *Craib, Fl. Siam. Enum.* i. 649 (1931): E. leptantha *Wight.*
Levinei *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 39 (1934).—Kwangtung; Hongkong; Hainan; Tonkin.
Luetzelburgii *Burret ex Luetzelb. Estudo Bot. Nordéste, Rio de Janeiro,* iii. 29, 200 (1923) [*Insp. Fed. Obras Secc.* Publ. 57], nomen; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 150.—Bras. (Bahia).
Lundellii *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 76 (1935).—Mexico; Guatem.
macradenia *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 28 (1932).—Santo Domingo.
megacarpa *Craib, Fl. Siam. Enum.* i. 652 (1931): E. macrocarpa *Roxb.*
nandarivatensis *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 83, 22 (1931).—Ins. Viti.
palauensis *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo,* 1931, xlv. 335.—Ins. Palau.
pauper *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1933, Sér. II. v. 245, nomen.—N. Caled.
perplexans *R. O. Williams in Fl. Trinidad & Tobago,* i. 350 (1934).—Trinidad.
ploumensis *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich,* 1933, lxxviii. Beibl. 19, 298.—N. Caled.
psychotrioides *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* ii. 432 (1834), in syn.: Myrtus psychotrioides.
rariflora *Benth.*; *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 130, 201 (1935), descr. emend.—Polynes. austr.-or.
rigidissima *Cufod. in Archiv. Bot., Forlì,* 1933, ix. 198.—Costa Rica.
rotata *King ex Craib, Fl. Siam. Enum.* i. 660 (1931): E. urceolata *King.*
Schippii *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., xi. 137 (1932).—Brit. Honduras.

EUGENIA:—
Somai *Hayata in Kanehira, Formos. Trees,* [255] (1918), japonice.—Formosa.
somalensis *Chiov. Fl. Somala,* II. 217 (1932).—Somal. Ital.
stelechantha (*Diels*) *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo,* 1931, xlv. 334: Jambosa stelechantha.
stelechanthoides *Kanehira, l. c.* 1932, xlvi. 669.—Ins. Carolin. (Kusai).
subdecurrens (*Miq.*) *Merrill & Chun in Sunyatsenia,* ii. 289 (1935): Syzygium subdecurrens.
Suzukii *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo,* 1931, xlv. 335.—Ins. Palau.
tiburona *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 26 (1932).—Haiti.
trachyphloia *C. T. White in Contrib. Arn. Arb.* No. IV. 80 (1933).—Austral. (Queensland).
Tsoi *Merrill & Chun in Sunyatsenia,* ii. 291 (1935).—China (Hainan).
waianensis *Degener, Fl. Hawaiiensis,* Fam. 273 (1932): E. rariflora var. parvifolia *Hillebr.*, non E. parvifolia *DC.*
Wolfii *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 83, 22 (1931).—Ins. Viti.

EUHYDROBRYUM Koidz. in Y. Doi, Fl. Satsum. ii. 98 (1931). *PODOSTEMACEAE.*
floribundum (*Koidz.*) *Koidz. l. c.* 100: Hydrobryum floribundum.
japonicum (*Imamura*) *Koidz. l. c.* 101: Hydrobryum japonicum.
puncticulatum *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 178.—Japon. (Kiushiu).

EULALIA Kunth (Gramin.).
cantonensis (*Rendle*) *Hitchcock in Lingnan Sc. Journ.* vii. 234 (1931): Pollinia cantonensis.

EULALIOPSIS Honda (Gramin.).
binata (*Retz.*) *C. E. Hubbard in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. sub t. 3262, p. 6 (1935), in adnot.: Andropogon binatus.

EULOPHIA R. Br. (Orchidac.).
cucullata (*Afzel. ex Sw.*) *Steud. Nom. Bot.* ed. 2, 605 (1840): Limodorum cucullatum.
Decaryana *H. Perrier ex Guillaumin & Manguin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1934, Sér. II. vi. 521, nomen; *H. Perrier in Bull. Soc. Bot. France,* 1935, lxxxii. 154, descr.—Madag.
Grandidieri *H. Perrier in Bull. Soc. Bot. France,* 1935, lxxxii. 149.—Madag.
Gusukumai *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa,* 1934, xxiv. 208.—Ins. Liukiu.
Kitamurai *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan,* 1932, iv. 192.—Formosa.
lanceata *H. Perrier in Bull. Soc. Bot. France,* 1935, lxxxii. 156.—Madag.
lokobensis *H. Perrier, l. c.* 153.—Madag.
montis-elgonis *Summerhayes in Kew Bull.* 1932, 509.—Afr. trop. or. (Elgon).
nervosa *H. Perrier in Bull. Soc. Bot. France,* 1935, lxxxii. 150.—Madag.
palmicola *H. Perrier, l. c.* 158.—Madag.
Poilanei *Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1931, Sér. II. iii. 683.—Anam; Cambodia; Cochinch.
pretoriensis *L. Bolus in Fl. Pl. S. Afr.* 1933, xiii. t. 500.—Transvaal.
Schlechterii *H. Perrier in Bull. Soc. Bot. France,* 1935, lxxxii. 154: Eulophidium ambongense.
Segawae *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo,* 1934, xlviii. 437.—Formosa.
spatulifera *H. Perrier in Bull. Soc. Bot. France,* 1935, lxxxii. 157.—Madag.
Stolzeana *Kraenzl. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* ii. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 444 (1908), in obs.—Tanganyika Terr.

EULYCHNOCACTUS Backeb. in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit. 1931, xlvi. 207, in obs. *CACTACEAE.*
bolivianus *Backeb. l. c.*, in obs.—Boliv.

EUNOMIA DC. (Crucif.).
caespitosa (*Boiss.*) *O. E. Schulz in Engl. Jahrb.* lxvi. 95 (1933), in obs.: Aethionema caespitosum.
sagittata (*Boiss.*) *O. E. Schulz, l. c.*, in obs.: Aethionema sagittatum.

EUNOMIA:—
trinervia (*DC.*) *Prantl in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* iii. II. 165 (1891): Hutchinsia trinervia.

EUODIA J. R. & G. Forst. (Rutac.).
[Vide EVODIA.]

EUONYMUS L. (Celastrac.).
Arakianus *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 174.—Japon.
castaneifolius *Ridley in Kew Bull.* 1931, 36.—Borneo.
Chenmoui *Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., x. 75 (1935).—China (Anhwei).
dichotomus *Heyne ex Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 410 (1824).—Ind. or.
echinatus *Wall. l. c.*—Nepal.
fimbriatus *Wall. l. c.* 408.—Reg. Himal.
Forrestii *Comber ex Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 663 (1933), nomen; *Comber in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 242 (1934), descr.—China (Yunnan).
Fortunei (*Turcz.*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 660 (1933): Elaeodendron Fortunei.
frigidus *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 409 (1824).—Reg. Himal.
fusiformis *R. N. Parker in Fedde, Repert.* xxix. 104 (1931).—Burma (Tenasserim).
garcinifolius *Roxb. Hort. Beng.* 18 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 403 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 628 (1832).—Ind. or. (Assam).
Georgei *Comber in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 242 (1934).—China (Yunnan).
glaber *Roxb. Hort. Beng.* 86 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 403 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 628 (1832).—Ind. or. (Bengal).
grandiflorus *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 404 (1824).—Nepal.
grossus *Roxb. l. c.* 408.—Reg. Himal.
indicus *Heyne ex Roxb. l. c.* 409.—Ind. or.
kansuensis *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 418, in obs.: E. sachalinensis *Maxim. Fl. Tangut.* i. 110 (1889), non *Maxim.* (1881).
kewensis *Hort. ex Hesse in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1932, xlvii. 217.—Hort.
longipedicellatus *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 36 (1934).—China (Hainan).
mongolicus *Nakai apud Nakai & Kitagawa in Rep. 1st. Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. I. (*Pl. Nov. Jehol.* I.) 7 (1934).—Manchur. (Jehol).
Moultoni *Ridley in Kew Bull.* 1931, 36.—Borneo.
nantoënsis *Loes. ex Hand.-Mazz. in Beih. Bot. Centralbl.* lii. Abt. B. 168 (1934), in obs., pro syn.: E. flavescens.
quinquecornutus *Comber in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 243 (1934).—China.
quinquecornutus *Evans ex Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 663 (1933), nomen.—China (Szechuan).
streptopterus *Merrill in Sunyatsenia*, i. 198 (1934).—China (Kwangtung).
subtrinervis *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 247: Echinocarpus Esquirolii.
sumatranus *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 92 (1934).—Sumatra.
ternifolius *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 659 (1933).—China (Szechuan).
tingens *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 406 (1824).—Reg. Himal.
Tsoi *Merrill in Sunyatsenia*, i. 198 (1934).—China (Kwangtung).
vagans *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 412 (1824).—Reg. Himal.
virginicus *Bellardi ex Colla, Herb. Pedem.* ii. 3 (1834), in obs., nomen.—Hab. ?

EUPATORIUM L. (Compos.).
amabile *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 283.—Formosa.
Amori *Cuatrec. in An. Univ. Madrid*, iv. Fasc. 2, 219 (1935).—Peruv.
anachoreticum *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 9 (1934).—Peruv.
angulare *B. L. Robinson, l. c.* n. s. xcvi. 19 (1931): E. fistulosum *B. L. Robinson.*
angusticeps *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 6, 25 (1932).—Bras. (Rio Grande do Sul).
Arsenei *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 10 (1934).—Mexico.

EUPATORIUM:—
atrocordatum *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 12 (1934).—Mexico.
Bartlettii *B. L. Robinson, l. c.* n. s., c. 11 (1932).—Brit. Honduras.
basifolium *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 8, 30 (1932).—Bras. (Matto Grosso).
bathyphlebium *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s., c. 12 (1932).—Venez.
boyacense *B. L. Robinson, l. c.* n. s. civ. 13 (1934).—Colomb.
bullulatum *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 67 (1931).—Haiti.
cabaionum *Urb. & Ekman, l. c.* 65.—Haiti.
caespitosum *Migo in Journ. Shanghai Sc. Inst.* Sect. III. iii. pp. 1–9 (1934); cf. *Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 46, japonice.—China austr.-or.
Celestini *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 27, Cuadro 12 (1934), nomen; *et l. c.* No. 29, p. 15 (1935), descr.—Colomb.
chabrense *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 58 (1931).—Haiti.
Chaseae *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 14 (1934).—Bras. (Minas Geraes).
conspicuum *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 283 (1834).—Bras.
corumbense *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 15 (1934).—Bras. (Matto Grosso).
cuchabense *B. L. Robinson, l. c.* n. s., c. 13 (1932).—Ecuador.
delpechianum *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 60 (1931).—Haiti.
Dusenii *Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 38 (1933).—Bras. (Paraná).
ellipticum *Hook. & Arn.*; *B. L. Robinson in Ostenia*, 356 (1933), descr. emend.—Bras.; Parag.; Argent.
esmeraldae *Cuatrec. in An. Univ. Madrid*, iv. Fasc. 2, 221 (1935).—Ecuador.
fistulosum *Barratt in Wood, Class-Book*, ed. 10, 314 (1849).—Am. bor.
flavidulum *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 61 (1931).—Haiti.
fragile *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s., c. 13 (1932).—Peruv.
gentianoides (*B. L. Robinson*) *B. L. Robinson, l. c.* 14: Brickellia gentianoides.
Gibertii *Baker ex Herter, Fl. Urug. Pl. Vasc.* (*Estud. Bot. Reg. Urug.* iv.) 119 (1931), nomen.—Urug.
glabellum *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 448 (1894), in syn.: E. ligustrinum.
Gongorae *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 29, 17 (1935).—Colomb.
griseopubescens *Dusén ex Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 49 (1933).—Bras. (Paraná).
grossedentatum *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 284 (1834).—Bras.
heterosquameum *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 54 (1931).—Santo Domingo.
hispidulum (*DC.*) *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 8, 20 (1932): E. Maximiliani var. hispidulum.
Holzingeri *Rydb. in Brittonia*, i. 97 (1931).—U.S.A. (Minnesota; Iowa; Missouri).
hosanense *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s., c. 14 (1932).—Boliv.
hotteanum *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 63 (1931).—Haiti.
huantae *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 16 (1934).—Peruv.
hylophorbum *B. L. Robinson, l. c.*—Peruv.
insigne *Malme in Arkiv. Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 8, 28 (1932).—Bras. (Matto Grosso).
iteophyllum *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 57 (1931).—Haiti.
lasiolepis *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcvi. 21 (1931).—Bras. (Rio Grande do Sul).
latisquamulosum (*Hieron.*) *Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 34 (1933): E. rhinanthaceum var. latisquamulosum.
leucocephalum (*Gardn.*) *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 8, 26 (1932): Chromolaena leucocephala.

EUPATORIUM:—
lineare *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 8, 23 (1932).—Bras. (Matto Grosso).
Loefgrenii *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n.s. civ. 18 (1934).—Bras. (S. Paulo).
Lozanoi *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 29, 18 (1935).—Colomb.
lucidum *Colla, Herb. Pedem.* iii. 283 (1834).—Bras.
megaphyllum *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 70 (1933–5).—Mexico.
mercedense *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 19 (1934).—Peruv.
Mexiae *B. L. Robinson, l. c.* 20.—Bras. (Minas Geraes).
microchaeteum *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 62 (1931).—Haiti.
mikaniifolium *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 22 (1934).—Argent.
missionum *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 6, 35 (1932).—Argent.
moralense *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 22 (1934): Kyrstenia rufa *Greene*, non Eupatorium rufum *Spreng. ex DC.*
moritibense *B. L. Robinson, l. c.* 23.—Bras. (Bahia).
mornicola *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 65 (1931).—Haiti.
odoratissimum *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 448 (1894), in syn.: E. ligustrinum.
Ostenii *B. L. Robinson in Ostenia*, 356 (1933).—Parag.
pacificum *B. L. Robinson in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 99 (1931); *et in Contrib. Gray Herb.* n. s., c. 15 (1932).—Mexico (Arch. Revillagigedo).
pampalcense *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 24 (1934).—Peruv.
parviceps *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 8, 24 (1932).—Bras. (Matto Grosso).
paucicrenatum *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 59 (1931).—Haiti.
phanioides *Urb. & Ekman, l. c.* 54.—Haiti.
pharcidodes *B. L. Robinson in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 483.—Guiana Brit.
phlebodes *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s., c. 16 (1932).—Parag.
pitonianum *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 64 (1931).—Haiti.
Plumerii *Urb. & Ekman, l. c.* 52.—Haiti.
polycladum *Dusén ex Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 39 (1933).—Bras. (Paraná).
porphyrocladum *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 56 (1931).—Haiti.
quinqueflorum *Urb. & Ekman, l. c.* 57.—Santo Domingo.
rhodotrichum *Dusén ex Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 30 (1933), in syn.: Trichogonia rhodotricha.
Rimbachii *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcvi. 21 (1931).—Ecuador.
rubroviolaceum *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 62 (1931).—Haiti.
scabriusculum *Urb. & Ekman, l. c.* 59.—Haiti.
selleanum *Urb.*; *Urb. l. c.* 53, descr. ampl.—Haiti.
Shimadai *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 284.—Formosa.
Skutchii *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 27 (1934).—Guatem.
stigmaticum *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 67 (1931).—Haiti.
subcapitatum *Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 45 (1933).—Bras. (Paraná).
subferrugineum *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcvi. 22 (1931).—Peruv.
subintegerrimum *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 6, 30 (1932).—Bras. (Rio Grande do Sul).
subpurpureum *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 66 (1931).—Santo Domingo.
tarmense *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 28 (1934).—Peruv.
Tatei *B. L. Robinson in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 484.—Venez.
×Tawadae *Kitamura in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 167.—Ins. Liukiu.

EUPATORIUM:—

Toroi *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 28 (1934).—Colomb.
trujillense *B. L. Robinson, l. c.* 29.—Venez.
Tyleri *B. L. Robinson in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 482.—Venez.
umbelliforme *Dusén ex Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 33 (1933).—Bras. (Paraná; S. Catharina).
Urbanii *Ekman ex Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 55 (1931).—Haiti.
variegatum *Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 46 (1933): Oöclinium grandiflorum.
Voglii *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 29 (1934).—Venez.
yakushimaënse *Masamune & Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 43.—Japon.
yungasense *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 30 (1934).—Boliv.

EUPHORBIA L. (Euphorbiac.).

Abolini *Korovin ex Pavlov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1933, n. s. xlii. 128, in syn.: E. mucronulata.
Abramsiana *Wheeler in Bull. S. Calif. Acad. Sc.* 1934, xxxiii. 109.—U.S.A. (Calif.; Arizona); Mexico.
aeruginosa *Schweickerdt in Kew Bull.* 1935, 205.—Transvaal.
alaica *Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med. (Trans. Rubber & Guttap. Inst.)* 57 (1933), in syn.: Tithymalus alaicus.
Baga *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1933, xiii. 569.—Sudan. Gall.
Barnhartii *Croizat, Euphorb. Antiq. Offic.* 25, 54 (1934): E. trigona *Roxb.*
Beillei *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1933, xiii. 559.—Afr. Gall. Centr.
bevilaniensis *Croizat in Nat. Hort. Mag.* Jan. 1934, p. 96.—Madag.
bisulcata *Howell in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xxi. 330 (1935).—Ins. Galapag.
Briquetii *Emberger & Maire*; *Emberger & Maire in Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc,* xi. Nos. 4–6, 108 (1931).—Marocc.
Capazii *Caballero in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid,* Ser. Bot., No. 30, 25 (1935).—Marocc.
carpatica *Woloszcz.*; *Pilát in Beih. Bot. Centralbl.* liv. B, 337 (1935), descr. emend.—Carpath.
chaetocalyx (*Wooton & Standley*) *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 40: Chamaesyce chaetocalyx.
confluens *Nel in Kakteenk.* 1933, 193.—Little Namaq.
corallifera *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 50 (1933–5).—Calif. infer.
Cuatrecasasii *Pau in Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona,* xii. 353 (1929).—Hispan.
cumulata *R. A. Dyer in Rec. Albany Mus.* iv. 92 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
curvirama *R. A. Dyer, l. c.* 104.—Afr. austr. (Cape Prov.).
cyanophylla *Léveillé*; *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 226 (1931), descr. ampl.—China (Yunnan).
Cypriani *Sennen in Bull. Soc. Bot. France,* 1931, lxxviii. 189, in obs., nomen.—Marocc.
dasycarpa *Coss.*; *Battand. & Trab. Fl. Algér.* 802 (1890).—Marocc.
Decariana *Croizat in Nat. Hort. Mag.* Jan. 1934, p. 98.—Madag.
Decaryi *Guillaumin in Cactus,* iii. No. 6, 3, nomen; *et in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1934, Sér. II. vi. 120, descr.—Madag.
deltobracteata *Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med. (Trans. Rubber & Guttap. Inst.)* 149 (1933), in syn.: Tithymalus deltobracteatus.
demnatensis *Coss. in Bull. Soc. Dauph.* 1883, p. 413, No. 4007, nomen; *Battand. & Trab. Fl. Algér.* 802 (1890).—Marocc.
densiuscula *Popov in Trans. Sc. Soc. Turk.* i. 38 (1923).—Bokhara.
didiereoides *Denis ex Léandri in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1934, Sér. II. vi. 121.—Madag.
duseimata *R. A. Dyer in Fl. Pl. S. Afr.* 1934, xiv. t. 530.—Bechuanaland.

EUPHORBIA:—

Ecklonii (*Klotzsch & Garcke*) *A. Hässler in Bot. Notiser,* 1931, 335, 338: Tithymalus Ecklonii.
eendornensis *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 196 (1932).—Great Namaq.
elastica *Poisson & Pax in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1902, viii. 60, in obs.—Afr. trop. occ.
erythrocoma *Léveillé*; *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 227 (1931), descr. ampl.—China (Yunnan).
espirituensis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 50 (1933–5).—Calif. infer.
× Esulo-lucida *Andrae in Bot. Zeitung,* 1855, xiii. 914.—Ruman.
Euryops *Bullock in Kew Bull.* 1932, 492.—Afr. trop. or. (Elgon).
ferganensis *B. Fedtsch. in O. & B. Fedtsch. Consp. Fl. Turk.* vi. 304 (1916); cf. *Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med. (Trans. Rubber & Guttap. Inst.)* 77 (1933).—Turkestan.?
Finlaysonii *J. M. Black in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1935, lix. 258.—Centr. Austral.
flagelliformis (*Rydb.*) *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 576: Chamaesyce flagelliformis.
Floresii *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 67 (1935).—Mexico.
Frickiana *N. E. Brown in Journ. Cact. & Succ. Soc. Amer.* ii. 491 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Frivaldszkyana *Dörfl. & Degen ex Halácsy, Consp. Fl. Graec.* iii. 107 (1904), in syn.: E. thessala.
Fuhsii *Bornm. & Sint. ex O. & B. Fedtsch. Consp. Fl. Turkest.* vi. 310 (1916), nomen; *Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med. (Trans. Rubber & Guttap. Inst.)* 158 (1933), in syn.: Tithymalus kopetdaghi.
giumboënsis *A. Hässler in Bot. Notiser,* 1931, 320, in clavi, 328.—Somaliland.
glomerulans *Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med. (Trans. Rubber & Guttap. Inst.)* 183 (1933), in syn.: Tithymalus glomerulans.
Gorinii *Chiov. Fl. Somala,* II. 401 (1932).—Somal. Ital.
grandilobata *Chiov. l. c.* 405, in obs.—Somal. Ital.
guadalupensis *Howell in Leafl. West. Bot.* i. 51 (1933).—Calif. infer. (Ins. Guadalupe).
guntensis *Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med. (Trans. Rubber & Guttap. Inst.)* 201 (1933), in syn.: Tithymalus guntensis.
helioscopioides *Blatter in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxvi. 483 (1933).—Ind. or. (Waziristan).
Hernandez-Pachecoi *Caballero in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid,* Ser. Bot., No. 30, p. 28 (1935).—Marocc.
herpetorrhiza *Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med. (Trans. Rubber & Guttap. Inst.)* 145 (1933), in syn.: Tithymalus herpetorrhizus.
hissarica *Lipsky ex Prokh. l. c.* 140, in syn.: Tithymalus Franchetii.
hopetownensis *Nel in Kakteenk.* 1933, 192.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Humbertiana *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord,* 1934, xxv. 318.—Marocc.
hylonoma *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 230 (1931).—China (Kweichau; Hunan; Shensi).
hypoleuca *Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med. (Trans. Rubber & Guttap. Inst.)* 199 (1933), in syn.: Tithymalus hypoleucus.
imbricata *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1933, 468.—Tanganyika Terr.
inconstantia *R. A. Dyer in Rec. Albany Mus.* iv. 93 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
indivisa (*Millsp.*) *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 40: Chamaesyce indivisa.
issykkulensis *Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med. (Trans. Rubber & Guttap. Inst.)* 60 (1933), in syn.: Tithymalus issykkulensis.
isthmia *V. Täckh. in Svensk Bot. Tidskr.* 1932, xxvi. 374.—Aegypt.
jansenvillensis *Nel in Jahrb. Deutsch. Kakt. Ges.*; cf. *Kakteenk.* 1935, 211, nomen.—Hab.?
jaxartica *Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med. (Trans. Rubber & Guttap. Inst.)* 192 (1933), in syn.: Tithymalus jaxarticus.
Juglans *Compton in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 126.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Knobelii *Letty in Fl. Pl. S. Afr.* 1934, xiv. t. 521.—Transvaal.

EUPHORBIA:—

kopetdaghensis *Korovin ex Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med. (Trans. Rubber & Guttap. Inst.)* 166 (1933), in syn.: Tithymalus Buhsei.
kopetdaghi *Prokh. l. c.* 158, in syn.: Tithymalus kopetdaghi.
Korovini *Pavlov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1933, n. s. xlii. 126, 129.—Turkestan.
kouandenensis *Beille in Bull. Soc. Bot. France,* 1914, lxi. Mém. 8, 296 (1917).—Dahomey.
lamprocarpa *Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med. (Trans. Rubber & Guttap. Inst.)* 105 (1933), in syn.: Tithymalus lamprocarpus.
lanceolata *T. Liou in Contrib. Lab. Bot. Nat. Acad. Peiping,* i. 5 (1931).—China.
latimammillaris *Croizat in Cact. & Succ. Journ. Amer.* iv. 293, fig. 5 (1932); *et l. c.* iv. 331, 333 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Leviana *Croizat, Euphorb. Antiq. Offic.* 102 (1934): E. cereiformis *Boiss. in DC. Prodr.* xv. ii. 88 (1862), non *L.*
Lipskyi *Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med. (Trans. Rubber & Guttap. Inst.)* 80 (1933), in syn.: Tithymalus Lipskyi.
Litwinowii *Prokh. l. c.* 147, in syn.: Tithymalus Litwinowii.
lombardensis *Nel in Kakteenk.* 1933, 194.—Afr. austr. (Cape Prov.).
longepetiolata *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 55 (1933–5).—Mexico.
luticola *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 233 (1931).—China (Yunnan; Kweichau; Hunan).
lydenburgensis *Schweickerdt & Letty in Fl. Pl. S. Afr.* 1933, xiii. t. 486.—Transvaal.
Lyttoniana *Dexter in Euphorb. Rev.* i. 14 (1935).—Hort.
maleolens *Phillips in Fl. Pl. S. Afr.* 1932, xii. t. 459.—Transvaal.
Mazicum *Emberger & Maire*; *Emberger & Maire in Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc,* Nos. XXI–XXII. 48 (1930).—Marocc.
melillensis *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 106 [1933], nomen.—Marocc.
messeniaca *Heldr. ex Halácsy, Consp. Fl. Graec.* iii. 104 (1904), in syn.: E. veneta *Willd.*
Meyeri *Nel in Kakteenk.* 1933, 134.—Little Namaq.
microcarpa *Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med. (Trans. Rubber & Guttap. Inst.)* 171 (1933), in syn.: Tithymalus microcarpus.
miricornis *Maire & Wilczek in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord,* 1934, xxv. 318.—Marocc.
multifoliosa *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 54 (1933–5).—Mexico.
Murrayana *J. M. Black in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1932, lvi. 42.—S. Austral.
muscosa *Tenore, Fl. Nap.* i. 269 (1811–15), in obs.—Ital.
Nesemannii *R. A. Dyer in Kew Bull.* 1934, 267.—Afr. austr. (Cape Prov.).
nyassae *Pax in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 160 (1921), in obs.—Nyasaland.
Oryctis *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 167 (1931), in obs.—Afr. austr.-occ.
paganorum *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1933, xiii. 556.—Sudan. Gall.
pamirica *Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med. (Trans. Rubber & Guttap. Inst.)* 198 (1933), in syn.: Tithymalus pamiricus.
panchganiensis *Blatter & McCann in Journ. & Proc. As. Soc. Beng.* 1930, n. s. xxvi. 353 (1931).—Ind. or. (Bombay).
patellifera *Howell in Leafl. West. Bot.* i. 53 (1933).—U.S.A. (Calif.).
pauciradiata *Blatter in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxvi. 483 (1933).—Ind. or. (Waziristan).
philora (*Cockerell*) *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wasn* 1935, xlviii. 41: Tithymalus philorus.
pitcairnensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 130, p. 134 (1935).—Ins. Tuamotu (Pitcairn).
platymammillaris *Croizat in Cact. & Succ. Journ. Amer.* iv. 293, fig. 4 (1932); *et l. c.* iv. 333 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Plummerae *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xviii. 195 (1883).—U.S.A. (Arizona).

EUPHORBIA:—

poecilophylla *Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med.* (*Trans. Rubber & Guttap. Inst.*) 186 (1933), in syn.: Tithymalus poecilophyllus.
polycephala *Marloth in S. Afr. Gard.* 1931, xxi. 127, 133.—Afr. austr. (Cape Prov.).
polytimetica *Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med.* (*Trans. Rubber & Guttap. Inst.*) 142 (1933), in syn.: Tithymalus polytimetica.
Pondii *Millsp. in Pittonia*, ii. 88 (1890), nomen; *et in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. 12 (1890), descr.—Calif. infer. et Ins. Guadalupe.
pseudo-dendroides *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 98 (1932).—Marocc.
pseudovirgata (*Schur*) *Soó in Veröff. Geobot. Inst. Rübel*, vi. 252 (1930): E. virgata var. pseudovirgata.
purpurea (*Rafin.*) *Fernald in Rhodora*, 1932, xxxiv. 25: Agaloma purpurea.
ramipressa *Croizat in Cact. & Succ. Journ. Amer.* vi. 79 (1934): E. alcicornis *A. Berger, Sukkul. Euphorb.* 41 (1907), non *Baker*.
rugosissima *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1928, No. 255 [1929].—Marocc.
san-salvador *Hort. ex Jacobsen, Sukkulent.* 65 (1933), in syn.: E. resinifera.
schugnanica *B. Fedtsch. in O. & B. Fedtsch. Consp. Fl. Turk.* vi. 307 (1916); cf. *Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med.* (*Trans. Rubber & Guttap. Inst.*) 64 (1933).—Turkestan.?
semivillosa *Prokh. l. c.* 112, in syn.: Tithymalus semivillosus.
Sennii *Chiov. Fl. Somala*, II. 404 (1932).—Somal. Ital.
sericocarpa *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 227 (1931).—China (Yunnan).
Sewerzowii *Herd. ex Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med.* (*Trans. Rubber & Guttap. Inst.*) 188 (1933), in syn.: Tithymalus Sewerzowii.
simplex *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 164 (1931), in obs., nomen.—Afr. austr.-occ.
sogdiana *Popov in Trans. Sc. Soc. Turk.* i. 38 (1923).—Bokhara.
somalensis *Pax*; *A. Hässler in Bot. Notiser*, 1931, 320, in clavi, 322, descr. emend.—Somaliland.
× Souliei *Sennen in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xv. Ser. Bot. No. 1, 33 (1931), in obs.—Hispan.
spinidens *Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med.* (*Trans. Rubber & Guttap. Inst.*) 208 (1933), in syn.: Tithymalus spinidens.
stolonifera *Marloth ex Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 298 (1931), nomen.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Sturii *Holuby ex Velen. Fl. Bulgar.* 505 (1891), in syn.: E. Gerardiana subsp. saxicola *Velen.*
suareziana *Croizat in Nat. Hort. Mag.* Jan. 1934, p. 99.—Madag.
submamillaris *A. Berger ex Pax in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 161 (1921), in obs.—Afr. austr. (Cape Prov.).
sudanica *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 589.—Sudan. (Haut-Sénégal-Niger).
surinamensis *Lanj. Euphorbiac. Surinam*, 48 (1931).—Guiana Bat.
taboraënsis *A. Hässler in Bot. Notiser*, 1931, 322, in clavi, 331.—Tanganyika Terr.
talastavica *Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med.* (*Trans. Rubber & Guttap. Inst.*) 95 (1933), in syn.: Tithymalus talastavicus.
Tellieri *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1933, xiii. 555.—Sudan. Gall.
tenuissima *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 55 (1933–5).—Mexico.
Tessmannii *Mansf. in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 1928, xlvi. 674 (1929), in obs.; *et in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 137 (1931), latine.—Peruv.
thessala (*Forman.*) *Degen & Dörfl. in Denkschr. Akad. Wiss. Wien, Math.-Nat.* 1897, lxiv. 736: E. baselicis subsp. thessala.
tinianensis *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 29.—Ins. Marian. (Tinian).
torta *Pax & K. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 160 (1921), in obs.—Tanganyika Terr.

EUPHORBIA:—

Tozzii *Chiov. Fl. Somala*, II. 407 (1932).—Somal. Ital.
Tranzschelii *Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med.* (*Trans. Rubber & Guttap. Inst.*) 59 (1933), in syn.: Tithymalus Tranzschelii.
trapiifolia *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1933, xiii. 556.—Sudan. Gall.
tshuiensis (*Prokh.*) *Sergievsk. in Krylov, Fl. Sibir. Occ.* viii. 1880 (1935): Tithymalus tshuiensis.
Tsukamotoi *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 407.—Japon. (Hokkaido).
tubiglans *Marloth ex R. A. Dyer in Kew Bull.* 1934, 268.—Afr. austr. (Cape Prov.).
vallis-mortae (*Millsp.*) *Howell in Madroña*, ii. 19 (1931): Chamaesyce vallis-mortae.
Velenovskyi *Bornm. in Engl. Jahrb.* lxvi. 117 (1933), in obs.: E. nuda *Velen.*
Vinyalsi *Sennen in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xv. Ser. Bot. No. 1, 51 (1931), in obs., nomen.—Hispan.
Weberbaueri *Mansf. in Fedde, Repert.* xxix. 221 (1931).—Peruv.
Wilmanae *Marloth in S. Afr. Gard.* 1931, xxi. 127, 133.—Afr. austr. (Little Namaq.; Griqualand West).
yaquiana *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 41: E. mollis *Engelm.*

EUPHORIA Comm. ex Juss. (Sapindac.).

cambodiana *Lecomte, Not. Syst.* ii. 55 (1911).—Cambodia.
foveolata *Radlk. in Philipp. Journ. Sc., Bot.* 1913, viii. 445, 457 (1914).—Ins. Philipp. (Luzon).
gracilis *Radlk. in Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* v. 1606 (1913).—Ins. Philipp. (Mindanao).
Longan (*Lour.*) *Steud. Nomencl. Bot.* 328 (1821): Dimocarpus Longan.
microcarpa *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 907 (1932).—Borneo.
nephelioides *Radlk. in Philipp. Journ. Sc., Bot.* 1913, viii. 445, 457 (1914).—Ins. Philipp. (Basilan).
obtusa *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 898 (1932).—Cochinch.
pallens *Pierre, Fl. For. Cochinch.* t. 318 (1894).—Cochinch.

EUPHRASIA L. (Scrophulariac.).

abscondita *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1930, xxix. 157 (1931), descr.—Hispan.
altaica *Sergievsk. in Trav. Inst. Sc. Biol., Tomsk*, i. 81 (1935).—Altai.
Anitae *Sennen, Pl. d'Esp.* No. 5821 (1926); *Rothmaler in Cavanillesia*, vii. 20 (1935), in syn.: E. hirtella.
asturica *Pugsley in Journ. Bot.* 1932, lxx. 200.—Hispan.
atroviolacea *Druce & Lumb*; *Druce & Lumb in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1930, ix. 277 (1931), latine.—Ins. Orkney.
bilineata *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 306.—Hab.?
Borderi *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1930, xxix. 160 (1931).—Pyren.
Cabrerae *Sennen & Gonzalo in Sennen, Pl. d'Esp.* No. 5525 (1925); *Rothmaler in Cavanillesia*, vii. 12 (1935), in syn.: E. pectinata.
Cadevallii *Sennen & Gonzalo, l. c.* No. 5527; *Rothmaler, l. c.*, in syn.: E. pectinata.
cantabrica *Font Quer & Rothmaler, l. c.* 10, in clavi, 23.—Hispan.
carpetana *Boiss. ex Rothmaler, l. c.* 19, in syn.: E. hirtella.
cephalata *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1930, xxix. 158 (1931), descr.—Hispan.
Chaberti *Sennen*; *Sennen, l. c.* 153, descr.—Hispan.
Chodati *Sennen*; *Sennen, l. c.* 154, descr.—Pyren.
cisalpina *Pugsley in Journ. Bot.* 1932, lxx. 263, in obs.: E. Schinzii *Pugsley*.
condensa *Sennen, Pl. d'Esp.* No. 6156 (1927); *Rothmaler in Cavanillesia*, vii. 17 (1935), in syn.: E. minima var. hispidula *Favrat ex Gremli*.
Cousturieri *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1930, xxix. 148 (1931), descr.—Pyren.
crispata *Sennen*; *Sennen, l. c.* 149, descr.—Pyren.
Davidssonii *Pugsley in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 308.—Islandia.
Dielsii *Du Rietz in Svensk Bot. Tidskr.* 1931, xxv. 527 (1932), in obs., nomen.—N. Guin.

EUPHRASIA:—

dunensis *Wiinst. in Bot. Tidsskr.* xliii. 232 (1935).—Dania.
Durietziana *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 149.—Formosa.
Durietzii *Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1934, vi. 561.—Formosa.
Eduardi *Sennen, Pl. d'Esp.* No. 6945 (1928); *Rothmaler in Cavanillesia*, vii. 15 (1935).—Hispan.
Eliae *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1930, xxix. 161 (1931).—Hispan.
Eliasii *Sennen, Pl. d'Esp.* No. 5006 (1923); *Rothmaler in Cavanillesia*, vii. 14 (1935), in syn.: E. rigidula.
exilis *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 306.—Formosa.
fennica *Kihlm. in Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn.* Fasc. 24, 92 (1901).—Fennia.
Font-Queri *Rothmaler in Cavanillesia*, vii. 12, in clavi, 19 (1935).—Hispan.
Gandogeriana *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1930, xxix. 148 (1931), descr.—Hispan.
Gibbsiae *Du Rietz in Svensk Bot. Tidskr.* 1931, xxv. 532 (1932), in obs., nomen.—Tasman.
Gonzaloi *Sennen, Pl. d'Esp.* No. 4207 (1921); *Rothmaler in Cavanillesia*, vii. 12 (1935), in syn.: E. pectinata.
Gundisalvi *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1930, xxix. 153, 159 (1931).—Hispan.
Gustavei *Sennen, Pl. d'Esp.* No. 4267 (1922); *Rothmaler in Cavanillesia*, vii. 16 (1935), in syn.: E. minima.
Immaculatae-Conceptionis *Sennen & Gonzalo in Sennen, l. c.* No. 5523 (1925); *Rothmaler, l. c.* 12, in syn.: E. pectinata.
Jordaniana *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1930, xxix. 152 (1931), in obs.: E. minor *Jord.*
Kjellbergii *Du Rietz in Svensk Bot. Tidskr.* 1931, xxv. 542 (1932), in obs.—Celebes.
Krylovii *Sergievsk. in Trav. Inst. Sc. Biol., Tomsk*, i. 90 (1935).—Altai.
Lamii *Diels in Nova Guinea*, xiv. 538 (1932).—N. Guin.
latisepala *Du Rietz in Svensk Bot. Tidskr.* 1931, xxv. 527 (1932), in obs., nomen.—N. Guin.
× Lerschii *Györffy in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 96.—Hungar.
Llenasi *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1930, xxix. 155 (1931), descr.—Pyren.
Lumbii *Druce in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1930, ix. 277 (1931): E. variabilis *Druce & Lumb.*
Mariani *Sennen, Pl. d'Esp.* No. 8229 (1932); *Rothmaler in Cavanillesia*, vii. 22 (1935), in syn.: E. alpina.
Masamuneana *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 307.—Formosa.
Merrillii *Du Rietz in Svensk Bot. Tidskr.* 1931, xxv. 510 (1932).—Ins. Philipp. (Luzon).
microphylla *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 60.—Japon.
× Minniae *Rothmaler in Cavanillesia*, vii. 25 (1935).—Hispan.
minor *Jord. in Gren. Fl. Jur.* 570 (1865), in syn.: E. minima var. minor *Gren.*
Navasi *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1930, xxix. 159 (1931).—Hispan.
nigra *Sennen*; *Sennen, l. c.* 151, descr.—Hispan.
nuriensis *Sennen*; *Sennen, l. c.* 150, descr.—Pyren.
onegensis *Cajand. ex Sergievsk. in Trav. Inst. Sc. Biol., Tomsk*, i. 91 (1935): E. fennica subsp. praecox *Ganesch.*
pectinatiformis *Kryl. & Sergievsk. l. c.* 74.—Altai.
philippinensis *Du Rietz in Svensk Bot. Tidskr.* 1931, xxv. 502, 508 (1932).—Ins. Philipp. (Luzon).
praebrevipila *Chitr. in Trav. Mus. Bot. Acad. Sc. Pétersb.* iii. 27 (1907), in obs.—Hab.?
praerostkoviana *Chitr. l. c.*, in obs.—Hab.?
procumbens *Du Rietz in Svensk Bot. Tidskr.* 1931, xxv. 527 (1932), in obs., nomen.—N. Guin.
prolifica *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1930, xxix. 162 (1931).—Hispan.
pseudo-pumila *Sennen, Pl. d'Esp.* No. 4268 (1921); *Rothmaler in Cavanillesia*, vii. 16 (1935), in syn.: E. minima.
Pulleana *Du Rietz in Svensk Bot. Tidskr.* 1931, xxv. 527 (1932), in obs., nomen.—N. Guin.
Pumilio *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 306.—Formosa.

EUPHRASIA:—
recurvata *Schousb. ex Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 310, in obs., in syn.: E. squarrosa.
Remigii *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 110.—Hispan.
Rocapreverae *Sennen & Gonzalo in Sennen, Pl. d'Esp.* No. 5520 (1925); *Rothmaler in Cavanillesia*, vii. 12 (1935), in syn.: E. pectinata.
Schinzii *Pugsley in Journ. Bot.* 1932, lxx. 202.—Helvet.; Ital.
×Schinzii *Wettst. Monogr. Euphrasia*, 281 (1896).—Helvet.; Bavar.
Schischkinii *Sergievsk. in Trav. Inst. Sc. Biol., Tomsk*, i. 80 (1935).—Altai.
Senneni (*Chab.*) *Sennen, Pl. d'Esp.* No. 2777 (1916); *Rothmaler in Cavanillesia*, vii. 22 (1935), in syn.: E. alpina.
×Senneniana *Rothmaler, l. c.* 26.—Hispan.
septentrionalis *Druce & Lumb*; *Druce & Lumb in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1930, ix. 276 (1931), latine.—Scotia.
sibirica *Sergievsk. in Trav. Inst. Sc. Biol., Tomsk*, i. 76 (1935).—Sibir.
Sicardi *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1930, xxix. 157 (1931), descr.—Hispan.
subarctica *Raup in Rhodora*, 1934, xxxvi. 87.—Alaska; Canada (Athabaska).
substituta *Sennen, Pl. d'Esp.* No. 4265 (1922); *Rothmaler in Cavanillesia*, vii. 16 (1935), in syn.: E. minima.
subulata *Sennen ex Rothmaler l. c.* 12, in syn.: E. pectinata.
suecica *Murb. & Wettst. in Wettst. Monogr. Euphrasia*, 297 (1896), in obs.—Suecia ?
Syreitschikovii *Govor. ex Sergievsk. in Trav. Inst. Sc. Biol., Tomsk*, i. 82 (1935), in obs.—Sibir. ?
tarokoana *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 149.—Formosa.
Texidoris *Sennen ex Rothmaler in Cavanillesia*, vii. 12 (1935), in syn.: E. pectinata.
Timbali *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1930, xxix. 150 (1931), descr.—Pyren.
×Tremolsii *Rothmaler in Cavanillesia*, vii. 25 (1935).—Hispan.
uniflora *Du Rietz in Svensk Bot. Tidskr.* 1931, xxv. 527 (1932), in obs., nomen.—N. Guin.
valdesetulosa *Sennen ex Rothmaler in Cavanillesia*, vii. 14 (1935), in syn.: E. pectinata var. puberula *Wettst.*
valdesubulata *Sennen, Pl. d'Esp.* No. 6160 (1927); *Rothmaler in Cavanillesia*, vii. 17 (1935), in syn.: E. minima var. hispidula *Favrat ex Gremli.*
Versteegii (*Diels*) *Du Rietz in Svensk Bot. Tidskr.* 1931, xxv. 527 (1932), in obs.: E. Lamii var. Versteegii.
×Viciosoi *Pau ex Rothmaler in Cavanillesia*, vii. 26 (1935).—Hispan.
Wettsteiniana *Du Rietz in Svensk Bot. Tidskr.* 1931, xxv. 122: Anagosperma dispermum *Wettst.*, non Euphrasia disperma *Hook. f.*

EURYA Thunb. (Theac.; Ternstroemiac., Gen. Pl.).
aurescens (*Rehder & Wilson*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 400 (1931): E. japonica var. aurescens.
Bolleana *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxxiii. 177 (1933).—Santo Domingo.
Degeneri *Kobuski in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 351.—Ins. Sandvic.
disticha *Chun in Sunyatsenia*, ii. 52 (1934).—China (Kwangtung).
Hayatai *Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1933, v. 348.—Formosa.
ladronica *Hosokawa in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1934, vi. 667, nomen; *et in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 30, descr.—Ins. Marian.
lancifolia *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 317 (1931).—Brit. Honduras.
osimensis *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 249.—Ins. Liukiu.
palauensis *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 31.—Ins. Palau.
patentipila *Chun in Sunyatsenia*, ii. 56 (1934).—China (Kwangtung).

EURYA:—
polyneura *Chun in Sunyatsenia*, ii. 54 (1934).—China (Kwangtung).
ponapensis *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 31.—Ins. Carolin. (Ponape).
rapensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 182 (1935).—Polynes. (Ins. Rapa).
rengechiensis *Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1933, v. 55.—Formosa.
ryukyuensis *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 249.—Ins. Liukiu (Iriomote).
Suzukii *Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1933, v. 349.—Formosa.
velutina *Chun in Sunyatsenia*, ii. 57 (1934).—China (Kwangtung).
yaeyamensis *Masamune in Jap. Soc. Pres. Beaut. Scen. Hist. Nat. Mon.* viii. 24 (1933); cf. *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 209.—Ins. Liukiu (Iriomote).

EURYCORYMBUS Hand.-Mazz. (Sapindac.).
Cavaleriei (*Léveillé*) *Rehder & Hand.-Mazz. in Journ. Arn. Arb.* 1934, xv. 8: Rhus Cavaleriei.

EURYOPS Cass. (Compos.).
caespitosus *Markötter in Ann. Univ. Stellenb.* 1930, viii. Sect. A, No. 1, 44 (1930).—Orange Free State.
discoideus *Burtt Davy in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 105.—Transvaal.
laxus (*Harv.*) *Burtt Davy in Kew Bull.* 1935, 569: Gamolepis laxa.
Rehmannii *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 321 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Rogersii *Burtt Davy in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 105.—Transvaal.

EUSTEPHIA Cav. (Amaryllidac.).
armifera *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 47 (1931).—Peruv.

EUSTEPHIOPSIS R. E. Fries (Amaryllidac.).
argentina (*Pax*) *Hauman in Bull. Soc. Bot. Belg.* lxiv. 56 (1931), in obs.: Eustephia argentina.

EUTERPE Gaertn. emend. Mart. (Palmae).
andina *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 322 (1932).—Colomb.
montis-duida *Burret in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 319.—Venez.
panamensis *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 864 (1933).—Panamá.
speciosa *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1155 (1895), in syn.: Howea Belmoreana.

EUTHAMIA Ell. (Compos.).
glutinosa *Rydb. in Brittonia*, i. 102 (1931).—U.S.A. (Nebraska; Kansas).

EUTHEMIS Jack (Ochnac.).
elegantissima *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 305 (1824).—Penins. Mal.

EUTHETA Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago, Bot. Ser., viii. 324 (1931). *SOLANACEAE.*
hondurensis (*Donn. Smith*) *Standley, l. c.* 325: Cacabus hondurensis.

EUTOCA R. Br. (Hydrophyllac.).
fimbriata *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 689 (1895), in syn.: Phacelia Purshii.

EVACIDIUM Pomel (Compos.).
discolor (*DC.*) *Maire in Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc*, xi. Nos. 4–6, 101 (1931): Evax discolor.

EVAX Gaertn. (Compos.).
longilanata *Maire & Wilczek in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1934, xxv. 303.—Marocc.
lusitanica *G. Sampaio in Ann. Acad. Polyt. Porto*, xiv. 161 (1921).—Lusitan.

EVEA Aubl. (Rubiac.).
Ipecacuanha (*Brot.*) *W. F. Wight in Contrib. U. S. Nat. Herb.* ix. 216 (1905), in adnot.: Callicocca Ipecacuanha.
radiata *Rusby in Phytologia*, i. 79 (1934).—Boliv.

EVODIA J. R. & G. Forst. (Rutac.).
austrosinensis *Hand.-Mazz. in Sinensia*, v. 1 (1934).—China (Kwangsi; Kwangtung); Indo-China (Tonkin).

EVODIA:—
capillacea *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 91, 10 (1932).—Ins. Viti.
compacta *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 627 (1933).—China (Hunan).
cucullata *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 91, 10 (1932).—Ins. Viti.
impellucida *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 626 (1933).—China (Yunnan).
Kajewskii *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 234.—N. Hebrides.
lepta (*Spreng.*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 219 (1935): Ilex lepta.
Margaretae *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, p. 130 (1935).—Polynes. (Ins. Rapa).
sambucifolia *Dode in Bull. Soc. Bot. France*, 1908, lv. 701 (1909), in adnot.: Philagonia sambucina (sphalm. sambucifolia).
sambucina (*Blume*) *Hook. f. ex Koorders & Valeton in Meded.'sLands Plant.* xvii. 216 (1896): Philagonia sambucina.
Seemanni *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 91, 12 (1932).—Ins. Viti.
triphylla *Hort. ex Backer, Schoolfl. Java*, 179 (1911).—Java.
zambalensis *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3216 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).

EVOLVULUS L. (Convolvulac.).
bogotensis *v. Ooststr. in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht*, No. 14, 89 (1934).—Colomb.
boliviensis *v. Ooststr. l. c.* 83.—Boliv.
brevifolius (*Meissn.*) *v. Ooststr. l. c.* 219: E. glomeratus var. brevifolius.
chapadensis *Glaziou*; *v. Ooststr. l. c.* 218, in adnot., descr.—Bras. (Goyaz).
comosus *v. Ooststr. l. c.* 211.—Bras. (Minas Geraes).
Fieldii *v. Ooststr. l. c.* 78.—Peruv.
genistoides *v. Ooststr. l. c.* 191: E. phylicoides *Mart.*
Hallierii *v. Ooststr. l. c.* 109.—Mexico.
Herrerae *v. Ooststr. l. c.* 77.—Peruv.
imbricatus *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 207 (1835).—Bras.
longepilosus (*Choisy*) *Mart. ex v. Ooststr. in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht*, No. 14, 229, in obs., 230 (1934): E. echioides var. longepilosus.
macilentus *Small, Man. Southeast. Fl.* 1082 (1933).—U.S.A. (Florida).
Martii *Colla, Herb. Pedem.* iv. 207 (1835).—Bras.
minimus *v. Ooststr. in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht*, No. 14, 110 (1934): Convolvulus serpylloides.
piurensis *v. Ooststr. l. c.* 82.—Peruv.
Purpusii *v. Ooststr. l. c.* 145.—Mexico.
rariflorus (*Meissn.*) *v. Ooststr. l. c.* 149, in obs., 159: E. frankenioides var. rariflorus.
stellariifolius *v. Ooststr. l. c.* 93.—Bras. (Minas Geraes).
tomentosus (*Meissn.*) *v. Ooststr. l. c.* 155, in obs., 219: E. aurigenius var. tomentosus.
villosissimus *v. Ooststr. l. c.* 151.—Venez.
vimineus *v. Ooststr. l. c.* 73.—Bras. (Minas Geraes).

EVRARDIA Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 1932, Sér. II. iv. 596. *ORCHIDACEAE.*
Poilanei *Gagnep. l. c.*—Indo-China (Anam).

EVRARDIELLA Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 1934, Sér. II. vi. 191. *LILIACEAE.*
dodecandra *Gagnep. l. c.*—Indo-China (Anam).

EXACUM L. (Gentianac.).
bicolor *Roxb. Hort. Beng.* 83 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 413 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 397 (1832).—Ind. or.
carinatum *Roxb. l. c.* 10, nomen; *et l. c.* 415; *et l. c.* 399.—Zeylan.
sulcatum *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.*; *et l. c.* 400.—Ind. or. (Bengal).
teres *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 414 (1820).—Ind. or.
tetragonum *Roxb. Hort. Beng.* 10 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 413 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 398 (1832).—Ind. or. (Bengal).
zeylanicum *Roxb. l. c.* 83, nomen; *et l. c.* 414; *et l. c.*—Zeylan

EXCOECARIA L. (Euphorbiac.).
acuminata *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 91, 14 (1932).—Ins. Viti.

EXOCHOGYNE C. B. Clarke; Tutin in Hook. Ic. Pl. xxxiii. t. 3273 (1935), descr. ampl. *CYPERACEAE.*
amazonica *C. B. Clarke*; *Tutin, l. c.*, descr. ampl.—Bras. (Amaz.).
decandra *Tutin, l. c.* t. 3275.—Bras. (Amaz.).
megalorrhyncha *Tutin, l. c.* t. 3274.—Guiana Brit.

EXOCHORDA Lindl. (Rosac.).
tianschanica *Gontsch. in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 91 (1934).—Turkestan.

EXOGONIUM Choisy (Convolvulac.).
mirandinum *Pittier in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 143.—Venez.
retropilosum *Pittier, l. c.*—Venez.
Steerei *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 83 (1935).—Mexico.
verruculosum *Pittier in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 142.—Venez.

EXOLOBUS Fourn. (Asclepiadac.).
marmoreus *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1931, xviii. 561.—Colomb.

EXORHOPALA v. Steenis in Handel. Zesde Ned.-Ind. Natuurwetensch. Congr., Bandoeng (Java), 1931, 470. *BALANOPHORACEAE.*
ruficeps (*Ridley*) *v. Steenis, l. c.*, in adnot.: Rhopalocnemis ruficeps.

EXORRHIZA Becc. (Palmae).
Harlandi (*Becc.*) *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 593 (1935): Clinostigma Harlandi.
Smithii *Burret in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu*, xi. No. 4, p. 3 (1935).—Ins. Viti.
Thurstonii (*Becc.*) *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 593 (1935): Clinostigma Thurstonii.
Vaupelii *Burret in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu*, xi. No. 4, p. 4 (1935).—Ins. Samoa.

EXOSTEMA L. C. Rich. (Rubiac.).
Leonis *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 338 (1931).—Cuba.
nitens *Urb.*; *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 44 (1932), descr. ampl.—Santo Domingo.
polyphyllum *Urb. & Ekman*; *Urb. l. c.*, descr. ampl.—Haiti.

EZEHLSIA Lour. ex Gomes in Mem. Acad. Sc. Lisb. Cl. Sc. Pol. Mor. Bel.-Let. n. s. iv. (1), 29 (1868); Merrill in Trans. Am. Phil. Soc. n. s. xxiv. II. 16 (1935). *LILIACEAE?*
palma *Lour. ex Gomes, l. c.*; *Merrill, l. c.*: Dracaena ferrea.

F

FABA Zinn, Cat. Pl. Gott. 357 (1757); Boehm. in Ludw. Def. Gen. Pl. ed. 3, 257 (1760); Adans. Fam. Pl. ii. 331 (1763); Sprague in Kew Bull. 1934, 218. *LEGUMINOSAE.*

FABERIA Hemsl. (Compos.).
lancifolia *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 196 (1934).—China (Yunnan).

FACELIS Cass. (Compos.).
lasiocarpa (*Griseb.*) *Cabrera in Physis*, x. 280 (1931): Filago lasiocarpa.

FACHEIROA Britton & Rose (Cactac.).
Ulei (*Gürke*) *Werderm. Bras. Säulenkakt.* 113 (1933): Cephalocereus Ulei.

FADOGIA Schweinf. (Rubiac.).
caespitosa *Robyns in Journ. Bot.* 1931, lxix. 167.—Angola.
erythrophloea (*K. Schum. & K. Krause*) *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 108, in clavi, 109 (1931): Vangueria erythrophloea.
flaviflora *Robyns in Journ. Bot.* 1931, lxix. 169.—Congo Belg.; Angola.
Gossweileri *Robyns, l. c.* 171.—Angola.
oblongo-lanceolata *Robyns, l. c.* 170.—Angola.
olivacea *Robyns, l. c.* 168.—Angola.
punctulata *Robyns, l. c.* 166.—Angola.
variifolia *Robyns, l. c.* 167.—Angola.

FAGARA L. (Rutac.).
aculeatissima *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 220 (1931).—Boliv.
anadenia *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 14 (1932).—Haiti.
apiculata *Sandwith in Kew Bull.* 1935, 120.—Guiana Brit.
arborescens (*Rose*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 220 (1931): Zanthoxylum arborescens.
Bluettiana (*Rock*) *Engl. l. c.* 224: Zanthoxylum Bluettianum.
Budrunga *Roxb. Hort. Beng.* 11 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 437 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 417 (1832).—Ind. or. (Assam).
Chaffanjoni (*Léveillé*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 625 (1933): Zanthoxylum Chaffanjoni.
Consolatae *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 14 (1935).—Kenya Col.
diabolica (*Elmer*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 220 (1931): Zanthoxylum diabolicum.
foetida (*Rose*) *Engl. l. c.* 218: Zanthoxylum foetidum.
Goldmani (*Rose ex P. Wilson*) *Engl. l. c.* 220: Zanthoxylum Goldmani.
hirtella (*Ridley*) *Engl. l. c.* 221: Zanthoxylum hirtellum.
jamaicensis (*P. Wilson*) *Engl. l. c.* 223: Zanthoxylum jamaicense.
Kellermanii (*P. Wilson*) *Engl. l. c.* 220: Zanthoxylum Kellermanii.
kivuensis *Lebrun in Publ. Inst. Nat. Étude Agron. Congo Belg.*, Sér. Sc. No. 1 (*Ess. For. Congo Belge*, II: *Ess. For. Reg. Mont. Congo Or.*) 102 (1935).—Congo Belg.
Krukovii (*A. C. Smith*) *Sandwith in Kew Bull.* 1935, 120, in obs.: Zanthoxylum Krukovii.
kwangsiensis *Hand.-Mazz. in Sinensia*, iii. 186 (1933).—China (Kwangsi).
lenticellosa *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 13 (1932).—Santo Domingo.
macrantha *Hand.-Mazz. in Sinensia*, v. 17 (1934).—China (Kweichau).
mantaro *Macbride in Candollea*, v. 372 (1934).—Peruv.
mantchurica (*Bennett*) *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 633: Zanthoxylum mantchuricum.
megalismontana *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 223 (1931).—Transvaal.
megistophylla *B. L. Burtt in Kew Bull.* 1935, 301.—Ins. Solomon. (Bougainville).
melanorhachis *Hoyle in Kew Bull.* 1933, 174.—Nigeria.
membranifolia *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1068 (1934).—Tanganyika Terr.
negrilensis (*Fawcett & Rendle*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 223 (1931): Zanthoxylum negrilense.
nitens (*Hiern*) *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 749 (1915), in obs.: Zanthoxylum nitens.
nitida *Roxb. Hort. Beng.* 11 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 439 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 419 (1832).—China.
obliquefoliolata *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 222 (1931): F. rigidifolia *Engl.*
occidentalis (*Rose*) *Engl. l. c.* 219: Zanthoxylum occidentale.
odorata (*Léveillé*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 623 (1933): Evodia odorata.
paracantha *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1069 (1934).—Tanganyika Terr.
procera (*Donn. Smith*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 223 (1931): Zanthoxylum procerum.
Purpusii (*T. S. Brandegee*) *Engl. l. c.* 220: Zanthoxylum Purpusii.
Rhetsa *Roxb. Hort. Beng.* 11 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 438 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 417 (1832).—Ind. or.
rubescens (*Planch.*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* iii. IV. 118 (1896): Zanthoxylum rubescens.
Shaferi (*P. Wilson*) *Engl. l. c.* ed. 2, xix a. 223 (1931): Zanthoxylum Shaferi.

FAGARA:—
shikokiana *Makino in Makino & Nemoto, Fl Jap.* ed. 1, 674 (1925); *et l. c.* ed. 2, 626 (1931), japonice.—Japon.
somalensis *Chiov. Fl. Somala*, II. 48 (1932).—Somal. Ital.
stelligera (*Turcz.*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 220 (1931): Zanthoxylum stelligerum.
tomentella (*Hook. f.*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 624 (1933): Zanthoxylum tomentellum.
trijuga *Dunkley in Kew Bull.* 1934, 186.—N. Rhodesia; Tanganyika Terr.
Unwinii *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 480, in clavi, 481 (1928); *Hutchinson & Dalziel in Kew Bull.* 1929, 24, descr.—Nigeria.
valens *Macbride in Candollea*, v. 373 (1934).—Peruv.
venosa (*Leonard*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 224 (1931); *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 14 (1932), cum descr. ampl.: Zanthoxylum venosum.

FAGAROPSIS Mildbr. in Siebenl. Forstw. Deutsch-Ostafr. 90 (1914). *RUTACEAE.*
oppositifolia *Mildbr. l. c.*—Tanganyika Terr.

FAGONIA L. (Zygophyllac.).
albiflora *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1935, xv. 961.—Ins. C. Verde.
harpago *Emberger & Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 284.—Marocc.
ifniensis *Caballero in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 30, 22 (1935).—Marocc.
Tilhoana *Maire in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 907.—Sahara Gall. (Tibesti).
trifolia *Riedlé ex A. Cheval. in Arch. Mus. Hist. Nat. Paris*, Sér. VI. xii. 659 (1935), nomen.—Ins. Canar.

FAGOPYRUM Mill. (Polygonac.).
heterocarpum *Domin in Preslia*, xiii–xv. 64 (1935), in syn.: F. convolvuloides.

FAGRAEA Thunb. (Loganiac.).
calcarea *M. R. Henderson in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 113 (1933).—Penins. Mal.
elliptica *Roxb. Hort. Beng.* 84 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 32 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 462 (1832).—Ins. Molucc.
fragrans *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.*; *et l. c.* 461.—China.
kusaiana *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 202.—Ins. Carolin. (Kusai).
obovata *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 33 (1824).—Ind. or. (Assam); Penins. Mal.
racemosa *Jack in Roxb. l. c.* 35.—Penins. Mal.
Sparei *M. R. Henderson in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 114 (1933).—Penins. Mal.
volubilis *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 36 (1824).—Sumatra.

FAGUS L. (Fagac.; Cupulif., Gen. Pl.).
Chienii *Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., x. 70 (1935).—China (Szechuan).
cochleata *Hort. ex Domin in Bull. Internat. Acad. Sc., Prague*, 1932, xxxiii. 70, in syn.: F. sylvatica f. cochleata *Dippel.*
glandulosa *Reiche, Fl. Chile*, i. 268 (1896), in syn., sphalm.: E. glutinosa.
moesiaca (*Maly*) *Domin in Bull. Internat. Acad. Sc., Prague*, 1932, xxxiii. 73, in syn.; *Czecz. in Ann. Soc. Dendr. Pologne*, v. 52 (1933): F. sylvatica var. moesiaca.
quercifolia *Hort. ex Domin in Bull. Internat. Acad. Sc., Prague*, 1932, xxxiii. 69, in syn.: F. sylvatica f. quercifolia *Lavallée.*
tortuosa *Hort. ex Domin, l. c.* 72, in syn.: F. sylvatica var. tortuosa *Dippel.*

FAIDHERBIA A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq. 1934, xiv. 876. *LEGUMINOSAE.*
albida (*Delile*) *A. Cheval. l. c.*: Acacia albida.

FALCATA J. F. Gmel. (Legumin.).
angustifolia (*Kunth*) *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1933, xiii. 712: Cologania angustifolia.
pulchella (*H. B. & K.*) *A. Cheval. l. c.*: Cologania pulchella.

FALCATULA Brot. (Legumin.).
ornithopodioides *G. Sampaio, Herb. Portug.* 66 (1913), in adnot., pro syn.: Trigonella ornithopodioides.

FALCONERIA Royle, Ill. Bot. Himal. 354 (Febr. 1839). *EUPHORBIACEAE.*

FARADAYA F. Muell. (Verbenac.).
neo-ebudica *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 28.—N. Hebrides.
Powellii *Seem. ex Powell in Seem. Journ. Bot.* 1868, vi. 342.—Ins. Samoa.

FARAMEA Aubl. (Rubiac.).
belizensis *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 90 (1935).—Brit. Honduras.
candelabrum *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., vii. 299 (1931).—Boliv.
cuencana *Standley, l. c.* 219.—Ecuador.
guianensis (*Aubl.*) *Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 279, in obs.: Evea guianensis.
orinocensis *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., vii. 418 (1931).—Venez.
purpurea *Benth. ex Bremek. in Pulle, Fl. Surinam,* iv. (*Meded. K. Ver. Kol. Inst. Amst.* xxx.) 203 (1934), in syn.: F. longifolia.
quadricostata *Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 279.—Guiana Bat.
surinamensis *Miq. ex Bremek. l. c.* 280, in syn.: Coussarea surinamensis.
umbelliflora *Bremek. l. c.*—Guiana Bat.
Zetekii *Standley in Contrib. Arn. Arb.* No. v. 146 (1933).—Panamá (Ins. Barro Colorado).

FAROA Welw. (Gentianac.).
pygmaea *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 403 (1932).—Tanganyika Terr.

FASCICULARIA Mez (Bromeliac.).
micrantha (*R. Phil.*) *Mez in Engl. Pflanzenreich, Bromeliac.* 7 (1934): Rhodostachys micranthus.

FASKIA Lour. ex Gomes in Mem. Acad. Sc. Lisb. Cl. Sc. Pol. Mor. Bel.-Let. n. s. iv. (1), 28 (1868); Merrill in Trans. Am. Phil. Soc. n. s. xxiv. ii. 13, 16, 315 (1935), in syn.: **Strophanthus** DC. (Apocynac.).
divaricata *Lour. ex Gomes, l. c.*; *Merrill, l. c.*, in syn.: Strophanthus caudatus.

×**FATSHEDERA** Guillaumin in Journ. Soc. Nat. Hort. France, Sér. IV. xxiv. 524 (1923). *ARALIACEAE.*
[Fatsia × Hedera.]
Lizei (*Hort. ex Cochet*) *Guillaumin, l. c.*, in obs.: Aralia Lizei.

FATSIA Decne. & Planch. (Araliac.).
Wilsonii (*Nakai*) *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 821 (1931): Boninofatsia Wilsonii.

FAUCARIA Schwantes (Ficoidac.).
acutipetala *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 443 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Britteniae *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1933, xxiii. 22.—Afr. austr. (Cape Prov.).
coronata *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 446 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
cradockensis *L. Bolus, l. c.* 448.—Afr. austr. (Cape Prov.).
crassisepala *L. Bolus, l. c.* 442.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Duncanii *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1933, xxiii. 22.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Gratiae *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 394 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Hooleae *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 447 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Jamesii *L. Bolus ex Tisch. in Kakteenk.* 1934, 99, in obs., nomen.—Hab.?
kendrewensis *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 469 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
latipetala *L. Bolus, l. c.* 443.—Afr. austr. (Cape Prov.).
laxipetala *L. Bolus, l. c.* 444.—Afr. austr. (Cape Prov.).
longidens *L. Bolus, l. c.* 470.—Afr. austr. (Cape Prov.).
longifolia *L. Bolus, l. c.* 471.—Afr. austr. (Cape Prov.).
militaris *Tisch. in Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges.* 1932, iv. 280.—Hab.?

FAUCARIA:—
montana *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 448 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
multidens *L. Bolus, l. c.* 450.—Afr. austr. (Cape Prov.).
paucidens *N. E. Brown in N. E. Brown, Tisch. & Karst. Mesembr.* 210 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Ryneveldiae *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 446 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
speciosa *L. Bolus, l. c.* 445.—Afr. austr. (Cape Prov.).
subindurata *L. Bolus, l. c.* 444.—Afr. austr. (Cape Prov.).
subintegra *L. Bolus, l. c.* 449.—Afr. austr. (Cape Prov.).

FAUREA Harv. (Proteac.).
argentea *Hutchinson in Kew Bull.* 1931, 249.—N. Rhodesia.

FEDIA Gaertn. (Valerianac.).
calycina *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord,* 1931, xxii. 6, 294.—Alger.
Fischeriana *Colla, Herb. Pedem.* iii. 184 (1834).—Armen.

FELICIA Cass. (Compos.).
amelloides (*DC.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 472 (1894): Agathaea amelloides.
grossedentata *Dinter ex Range in Fedde, Repert.* xxxviii. 276 (1935), nomen.—Namaqualand.
knella *Hort. ex Gard. Chron.* 1934, Ser. III. xcvi. 56: an F. tenella?
lasiocarpa (*DC.*) *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 312 (1931): Mairea lasiocarpa.
microphylla (*Cass.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 472 (1894): Agathaea microphylla.
monticola *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 312 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
ovata (*Thunb.*) *Compton, l. c.*: Leyssera ovata.
rotundifolia *G. C. Taylor in New Fl. & Silv.* iii. 118 (1931), in obs.—Afr. austr.
teres *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 313 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).

FENUGRAECUM Adans. (Legumin.).
officinale *Tschechow in Bull. Applied Bot., Leningrad,* Ser. II. No. 1, 138, 144 (1932): Trigonella Foenum-graecum.

FERDINANDUSA Pohl (Rubiac.).
chlorantha (*Wedd.*) *Standley in Tropical Woods,* 1933, No. 34, 41: Gomphosia chlorantha.
loretensis *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., viii. 337 (1931).—Peruv.

FERNALDIA R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard. 1932, xix. 48. *APOCYNACEAE.*
brachypharynx *R. E. Woodson, l. c.* 380.—Guatem.
pandurata (*A. DC.*) *R. E. Woodson, l. c.* 48: Echites pandurata.

FEROCACTUS Britton & Rose (Cactac.).
coloratus *H. E. Gates in Cact. & Succ. Journ. Amer.* iv. 344 (1933).—Calif. infer.
gracilis *H. E. Gates, l. c.* 323.—Calif. infer.
haematacanthus (*Mouv. ex Weber*) *Bravo ex Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 352 (1935): Echinocactus haematacanthus.
Herrerae *Ortega, Mex. For.* v. 53 (1927); *Ortega in Bol. Pro-Cult. Reg. S.C.L.* Nos. 14, 15 (*Fam. Cact.* [25]) (1930).—Mexico.
pilosus (*Galeotti*) *Werderm. in Fedde, Repert. Sonder-Beih.* C. t. 72 (1933): Echinocactus pilosus.
tortulospinus *H. E. Gates in Cact. & Succ. Journ. Amer.* iv. 343 (1933).—Calif. infer.
viscainensis *H. E. Gates, l. c.* 324.—Calif. infer.

FERRARIA L. (Iridac.).
crispulata *L. Bolus in Journ. Bot.* 1931, lxix. 260.—Little Namaq.
Framesii *L. Bolus, l. c.* 123.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Hirschbergii *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 57, 59.—Congo Belg.
Lahue *Molina, Sagg. Stor. Nat. Chile,* ed. 2, 110 (1810).—Chile.
Vandermerwei *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 276, 277.—Afr. austr. (Cape Prov.).

FERULA L. (Umbellif.).
angreni *Korovin in Bull. Univ. As. Centr.* vii. 20 (1924), in obs.—Turkestan. (Thian Shan).
biverticellata *J. Thiéb. in Bull. Soc. Bot. France,* 1935, lxxxii. 190.—Syria.
Dubjanskyi *Korovin in Bull. Univ. As. Centr.* xx. 196 (1935), in obs.: Dorema songoricum.
equisetifolia *K.-Pol. in Bull. Soc. Nat. Voron.* i. 92 (1926), in clavi.—Ross. asiat. centr.
foliosa *Lipsky ex Popov in Trav. Turkest. Univ., Tashkent,* No. 4 (*Vég. Monts Sary-Taou, etc.*) 55 (1922), nomen.—Turkestan.
gigas *K.-Pol. in Bull. Soc. Nat. Voron.* i. 90 (1926), in clavi.—Ross. asiat. centr.
karataviensis (*Regel & Schmalh.*) *Korovin ex Pavlov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1933, n. s. xlii. 130: Peucedanum karataviense.
Korovini *Pavlov, l. c.* 127, 129: F. karataviensis *Korovin*, non F. karatavica *Regel & Schmalh.*
Korschinskii *Korovin in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 2, 60 (1928), in adnot., nomen.—Hab.?
Krylovii *Korovin in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1934, Nos. 2–3, p. 2.—Ross. asiat. (Semipalatinsk).
laeta *Woronow in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS,* Ser. I. Fasc. 1, 219 (1933).—Caucas.
leucographa *Korovin in Bull. Univ. As. Centr.* xx. 196 (1935), in obs.—Ross. asiat. (Kasakstan).
Licentiana *Hand.-Mazz. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1933, lxxxii. 252.—China (Shansi).
montis-elgonis *Bullock in Kew Bull.* 1932, 495.—Afr. trop. or. (Elgon).
moschata (*Reinsch*) *K.-Pol. in Bull. Soc. Nat. Voron.* i. 94 (1926), in clavi: Sumbulus moschatus.
olivacea (*Diels*) *H. Wolff ex Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 727 (1933): Angelica olivacea.
pachycarpa *Korovin in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 24, 11 (1935), in obs., nomen.—As. centr.
Pallasii (*Cuss. ex Ledeb.*) *K.-Pol. in Bull. Soc. Nat. Voron.* i. 37 (1925), in obs.; *et l. c.* 92 (1926), in clavi: Peucedanum Pallasii.
palmyrensis *Post & Beauverd in Dinsm. Pl. Post. & Dinsm.* Fasc. I. 7 (1932); *Dinsm. in Fedde, Repert.* xxxiii. 106 (1933).—Syria.
Parkeriana *H. Wolff ex O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 877 (1933), in syn.: F. Jaeschkeana var. Parkeriana *O. E. Schulz.*
prangifolia *Korovin in Bull. Univ. As. Centr.* vii. 21 (1924), in obs.—Turkestan. (Thian Shan).
pseud-Oreoselinum (*Regel & Schmalh.*) *K.-Pol. in Bull. Soc. Nat. Voron.* i. 94 (1926), in clavi: Peucedanum pseud-Oreoselinum.
rediviva (*Pall.*) *Schischk. in Krylov, Fl. Sibir. Occ.* viii. 1996 (1935): Peucedanum redivivum.
Stewartiana *O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 877 (1933).—Ind. or. (Punjab).
ugamica *Korovin ex Baranov in Journ. Turkest. Branch Russ. Geogr. Soc.* 1924, xvii. 25, 33 (1925), nomen.—Turkestan. (Thian Shan).

FESTUCA L. (Gramin.).
alatavica (*St.-Yves*) *Roshev. in Komarov, Fl. URSS,* ii. 528 (1934): F. rubra subsp. alatavica.
ambigua *Vasey in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. 277 (1893).—U.S.A. (Oregon; Calif.).
amblyodes *Krecz. & Bobr. in Komarov, Fl. URSS,* ii. 529, 771 (1934).—Turkestan.
argentina (*Speg.*) *Parodi in Physis,* xi. 498 (1935): Poa argentina.
aucta *Krecz. & Bobr. in Komarov, Fl. URSS,* ii. 518, 767 (1934).—Kamchatka; Ins. Bering; Ins. Kuril.
baicalensis (*Griseb.*) *Krecz. & Bobr. l. c.* 518, 768: F. rubra var. baicalensis.
blepharogyna *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 66, in syn.: Leiopoa blepharogyna.
Bornmuelleri (*Hackel*) *Krecz. & Bobr. in Komarov, Fl. URSS,* ii. 510 (1934): F. ovina subsp. Bornmuelleri.
Briqueti *St.-Yves, Clav. Anal. Festuc.* (*Rev. Bret. Bot.* No. 2) 53 (1927); *St.-Yves in Candollea,* iv. 74 (1929).—Ins. Viti.
Callieri (*Hackel*) *Markgraf in Fedde, Repert. Beih.* xxx. III. 278 (1932): F. sulcata var. Callieri.

FESTUCA:—
chalcophaea *Krecz. & Bobr. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 513, 768 (1934).—Armen.; Caucas.
coelestis (*St.-Yves*) *Krecz. & Bobr. l. c.* 514, 770: F. ovina subsp. coelestis.
conferta *Troitzky ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 115 (1928).—Caucas.
congolensis *St.-Yves in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 346.—Congo Belg.
cretacea *Popov & Prosk. in Bull. Soc. Nat. Voron.* ii. 46 (1927).—Rossia.
cryophila *Krecz. & Bobr. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 519, 767 (1934).—Eur. et As. arct.
dahurica *Krecz. & Bobr. l. c.* 517, 771.—Sibir. (Transbaikal.).
dasyclada *Hackel ex Beal, Grasses N. Amer.* ii. 602 (1896).—U.S.A. (Rocky Mts.; Utah).
denticulata *Beal, l. c.* 589: F. ambigua *Vasey*.
egena *Krecz. & Bobr. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 523, 769 (1934).—Sibir.
extremiorientalis *Ohwi in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 194.—Corea.
Font-Queri *St.-Yves in Font Quer, Iter Marocc.* 1929, No. 41 [1930], nomen; *St.-Yves in Cavanillesia*, iii. 5 (1930), descr.—Marocc.; As. centr.
Forrestii *St.-Yves, Clav. Anal. Festuc.* (*Rev. Bret. Bot.* No. 2) 72 (1927); *St.-Yves in Candollea*, iii. 383 (1928).—Tibet; China (Yunnan).
incrassata *L. Sp. Pl.* ed. 1, 75, fol. orig. (1753).—Hispan.
Issatchenkoi *St.-Yves in Candollea*, v. 134 (1932).—Rossia.
Iwamotoi *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 435.—Japon. (Hokkaido).
Jeanpertii (*St.-Yves*) *Markgraf in Fedde, Repert. Beih.* xxx. III. 276 (1932): F. laevis var. Jeanpertii.
Kryloviana *Reverd. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1927, No. 2, p. 3.—Sibir.
ligulata *Swallen in Am. Journ. Bot.* 1932, xix. 436.—U.S.A. (Texas).
Litardiereana *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 323.—Marocc.
Ludovici-Gonzagae *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 133 [1933], nomen.—Marocc.
Mairei *St.-Yves in Candollea*, i. 45 (1922).—Marocc.
maritima *L. Sp. Pl.* ed. 1, 75, fol. cancell. (1753).—Hispan.
Mauritii *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 132 [1933], nomen.—Marocc.
mollissima *Krecz. & Bobr. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 512, 770 (1934).—Sibir. or.
nigricans *Schleich. Cat. Pl. Helv.* 13 (1800); *Simonk. Enum. Fl. Transsilv.* 590 (1886).—Transylv.
obturbans *St.-Yves, Clav. Anal. Festuc.* (*Rev. Bret. Bot.* No. 2) 83 (1927); *St.-Yves in Candollea*, iv. 98 (1929).—Tanganyika Terr.
Pauana *Font Quer in Cavanillesia*, iv. 25 (1931).—Marocc.
paucispiculata *Howarth ex St.-Yves in Candollea*, iv. 305 (1931), in syn.: F. Briquetii.
prolifera (*Piper*) *Fernald in Rhodora*, 1933, xxxv. 133: F. rubra subsp. prolifera.
pseudodalmatica *Kraj.*; *Kraj. in Acta Bot. Bohem.* ix. 206 (1930), descr. ampl.—Czechoslovak.
recognita *Reverd. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1928, Nos. 3–4, p. 7.—Sibir.
Regelii *Pavlov in Sovietsk. Bot.* 1934, No. 1, 19, in obs.—Turkestan.
Ruprechtii (*Boiss.*) *Krecz. & Bobr. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 507 (1934): F. ovina var. Ruprechtii.
spiralifibrosa *Vetter in Fedde, Repert.* xxxviii. 385 (1935).—Albania.
takasagoënsis *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 163.—Formosa.
Takedana *Ohwi, l. c.* 1932, i. 67, in syn.: Leiopoa nuda.
tianschanica *Roshev. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 526, 772 (1934).—Ross. asiat. (Kasakstan).
trachyphylla (*Hackel*) *Kraj. in Acta Bot. Bohem.* ix. 190 (1930), in adnot.: F. ovina subvar. trachyphylla.
tristis *Krylov & Ivanitzk. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1928, No. 1, p. 1.—Sibir.

FESTUCA:—
Vaseyana *Hackel ex Beal, Grasses N. Amer.* ii. 601 (1896).—U.S.A. (Colorado).
versicolor *Tausch.*; *Kraj. in Publ. Fac. Sc. Univ. Charles, Prague*, No. 106, 25 (1930), descr. emend.—Carpath.
versuta *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 589 (1896): F. texana *Vasey*.
yunnanensis *St.-Yves, Clav. Anal. Festuc.* (*Rev. Bret. Bot.* No. 2) 72 (1927); *St.-Yves in Candollea*, iii. 386 (1928).—China (Yunnan).

FEZIA Pitard ex Battand. in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, 1917, viii. 216; Pitard, Contrib. Étude Fl. Maroc, 2 (1918). *CRUCIFERAE*.
pterocarpa *Pitard ex Battand. l. c.*; *Pitard, l. c.*—Marocc.

FICARIA Adans. (Ranunculac.).
ficariiformis (*F. Schultz*) *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxvi. 84 (1934): Ranunculus ficariiformis.
Ledebourii *Grossheim & Schischk. in Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 108 (1930).—Caucas.

FICINIA Schrad. (Cyperac.).
dispar (*Spreng.*) *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 76 (1932): Schoenus dispar.
marginata (*Thunb.*) *Fourc. l. c.*: Scirpus marginatus.
pseudoschoenus (*Steud.*) *Fourc. l. c.*: Scirpus pseudoschoenus.

FICUS L. (Morac.; Urticac., Gen. Pl.).
acarouaniensis *Benoist in Arch. Bot., Caen*, Bull. 1929, iii. 170 (1931).—Guiana Gall.
acrorrhyncha *Summerhayes in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 98.—N. Hebrides.
aechmophylla *Summerhayes, l. c.* 1933, xiv. 62: F. Brassii *Summerhayes*.
agapetoides *Diels in Engl. Jahrb.* lxvii. 222 (1935).—N. Guin.
alococarpa *Diels, l. c.* 228.—N. Guin.
anggica *Diels, l. c.* 198.—N. Guin.
badiopurpurea *Diels, l. c.* 212.—N. Guin.
balanota *Diels, l. c.* 226.—N. Guin.
bangouanensis *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 300 (1917).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
Barclayana (*Miq.*) *Summerhayes in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 104, in obs.: Covellia Barclayana.
Bartlettii *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 153 (1934).—Sumatra.
Behrmanniana *Diels in Engl. Jahrb.* lxvii. 192 (1935).—N. Guin.
biglandulosa *Colla, Herb. Pedem.* v. 146 (1836), in obs.—Hab.?
bismarckiana *Diels in Engl. Jahrb.* lxvii. 206 (1935).—N. Guin.
Branderhorstii *Diels, l. c.* 201.—N. Guin.
Buchananii *Warb. ex Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. 99 (1932), in syn.: F. verruculosa.
calopilina *Diels in Engl. Jahrb.* lxvii. 212 (1935).—N. Guin.
camptandra *Diels, l. c.* 228.—N. Guin.
Caroli *Diels, l. c.* 200.—N. Guin.
caudato-longifolia *Sata in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1934, vi. 26.—Formosa.
chaetostyla *Diels in Engl. Jahrb.* lxvii. 216 (1935), in obs.: F. setistyla *Warb. in Fedde, Repert.* i. 77 (1905), non *Warb. in K. Schum. & Lauterb.*
cylindrocarpa *Diels, l. c.* 181.—N. Guin.
Da *Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, v. 744 (1928), in clavi, sphalm.: F. nervosa.
Dammaropsis *Diels in Engl. Jahrb.* lxvii. 204 (1935): Dammaropsis Kingiana.
destruens *F. Muell. ex C. T. White in Contrib. Arn. Arb.* No. IV. 16 (1933).—Austral. (Queensland).
distichoidea *Diels in Engl. Jahrb.* lxvii. 221 (1935).—N. Guin.
djalonensis *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 301 (1917).—Guinea Gall.
Doormaniana *Diels in Engl. Jahrb.* lxvii. 192 (1935).—N. Guin.
Dugandii *Standley in Tropical Woods*, 1932, No. 32, 20.—Colomb.
Ekmanii *Rossb. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 581 (1935).—Cuba.

FICUS:—
eustephana *Diels in Engl. Jahrb.* lxvii. 199 (1935).—N. Guin.
flagellaris *Diels, l. c.* 216.—N. Guin.
Fleuryi *A. Cheval.*; *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1935, xv. 458, descr.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
floccifera *Diels in Engl. Jahrb.* lxvii. 231 (1935).—N. Guin.
glandifera *Summerhayes in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 99.—N. Hebrides.
gracillima *Diels in Engl. Jahrb.* lxvii. 194 (1935).—N. Guin.
hadroneura *Diels, l. c.* 186.—N. Guin.
Hahliana *Diels, l. c.* 211.—N. Guin.
hainanensis *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 215 (1935).—China (Hainan).
havanensis *Rossb. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 573 (1935).—Cuba.
Hayatae *Sata in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1934, vi. 28.—Formosa.
hololampra *Diels in Engl. Jahrb.* lxvii. 201 (1935).—N. Guin.
hotteana *Ekman ex Rossb. in Notizbl. Bot. Gart Berlin*, xii. 578 (1935), in obs.—Haiti.
hylobia *Diels in Engl. Jahrb.* lxvii. 186 (1935).—N. Guin.
hypophaea *Schlechter, Die Guttapercha- und Kautschuk-Exped. Kaiser-Wilhelms-Land*, pp. 129–30 (1911); cf. *Diels in Engl. Jahrb.* lxvii. 226 (1935).—N. Guin.
incompta *Diels, l. c.* 229.—N. Guin.
iodotricha *Diels, l. c.* 216.—N. Guin.
itoana *Diels, l. c.* 219.—N. Guin.
Kajewskii *Summerhayes in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 103.—N. Hebrides.
Kingii *F. Muell. Descript. Notes Papuan Pl.* ii. 58 (1890), in obs.: F. casearioides.
laciniata *Roxb. Fl. Ind.* ed. 2, iii. 556 (1832), in obs.; *Summerhayes in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 102, in obs.: F. Wassa.
laurentina *Diels in Engl. Jahrb.* lxvii. 224 (1935).—N. Guin.
leptodictya *Diels, l. c.* 196.—N. Guin.
Lundellii *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 54 (1935).—Guatem.
mammosa *Lebrun in Mém. Inst. Roy. Col. Belge* (Sect. Sc. Nat. & Méd.) 8vo, iii. reimpr. p. 67 (1934).—Congo Belg.
marquesensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 39 (1935).—Ins. Marquesas.
megalophylla *Diels in Engl. Jahrb.* lxvii. 204 (1935).—N. Guin.
meiocarpa *Diels, l. c.* 221.—N. Guin.
meizonochlamys *Rossb. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 577 (1935).—Cuba.
microdictya *Diels in Engl. Jahrb.* lxvii. 229 (1935).—N. Guin.
nasuta *Summerhayes in Hook. Ic. Pl.* xxxii. t. 3189 (1933).—Ins. Santa Cruz.
neo-ebudarum *Summerhayes in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 97.—N. Hebrides.
nubigena *Diels in Engl. Jahrb.* lxvii. 209 (1935).—N. Guin.
otariophylla *Diels, l. c.*—N. Guin.
pachythyrsa *Diels, l. c.* 215.—N. Guin.
Parkeriana (*Miq.*) *Sandwith in Kew Bull.* 1932, 227: Pharmacosycea Parkeriana.
pernitida *Diels in Engl. Jahrb.* lxvii. 195 (1935).—N. Guin.
petrotica *Diels, l. c.* 217.—N. Guin.
phatnophylla *Diels, l. c.* 222.—N. Guin.
Phillipsii *Burtt Davy & Hutchinson in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II, p. xxiii. 442 (1932).—Transvaal.
platysycia *Diels in Engl. Jahrb.* lxvii. 213 (1935).—N. Guin.
pleiadenia *Diels, l. c.* 187.—N. Guin.
pleioclada *Diels, l. c.* 216.—N. Guin.
rarotongensis *Summerhayes ex Wilder in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 86, 41 (1931), nomen subnudum.—Ins. Cook (Rarotonga).
regnans *Diels in Engl. Jahrb.* lxvii. 182 (1935).—N. Guin.
rhopalosycia *Diels, l. c.* 232.—N. Guin.
sageretina *Diels, l. c.* 225.—N. Guin.
saurauioides *Diels, l. c.* 205.—N. Guin.
sclerotiara *Diels, l. c.* 180.—N. Guin.

FICUS:—
scutata *Lebrun in Mém. Inst. Roy. Col. Belge* (Sect. Sc. Nat. & Méd.) 8vo, iii. reimpr. p. 68 (1934): F. variabilis f. obtusifolia *De Wild.*
skytinodermis *Summerhayes in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 62: F. clusiifolia *Summerhayes.*
Smutsii *Verdoorn in Kew Bull.* 1935, 205.—Transvaal.
stelechosycia *Diels in Engl. Jahrb.* lxvii. 212 (1935). —N. Guin.
sterrocarpa *Diels, l. c.* 179.—N. Guin.
stipitata *Lebrun in Mém. Inst. Roy. Col. Belge* (Sect. Sc. Nat. & Méd.) 8vo, iii. reimpr. p. 50 (1934): F. coriacea *De Wild.*
stoechotricha *Diels in Engl. Jahrb.* lxvii. 225 (1935). —N. Guin.
subacuminata (*De Wild.*) *Lebrun in Mém. Inst. Roy. Col. Belge* (Sect. Sc. Nat. & Méd.) 8vo, iii. reimpr. p. 70 (1934), cum descr. ampl.: F. variabilis f. subacuminata.
subconcolor *Diels in Engl. Jahrb.* lxvii. 199 (1935). —N. Guin.
Supfiana *Schlechter, Die Guttapercha- und Kautschuk-Exped. Kaiser-Wilhelms-Land,* pp. 130–2 (1911); cf. *Diels in Engl. Jahrb.* lxvii. 227 (1935). —N. Guin.
tapajozensis *Standley in Tropical Woods,* 1933, No. 33, 11.—Bras. (Pará).
thelephora *Benoist in Arch. Bot., Caen,* Bull. 1929, iii. 171 (1931).—Guiana Gall.
trichocerasa *Diels in Engl. Jahrb.* lxvii. 188 (1935). —N. Guin.
trichoneura *Diels, l. c.* 230, non seq.—N. Guin.
trichoneura *Summerhayes in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 104.—N. Hebrides.
trichosphaeridia *Diels in Engl. Jahrb.* lxvii. 225 (1935).—N. Guin.
viridicarpa *Corner in Journ. As. Soc. Mal.* xi. 52 (1933).—Penins. Mal.
xylosycia *Diels in Engl. Jahrb.* lxvii. 180 (1935).—N. Guin.
Yatesii *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 154 (1934).—Sumatra.
zambalensis *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3207 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).

FILAGO L. (Compos.).
murcica *Guir. ex Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord,* 1935, xxvi. 209, in syn.: F. mareotica var. murcica *Maire.*

FILICIUM Thwait. (Sapindac.; Burserac., Gen. Pl.).
somalense *Chiov. Fl. Somala,* II. 143 (1932).—Somal. Ital.

FILIPENDULA Mill. (Rosac.).
ciliata *Kudo, Veget. Yezo,* 263 (1925); *Hara in Bot. Mag., Tokyo,* 1935, xlix. 123, in syn.: F. yezoënsis.
Filipendula (*L.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.,* ed. 3, *Sieb. & Voss,* i. 240 (1894): Spiraea Filipendula.
yezoënsis *Hara in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 235.—Japon. (Yezo).

FIMBRISTYLIS Vahl (Cyperac.).
aggregata *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1931, 44.—Ind. or. (Madras).
campylophylla *Tuyama in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 248.—Japon.
Chevalieri *Kükenth. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1931, Sér. II. iii. 547.—Guinea Gall.
ciliata *C. B. Clarke ex Drobov in Opred. Rast. Tashk.* i. 49 (1923); *Schischk. in Komarov, Fl. URSS,* iii. 94 (1935), in syn.: F. ferruginea.
contorta *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1931, 45.—Ind. or. (Travancore).
Darlingtoniana *Pennell in Bartonia,* 1933, No. 15, 30.—U.S.A. (Pennsylvania; Delaware; Maryland ?).
diphylloides *Makino in Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 1, 1389 (1925); *et l. c.* ed. 2, 1473 (1931), japonice; *Tuyama in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 252, latine.—Japon.
Fauriei *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 77.—Formosa.
filiformis (*Benth.*) *H. Pfeiff. in Fedde, Repert.* xxix. 183 (1931), in adnot.: Actinoschoenus filiformis.
hahajimensis *Tuyama in Bot. Mag., Tokyo,* 1935, xlix. 368.—Ins. Bonin.

FIMBRISTYLIS:—
kadzusana *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 43 (1934). —Japon. (Hondo).
Koidzumiana *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 78.—Formosa.
liukiuensis *Tuyama in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 250.—Ins. Liukiu.
Narayanii *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1931, 46.—Ind. or. (Travancore).
ochotensis (*Meinsh.*) *Komarov, Fl. Kamtsch.* i. 212 (1927): Scirpus ochotensis.
Tashiroana *Ohwi in Bot. Mag., Tokyo,* 1931, xlv. 377.—Japon.
Testui *Cherm. in Arch. Bot., Caen,* iv. Mém. No. 7, 33 (1931).—Afr. Gall. Centr.
Tisseranti *Cherm. l. c.* 32.—Afr. Gall. Centr.

FIORIA Mattei in Bol. Ort. Bot. Palermo, n. s. ii. 71 (1917). *MALVACEAE.*
dictyocarpa (*Webb*) *Mattei, l. c.* 74: Hibiscus dictyocarpus.
pavonioides (*Fiori*) *Mattei, l. c.*: Hibiscus pavonioides.
vitifolia (*L.*) *Mattei, l. c.* 72: Hibiscus vitifolius.

FIRMIANA Marsili (Sterculiac.).
lychnophora (*Hance*) *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. Beibl. 58, 21 (1897), in obs.: Sterculia lychnophora.
Migeodii *Exell*; *Exell in Journ. Bot.* 1931, lxix. 100, descr. ampl.—Tanganyika Terr.

FISCHERIA DC. (Asclepiadac.).
Briquetiana *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., xi. 139 (1932).—Brit. Honduras.
viridis *Moldenke in Phytologia,* i. 13 (1933).—Colomb.

FISSISTIGMA Griff. (Annonac.).
cupreonitens *Merrill & Chun in Sunyatsenia,* ii. 8 (1934).—China (Kwangtung).
Kingii (*Boerl.*) *Burkill in Kew Bull.* 1935, 317; *Burkill, Dict. Econ. Prod. Mal. Penins.* i. 1021 (1935): Melodorum Kingii.

FITCHIA Hook. f. (Compos.).
cuneata *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 102, 48 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
mangarevensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 130, 365 (1935).—Ins. Tuamotu (Mangareva).
rapensis *Forest Brown, l. c.* 366.—Polynes. (Ins. Rapa).

FLACOURTIA Commers. (Flacourtiac.; Bixac., Gen. Pl.).
ovata *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 83, 27 (1931).—Ins. Viti.

FLAGELLARIA L. (Flagellariac.).
catenata *Lour. ex Gomes in Mem. Acad. Sc. Lisb. Cl. Sc. Pol. Mor. Bel.-Let.* n. s. iv. (1), 27 (1868); *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. ii. 14, 100 (1935), in syn.: F. indica.
petraea *Lour. ex Gomes, l. c.; Merrill, l. c.* 15, 92, in syn.: Plectocomia spp.

FLEMINGIA Hunter ex Ridley in Journ. As. Soc. Straits, liii. 83 (1909). *RUBIACEAE.*
fragrans *Hunter ex Ridley, l. c.*—Hab. ?

FLEMINGIA Roxb. (Legumin.).
macrophylla *Boldingh, Zakfl. Landbouwstr. Java,* 121 (1916).—Java.

FLEURYDORA A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 1933, Sér. II. v. 158. *OCHNACEAE.*
Felicis *A. Cheval. l. c.*—Guinea Gall.

FLOURENSIA DC. (Compos.).
dentata *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 315.—Mexico.

FLUECKIGERA Kuntze (Phytolaccac.).
macrantha (*Standley*) *P. Wilson in N. Am. Fl.* xxi. 260 (1932): Ledenbergia macrantha.

FLUGGEA Willd. (Euphorbiac.).
Klaineana *Pierre ex A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 290 (1928), in syn.: Phyllanthus discoideus.

FOBEA Frič ex Bödeker in Kakteenk. 1933, 155, in obs. *CACTACEAE.*
viridiflora *Frič ex Bödeker, l. c.*, in obs.; *Frič ex Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 380 (1935), in syn.: Escobaria tuberculosa.

FOCKEA Endl. (Asclepiadac.).
cylindrica *R. A. Dyer in Kew Bull.* 1933, 459.—Afr. austr. (Cape Prov.).
gracilis *R. A. Dyer, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).

FOENICULUM Mill. (Umbellif.).
subinodorum *Maire, Weiller & Wilczek in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord,* 1935, xxvi. 121, 205. —Marocc.

FONTAINEA Heckel (Euphorbiac.).
picrosperma *C. T. White in Contrib. Arn. Arb.* No. iv. 55 (1933).—Austral. (Queensland).

FONTQUERA Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, 1931, xxii. 74, in obs.; Maire in Cavanillesia, iv. 14 (1931). *COMPOSITAE.*
Paui (*Font Quer*) *Maire, l. c.*, in obs.; *Maire, l. c.*: Perralderia Paui.

FORDIOPHYTON Stapf (Melastomatac.).
elatum *Diels in Engl. Jahrb.* lxv. 113 (1932).—Indo-China (Tonkin).
polystegium *Hand.-Mazz. in Sinensia,* iii. 196 (1933).—China (Kwangsi).
strictum *Diels in Engl. Jahrb.* lxv. 113 (1932).—China (Yunnan).

FORSTERA L. f. (Stylidiac.).
Mackayi *Allan in Trans. & Proc. Roy. Soc. N.Z.* lxv. 221 (1935).—N. Zel.

FORSTERONIA G. F. W. Mey. (Apocynac.).
chiriquensis *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1935, xxii. 203.—Panamá.
cordata (*Muell.-Arg.*) *R. E. Woodson, l. c.* 186: F. pubescens var. cordata.
decipiens *R. E. Woodson, l. c.* 181.—Peruv.
fallax *Taub. ex R. E. Woodson, l. c.* 222.—Bras. (Rio de Janeiro).
galbina *R. E. Woodson, l. c.* 198.—Peruv.
graciloides *R. E. Woodson, l. c.* 163.—Peruv.
paludosa *R. E. Woodson, l. c.* 1934, xxi. 620.—Bras. (Pará).
peninsularis *R. E. Woodson, l. c.* 1935, xxii. 215.—Brit. Honduras.
portoricensis *R. E. Woodson, l. c.* 1934, xxi. 618.—Portoric.
pycnothyrsus *K. Schum. ex R. E. Woodson, l. c.* 1935, xxii. 205.—Colomb. vel Ecuador ?
Sandwithiana *R. E. Woodson, l. c.* 209.—Guiana Brit.
simulans *R. E. Woodson, l. c.* 1934, xxi. 621.—Colomb.
subcordata *K. Schum. ex R. E. Woodson, l. c.* 1935, xxii. 189.—Ecuador.
tarapotensis *K. Schum. ex Ule*; *R. E. Woodson, l. c.* 195, descr.—Peruv.
umbellata (*Aubl.*) *R. E. Woodson, l. c.* 208: Apocynum umbellatum.
Velloziana (*A. DC.*) *R. E. Woodson, l. c.* 1934, xxi. 622: Echites Velloziana.
Wilsonii (*Griseb.*) *R. E. Woodson, l. c.* 1935, xxii. 174: Thyrsanthus Wilsonii.

FORTUNATIA Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago, Bot. Ser., xi. 9 (1931). *LILIACEAE.*
biflora (*Ruiz & Pav.*) *Macbride, l. c.*: Scilla biflora.

FORTUNELLA Swingle (Rutac.).
polyandra (*Ridley*) *Tanaka in Stud. Citrol.* v. 143 (1932), japonice: Atalantia polyandra.

FOTHERGILLA Murr. (Hamamelidac.).
montana *Hort. ex Bull. Soc. Nat. Hort. France,* 1933, Sér. V. vi. 437, in obs., nomen.—Am. bor.

FRAGARIA L. (Rosac.).
yakusimensis *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan,* 1931, iii. 115.—Japon.

FRAILEA Britton & Rose (Cactac.).
aurea *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 247, 415 (1935).—Urug.
castanea *Backeb. l. c.* 248, 415.—Urug.

FRAILEA:—
colombiana (*Werderm.*) *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 7, [p. 7], in obs., nomen; *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 248 (1935): Echinocactus colombianus.
pseudograhliana *Frič ex Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 248 (1935), nomen.—Hab.?

FRANCA [Mich. ex] Gérard, Fl. Gallo-Prov. 319 (1761): **Frankenia** L. (Frankeniac.).

FRANKENIA L. (Frankeniac.).
Ballii *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 527 (1921), in obs.—Marocc.
×composita *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 392 [1928].—Marocc.
crassicostata *Sennen in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 188, in obs., nomen.—Marocc.
crispa *J. M. Black in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1932, lvi. 43.—S. Austral.
granulata *J. M. Black, l. c.* 1933, lvii. 154.—S. Austral.
ifniensis *Caballero in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 30, p. 31 (1935).—Marocc.
×Julii *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 16 [1933].—Marocc.
latifolia (*Webb & Berth.*) *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1935, xv. 940: F. ericifolia var. latifolia.
orthotricha *J. M. Black in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1932, lvi. 43.—S. Austral.

FRANSERIA Cav. (Compos.).
acerifolia *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 78 (1933–5).—Calif. infer.

FRASERA Walt. (Gentianac.).
officinalis *Barton, Fl. Virg.* 49 (1812); cf. *Pennell in Bartonia*, 1925–6, No. 9, 28 (1926).—U.S.A. (Virginia).

FRAXINUS L. (Oleac.).
angustata (*Blume*) *Hatsusima, Bot. Surv. S. Chosen*, Rep. V. (1934); cf. *Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 369, japonice: F. Sieboldiana var. angustata.
chinensis *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 150 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 148 (1832).—China.
densata *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 130.—Corea.
excelsissima *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 41.—Japon. (Hondo).
floribunda *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 150 (1820).—Nepal.
hopeiensis *Tang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* 1931, ii. 101.—China (Chihli).
japonica *Blume ex Koch, Dendrol.* ii. 1. 239 (1872).—Japon.
Nakaiana *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 41.—Japon.
orientalis *Hort. ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 117 (1835).—Hab.?
quadrijuga *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 419.—Corea.
salicifolia *Hort. ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 116 (1835).—Hab.?
Sasakii *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 210.—Formosa.
taiwaniana *Masamune, l. c.*—Formosa.
tenodericarpa *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 42.—Japon. (Hondo).
Tobana *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 677.—Japon.

FREESIA Klatt (Iridac.).
elimensis *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1933, xxiii. 167, in obs., 168.—Afr. austr. (Cape Prov.).
flava (*N. E. Brown*) *N. E. Brown in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 27: F. Sparrmanni var. flava.
Framesii *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1934, xxiv. 243, 245.—Afr. austr. (Cape Prov.).
gentilis *N. E. Brown in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 20.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Herberti *N. E. Brown, l. c.* 14.—Afr. austr.
Hurlingii *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1933, xxiii. 112.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Middlemostii *Barker in S. Afr. Gard.* 1933, xxiii. 112.—Afr. austr. (Cape Prov.).

FREESIA:—
Muirii *N. E. Brown in Gard. Chron.* 1932, Ser. III. xcii. 467.—Afr. austr. (Cape Prov.).
occidentalis *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1933, xxiii. 255, 266.—Afr. austr. (Cape Prov.).
parva *N. E. Brown in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 9.—Afr. austr. (Cape Prov.).
picta *N. E. Brown, l. c.* 21.—Afr. austr. (Cape Prov.).

FREIREA Gaudich. (Urticac.).
micrantha (*Ledeb.*) *Jarmol. in Sovietsk. Bot.* 1934, No. 4, 144, 145: Parietaria micrantha.

FREMONTIA Torr. (Sterculiac.).
crassifolia *Eastw. in Leafl. West. Bot.* i. 139 (1934).—U.S.A. (Calif.).
napensis *Eastw. l. c.* 140.—U.S.A. (Calif.).
obispoënsis *Eastw. l. c.*—U.S.A. (Calif.).

FREMYA Brongn: & Gris (Myrtac.).
integrifolia *Brongn. & Gris ex E. G. Baker in Journ. Linn. Soc., Bot.* xlv. 311 (1931), in syn.: Xanthostemon integrifolius.

FREYCINETIA Gaudich. (Pandanac.).
almonoguiensis *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 186.—Ins. Palau.
boninensis (*Nakai*) *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 153: F. formosana var. boninensis.
carolinensis *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 185.—Ins. Palau.
Delmasiana *Martelli in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa*, Mem., 1932, xlii. 223.—Ins. Marquesas.
hivaoënsis *Martelli, l. c.* 225.—Ins. Marquesas.
marquisensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 84, 28 (1931).—Ins. Marquesas.
monticola *Forest Brown, l. c.* 29.—Ins. Marquesas.
ponapensis *Martelli in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 129.—Ins. Carolin. (Ponape).
rapensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 84, 29 (1931).—Polynes. (Ins. Rapa).
tannaënsis *Martelli in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 269.—N. Hebrides.
Villalobosensis *Martelli in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 128.—Ins. Palau.
Wilderi *Martelli ex Wilder in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 86, 15, tab. (1931); *Martelli in Univ. Calif. Publ. Bot.* xvii. 171 (1933), descr.—Ins. Cook (Rarotonga).

FRITILLARIA L. (Liliac.).
Drenovskii *Degen & Stoyanoff in Mitt. Königl. Naturw. Inst. Sofia*, iv. 142 (1931); *Turrill in Kew Bull.* 1931, 454, descr. ampl.—Macedon.
ferganensis *Losinsk. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 315, 740 (1935).—As. centr. (Mont. Pamir et Alai).
glaucoviridis *Turrill in Gard. Chron.* 1933, Ser. III. xciii. 334.—As. Min.
Grossheimiana *Losinsk. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 313, 739 (1935).—Transcaucas.; Persia.
macrocarpa *Coss. ex Battand. Contrib. Fl. Atlant.* 89 (1919).—Marocc.
Olgae *Vved. in B. Fedtsch. & al., Fl. Turkm.* i. 297 (1932).—Transcasp.
phaeanthera *Purdy in Lily Year-Book*, 1932, 97; *Eastw. in Leafl. West. Bot.* i. 55 (1933).—U.S.A. (Calif.).
pineticola *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxvi. 69 (1934).—As. Min. (Lydia).
Regelii *Losinsk. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 314, 739 (1935).—As. centr. (Mont. Pamir et Alai).
serawschanica *O. Fedtsch. ex Losinsk. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 314 (1935), in syn.: F. Olgae.
striata *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 136 (1931).—U.S.A. (Calif.).

FUCHSIA L. (Onagrac.).
Campos-Portoi *Pilger & G. K. Schulze in Rodriguesia*, i. No. 2, 95 (1935); *et in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 470 (1935).—Bras. (Rio de Janeiro).
×hortensis *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 227 (1924).—Hort.
hybrida *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 332 (1894).—Hab.?
pumila *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in syn.: F. gracilis f. pumila *Voss*.

FUCHSIA:—
×riccartonensis *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 227 (1924): F. Riccartonii *Hort. ex Tillery*.

FUERSTIA T. C. E. Fries (Labiat.).
angustifolia *G. Taylor in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl. 2, 155.—Angola; N. Rhodesia.
bartsioides (*Baker*) *G. Taylor, l. c.* 1932, lxx. 272: Orthosiphon bartsioides.
rara *G. Taylor, l. c.*—Angola.
tuberosa (*Briq.*) *G. Taylor, l. c.* 273: Orthosiphon tuberosus.
Welwitschii *G. Taylor, l. c.*—Angola.

FUGOSIA Juss. (Malvac.).
pulchella *C. A. Gardner in For. Dep. Bull., W. Austral.* No. 32, 63 (1923).—W. Austral.

FUIRENA Rottb. (Cyperac.).
ciliaris (*L.*) *Roxb. Hort. Beng.* 81 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 184 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 180 (1832): Scirpus ciliaris.
cinerascens *Boj.*; *C. B. Clarke in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 467 (1902), descr.—Zanzibar; Ins. Mascar.
Mahouxi *Cherm. in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 264.—Guinea (Togo).
primiera *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 25 (1933–5).—Calif. infer.

FUMANA Spach (Cistac.).
bracteifera *Pau in Font Quer, Iter Marocc*, 1930, No. 450 [1932].—Marocc.
×condensata *Pau in Bol. Soc. Ibér.* 1932, xxxi. 99 (1934), in obs.—Marocc.

FUMARIA L. (Papaverac.).
ajmasiana *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1928, No. 120 [1929].—Marocc.
Barnolae *Sennen & Pau in Le Monde des Plantes*, 1929, xxx. 7.—Hispan.
bifrons *Pugsley in Journ. Linn. Soc., Bot.* xlix. 99 (1932).—Marocc.
calcarata *Cadevall*; *Cadevall & Sallent, Fl. Catal.* i. 75 (1913–15), descr.—Hispan.
Embergeri *Pugsley in Journ. Linn. Soc., Bot.* xlix. 96 (1932).—Marocc.
Mairei *Pugsley ex Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 276; *Pugsley in Journ. Linn. Soc., Bot.* xlix. 97 (1932).—Alger.
Mauritii *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 5 [1933], nomen.—Marocc.
multiflora *Pugsley in Journ. Linn. Soc., Bot.* xlix. 94 (1932).—Marocc.
Normanii *Pugsley, l. c.* xlix. 518 (1934).—Alger.
ragusina (*Pugsley*) *Pugsley, l. c.* 524: F. officinalis var. ragusina.

FUNASTRUM Fourn. (Asclepiadac.).
ovalifolium (*Rusby*) *Killip in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 351: Philibertia ovalifolia.
vesciculare *R. E. Woodson in Am. Journ. Bot.* 1935, xxii. 687.—Mexico.

FUNIFERA Leandr. ex C. A. Mey. (Thymelaeac.).
ericiflora (*Gilg & Markgraf*) *Domke in Biblioth. Bot.* cxi. 57 (1934), in obs.: Daphnopsis ericiflora.
grandifolia *Domke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 731 (1935).—Bras. (Rio de Janeiro).

FURCRAEA Vent. (Amaryllidac.).
interrupta *auct. ex Trelease in L. H. Bailey, Standard Cycl. Hort.* iii. 1306 (1915), in syn.: F. tuberosa.
variegata *Hort. ex Trelease, l. c.*, in syn.: F. gigantea var. medio-picta *Trelease*.

FUSAEA Safford (Annonac.).
decurrens *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* xii. 207 (1934).—Peruv.

G

GAERTNERA Lam. (Rubiac.; Loganiac., Gen. Pl.).
brevistylis *Ridley in Kew Bull.* 1934, 124.—Borneo.
Cooperi *Hutchinson & M. B. Moss in Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 21 (1931).—Guinea Gall.; Liberia.
crinita *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxxvi. (*Hist. Nat. Pl.* vi. Atlas iv.) t. 432 (1897).—Madag.

GAERTNERA:—
ferruginea *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 272 (1931), in syn.: Premna quadrifolia.
salicifolia *Hutchinson & Gillett in Hutchinson & Dalziel, l. c.* 21.—Liberia.
spathacea *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxxvi. (*Hist. Nat. Pl.* vi. Atlas iv.) t. 433 (1897).—Madag.

GAGEA Salisb. (Liliac.).
altaica *Schischk. & Sumnev. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1928, No. 8, 1 (1929).—Ross. asiat.
anisopoda *Popov in Komarov, Fl. URSS*, iv. 103, 737 (1935).—Transcasp.
Bergii *Litw. in B. Fedtsch. & al., Fl. Turkm.* i. 267 (1932).—Transcasp.
capillifolia *Vved. in Vved. & al., Key Fl. Tashkent*, 60 (1923).—Turkestan.
Caroli-Kochii *Grossheim in Komarov, Fl. URSS*, iv. 99, 736 (1935).—Transcaucas.
coreana *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 603.—Corea; Japon.
cretacea *Sukatsch. ex Grossheim in Komarov, Fl. URSS*, iv. 79 (1935), in syn.: G. erubescens.
Dayana *Chodat & Beauverd in Dinsm. Pl. Post. & Dinsm.* Fasc. I. 8 (1932); *Dinsm. in Fedde, Repert.* xxxiii. 107 (1933).—Syria.
Dutoitii *Maire & Wilczek in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 318.—Marocc.
gageoides (*Zucc.*) *Vved. in B. Fedtsch. & al., Fl. Turkm.* i. 261 (1932): Bulbillaria gageoides.
gracillima *Pampan. in Sped. Ital. De Filippi Himal. etc. 1913–14*, Ser. II. xi. (*Agg. Fl. Carac.*) 156 (1934).—Mont. Karakoram.
graeca (*L.*) *Dandy in Journ. Bot.* 1932, lxx. 330: Anthericum graecum.
graminifolia *Vved. in B. Fedtsch. & al., Fl. Turkm.* i. 269 (1932).—Transcasp.
improvisa *Grossheim in Komarov, Fl. URSS*, iv. 102, 737 (1935).—Transcaucas.
Joannis *Grossheim, l. c.* 70, 734.—Armen.
kneissea *J. Thiéb. in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 119.—Syria.
kopetdagensis *Vved. in B. Fedtsch. & al., Fl. Turkm.* i. 260 (1932).—Transcasp.
Korshinskyi *Grossheim in Komarov, Fl. URSS*, iv. 77, 735 (1935).—Bokhara.
longiscapa *Grossheim, l. c.* 79, 735.—Sibir.
minuta *Grossheim, l. c.* 76, 734.—Bokhara.
mirabilis *Grossheim, l. c.* 88, 736.—Ross. asiat. (Kasakstan.).
nova *G. Sampaio ex Lopes in Bol. Soc. Brot.* Ser. II. vi. 272 (1929–30).—Lusitan.
Paczoskii (*Zapal.*) *Grossheim in Komarov, Fl. URSS*, iv. 91 (1935): G. pratensis var. Paczoskii.
pamirica *Grossheim, l. c.* 108, 738.—As. centr. (Thian Shan; Pamir).
parva *Vved. ex Grossheim, l. c.* 82.—As. centr.
pseudoreticulata *Vved. in B. Fedtsch. & al., Fl. Turkm.* i. 268 (1932).—Transcasp.
pubescens *Popov ex Grossheim in Komarov, Fl. URSS*, iv. 90 (1935), in syn.: G. dubia.
samojedorum *Grossheim, l. c.* 84, 736.—Ross. bor.
smyrnaea *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxvi. 70 (1934).—As. Min. (Lydia).
transcarpatica *Domin in Acta Bot. Bohem.* x. 18 (1931), in obs., pro syn.: G. spathacea var. transcarpatica *Domin.*
triquetra *Vved. in Vved. & al., Key Fl. Tashkent*, 59 (1923).—As. centr.
tunicata (*J. & C. Presl*) *Kreutzer, Anthochron. Pl. Eur. Med.* 12, 222 (1840): Ornithogalum tunicatum.
turcomanica *Popov in B. Fedtsch. & al., Fl. Turkm.* i. 269 (1932).—Transcasp.
variabilis *Popov ex Grossheim in Komarov, Fl. URSS*, iv. 88 (1935), in syn.: G. emarginata.
Vvedenskyi *Grossheim, l. c.* 107, 737.—As. centr. (Thian Shan; Pamir).

GAHNIA J. R. & G. Forst. (Cyperac.).
marquisensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 84, 112 (1931).—Ins. Marquesas.
Stokesii *Forest Brown, l. c.* 113.—Ins. Austral; Ins. Rapa.

GAIADENDRON G. Don (Loranthac.).
macranthum *Killip in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1934, xxiv. 44.—Peruv.

GALACTIA P. Br. (Legumin.).
belizensis *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 133 (1932).—Brit. Honduras.
Broussonetii (*Balb.*) *Colla, Herb. Pedem.* ii. 150 (1834), in obs.: Clitoria Broussonetii.
carnea *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 10 (1932).—Santo Domingo.
elliptifoliola *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 12 (1935).—China (Hainan).
mississippiensis (*Vail*) *Rydb. Fl. Prairies & Plains Centr. N. Amer.* 493 (1932): G. volubilis var. mississippiensis.
nitida *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 62 (1935).—Brit. Honduras.
obovata *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 13, 88 (1931).—Bras. (Matto Grosso).
ocoana *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 11 (1932).—Santo Domingo.
prostrata *Small, Man. Southeast. Fl.* 719 (1933).—U.S.A. (Florida).

GALACTOPHORA R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard. 1932, xix. 49. *APOCYNACEAE.*
calycina (*Huber*) *R. E. Woodson, l. c.* 50: Dipladenia calycina.
crassifolia (*Muell.-Arg.*) *R. E. Woodson, l. c.*: Amblyanthera crassifolia.
magnifica *R. E. Woodson, l. c.* 382.—Bras.
pulchella *R. E. Woodson, l. c.* 51.—Bras.
Schomburgkiana *R. E. Woodson, l. c.* 50.—Guiana Brit.

GALANTHUS L. (Amaryllidac.).
Melvillei *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1006 (1895), in obs.—Hab.?
octobrensis *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in syn.: G. nivalis.
Woronowii *Losinsk. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 479, 749 (1935).—Reg. Caucas.

GALARHOEUS Haw. (Euphorbiac.).
adenochlorus (*Morr. & Decne.*) *Hara in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 383: Euphorbia adenochlora.
arkansanus (*Engelm. & A. Gray*) *Small ex Rydb. Fl. Prairies & Plains Centr. N. Amer.* 520 (1932): Euphorbia arkansana.
austrinus (*Small*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 801 (1933): Tithymalus austrinus.
commutatus (*Engelm.*) *Small ex Rydb. Fl. Prairies & Plains Centr. N. Amer.* 520 (1932): Euphorbia commutata.
Cyparissias (*L.*) *Small ex Rydb. l. c.*: Euphorbia Cyparissias.
Darlingtonii (*A. Gray*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 801 (1933): Euphorbia Darlingtonii.
ebracteolatus (*Hayata*) *Hara in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 384: Euphorbia ebracteolata.
Esula (*L.*) *Rydb. in Brittonia*, i. 93 (1931): Euphorbia Esula.
floridanus (*Chapm.*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 801 (1933): Euphorbia floridana.
inundatus (*Torr.*) *Small, l. c.*: Euphorbia inundata.
Jolkini (*Boissieu*) *Hara in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 385: Euphorbia Jolkini.
lucidus (*Waldst. & Kit.*) *Rydb. in Brittonia*, i. 93 (1931): Euphorbia lucida.
missouriensis (*Norton*) *Rydb. l. c.*: Euphorbia arkansana var. missouriensis.
obtusatus (*Pursh*) *Small ex Rydb. Fl. Prairies & Plains Centr. N. Amer.* 520 (1932): Euphorbia obtusata.
pekinensis (*Rupr.*) *Hara in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 386: Euphorbia pekinensis.
robustus (*Engelm.*) *Rydb. in Brittonia*, i. 93 (1931): Euphorbia montana var. robusta.
sendaicus (*Makino*) *Hara in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 388: Euphorbia sendaica.
Sieboldianus (*Morr. & Decne.*) *Hara, l. c.*: Euphorbia Sieboldiana.
telephioides (*Chapm.*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 801 (1933): Euphorbia telephioides.
togakusensis (*Hayata*) *Hara in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 389: Euphorbia togakusensis.

GALARHOEUS:—
trichotomus (*H. B. & K.*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 802 (1933): Euphorbia trichotoma.
Watanabei (*Makino*) *Hara in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 389: Euphorbia Watanabei.

GALATELLA Cass. (Compos.).
(sphalm. Calatella) Luengoi *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 99, nomen alternativ.—Hispan.
pontica *Novopokr. & Bogdan in Sc. Journ. Rostov-on-Don State Univ.* vi. 44 (1935), in syn.: G. Linosyris subsp. pontica *Novopokr. & Bogdan.*

GALEANDRA Lindl. (Orchidac.).
multifoliata *W. Zimmerm. in Biblioth. Bot.* cix. 2 (1934).—Bras. (Minas Geraes).

GALEARIS Rafin. Herb. Rafinesq. 71 (1833). *ORCHIDACEAE.*
biflora *Rafin. l. c.* 72.—U.S.A. (Mont. Allegheny).
spectabilis (*L.*) *Rafin. l. c.*: Orchis spectabilis.

GALENIA L. (Ficoidac.).
fallax *Pax ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 147 (1915), in obs.—Namaqualand.
Steingroeveri *Engl. l. c.*, in obs.—Namaqualand.

GALEOPSIS L. (Labiat.).
Alberti *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1932, xxxi. 49, descr.—Hispan.
Blanqueti *Sennen*; *Sennen, l. c.* 20, descr.—Hispan.
× carinthiaca *Porsch ex Fiori, Nuov. Fl. Anal. Ital.* ii. 421 (1926).—Ital.
Conilli *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1932, xxxi. 46, descr.—Hispan.
Costei *Sennen*; *Sennen, l. c.* 21, descr.—Hispan.
crenatifolia *Sennen*; *Sennen, l. c.* 18, descr.—Hispan.
× fragrans *Porsch ex Fiori, Nuov. Fl. Anal. Ital.* ii. 421 (1926).—Ital.
Nadali *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1932, xxxi. 19.—Pyren.
pseudo-Tetrahit *P. Fourn. in Le Monde des Plantes*, 1934, xxxv. 20.—Gallia.
pubinervis *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1932, xxxi. 45, descr.—Hispan.
Rechingeri *Sennen*; *Sennen, l. c.* 48, descr.—Hispan.
Rolandi *Sennen*; *Sennen, l. c.* 21, descr.—Hispan.
× styriaca *Porsch ex Fiori, Nuov. Fl. Anal. Ital.* ii. 421 (1926).—Ital.
Timbali *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1932, xxxi. 47, descr.—Hispan.
Violeti *Sennen*; *Sennen, l. c.* 48, descr.—Hispan.

GALEORCHIS Rydb. (Orchidac.).
cyclochila (*Franch. & Sav.*) *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, iv. 669 (1935): Habenaria cyclochila.
Reichenbachii *Nevski, l. c.* 670, in obs.: Orchis spathulata *Reichb. ex Benth.*
Roborovskyi (*Maxim.*) *Nevski. l. c.*, in obs.: Orchis Roborovskyi.

× **GALIASPERULA** Ronniger in Fedde, Repert. xxix. 143 (1931). *RUBIACEAE.*
[Asperula × Galium.]
Himmelbauriana *Ronniger, l. c.*—Bulgar.

GALIPEA Aubl. (Rutac.).
Davisii *Sandwith in Kew Bull.* 1935, 118.—Guiana Brit.
tubiflora *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 357.—Bras. (Matto Grosso).

GALIUM L. (Rubiac.).
afro-alpinum *Bullock in Kew Bull.* 1932, 498.—Kenya Col.; Uganda.
asperifolium *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 381 (1820).—Nepal.
Bourgaeanum *Coss.*; *Battand. Contrib. Fl. Atlant.* 42 (1919), descr.—Afr. bor.-occ.
charoides *Rusby in Phytologia*, i. 80 (1934).—Boliv.
Clementis *Eastw. in Leafl. West. Bot.* i. 56 (1933).—U.S.A. (Calif.).
elegans *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 382 (1820).—Nepal.
× Ferdinandi-Coburgi *J. Wagner in Fedde, Repert.* xxxviii. 284 (1935).—Thessal.
filifolium (*Wieg.*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 1268 (1933): G. tinctorium var. filifolium.

GALIUM:—
formosense *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 55 (1934). —Formosa.
gilboënse *Eig in Fedde, Repert. Beih.* lxiii. 1. 114 (1931), nomen.—Palaest.
glaucophyllum *Schmid in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1933, lxxviii. 253.—Sardin.
Jepsoni *Hilend & Howell in Leafl. West. Bot.* i. 135 (1934).—U.S.A. (Calif.).
Jolyi *Battand. Contrib. Fl. Atlant.* 42 (1919).—Marocc.
jordanense *Eig in Fedde, Repert. Beih.* lxiii. II. 103 (1932), nomen.—Palaest.
kiirunense *Masamune, Suzuki & Mori in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 412: G. gracile f. rotundifolia *Hayata*.
Kinuta *Nakai & Hara in Journ. Jap. Bot.* ix. 518 (1933): G. boreale *Miq. Prol. Fl. Jap.* 276 (1866–7), non *L.*
kwanzanense *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 56 (1934).—Formosa.
lutchuense *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 618.—Ins. Liukiu.
Miyabei *Koidz. ex Hara in Journ. Jap. Bot.* ix. 517 (1933), in syn.: G. Nakaii.
mollicomum *Bullock in Kew Bull.* 1932, 498.—Kenya Col.; Uganda.
Munzii *Hilend & Howell in Leafl. West. Bot.* i. 135 (1934).—U.S.A. (Calif.; Nevada).
Nakaii *Kudo in Jap. Journ. Bot.* ii. 277 (1925), nomen; *Hara in Journ. Jap. Bot.* ix. 517 (1933), descr.—Japon. (Yezo).
nankotaizanum *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 56 (1934).—Formosa.
oliganthum *Nakai & Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. 1. (*Pl. Nov. Jehol.* 1.) 56 (1934).—Manchur. (Jehol).
Parishii *Hilend & Howell in Leafl. West. Bot.* i. 136 (1934): G. parvifolium *Jepson*.
pedunculatum *Stoyanoff & Stefanoff ex Stefanoff & Jordanoff in Engl. Jahrb.* lxiv. 513 (1931), nomen; *Stoyanoff & Stefanoff in Magyar Bot. Lap.* 1933, xxxii. 3, descr.—Macedon.
petraeum *Coss. & Dur. ex Munby*; *Battand. Contrib. Fl. Atlant.* 42 (1919), descr.—Afr. bor.-occ.
prolazense *Nyár. in Bul. Grăd. & Muz. Bot. Univ. Cluj*, 1935, xv. 55.—Ruman.
pubescens *Requien ex Guérin in Desv. Journ. de Bot.* iii. [No. 5] 235 [1816].—Gallia.
punduanum *Wall.*; *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 233 (1934), descr.—Burma; Siam.
Rouyanum *Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* v. 39 [1921]: G. Jordani var. gracilicaule *Rouy*.
utahense *Eastw. in Leafl. West. Bot.* i. 55 (1933).—U.S.A. (Utah).
Werdermannii *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 398 (1931).—Chile.
Witmanni *Ten. in Atti Accad. Pontan.* i. 194 (1832). —Ital.
yakusimense *Masamune, Prelim. Rep. Veg. Yakus.* 120 (1929); *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1930, ii. 37; *et in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* xi., Bot. No. 4, 423 (1934).—Ins. Liukiu (Yakushima).

GALLESIA Casar. (Phytolaccac.).
ovata *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxxii. 97 (1933).—Peruv.

GALPINSIA Britton (Onagrac.).
glandulifera *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 575.—U.S.A. (N. Mexico).

GALVEZIA Domb. ex Juss. (Scrophulariac.).
sessilis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 51 (1933–5).—Mexico.

GAMOLEPIS Less. (Compos.).
speciosa *Pillans in Journ. Bot.* 1931, lxix. 50.—Afr. austr. (Cape Prov.).

GAMOTOPEA Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl. 1934, xxxi. 293. *RUBIACEAE.*
alba (*Aubl.*) *Bremek. l. c.* 294: Tapogomea alba.
callithrix (*Miq.*) *Bremek. l. c.*: Cephaëlis callithrix.
purpurea (*Aubl.*) *Bremek. l. c.*: Tapogomea purpurea.
surinamensis (*Standley*) *Bremek. l. c.*: Cephaëlis surinamensis.

GAMWELLIA E. G. Baker in Journ. Bot. 1935, lxxiii. 160. *LEGUMINOSAE.*
flava *E. G. Baker, l. c.* 161.—N. Rhodesia.

GARCINIA L. (Guttif.).
affinis (*Chiov.*) *Chiov. Fl. Somala*, II. 18 (1932), in ic.: G. Ferrandii var. affinis.
albo-rosea *Pierre ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 512 (1921), in obs.—Gabon.
bullata *Staner in Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. 157 (1934).—Angola.
Bussei *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 510 (1921), in obs. —Tanganyika Terr.
Kajewskii *C. T. White in Contrib. Arn. Arb.* No. IV. 72 (1933).—Austral. (Queensland).
Klainii *Pierre ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 514 (1921), in obs.—Gabon.
Matsudai *Kanehira, Fl. Micrones.* 235 (1933), japonice; *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 675, latine.—Ins. Palau.
menisperma *Pierre ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 515 (1921), in obs.—Gabon.
pallidinervia *Engl. l. c.* 510, in obs.—Congo Belg.; Tanganyika Terr.
Rumiyo *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 329.—Ins. Palau.
trukensis *Kanehira, l. c.* 1932, xlvi. 488.—Ins. Carolin. (Truk).

GARDENIA Ellis (Rubiac.).
anisophylla *Jack ex Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 561 (1824).—Penins. Mal.
arborea *Roxb. Hort. Beng.* 15 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 554 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 708 (1832).—Ind. or. (Madras).
calyculata *Roxb. l. c.* 85, nomen; *et l. c.* 550; *et l. c.* 704.—Ind. or.
campanulata *Roxb. l. c.* 15, nomen; *et l. c.* 556; *et l. c.* 710.—Ind. or. (Bengal).
carinata *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 560 (1824).—Penins. Mal.
costata *Roxb. Hort. Beng.* 15 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 550 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 704 (1832).—Ind. or.
costulata *Ridley in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 274.—Borneo.
densa *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 559 (1824).—Nepal.
enneandra *Koen. ex Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 552 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 706 (1832), in syn.: G. latifolia.
Lane-Poolei *Hutchinson*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 73 (1931), in syn.: G. nitida.
lineata *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 119 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 287, descr. ampl.—Siam.
Lobbii *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 120 (1932): G. speciosa *Hook. f.*
longisepala (*Masamune*) *Masamune in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* xi., Bot. No. 4, 417 (1934): G. angusta var. longisepala.
longituba *Ridley in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 274.—Borneo.
lucida *Roxb. Hort. Beng.* 15 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 553 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 707 (1832).—Ind. or.
mamillata *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 121 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 288, descr. ampl.—Siam.
montana *Roxb. Hort. Beng.* 85 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 556 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 709 (1832).—Ind. or. (Madras).
similis (*Craib*) *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 122 (1932): Randia similis.
sinensis *Lour. ex Gomes in Mem. Acad. Sc. Lisb. Cl. Sc. Pol. Mor. Bel.-Let.* n. s. iv. (1), 28 (1868); *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 16, 313 (1935), in syn.: Ichnocarpus volubilis.
stupinocarpa *Chiov. Fl. Somala*, II. 238 (1932).—Somal. Ital.
tannaënsis *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 5.—N. Hebrides.
tetrasperma *Roxb. Hort. Beng.* 85 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 555 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 709 (1832).—Kashmir.

GARDENIA:—
truncata *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 123 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 288, descr. ampl.—Siam.
tubifera *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 562 (1824).—Penins. Mal.
turgida *Roxb. Hort. Beng.* 15 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 557 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 711 (1832).—Bhutan.

GARDNERIA Wall. in Roxb. Fl. Ind., ed. Carey & Wall., i. 400 (1820). *LOGANIACEAE.*
angustifolia *Wall. l. c.* ii. 318 (1824).—Reg. Himal.
ovata *Wall. l. c.* i. 400 (1820); *et l. c.* ii. 318 (1824). —Reg. Himal.

GARDOQUIA Ruiz & Pav. (Labiat.).
salviifolia *Colla, Herb. Pedem.* iv. 469 (1835); *Colla in Mem. Accad. Torin.* xxxix. 2, t. 48 (1836).—Chile.

GARHADIOLUS Jaub. & Spach (Compos.).
acaulis *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxvi. 149 (1934).—As. Min. (Lydia).

GARNOTIA Brongn. (Gramin.).
depressa *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 18 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
raiateënsis *J. W. Moore, l. c.*—Ins. Societ. (Raiatea).
triseta *Hitchcock in Lingnan Sc. Journ.* vii. 200 (1931).—China (Kwangtung).

GARRYA Dougl. ex Lindl. (Cornac.).
grisea *Wiggins in Contrib. Dudley Herb. Stanford Univ.* i. 172 (1933).—Calif. infer.

GARULEUM Cass. (Compos.).
crinitum *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 184 (1932). —Hereroland.

×**GASTERALOË** Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 1931, Sér. II. iii. 339. *LILIACEAE.* [ALOË × GASTERIA.]
Bedinghausii (*Radl*) *Guillaumin, l. c.*: Aloë Bedinghausii.
Beguinii (*Radl*) *Guillaumin, l. c.*: Aloë Beguinii.
Chludowii (*Radl*) *Guillaumin, l. c.*: Aloë Chludowii.
Derbetzei (*Hort.*) *Guillaumin, l. c.*: Aloë Derbetzi.
Lapaixii (*Radl*) *Guillaumin, l. c.*: Aloë Lapaixii.
mortolensis (*A. Berger*) *Guillaumin, l. c.*: Aloë mortolensis.
Pfrimmeri *Guillaumin, l. c.*—Hort.
Rebutii (*Hort. ex A. Berger*) *Guillaumin, l. c.* 340: Aloë Rebutii.
Simoniana (*Deleuil*) *Guillaumin, l. c.*: Aloë Simoniana.
smaragdina (*Hort. ex A. Berger*) *Guillaumin, l. c.*: Aloë smaragdina.

×**GASTERHAWORTHIA** Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 1931, Sér. II. iii. 339. *LILIACEAE.* [GASTERIA × HAWORTHIA.]
Holtzei (*A. Berger*) *Guillaumin, l. c.* 340: Gasteria Holtzei.

GASTERIA Duval (Liliac.).
×Holtzei *A. Berger in Engl. Pflanzenreich, Liliac.-Asphodel.-Aloin.* 131 (1908).—Hort.
Lutzii *v. Poelln. in Fedde, Repert.* xxxiii. 242 (1933). —Afr. austr. (Cape Prov.).

GASTROCHILUS D. Don (Orchidac.).
calceolaris *D. Don*; *Ames & Quisumb. in Philipp. Journ. Sc.* 1932, xlix. 495, descr. ampl.—Sikkim; Assam; Sumatra; Java; Luzon.
nebulosus *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 762.—Formosa.
raraënsis *Fukuyama, l. c.* 1934, xlviii. 441.—Formosa.
rupestris *Fukuyama, l. c.* 1935, xlix. 763.—Formosa.

GASTROCHILUS Wall. (Zingiberac.; Scitamin., Gen. Pl.).
rotundus (*L.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 281 (1931): Curcuma rotunda.

GASTRODIA R. Br. (Orchidac.).
callosa *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxix. 248 (1931).—Java.
grandilabris *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 179 (1935).—Borneo.
lutea *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 666.—Formosa.

GASTRODIA:—
taiwaniana *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 299.—Formosa.

×**GASTROLEA** Walth. (Liliac.).
Lapaixii (*Radl*) *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 1031: Aloë Lapaixii.
Pfrimmeri (*Guillaumin*) *Guillaumin, l. c.*: Gasteraloë Pfrimmeri.
Simoniana (*Deleuil*) *Guillaumin, l. c.*: Aloë Simoniana.

×**GASTROLIRION** Walth. in Cact. & Succ. Journ. Amer. v. 467, 468 (1933). *LILIACEAE.* [CHORTOLIRION × GASTERIA.]
Orpetii *Walth. l. c.* 468.—Hort.

GASTRONYCHIA Small, Man. Southeast. Fl. 480 (1933). *CARYOPHYLLACEAE.*
herniarioides (*Michx.*) *Small, l. c.*: Anychia herniarioides.

GASTRORCHIS Schlechter (Orchidac.).
Schlechteri *H. Perrier ex François*; *H. Perrier in Bull. Acad. Malgache*, 1929, n. s. xii. 33, in clavi, 35, in adnot. (1930), descr.—Madag.

GAULTHERIA L. (Ericac.).
abbreviata *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxxv. 292 (1934).—Sumatra.
alnifolia (*Dun.*) *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 109: Thibaudia alnifolia.
antioquiensis *A. C. Smith, l. c.* 108.—Colomb.
apiculata *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 59 (1934).—Peruv.
appressa *A. W. Hill in Journ. Linn. Soc., Bot.* xlix. 622 (1935).—Austral. (N. S. Wales; Victoria).
arachnoidea *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 101.—Colomb.
atjehensis *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxxv. 293 (1934).—Sumatra.
benguetensis *H. F. Copeland in Philipp. Journ. Sc.* 1932, xlvii. 58.—Ins. Philipp. (Luzon).
bicolor *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 59 (1934).—Peruv.
Bolivari *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 26, 13 (1933).—Colomb.
caudata *Stapf in Bot. Mag.* t. 9228 (1931).—China (Yunnan?).
ciliolata (*Hook. f.*) *F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict.* i. II. 21 (1889): Diplycosia ciliolata.
codonantha *Airy-Shaw in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3207 (1933).—Assam.
cordifrons *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 283 (1935): G. glandulifera *B. Fedtsch. & Basilevsk.*
Cummingii *Sleum. l. c.* xii. 125 (1934).—Mexico.
Donnellii *Sleum. l. c.* 126.—Costa Rica.
glandulosissima *Sleum. l. c.* 60.—Peruv.
glomerata (*Cav.*) *Sleum. l. c.* xii. 283 (1935): Andromeda glomerata.
hapalotricha *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 106.—Colomb.
martaënsis *Rusby in Phytologia*, i. 71 (1934), in obs., nomen.—Boliv.
megalodonta *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 100.—Ecuador.
microdonta *A. C. Smith, l. c.* 108.—Colomb.
Mutisiana *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 26, 12 (1933).—Colomb.
neglecta *Colenso ex B. L. Burtt & A. W. Hill in Journ. Linn. Soc., Bot.* xlix. 643 (1935), in obs., pro syn.: G. Colensoi × Pernettya macrostigma.
notabilis *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 18 (1933).—China (Yunnan).
opaca *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 61 (1934).—Peruv.
paniculata *B. L. Burtt & A. W. Hill in Journ. Linn. Soc., Bot.* xlix. 614 (1935).—N. Zel.
Pennellii *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 105.—Colomb.
poasana *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 127 (1934).—Costa Rica.
psilantha *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 107.—Colomb.
psilocarpa *H. F. Copeland in Philipp. Journ. Sc.* 1932, xlvii. 62.—Ins. Philipp. (Mindoro; Negros; Mindanao).
regia *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 62 (1934).—Colomb.

GAULTHERIA:—
revoluta *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 102.—Colomb.
rufolanata *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 127 (1934).—Colomb.
santanderensis *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 104.—Colomb.
Schiedeana *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 128 (1934) —Mexico.
sclerophylla *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 26, 14 (1933).—Colomb.
sinensis *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 19 (1933).—Tibet; Yunnan; Upper Burma.
Stuebeliana *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 63 (1934).—Colomb.
subrotunda *Sleum. l. c.* xii. 284 (1935).—Nicarag.
Tatei *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 99.—Venez.
tristis *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 129 (1934).—Peruv.
vegasana *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 103.—Colomb.
Weberbaueriana *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 64 (1934).—Peruv.
yunnanensis (*Franch.*) *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1934, xv. 282: Vaccinium yunnanense.

GAYA H. B. & K. (Malvac.).
jaënensis *Ulbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 539 (1932).—Peruv.
peruviana *Ulbr. l. c.* 540.—Peruv.
Weberbaueri *Ulbr. l. c.* 541.—Peruv.

GAYLUSSACIA H. B. & K. (Ericac.; Vacciniac., Gen. Pl.).
cacuminis *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 438.—Venez.
insignis *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 130 (1934).—Bras. (Minas Geraes).
Mosieri (*Small*) *Camp in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1935, lxii. 129, et 130, in clavi: Lasiococcus Mosieri.
orocola (*Small*) *Camp, l. c.*, in clavi: Lasiococcus orocola.

GEANTHUS Rafin. Specchio, i. 116 (1814). *IRIDACEAE?*
autumnalis *Rafin. l. c.*—U.S.A. (Pennsylvania).

GEBOSCON Rafin. (Liliac.).
bivalve (*L.*) *House in Bull. N. Y. State Mus.* 1920, Nos. 233–4, 66 (1921): Ornithogalum bivalve.
fragrans (*Kunth*) *House, l. c.* 67: Nothoscordum fragrans.
neriniflorum (*Herb.*) *House, l. c.*: Caloscordum neriniflorum.

GEIJERA Schott (Rutac.).
Deplanchei (*Panch. & Sebert*) *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1932, lxxvii. Beibl. 19, 196: Dendrosma Deplanchei.

GEISSANTHUS Hook. f. (Myrsinac.).
Karlii *Macbride in Candollea*, v. 395 (1934).—Peruv.

GEISSASPIS Wight & Arn. (Legumin.).
Castroi *E. G. Baker in Bol. Soc. Brot.* Sér. II. viii. 106 (1933).—Angola.
Heudelotiana *Baill. ex Tisserant in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 334, pro syn.: G. lupulina.
Mendoncae *E. G. Baker in Bol. Soc. Brot.* Sér. II. viii. 105 (1933).—Angola.

GEISSOIS Labill. (Cunoniac.; Saxifragac., Gen. Pl.).
superba *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 83, 9 (1931).—Ins. Viti.

GEISSORHIZA Ker-Gawl. (Iridac.).
eurystigma *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1931, xxi. 281, 282, 369.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Rogersii *N. E. Brown in Kew Bull.* 1931, 452.—Afr. austr. (Cape Prov.).
subrigida *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 276, 277.—Afr. austr. (Cape Prov.).

GEISSOSPERMUM Allem. (Apocynac.).
excelsum *Kuhlm. in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 89 (1935).—Bras. (Amaz.).
myristicifolium *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 787 (1933).—Ecuador.

GELONIUM Roxb. (Euphorbiac.).
borneënse *Pax & K. Hoffm. in Mitt. Inst. Bot. Hamburg*, vii. 230 (1931).—Borneo.
occidentale *Hoyle in Kew Bull.* 1935, 258.—Gold Coast.
pinatubense *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3186 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).

GENDARUSSA Nees (Acanthac.).
sericea (*Ruiz & Pav.*) *Kostel. Allg. Med. Pharm. Fl.* iii. 931 (1834): Justicia sericea.

GENIOSTOMA J. R. & G. Forst. (Loganiac.).
acuminatum *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 316 (1824).—Penins. Mal.
clavatum *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 38 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
glaberrimum *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 34.—Ins. Marian.
kasyotense *Kanehira & Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 400.—Formosa (Ins. Samasana).
kusaiense *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 491.—Ins. Carolin. (Kusai).
longistylum *Gilg-Benedict in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 221 (1934).—Ins. Marian.
macrophyllum *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 91, 25 (1932).—Ins. Viti.
niinoanense *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 341.—Ins. Carolin. (Ponape).
rapense *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 226 (1931).—Polynes. (Ins. Rapa).
Sarasinii *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1933, lxxviii. Beibl. 19, 371.—Ins. Loyauté.
sessile *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 342.—Ins. Palau.

GENIPA L. (Rubiac.).
Talangnignia *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxxvi. (*Hist. Nat. Pl.* vi. Atlas iv.) t. 442 (1897).—Madag.

GENISTA L. (Legumin.).
acutiflora *Pau in Font Quer, Iter Marocc.* 1930, No. 292 [1932].—Marocc.
Caballeroi *Pau ex Caballero in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 11, 19 (1917).—Marocc.
demnatensis *Coss. in Bull. Soc. Dauph.* 1883, p. 413, No. 3991, nomen.—Marocc.
hypericifolia *Herb. ex Colla, Herb. Pedem.* ii. 65 (1834).—Ital.
ifniensis *Caballero in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.* 1935, xxxv. 332.—Hispan.
macrobotrys *Maire & Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 29 [1933], nomen.—Marocc.
mauritiana *Pau & Sennen in Sennen & Mauricio, l. c.* 145, nomen.—Marocc.
nociva *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 276 [1928].—Marocc.
palmiformis *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 29 [1933], nomen.—Marocc.
Pomeliana *Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc*, ii. 356 (1932): Argyrolobium saharae.
pseudoumbellata *Caballero in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.* 1935, xxxv. 331.—Marocc.
Raymundi *Maire & Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 29 [1933], nomen.—Marocc.
suanica *Schischk. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 252 (1930).—Caucas.
tamarrutii *Caballero in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.* 1935, xxxv. 331.—Hispan.
tripolitana *Bornm. in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 83.—Tripolit.

GENISTELLA Moench (Legumin.).
riphaea *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 277 [1928].—Marocc.

GENLISEA A. St.-Hil. (Lentibulariac.).
anfractuosa *Tutin in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 310.—Guiana Brit.
Luetzelburgii *Merl ex Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste Braz.* iii. 223 (1923) [*Insp. Fed. Obras Secc.* Publ. 57], nomen; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 151.—Bras. (Bahia; Goyaz).
pulchella *Tutin in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 309.—Guiana Brit.

GENTIANA L. (Gentianac.).
Andreae-Mathewsii *Briquet in Candollea*, iv. 326 (1931): G. Mathewsii *Gilg*.
angustata (*C. B. Clarke*) *Marquand in Kew Bull.* 1931, 70: Crawfurdia angustata.
anisostemon *Marquand, l. c.* 88.—China (Yunnan).
Arbelaezii *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 26, 22 (1933).—Colomb.
× Bergerii *Krist in Sbornik Kl. Přírod. Brně*, 1933, xvi. 94, 137.—Czechoslovak.
bicuspidata (*G. Don*) *Briquet in Candollea*, iv. 324 (1931): Pneumonanthe bicuspidata.
bomareoides *Marquand in Kew Bull.* 1931, 73.—Upper Burma.
Bulleyana (*Forrest*) *Marquand, l. c.* 70: Crawfurdia Bulleyana.
campanulacea (*Wall. & Griff. ex C. B. Clarke*) *Marquand, l. c.*: Crawfurdia campanulacea.
caudata *Marquand, l. c.* 78.—China (Szechuan; Hupeh).
Chingii *Marquand, l. c.* 83.—China (Kansu).
choanantha *Marquand, l. c.* 85.—China (Szechuan); E. Tibet.
confusa *Marquand, l. c.* 70: Crawfurdia affinis.
Copelandi *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 150 (1931).—U.S.A. (Calif.).
coquimbensis *Briquet in Candollea*, iv. 328 (1931).—Chile.
cordata *Marquand in Kew Bull.* 1931, 77.—China (Szechuan; Yunnan).
crawfurdioides *Marquand, l. c.* 72.—S. E. Tibet.
curviflora *Marquand, l. c.* 74.—China (Szechuan).
delphinensis *Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1932–3, Sér. II. xxv. 314 (1934): G. pumila *Vill. Hist. Pl. Dauph.* ii. 527 (1787), non *Jacq.*
dendrologi *Marquand in Kew Bull.* 1931, 79.—China occ.
dimidiata *Marquand, l. c.* 77.—China (Yunnan).
dimorphoclada *Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1930, Sér. II. xxii. 454 (1931).—Gallia.
discoidea *Marquand in Kew Bull.* 1931, 72.—China (Hupeh).
emergens *Marquand, l. c.* 82.—China (Szechuan).
Ernesti *Briquet in Candollea*, iv. 326 (1931).—Peruv.
eurycolpa *Marquand in Kew Bull.* 1931, 71.—China (Yunnan).
eximia *Eastw. in Leafl. West. Bot.* i. 96 (1934), in obs.: G. Copelandi.
fascicularis *Marquand in Kew Bull.* 1931, 70: Crawfurdia fasciculata.
fastigiata *Fisch. ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 167 (1835).—Sibir. (Transbaikal.).
flavicans *Perret ex Colla, l. c.* 168, in syn.: G. Perretii.
fratris *Marquand in Kew Bull.* 1931, 70: Crawfurdia Delavayi.
gaspensis *Marie-Vict. in Contrib. Lab. Bot. Univ. Montréal*, No. 20, 10 (1932).—Canada (Quebec).
× Gentianella *Hort. ex Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 237 (1924).—Hort.
gilvostriata *Marquand in Kew Bull.* 1931, 83.—Upper Burma.
Golowninia *Marquand, l. c.* 70: Crawfurdia japonica.
grandis (*A. Gray*) *Holm in Ottawa Nat.* 1901, xv. 110, in adnot.: G. serrata var. grandis.
Heleni *Marquand in Kew Bull.* 1931, 69: Crawfurdia Trailiana.
Helleri *Briquet in Candollea*, iv. 331 (1931).—U.S.A. (Nevada).
holopetala (*A. Gray*) *Holm in Ottawa Nat.* 1901, xv. 110, in adnot.: G. serrata var. holopetala.
horomuiensis *Kudo in Kudo & Susaki, Hokk.-Yak.-Shokub.-Zui*, t. 70 (1922); cf. *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 947 (1931), japonice.—Japon.
iochroa *Marquand in Kew Bull.* 1931, 74.—S.E. Tibet.
khamensis *Marquand, l. c.* 70: Crawfurdia thibetica.
Kingdonii *Marquand, l. c.*: Crawfurdia Wardii.
laevicalyx (*Rohlena*) *Rohlena in Sitz. Böhm. Ges.* 1912, No. 1, 87 (1913), in syn.; *et in Mém. Soc. Sc. Bohême*, 1933, No. 8, p. 7 (1934): G. campestris var. laevicalyx.
lagodechiana (*Kusn.*) *Grossheim ex Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1931, xlvi. 141; *Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 228 (1932): G. septemfida var. lagodechiana.

GENTIANA:—
lhaguensis *F. K. Ward in Gard. Chron.* 1934, Ser. III. xcv. 263.—Tibet.
Lowndesii *Blatter in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxv. 861 (1932).—Ind. or. (Waziristan).
luteo-viridis (*C. B. Clarke*) *Marquand in Kew Bull.* 1931, 70: Crawfurdia luteo-viridis.
Macounii *Holm in Ottawa Nat.* 1901, xv. 110.—Canada (Alberta; Saskatchewan).
macrauchena *Marquand in Kew Bull.* 1931, 85.—S. E. Tibet.
manshurica *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 103.—China centr.?
membranacea *Marquand in Kew Bull.* 1931, 75.—Upper Burma.
mirabilis *Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1930, Sér. II. xxii. 453 (1931).—Gallia.
moniliformis *Marquand in Kew Bull.* 1931, 86.—China (Yunnan).
nesophila *Holm in Ottawa Nat.* 1901, xv. 111.—Canada (Quebec).
Nienkui *Marquand in Kew Bull.* 1931, 76.—China (Hongkong).
oschtenica *Kusn. in Fl. Cauc. Crit.* iv. 351 (1903), in obs.—Caucas.
× Palezieuxi *Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1931–2, Sér. II. xxiv. 228, 231 (1933).—Gallia.
Parryae *Marquand in Kew Bull.* 1931, 86.—Ind. or. (Assam).
pentasticta *Marquand in Journ. Roy. Hort. Soc.* 1932, lvii. 211.—Nepal.
Perretii *Colla, Herb. Pedem.* iv. 168 (1835).—Hab.?
Pricei *Marquand in Kew Bull.* 1931, 75.—China (Fokien).
procera *Holm in Ottawa Nat.* 1901, xv. 111.—Canada (Manitoba; Ontario); U.S.A. (N. E. States).
radiata *Marquand in Kew Bull.* 1931, 87.—China (Szechuan).
robustior *Burkill ex Diels in Notes Bot. Gard. Edinb.* vii. 196 (1912).—China (Yunnan).
saxicola *C. S. English in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1934, xlvii. 192.—U.S.A. (Washington).
semialata *Marquand in Kew Bull.* 1931, 75.—China (Szechuan).
sessiliflora *Marquand, l. c.* 76.—China (Szechuan?).
sierrae *Briquet in Candollea*, iv. 323 (1931): G. nevadensis *Soltok*.
sinkuensis *Marquand in Kew Bull.* 1931, 73.—Upper Burma.
speciosa (*Wall.*) *Marquand, l. c.* 70: Crawfurdia speciosa.
× stevenagensis *Hort. ex Barker in Gard. Chron.* 1934, Ser. III. xcvi. 198, 223; *Hort. ex Mulligan in Gard. Chron.* 1934, Ser. III. xcvi. 285, in obs.—Hort.
Stuckertii *Briquet in Candollea*, iv. 325 (1931).—Argent.
subocculta *Marquand in Kew Bull.* 1931, 81.—China (Yunnan); Tibet.
subpetiolata *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 434.—Japon. (Hondo).
subuniflora *Marquand in Kew Bull.* 1931, 87.—China occ.
Tatei *Rusby in Phytologia*, i. 72 (1934).—Boliv.
tonsa (*Lunell*) *Marie-Vict. in Contrib. Lab. Bot. Univ. Montréal*, No. 20, 14 (1932): G. detonsa var. tonsa.
Townsendii *Briquet in Candollea*, iv. 329 (1931).—Mexico.
Wardii *Marquand ex F. K. Ward in Gard. Chron.* 1934, Ser. III. xcv. 264.—Burma.
wasenensis *Marquand in Kew Bull.* 1931, 80.—China (Szechuan).
× Wellsiana *Hort. ex Mulligan in Gard. Chron.* 1934, Ser. III. xcvi. 285.—Hort.
wutaiensis *Marquand in Kew Bull.* 1931, 80.—China (Shansi).
yakumontana *Masamune, Prelim. Rep. Veg. Yakus.* 112 (1929); *Masamune in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* xi., Bot. No. 4, 374 (1934).—Ins. Liukiu (Yakushima).
Yamatsutae *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 104.—Manchur.

GEODORUM Jacks. (Orchidac.).
cochinchinense *Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 710, in clavi, 711.—Cochinch.
parviflorum *Gagnep. l. c.*—Cochinch.
Pierrei *Gagnep. l. c.* 710, in clavi, 712.—Cambodia.
recurvum (*Roxb.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 276 (1931): Limodorum recurvum.
Regnieri *Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 710, in clavi, 712.—Cochinch.

GEOGENANTHUS Ule (Commelinac.).
ciliatus *Brückn. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 224 (1931).—Peruv.

GEONOMA Willd. (Palmae).
amoena *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 862 (1933).—Colomb.
anomoclada *Burret, l. c.* xii. 615 (1935).—Colomb.
bella *Burret, l. c.* 304.—Bras. (Amaz.).
camptoneura *Burret, l. c.* xi. 201 (1931).—Peruv.
chaunostachys *Burret in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 318.—Venez.
cuneifolia *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 199 (1931).—Peruv.
decussata *Burret in Fedde, Repert.* xxxii. 103 (1933).—Bras. (Bahia).
Dryanderae *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 615 (1935).—Colomb.
Heinrichsiae *Burret, l. c.* xii. 43 (1934).—Ecuador.
Hoppii *Burret, l. c.* xi. 235 (1931).—Ecuador.
humilis *Hort. ex Burret, l. c.* xi. 758 (1933), in syn.: Chamaedorea geonomiformis.
Killipii *Burret, l. c.* xi. 320 (1932).—Peruv.
latifolia *Burret in Fedde, Repert.* xxxii. 102 (1933).—Bras. (Sergipe).
latifrons *Hort. ex Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 728 (1933), in syn.: Eleutheropetalum Ernesti-Augusti.
leptoclada *Burret, l. c.* 863.—Guatem.
linearis *Burret, l. c.* 861.—Colomb.
multisecta (*Burret*) *Burret, l. c.* xii. 155 (1934): Taenianthera multisecta.
paradoxa *Burret, l. c.* xi. 1040 (1934).—Colomb.
platybothros *Burret, l. c.* xi. 200 (1931).—Colomb.
pleioneura *Burret, l. c.* 234.—Ecuador.
polyneura *Burret, l. c.* xi. 500 (1932).—Guatem.
trichostachys *Burret, l. c.* xi. 862 (1933).—Colomb.

GEOPHILA D. Don (Rubiac.).
liberica *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 128 (1931), in clavi.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
Matthewi *Ridley in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 275.—Sumatra.
trichogyne (*Muell.-Arg.*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 423 (1931): Mapouria trichogyne.

GERANIUM L. (Geraniac.).
asiaticum *Sergievsk. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1934, No. 1, p. 1.—Sibir. occ. et or.
aureum *Rose ex Knuth in Engl. Pflanzenreich, Geraniac.* 169 (1912), in syn.: G. Lozani.
chinense *Migo in Journ. Shanghai Sc. Inst.*, Sect. III. iii. 95 (1935).—China (Kiangsu; Anhwei; Chekiang).
Christensenianum *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 621 (1933).—China (Yunnan).
Cuatrecasasii *Knuth in Fedde, Repert.* xxxiv. 143 (1933).—Colomb.
cuchillense *Knuth, l. c.* 144.—Boliv.
dalmaticum (*Beck*) *K. H. Rechinger in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 28: G. macrorrhizum var. dalmaticum.
dolomiticum *Rothmaler in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.* 1934, xxxiv. 151.—Hispan.
escalonense *Knuth in Fedde, Repert.* xxxiv. 145 (1933).—Boliv.
Forrestii *Stapf in Bot. Mag.* sub t. 9092 (1926), in obs.—China (Yunnan).
Hayatanum *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 152: G. uniflorum *Hayata*.
× intermedium *Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1906, xii. 91.—Hort.
Jaekelae *Macbride in Candollea*, vi. 7 (1934): G. minimum *Knuth*.

GERANIUM:—
Killipianum *Knuth in Fedde, Repert.* xxxiv. 144 (1933).—Peruv.
Knuthianum *Macbride in Candollea*, vi. 7 (1934): G. elongatum *Knuth*.
lasiocaulon *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 350.—Corea.
Losae *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 114.—Hispan.
malpasense *Knuth in Fedde, Repert.* xxxiv. 146 (1933).—Boliv.
maurum *Pau in Font Quer, Iter Marocc.* 1930, No. 395 [1932].—Marocc.
nanum *Coss. in Bull. Soc. Dauph.* 1883, p. 413, No. 3990, nomen.—Marocc.
occitanicum *Battand. & Pitard in Pitard, Contrib. Étude Fl. Maroc*, 8 (1918).—Marocc.
occitanum *Battand. & Pitard ex Battand. Contrib. Fl. Atlant.* 15 (1919), sphalm.: G. occitanicum.
Philippii *Macbride in Candollea*, vi. 7 (1934): G. ciliatum *R. Phil.*
pinetorum *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 619 (1933).—China (Yunnan).
pseudo-aconitifolium *Blatter in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxvi. 956 (1933): G. aconitifolium *Edgew. & Hook. f. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 429 (1874), non *L'Hérit.*
pulchrum *Morton in Phytologia*, i. 147 (1935).—Guatem.
Ruprechtii *Woronow ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 7 (1932).—Caucas.
Schliebenii *Knuth in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1067 (1934).—Tanganyika Terr.
Skottsbergii *Knuth in Fedde, Repert.* xxxiv. 143 (1933).—Chile.
Smithianum *Knuth, l. c.* 146.—Peruv.
sphaerospermum *Fernald in Rhodora*, 1935, xxxvii. 298.—Canada austr.; U.S.A.
Stapfianum *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 620 (1933): G. Forrestii *Stapf*.
stenorrhizum *Stapf in Bot. Mag.* sub t. 9092 (1926), in obs.: G. Donianum *Knuth in Engl. Pflanzenreich, Geraniac.* 141 (1912), non *Sweet*.
Suzukii *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1931, iii. 392.—Formosa.
transbaicalicum *Sergievsk. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1934, No. 1, 4.—Sibir. (Transbaikal.).
tricolor (*Curt.*) *J. S. Kerner, Hort. Sempervirens*, tab. 11 (1796): Pelargonium tricolor.

GERARDIA L. (Scrophulariac.).
acuta (*Pennell*) *Pennell in Acad. Nat. Sc. Philad.*, Monogr. 1, *Scroph.* 470 (1935): Agalinis acuta.
albida (*Britton & Pennell*) *Pennell, l. c.* 421, in adnot.: Agalinis albida.
caddoënsis (*Pennell*) *Pennell, l. c.* 449: Agalinis caddoënsis.
calycina (*Pennell*) *Pennell, l. c.* 427, in obs.: Agalinis calycina.
Edwardsiana (*Pennell*) *Pennell, l. c.* 457: Agalinis Edwardsiana.
Gatesii (*Benth.*) *Pennell, l. c.* 635, in obs.: G. filifolia var. Gatesii.
Harperi (*Pennell*) *Pennell, l. c.* 441: Agalinis Harperi.
havanensis *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 45 (1931).—Cuba.
homalantha (*Pennell*) *Pennell in Acad. Nat. Sc. Philad.*, Monogr. 1, *Scroph.* 466 (1935): Agalinis homalantha.
keyensis (*Pennell*) *Pennell, l. c.* 453, in obs.: Agalinis keyensis.
laxa (*Pennell*) *Pennell, l. c.* 449: Agalinis laxa.
oblongifolia *Pennell, l. c.* 422, in obs., sphalm.: G. obtusifolia.
obtusifolia (*Rafin.*) *Pennell, l. c.* 471: Agalinis obtusifolia.
pseudaphylla (*Pennell*) *Pennell, l. c.* 455: Agalinis oligophylla var. pseudaphylla.
pulchella *Pennell, l. c.* 440: Agalinis pinetorum *Pennell*, non Gerardia pinetorum *Britton & P. Wilson*.
pulcherrima *Pennell, l. c.* 448: Agalinis pulchella *Pennell*, non Gerardia pulchella *Pennell*.
stenophylla (*Pennell*) *Pennell, l. c.* 452: Agalinis stenophylla.
tenella (*Pennell*) *Pennell, l. c.* 471: Agalinis tenella.

GERASCANTHUS P. Br. (Boraginac.).
rotundifolius (*Ruiz & Pav.*) *Friesen in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1931–2, Sér. II. xxiv. 183 (1933): Cordia rotundifolia.

GERMAINIA Balansa & Poitrass. (Gramin.).
flosculosa (*F. Muell.*) *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 445: Anthistiria flosculosa.

GERRARDANTHUS Harv. (Cucurbitac.).
nigericus *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 178 (1927); *Hutchinson & Dalziel in Kew Bull.* 1928, 215.—Gold Coast; Nigeria.

GESNERIA L. (Gesneriac.).
brachysepala *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 34 (1932).—Haiti.
odontophylla *Urb. & Ekman, l. c.*—Haiti.

GETHYLLIS L. (Amaryllidac.).
Herrei *L. Bolus in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 122.—Namaqualand.
lanuginosa *Marloth in S. Afr. Gard.* 1931, xxi. 40, 41.—Afr. austr. (Cape Prov.).
lata *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 83, 88.—Afr. austr. (Cape Prov.).
setosa *Marloth in S. Afr. Gard.* 1931, xxi. 40, 41.—Afr. austr. (Cape Prov.).
verrucosa *Marloth, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).

GEUM L. (Rosac.).
balcanicum *Kellerer ex Bolle in Fedde, Repert. Beih.* lxxii. 75 (1933), in syn.: G. coccineum × montanum.
brevicarpellatum *Bolle, l. c.* 54.—Argent.
×cultorum *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 246 (1924).—Hort.
×Fridae *K. H. Rechinger in Fedde, Repert.* xxxviii. 329 (1935).—Albania.
geminiflorum *Borb. ex Bolle in Fedde, Repert. Beih.* lxxii. 42 (1933), in syn.: G. montanum.
×Heldreichii *Hort. ex Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 245 (1924).—Hort.
iyoanum *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 137.—Japon. (Shikoku).
Kellereri *ex Bolle in Fedde, Repert. Beih.* lxxii. 75 (1933), in syn.: G. coccineum × montanum.
Kerneri *Blocki ex Bolle, l. c.* 77, in syn.: G. aleppicum × urbanum.
persicum *Bornm. ex Bolle, l. c.* 45, in syn.: G. kokanicum.
riojense *Bolle, l. c.* 54.—Argent.
Roylei *Wall.*; *Bolle, l. c.* 66, descr.—Himal. bor.-occ.
×Salvatoris *Sennen ex Bolle, l. c.* 67, in syn.: G. urbanum.
versipatella *Marquand in Bot. Mag.* t. 9344 (1934).—Nepal.

GHINIA Schreb. (Verbenac.).
juncea (*Schau.*) *Moldenke in Phytologia*, i. 169 (1935): Tamonea juncea.
spicata (*Aubl.*) *Moldenke, l. c.*: Tamonea spicata.

GIBBAEUM Haw. (Ficoidac.).
cryptopodium (*Kensit*) *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 402 (1933): Mesembryanthemum cryptopodium.
Haagei *Schwantes ex Jacobsen, Succ. Pl.* 179 (1935).—Hab.?
Helmiae *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 402 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Luckhoffii *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 232 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Nelii *Schwantes ex Jacobsen, Sukkulent.* 133 (1933).—Hab.?

GIGACHILON Seidl in Bercht. & Seidl, Oek.-techn. Fl. Böhm. i. 425 (1836), in syn., sine descr. *GRAMINEAE*.
polonicum *Seidl, l. c.*, in syn.: Triticum polonicum.

GILGIODAPHNE Domke in Biblioth. Bot. cxi. 119 (1934): **Synandrodaphne** Gilg (Thymelaeac.).
paradoxa (*Gilg*) *Domke, l. c.* 120: Synandrodaphne paradoxa.

GILIA Ruiz & Pav. (Polemoniac.).
concinna (*Milliken*) *Munz, Man. S. Calif. Bot.* 396, 599 (1935): Linanthus concinnus.
eremica (*Jepson*) *Craig in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1934, lxi. 416: Hugelia eremica.

GILIA:—
flavocincta *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 577.—U.S.A. (Arizona).
hamata (*Greene*) *Munz, Man. S. Calif. Bot.* 400, 599 (1935): Navarretia hamata.
Jaegeri *Munz in Bull. S. Calif. Acad. Sc.* 1932, xxxi. 68.—U.S.A. (Calif.).
Liebmannii *Hort. ex Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. Fasc. suppl. 1, p. 7 (1934), nomen.—Hab.?
Microsteris *Piper in Piper & Beattie, Fl. Palouse Reg.* 142 (1901): Microsteris humilis.
nivalis *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 684 (1895), in syn.: G. tricolor f. nivalis *Voss*.
peninsularis (*Greene*) *Munz, Man. S. Calif. Bot.* 400, 599 (1935): Navarretia peninsularis.
punctata (*A. A. Heller*) *Munz, l. c.* 402, 599: Langloisia punctata.
Sherman-Hoytae *Craig in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1934, lxi. 415.—U.S.A. (Calif.).

GILIBERTIA Ruiz & Pav. (Araliac.).
amamiensis *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 250.—Ins. Liukiu.
hainanensis *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 296 (1935).—China (Hainan).
intercedens *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 691 (1933).—China (Kiangsi; Fokien).
iriomotensis *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 250.—Ins. Liukiu (Iriomote).
marginifera *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 490 (1932).—Peruv.
membranifolia (*W. W. Smith*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 692 (1933): Nothopanax membranifolius.
siamensis *Craib in Kew Bull.* 1931, 206.—Siam.
Williamsii *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 490 (1932).—Peruv.

GILLENIA Moench (Rosac.).
stipulata (*Muehl.*) *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 247 (1924): Spiraea stipulata.

GINALLOA Korth. (Loranthac.).
angustifolia (*Merrill*) *Danser in Philipp. Journ. Sc.* 1935, lviii. 132: G. Cumingiana var. angustifolia.
applanata *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 448 (1931).—Borneo.
falcata *Danser, l. c.* 451.—Java.
gracilis *M. L. T[ardieu] in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 695; *Danser in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 224, nomen, sphalm.: G. falcata.
linearis *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 451 (1931).—Borneo.
nuda *Danser in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 229.—Borneo.
ovata *Danser in Philipp. Journ. Sc.* 1935, lviii. 133.—Ins. Philipp. (Luzon).

GIRARDINIA Gaudich. (Urticac.).
Chingiana *Chien in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., ix. 259 (1934).—China (Chekiang).
longispica *Hand.-Mazz. in Sinensia*, ii. 133 (1932).—China (Kweichau).

GIRONNIERA Gaudich. (Ulmac.; Urticac., Gen. Pl.).
scabrida (*Thwait.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 267 (1931): Helminthospermum scabridum.

GITHOPSIS Nutt. (Campanulac.).
latifolius *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 154 (1931).—U.S.A. (Calif.).

GLADIOLUS L. (Iridac.).
aberdaricus *N. E. Brown in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xx. 267 (1932): Antholyza speciosa.
anorthanthus *Ingram in Gard. Chron.* 1933, Ser. III. xciv. 273.—Transvaal.
Barnardii *Lewis in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 204, 205.—S. Rhodesia.
Burchellii (*Bolus*) *Ingram in Gard. Chron.* 1932, Ser. III. xcii. 482: G. Bolusii var. Burchellii.
Cabrae (*De Wild.*) *N. E. Brown in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xx. 267 (1932): Antholyza Cabrae.
ceresianus *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1931, xxi. 367, 369.—Afr. austr. (Cape Prov.).

GLADIOLUS:—
Childsii *Hort. ex Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. Fasc. suppl. 3, p. 7 (1933), nomen.—Hab. ?
cygneus *Ingram in Gard. Chron.* 1931, Ser. III. xc. 347.—Natal.
Emiliae *L. Bolus in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 124.—Afr. austr. (Cape Prov.).
eximius *Ingram in Gard. Chron.* 1931, Ser. III. lxxxix. 46.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Fredericii *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1931, xxi. 367, 369.—Afr. austr. (Cape Prov.).
hibernus *Ingram in Gard. Chron.* 1931, Ser. III. xc. 9.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Hollandii *L. Bolus in Journ. Bot.* 1931, lxix. 261.—Transvaal.
Juniani *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 145 [1933], nomen.—Marocc.
labiatus (*Pax*) *N. E. Brown in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xx. 267 (1932): Antholyza labiata.
leptophyllus *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 204.—Transvaal.
Martleyi *L. Bolus, l. c.* 1933, xxiii. 47.—Afr. austr. (Cape Prov.).
modestus *Ingram in Gard. Chron.* 1931, Ser. III. xc. 9.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Murielae *Hort. ex Gard. Chron.* 1932, Ser. III. xcii. 107.—Abyss.
nebulicola *Ingram in Gard. Chron.* 1931, Ser. III. lxxxix. 87.—Rhodesia.
perennis *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 996 (1895), in syn.: G. Lemoinei.
Pillansii *Lewis in S. Afr. Gard.* 1935, xxv. 57.—Afr. austr. (Cape Prov.).
retrocurvus *Lewis, l. c.* 1932, xxii. 204, 205.—Transvaal.
Sandersii *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 994 (1895), in syn.: G. Saundersii.
Saundersonii *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in syn.: G. Saundersii.
socium *L. Bolus in Journ. Bot.* 1931, lxix. 14.—Afr. austr. (Cape Prov.).
strictiflorus *L. Bolus, l. c.* 15.—Orange Free State.
superans *N. E. Brown in Gard. Chron.* 1932, Ser. III. xcii. 467.—Afr. austr. (Cape Prov.).
triangulus *Lewis in S. Afr. Gard.* 1933, xxiii. 140.—Afr. austr. (Cape Prov.).
turkmenorum *Czerniak. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 581, 750 (1935).—Transcasp.
Uysiae *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1931, xxi. 367, in obs., nomen provis.—Afr. austr. (Cape Prov.).
xanthus *L. Bolus, l. c.* 1933, xxiii. 47.—Rhodesia.

GLANDULARIA J. F. Gmel. (Verbenac.).
canadensis (*L.*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 1139 (1933): Buchnera canadensis.
Drummondii (*Hort. ex Baxt.*) *Small, l. c.*: Verbena Drummondii.
Lamberti (*Sims*) *Small, l. c.* 1138: Verbena Lamberti.
maritima (*Small*) *Small, l. c.*: Verbena maritima.
peruviana (*L.*) *Small, l. c.* 1139: Erinus peruvianus.
tampensis (*Nash*) *Small, l. c.*: Verbena tampensis.
tenuisecta (*Briq.*) *Small, l. c.*: Verbena tenuisecta.

GLAUCIUM Mill. (Papaverac.).
anatalyjaënse *Hort. ex Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1933, xlviii. 376; *et ex Gartenflora*, 1934, lxxxiii. 193.—Hort.
bracteatum *Popov in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 79 (1934).—Turkestan.

GLEASONIA Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago, Bot. Ser., vii. 372 (1931). *RUBIACEAE.*
duidana *Standley, l. c.*—Venez.
uaupensis *Ducke in Arquiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, i. 91 (1934).—Bras. (Amaz.).

GLIRICIDIA H. B. & K. (Legumin.).
maculata (*H. B. & K.*) *Steud. Nomencl.* ed. 2, i. 688 (1841): Robinia maculata.
sepium (*Jacq.*) *Steud. l. c.*: Robinia sepium.

GLOBBA L. (Zingiberac.; Scitamin., Gen. Pl.).
Careyana *Roxb. Hort. Beng.* 2 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 77 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 80 (1832).—Burma.
spathulata *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 80; *et l. c.* 83.—Ind. or. (Assam).

GLOBBA:—
subulata *Roxb. Hort. Beng.* 2 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 78 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 81 (1832).—Ind. or. (Bengal).

GLOBIMETULA Van Tiegh. (Loranthac.).
anguliflora (*Engl.*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 54 (1933): Loranthus anguliflorus.
Braunii (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Braunii.
cupulata (*DC.*) *Danser, l. c.* 55: Loranthus cupulatus.
Dinklagei (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Dinklagei.
fulgens (*Engl. & K. Krause*) *Danser, l. c.*: Loranthus fulgens.
mayombensis (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus mayombensis.
mweroënsis (*Baker*) *Danser, l. c.*: Loranthus mweroënsis.
opaca (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus opacus.
oreophila (*Hook. f.*) *Danser, l. c.*: Loranthus oreophilus.
pachyclada (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus pachycladus.
rubripes (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus rubripes.

GLOBULARIOPSIS Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr. xix. 308 (1931). *SELAGINACEAE.*
wittebergensis *Compton, l. c.* 309.—Afr. austr. (Cape Prov.).

GLOCHIDION J. R. & G. Forst. (Euphorbiac.).
botryanthum (*Muell.-Arg.*) *Pax & K. Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix c. 58 (1931): Phyllanthus botryanthus.
bracteatum *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 91, 15 (1932).—Ins. Viti.
emarginatum *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 30 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
Ferdinandi (*Muell.-Arg.*) *Pax & K. Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix c. 57 (1931): Phyllanthus Ferdinandi.
Gimi (*K. Schum.*) *Pax & K. Hoffm. l. c.* 58: Tetraglochidion Gimi.
heterodoxum (*Muell.-Arg.*) *Pax & K. Hoffm. l. c.*: Phyllanthus heterodoxus.
Kanehirae *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 22.—Ins. Palau.
lamprophyllum (*Muell.-Arg.*) *Pax & K. Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix c. 58 (1931): Phyllanthus lamprophyllus.
Longfieldiae (*Riley*) *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, p. 141 (1935): Phyllanthus Longfieldiae.
longipedicellatum *Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1933, v. 178.—Formosa.
macrosepalum *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 21.—Ins. Palau.
marchionicum *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, p. 142 (1935).—Ins. Marquesas.
mehipitense *Pax & K. Hoffm. in Mitt. Inst. Bot. Hamburg*, vii. 225 (1931).—Borneo.
myrianthum (*Muell.-Arg.*) *Pax & K. Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix c. 58 (1931): Phyllanthus myrianthus.
palauense *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 22.—Ins. Palau.
Perrieri *Léandri in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 606.—Madag.
pilosum (*Lour.*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 10, 232 (1935): Nymphanthus pilosus.
platycalyx (*Muell.-Arg.*) *Pax & K. Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix c. 58 (1931): Phyllanthus platycalyx.
ponapense *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 24.—Ins. Carolin. (Ponape).
puberulum *Hosokawa, l. c.* 23.—Ins. Carolin. (Ponape).
punctatum *Pax & K. Hoffm. in Mitt. Inst. Bot. Hamburg*, vii. 226 (1931).—Borneo.
raiateënse *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 30 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).

GLOCHIDION:—
raivavense *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, p. 142 (1935).—Ins. Austral (Raivavae).
Riedelianum (*Muell.-Arg.*) *Pax & K. Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix c. 58 (1931): Phyllanthus Riedelianus.
tannaënse *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 90.—N. Hebrides.
vitiense (*Muell.-Arg.*) *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 91, 17 (1932): Phyllanthus vitiensis.

GLOEOCARPUS Radlk. (Sapindac.).
patentivalvis (*Radlk.*) *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 1208 (1933): Cupaniopsis patentivalvis.

GLOMERA Blume (Orchidac.).
connexiva *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxv. 472 (1933).—Celebes.
fusca (*Schlechter*) *J. J. Smith, l. c.* lxvi. 171 (1934): Giulianettia fusca.
Hunsteiniana (*Schlechter*) *J. J. Smith, l. c.*: Glossorhyncha Hunsteiniana.
inconspicua *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 27 (1935).—N. Guin.
inflata (*Schlechter*) *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 171 (1934): Giulianettia inflata.
Ledermannii (*Schlechter*) *J. J. Smith, l. c.*: Glossorhyncha Ledermannii.
Macdonaldii (*Schlechter*) *Ames in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 111: Glossorhyncha Macdonaldii.
pteropetala (*Schlechter*) *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 171 (1934): Glossorhyncha pteropetala.
retusimentum *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 26 (1935).—N. Guin.
tamiana *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 171 (1934): Glossorhyncha Schultzei.
verrucosissima (*Schlechter*) *J. J. Smith, l. c.*: Giulianettia verrucosissima.

GLORIOSA L. (Liliac.).
Leopoldi *v. Houtte & Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1049 (1895), in obs.—Hab. ?
luxurians *Lour. ex Gomes in Mem. Acad. Sc. Lisb. Cl. Sc. Pol. Mor. Bel.-Let.* n. s. iv. (1), 29 (1868); *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 16, 105 (1935), in syn.: Hemerocallis fulva.

GLOSSODISCUS Warb. ex Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xi. 955 (1934), in syn.: **Casearia** Jacq. (Flacourtiac.; Samydac., Gen. Pl.).
laetioides *Warb. ex Sleum. l. c.*, in syn.: Casearia javitensis.

GLOSSOGYNE Cass. (Compos.).
Bidens (*Retz.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 168 (1931): Zinnia Bidens.

GLOSSULA Lindl. (Orchidac.).
Passerina *Gagnep. in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, vi. 627 (1934).—Cambodia.

GLOTTIPHYLLUM Haw. (Ficoidac.).
compressum *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 249 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Davisii *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 403 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Herrei *L. Bolus, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).
latifolium *N. E. Brown in N. E. Brown, Tisch. & Karst. Mesembr.* 228 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
oligocarpum *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 450 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
pallens *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 389 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
parvifolium *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 250 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Peersii *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 362 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
pygmaeum *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 390 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Starkeae *L. Bolus, l. c.* 404.—Afr. austr. (Cape Prov.).
uniondalense *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 362 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).

GLOXINIA L'Hérit. (Gesneriac.).
formosa *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 789 (1895), in syn.: Sinningia speciosa.

GLOXINIA:—
×hybrida *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 789 (1895), in syn.: Sinningia hybrida.
superba *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in syn.: Sinningia speciosa.

GLUEMA Aubrév. & Pellegr. in Bull. Soc. Bot. France, 1934, lxxxi. 797 (1935). *SAPOTACEAE.*
ivorensis *Aubrév. & Pellegr. l. c.* 798.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).

GLUTA L. (Anacardiac.).
laxiflora *Ridley in Kew Bull.* 1933, 196.—Borneo.
nitida (*Lour.*) *Merrill in Sunyatsenia*, ii. 35 (1934): Penaea nitida.

GLYCERIA R. Br. (Gramin.).
altissima (*Moench*) *P. Fourn. in Le Monde des Plantes*, 1935, xxxvi. 20: Poa altissima.
australis *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 450.—Austral. (N. S. Wales).
borealis (*Nash*) *Piper in Piper & Beattie, Fl. Palouse Reg.* 27 (1901): Panicularia borealis.
depauperata *Ohwi in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 381.—Japon.
Drummondii (*Steud.*) *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 450: Porroteranthe Drummondii.
formosensis *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 164.—Formosa.
infirma *Ohwi in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 383.—Japon.
kamtschatica *Komarov, Fl. URSS*, ii. 459, 758 (1934).—Kamchatka.
kashmiriensis *Kelso in Rhodora*, 1935, xxxvii. 262.—Kashmir.
leptolepis *Ohwi in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 381.—Sakhalin; Japon.; Corea.
nubigena *W. A. Anders. in Rhodora*, 1933, xxxv. 321.—U.S.A. (Tennessee).
Otisii *Hitchcock in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 128.—U.S.A. (Washington).
rigida (*Nash*) *Rydb. Fl. Prairies & Plains Centr. N. Amer.* 122 (1932): Panicularia nervata var. rigida.
triflora (*Korsh.*) *Komarov, Fl. URSS*, ii. 459, 758 (1934): G. aquatica var. triflora.
turcomanica *Komarov, l. c.* 452, 757.—Transcasp.
ussuriensis *Komarov, l. c.* 460, 758.—As. or.

GLYCINE L. (Legumin.).
formosana *Hosokawa in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 308.—Formosa.
Grahami *Wall.*; *Benth. in Miq. Pl. Jungh.* 233 (1852), descr.—Burma.
oblongifolia (*E. Mey.*) *Harms in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 655 (1915), in obs.: Tephrosia oblongifolia.
pinnata *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 15 (1935).—China (Hainan).
Schliebenii *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 814 (1933).—Tanganyika Terr.

GLYCOSMIS Correa (Rutac.).
Clemensii *Tanaka in Meded. Herb. Leid.* No. 69, 4 (1931).—Borneo.

GLYCOXYLON Ducke (Sapotac.).
oppositum *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 68 (1935).—Bras. (Amaz.).

GLYCYRRHIZA L. (Legumin.).
costulata *Hand.-Mazz. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1933, lxxxii. 248.—Mongol.
zaissanica *Sergievsk. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1933, Nos. 1–2, 11.—Ross. asiat.

GLYPTOCARYOPSIS A. Brand in Engl. Pflanzenreich, Borrag.-Borraginoid.-Cryptanth. 104 (1931). *BORAGINACEAE.*
anaglyptica (*Piper*) *A. Brand, l. c.*: Allocarya anaglyptica.
distantiflora (*Piper*) *A. Brand, l. c.* 105: Allocarya distantiflora.
glyptocarpa (*Piper*) *A. Brand, l. c.* 104: Allocarya glyptocarpa.
microcarpa (*Piper*) *A. Brand, l. c.* 105: Allocarya microcarpa.
papillata (*Piper*) *A. Brand, l. c.* 104: Allocarya papillata.
spiculifera (*Piper*) *A. Brand, l. c.*: Allocarya spiculifera.

GMELINA L. (Verbenac.).
annamensis *Dop in Rev. Bot. Appliq.* 1933, xiii. 894.—Indo-China (Anam).
racemosa (*Lour.*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. ii. 11, 336 (1935): Lantana racemosa.
salomonensis *Bakh. in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 72.—Ins. Solomon. (Isabel).

GNAPHALIUM L. (Compos.).
acutiusculum *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 78 (1931).—Haiti.
calviceps (errore calvescens) *Fernald in Rhodora*, 1935, xxxvii. 449, 466.—U.S.A. (Virginia).
caucasicum *Leskov ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 102 (1934).—Caucas.
drakensbergense *Markötter in Ann. Univ. Stellenb.* 1930, viii. Sect. A, No. 1, 45.—Orange Free State.
eriocephalum (*Guss.*) *Bonnier & Layens in Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* vi. 19 [1923]: Filago eriocephala.
Genevoisi *Emberger in Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc*, 1932, No. xxxiii. 44 (1933).—Marocc.
Greenmanii *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 329: G. linearifolium *Greenm.*
heterophyllum *R. Phil. in Verh. Deutsch. Wiss. Ver. Santiago (Chile)*, ii. 107 (1890), nomen; *et in An. Univ. Chile*, xc. 14 (1895), descr.—Chile.
Nelsonii *Burtt Davy in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 107.—Transvaal.
nepalense *Loisel. Herb. Gén. Amat.* viii. 520 (1827).—Nepal.
paramorum *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 328.—Venez.
saxicola *Fassett in Rhodora*, 1931, xxxiii. 75.—U.S.A. (Wisconsin).
selleanum *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 78 (1931).—Haiti.
sindoroënse *Hochr. in Candollea*, v. 312 (1934).—Java.
spathulatum (*Presl*) *Bonnier & Layens in Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* vi. 19 [1923]: Filago spathulata.
Spini *Colla, Herb. Pedem.* iii. 332 (1834).—Hab. ?
tenuifolium (*Presl*) *Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* vi. 17 [1923]: Filago tenuifolia.
tortuanum *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 77 (1931).—Haiti.

GNIDIA L. (Thymelaeac.).
bambutana *Gilg & Lederm. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 631 (1921), in obs.—Cameroons.
capensis *Domke in Biblioth. Bot.* cxi. 95 (1934), in obs., nomen.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Claessensii *Staner in Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. 355 (1935).—Congo Belg.
clutyioides *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1933, 143, 256.—Tanganyika Terr.
foliosa (*H. H. W. Pearson*) *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 633 (1921), in obs.: Arthrosolen foliosa.
Forbesii *Gilg ex Domke in Biblioth. Bot.* cxi. 146 (1934), nomen.—Hab. ?
gnidioides (*Baker*) *Domke, l. c.* 46, in obs.: Dais gnidioides.
Kerstingii *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 636 (1921), in obs.—Guinea (Togo).
leiosiphon (*Gilg*) *Domke in Biblioth. Bot.* cxi. 90 (1934), in obs.: Englerodaphne leiosiphon.
linifolia (*Decne.*) *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 635 (1921), in obs.: Lasiosiphon linifolius.
marunguensis *Staner in De Wild. & Staner, Contrib. Fl. Katanga*, Suppl. iv. 71 (1932).—Congo Belg.
rorida (*S. Moore*) *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 636 (1921), in obs.: Lasiosiphon roridus.
rostrata *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxxv. (*Hist. Nat. Pl.* v. Atlas iii.) t. 315 (1896).—Madag.
sericocephala (*Meissn.*) *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 634 (1921), in obs.: Arthrosolen sericocephalus.

GNIDIA:—
sphaerantha *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 633 (1921), in obs.—Tanganyika Terr.
Tiesleri *Gilg ex Engl. l. c.*, in obs.—Afr. Lusit. Or.
variabilis (*C. H. Wright*) *Engl. l. c.* 630, in obs.: Arthrosolen variabilis.
Volkensii *Gilg in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C. 283 (1895).—Afr. trop.
Wilmsii *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 634 (1921), in obs.—Transvaal.
Wittei *Staner in De Wild. & Staner, Contrib. Fl. Katanga*, Suppl. iv. 73 (1932).—Congo Belg.

GOCHNATIA H. B. & K. (Compos.).
arequipensis *Sandwith in Kew Bull.* 1934, 100.—Peruv.
Cardenasii *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 324.—Boliv.
Iserniana *Cuatrec. in An. Univ. Madrid*, iv. Fasc. 2, 225 (1935).—Peruv.
Malmei *Cabrera in Not. Mus. La Plata, Bot.*, i. 61 (1935).—Argent.
palosanto *Cabrera, l. c.* 62.—Argent.

GODETIA Spach (Onagrac.).
pacifica *Peck in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1934, xlvii. 187.—U.S.A. (Oregon).

GODOYA Ruiz & Pav. (Ochnac.).
magnifica *Gleason in Phytologia*, i. 27 (1933).—Colomb.
reparida *Bonpl. ex H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vii. 277 (1825); *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 1030 (1933), in syn.: Cupania polyodonta.

GOETHALSIA Pittier; Gleason in Phytologia, i. 112 (1934), descr. emend. *FLACOURTIACEAE.*

GOETHEA Nees (Malvac.).
intermedia (*A. St.-Hil.*) *Heydt in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1933, xlviii. 364, in obs.: Pavonia intermedia.

GOETZEA Wydl. (Solanac.).
Ekmanii *O. E. Schulz in Fedde, Repert.* xxxii. 90 (1933).—Hispaniola.

GOLUBIOPSIS Becc. ex Martelli in Nuov. Giorn. Bot. Ital. 1934, n. s. xli. 702 (1935), sine descr. *PALMAE.*
palawensis *Becc. ex Martelli, l. c.*, nomen.—Ins. Carolin.

GOMPHANDRA Wall. (Icacinac.; Olacac., Gen. Pl.).
carolinensis *Kanehira, Fl. Micrones.* 198 (1933), japonice; *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 673, latine.—Ins. Palau.
subrostrata *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 164 (1934).—Sumatra.
Yatesii *Merrill, l. c.* 165.—Sumatra.

GOMPHICHIS Lindl. (Orchidac.).
costaricensis (*Schlechter*) *Ames, F. T. Hubbard & C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* iii. 37 (1934): Stenoptera costaricensis.

GOMPHOSTEMMA Wall. (Labiat.).
Bartlettii *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 191 (1934).—Sumatra.
dolichobotrys *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. viii. 148 (1934).—Sumatra.
parvum *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 192 (1934).—Sumatra.

GOMPHRENA L. (Amaranthac.).
acrotepala *Suesseng. in Fedde, Repert.* xxxv. 308 (1934).—Argent.
alba *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. ii. Anhang, 24 (1932).—Tanganyika Terr.
anti-lethargica *Alv. Silv. in Corrêa, Dicc. Pl. Ut. Bras.* i. 467 (1926); *Alv. Silv. Fl. Mont.* ii. 41 (1931).—Bras. (Minas Geraes).
aurantiaca *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 871 (1895), in syn.: G. Haageana.
basilanata *Suesseng. in Fedde, Repert.* xxxix. 7 (1935).—Bras. (Piauhy; Bahia).
cinnabarina *Suesseng. l. c.* xxxv. 309 (1934).—Boliv.
cladotrichoides *Suesseng. l. c.* xxxix. 7 (1935).—Argent.

GOMPHRENA:—
Hillii *Suesseng. in Fedde, Repert.* xxxv. 312 (1934).—Bras.
pulvinata *Suesseng. l. c.* 315.—Bras. (Bahia).
Trollii *Suesseng. l. c.*—Boliv.
viridifolia *Suesseng. l. c.* 316.—Urug.; Argent.

GONGYLOLEPIS Schomb. (Compos.).
crioclada *Blake in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 495.—Venez.
glaberrima *Blake, l. c.* 494.—Venez.

GONIODISCUS Kuhlm. in Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro, vi. 109 (1933). *CELASTRACEAE.*
elaeospermus *Kuhlm. l. c.*—Bras. (Amaz.).

GONIOLIMON Boiss. (Plumbaginac.).
Kaufmannianus (*Regel*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 614 (1895): Statice Kaufmanniana.

GONIOSCYPHA Baker (Liliac.).
muricata *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 287.—Indo-China (Laos).

GONIOSPERMA Burret in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu, xi. No. 4, 10 (1935). *PALMAE.*
Thurstonii (*Becc.*) *Burret, l. c.* 12: Cyphosperma Thurstonii.
vitiense *Burret, l. c.* 11.—Ins. Viti.

GONIOTHALAMUS Hook. f. & Thoms. (Annonac.).
burmanicus *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1935, 572.—Burma.
carolinensis *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 279.—Ins. Palau.
chinensis *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 6 (1934).—China (Kwangtung).
tortilipetalus *M. R. Henderson in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 88 (1933).—Penins. Mal.

GONOCALYX Planch. & Linden (Ericac.).
portoricensis (*Urb.*) *A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 354 (1932): Thibaudia portoricensis.
smilacifolius (*Griseb.*) *A. C. Smith, l. c.*: Vaccinium smilacifolium.

GONOCARYUM Miq. (Icacinac.).
Calleryanum (*Baill.*) *Becc. Malesia*, i. 123 (1877), in obs.: Phlebocalymna Calleryana.
sinense *Hand.-Mazz. in Sinensia*, iii. 189 (1933).—China (Kwangsi).

GONOLOBUS Michx. (Asclepiadac.).
andinus *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxv. A. No. 7, 21 (1933).—Ecuador; Boliv.
Asplundii *Malme, l. c.* 20.—Boliv.
australis (*Malme*) *Herter, Fl. Urug. Pl. Vasc.* (*Estud. Bot. Reg. Urug.* iv.) 101 (1931): Pseudibatia australis.
Bolivari *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 29, 10 (1935).—Marocc.
floribundus *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxv. A. No. 7, 19 (1933).—Boliv.
Melinii *Malme, l. c.* 23.—Peruv.
pedicellatus *Malme, l. c.* 24.—Peruv.
rotundus *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 64 (1933–5).—Mexico.
stapelioides *Desv. in Buch.-Ham. Prodr. Pl. Ind. Occ.* 32 (1825).—Ind. occ. (Tobago).
Venturii *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxv. A. No. 7, 18 (1933).—Argent.
virescens *Desv. in Buch.-Ham. Prodr. Pl. Ind. Occ.* 32 (1825).—Jamaica.

GONOSTEGIA Turcz. (Urticac.).
Matsudai (*Yamamoto*) *Yamamoto & Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1931, iii. 392: Memorialis Matsudai.
neurocarpa (*Yamamoto*) *Yamamoto & Masamune, l. c.*: Memorialis neurocarpa.

GONYPETALUM Ule (Dichapetalac.).
lanceolatum *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 737.—Bras. (Amaz.).
Tessmannii *K. Krause in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 137 (1931).—Peruv.

GONYSTYLUS Teijsm. & Binn. (Gonystylac.; Thymelaeac., Gen. Pl.).
Beccarianus *Van Tiegh. in Ann. Sc. Nat.* Sér. VII. xvii. 245 (1893), in obs.—Borneo.

GONYSTYLUS:—
sympetala *Domke in Biblioth. Bot.* cxi. 33, in obs., 145 (1934); *v. Steenis & Domke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 233 (1934).—Borneo.

GONZALAGUNIA Ruiz & Pav. (Rubiac.).
sessilifolia *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 210 (1931).—Ecuador.
sororia *Standley, l. c.* 211.—Ecuador.
surinamensis *Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 264.—Guiana Bat.

GOODENIA Sm. (Goodeniac.).
Konigsbergeri (*Backer*) *Backer ex Boldingh, Zakfl. Landbouwstr. Java*, 88 (1916): Selliera Konigsbergeri.

GOODYERA R. Br. (Orchidac.).
callosa *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 164 (1934).—N. Guin.
daibuzanensis *Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 305.—Formosa.
denticulata *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 165 (1934).—N. Guin.
erosa (*Ames & C. Schweinf.*) *Ames, F. T. Hubbard & C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* iii. 37 (1934): Epipactis erosa.
hylophiloides *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 195 (1935).—Borneo.
kwangtungensis *Tso in Sunyatsenia*, i. 134 (1933).—China (Kwangtung).
nankoënsis *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 432.—Formosa.
ophioides (*Fernald*) *Rydb. in Brittonia*, i. 86 (1931): G. repens var. ophioides.
seikoomontana *Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 187.—Formosa.
ustulata *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 194 (1935).—Borneo.

GORDONIA Ellis in Phil. Trans. 1770, lx. 520 (1771); L. Mant. Alt. 556 (1771). *THEACEAE* (Ternstroemiac., Gen. Pl.).
chrysandra *Cowan in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 184 (1931).—China (Yunnan).
Lasianthus (*L.*) *Ellis in Phil. Trans.* 1770, lx. 523, tab. xi. (1771); *L. Mant. Alt.* 570 (1771): Hypericum Lasianthus.

GOSSYPIANTHUS Hook. (Amaranthac.).
heterophyllus *Ekman & Suesseng. in Fedde, Repert.* xxxv. 317 (1934).—Cuba.
Jackianus *Ekman & Suesseng. l. c.*—Cuba.

GOSSYPIOSPERMUM Urb. (Flacourtiac.).
paraguariense *Rehder in Tropical Woods*, 1932, No. 32, 7: Casearia gossypiosperma.

GOSSYPIUM L. (Malvac.).
aridum (*Rose & Standley*) *Skovsted in Journ. Genet.* xxviii. 422 (1934), in obs.: Erioxylum aridum.
Armourianum *Kearney in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1933, xxiii. 558.—Calif. infer.
ceratodenum *ex Journ. Heredity*, 1935, xxvi. 30, in obs.—U.S.A. (Florida).
gossypioides (*R. Br.*) *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 79 (1931): Sturtia gossypioides.
leucadenum *ex Journ. Heredity*, 1935, xxvi. 30, in obs.—U.S.A. (Florida).
lysinum *ex Journ. Heredity, l. c.*, in obs.—U.S.A. (Florida).
Raimondii *Ulbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 548 (1932).—Peruv.
synochrum *ex Journ. Heredity*, 1935, xxvi. 30, in obs.—U.S.A. (Florida).
terraceium *ex Journ. Heredity, l. c.*, in obs.—U.S.A. (Florida).

GOUANIA Jacq. (Rhamnac.).
cormorensis *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 315 (1921), in obs.—Ins. Comor.
efatensis *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 239.—N. Hebrides.
napalensis *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 417 (1824).—Nepal.

GOUINIA Fourn. (Gramin.).
barbata (*Hackel*) *Swallen in Am. Journ. Bot.* 1935, xxii. 37: Diplachne barbata

GOUINIA:—
Brandegei (*Vasey*) *Hitchcock in U. S. Dep. Agric., Bur. Pl. Ind.*, Bull. 33, 21 (1903): Diplachne Brandegei.
brasiliensis (*S. Moore*) *Swallen in Am. Journ. Bot.* 1935, xxii. 36: Pogochloa brasiliensis.
cearensis (*Ekman*) *Swallen, l. c.* 39: Diplachne cearensis.
gracilis *Ekman in Am. Journ. Bot.* 1935, xxii. 33.—Cuba.
guatemalensis (*Hackel*) *Swallen in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 436, 334 (1934): Diplachne guatemalensis.
longiramea *Swallen, l. c.*—Mexico.
papillosa *Swallen, l. c.*—Mexico.
paraguayensis (*Kuntze*) *Parodi in Rev. Mus. La Plata*, xxxiv. 176, in obs., 192 (1934): Arundinaria paraguayensis.
ramosa *Swallen in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 436, 333 (1934).—Mexico.
tortuosa *Swallen in Am. Journ. Bot.* 1935, xxii. 41.—Argent.

GOURLIEA Gill. ex Hook. Bot. Misc. iii. 207 (1832). *LEGUMINOSAE.*
decorticans *Gill. l. c.* 208.—Argent.

GOURMANNIA A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France, 1914, lxi. Mém. 8, 253 (1917). *STERCULIACEAE.*
grewioides *A. Cheval. l. c.*—Sudan.; Dahomey.

GRABOWSKIA Schlecht. (Solanac.).
geniculata (*Fernald*) *C. L. Hitchcock in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1932, xix. 331: Lycium geniculatum.

GRADERIA Benth. (Scrophulariac.).
iringensis *Melch. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 603 (1932).—Tanganyika Terr.

GRAFFENRIEDA DC. (Melastomatac.).
colombiana *Gleason in Phytologia*, i. 41 (1933).—Colomb.
Ottoschulzii (*Urb. & Ekman*) *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 15 (1931), cum descr. ampl.: Miconia Ottoschulzii.
polymera *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 420.—Venez.
rupestris *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 66 (1935).—Bras. (Amaz.).
stellipilis *Gleason in Am. Journ. Bot.* 1932, xix. 742.—Boliv.
tricalcarata *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 421.—Venez.

GRAMMADENIA Benth. (Myrsinac.).
hexamera *Pittier in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 140.—Venez.

GRAPHEPHORUM Honda in Journ. Jap. Bot. 1934, x. 693, japonice, 694, latine. *GRAMINEAE.*
nipponicum *Honda, l. c.*—Japon.
Pringlei *Scribn. ex Beal, Grasses N. Amer.* 561 (1896).—Mexico.

GRAPHORCHIS Thou. (Orchidac.).
herbacea (*Lindl.*) *Lyons, Plant Names Scientific & Popular*, ed. 2, 215 (1907), in obs.: Eulophia herbacea.

GRAPTOPETALUM Rose (Crassulac.).
amethystinum (*Rose*) *Walth. in Cact. & Succ. Journ. Amer.* iii. 12 (1931): Pachyphytum amethystinum.
occidentale *Rose apud Walth. l. c.* v. 411 (1933).—Mexico.

GRATIOLA L. (Scrophulariac.).
alata *Roxb. Hort. Beng.* 80 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 137 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 137 (1832).—Ins. Molucc.
amara (*Vahl*) *Roxb. l. c.* 4, nomen; *et l. c.* 136; *et l. c.* 135: Caranga amara.
cuneifolia *Roxb. l. c.* 80, nomen; *et l. c.* 142; *et l. c.* 142.—Ind. or.
integrifolia *Roxb. l. c.* 4, nomen; *et l. c.* 138; *et l. c.* 137.—Ind. or. (Bengal).
involucrata *Roxb. l. c.* 80, nomen; *et l. c.*; *et l. c.*—Ins. Molucc.
meonantha *G. Sampaio in Ann. Sc. Nat. Porto*, x. 54 (1906).—Lusitan.

GRATIOLA:—
racemosa *Roxb. Hort. Beng.* 43 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 139 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 138 (1832).—Ind. or.
reptans *Roxb. l. c.* 4, nomen; *et l. c.* 140; *et l. c.* 140.—Ins. Molucc.
serrata *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.*; *et l. c.* 139.—Ind. or. (Bengal).

GRAVESIA Naud. (Melastomatac.).
aberrans *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. XII. 131 (1932).—Madag.
alata *H. Perrier, l. c.* 130.—Madag.
ambrensis *H. Perrier, l. c.* 86.—Madag.
angustisepala *H. Perrier, l. c.* 98.—Madag.
antongiliana *H. Perrier, l. c.* 110.—Madag.
apiculata (*Cogn.*) *H. Perrier, l. c.* 97: Veprecella apiculata.
barbata *H. Perrier, l. c.* 134.—Madag.
biauriculata *H. Perrier, l. c.* 69.—Madag.
biporosa *H. Perrier, l. c.* 117.—Madag.
bullosa (*Cogn.*) *H. Perrier, l. c.* 135: Veprecella bullosa.
capitata *H. Perrier, l. c.* 73.—Madag.
cauliflora *H. Perrier, l. c.* 108.—Madag.
cistoides *H. Perrier*; *H. Perrier, l. c.* 63, descr.—Madag.
crassicauda *H. Perrier, l. c.* 78.—Madag.
Decaryana *H. Perrier, l. c.* 70.—Madag.
dichaetantheroides *H. Perrier*; *H. Perrier, l. c.* 132, descr.—Madag.
dionychifolia *H. Perrier, l. c.* 95.—Madag.
diversifolia *H. Perrier, l. c.* 106.—Madag.
ecalcarata *H. Perrier, l. c.* 84.—Madag.
elongata (*Cogn.*) *H. Perrier, l. c.* 119: Medinilla elongata.
erecta *H. Perrier, l. c.* 79.—Madag.
fulva *H. Perrier, l. c.* 82.—Madag.
glandulosa *H. Perrier, l. c.* 91.—Madag.
gunneroides *H. Perrier, l. c.* 65.—Madag.
hederoides *H. Perrier, l. c.* 108.—Madag.
hirtopetala *H. Perrier, l. c.* 135.—Madag.
hispida (*Baker*) *H. Perrier, l. c.* 134: Veprecella hispida.
Humberti *H. Perrier, l. c.* 67.—Madag.
ikongoënsis *H. Perrier, l. c.* 66.—Madag.
inappendiculata *H. Perrier, l. c.* 116.—Madag.
Jumellei *H. Perrier, l. c.* 90: G. rosea *Jumelle & H. Perrier*.
lanceolata (*Cogn.*) *H. Perrier, l. c.* 114: Veprecella lanceolata.
laxiflora (*Naud.*) *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxxv. (*Hist. Nat. Pl.* v. Atlas iii.) t. 387 (1896); *H. Perrier, l. c.* 113, descr. emend.: Veprecella laxiflora.
longifolia *H. Perrier, l. c.* 77.—Madag.
longipes *H. Perrier, l. c.* 85.—Madag.
lutea (*Naud.*) *H. Perrier, l. c.* 111: Veprecella lutea.
macrophylla (*Naud.*) *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxxv. (*Hist. Nat. Pl.* v. Atlas iii.) t. 388 (1896); *H. Perrier, l. c.* 125: Veprecella macrophylla.
macropoda (*Jumelle & H. Perrier*) *H. Perrier, l. c.* 71: Medinilla macropoda.
magnifolia *H. Perrier, l. c.* 125.—Madag.
medinilloides *H. Perrier, l. c.* 70: Medinilla violacea.
microphylla (*Cogn.*) *Drake in Grandidier Hist. Pl. Madag.* xxxv. (*Hist. Nat. Pl.* v. Atlas iii.) t. 390 (1896); *H. Perrier, l. c.* 105: Veprecella microphylla.
minutidentata *H. Perrier*; *H. Perrier, l. c.* 128, descr.—Madag.
nigrescens (*Naud.*) *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxxv. (*Hist. Nat. Pl.* v. Atlas iii.) t. 389 (1896); *H. Perrier, l. c.* 115, descr. ampl.: Veprecella nigrescens.
nigro-ferruginea *H. Perrier, l. c.* 98.—Madag.
oblanceolata *H. Perrier, l. c.* 104.—Madag.
oblongifolia (*Cogn.*) *H. Perrier, l. c.* 137: Veprecella oblongifolia.
parvifolia (*A. DC.*) *H. Perrier, l. c.* 136: Veprecella parvifolia.
pauciflora *H. Perrier, l. c.* 112.—Madag.
peltata *H. Perrier, l. c.* 68.—Madag.
pilosula (*Cogn.*) *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxxv. (*Hist. Nat. Pl.* v. Atlas iii.) t. 391 (1896); *H. Perrier, l. c.* 123: Veprecella pilosula.

GRAVESIA:—
pterocaulon *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. XII. 129 (1932).—Madag.
pustulosa *H. Perrier, l. c.* 91.—Madag.
retracticauda *H. Perrier, l. c.* 76.—Madag.
rienanensis *H. Perrier, l. c.* 109.—Madag.
rosea (*Cogn.*) *H. Perrier, l. c.* 121: Veprecella rosea.
rostrata *H. Perrier*; *H. Perrier, l. c.* 79, descr.—Madag.
rotundifolia *H. Perrier, l. c.* 64.—Madag.
rubiginosa *H. Perrier, l. c.* 118.—Madag.
rubra (*Jumelle & H. Perrier*) *H. Perrier, l. c.* 132: Veprecella rubra.
rubripes (*Jumelle & H. Perrier*) *H. Perrier l. c.* 71: Medinilla rubripes.
rupicola *H. Perrier, l. c.* 136.—Madag.
Rutenbergiana *Baill.*; *H. Perrier, l. c.* 102, descr. ampl.—Madag.
sambiranensis *H. Perrier, l. c.* 93.—Madag.
scandens *H. Perrier, l. c.* 96.—Madag.
setifera *H. Perrier, l. c.* 101.—Madag.
subglobosa *H. Perrier, l. c.* 97.—Madag.
submalvacea *H. Perrier, l. c.* 90.—Madag.
subsessilifolia *H. Perrier, l. c.* 96.—Madag.
succosa *H. Perrier, l. c.* 100.—Madag.
tanalensis *H. Perrier, l. c.* 76.—Madag.
tetramera *H. Perrier, l. c.* 119.—Madag.
tetraptera (*Cogn.*) *H. Perrier, l. c.* 129: Veprecella tetraptera.
thymoides (*Baker*) *H. Perrier, l. c.* 105: Phornothamnus thymoides.
tricaudata *H. Perrier, l. c.* 130.—Madag.
variesetosa *H. Perrier, l. c.* 111.—Madag.
venusta *H. Perrier, l. c.* 107.—Madag.
vestita (*Baker*) *H. Perrier, l. c.* 122: Veprecella vestita.
Viguieri *H. Perrier, l. c.* 64.—Madag.
violacea (*Jumelle & H. Perrier*) *H. Perrier, l. c.* 74: Veprecella violacea.
viscosa *H. Perrier, l. c.* 72.—Madag.

GREENEA Wight & Arn. (Rubiac.).
oblonga *Craib in Kew Bull.* 1931, 211.—Siam.
secunda (*Griff.*) *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 25 (1932): Wendlandia secunda.
siamensis *Craib in Kew Bull.* 1931, 211.—Siam.

GREENMANIELLA Sharp in Ann. Missouri Bot. Gard. 1935, xxii. 141. *COMPOSITAE.*
resinosa (*S. Wats.*) *Sharp, l. c.*: Zaluzania resinosa.

GREGORIA Duby (Primulac.).
arctica (*Hook.*) *House in Bull. N. Y. State Mus.* 1920, Nos. 233–4, 69 (1921): Douglasia arctica.
dentata (*S. Wats.*) *House, l. c.*: Douglasia dentata.
Johnstoni (*A. Nelson*) *House, l. c.*: Douglasia Johnstoni.
laevigata (*A. Gray*) *House, l. c.*: Douglasia laevigata.
montana (*A. Gray*) *House, l. c.*: Douglasia montana.
nivalis (*Lindl.*) *House, l. c.* 68: Douglasia nivalis.

GREIGIA Regel (Bromeliac.).
columbiana *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcviii. 7 (1932).—Colomb.
Macbrideana *L. B. Smith, l. c.*—Peruv.

GREVILLEA R. Br. (Proteac.).
dryandroides *C. A. Gardner in Journ. Roy. Soc. W. Austral.* 1932–3, xix. 81 (1934).—W. Austral.
elaeocarpifolia *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 87.—N. Hebrides.
latifolia *C. A. Gardner in For. Dep. Bull., W. Austral.* No. 32, 43 (1923).—W. Austral.
tenuiloba *C. A. Gardner in Journ. Roy. Soc. W. Austral.* 1932–3, xix. 81 (1934).—W. Austral.
viscidula *C. A. Gardner in For. Dep. Bull., W. Austral.* No. 32, 44 (1923).—W. Austral.

GREWIA L. (Tiliac.).
Brassii *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 604 (1935).—N. Guin.
Burttii *Exell in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 314.—Tanganyika Terr.
concolor *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 35 (1935).—China (Hainan).
dumicola *Exell in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 315.—Tanganyika Terr.
ehretioides *Chiov. Fl. Somala*, II. 33 (1932).—Somal. Ital.

GREWIA:—
filipes *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 712 (1935).—Tanganyika Terr.
Gossweileri (*Burret*) *Exell in Journ. Bot.* 1932, lxx. Suppl. 1, 221: Microcos Gossweileri.
Inmac *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 231.—N. Hebrides.
lagenophora *Chiov. Fl. Somala*, II. 39 (1932).—Somal. Ital.
macropetala *Burret in Fedde, Repert.* xxxiii. 74 (1933).—China (Kwangsi).
megistocarpa *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 194 (1934).—Tanganyika Terr.
meizophylla *Burret, l. c.* xii. 713 (1935).—Tanganyika Terr.
pannosisepala *Chiov. Fl. Somala*, II. 36 (1932).—Somal. Ital.
penicillata *Chiov. l. c.* 39.—Somal. Ital.
retusa *Chiov. l. c.* 37.—Somal. Ital.
Schliebenii *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 193 (1934).—Tanganyika Terr.
tenax (*Forsk.*) *Fiori in Agric. Colon.* 1911, v. Suppl., 23 (1912): Chadara tenax.
utilis *Exell in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 316.—Tanganyika Terr.
velutinissima *Dunkley in Kew Bull.* 1935, 256.—N. Rhodesia.

GRIAS L. (Lecythidac.; Myrtac., Gen. Pl.).
loretensis *Knuth in Fedde, Repert.* xxxv. 339 (1934).—Peruv.
maranonensis *Knuth, l. c.*—Peruv.
Neuberthii *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 30 (1931).—Peruv.
Tessmannii *Knuth in Fedde, Repert.* xxxv. 340 (1934).—Peruv.

GRINDELIA Willd. (Compos.).
acutifolia *Steyerm. in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1934, xxi. 498.—U.S.A. (Colorado; N. Mexico).
aegialitis *Cabrera in Rev. Mus. La Plata*, xxxiii. 234 (1932).—Argent.
aggregata *Steyerm. in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1934, xxi. 566.—Brit. Columb.
arenicola *Steyerm. l. c.* 229.—U.S.A. (Calif.).
Bergii (*Hieron.*) *Cabrera in Rev. Mus. La Plata*, xxxiii. 236 (1932): G. brachystephana var. Bergii.
Blakei *Steyerm. in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1934, xxi. 567.—U.S.A. (Calif.).
bracteosa *Howell in Madroña*, ii. 22 (1931).—U.S.A. (Calif.).
chiloënsis (*Cornel.*) *Cabrera in Rev. Mus. La Plata*, xxxiii. 215 (1932): Hoorebekia chiloënsis.
exilifolia *A. Nelson ex Schmoll, Veg. Chimney Rock Area Colorado*, 43 (1935), nomen; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 149.—U.S.A. (Colorado).
Greenei *Steyerm. in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1934, xxi. 517.—Mexico.
Greenmanii *Steyerm. l. c.* 460.—Mexico.
Hallii *Steyerm. l. c.* 229.—U.S.A. (Calif.).
Havardii *Steyerm. l. c.* 474.—U.S.A. (N. Mexico; Texas).
Howellii *Steyerm. l. c.* 549.—U.S.A. (Idaho).
littoralis *Steyerm. l. c.* 516.—U.S.A. (Texas).
maritima (*Greene*) *Steyerm. l. c.* 576: G. rubricaulis var. maritima.
Nelsonii *Steyerm. l. c.* 463.—Mexico.
Palmeri *Steyerm. l. c.* 471.—Mexico.
revoluta *Steyerm. l. c.* 496.—U.S.A. (Colorado).
Robinsonii *Steyerm. l. c.* 459.—Mexico.
sublanuginosa *Steyerm. l. c.* 458.—Mexico.
tenella *Steyerm. l. c.* 464.—Mexico.

GROBYA Lindl. (Orchidac.).
bibrachiata *Hoehne in Bol. Agric., S. Paulo*, 1933, xxxiv. 625 (1934).—Bras. (S. Paulo).

GRONOPHYLLUM Scheff. (Palmae).
microspadix *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 44 (1934).—Celebes.

GROSSERA Pax (Euphorbiac.).
Vignei *Hoyle in Kew Bull.* 1935, 259.—Gold Coast.

GROSSULARIA Mill. (Saxifragac.).
brachyantha (*A. Gray*) *Petraw. in U. S. Dep. Inter., Nat. Park Service, Techn. Bull.* vi. 20 (1932); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 135: Ribes leptanthum var. brachyanthum.

GRUBBIA Berg. (Grubbiac.; Santalac., Gen. Pl.).
tomentosa (*Thunb.*) *Harms in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi b. 51 (1935): Taxus tomentosa.

GRUSONIA F. Reichb. ex K. Schum. (Cactac.).
santamaria (*E. M. Baxter*) *E. M. Baxter in Cact. & Succ. Journ. Amer.* vi. 60 (1934), cum descr.: Opuntia santamaria.
Wrightiana *E. M. Baxter, Calif. Cactus*, 58 (1935). —Arizona; Calif.; Mexico.

GUADUELLA Franch. (Gramin.).
macrostachys (*K. Schum.*) *Pilger in Wiss. Ergebn. Deutsch.-Zentr.-Afr. Exped. 1910–11*, ii. 93 (1922), in obs.: Microbambus macrostachys.

GUAPIRA Aubl.; H. Hallier in Meded. Herb. Leid. No. 35, 18 (1918): **Pisonia** L. (Nyctaginac.).

GUAREA Allem. (Meliac.).
Davisii *Sandwith in Kew Bull.* 1933, 330.—Guiana Brit.
fissicalyx *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 383 (1932).—Peruv.
Kennedyi [*Burtt Davy*] *ex J. D. Kennedy in Empire For. Journ.* 1930, ix. 223, in obs., nomen. —Nigeria.
Klugii *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 384 (1932).—Peruv.
yungasana *Briq. in Candollea*, vi. 20 (1935).—Boliv.

GUATTERIA Ruiz & Pav. (Annonac.).
Guentheriana *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 75 (1931).—Boliv.
hyposericea *Diels, l. c.* 76.—Peruv.
leiophylla *Diels, l. c.* 77.—Boliv.
lucens *Standley in Tropical Woods*, 1935, No. 42, 22. —Panamá.
phanerocampta *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 76 (1931).—Peruv.
Poiteaui *Diels, l. c.* 74.—Guiana Gall.
Raimondii *Diels, l. c.* 75.—Peruv.
setosa *Rusby in Phytologia*, i. 55 (1934).—Boliv.
Tonduzii *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 75 (1931).—Costa Rica.
trichoclonia *Diels, l. c.* 77.—Boliv.
xalapensis *Baill. ex R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* x. 43 (1930), in syn.: Malmea depressa.

GUATTERIOPSIS R. E. Fries in Acta Hort. Berg. xii. 108 (1934). *ANNONACEAE.*
blepharophylla (*Mart.*) *R. E. Fries, l. c.* 110: Guatteria blepharophylla.
hispida *R. E. Fries, l. c.* 111.—Bras. (Amaz.).
sessiliflora (*Benth.*) *R. E. Fries, l. c.* 109: Annona sessiliflora.

GUETTARDA L. (Rubiac.).
×adulterina *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 47 (1932).—Santo Domingo.
colubrinoides *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 358 (1931).—Mexico.
densiflora (*Wright*) *Maza in An. Soc. Esp. Hist. Nat.* Ser. II. iii. 290 (1895): Stenostomum densiflorum.
divaricata (*Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 403 (1931): Dicrobotryum divaricatum.
Eliadis *Standley in Tropical Woods*, 1935, No. 42, 25.—Colomb.
excisa *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 48 (1932).—Haiti.
fasciculata (*Sw.*) *Maza in An. Soc. Esp. Hist. Nat.* Ser. II. iii. 290 (1895): Chomelia fasciculata.
glabrescens *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 456, nomen.—N. Caled.
granulata (*Griseb.*) *Maza in An. Soc. Esp. Hist. Nat.* Ser. II. iii. 290 (1895): Stenostomum granulatum.
hypoglauca *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 359 (1931).—Bras. (Rio de Janeiro).
Kajewskii *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 6.—N. Hebrides.
lacornea *Urb. & Ekman*; *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 49 (1932), descr. ampl.—Haiti.
lamprophylla *Urb. l. c.* 50.—Haiti.

GUETTARDA:—
myrtifolia (*Griseb.*) *Maza in An. Soc. Esp. Hist. Nat.* Ser. II. iii. 290 (1895): Stenostomum myrtifolium.
nitida (*DC.*) *Maza, l. c.*: Stenostomum nitidum.
ocoana *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 49 (1932).—Santo Domingo.
pauciflora (*Wright*) *Maza in An. Soc. Esp. Hist. Nat.* Ser. II. iii. 289 (1895): Stenostomum pauciflorum.
rhamnifolia *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 359 (1931).—Bras.
rotundata (*Griseb.*) *Maza in An. Soc. Esp. Hist. Nat.* Ser. II. iii. 290 (1895): Stenostomum rotundatum.
Shaferi *Standley in N. Am. Fl.* xxxii. 243 (1934): G. densiflora *Urb.*
torbeciana *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 49 (1932).—Haiti.
Tournefortiopsis *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 293 (1931): Tournefortiopsis reticulata *Rusby*, non Guettarda reticulata *Griseb.*
triacantha (*Griseb.*) *Maza in An. Soc. Esp. Hist. Nat.* Ser. II. iii. 290 (1895): Chomelia triacantha.

GUICHENOTIA J. Gay (Sterculiac.).
angustifolia (*Turcz.*) *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 81 (1931): Ditomostrophe angustifolia.

GUILDINGIA Hook. Bot. Misc. i. 122 (1829). *MELASTOMATACEAE.*
psidioides *Hook. l. c.*—Ind. occ. (Martinique).

GUILIELMA Mart. (Palmae).
Chontaduro *Karst. & Triana in Triana, Nuev. Jen. i Esp. Fl. Neo-Granad.* 15 (1854); *Sprague in Kew Bull.* 1934, 395, 396.—Colomb.

GUILLENIA Greene (Crucif.).
heterophylla (*Nutt.*) *O. E. Schulz in Engl. Jahrb.* lxvi. 98 (1933): Streptanthus heterophyllus.

GUINDILIA Gill. ex Hook. Bot. Misc. iii. 170 (1832). *SAPINDACEAE.*
trinervis *Gill. ex Hook. l. c.*—Am. austr.

GUIOA Cav. (Sapindac.).
concolor *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 83, 17 (1931).—Ins. Viti.
montana *C. T. White in Contrib. Arn. Arb.* No. iv. 61 (1933).—Austral. (Queensland).

GUIZOTIA Cass. (Compos.).
oblonga (*Hutchinson*) *Hutchinson & Bullock in Kew Bull.* 1933, 85, 150: Wedelia oblonga.

GULUBIA Becc. (Palmae).
Brassii *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 336 (1935).—N. Guin.

GUNDLACHIA A. Gray (Compos.).
compacta *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 75 (1931).—Haiti.
ocoana *Urb. & Ekman, l. c.* 76.—Santo Domingo.

GUNNERA L. (Haloragac.).
Bolivari *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 32 (1931).—Peruv.
Dominii *Kraj. in Acta Bot. Bohem.* ix. 50 (1930).— Ins. Sandvic.
Herteri *Osten, Herb. Corn. Osten*, ii. 33 (1932); *Osten in Physis*, xi. 176 (1932).—Urug.
peruviana *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 31 (1931).—Peruv.

GURANIA Cogn. (Cucurbitac.).
cinerea *Suesseng. in Fedde, Repert.* xxx. 277 (1932). —Bras. (Amaz.).
robusta *Suesseng. l. c.* 278.—Bras. (Amaz.).

GUSTAVIA L. (Lecythidac.; Myrtac., Gen. Pl.).
caballoënsis *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 28 (1931).—Peruv.
gracillipes *Knuth in Fedde, Repert.* xxxv. 338 (1934).—Colomb.
iquitosensis *Knuth, l. c.*—Peruv.
Mangua *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 29 (1931).—Peruv.
Tessmannii *Knuth in Fedde, Repert.* xxxv. 338 (1934).—Peruv.; Bras. (Amaz).

GUTEMBERGIA Sch. Bip. (Compos.).
cupricola *Robyns in Nat. Tijdschr.* xiv. (Congr. Num.) 102 (1932), nomen.—Congo Belg.
nivea *Hutchinson & B. L. Burtt in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiii. 36 (1932).—Congo Belg.
Rangei *Muschl. ex Range in Fedde, Repert.* xxxix. 58 (1935), pro syn.: Senecio niveus.

GUTHNICKIA Regel (Gesneriac.).
tyrianthina *Regel ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 792 (1895), in syn.: Achimenes tyrianthina.

GUZMANIA Ruiz & Pav. (Bromeliac.).
apiculata *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcviii. 25 (1932).—Peruv.
cardinalis (*André*) *Mez in Engl. Pflanzenreich, Bromeliac.* 609 (1935): Caraguata cardinalis.
caricifolia (*André*) *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 74 (1934): Sodiroa caricifolia.
crateriflora *Mez & Werckle*; *L. B. Smith in Am. Journ. Bot.* 1935, xxii. 261, descr. emend.—Ins. Cocos; Costa Rica.
Dielsii *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 538 (1935).—Ecuador.
dissitiflora (*André*) *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 74 (1934): Sodiroa dissitiflora.
fragrans *Nicholson, Ill. Dict. Gard.* i. 260 (1884), in syn.: Canistrum eburneum.
graminifolia (*André*) *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 74 (1934): Sodiroa graminifolia.
Hitchcockiana *L. B. Smith in Proc. Am. Acad.* lxx. 148 (1935).—Ecuador.
Kalbreyeri (*Baker*) *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 74 (1934): Sodiroa Kalbreyeri.
Killipiana *L. B. Smith, l. c.* n. s. xcviii. 29 (1932).— Peruv.
mitis *L. B. Smith, l. c.* 31.—Colomb.
nigrescens (*André*) *Mez in Engl. Pflanzenreich, Bromeliac.* 617 (1935): Tillandsia nigrescens.
obtusiloba *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 74 (1934): Sodiroa Andreana *Wittm.*, non Guzmania Andreana *Mez.*
pallida *L. B. Smith, l. c.* n. s. xcviii. 27 (1932).— Colomb.
Pearcei (*Baker*) *L. B. Smith, l. c.* n. s. civ. 74 (1934): Sodiroa Pearcei.
Pennellii *L. B. Smith, l. c.* n. s. xcviii. 30 (1932).— Colomb.
plicatifolia *L. B. Smith in Proc. Am. Acad.* lxviii. 146 (1933).—Costa Rica.
rosea *L. B. Smith, l. c.* 147.—Colomb.
Sprucei (*André*) *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 75 (1934): Sodiroa Sprucei.

GYMNEMA R. Br. (Asclepiadac.).
alterniflorum (*Lour.*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 318 (1935): Apocynum alterniflorum.

×**GYMNIGRITELLA** G. Camus (Orchidac.).
Godferyana *G. Keller in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 270 (1933).—Helvet.
Schwerei *G. Keller, l. c.* 271.—Helvet.

GYMNOCALYCIUM Pfeiff. (Cactac.).
albispinum *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 285, 416 (1935).—Argent.
Andreae (*Bödeker*) *Backeb. & F. M. Knuth, l. c* 285: Echinocactus Andreae.
Castellanosii *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 287, 416.—Argent.
Fleischerianum *Jajo ex Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 288.—Parag.
grandiflorum *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 289, 417.—Argent.
hybopleurum *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 289.—Argent.
mazanense *Backeb. in Kakteenfreund*, i. No. 12 (1933); *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 2, [p. 6].—Argent.
nidulans *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 293, 417 (1935).—Argent.
nigriareolatum *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 5, [p. 8].—Argent.
Ochoterenai *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 293, 417 (1935).—Argent.
oenanthemum *Backeb. in Kaktusar*, 1934, August; cf. *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 9, [p. 2].—Argent.

GYMNOCALYCIUM:—
Pflanzii (*Vaupel*) *Werderm. in Fedde, Repert. Sonder-Beih.* C. t. 94 (1935): Echinocactus Pflanzii.
proliferum *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 294 (1935).—Argent.
Valnicekianum *Jajo ex Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 296.—Argent.
Venturi *Frič ex Backeb. & F. M. Knuth, l. c.*, in syn.: G. Venturianum.
Venturianum *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 9, [p. 1].—Urug.
Weissianum *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 296, 417 (1935).—Argent.

GYMNOCLADUS Lam. (Legumin.).
assamicus *Kanj. ex P. C. Kanj. in Assam Forest Rec.*, Bot. i. 7 (1934).—Ind. or. (Assam).

GYMNOLAEMA Benth. (Asclepiadac.).
tuberosa *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1934, 304.—Tanganyika Terr.

GYMNOPOGON Beauv. (Gramin.).
radiatus (*L.*) *Parodi in Pl. Forraj. Rep. Argent.* (*Fac. Agron. & Vet., Buenos Aires*) Contrib. 1, [t. 20] (1923): Agrostis radiata.

GYMNOSPORIA Benth. & Hook. f. (Celastrac.).
annobonensis *Loes. & Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 30 (1934).—Afr. trop. (Ins. Annobon).
hainanensis *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 267 (1935).—China (Hainan).
ilicina (*Burch.*) *Loes. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 225 (1921), in obs.: Celastrus ilicinus.
Ledermannii *Engl. in Engl. l. c.*, in obs.—Cameroons.
lucida (*L.*) *Loes. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* iii. v. 208 (1892): Celastrus lucidus.
maritima (*Bolus*) *Loes. l. c.*, in obs.: Celastrus maritimus.
nyasica *Burtt Davy & Hutchinson in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. 11. pp. xxiii. 448 (1932).—Transvaal.
saharae (*Battand.*) *Loes. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 228 (1921), in obs.: Celastrus saharae.
somalensis *Loes. in Engl. Jahrb.* xvii. 547 (1893).—Somaliland.
spinosa (*Forsk.*) *Fiori in Agric. Colon.* 1911, v. Suppl., 2 (1912): Catha spinosa.

GYMNOTHECA Decne. (Saururac.; Piperac., Gen. Pl.).
involucrata *P'ei in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., ix. 111 (1934).—China (Szechuan).

GYMNOTHRIX Beauv. corr. Spreng. (Gramin.).
polystachya (*L.*) *Swartz ex Trin. Gram. Pan.* 66 (1826), in obs.: Panicum polystachyon.

GYNANDROPSIS DC. (Capparidac.).
gracilis (*Triana & Planch.*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 22 (1931): Cleome gracilis.
hirsuta *Moldenke in Phytologia*, i. 5 (1933).—Colomb.
macrothyrsis (*Triana & Planch.*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 22 (1931): Cleome macrothyrsis.
orba *Macbride in Candollea*, v. 359 (1934).—Peruv.
puberula (*Triana & Planch.*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 22 (1931): Cleome puberula.

GYNERIUM Humb. & Bonpl. (Gramin.).
roseum *Hort. ex Bull. Ort. Bot. Napoli*, x. p. xv. (1930), nomen.—Hort.

GYNOCHTHODES Blume (Rubiac.).
ovalifolia (*Valeton*) *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 351: Plectronia ovalifolia.
puberula *Craib in Kew Bull.* 1932, 436.—Siam.

GYNOXYS Cass. (Compos.).
tolimensis *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 27, Cuadro 8 (1934), nomen; *et l. c.* No. 29, 37 (1935), descr.—Colomb.

GYNURA Cass. (Compos.).
ajakensis *Hochr. in Candollea*, v. 330 (1934).—Java.

GYNURA:—
baoulensis *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 147, in clavi, 148 (1931).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
caerulea *Hutchinson & Dalziel, l. c.*—Nigeria.
calciphila *Kerr in Kew Bull.* 1935, 330.—Siam.
Elberti *Koster in Fedde, Repert.* xxxiv. 25 (1933).—Ins. Sunda (Lombok).
formosana *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 175.—Formosa.
gracilis *Hook. f. ex Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 147, in clavi, 148 (1931): Senecio picridifolius *A. Cheval. Expl. Bot. Afr. Occ. Franç.* 375 (1920), non *DC.*
liberica (*S. Moore*) *Hutchinson & Dalziel, l. c.*: Crassocephalum libericum.
longifolia *Kerr in Kew Bull.* 1935, 331.—Siam.
montuosa (*S. Moore*) *Bullock in Kew Bull.* 1932, 499: Senecio montuosus.
picridifolia *Burtt Davy in Kew Bull.* 1935, 569.—Afr. trop. et austr.-or.
pubigera *Boldingh, Zakfl. Landbouwstr. Java*, 58 (1916).—Java.
truncata *Kerr in Kew Bull.* 1935, 331.—Siam.

GYPSOPHILA L. (Caryophyllac.).
antari *Post & Beauverd in Dinsm. Pl. Post. & Dinsm.* Fasc. 1. 4 (1932); *Dinsm. in Fedde, Repert.* xxxiii. 103 (1933).—Syria.
cephalotes (*Schrenk*) *Raikova in Vved. & al., Key Fl. Tashkent*, 115 (1924): G. fastigiata var. cephalotes.
diffusa *Fisch. & Mey.*; *Schischk. in Trav. Mus. Bot. Acad. Sc. URSS*, xxiv. 35 (1932), descr. emend.—Turkestan.
exaltata *Bornm. in Magyar Bot. Lap.* 1931, xxx. 61.—As. Min. (Paphlagonia).
Henrici *Czecz. in Acta Soc. Bot. Polon.* 1932, ix. 33.—As. Min. (Paphlagonia).
Krascheninnikovii *Schischk. in Trav. Mus. Bot. Acad. Sc. URSS*, xxiv. 36 (1932).—Turkestan.
Licentiana *Hand.-Mazz. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1933, lxxxii. 245.—China (Kansu; Shensi; Shansi); Mongol.
Manginii *Hort. ex Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1931, xlvi. 296, in obs.—Gallia.
myriantha *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 108 (1894), in syn.: G. paniculata.
saponarioides *Bornm. & Gauba in Fedde, Repert.* xxxix. 89 (1935).—Persia.
turkestanica *Schischk. in Trav. Mus. Bot. Acad. Sc. URSS*, xxiv. 38 (1932).—Turkestan.

GYRINOPS Gaertn. (Thymelaeac.).
caudata (*Gilg*) *Domke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 349 (1932): Brachythalamus caudatus.
Ledermannii *Domke, l. c.*—N. Guin.
podocarpa (*Gilg*) *Domke, l. c.*: Brachythalamus podocarpus.
Versteegii (*Gilg*) *Domke, l. c.*: Brachythalamus Versteegii.

GYROCARPUS Jacq. (Hernandiac.; Combretac., Gen. Pl.).
Jacquini *Roxb. Hort. Corom.* i. t. 1 (1795); *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 465 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 445 (1832).—Ind. or.

GYROSTELMA Fourn. (Asclepiadac.).
Bornmuelleri *Schlechter ex Bornm. in Rev. Sudamer. Bot.* 1935, ii. 3, an seq.—Bras. (Rio Grande do Sul).
Bornmuelleri *Schlechter ex Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxv. A. No. 7, 12 (1933).—Bras. (Rio Grande do Sul); Argent.

GYROSTEMON Desf. (Phytolaccac.).
robustus (*Diels*) *Heimerl in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 170 (1934): G. ramulosus var. robustus.
strictus (*Diels*) *Heimerl, l. c.*: G. ramulosus var. strictus.

H

HAAGEOCACTUS Backeb. in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit. 1931, xlvi. 187, in obs. *CACTACEAE.*

HAAGEOCEREUS Backeb. in Cact. & Succ. Journ. Amer. iii. 130 (1932), in obs.; et in Cactus Journ. i. 52 (1933), in obs.; Backeb. Blätter Kakteenforsch. 1934, Pt. 3, [p. 4], Pt. 6, [p. 1], in obs. *CACTACEAE.*
acranthus (*Vaupel*) *Backeb. in Desert*, v. 3 (1933); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 139; *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 207 (1935): Cereus acranthus.
auricolor *Backeb. in Cact. & Succ. Journ. Amer.* iii. 130 (1932), in obs.—Peruv.
chosicensis (*Werderm. & Backeb.*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 207 (1935): Cereus chosicensis.
decumbens (*Vaupel*) *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 6, [p. 2]; *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 207 (1935): Cereus decumbens.
humifusus (*Werderm. & Backeb.*) *Backeb. l. c.* 1935, Pt. 1, [p. 7], in obs.; *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 208: Cereus versicolor var. humifusus.
laredensis *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 208, 412 (1935).—Peruv.
matucanensis *Backeb. in Desert*, v. 3 (1933), cum fig.; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 139.—Peruv.
pacalaënsis *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 209, 412 (1935).—Peruv.
platinospinus (*Werderm. & Backeb.*) *Backeb. l. c.* 209: Cereus platinospinus.
pseudomelanostele (*Werderm. & Backeb.*) *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 6, [p. 1], in obs.; *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 209 (1935): Cereus pseudomelanostele.
rigidissimus *Backeb. in Cact. & Succ. Journ. Amer.* iii. 130 (1932), in obs.—Peruv.
versicolor (*Werderm. & Backeb.*) *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 1, [p. 7], in obs.; *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 209 (1935): Cereus versicolor.

HAARERA Hutchinson & E. A. Bruce in Kew Bull. 1932, 96. *COMPOSITAE.*
alternifolia (*O. Hoffm.*) *Hutchinson & E. A. Bruce, l. c.* 98: Bothriocline alternifolia.

HAASIA Nees (Laurac.).
Curtisii (*Gamble*) *Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, v. 152 (1914): Dehaasia Curtisii.
Poilanei *H. Liou, Laurac. Chine et Indochine*, 115 (1932).—Cambodia.

HABENARIA Willd. (Orchidac.).
albidorubra *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxv. 453 (1933).—Celebes.
angustissima *Summerhayes in Kew Bull.* 1933, 249.—Guinea Gall.
apetala *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 67.—Indo-China (Anam).
auriculiloba *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 106 (1932).—Sumatra.
bassacensis *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 67.—Indo-China (Laos; Anam).
brachylobos (*Summerhayes*) *Summerhayes in Kew Bull.* 1933, 248: Peristylus brachylobos.
brachyphyton *Schlechter ex Mansf. in Fedde, Repert. Beih.* lviii. 4 (1930): H. nana *Schlechter* (1919).
brevicalcarata *Fukuyama in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1932, xxii. 42.—Formosa.
cerea *Blatter & McCann in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxvi. 21 (1932).—Ind. or. (Bombay).
chapaënsis *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 67.—Indo-China (Tonkin).
cirrhifera *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 141.—Ins. Liukiu.
Clovisii *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 68.—Indo-China (Laos; Anam).
cylindrocalyx *Gagnep. l. c.*—Cochinch.?
Dalzielii *Summerhayes in Kew Bull.* 1932, 339.—Sierra Leone; N. Nigeria.
dankiaënsis *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 35.—Anam; Cochinch.
dianthoides *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, iv. 642, 751 (1935).—As. or. extr.
elata (*Dalz.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 280 (1931): Peristylus elatus.

HABENARIA:—
Evrardii *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 69.—Indo-China (Anam).
Geoffrayi *Gagnep. l. c.*—Cambodia.
graminifolia *Gagnep. l. c.* 70.—Indo-China.
grandifloriformis *Blatter & McCann in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxvi. 17 (1932).—Ind. or. (Bombay).
Hallbergii *Blatter & McCann, l. c.* 24.—Ind. or. (Bombay).
helicoplectrum *Summerhayes in Kew Bull.* 1931, 379.—Tanganyika Terr.
holotricha *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 70.—Indo-China (Laos ?).
hondurensis *Ames in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* iii. 26 (1934).—Honduras.
Hosokawae *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 297.—Formosa.
Jacobi *Summerhayes in Kew Bull.* 1935, 196.—Guinea Gall.
Johnsoni *Rolfe*; *Summerhayes, l. c.* 1932, 189, descr. emend.—Afr. Lusit. Or.
keskeoides *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 71.—Indo-China (Tonkin).
Kjellbergii *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxv. 452 (1933).—Celebes.
Lacei (*Rolfe*) *Gagnep. in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, vi. 623 (1934): Platanthera Lacei.
langbianensis *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 71.—Indo-China (Anam).
laotica *Gagnep. l. c.*—Indo-China (Laos).
Lelyi *Summerhayes in Kew Bull.* 1932, 188.—N. Nigeria.
limnophila *Summerhayes, l. c.* 1931, 381.—Uganda; Kenya Col.; Tanganyika Terr.
Linderi *Summerhayes, l. c.*—Uganda.
linguiformis *Summerhayes, l. c.* 1932, 340.—N. Nigeria.
longiracema *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 758.—Formosa.
longirostris *Summerhayes in Kew Bull.* 1932, 192.—N. Nigeria.
macroptera *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 72.—Cochinch.; Laos ?
Maitlandii *Summerhayes in Kew Bull.* 1932, 341.—S. Nigeria.
marquisensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 84, 179 (1931).—Ins. Marquesas.
monadenioides *Schlechter ex Mansf. in Fedde, Repert. Beih.* lviii. 4 (1930): H. Williamsii.
myriotricha *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 72.—Laos; Cochinch.
obovata *Summerhayes in Kew Bull.* 1932, 191.—Cameroons.
occidentalis (*Lindl.*) *Summerhayes, l. c.* 1933, 246: Amphorchis occidentalis.
paradiseoides *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 105 (1932).—Sumatra.
pauper *Summerhayes in Kew Bull.* 1932, 341.—S. Nigeria.
Petelotii *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 73.—Indo-China (Tonkin).
phylacocheira *Summerhayes in Kew Bull.* 1932, 190.—N. Nigeria.
pinnatipartita *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 9 (1935).—N. Guin.
Poilanei *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxziii. 73.—Indo-China (Anam).
prionocraspedon *Summerhayes in Kew Bull.* 1932, 342.—S. Nigeria.
setifolia *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 171 (1935).—Borneo.
Snowdenii *Summerhayes in Kew Bull.* 1931, 380.—Uganda.
Spencei *Blatter & McCann in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxvi. 17 (1932).—Ind. or. (Bombay).
Stuhlmannii *Kraenzl. ex Schlechter in Fedde, Repert. Beih.* xxxiii. 97 (1924), in obs., pro syn.: Piatycoryne Stuhlmannii.
subaphylla *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 74.—Cambodia.
Thorelii *Gagnep. l. c.*—Indo-China (Laos).
Tweedieae *Summerhayes in Kew Bull.* 1933, 102, in obs., 248.—Kenya Col.; Uganda.
variabilis *Blatter & McCann in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxvi. 19 (1932).—Ind. or. (Bombay).

HABENARIA:—
venezuelana *Schlechter ex Mansf. in Fedde, Repert. Beih.* lviii. t. 7, fig. 25 (1930), sine descr.—Venez.
yezoënsis *Hara in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 512.—Japon.

HABENELLA Small (Orchidac.).
odontopetala (*Reichb. f.*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 373 (1933): Habenaria odontopetala.

HABROTHAMNUS Endl. (Solanac.).
aureus *Warsz. ex Francey in Candollea*, vi. 103 (1935), in syn.: Cestrum aurantiacum var. Warszewiczii *Francey*.
Helleri *Hort. ex Francey, l. c.* 124, in syn.: Cestrum elegans.
magnificus *Hort. ex Francey, l. c.* 113, in syn.: Cestrum fasciculatum.
Schottii *Heller ex Francey, l. c.* 108, in syn.: Cestrum roseum.
villosus *Hort. ex Francey, l. c.* 119, in syn.: Cestrum Regelii.
Zephirinae *Hort. ex Francey, l. c.* 115, in syn.: Cestrum Hartwegii.

HACKELIA Opiz (Boraginac.).
andicola (*K. Krause*) *A. Brand in Engl. Pflanzenreich, Borrag.-Borraginoid.-Cryptanth.* 120 (1931): Cynoglossum andicola.
caerulescens (*Rydb.*) *A. Brand, l. c.* 130: Lappula caerulescens.
Cottonii (*Piper*) *A. Brand, l. c.* 132: Lappula Cottonii.
Cusickii (*Piper*) *A. Brand, l. c.* 131: Lappula Cusickii.
elegans *A. Brand, l. c.* 128.—U.S.A. (Oregon; Calif.).
glochidiata (*A. DC.*) *A. Brand, l. c.* 119: Echinospermum glochidiatum.
grisea (*Wooton & Standley*) *I. M. Johnston in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 194: Lappula grisea.
guatemalensis (*A. Brand*) *A. Brand in Engl. Pflanzenreich, Borrag.-Borraginoid.-Cryptanth.* 120 (1931): Lappula guatemalensis.
heliocarpa (*A. Brand*) *A. Brand, l. c.*: Lappula heliocarpa.
Hendersonii (*Piper*) *A. Brand, l. c.* 132: Lappula Hendersonii.
Jessicae (*MacGregor*) *A. Brand, l. c.*: Lappula Jessicae.
leucantha (*Greene*) *A. Brand, l. c.* 131: Lappula leucantha.
parviflora (*K. Krause*) *A. Brand, l. c.* 122: Cynoglossum parviflorum.
patens (*Nutt.*) *I. M. Johnston in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 194: Rochelia patens.
Rattanii (*A. Brand*) *A. Brand in Engl. Pflanzenreich, Borrag.-Borraginoid.-Cryptanth.* 129 (1931): Lappula Rattanii.
saxatilis (*Piper*) *A. Brand, l. c.* 133: Lappula saxatilis.
scaberrima (*Piper*) *A. Brand, l. c.* 127: Lappula scaberrima.
uncinata (*Benth.*) *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1932, 298, in obs.: Cynoglossum uncinatum.

HACKELIA Vasey ex Beal, Grasses N. Amer. ii. 438 (1896), in syn., sine descr. *GRAMINEAE.*
angustifolia *Vasey ex Beal, l. c.*, in syn.: Leptochloa polygama.

HAEMANTHUS L. (Amaryllidac.).
avasimontanus *Dinter*; *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 259 (1931), descr. ampl.—Hereroland.
otaviensis *Dinter, l. c.* 258.—Hereroland.
sacculus *Phillips in Fl. Pl. S. Afr.* 1934, xiv. t. 531.—Transvaal.
sessiliflorus *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 168, in obs., et 258 (1931).—Great Namaq.

HAEMARIA Lindl. (Orchidac.).
pauciflora *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 349; *et in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, vi. 561 (1933).—Indo-China (Anam).
Petelotii *Gagnep. l. c.*; *et l. c.* 563.—Indo-China (Tonkin).

HAEMATOSTAPHIS Hook. f. (Anacardiac.).
deliciosa (*A. Cheval.*) *Pellegr. in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 441, in obs.: Sorindeia deliciosa.

HAEMOCHARIS Salisb. (Theac.; Ternstroemiac., Gen. Pl.).
caracasana *Linden & Planch.*; *Sprague in Kew Bull.* 1926, 43.—Venez.

HAHNIA Medik. (Rosac.).
intermedia *G. Sampaio in An. Fac. Sc. Porto*, xvii. 47 (1931), in obs.—Lusitan.

HAINANIA Merrill in Lingnan Sc. Journ. xiv. 35 (1935). *TILIACEAE.*
trichosperma *Merrill, l. c.* 36.—China (Hainan).

HAKEA Schrad. (Proteac.).
Lamberti *Hort. ex News Lit. & Fashion*, ii. 346 (1825), in adnot.; *Sweet, Hort. Brit.* ed. 1, 349 (1827).—Austral.
latifolia *Hort. ex Colla, Herb. Pedem.* v. 71 (1836), in obs.—Ital.?

HAKONEASTE Maekawa in Bot. Mag., Tokyo, 1935, xlix. 598. *ORCHIDACEAE.*
Sawadana *Maekawa, l. c.*—Japon. (Hondo).

HALENIA Borkh. (Gentianac.).
adpressa *Allen in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1933, xx. 148.—Colomb.
bifida *Rusby & Allen, l. c.* 201.—Boliv.
caleoides *Allen, l. c.* 173.—Guatem.
campanulata *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 26, p. 24 (1933).—Colomb.
Conzattii *Greenm.*; *Briq. in Candollea*, iv. 318 (1931), descr. ampl.—Mexico.
elegans *Allen in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1933, xx. 203.—Colomb.
gigantea *Allen, l. c.* 192.—Colomb.
Killipii *Allen, l. c.* 187.—Peruv.
micranthella *Briq. in Candollea*, iv. 320 (1931).—Mexico.
minima *Allen in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1933, xx. 193.—Ecuador.
parallela *Allen, l. c.* 157.—Venez.
Pauana *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 26, p. 23 (1933).—Colomb.
platyphylla *Allen in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1933, xx. 173.—Guatem.
recurva (*Sm.*) *Allen, l. c.* 161: Swertia recurva.
rhyacophila *Allen, l. c.* 168.—Costa Rica.
scapiformis *Briq. in Candollea*, iv. 322 (1931).—Mexico.
Schultzei *Gilg apud Allen in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1933, xx. 151.—Colomb.
Shannonii *Briq. in Candollea*, iv. 321 (1931).—Guatem.
spatulata *Allen in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1933, xx. 183.—Peruv.
Tuerkheimii *Briq. in Candollea*, iv. 317 (1931).—Guatem.
Weberbaueri *Allen in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1933, xx. 189.—Peruv.

HALERPESTES Greene (Ranunculac.).
sarmentosus (*Adams*) *Komarov in Komarov & Klob.-Alis. Key Pl. Far East. Reg. USSR*, i. 550 (1931): Ranunculus sarmentosus.

HALESIA L. (Styracac.).
Macgregorii *Chun*; *Chun & F. Chun in Sunyatsenia*, iii. 32 (1935), descr. ampl.—China (Kwangtung).

HALIMIUM Spach emend. Willk. (Cistac.).
antiatlanticum *Maire & Wilczek in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1935, xxvi. 128.—Marocc.
lasiocalycinum (*Boiss. & Reut.*) *Gross ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 534 (1921), in obs.: Helianthemum lasiocalycinum.
×Martrei *Sennen in Le Monde des Plantes*, 1931, xxxii. 39.—Pyren.
×Pauanum *Font Quer in Cavanillesia*, iv. 94 (1931).—Marocc.
verticillatum (*Brot.*) *Sennen in Le Monde des Plantes*, 1931, xxxii. 39, in obs.: Cistus verticillatus.

HALIMOCNEMIS C. A. Mey. (Chenopodiac.).
laricifolia *Turcz. ex Drobov in Bull. Univ. As. Centr.* xvi. 210 (1927), in syn.: Salsola laricifolia.

HALIMODENDRON Fisch. ex DC. (Legumin.).
Halodendron (*L.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 215 (1894): Robinia Halodendron.

HALOPHILA Thou. (Hydrocharitac.).
Balfouri *Solereder in Beih. Bot. Centralbl.* xxx. I. 47 (1913), in obs.—Ins. Rodriguez.

HALORAGIS J. R. & G. Forst. (Haloragac.).
chinensis (*Lour.*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 39, in obs., 290 (1935): Gaura chinensis.
isomera *R. N. Parker in Fedde, Repert.* xxix. 104 (1931).—Ind. or. (Assam); Burma (Tenasserim).
Stokesii *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 205 (1935).—Polynes. (Ins. Rapa).

HALOXANTHIUM Ulbr. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, xvi c. 521 (1934). *CHENOPODIACEAE.*
fissivalve (*F. Muell.*) *Ulbr. l. c.*: Atriplex fissivalvis.
quadrivalvatum (*Diels*) *Ulbr. l. c.*: Atriplex quadrivalvata.

HALOXYLON Bunge (Chenopodiac.).
aphyllum (*Minkw.*) *Iljin in Journ. Bot. URSS*, xix. 171 (1934): Arthrophytum Ammodendron var. aphyllum.
leptocladum (*Popov ex Iljin*) *Korovin in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 29, 22 (1935): Arthrophytum leptocladum.
wakhanicum (*Paulsen*) *Korovin, l. c.* 23: Anabasis wakhanica.

HAMAMELIS L. (Hamamelidac.).
bitchuensis *Makino in Journ. Jap. Bot.* i. 7 (1916).—Japon.
communis *Barton, Fl. Virg.* 64 (1812); cf. *Pennell in Bartonia*, 1925–6, No. 9, 28 (1926).—U.S.A. (Virginia).

HAMATOCACTUS Britton & Rose (Cactac.).
hamatacanthus (*Mühlpf.*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 353 (1935): Echinocactus hamatacanthus.

HAMELIA Jacq. (Rubiac.).
intermedia *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 46 (1932).—Haiti.

HAMILTONIA Roxb. Hort. Beng. 15 (1814), nomen; Fl. Ind., ed. Carey & Wall., ii. 223 (1824); Fl. Ind., ed. Carey, i. 554 (1832). *RUBIACEAE.*
pilosa *Roxb. l. c.* 85, nomen; *et l. c.* 226; *et l. c.* 555.—Ins. Molucc.
suaveolens (*Roxb.*) *Roxb. l. c.* 15, nomen; *et l. c.* 223; *et l. c.* 554: Spermadictyon suaveolens.

HAMPEA Schlecht. (Bombacac.; Malvac., Gen. Pl.).
euryphylla *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 135 (1932).—Brit. Honduras.

HANDELIODENDRON Rehder in Journ. Arn. Arb. 1935, xvi. 65. *SAPINDACEAE.*
Bodinieri (*Léveillé*) *Rehder, l. c.* 66: Sideroxylon Bodinieri.

HANGUANA Blume (Flagellariac.).
aquatica *Kanehira in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 8.—Ins. Palau.

HANNONIA Braun-Blanquet & Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, 1931, xxii. 104. *AMARYLLIDACEAE.*
hesperidum *Braun-Blanquet & Maire, l. c.*; *et l. c.* 1933, xxiv. 229.—Marocc.

HAPLOCLATHRA Benth. (Guttif.; Ternstroemiac., Gen. Pl.).
grandiflora *Asplund in Svensk Bot. Tidskr.* 1932, xxvi. 191.—Bras. (Amaz.).

HAPLOCOELUM Radlk. (Sapindac.).
alatum *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 883 (1932).—Madag.
Dekindtianum (*Engl.*) *Radlk. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.*, Nachtr. III. 204 (1907): Pistaciopsis Dekindtiana.
foliolosum (*Hiern*) *Bullock in Kew Bull.* 1931, 356: Balsamea foliolosa.
gallaënse (*Engl.*) *Radlk. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.*, Nachtr. III. 204 (1907): Pistaciopsis gallaënsis.
mombasense *Bullock in Kew Bull.* 1931, 355.—Kenya Col.
strongylocarpum *Bullock, l. c.* 356.—Kenya Col.

HAPLOLOBUS H. J. Lam in Ann. Jard. Bot. Buitenz. xlii. 25 (1931), in adnot. *BURSERACEAE.*
acuminatus (*K. Schum.*) *H. J. Lam, l. c.* 51; *et l. c.* xlii. 207 (1932): Santiria acuminata.
anisander (*Lauterb.*) *H. J. Lam, l. c.* xlii. 207 (1932): Santiria anisandra.
borneënsis *H. J. Lam, l. c.* 218.—Borneo.
floribundus (*K. Schum.*) *H. J. Lam, l. c.* 207: Santiria floribunda.
furfuraceus (*Lauterb.*) *H. J. Lam, l. c.*: Canarium furfuraceum.
Ledermannii (*Lauterb.*) *H. J. Lam, l. c.*: Santiria Ledermannii.
leeifolius (*Lauterb.*) *H. J. Lam, l. c.* 208: Santiria leeifolia.
maluensis (*Lauterb.*) *H. J. Lam, l. c.*: Santiria maluensis.
moluccanus *H. J. Lam, l. c.* xlii. 50 (1931), in obs.; *et l. c.* xlii. 207 (1932).—Celebes; Ins. Molucc. (Morotai; Halmahera).
nubigena (*Lauterb.*) *H. J. Lam, l. c.* xlii. 208 (1932): Santiria nubigena.
pachypodus (*Lauterb.*) *H. J. Lam, l. c.* 171, 207: Canarium pachypodum.
sepikensis (*Lauterb.*) *H. J. Lam, l. c.* 208: Santiria sepikensis.

HAPLOPAPPUS Endl. (Compos.).
[Vide APLOPAPPUS.]

HAPLOPETALON A. Gray (Rhizophorac.).
Parksii *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 91, 21 (1932).—Ins. Viti.

HAPLOPHYLLUM Reichb. (Rutac.).
[Vide APLOPHYLLUM.]

HAPLOSESELI H. Wolff & Hand.-Mazz. in Hand.-Mazz. Symb. Sin. Pt. VII. 721 (1933). *UMBELLIFERAE.*
alepidioides *H. Wolff & Hand.-Mazz. l. c.* 722.—China (Szechuan).

HAPLOSTACHYS Hillebr. (Labiat.).
Bryanii *Sherff in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 698.—Ins. Sandvic.
linearifolia (*Drake*) *Sherff in Bot. Gaz.* xcvi. 136 (1934): Phyllostegia linearifolia.

HARIOTA DC. (Cactac.).
cylindrica (*Britton & Rose*) *A. Berger, Kakteen*, 96 (1929), in obs.: Hatiora cylindrica.

HARLEYA Blake in Journ. Wash. Acad. Sc. 1932, xxii. 379. *COMPOSITAE.*
oxylepis (*Benth.*) *Blake, l. c.* 381: Oliganthes oxylepis.

HARONGA Thou. (Guttif.; Hypericac., Gen. Pl.).
ovata *Thou. Hist. Veg. Isles Austr. Afr.* ed. 2, t. 25 (1805); *Hiern in Journ. Bot.* 1900, xxxviii. 493: Harungana paniculata.

HARPULLIA Roxb. Hort. Beng. 86 (1814), nomen; Fl. Ind., ed. Carey & Wall., ii. 441 (1824); Fl. Ind., ed. Carey, i. 645 (1832). *SAPINDACEAE.*
cupanioides *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 442; *et l. c.*—Ind. or.
sphaeroloba *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 1454 (1934).—Ins. Molucc. (Ceram).
tomentosa *Ridley in Kew Bull.* 1933, 192.—Borneo.

HARRISIA Britton (Cactac.).
fimbriata (*Lam.*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 309 (1935): Cactus fimbriatus.
Jusbertii *Frič in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1932, xlvii. 421, in obs.—Hab. ?

HARTIA Dunn (Theac.).
kwangtungensis *Chun in Sunyatsenia*, ii. 60 (1934).—China (Kwangtung).
micrantha *Chun, l. c.* 62.—China (Kwangtung).
yunnanensis *Hu in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 169 (1935).—China (Yunnan).

HARTMANNIA Spach (Onagrac.).
domingensis *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 28 (1931).—Santo Domingo.

HARTWEGIELLA O. E. Schulz in Fedde, Repert. xxxiii. 187 (1933). *CRUCIFERAE.*
nasturtioides *O. E. Schulz, l. c.* 188.—Mexico.

HARVEYA Hook. (Scrophulariac.).
anisodonta *C. A. Smith in Kew Bull.* 1931, 66.—Transvaal.
Schliebenii *Melch. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 683 (1932).—Tanganyika Terr.

HASSELTIA H. B. & K. (Flacourtiac.; Tiliac., Gen. Pl.).
dioica (*Benth.*) *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 55 (1934): Banara dioica.
grandiflora (*Spruce*) *Sleum. l. c.* xi. 960 (1934): Banara grandiflora.

HAVILANDIA Stapf (Boraginac.).
opaca *I. M. Johnston in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 190.—N. Guin.
robusta *I. M. Johnston, l. c.* 191.—N. Guin.

HAWORTHIA Duval (Liliac.).
Blackbeardiana *v. Poelln. in Fedde, Repert.* xxxi. 82 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
confusa *v. Poelln. l. c.* 83.—Afr. austr. (Cape Prov.).
dentata *Jacobsen, Succ. Pl.* 101 (1935).—Hab. ?
fallax *v. Poelln. in Fedde, Repert.* xxxi. 83 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
ferox *v. Poelln. l. c.* 84.—Afr. austr. (Cape Prov.).
gigas *v. Poelln. l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).
gracilidelineata *v. Poelln. l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).
incurvula *v. Poelln. l. c.* 85.—Afr. austr. (Cape Prov.).
inermis *v. Poelln. l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).
integra *v. Poelln. l. c.* xxxiii. 239 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
magnifica *v. Poelln. l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).
Maraisii *v. Poelln. l. c.* xxxviii. 194 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Maughani *v. Poelln. l. c.* xxxi. 85 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
monticola *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 78 (1932): H. angustifolia *Baker in Dyer, Fl. Cap.* vi. 347 (1896), non *Haw.*
paradoxa *v. Poelln. in Fedde, Repert.* xxxiii. 240 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Starkiana *v. Poelln. l. c.* 73.—Afr. austr. (Cape Prov.).
tenera *v. Poelln. l. c.* xxxi. 86 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
tuberculata *v. Poelln. l. c.* xxix. 219 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).

HAYATAËLLA Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 1934, xxiv. 206. *RUBIACEAE.*
michelloides *Masamune, l. c.*—Formosa.

HAYNALDIA Schur (Gramin.).
breviaristata *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 17 (1932).—Marocc.

HEBE Comm. (Scrophulariac.).
Scott-Thomsonii *Cockayne & Allan in Ann. Bot.* 1934, xlviii. 40, nomen.—N. Zel.
Vandewateri (*Wernham*) *v. Steenis in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 252 (1934): Veronica Vandewateri.

HEBEA Hedw. f. (Iridac.).
Dodii *Lewis in Fl. Pl. S. Afr.* 1934, xiv. t. 549.—Afr. austr. (Cape Prov.).

HEBECLINIUM DC. (Compos.).
sordidum *Sch.-Bip. ex Koster in Blumea*, i. 494 (1935), in syn.: Eupatorium sordidum.

HEBEPETALUM Benth. (Linac.).
calophyllum (*Planch.*) *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 735, in obs.: Roucheria calophylla.
parviflorum *Ducke, l. c.*—Bras. (Amaz.).
punctatum *Ducke, l. c.*—Bras. (Amaz.).
Schomburgkii (*Planch.*) *Ducke, l. c.*, in obs.; *et in Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro*, vi. 38 (1933): Roucheria Schomburgkii.

HEBRADENDRON R. Graham (Guttif.).
pictorium (*Roxb.*) *Royle, Man. Mat. Med.* 305 (1847): Garcinia pictorium.

HECATACTIS F. Muell. (Compos.).
Gibbsiae (*Merrill*) *v. Steenis in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 36 (1933), in adnot.: Lagenophora Gibbsiae.
radicans (*F. Muell.*) *v. Steenis, l. c.* xiii. 188 (1934): Myriactis radicans.

HECATACTIS:—
trachyphylla *Mattf. in Nova Guinea*, xiv. 518 (1932).—N. Guin.
Wollastonii (*S. Moore*) *Mattf. l. c.*: Myriactis Wollastonii.

HECATEA Thou. (Euphorbiac.).
glandulosa *J. St.-Hil. Expos. Fam. Nat.* ii. 387 (1805).—Madag.

HECATOSTEMON Blake (Flacourtiac.).
guazumifolius (*H. B. & K.*) *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 55 (1934): Laetia guazumifolia.

HECHTIA Klotzsch (Bromeliac.).
epigyna *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 531 (1935).—Mexico.
Meziana *L. B. Smith in Proc. Am. Acad.* lxx. 149 (1935).—Mexico.

HEDEOMA Pers. (Labiat.).
adscendens *Rusby in Phytologia*, i. 74 (1934).—Boliv.

HEDERA L. (Araliac.).
algerica *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 407 (1894), in syn.: H. Helix.
Pastuchovii *Woronow*; *Woronow in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 108 (1932); *et in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 216 (1933), descr.—Caucas.
scotica *A. Cheval. in Le Monde des Plantes*, 1933, xxxiv. 42, pro syn.: H. canariensis.

HEDYCARYA J. R. & G. Forst. (Monimiac.).
crassifolia *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 91, 6 (1932).—Ins. Viti.
loxocarya (*Benth.*) *Francis in Kew Bull.* 1931, 458: Mollinedia loxocarya.
neo-ebudica *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 83.—N. Hebrides.

HEDYCHIUM Koenig (Zingiberac.; Scitamin., Gen. Pl.).
angustifolium *Roxb. Hort. Beng.* 1 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 11 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 13 (1832).—Ind. or. (Bengal; Assam).
flavum *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 81; *et l. c.* 12.—Ind. or. (Assam).
gracile *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 12; *et l. c.* 14.—Ind. or. (Bengal).
Mjoebergii *Merrill in Sarawak Mus. Journ.* iii. 519 (1928).—Borneo.
speciosum *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 13 (1820).—Ind. or.
villosum *Wall. l. c.* 12.—Ind. or.

HEDYOSMUM Sw. (Chloranthac.).
Huascari *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 15 (1931).—Peruv.
Kanehirae *Macbride, l. c.* 14.—Peruv.

HEDYOTIS L. (Rubiac.).
aimiriikensis *Kanehira in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 4.—Ins. Palau.
alamaganensis *Hosokawa in Journ. Soc. Trop. Agric. Taiwan*, 1934, vi. 669, nomen; *et in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 37, descr.—Ins. Marian. (Alamagan).
asperifolia *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 148 (1931): H. Thwaitesii.
betongensis *Geddes in Kew Bull.* 1931, 216.—Siam.
chrysotricha (*Palib.*) *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* vii. 322 (1931): Anotis chrysotricha.
confertiflora (*Thwait.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 147 (1931): H. Lessertiana var. confertiflora.
cornifolia *Kanehira in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 5.—Ins. Palau.
coronaria (*Kurz*) *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 38 (1932): Scleromitrion coronarium.
corymbiformis *Geddes in Kew Bull.* 1931, 217.—Siam.
cytisoides *Craib in Kew Bull.* 1931, 217.—Siam.
Dawsoniana *Craib, l. c.* 218.—Siam.
decora *Geddes in Kew Bull.* 1931, 219.—Siam.
dendroides *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 147 (1931).—Zeylan.
densa *Craib in Kew Bull.* 1931, 219.—Siam.

HEDYOTIS:—
divaricata (*Valeton*) *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 204: Oldenlandia divaricata.
diversifolia *Geddes in Kew Bull.* 1931, 220.—Siam.
exserta *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 72 (1934).—China (Hainan).
fumata *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 148 (1931).—Zeylan.
Garrettii *Craib in Kew Bull.* 1931, 220.—Siam.
Geddesiana *Craib, l. c.* 221.—Siam.
geniculata *Roxb. Hort. Beng.* 83 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 368 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 364 (1832).—Arch. Mal.
gracilis *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 371 (1820).—Reg. Himal.
hedyotidea (*DC.*) *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 48 (1934): Spermacoce hedyotidea.
impedita *Craib in Kew Bull.* 1931, 275.—Siam.
irosinensis *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3248 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
Kerrii (*Craib*) *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 42 (1932): Oldenlandia tenelliflora var. Kerrii.
korrorensis (*Valeton*) *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 204: Oldenlandia korrorensis.
Kurzii *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 195 (1934): H. Wallichii *Kurz*.
laciniata *Kanehira in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 6.—Ins. Marian.?
lineata *Roxb. Hort. Beng.* 10 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 369 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 365 (1832).—Ind. or. (Bengal).
lutescens *Kanehira in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 4.—Ins. Palau.
lychnidifolia *Craib in Kew Bull.* 1931, 276.—Siam.
obliquinervis *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 56 (1935).—China (Hainan).
Pitardiana *Craib in Kew Bull.* 1931, 277.—Siam.
plurifurcata *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 203.—Ins. Palau.
ponapensis (*Valeton*) *Kanehira, Fl. Micrones.* 463 (1933): Oldenlandia ponapensis.
punicea *Craib in Kew Bull.* 1931, 277.—Siam.
Ridleyana *Craib, l. c.* 278.—Siam.
rosmarinifolia (*Pitard*) *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 47 (1932): Oldenlandia rosmarinifolia.
saipanensis *Hosokawa in Journ. Soc. Trop. Agric. Taiwan*, 1934, vi. 669, nomen; *et in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 37, descr.—Ins. Marian. (Saipan).
sariganensis *Hosokawa, l. c.*, nomen; *et l. c.* 36, descr.—Ins. Marian. (Sarigan).
sarmentosa *Craib in Kew Bull.* 1931, 278.—Siam.
scabridifolia *Kanehira in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 7.—Ins. Marian. (Saipan).
scandens *Roxb. Hort. Beng.* 10 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 369 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 364 (1832).—Ind. or. (Assam).
simplicissima (*Lour.*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. ii. 11, 362 (1935): Petesia simplicissima.
subacaulis *Merrill in Sarawak Mus. Journ.* iii. 553 (1928).—Borneo.
subverticillata *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 148 (1931).—Zeylan.
terminaliflora *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 326 (1935).—China (Hainan).
tetrandra (*Roxb.*) *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 49 (1932): Rondeletia tetrandra.
tomentosa (*Valeton*) *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 204: Oldenlandia tomentosa.
trichoneura *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 146 (1931).—Zeylan.
trisecta *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3249 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
ulmifolia *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 370 (1820).—Nepal.
uncinelloides (*Valeton*) *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 204: Oldenlandia uncinelloides.
yapensis *Kanehira in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 5.—Ins. Palau.

HEDYSARUM L. (Legumin.).
blepharopterum *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 560, in clavi, 567 (1933).—China (Szechuan).

HEDYSARUM:—
capitellatum *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 339 [1928].—Marocc.
chinense (*B. Fedtsch.*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 562 (1933): H. alpinum var. chinense *B. Fedtsch.*
citrinum *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 296.—S. E. Tibet.
fistulosum *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 564 (1933).—Burma; China (Yunnan).
halophilum *Bornm. & Gauba in Fedde, Repert.* xxxix. 113 (1935).—Persia.
hyrcanum *Bornm. & Gauba, l. c.* 111.—Persia.
intricatum *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 39 [1933], nomen.—Marocc.
Krylovii *Sumnev. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1931, No. 4, 2 (1932).—Turkestan.
limitaneum *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 564 (1933).—China (Yunnan).
macranthum *Freyn. & Sint. ex Bornm. & Gauba in Fedde, Repert.* xxxix. 114 (1935), pro syn.: H. halophilum.
pallens (*Rouy*) *Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* iii. 84 [1914]: H. spinosissimum var. pallens.
polybotrys *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 563 (1933).—China (Kansu).
Schischkinii *Sumnev. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1931, No. 4, 1 (1932).—Turkestan.
Smithianum *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 561 (1933).—China (Shansi).
thiochroum *Hand.-Mazz. l. c.* 563.—China (Szechuan; Yunnan).
trigonomerum *Hand.-Mazz. l. c.* 562.—China (Kansu).

HEISTERIA Jacq. (Olacac.).
amazonica *Sleum. in Fedde, Repert.* xxxviii. 206 (1935).—Bras. (Amaz.).
caloneura *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 66 (1934).—Peruv.
Chippiana *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 130 (1932).—Brit. Honduras.
Duckei *Sleum. in Fedde, Repert.* xxxviii. 207 (1935).—Bras. (Amaz.).
Huberiana *Sleum. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi b. 17 (1935): H. subsessilis *Huber*.
insculpta *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 65 (1934).—Bras.
iquitensis *Sleum. in Fedde, Repert.* xxxviii. 207 (1935).—Peruv.
Tessmanniana *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 67 (1934).—Peruv.
Uleana *Sleum. l. c.*—Bras. (Amaz.).

HELENIA Zinn, Cat. Pl. Gott. 417 (1757); cf. Sprague in Kew Bull. 1934, 218: **Helenium** L. (Compos.).

HELENIUM L. (Compos.).
decurrens (*Macbride*) *Moldenke in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1935, lxii. 230, in adnot.: Leptopoda decurrens.
denticulatum (*Nutt.*) *Moldenke in Phytologia*, i. 169 (1935): Leptopoda denticulata.
gaillardiiflorum *Hort. ex Heydenr. in Gartenflora*, 1933, lxxxii. 220, in obs.—Hort.
heterophyllum (*Juss.*) *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 6, 73 (1932): Actinea heterophylla.
luteum *Hort. ex Heydenr. in Gartenflora*, 1933, lxxxii. 220, in obs.—Hort.

HELEOCHARIS Lestib. (Cyperac.).
[Vide Eleocharis.]

HELEOCHLOA Host (Gramin.).
orientalis (*Boiss.*) *Dinsm. in Post, Fl. Syria, Palest. & Sinai*, ed. 2, ii. (*Publ. Am. Univ. Beirut*, Nat. Sc. Ser. No. 1) 717 (1933): Rhizocephalus orientalis.
turkestanica *Litw. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 743 (1934).—Bokhara.

HELIAMPHORA Benth. (Sarraceniac.).
Macdonaldae *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 367.—Venez.

HELIAMPHORA:—
Tatei *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 368.—Venez.
Tyleri *Gleason, l. c.*—Venez.

HELIANTHEMUM Mill. (Cistac.).
atlanticum (*Humbert & Maire*) *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 407 [1928]: Halimium atlanticum.
×Carolipaui *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, v. Ser. Bot. No. 7, 28 (1926).—Hispan.
×Chevallieri *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 33: H. glauco-pergamaceum.
×Cuatrecasasii *Pau in Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, v. Ser. Bot. No. 7, 28 (1926).—Hispan.
frigidulum *Cuatrec. l. c.* xii. 361 (1929).—Hispan.
glauco-pergamaceum *Battand. Contrib. Fl. Atlant.* 12 (1919).—Marocc.
×golondrinum *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xii. 359 (1929).—Hispan.
Grosii *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 414 [1928].—Marocc.
helianthemoides (*Desf.*) *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 14 [1933].—Marocc.
Hieronymi *Sennen, Pl. d'Esp.* No. 6717 (1929); *Font Quer & Rothmaler in Cavanillesia*, vi. 169 (1934), in syn.: H. Rossmaessleri var. Hieronymi.
×hortense *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 260 (1924).—Hort.
Isabelis *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 96.—Hispan.
Mauritii *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 14 [1933], in syn.: H. Sennenianum.
myrtifolium *G. Sampaio in Bol. Soc. Brot.* Ser. II. vii. 134 (1931): Cistus marifolius *L.*
Pauanum (*Font Quer*) *Font Quer, Iter Marocc.* 1930, No. 441 [1932]: Halimium Pauanum.
perplexans *Maire & Wilczek in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 279.—Marocc.
Piorum *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 96.—Hispan.
riphaeum *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 405 [1928].—Marocc.
×Rothmaleri *H. Villar in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.* 1934, xxxiv. 152.—Hispan.
Sennenianum *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1933, xxiv. 202.—Marocc.
×subhispidulum *Faure & Maire, l. c.* 1934, xxv. 294.—Alger.
×subviscosum *Faure & Maire, l. c.* 1933, xxiv. 201.—Alger.
violaceum (*Cav.*) *Pau in Cavanillesia*, iv. 151 (1931): Cistus violaceus.

HELIANTHOSTYLIS Baill. (Morac.; Urticac., Gen. Pl.).
paraënsis (*Ducke*) *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 30 (1935): Androstylanthus paraënsis.

HELIANTHUS L. (Compos.).
anomalus *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 333.—U.S.A. (Utah).
×superbus *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 264 (1924).—Hort.

HELICANTHES Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk. Sect. II. xxix. No. 6, 55 (1933). *LORANTHACEAE.*
elastica (*Desr.*) *Danser, l. c.*: Loranthus elasticus.

HELICHRYSUM Mill. corr. Pers. (Compos.).
acrobates *Bullock in Kew Bull.* 1933, 149.—Tanganyika Terr.
albidobracteatum *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 436 (1932).—Congo Belg.
andersoniense *Burtt Davy in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 107.—Transvaal.
Archeri *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 315 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Barorum *Humbert in Bull. Soc. Bot. France*, 1930, lxxvii. 683 (1931).—Madag.
brunneum *Burtt Davy in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 107.—Transvaal.
cameroonense *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 159 (1931).—Cameroons.
capitatum *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 534 (1894), in syn.: H. apiculatum.

HELICHRYSUM:—
chamaethamnos *Mattf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 416 (1932).—Tanganyika Terr.
chrysobracteatum *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 437 (1932).—Congo Belg.
compositum *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 534 (1894), in syn.: H. bracteatum.
dichotomum *Humbert in Bull. Soc. Bot. France*, 1930, lxxvii. 684 (1931).—Madag.
dimorphotrichum *Humbert, l. c.* 685.—Madag.
Doerfleri *K. H. Rechinger in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 15.—Creta.
flavum *Burtt Davy in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 108.—Transvaal.
funereum *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 65 (1935).—Kenya Col.
Geayi *Humbert*; *Humbert in Bull. Soc. Bot. France*, 1930, lxxvii. 685 (1931), descr. emend.—Madag.
Gloria-Dei *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 67 (1935).—Kenya Col.
infuscum *Burtt Davy in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 108.—Transvaal.
laevigatum *Markötter in Ann. Univ. Stellenb.* 1930, viii. Sect. A, No. 1, 46.—Orange Free State.
lanatomarginatum *Markötter, l. c.* 47.—Natal.
mandrarense *Humbert in Bull. Soc. Bot. France*, 1930, lxxvii. 687 (1931).—Madag.
monstruosum *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 534 (1894), in syn.: H. bracteatum.
montelinasanum *Schmid in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1933, lxxviii. 254.—Sardin.
pseudoferrugineum *Hochr. in Candollea*, v. 316 (1934).—Austral. (Victoria).
pseudoturbinatum *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 133 (1931): H. turbinatum *Fitzg.*, non Argyroglottis turbinata *Turcz.*
pullulum *Burtt Davy in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 109.—Griqualand East; Natal; Transvaal.
salviifolium *Humbert in Bull. Soc. Bot. France*, 1930, lxxvii. 687 (1931).—Madag.
silicicola *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 316 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
subluteum *Burtt Davy in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 109.—Transvaal.
summo-montanum *Verdoorn in Fl. Pl. S. Afr.* 1933, xiii. t. 483.—Transvaal.
syncephaloides *Humbert in Bull. Soc. Bot. France*, 1930, lxxvii. 688 (1931).—Madag.
truncatum *Burtt Davy in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 110.—Transvaal.
turbinatum (*Turcz.*) *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 134 (1931): Argyroglottis turbinata.
undulifolium *Hutchinson & B. L. Burtt in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiii. 40 (1932).—Congo Belg.
uninervium *Burtt Davy in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 110.—Transvaal.
vaginatum *Humbert in Bull. Soc. Bot. France*, 1930, lxxvii. 689 (1931).—Madag.
vellereum *R. A. Dyer in Kew Bull.* 1934, 266.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Wittei *Hutchinson & B. L. Burtt in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiii. 40 (1932).—Congo Belg.

HELICIA Lour. (Proteac.).
longipetiolata *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 217 (1935).—China (Hainan).
micronesica *Kanehira, Fl. Micrones.* 95 (1933), japonice; *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 669, latine.—Ins. Palau.

HELICONIA L. (Musac.; Scitamin., Gen. Pl.).
buccinata *Roxb. Hort. Beng.* 19 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 494 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 670 (1832).—Ins. Molucc. (Amboina).
Mutisiana *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 27, Cuadro 2 (1934), nomen; *et l. c.* No. 29, p. 5 (1935), descr.—Colomb.
osaënsis *Cufod. in Archiv. Bot., Forli*, 1933, ix. 189.—Costa Rica.
pogonantha *Cufod. l. c.* 191.—Costa Rica.
Standleyi *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 48 (1931).—Peruv.
tenebrosa *Macbride, l. c.*—Peruv.

HELICOSTYLIS Trécul (Morac.; Urticac., Gen. Pl.).
asperifolia *Ducke in Tropical Woods*, 1932, No. 31, 11.—Bras. (Amaz.).
heterotricha *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 721.—Bras. (Amaz.).
lancifolia *Ducke, l. c.*—Bras. (Amaz.).
obtusifolia *Standley in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 356.—Venez.
tomentosa (*Poepp. & Endl.*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 16 (1931): Olmedia tomentosa.

HELICTERES L. (Sterculiac.).
Martiana *Colla, Herb. Pedem.* i. 421 (1833).—Bras.

HELICTOTRICHON Bess. ex Roem. & Schult. Syst. Veg. ii. Addit. I. 526 [1827], in obs. *GRAMINEAE.*

HELIETTA Tul. (Rutac.).
barrancae *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 47 (1933–5).—Mexico.

HELINUS E. Mey. (Rhamnac.).
scandens (*Eckl. & Zeyh.*) *Radlk. ex Weberbauer in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* iii. v. 426 (1896): Willemetia scandens.
spartioides (*Engl.*) *Schinz ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 316 (1921), in obs.: Marlothia spartioides.

HELIOCEREUS Britton & Rose (Cactac.).
serratus (*Weing.*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 310 (1935): Cereus serratus.

HELIOPHILA L. (Crucif.).
adpressa *O. E. Schulz in Bot. Archiv*, xxxi. 530 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
bulbostyla *P. E. Barnes in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 287 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
capensis (*L. f.*) *C. A. Smith in Kew Bull.* 1931, 155: Peltaria capensis.
Christieana *O. E. Schulz in Bot. Archiv*, xxxi. 524, in clavi, 530 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
clavuligera *O. E. Schulz, l. c.* 531.—Afr. austr. (Cape Prov.).
collina *O. E. Schulz, l. c.* 533.—Afr. austr. (Cape Prov.).
cornigera *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 90 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
edentula *O. E. Schulz in Bot. Archiv*, xxxi. 527 (1931).—Afr. austr.-occ.
Marlothii *O. E. Schulz, l. c.* 533.—Afr. austr. (Cape Prov.).
natalensis *O. E. Schulz, l. c.* 534.—Natal.
odorans *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 169 (1931), in obs., nomen.—Afr. austr.-occ.
pallida *Schlechter ex O. E. Schulz in Bot. Archiv*, xxxi. 534 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Pearsonii *O. E. Schulz, l. c.* 528.—Afr. austr.-occ.; Cape Prov.
ramosissima *O. E. Schulz, l. c.* 535.—Afr. austr. (Cape Prov.).
remotiflora *O. E. Schulz, l. c.* 536.—Afr. austr. (Griqualand West).
rostrata *C. Presl*; *O. E. Schulz, l. c.*, descr. ampl.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Smithii *O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 227 (1931).—Orange Free State.
torulosa *O. E. Schulz in Bot. Archiv*, xxxi. 537 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).

HELIOSTEMMA R. E. Woodson in Am. Journ. Bot. 1935, xxii. 689. *ASCLEPIADACEAE.*
molestum *R. E. Woodson, l. c.* 690.—Mexico.

HELIOTROPIUM L. (Boraginac.).
antiatlanticum *Emberger ex Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1932, xxiii. 200.—Marocc.
brevifolium *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 2 (1824).—Nepal.
Chiatellinii *Chiov. Fl. Somala*, II. 321 (1932).—Somal. Ital.
cornutum *I. M. Johnston in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcii. 90 (1930).—Ind. or. (Mysore).
Gorinii *Chiov. Fl. Somala*, II. 317 (1932).—Somal. Ital.
graminifolium *Chiov. l. c.* 319.—Somal. Ital.
littorale *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 226 (1835).—Bras.
longespicatum *Mart. ex Colla, l. c.* 227.—Bras.

HELIOTROPIUM:—
madagascariense (*Vatke*) *I. M. Johnston in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcii. 91 (1930): Evolvulus madagascariensis.
malodorum *Bremek. & Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xvi. 430 (1935).—Bechuanaland Protect.
Nuttallii *House in Bull. N. Y. State Mus.* 1920, Nos. 233–4, 61 (1921): Lithospermum tenellum *Nutt.*
paniculatum *Roxb. Hort. Beng.* 13 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 2 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 455 (1832).—Ind. or. (Bengal).
polyanthiodorum *Colla, Herb. Pedem.* iv. 225 (1835).—Armen.
pseudolongiflorum *Chiov. Fl. Somala*, II. 315 (1932).—Somal. Ital.
pusillum *Colla, Herb. Pedem.* iv. 227 (1835).—Bras.
riparium *Mart. ex Colla, l. c.* 226.—Bras.
Scorpiurus *Mart. ex Colla, l. c.*—Bras.
Scotteae *Rendle in Journ. Bot.* 1932, lxx. 161.—Kenya Col.
Sennii *Chiov. Fl. Somala*, II. 315 (1932).—Somal. Ital.

HELIPTERUM DC. (Compos.).
flavum *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 316 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Loganianum *Compton, l. c.* 317.—Afr. austr. (Cape Prov.).

HELIXANTHERA Lour. (Loranthac.).
alata (*Van Tiegh.*) *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 370 (1931): Coleobotrys alata.
apodanthes *Danser, l. c.* 371.—Penins. Mal.
carinata *Danser, l. c.* 373.—Sumatra.
Cleghornii (*Beddome*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 56 (1933): Loranthus Cleghornii.
combretoides (*Van Tiegh.*) *Danser, l. c.*: Sycophila combretoides.
crassipetala (*King*) *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 376 (1931): Loranthus crassipetalus.
cylindrica (*Jack ex Roxb.*) *Danser, l. c.* 377: Loranthus cylindricus.
dura *Danser in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 243.—Borneo.
garciana (*Engl.*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 57 (1933): Loranthus garcianus.
huillensis (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus huillensis.
ikelembensis (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus ikelembensis.
Kirkii (*Oliv.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Kirkii.
Mannii (*Oliv.*) *Danser, l. c.* 58: Loranthus Mannii.
Maxwelliana (*Gibbs*) *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 380 (1931): Loranthus Maxwelliana.
messinensis (*N. E. Brown*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 58 (1933): Loranthus messinensis.
parviflora *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 384 (1931).—Borneo.
patentiflora (*Engl. & K. Krause*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 58 (1933): Loranthus patentiflorus.
rosacea (*Engl.*) *Danser, l. c.* 59: Loranthus rosaceus.
rubristaminea (*Engl. & K. Krause*) *Danser, l. c.*: Loranthus rubrostamineus.
somalensis (*Chiov.*) *Danser, l. c.*: Loranthus somalensis.
spicata *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 389 (1931).—Borneo.
subcylindrica (*Sprague*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 59 (1933): Loranthus subcylindricus.
sublilacina (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus sublilacinus.
sumatrana *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 389 (1931).—Sumatra.
ternata (*Van Tiegh.*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 60 (1933): Sycophila ternata.
Thomsonii (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus Thomsonii.
Wildemanii (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus Wildemanii.

HELIXANTHERA:—
Woodii (*Engl. & K. Krause*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 60 (1933): Loranthus Woodii.

HELLEBORINE Mill. (Orchidac.).
Schulzei (*P. Fourn.*) *P. M. Hall in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1931, ix. 725 (1932): Epipactis Schulzei.

HELLEBORUS L. (Ranunculac.).
biflorus *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 25 (1894), in syn.: H. olympicus.
× hybridus *Hort. ex Vilmorin, l. c.* 27.—Hab.?

HELMHOLTZIA F. Muell. (Philydrac.).
novoguineënsis (*K. Krause*) *Skottsb. in Engl. Jahrb.* lxv. 260 (1932), cum descr.: Astelia novoguineënsis.

HELMINTHOTHECA Zinn, Cat. Pl. Gott. 430 (1757); cf. Sprague in Kew Bull. 1934, 218: **Helminthia** Juss. (Compos.).

HELMONTIA Cogn. (Cucurbitac.).
cardiophylla *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 772 (1933).—Bras. (Pará).

HEMARTHRIA R. Br. (Gramin.).
altissima (*Poir.*) *Stapf & C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 109: Rottboellia altissima.
humilis *Keng in Sunyatsenia*, i. 128 (1933).—China (Kwangtung).
japonica (*Hackel*) *Roshev. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 13 (1934): Rottboellia compressa var. japonica.

HEMEROCALLIS L. (Liliac.).
coreana *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 123.—Corea; Manchur.; Japon.
exaltata *Stout in Addisonia*, 1934, xviii. 37.—Japon. (Ins. Tobi Shima).
× hybrida *Hort. ex Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 270 (1924).—Hort.
× ochroleuca *Hort. ex Bergmans, l. c.* 271.—Hort.
pedicellata *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 117.—Sakhalin.
sulphurea *Nakai, l. c.* 121.—Hab.?

HEMICARPHA Nees & Arn. (Cyperac.).
intermedia *Piper in Piper & Beattie, Fl. Palouse Reg.* 36 (1901).—U.S.A. (N. W. States).

HEMIGENIA R. Br. (Labiat.).
Dielsii (*Hemsl.*) *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 114 (1931): Microcorys Dielsii.

HEMIGRAPHIS Nees (Acanthac.).
Okamotoi *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 248.—Ins. Liukiu.
pacifica *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 127.—Ins. Palau.
palauana *Hosokawa, l. c.*—Ins. Palau.

HEMIGYMNIA Stapf (Gramin.).
canaliculata (*Nees*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 324 (1931): Panicum canaliculatum.
javanica (*Poir.*) *Alston, l. c.* 323: Urochloa javanica.

HEMIPILIA Lindl. (Orchidac.).
crassicalcarata *Chien in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., vi. 80 (1931).—China (Szechuan).

HEMISTEMMA (sphalm. Hemistema) DC. in Thou. Hist. Veg. Isles Austr. Afr. ed. 2, t. 30 (1805); Juss. ex Thou. Gen. Nov. Madag. 18 (1806). *DILLENIACEAE.*
Aubertii *DC. in Thou. Hist. Veg. Isles Austr. Afr.* ed. 2, t. 30 (1805); *DC. Syst.* i. 413 (1818).—Madag.

HEMIZONIA DC. (Compos.).
Halliana *Keck in Madroña*, iii. 12 (1935).—U.S.A. (Calif.).
martirensis *Keck, l. c.*—Calif. infer.
mohavensis *Keck, l. c.* 9.—U.S.A. (Calif.).
obconica *Clausen & Keck, l. c.* 7.—U.S.A. (Calif.).
pallida *Keck, l. c.* 8.—U.S.A. (Calif.).
perennis (*Greene*) *Keck, l. c.* 15: Centromadia perennis.
vernalis *Keck, l. c.* 7.—U.S.A. (Calif.).

HEMIZYGIA Briq. (Labiat.).
albiflora (*N. E. Brown*) *Ashby in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 316, in clavi, 348: Orthosiphon albiflorus.
canescens (*Gürke*) *Ashby, l. c.* 318, in clavi, 354: Orthosiphon canescens.
Chevalieri *Briq. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 281 (1917).—Afr. trop.
Elliottii (*Baker*) *Ashby in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 316, in clavi, 345: Orthosiphon Elliottii.
Gerrardi (*N. E. Brown*) *Ashby, l. c.*: Orthosiphon Gerrardi.
humilis (*N. E. Brown*) *Ashby, l. c.* 317, in clavi, 348: Orthosiphon humilis.
latidens (*N. E. Brown*) *Ashby, l. c.* 316, in clavi, 348: Orthosiphon latidens.
Laurentii (*De Wild.*) *Ashby, l. c.* 317, in clavi, 350: Orthosiphon Laurentii.
Mossiana (*Good*) *Ashby, l. c.* 318, in clavi, 356: Orthosiphon Mossianus.
Obermeyerae *Ashby, l. c.* 315, in clavi, 343.—Transvaal.
ocimoides (*A. Cheval.*) *Briq. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 281 (1917), in obs.: Bouetia ocimoides.
persimilis (*N. E. Brown*) *Ashby in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 317, in clavi, 349: Orthosiphon persimilis.
petiolata *Ashby, l. c.* 317, in clavi, 355.—Transvaal.
petrensis (*Hiern*) *Ashby, l. c.* 318, in clavi, 353: Orthosiphon petrensis.
pretoriae (*Gürke*) *Ashby, l. c.* 318, in clavi, 356: Orthosiphon pretoriae.
Rehmannii (*Gürke*) *Ashby, l. c.* 316, in clavi, 347: Orthosiphon Rehmannii.
rugosifolia *Ashby, l. c.* 315, in clavi, 344.—Transvaal.
stenophylla (*Gürke*) *Ashby, l. c.* 316, in clavi, 347: Orthosiphon stenophyllus.
subvelutina (*Gürke*) *Ashby, l. c.* 316, in clavi, 346: Orthosiphon subvelutinus.
Thorncroftii (*N. E. Brown*) *Ashby, l. c.* 317, in clavi, 349: Orthosiphon Thorncroftii.
transvaalensis (*Schlechter*) *Ashby, l. c.*: Orthosiphon transvaalensis.
Welwitschii (*Rolfe*) *Ashby, l. c.* 318, in clavi, 350: Orthosiphon Welwitschii.

HENRIETTELLA Naud. (Melastomatac.).
caudata *Gleason in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1935, xxxii. 210.—Guiana Bat.
costaricensis *Kraenzl. in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 158.—Costa Rica.
cuneata (*Standley*) *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 75, in obs.: Maieta cuneata.
fissanthera *Gleason in Phytologia*, i. 35 (1933).—Colomb.
Lawrancei *Gleason, l. c.* 31.—Colomb.
loretensis *Gleason, l. c.* 46.—Peruv.
micrantha *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 414.—Venez.
reflexa *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 26 (1931).—Santo Domingo.
sylvestris *Gleason in Phytologia*, i. 108 (1934).—Bras. (Amaz.).

HENRIQUEZIA Spruce (Rubiac.).
aturensis *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 368 (1931).—Venez.
macrophylla *Ducke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 475 (1932).—Bras. (Amaz.).

HEPPIELLA Regel (Gesneriac.).
verticillata (*Cav.*) *Cuatrec. in An. Univ. Madrid*, iv. Fasc. 2, 259 (1935): Gesneria verticillata.

HEPTAPLEURUM Gaertn. (Araliac.).
nodosum *Blume ex F. M. Muller in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 163, in syn.: Schefflera nodosa.
pulchrum (*Decne. & Planch.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 408 (1894), in obs.: Paratropia pulchra.

HEPTASETA Koidz. in Bot. Mag., Tokyo, 1933, xlvii. 146, japonice, in syn.: **Senisetum** Honda (Gramin.).
japonica *Koidz. l. c.*, japonice, in syn.: Senisetum Hideoi.

HERACLEUM L. (Umbellif.).
aconitifolium *Woronow in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 220 (1933).—Caucas.

HERACLEUM:—
algeriense *Coss. ex Battand. Fl. Algér.* Suppl. Phanérog. 49 (1910).—Alger.
elgonense (*H. Wolff*) *Bullock in Kew Bull.* 1932, 496: Malabaila elgonensis.
Forrestii *H. Wolff in Fedde, Repert.* xxxiii. 75 (1933).—China (Yunnan).
Henryi *H. Wolff, l. c.* 76.—China (Yunnan).
Kingdoni *H. Wolff, l. c.*—China (Yunnan).
Lallemantii *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 400 (1894), in syn.: H. Lehmannianum.
likiangense *H. Wolff in Fedde, Repert.* xxxiii. 78 (1933).—China (Yunnan).
oreocharis *H. Wolff, l. c.* 77.—China (Yunnan).
paphlagonicum *Czecz. in Acta Soc. Bot. Polon.* 1932, ix. 38.—As. Min. (Paphlagonia).
ponticum (Lipsky) *Schischk. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 185 (1932): H. cyclocarpum var. ponticum.
schansianum *Fedde ex H. Wolff in Fedde, Repert.* xxxiii. 78 (1933).—China (Shansi).
Smithii *Fedde ex H. Wolff, l. c.* 79.—China (Szechuan).
stenopteroides *Fedde ex H. Wolff, l. c.*—China (Yunnan).
Strelkovi *Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 186 (1932).—Caucas.
sumatranum *Buwalda ex v. Steenis in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 255 (1934), nomen.—Sumatra.
tiliifolium *H. Wolff in Fedde, Repert.* xxxiii. 80 (1933).—China (Kiangsi).
yungningense *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 729 (1933).—China (Yunnan).

HEREROA Dinter & Schwantes (Ficoidac.).
acuminata *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 390 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
aspera *L. Bolus, l. c.* 391.—Afr. austr. (Cape Prov.).
carinans (*Haw.*) *Dinter & Schwantes ex Jacobsen, Sukkulent* 138 (1933): Mesembryanthemum carinans.
crassa *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 363 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
gracilis *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 268 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Joubertii *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 484 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Stanfordiae *L. Bolus, l. c.* 485.—Afr. austr. (Cape Prov.).
tenuifolia *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 251 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
willowmorensis *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 323 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).

HERITIERA Ait. (Sterculiac.).
longipetiolata *Kanehira in Tropical Woods*, 1932, No. 29, 4, in obs., nomen; *et in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 487, descr.—Ins. Marian. (Tinian).

HERMANNIA L. (Sterculiac.).
gracilis (*Harv.*) *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 440 (1921), in obs.: Mahernia gracilis.
jacobeifolia (*Turcz.*) *R. A. Dyer in Kew Bull.* 1932, 154: Mahernia jacobeifolia.
lacera (*E. Mey. ex Harv.*) *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 101 (1932): Mahernia lacera.
multifida (*E. Mey.*) *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 439 (1921), in obs.: Mahernia multifida.
Pillansii *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 300 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
resedifolia (*Burch. ex DC.*) *R. A. Dyer in Kew Bull.* 1932, 155: Mahernia resedifolia.
viscida *K. Schum. in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* v. 87 (1900), sphalm.: H. viscosa *Hiern.*

HERMAS L. (Umbellif.).
intermedia *C. Norman in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 125.—Afr. austr. (Cape Prov.).

HERMINIUM L. (Orchidac.).
annamense *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 36.—Indo-China (Anam).
australe *Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 324.—Cambodia.
latifolium *Gagnep. l. c.* 325.—China (Yunnan).

HERMINIUM:—
macrophyllum (*D. Don*) *Dandy in Journ. Bot.* 1932, lxx. 328: Neottia macrophylla.
nankotaizanense *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 194.—Formosa.
pusillum *Ohwi & Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 430.—Formosa.
Tsoongii *Tang & Wang in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, ii. 134 (1934).—China (Yunnan).

HERNANDIA L. (Hernandiac.; Laurac., Gen. Pl.).
nukuhivensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 86 (1935).—Ins. Marquesas.
olivacea *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 91, 9 (1932).—Ins. Viti.

HERNIARIA L. (Caryophyllac.; Illecebrac., Gen. Pl.).
africana (*Battand.*) *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 23 [1933]: H. incana subsp. africana.
atlantica *Sennen & Mauricio, l. c.*, nomen.—Marocc.
polymorpha *G. Sampaio in Ann. Acad. Polyt. Porto*, v. 53 (1909).—Lusitan.
riphaea *Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 175 [1928], in obs.—Marocc.
Unomunoana *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 97.—Hispan.

HERPESTIS Gaertn. f. (Scrophulariac.).
macrantha *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 51 (1933–5).—Mexico.

HERPOTHAMNUS Small, Man. Southeast. Fl. 1017 (1933). *ERICACEAE.*
crassifolius (*Andr.*) *Small, l. c.*: Vaccinium crassifolium.

HERPYSMA Lindl. (Orchidac.).
bracteata (*Blume*) *J. J. Smith in Blumea*, i. 213 (1934), in obs.: Physurus bracteatus.
sumatrana *Carr in Journ. As. Soc. Mal.* xi. 69 (1933).—Sumatra.

HERRANIA Goudot (Sterculiac.).
aspera (*Triana*) *Karst. in Linnaea*, xxviii. 447 (1857); *Sprague in Kew Bull.* 1934, 395: Brotobroma asperum.

HERRERIOPSIS H. Perrier in Bull. Soc. Bot. France, 1934, lxxxi. 819 (1935). *LILIACEAE.*
elegans *H. Perrier, l. c.*—Madag.

HERSCHELIA Lindl. (Orchidac.).
lacera (*Sw.*) *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 81 (1932): Disa lacera.

HERTIA Neck. (Compos.).
maroccana (*Battand.*) *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 298: Othonnopsis maroccana.

HESIODIA Moench (Labiat.).
romana (*L.*) *G. Sampaio in An. Fac. Sc. Porto*, xvii. 50 (1931): Sideritis romana.

HESPERANTHA Ker-Gawl. (Iridac.).
Buhrii *L. Bolus in Journ. Bot.* 1931, lxix. 13.—Afr. austr. (Cape Prov.).
discolor *N. E. Brown in Kew Bull.* 1931, 451.—Afr. austr. (Cape Prov.).
flava *Lewis in S. Afr. Gard.* 1933, xxiii. 255, 266.—Afr. austr. (Cape Prov.).
linearis (*Jacq.*) *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 77 (1932): Ixia linearis.
Stanfordiae *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1931, xxi. 281, 282.—Afr. austr. (Cape Prov.).

HESPERETHUSA M. Roem. (Rutac.).
alata (*Wight & Arn.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 38 (1931): Limonia alata.

HESPERHODOS Cockerell in Nature, xc. 571 (1913), in obs. *ROSACEAE.*
minutifolia (*Engelm.*) *Hurst in Rose Annual*, 1929, 63, in obs.: Rosa minutifolia.

HESPERIS L. (Crucif.).
bicolor *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 79 (1894), in syn.: Malcolmia bicolor.

HESPEROCHIRON S. Wats. (Hydrophyllac.).
villosulus (*Greene*) *Suksdorf, Wash. Fl.* Fasc. 13, 3 (1928); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 148: Capnorea villosula.

HESPEROMANNIA A. Gray (Compos.).
Bushiana *Degener, Fl. Hawaiiensis*, Fam. 344 (1935).—Ins. Sandvic.
Swezeyi *Degener, l. c.*—Ins. Sandvic. (Oahu).

HESPEROMELES Lindl. (Rosac.).
Goudotiana (*Decne.*) *Killip in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1934, xxiv. 46: Osteomeles Goudotiana.
nitida *Killip, l. c.*—Colomb.
pachyphylla (*Pittier*) *Killip, l. c.*: Osteomeles pachyphylla.

HESSEA Herb. (Amaryllidac.).
karooica *Barker in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 32.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Mathewsii *Barker in Fl. Pl. S. Afr.* 1931, xi. t. 404.—Afr. austr. (Cape Prov.).
unguiculata *Barker in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 33.—Afr. austr. (Cape Prov.).

HETAERIA Blume (Orchidac.).
angustifolia *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 190 (1935).—Borneo.
heterosepala (*Reichb. f.*) *Summerhayes in Kew Bull.* 1934, 207: Cheirostylis heterosepala.
Mannii (*Reichb. f.*) *Benth. ex Durand & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 57 (1892): Rhamphidia Mannii.
occidentalis *Summerhayes in Kew Bull.* 1934, 206.—Gold Coast; Guinea Gall.; Nigeria.
Stammleri (*Schlechter*) *Summerhayes, l. c.* 208: Zeuxine Stammleri.
tetraptera (*Reichb. f.*) *Summerhayes, l. c.* 207: Monochilus tetrapterus.
Tokioi *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 434.—Formosa.
yakusimensis *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1931, iii. 393, in syn.: Zeuxine yakusimensis.

HETERACHNE Benth. (Gramin.).
Baileyi *C. E. Hubbard in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. sub t. 3283, p. 3 (1935).—Austral. (Queensland).
Gulliveri *Benth.*; *C. E. Hubbard, l. c.* p. 2, descr. emend.—N. Austral.; Queensland.

HETERANTHOECIA Stapf (Gramin.).
guineënsis (*Franch.*) *Robyns in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 201 (1932): Dinebra guineënsis.

HETEROCARYUM A. DC. (Boraginac.).
echinophorum (*Pall.*) *A. Brand in Engl. Pflanzenreich, Borrag.-Borraginoid.-Cryptanth.* 95 (1931): Myosotis echinophora.

HETEROCHAETA Bess. ex Roem. & Schult. Syst. Veg. ii. Addit. I. 526 [1827], in obs. *GRAMINEAE.*

HETEROLOBIUM Peter in Nachr. Ges. Wiss. Gött. Math.-phys. Kl. pp. 185–225 (1929); cf. K. Krause in Engl. Jahrb. lxiv. Literaturber. p. 9 (1931). *ARACEAE.*

HETEROMORPHA Cham. & Schlecht. (Umbellif.).
angolensis (*C. Norman*) *C. Norman in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 206: Bupleurum angolense.
Gossweileri (*C. Norman*) *C. Norman, l. c.* 1933, lxxi. Suppl. 1, 236: Annesorhiza Gossweileri.
pubescens *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxiii. 520 (1932).—Transvaal.

HETEROPAPPUS Less. (Compos.).
arenarius *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 43.—Japon. (Hondo).
chejuensis *Kitamura, l. c.* 1934, iii. 172: H. rupicola.
Koidzumianus *Kitamura, Cirsium Nov. Or.-Asiat.* 22 (1931).—Japon. (Kiushiu).
Oharai (*Nakai*) *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 44: Aster Oharai.
Oldhami (*Hemsl.*) *Kitamura, l. c.* 1932, i. 146: Aster Oldhami.
pinetorum *Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 216 (1932).—Sibir. (Marit. Prov.).
rupicola (*Vaniot & Léveillé*) *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 146: Aster rupicola.
saxomarinus *Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 217 (1932).—Sibir. (Marit. Prov.).

HETEROPAPPUS:—
sibiricus (*Komarov*) *Komarov in Komarov & Klob.-Alis. Key Pl. Far East. Reg. USSR*, ii. 1010 (1932): H. hispidus var. sibiricus.
villosus *Komarov, l. c.*—Ross. asiat. or.

HETEROPETALUM Benth. (Annonac.).
Spruceanum *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* x. 75 (1930).—Venez. ? vel Bras. bor. ?

HETEROPOGON Pers. (Gramin.).
bellariensis (*Hackel*) *C. E. C. Fischer in Gamble, Fl. Madras*, 1744 (1934): Andropogon bellariensis.

HETEROPTERIS H. B. & K. (Malpighiac.).
charruarum *Herter, Fl. Urug. Pl. Vasc.* (*Estud. Bot. Reg. Urug.* iv.) 77 (1931): H. acutifolia *Arech.*
oblongifolia *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 377.—Venez.

HETEROSMILAX Kunth (Liliac.).
chinensis *Wang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* v. 121 (1934).—China (Szechuan).
dalatensis *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 69.—Indo-China (Anam).
erythrantha *Baill. ex Gagnep. l. c.*—Indo-China (Tonkin).
paniculata *Gagnep. l. c.*—Indo-China (Tonkin).
polyandra *Gagnep. l. c.* 70.—Indo-China (Laos).
seisuiensis (*Hayata*) *Wang & Tang in Sinensia*, v. 427 (1934): Pseudosmilax seisuiensis.
septemnervia *Wang & Tang, l. c.* 428.—China (Kweichau; Kwangsi).
yunnanensis *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 70.—China (Yunnan).

HETEROSPATHE Scheff. (Palmae).
Muelleriana (*Becc.*) *Becc. in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa*, Mem., 1934, xliv. 139: Ptychandra Muelleriana.
pilosa (*Burret*) *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 328 (1935): Rhynchocarpa pilosa.
sphaerocarpa *Burret, l. c.* 326.—N. Guin.

HETEROSPERMA Cav. (Compos.).
nanum (*Nutt.*) *Sherff in Bot. Gaz.* 1931, xci. 312: Microdonta nana.

HETEROTRICHUM DC. (Melastomatac.).
porphyrotrichum *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 181 (1934).—Ecuador.

HETEROTROPA Morr. & Decne. (Aristolochiac.).
aspera (*Maekawa*) *Maekawa in Journ. Jap. Bot.* ix. 368 (1933): Asarum asperum.
Blumei (*Duch.*) *Maekawa, l. c.* 40: Asarum Blumei.
constricta (*Maekawa*) *Maekawa, l. c.* 367: Asarum constrictum.
costata *Maekawa, l. c.* 178.—Japon. (Shikoku).
crassa (*Maekawa*) *Maekawa, l. c.* 284: Asarum crassum.
curvistigma (*Maekawa*) *Maekawa, l. c.* 505: Asarum curvistigma.
dilatata *Maekawa, l. c.* 508.—Japon. (Hondo).
hexaloba (*Maekawa*) *Maekawa, l. c.* 281: Asarum hexalobum.
kiusiana (*Maekawa*) *Maekawa, l. c.* 242: Asarum kiusianum.
megacalyx *Maekawa, l. c.* 1934, x. 358, 360.—Japon. (Hondo).
melanosiphon (*Maekawa*) *Maekawa, l. c.* ix. 245 (1933): Asarum melanosiphon.
Muramatsui (*Makino*) *Maekawa, l. c.* 101: Asarum Muramatsui.
nipponica (*Maekawa*) *Maekawa, l. c.* 44, in obs.: Asarum nipponicum.
oblonga *Maekawa, l. c.* 370: Asarum minus *Maekawa*.
sakawana (*Makino*) *Maekawa, l. c.* 174: Asarum sakawanum.
satsumensis (*Maekawa*) *Maekawa, l. c.* 96: Asarum satsumense.
Savatieri (*Franch.*) *Maekawa, l. c.* 241: Asarum Savatieri.
tamaënsis (*Makino*) *Maekawa, l. c.* 97: Asarum tamaënse.

HEUCHERA L. (Saxifragac.).
Duranii *Bacigal. in Contrib. Dudley Herb. Stanford Univ.* i. 191 (1933).—U.S.A. (Calif.).

HEVEA Aubl. (Euphorbiac.).
gracilis *Ducke in Rev. Bot. Appliq.* 1931, xi. 28; *et in Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro*, vi. 52 (1933).—Bras. (Amaz.).

HEXACYRTIS Dinter in Fedde, Repert. xxx. 84 (1932). *LILIACEAE.*
Dickiana *Dinter, l. c.*—Great Namaq.

HEXADESMIA Brongn. (Orchidac.).
hondurensis *Ames in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* i. No. 6, 1 (1933).—Honduras.

HEXAGLOTTIS Vent. (Iridac.).
nana *L. Bolus in Kew Bull.* 1932, 326.—Afr. austr. (Cape Prov.).

HEXALOBUS A. DC. (Annonac.).
Mbula *Exell in Journ. Bot.* 1932, lxx. Suppl. 1, 206.—Congo Lusit.
tomentosus *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 52 (1927), in syn.: H. monopetalus.

HEXASPORA C. T. White in Contrib. Arn. Arb. No. iv. 58 (1933). *CELASTRACEAE.*
pubescens *C. T. White, l. c.*—Austral. (Queensland).

HEXISEA Lindl. (Orchidac.).
Amparoana (*Schlechter*) *Ames, F. T. Hubbard & C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* iii. 40 (1934): Costaricaea Amparoana.

HEXOPETION Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xii. 156 (1934). *PALMAE.*
mexicanum (*Liebm.*) *Burret, l. c.*: Astrocaryum mexicanum.

HIBBERTIA Andr. (Dilleniac.).
catargyrea *Guillaumin in Lecomte, Not. Syst.* v. 13 (1935).—N. Caled.
kimberleyensis *C. A. Gardner in For. Dep. Bull., W. Austral.* No. 32, 68 (1923).—W. Austral.
nana *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1933, lxxviii. Beibl. 19, 268.—N. Caled.
rupicola (*S. Moore*) *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 83 (1931): Candollea rupicola.

HIBISCUS L. (Malvac.).
anonimus *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 405 (1833).—Hab. ?
aridus *R. A. Dyer in Kew Bull.* 1933, 460.—Afr. austr. (Cape Prov.).
armatus *Roxb. ex Beatson, Tracts St. Helena*, 310 (1816); *Melliss, St. Helena*, 243 (1875), nomen.—S. Helena.
Burtt-Davyi *Dunkley in Kew Bull.* 1935, 256.—Nyasaland.
calisureus *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 142 (1894), in syn.: H. vesicarius.
comoënsis *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 265, in clavi, 267 (1928); *Hutchinson & Dalziel in Kew Bull.* 1928, 298, descr.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
×corrugatus *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 31 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
crassicalyx *J. M. Black in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1933, lvii. 154.—Austral. centr.
furcellatoides *Hochr. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 248 (1917).—Guinea Gall.
Humbertianus *Hochr. in Candollea*, v. 9 (1932).—Madag.
lonchosepalus *Hochr. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 251 (1917).—Dahomey.
longisepalus *Hochr. l. c.* 250.—Sudan. Gall.
molochinus *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 29 (1931): H. angulosus var. purpureus *Thwait.*
oculiroseus *Britton ex L. H. Bailey, Standard Cycl. Hort.* iii. 1486 (1915).—U.S.A. (N. Jersey).
Peekelii *Ulbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 494 (1935), in obs., pro syn.: Cephalohibiscus Peekelii.
Poggei *Gürke ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 400 (1921), in obs.—Angola.
praeteritus *R. A. Dyer in Fl. Pl. S. Afr.* 1931, xi. t. 436.—Transvaal.

HIBISCUS:—
primulinus *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 29 (1931): H. angulosus var. grandiflorus *Thwait.*
pseudohirtus *Hochr. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 247 (1917).—Sudan. Gall.
rivularis *Bremek. & Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xvi. 424 (1935).—Bechuanaland Protect.
serratifolius *Ulbr. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 394 (1921), in obs.—Damaraland.
superbus *C. A. Gardner in For. Dep. Bull., W. Austral.* No. 32, 64 (1923).—W. Austral.
×superbus *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 276 (1924).—Hort.

HICORIA Rafin. (Juglandac.).
austrina *Small, Man. Southeast. Fl.* 406 (1933).—U.S.A. (Florida).

HIERACIUM L. (Compos.).
×Abrezolianum *Zahn, Hierac. Alp. Marit.* 47 (1916).—Alpes Marit.
acutellum *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, 1. No. 5, 21 (1931).—Norveg.
adarnelli *Notø, l. c.* 65.—Norveg.
adenotrophum *Omang in Nyt Mag., Naturvidensk., Oslo*, lxxi. 111 (1932).—Norveg.
aequipodum *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, 1. No. 5, 58 (1931).—Norveg.
aethaloteles *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo*, lxxi. 142 (1932).—Norveg.
agastum *K. H. Rechinger & Zahn in Fedde, Repert.* xxxviii. 346 (1935).—Albania.
alapodum *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, 1. No. 5, 50 (1931).—Norveg.
almaatense *B. Fedtsch. & Nevski in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 207 (1933).—Ross. asiat. (Kasakstan).
alutifolium *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, 1. No. 5, 35 (1931).—Norveg.
amblycybe *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo*, lxxi. 112 (1932).—Norveg.
amblyglochin *Dahlst. ex Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, 1. No. 5, 86 (1931).—Norveg.
amitsokense (*Almq.*) *Dahlst. ex Omang in Skrift. Svalb. og Ishavet*, No. 55, 11 (1933): H. dovrense var. amitsokense.
amphithales *Maly & Zahn in Fedde, Repert.* xxxviii. 298 (1935).—Croatia.
amplisissimum *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 6, 9 (1934).—Suecia.
anatasiodes *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo*, lxxi. 97 (1932).—Norveg.
angustevitreum *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 6, 3 (1934).—Suecia.
angustidens *Folin, l. c.* 10.—Suecia.
anthracodes *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo*, lxxi. 132 (1932).—Norveg.
apicesignatum *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 1, 7 (1931).—Suecia.
arguteserratum *Folin, l. c.* xxvi. A. No. 6, 11 (1934).—Suecia.
aricharactum *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo*, lxxi. 107 (1932).—Norveg.
arrostocephalum *Omang in Ostenf. & Gröntv. Fl. Icel. & Faer.* 165 (1934).—Islandia.
×auriculigena *Arv.-Touv. & Belli ex Fiori, Nuov. Fl. Anal. Ital.* ii. 866 (1928).—Ital.
autonomum *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, 1. No. 5, 55 (1931).—Norveg.
baliophaes *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo*, lxxi. 114 (1932).—Norveg.
basidecurrens *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 1, 53 (1931).—Suecia.
basidenticeps *Folin, l. c.* 59.—Suecia.
basifalcatum *Folin, l. c.* 39.—Suecia.
basigriseum *Folin, l. c.* 60.—Suecia.
basilacinium *Folin, l. c.* 11.—Suecia.
basiunguiculum *Folin, l. c.* xxvi. A. No. 6, 12 (1934).—Suecia.
basivinosum *Folin, l. c.* xxiv. A. No. 1, 46 (1931).—Suecia.
Bastrerianum *Zahn, Hierac. Alp. Marit.* 340 (1916).—Alpes Marit.
bathylepioides *Dahlst. ex Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1911, xxxiv. 8, in clavi, 41 (1912–13); *et l. c.* 1927, 1. No. 5, 23 (1931).—Norveg.

HIERACIUM:—

Blauii *Schütt & Zahn in Fedde, Repert.* xxx. 237 (1932).—Albania.
bolsoyense *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo,* lxxi. 115 (1932).—Norveg.
Borzae *Nyár. & Zahn in Bul. Grăd. & Muz. Bot. Univ. Cluj,* 1933, xiii. 63 (1934).—Ruman.
brachyligulum *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 60 (1931).—Norveg.
brachystylum *Notø, l. c.* 48.—Norveg.
brasiliense *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 15, 9 (1931).—Bras. (Minas Geraes).
breazense *Nyár. in Bul. Grăd. & Muz. Bot. Univ. Cluj,* 1933, xiii. 66 (1934).—Ruman.
brevifloriferum *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 1, 57 (1931).—Suecia.
brevivestitum *Folin, l. c.* 40.—Suecia.
Bubakii (*Domin*) *Domin in Preslia,* xiii–xv. 275 (1935), in adnot.: H. vulgatum subsp. Bubakii.
canipedifrons *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 6, p. 5 (1934).—Suecia.
capillosum *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 54 (1931).—Norveg.
Cavillieri *Zahn, Hierac. Alp. Marit.* 305 (1916).—Alpes Marit.
celsum *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 27 (1931).—Norveg.
cephalodotum *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo,* lxxi. 116 (1932).—Norveg.
chlorelloides (*Zahn*) *Zahn, Hierac. Alp. Marit.* 242 (1916): H. sylvaticum subsp. chlorelloides.
cirritogenes *Zahn, l. c.* 198.—Alpes Marit.
clinocladium *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 59 (1931).—Norveg.
commenticium *Notø, l. c.* 70.—Norveg.
comotrophum *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo,* lxxi. 117 (1932).—Norveg.
consanguineum *Gremli ex Zahn, Hierac. Alp. Marit.* 357 (1916), in syn.: H. symphytaceum subsp. sarracenicum *Zahn.*
convergentipes *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 1, 18 (1931).—Suecia.
crenulentum *Folin, l. c.* 36.—Suecia.
crinosum *Omang in Ostenf. & Gröntv. Fl. Icel. & Faer.* 153 (1934).—Islandia.
crispulifolium *Arv.-Touv. ex Zahn, Hierac. Alp. Marit.* 114 (1916), in syn.: H. dentatum subsp. erigerontinum *Zahn.*
crucimontis (*Koch*) *Zahn in Engl. Pflanzenreich, Compos.-Hierac.* 76 (1921): H. predilensis subsp. crucimontis.
cryptastrum *Zahn, Hierac. Alp. Marit.* 33 (1916), hybr. ?—Alpes Marit.
curvatoides *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 79 (1931).—Norveg.
curvifrons *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 1, 33 (1931).—Suecia.
curviramum *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 62 (1931).—Norveg.
cuspididens *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 1, 37 (1931).—Suecia.
cyanoleucoides *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo,* lxxi. 134 (1932).—Norveg.
cymellum *Arv.-Touv. ex Zahn, Hierac. Alp. Marit.* 48, 50 (1916), in syn.: Hieracium spp.
Davidsonii *Omang in Ostenf. & Gröntv. Fl. Icel. & Faer.* 149 (1934).—Islandia.
decessum *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 28 (1931).—Norveg.
deflectum *Notø, l. c.* 66.—Norveg.
densedenticulatum *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 1, 49 (1931).—Suecia.
densifloccum *Folin, l. c.* 52.—Suecia.
dentidecurrens *Folin, l. c.* xxvi. A. No. 6, 2 (1934).—Suecia.
Devoldii *Omang in Skrift. Svalb. og Ishavet,* No. 55, 13 (1933).—Groenlandia.
dipteroides *Dahlst. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles,* 1933, x. 474 (1934).—Scotia.
discessum *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 37 (1931).—Norveg.
dolichocranum *Notø, l. c.* 31.—Norveg.
Dublitzkii *B. Fedtsch. & Nevski in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS,* Ser. I. Fasc. 1, 208 (1933).—Ross. asiat. centr.
Ekmanii *Zahn in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 102 (1931).—Haiti.

HIERACIUM:—

elaphrum *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo,* lxxi. 118 (1932).—Norveg.
elegantidens *Zahn, Hierac. Alp. Marit.* 316 (1916).—Alpes Marit.
ellipticifolium *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 63 (1931).—Norveg.
emmetrophyllum *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo,* lxxi. 135 (1932).—Norveg.
ereptum *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 22 (1931).—Norveg.
ernesiozum *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo,* lxxi. 108 (1932).—Norveg.
erythrostictum *Omang in Ostenf. & Gröntv. Fl. Icel. & Faer.* 167 (1934).—Islandia.
euxinum *B. Fedtsch. & Nevski in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS,* Ser. I. Fasc. 1, 210 (1933).—Ross. asiat. centr.
evolsum *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, p. 5 (1931).—Norveg.
excedulum *Notø, l. c.* 19.—Norveg.
farinulentiforme *Zahn, Hierac. Alp. Marit.* 202 (1916).—Alpes Marit.
Ferdinandi-Coburgi *J. Wagner & Zahn in Fedde, Repert.* xxxviii. 288 (1935).—Thessal.
fertilium *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 60 (1931).—Norveg.
filiare *Notø, l. c.* 34.—Norveg.
filiflorum *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 1, 28 (1931).—Suecia.
firmipilum *Folin, l. c.* 47.—Suecia.
fladvoldense *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 14 (1931).—Norveg.
flexibipes *Notø, l. c.* 18.—Norveg.
fosnaënse *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo,* lxxi. 143 (1932).—Norveg.
furcilliferum *Dahlst. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles,* 1933, x. 475 (1934).—Scotia.
fuscoviridiceps *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 1, 22 (1931).—Suecia.
Georgieffii *Zahn in Bull. Soc. Bot. Bulgar.* iv. 78 (1931).—Bulgar.
giennense *Pau in Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona,* xii. 478 (1929).—Hispan.
gjevilense *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo,* lxxi. 96 (1932).—Norveg.
glaucibifidum *Arv.-Touv. ex Zahn, Hierac. Alp. Marit.* 209 (1916), in syn.: H. caesioides subsp. prasinops *Zahn.*
goderiense *Zahn, l. c.* 232.—Alpes Marit.
× Gorfenianum *Bornm. & Zahn in Magyar Bot. Lap.* 1933, xxxii. 185.—Tirol.
groenlandicum *Arv.-Touv. Spicil.* 31 (1881); *Zahn in Engl. Pflanzenreich, Compos.-Hierac.* 839 (1921).—Groenlandia.
gusinjense *Scheffer & Zahn in Fedde, Repert.* xxxviii. 349 (1935).—Albania.
hebetatoides *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 19 (1931).—Norveg.
heliocaes *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo,* lxxi. 120 (1932).—Norveg.
heteradenum *Arv.-Touv.; Arv.-Touv. & Cadevall in Cadevall & Font Quer, Fl. Catal.* iii. 489 (1931), descr.—Hispan.
heterospermum *Schult. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 525 (1834).—Hab. ?
horridellum *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo,* lxxi. 99 (1932).—Norveg.
hraunense *Omang in Ostenf. & Gröntv. Fl. Icel. & Faer.* 152 (1934).—Islandia.
humiliceps *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 1, 17 (1931).—Suecia.
incretum *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 76 (1931).—Norveg.
incurvum *Notø, l. c.* 67.—Norveg.
innatum *Notø, l. c.* 82.—Norveg.
isolanum *Zahn, Hierac. Alp. Marit.* 313 (1916).—Alpes Marit.
isopicinum *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 41 (1931).—Norveg.
ivigtutense (*Almq.*) *Omang in Meddel. Grønland,* cvi. No. 3, 116 (1933): H. dovrense var. ivigtutense.
jaculifolium *Hanbury ex H. H. Johnston in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles,* 1933, x. 473 (1934), in obs.—Hab. ?
Johnstonii *Dahlst. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles,* 1931, ix. 731 (1932).—Ins. Orkney.

HIERACIUM:—

jucundum *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 68 (1931).—Norveg.
Kitaibelianum *Domin in Preslia,* xiii–xv. 295 (1935), pro subsp. H. racemosi.
kumbelicum *B. Fedtsch. & Nevski in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS,* Ser. I. Fasc. 1, 209 (1933).—Ross. asiat. centr.
lacistoides *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 13 (1931).—Norveg.
lacistophylloides *Dahlst. ex Notø, l. c.* 52.—Norveg.
lactucoides *Arv.-Touv. ex Zahn, Hierac. Alp. Marit.* 321 (1916), in syn.: H. viscosum subsp. lactucoides *Zahn.*
laesulum *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 51 (1931).—Norveg.
laetellum *Notø, l. c.* 65.—Norveg.
laetemarginatum *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 6, 8 (1934).—Suecia.
laetifrons *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 64 (1931).—Norveg.
laevibifidum *Arv.-Touv. ex Zahn, Hierac. Alp. Marit.* 176, 177 (1916), in syn.: Hieracium spp.
languidum *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 73 (1931).—Norveg.
latidens *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 1, 15 (1931).—Suecia.
laxifloccum *Folin, l. c.* 20.—Suecia.
laxiramum *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 34 (1931).—Norveg.
leiophyllum *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo,* lxxi. 121 (1932).—Norveg.
lembifolium *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 31 (1931).—Norveg.
lene *Notø, l. c.* 26.—Norveg.
lepidothoum *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo,* lxxi. 122 (1932).—Norveg.
leptocarenum *Dahlst. ex Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 84 (1931).—Norveg.
leptoglochin *Dahlst. ex Notø, l. c.* 25.—Norveg.
leucodetum *Omang in Ostenf. & Gröntv. Fl. Icel. & Faer.* 163 (1934).—Islandia.
limbulatum *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo,* lxxi. 100 (1932).—Norveg.
Linnaeanum *Domin in Preslia,* xiii–xv. 286 (1935), pro subsp. H. alpini.
lipotrichum *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo,* lxxi. 109 (1932).—Norveg.
lividellum *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 24 (1931), in obs.: H. alpinum f. lividum *Notø.*
lividum *Notø, l. c.,* in obs., in syn.: H. lividellum *Notø.*
loensetense *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo,* lxxi. 136 (1932).—Norveg.
luculentum *Omang, l. c.* 137.—Norveg.
Lyautei *Sennen in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona,* xv. Ser. Bot. No. 1, 23 (1931), in obs., nomen.—Hispan.
mammatidens *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 1, 34 (1931).—Suecia.
Marchesettianum *Zahn, Hierac. Alp. Marit.* 173 (1916).—Alpes Marit.; Austria; Hungar.
Marotii *Georgieff & Zahn in Bull. Soc. Bot. Bulgar.* vi. 74 (1934).—Bulgar.
mastrucatum *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 49 (1931).—Norveg.
micantiforme *Notø, l. c.* 60.—Norveg.
micantiramum *Notø, l. c.* 92.—Norveg.
Mosenii *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 15, 5 (1931).—Bras. (Minas Geraes; Paraná).
multicaulis *Baranov in Journ. Turkest. Branch Russ. Geogr. Soc.* 1924, xvii. 14 (1925), nomen.—Turkestan. (Thian Shan).
neobipes *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 83 (1931).—Norveg.
neosyllectum *Maly & Zahn in Fedde, Repert.* xxxviii. 291 (1935).—Herzegov.
nepiocratum *Omang in Meddel. Grønland,* cvi. No. 3, 120 (1933).—Groenlandia.
nigritipes *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 1, 25 (1931).—Suecia.
nigro-olivaceum *Folin, l. c.* 10.—Suecia.
nigroviridans *Folin, l. c.* xxvi. A. No. 6, p. 6 (1934).—Suecia.
nigroviridiceps *Folin, l. c.* xxiv. A. No. 1, 9 (1931).—Suecia.

HIERACIUM:—
nipholasium *Georgieff & Zahn in Bull. Soc. Bot. Bulgar.* vi. 75 (1934).—Hab. ?
niveicuspis *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 1, 45 (1931).—Suecia.
obovalifrons *Folin, l. c.* 35.—Suecia.
occidentale *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 154 (1931).—U.S.A. (Calif.).
opsianthum (*Dahlst.*) *Vachell in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1933, x. 713 (1934): H. strictum var. opsianthum.
paediscum *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 51 (1931).—Norveg.
×palenicae *K. H. Rechinger & Zahn in Fedde, Repert.* xxxi. 356 (1933).—Carpath. centr.
pampoecilum *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo*, lxxi. 101 (1932).—Norveg.
pandurellum *Arv.-Touv. ex Zahn, Hierac. Alp. Marit.* 293 (1916), in syn.: H. juranum var. acroastrum *Favre & Zahn.*
paractites *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo*, lxxi. 123 (1932).—Norveg.
paraliiforme *Dahlst. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1931, ix. 730 (1932).—Ins. Orkney.
pardalinoides *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo*, lxxi. 124 (1932).—Norveg.
parvulifrons *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 6, 13 (1934).—Suecia.
patens *Dahlst. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1933, x. 473 (1934).—Ins. Orkney.
penduloides *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 6, 15 (1934).—Suecia.
persolum *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 44 (1931).—Norveg.
pertactum *Notø, l. c.* 16.—Norveg.
pertectum *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo*, lxxi. 125 (1932).—Norveg.
pertransiens *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 75 (1931).—Norveg.
phrixomalloides *Dahlst. ex Notø, l. c.* 81.—Norveg.
phylapicinum *Notø, l. c.* 32.—Norveg.
picinellum *Notø, l. c.* 66.—Norveg.
pirinicola *Georgieff & Zahn in Bull. Soc. Bot. Bulgar.* iv. 80 (1931).—Bulgar.
×pizenze *Zahn, Hierac. Alp. Marit.* 155 (1916).—Alpes Marit.
pleioterum *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo*, lxxi. 103 (1932).—Norveg.
plicatifrons *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 1, 42 (1931).—Suecia.
polyphyllum *Dahlst. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1932, x. 24 (1933).—Ins. Orkney.
porphyritifrons *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 1, 14 (1931).—Suecia.
praeravum *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 58 (1931).—Norveg.
procerellum *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo*, lxxi. 127 (1932).—Norveg.
pronum *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 33 (1931).—Norveg.
pseudarnelli *Notø, l. c.* 65.—Norveg.
pseudocurvatifolium *Notø, l. c.* 80.—Norveg.
pseudoeriopus *Zahn in Bull. Soc. Bot. Bulgar.* iv. 86 (1931), nomen.—Hab. ?
pseudogaeutaënse *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 1, 12 (1931).—Suecia.
pseudoglischrodes *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo*, lxxi. 128 (1932).—Norveg.
pseudohapalotrichum *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, p. 6 (1931).—Norveg.
pseudomicans *Notø, l. c.* 91.—Norveg.
pseudopicinum *Dahlst. ex Notø, l. c.* 1908–9, xxxi–xxxii. 45 (1910); *et l. c.* 1927, l. No. 5, 38 (1931).—Norveg.
pseudoprasinops *Zahn, Hierac. Alp. Marit.* 213 (1916).—Alpes Marit.
pseudoringselense *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 1, 23 (1931).—Suecia.
pseudoseidense *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 10 (1931).—Norveg.
pseudotransiens *Dahlst.*; *Notø, l. c.* 75, descr.—Norveg.
pseudovatricosum *Notø, l. c.* 9.—Norveg.
psilotrichum *Arv.-Touv. & Cadevall ex Cadevall & Font Quer, Fl. Catal.* iii. 487 (1931), in syn.: H. candidum var. psilotrichum *Cadevall.*

HIERACIUM:—
pterygophyllum *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo*, lxxi. 104 (1932).—Norveg.
pulvericeps *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 1, 56 (1931).—Suecia.
pulverosiceps *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo*, lxxi. 105 (1932).—Norveg.
purpurifrons *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 20 (1931).—Norveg.
remissifolium *Notø, l. c.* 22.—Norveg.
rigorosum (*Laest. ex Lange*) *Almq. ex Omang in Skrift. Svalb. og Ishavet*, No. 55, 11 (1933): H. prenanthoides var. rigorosum.
ringselense *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 1, 16 (1931).—Suecia.
Riofrioi *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1928, No. 438 [1929].—Marocc.
runcinatifolium *Chang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 69 (1935): Crepis scaposa.
sagittaticeps *Dahlst. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1931, ix. 729 (1932).—Ins. Orkney.
samokoviense *Georgieff & Zahn in Bull. Soc. Bot. Bulgar.* v. 94 (1932).—Bulgar.
Schefferi *K. H. Rechinger & Zahn in Aschers. & Graebn. Syn. Mitteleur. Fl.* xii. II. 790 (1935); *et in Fedde, Repert.* xxxviii. 352 (1935), latine.—Albania.
Scholanderi *Omang in Skrift. Svalb. og Ishavet*, No. 55, 9 (1933).—Groenlandia.
semistellatifrons *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 1, 41 (1931).—Suecia.
setanium *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo*, lxxi. 129 (1932).—Norveg.
silboënse *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 1, 27 (1931).—Suecia.
silsetense *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo*, lxxi. 138 (1932).—Norveg.
Sinclairii *Dahlst. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1931, ix. 729 (1932).—Ins. Orkney.
siskiyouense *Peck in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1934, xlvii. 188.—U.S.A. (Oregon).
Skytteanum *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 6, 16 (1934).—Suecia.
sparsifloccum *Folin, l. c.* 7.—Suecia.
staurozum *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo*, lxxi. 130 (1932).—Norveg.
Stefanoffii *Zahn in Fedde, Repert. Beih.* xxx. II. 970 (1931).—Macedon.
Stefanssonii *Omang in Ostenf. & Gröntv. Fl. Icel. & Faer.* 151 (1934).—Islandia.
stelechodes *Omang in Skrift. Svalb. og Ishavet*, No. 46, 4 (1932).—Groenlandia.
stellatifrons *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 1, 32 (1931).—Suecia.
steneces *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo*, lxxi. 131 (1932).—Norveg.
stenolepidoides *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 1, 44 (1931).—Suecia.
stictophyllum *Dahlst. ex Riddelsdell in Journ. Bot.* 1907, xlv. Suppl., 41, nomen.—Cambria.
Strafforelloanum *Zahn, Hierac. Alp. Marit.* 285 (1916).—Alpes Marit.
strimaënse *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 6, 20 (1934).—Suecia.
subakkavarense *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 43 (1931).—Norveg.
subanomoglossum *Notø, l. c.* 45.—Norveg.
subbathycephalum *Notø, l. c.* 20.—Norveg.
subcanifrons *Notø, l. c.* 59.—Norveg.
subcuneatum *Notø, l. c.* 48.—Norveg.
subcurvatifolium *Notø, l. c.*—Norveg.
subcurvatoides *Notø, l. c.* 79.—Norveg.
subexpallescens *Dahlst. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1932, x. 23 (1933).—Ins. Orkney.
subglomeratum *Arv.-Touv. ex Zahn, Hierac. Alp. Marit.* 74 (1916), in syn.: H. Zizianum subsp. perthusiense *Zahn.*
subhapalotrichum *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, p. 6 (1931).—Norveg.
sublacistophyllum *Notø, l. c.* 61.—Norveg.
submammatidens *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 1, 30 (1931).—Suecia.
subnordlandicum *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 72 (1931).—Norveg.
subovalifrons *Notø, l. c.* 61.—Norveg.
subpamphili *Zahn, Hierac. Alp. Marit.* 116 (1916).—Alpes Marit.

HIERACIUM:—
subphalarograptum *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 6, 17 (1934).—Suecia.
subpiciniforme *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 38 (1931).—Norveg.
subpulliceps *Notø, l. c.* 53.—Norveg.
subrivoënse *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 1, 26 (1931).—Suecia.
subtilipilosum *Folin, l. c.* 29.—Suecia.
subtomentosum (*Burn. & Gremli*) *Zahn, Hierac. Alp. Marit.* 231 (1916): H. Pamphilii var. subtomentosum.
subtransiens *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 74 (1931).—Norveg.
subtumescens *Dahlst. ex Notø, l. c.* 8.—Norveg.
subulatum *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 6, 18 (1934).—Suecia.
sunndalicum *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo*, lxxi. 139 (1932).—Norveg.
Sylowi *Omang in Meddel. Grønland*, cvi. No. 3, 119 (1933).—Groenlandia.
tanytrachelium *Dahlst. ex Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 47 (1931).—Norveg.
tardum *Notø, l. c.* 71.—Norveg.
Tatewakii (*Kudo*) *Tatewaki & Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 73: Crepis Tatewakii.
tersum *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 71 (1931).—Norveg.
Thuretianum *Zahn, Hierac. Alp. Marit.* 265 (1916).—Alpes Marit.
×tinctilingua *Zahn in Engl. Pflanzenreich, Compos.-Hierac.* 1340 (1923): H. tendinum subsp. tinctum *Naeg. & Pet.*
tolimense *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 27, Cuadro 11 (1934), nomen; *et l. c.* No. 29, p. 44 (1935), descr.—Colomb.
trichoplethes *Omang in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo*, lxxi. 141 (1932).—Norveg.
Tsiangii *Chang in Sinensia*, iii. 207 (1933).—China (Kweichau).
valdeplicatum *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 1, 50 (1931).—Suecia.
×valdostanum *Zahn in Engl. Pflanzenreich, Compos.-Hierac.* 141 (1921).—Alpes.
valesiacum *Gremli ex Zahn, Hierac. Alp. Marit.* 333 (1916), in syn.: H. inuloides subsp. Vetteri *Zahn.*
vatricosiceps *Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 41 (1931).—Norveg.
viridicaniceps *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 1, 55 (1931).—Suecia.
viridilimbatum *Dahlst. ex Notø in Tromsø Mus. Årsheft.* 1927, l. No. 5, 39 (1931).—Norveg.
viridistylum *Notø, l. c.* 76.—Norveg.
vitreicuspis *Folin in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 1, 24 (1931).—Suecia.

HIEROCHLOË R. Br. (Gramin.).
jacutica *Drobov ex Komarov, Fl. URSS*, ii. 62 (1934), in syn.: H. glabra.

HIERONYMIELLA Pax (Amaryllidac.).
clidanthoides *Pax*; *Castellanos in Physis*, xi. 494 (1935), descr. emend.—Argent.

HILAIRANTHUS Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1898, xii. 357, in obs., 358. *VERBENACEAE.*
nitidus (*Jacq.*) *Van Tiegh. l. c.* 358, in obs.: Avicennia nitida.
tomentosus (*Jacq.*) *Van Tiegh. l. c.*, in obs.: Avicennia tomentosa.

HILDEBRANDTIA Vatke (Convolvulac.).
macrophylla *Dammer ex Chiov. Fl. Somala*, II. 322 (1932), in syn.: H. sepalosa.

HILLIA Jacq. (Rubiac.).
Goudotii *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 338 (1931).—Colomb.
macrophylla *Standley, l. c.* vii. 201 (1931).—Ecuador.

HINTONIA Bullock in Hook. Ic. Pl. xxxiii. t. 3295 (1935). *RUBIACEAE.*
latiflora (*Sessé & Moc. ex DC.*) *Bullock, l. c.* sub t. 3295, p. 4: Coutarea latiflora.
Lumaeana (*Baill.*) *Bullock, l. c.* p. 5: Coutarea Lumaeana.
octomera (*Hemsl.*) *Bullock, l. c.* p. 6: Coutarea octomera.

HINTONIA:—
Standleyana *Bullock in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. sub t. 3295, p. 6 (1935): Coutarea latiflora *Standley in N. Am. Fl.* xxxii. 127 (1921), non *Sessé & Moc. ex DC.*

HIPPEASTRUM Herb. (Amaryllidac.).
gladioloides (*Hieron.*) *Pax in Engl. Jahrb.* xi. 321 (1890): Habranthus gladioloides.
puniceum (*Lam.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1033 (1895): Amaryllis punicea.
unifolium (*Arech.*) *Herter, Fl. Urug. Pl. Vasc.* (*Estud. Bot. Reg. Urug.* iv.) 49 (1931): Zephyranthes unifolia.

HIPPOCRATEA L. (Hippocrateac.; Celastrac., Gen. Pl.).
africana (*Willd.*) *Loes. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 240 (1921), in obs.: Tonsella africana.
divaricata *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 473 (1833).—Bras.
hirtiuscula *Dunkley in Kew Bull.* 1934, 185.—N. Rhodesia.
Kennedyi *Hoyle in Kew Bull.* 1932, 263.—S. Nigeria.
loandensis *Exell in Journ. Bot.* 1932, lxx. Suppl. 1, 225.—Angola.
obtusifolia *Roxb. Hort. Beng.* 5 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 170 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 166 (1832).—Ind. or.
Tulasnei *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxxv. (*Hist. Nat. Pl.* v. Atlas iii.) t. 283 (1896).—Madag.
Vignei *Hoyle in Kew Bull.* 1932, 264.—Gold Coast.

HIPPOCREPIS L. (Legumin.).
biflora *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 146 [1933], nomen.—Marocc.
burgalensis *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 114.—Hispan.
toletana *Pau in Brotéria*, Sér. Bot., 1931, xxv. 142.—Hispan.

HIPPOMARATHRUM Hoffmgg. & Link (Umbellif.).
brachylobum (*Battand.*) *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 49 [1933]: H. Bocconei var. brachylobum.

HIRAEA Jacq. (Malpighiac.).
colombiana *Morton in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1933, xlvi. 88.—Colomb.
sanctae-marthae *Morton, l. c.* 87.—Colomb.
smilacina *Standley in Contrib. Arn. Arb.* No. v. 87 (1933).—Panamá (Ins. Barro Colorado).

HIRSCHFELDIA Moench (Crucif.).
littorea *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 229 [1928].—Marocc.
Paui *Sennen ex Pau in Cavanillesia*, v. 175 (1932), nomen.—Marocc.

HIRSCHTIA K. Schum. ex Schwartz in Engl. Jahrb. lxi. Beibl. 139, 41 (1927), in obs., pro syn.: **Pontederia** L. (Pontederiac.).
heterantherimorpha *K. Schum. ex Schwartz, l. c.*, in obs., pro syn.: Pontederia heterantherimorpha.

HIRTELLA L. (Rosac.).
Conrauana (*Engl.*) *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 194: Magnistipula Conrauana.
coppenamensis *Kleinh. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 180.—Guiana Bat.
cupheiflora (*Mildbr.*) *Mildbr. ex A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 195: Magnistipula cupheiflora.
Davisii *Sandwith in Kew Bull.* 1935, 125.—Guiana Brit.
Fleuryana *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 192.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
formicaria *Suesseng. in Fedde, Repert.* xxxix. 14 (1935).—Bras. (Amaz.).
glaberrima (*Engl.*) *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 195: Magnistipula glaberrima.
guyanensis (*Fritsch*) *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 377: Parinari guyanensis.
hevanda *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* ii. 289 (1834).—Bras.

HIRTELLA:—
Sapini (*De Wild.*) *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 195: Magnistipula Sapini.
Zenkeri (*Engl.*) *A. Cheval. l. c.*: Magnistipula Zenkeri.

HOFFMANNIA Sw. (Rubiac.).
Carpinterae *Standley in N. Am. Fl.* xxxii. 199 (1934): H. macrophylla *Standley*.
Dusenii *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 348 (1931).—Bras. (Paraná).
ecuatoriana *Standley, l. c.* vii. 214 (1931).—Ecuador.
rhizantha *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 90 (1935).—Brit. Honduras.
Sprucei *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 215 (1931).—Ecuador.

HOFFMANSEGGIA Cav. (Legumin.).
miranda *Sandwith in Kew Bull.* 1934, 99.—Peruv.

HOHENBERGIA Schult. f. (Bromeliac.).
Brittoniana *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcviii. 8 (1932).—Jamaica.
caruaruensis *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 780 (1933).—Bras. (Pernambuco).
caymanensis *Britton ex L. B. Smith in Proc. Am. Acad.* lxx. 150 (1935).—Ind. occ. (Ins. Cayman).
horrida *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 525 (1935).—Bras. (Pernambuco).
negrilensis *Britton ex L. B. Smith in Proc. Am. Acad.* lxx. 151 (1935).—Jamaica.
virens (*Brongn.*) *Mez in Engl. Pflanzenreich, Bromeliac.* 87 (1934): Aechmea virens.

HOLALAFIA Stapf (Apocynac.).
jasminiflora (*A. Cheval.*) *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 43 (1931), in clavi: Alafia jasminiflora.

HOLBOELLIA Wall. (Lardizabalac.; Berberidac., Gen. Pl.).
obovata (*Hemsl.*) *Chun in Sunyatsenia*, i. 233 (1934): Stauntonia obovata.

HOLCUS L. (Gramin.).
ciliatus *Roxb. Hort. Beng.* 82 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 321 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 318 (1832).—Ind. or.
grumosus *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 128 [1933], in syn.: H. lanatus var. tuberosus *Sennen & Mauricio*.
nervosus *Roxb. Hort. Beng.* 82 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 320 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 318 (1832).—Ind. or.

HOLOPOGON Komarov & Nevski in Komarov, Fl. *URSS*, iv. 620, 750 (1935). *ORCHIDACEAE.*
ussuriensis *Komarov & Nevski, l. c.* 620, 751.—As. or. extrem.

HOLOSTYLON Robyns & Lebrun (Labiat.).
Baumii (*Gürke*) *G. Taylor in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl. 2, 161, in adnot.: Plectranthus Baumii.
robustum (*Hiern*) *G. Taylor, l. c.* 161: Solenostemon robustus.
strictipes *G. Taylor, l. c.*—Angola.

HOLOTHRIX L. C. Rich. (Orchidac.).
elgonensis *Summerhayes in Kew Bull.* 1932, 507.—Afr. trop. or. (Elgon).

HOLSTIA Pax (Euphorbiac.).
sessilifolia *Pax in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 7 (1921), in obs., nomen: an H. sessiliflora *Pax*?

HOLTONIA Standley in Tropical Woods, 1932, No. 30, pp. 28, 37. *RUBIACEAE.*
myriantha (*Standley*) *Standley, l. c.*: Sickingia myriantha.

HOMALACHNE (Benth.) Kuntze in Post & Kuntze, Lexic. 285 [1903]; Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. Nachtr. III. 13 (1906). *GRAMINEAE.*
[HOLCUS sect. HOMALACHNE Benth.]

HOMALANTHUS A. Juss. (Euphorbiac.).
acuminatus (*Muell.-Arg.*) *Pax in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix c. 189 (1931), in obs.: Carumbium acuminatum.
ebracteatus *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 94.—N. Hebrides.

HOMALANTHUS:—
Stokesii *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 151 (1935).—Polynes. (Ins. Rapa).

HOMALIUM Jacq. (Flacourtiac.; Samydac., Gen. Pl.).
aneityense *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 262.—N. Hebrides.
betulifolium *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1933, lxxviii. Beibl. 19, 276.—N. Caled.
buxifolium *Däniker, l. c.*—N. Caled.
djalonis *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 165, in clavi, 166 (1927); *Hutchinson & Dalziel in Kew Bull.* 1928, 212, descr.—Guinea Gall.
dolichophyllum *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 579 (1921), in obs.—Cameroons.
eburneum *Gilg ex Engl. l. c.* 581, in obs.—Cameroons.
elegantulum *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 715 (1935).—Tanganyika Terr.
Henriquesii *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 579 (1921), in obs.—Afr. trop. occ. (S. Thomé).
Le-Ratiorum *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 695.—N. Caled.
mollissimum *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 39 (1935).—China (Hainan).
myrianthum *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 579 (1921), in obs.—Cameroons.
neurophyllum *Hoyle in Kew Bull.* 1932, 265.—Gold Coast.
paitense *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 692.—N. Caled.
pronyense *Guillaumin, l. c.* 693.—N. Caled.
rhodesicum *Dunkley in Kew Bull.* 1934, 182.—N. Rhodesia.
riparium *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 74 (1935).—Brit. Honduras.
Skirlii *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 579 (1921), in obs.—Cameroons.
stenophyllum *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 287 (1935).—China (Hainan).
tatambense *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 140 (1934).—Ins. Solomon.
tibatiense *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 579 (1921), in obs.—Cameroons.
Zenkeri *Gilg ex Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, vii. 484 (1921), in obs.—Cameroons.

HOMALOMENA Schott (Arac.).
longipes *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 152 (1934).—Sumatra.
lunduensis *Furtado in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 148 (1935): H. multinervia *Ridley* (1907).

HOMERIA Vent. (Iridac.).
albida *L. Bolus in Journ. Bot.* 1931, lxix. 258.—Afr. austr. (Cape Prov.).
bobartioides *L. Bolus, l. c.* 12.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Britteniae *L. Bolus, l. c.* 11.—Afr. austr. (Cape Prov.).
collina (*Thunb.*) *Salisb. in Trans. Hort. Soc. Lond.* i. 307 (1812): Moraea collina.
Framesii *L. Bolus in Journ. Bot.* 1931, lxix. 259.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Galpinii *L. Bolus in Fl. Pl. S. Afr.* 1931, xi. t. 417.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Herrei *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1931, xxi. 367, 369.—Little Namaq.
odorata *L. Bolus in Kew Bull.* 1932, 326.—Afr. austr. (Cape Prov.).
papillosa *L. Bolus in Journ. Bot.* 1931, lxix. 259.—Afr. austr. (Cape Prov.).
salmonea *L. Bolus, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).
spiralis *L. Bolus, l. c.* 260.—Afr. austr. (Cape Prov.).
tricolor *Lewis in S. Afr. Gard.* 1933, xxiii. 266.—Afr. austr. (Cape Prov.).

HOMOGLOSSUM Salisb. (Iridac.).
acuminatum (*N. E. Brown*) *N. E. Brown in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xx. 278 (1932): Antholyza acuminata.

HOMOGLOSSUM:—
caryophyllaceum (*Burm. f.*) *N. E. Brown in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xx. 279 (1932): Antholyza caryophyllacea.
flexicaule *N. E. Brown, l. c.*: Gladiolus watsonius *Jacq. Collect.* iii. 257 (1789); *et Jacq. Ic. Pl. Rar.* ii. t. 233 (1786–93), non *Thunb.*
Fourcadei (*L. Bolus*) *N. E. Brown, l. c.*: Antholyza Fourcadei.
Gawleri (*L. Bolus*) *N. E. Brown, l. c.* 278: Antholyza Gawleri.
gracile (*Pax*) *N. E. Brown, l. c.*: Antholyza gracilis.
Guthriei (*L. Bolus*) *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1933, xxiii. 47: Antholyza Guthriei.
Hollandii *L. Bolus, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).
Huttoni *N. E. Brown in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xx. 278 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Muirii (*L. Bolus*) *N. E. Brown, l. c.* 279: Antholyza Muirii.
Priorii (*N. E. Brown*) *N. E. Brown, l. c.*: Antholyza Priorii.
quadrangulare (*Burm. f.*) *N. E. Brown, l. c.*: Antholyza quadrangularis.
Vandermerwei (*L. Bolus*) *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1933, xxiii. 47: Antholyza Vandermerwei.
watsonioides (*Baker*) *N. E. Brown in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xx. 278 (1932): Gladiolus watsonioides.
watsonium (*Thunb.*) *N. E. Brown, l. c.*: Gladiolus watsonius.

HOMOIOCELTIS Blume (Ulmac.; Urticac., Gen. Pl.).
(sphalm. Homoceltis) japonica *Hort. ex S.C. Lee, For. Bot. China*, 417 (1935), in syn.: Aphananthe aspera.

HOMOPHOLIS C. E. Hubbard in Kew Bull. 1934, 126. *GRAMINEAE.*
Belsonii *C. E. Hubbard, l. c.* 127.—Austral. (Queensland).

HONCKENYA Willd. (Tiliac.).
polyandra (*K. Schum.*) *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 350 (1921), in obs.: Cephalonema polyandrum.

HOODIA Sweet (Asclepiadac.).
Ruschii *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 192 (1932).—Great Namaq.
Triebneri *H. Schuldt in Desert*, Oct. 1933; cf. *White & Sloane, Stapel.* 183 (1933).—Hab.?

HOODIOPSIS Luckhoff in S. Afr. Gard. 1933, xxiii. 231. *ASCLEPIADACEAE.*
Triebneri *Luckhoff, l. c.*—Great Namaq.

HOOGENIA Balls in Gard. Chron. 1934, Ser. III. xcv. 9, in obs., sphalm.: **Hulthemia** Dum. (Rosac.).
berberidifolia *Balls, l. c.*, in obs., sphalm.: Hulthemia berberifolia.

HOOKERA Salisb. (Liliac.).
minor (*S. Wats.*) *Britten ex Greene in Bull. Calif. Acad. Sc.* ii. 136 (1887): Brodiaea minor.

HOPEA Roxb. (Dipterocarpac.).
apiculata *Symington in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 277 (1935).—Penins. Mal.
auriculata *Foxworthy in Malayan Forest Records*, No. 10, 125 (1932).—Penins. Mal.
chinensis (*Merrill*) *Hand.-Mazz. in Sinensia*, ii. 131 (1932): Shorea chinensis.
ferruginea *Parijs in Fedde, Repert.* xxxiii. 243 (1933).—Sumatra.
glabrifolia *C. T. White in Proc. Roy. Soc. Queensl.* 1931, xliii. 49 (1932).—N. Guin.
Jacobi *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1932, 245.—Ind. or. (Coorg).
laevifolia *Parijs in Fedde, Repert.* xxxiii. 244 (1933).—Borneo.
laxa *Symington in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 33 (1934).—Borneo.
macrosepala *Boerl. ex Symington, l. c.* 19, in syn.: H. Sangal.
pachycarpa (*Heim*) *Symington, l. c.* 30: Pierrea pachycarpa.
paucinervis *Parijs in Fedde, Repert.* xxxiii. 243 (1933).—Sumatra.
resinosa *Symington in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 278 (1935): Balanocarpus pubescens.

HOPEA:—
semicuneata *Symington in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 24 (1934).—Penins. Mal.; Borneo.

×**HORDEOPYRUM** Simonet in Compt. Rend. 1935, cci. 1212, in obs. *GRAMINEAE.*
[Agropyron × Hordeum.]
Rouxii (*Gren. & Duval*) *Simonet, l. c.*, in obs.: Agropyron Rouxii.

HORDEUM L. (Gramin.).
Bogdani *Wilensky in Izv. Saratovsk. Op. Stan.* i. 11. 13 (1918); *et in Acta Hort. Petrop.* xl. 248 (1928).—Ross. austr.-or.
elymoides (*Rafin.*) *Schenck in Engl. Jahrb.* xl. 109 (1907), in clavi: Sitanion elymoides.
Hystrix (*L.*) *Schenck, l. c.*, in clavi: Elymus Hystrix.
lanuginosum (*Trin. ex Ledeb.*) *Schenck, l. c.*, in clavi: Elymus lanuginosus.
Lechleri (*Steud.*) *Schenck, l. c.* 108, in clavi: Elymus Lechleri.
montanense *Scribn. ex Beal, Grasses N. Amer.* ii. 644 (1896).—U.S.A. (Montana).
sibiricum (*L.*) *Schenck in Engl. Jahrb.* xl. 109 (1907), in clavi: Elymus sibiricus.
striatum (*Willd.*) *Schenck, l. c.*, in clavi: Elymus striatus.
Strobelense *Chiov. in Monogr. e Rapp. Colon.* No. 19 (*Col. Cereal. Colon. Eritrea*) 49 (1912), in obs.—Argent.
turkestanicum *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 45 (1934).—As. centr.
valdiviae (*Steud.*) *Schenck in Engl. Jahrb.* xl. 109 (1907), in clavi: Elymus valdiviae.
villosum (*Muehl. ex Willd.*) *Schenck, l. c.*, in clavi: Elymus villosus.
virginicum (*L.*) *Schenck, l. c.*, in clavi: Elymus virginicus.

HORKELIA Cham. & Schlecht. (Rosac.).
brevibracteata *Wiggins in Contrib. Dudley Herb. Stanford Univ.* i. 170 (1933).—Calif. infer.
sabulosa (*M. E. Jones*) *L. Williams in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1934, lxi. 260: Potentilla sabulosa.

HORMOCALYX Gleason in Phytologia, i. 174 (1935). *MELASTOMATACEAE.*
hirsutus *Gleason, l. c.*—Bras. (Amaz.).

HORMOGYNE A. DC. (Sapotac.).
altissima *A. Cheval. Vég. Ut. Afr. Trop. Franç.* ix. 263 (1917); *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 265 (1917).—Guinea Gall.
gabonensis *A. Cheval. l. c.* 264; *et l. c.* 266.—Gabon.
Pierrei *A. Cheval.*; *A. Cheval. l. c.* 262; *et l. c.* 265, descr.—Afr. Gall. Centr.

HORNSCHUCHIA Nees (Annonac.).
alba (*St.-Hil.*) *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* x. 137 (1931): Bocagea alba.
Duckei *R. E. Fries, l. c.* xii. 197 (1934).—Bras. (Amaz.).

HORNSTEDTIA Retz. (Zingiberac.; Scitamin., Gen. Pl.).
sulfurea *R. N. Parker in Kew Bull.* 1931, 44.—Burma.

HORSFIELDIA Willd. (Myristicac.).
Amklaal *Kanehira, Fl. Micrones.* 109 (1933), japonice; *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 670, latine.—Ins. Palau.
ampla *Markgraf in Engl. Jahrb.* lxvii. 148 (1935).—N. Guin.
bracteosa *M. R. Henderson in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 120 (1933).—Penins. Mal.
crux-melitensis *Markgraf in Engl. Jahrb.* lxvii. 148 (1935).—N. Guin.
hainanensis *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xi. 43 (1932).—China (Hainan).
Nunu *Kanehira in Tropical Woods*, 1932, No. 29, 5, in obs., nomen; *et in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 451, descr.—Ins. Carolin. (Kusai).
palauensis *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 452, 674.—Ins. Palau.
pilifera *Markgraf in Engl. Jahrb.* lxvii. 154 (1935).—N. Guin.
rostrata *Markgraf, l. c.* 152.—N. Guin.
sepikensis *Markgraf, l. c.* 147.—N. Guin.

HORTIA Vand. (Rutac.).
colombiana *Gleason in Phytologia*, i. 25 (1933).—Colomb.
regia *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 184.—Guiana Brit.
superba *Ducke in Arquiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, i. 207 (1935); *et in Tropical Woods*, 1935, No. 43, 21.—Bras. (Amaz.).

HOSTA Tratt. (Liliac.).
apoiensis *Nakai ex Miyabe & Kudo in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 315 (1932), in syn.: H. rectifolia.
erromena *Stearn apud L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, ii. 438 (1932).—Cult.
glauca (*Sieb. ex Miq.*) *Stearn in Gard. Chron.* 1931, Ser. III. xc. 27, in adnot.: Funkia glauca.
harunaënsis *Honda in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 572.—Japon.
kiyosumiensis *Maekawa in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 689.—Japon.
longissima *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 696, in syn.: H. lancifolia.
Nakaiana *Maekawa in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 687.—Corea.
ventricosa (*Salisb.*) *Stearn in Gard. Chron.* 1931, Ser. III. xc. 27, in adnot.: Bryocles ventricosa.
venusta *Maekawa in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 245.—Japon.

HOTTEA Urb. (Myrtac.).
goavensis *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 29 (1932).—Haiti.
malangensis (*Urb. & Ekman*) *Urb. l. c.* 31: Eugenia malangensis.
micrantha *Urb. & Ekman, l. c.* 30.—Haiti.

HOUMIRI Aubl. (Humiriac.).
[Vide Humiria.]

HOYA R. Br. (Asclepiadac.).
attenuata *Christoph. in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 128, 187 (1935).—Samoa.
Fungii *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 68 (1934).—China (Hainan).
lancilimba *Merrill, l. c.* xi. 54 (1932).—China (Hainan).
phyllura *Schwartz in Mitt. Inst. Bot. Hamburg*, vii. 261 (1931).—Borneo.
Tsoi *Merrill in Sunyatsenia*, ii. 16 (1934).—China (Kwangtung).
vacciniiflora *Schwartz in Mitt. Inst. Bot. Hamburg*, vii. 261 (1931).—Borneo.

HUBERIA DC. (Melastomatac.).
Nettoana *Brade in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 13 (1935).—Bras. (S. Paulo).

HUBERODENDRON Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro, ii. 59 (1935). *BOMBACACEAE.*
ingens *Ducke, l. c.* 60.—Bras. (Amaz.).
styraciflorum *Ducke, l. c.* 59.—Bras. (Amaz.).
swietenioides (*Gleason*) *Ducke, l. c.* 72: Bernouillia swietenioides.

HUEGELIA Reichb. (Umbellif.).
caerulea *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 395 (1894), in syn.: Trachymene caerulea.

HUERNIA R. Br. (Asclepiadac.).
bicampanulata *Verdoorn in Fl. Pl. S. Afr.* 1932, xii. t. 449.—Transvaal.
confusa *Phillips in Fl. Pl. S. Afr.* 1932, xii. t. 456.—Transvaal.
Nouhuysii *Verdoorn in Fl. Pl. S. Afr.* 1931, xi. t. 412.—Transvaal.
Verekeri *Stent in Kew Bull.* 1933, 145.—S. Rhodesia.
Vogtsii *Phillips in Fl. Pl. S. Afr.* 1932, xii. t. 452.—Transvaal.
zebrina *N. E. Brown in Dyer, Fl. Cap.* iv. 1. 921 (1909).—Afr. austr.

HUGERIA Small (Ericac.).
incisa *Maekawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 614.—Japon. (Hondo).
lasiostemon (*Hayata*) *Maekawa, l. c.* 617: Vaccinium japonicum var. lasiostemon.
randaiensis (*Hayata*) *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 301: Vaccinium randaiense.

HUGERIA:—
sinica (*Nakai*) *Maekawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 615: Oxycoccoides japonica var. sinica.

HUGONIA L. (Linac.).
acuminata *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 132 (1927), in syn.: H. Planchonii.
arborescens *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 513 (1935).—Tanganyika Terr.
Bussei *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 722 (1915), in obs., sphalm.: H. Busseana *Engl.*
neo-caledonica (*Vieill.*) *Vieill. ex Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 36: Penicillanthemum neo-caledonicum.
orientalis *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 722 (1915), in obs. —Afr. Lusit. Or.
papillosa *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 37.—N. Caled.
reticulata *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 722 (1915), in obs.—Cameroons.
rufopilis *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 132 (1927), in clavi.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).

HUMBERTIELLA Hochr. (Malvac.).
Henrici *Hochr. in Candollea*, v. 3 (1932).—Madag.
quararibeoides *Hochr.*; *Hochr. l. c.* 2, descr. ampl. —Madag.

HUMBERTOCHLOA A. Camus & Stapf in Bull. Soc. Bot. France, 1934, lxxxi. 467. *GRAMINEAE.*
bambusiuscula *A. Camus & Stapf, l. c.* 470.—Madag.

HUMIRIA Aubl. (Humiriac.).
cassiquiari *Suesseng. & Bergdolt in Fedde, Repert.* xxxix. 16 (1935).—Venez.
savannarum *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 374.—Venez.

HUMULUS L. (Morac.; Urticac., Gen. Pl.).
scandens (*Lour.*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. ii. 138 (1935): Antidesma scandens.

HUNTERIA Roxb. Hort. Beng. 84 (1814), nomen; Fl. Ind., ed. Carey & Wall., ii. 531 (1824); Fl. Ind., ed. Carey, i. 695 (1832). *APOCYNACEAE.*
corymbosa *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.*; *et l. c.*—Ind. or. (Bengal); Penins. Mal.

HUODENDRON Rehder in Journ. Arn. Arb. 1935, xvi. 341. *STYRACACEAE.*
biaristatum (*W. W. Smith*) *Rehder, l. c.* 344: Styrax biaristatus.
Chunianum *Hu in Sunyatsenia*, iii. 36 (1935).—China (Yunnan).
tibeticum (*Anthony*) *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 342: Styrax tibeticus.

HUTCHINSIA R. Br. (Crucif.).
cenisia (*Rouy & Fouc.*) *Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* i. 101 [1912]: Thlaspi cenisium.

HUTCHINSIELLA O. E. Schulz in Engl. Jahrb. lxvi. 92 (1933). *CRUCIFERAE.*
perpusilla (*Hemsl.*) *O. E. Schulz, l. c.*, in obs.: Hutchinsia perpusilla.

HUTCHINSONIA M. E. Jones, Contrib. West. Bot. No. 18, 85 (1933–5). *COMPOSITAE.*
hyalina *M. E. Jones, l. c.*—U.S.A. (Arizona).

HUTCHINSONIA Robyns (Rubiac.).
bugoyensis (*K. Krause*) *Bullock in Kew Bull.* 1932, 389: Plectronia bugoyensis.
xanthotricha (*K. Schum.*) *Bullock, l. c.*: Plectronia xanthotricha.

HUTERA Porta; Gonz.-Albo in Cavanillesia, vi. 175 (1934), descr. emend. *CRUCIFERAE.*
leptocarpa *Gonz.-Albo, l. c.* 176.—Hispan.

HYACINTHELLA Schur (Liliac.).
azurea (*Fenzl*) *Chouard in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 178: Muscari azureum.
dalmatica (*Baker*) *Chouard in Ann. Sc. Nat.* Sér. X. xiii. 295 (1931), in obs.; *et in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 178, in obs.: Hyacinthus dalmaticus.

HYACINTHELLA:—
Heldreichii (*Boiss.*) *Chouard in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 178: Bellevalia Heldreichii.
hispida (*Baker*) *Chouard, l. c.*: Hyacinthus hispidus.
kopet-daghi (*Czern.*) *Chouard, l. c.*: Hyacinthus kopet-daghi.
lineata (*Steud.*) *Chouard, l. c.*: Hyacinthus lineatus.
micrantha (*Baker*) *Chouard, l. c.*: Hyacinthus micranthus.
nervosa (*Boiss.*) *Chouard, l. c.*: Bellevalia nervosa.
paradoxa (*Fisch. & Mey.*) *Chouard, l. c.*: Hyacinthus paradoxus.
persica (*Boiss. & Buhse*) *Chouard, l. c.*: Hyacinthus persicus.
pseudo-Muscari (*Baker*) *Chouard, l. c.*: Hyacinthus pseudo-Muscari.
pycnantha (*Baker*) *Chouard, l. c.*: Hyacinthus pycnanthus.
transcaspica (*Litw.*) *Chouard, l. c.*: Hyacinthus transcaspicus.

HYACINTHOIDES Medik. (Liliac.).
non-scripta (*L.*) *Chouard in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 625, in obs.: Hyacinthus non-scriptus.

HYACINTHUS L. (Liliac.).
longistylus *Misczenko in Acta Inst. Agric. Kuban.* v. 157 (1927); cf. *Losinsk. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 401 (1935).—Hab. ?
nivalis (*Baker*) *Chouard in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 178: Hyacinthus nivalis.
Pallasiana (*Stev.*) *Losinsk. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 408 (1935): Hyacinthus Pallasianus.
plumosus *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1124 (1895), in syn.: Muscari comosum f. plumosum *Voss.*
Sawiczii (*Woron.*) *Vved. in B. Fedtsch. & al., Fl. Turkm.* i. 309 (1932): Bellevalia Sawiczii.

HYALOSERIS Griseb. (Compos.).
catamaquiensis *Hieron. ex Fiebr. in Engl. Jahrb.* xlv. 43 (1910), in obs.—Boliv.

HYBANTHUS Jacq. (Violac.).
agateoides *Melch.*; *G. K. Schulze in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 113 (1934), descr.—N. Caled.
attenuatus (*Humb. & Bonpl.*) *G. K. Schulze, l. c.* 114: Ionidium attenuatum.
biacuminatus (*Rusby*) *G. K. Schulze, l. c.*: Calceolaria biacuminata.
bilobus *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 84 (1931), nomen; *C. A. Gardner in Journ. Roy. Soc. W. Austral.* 1932–3, xix. 86 (1934), descr.—W. Austral.
Calceolaria (*L.*) *G. K. Schulze in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 114 (1934): Viola Calceolaria.
glaucus (*Chod.*) *G. K. Schulze, l. c.* 113: Ionidium glaucum.
graminifolius (*Chod.*) *G. K. Schulze, l. c.* 114: Ionidium graminifolium.
leptopus *G. K. Schulze, l. c.* 109.—Bras. (Amaz.).
longistylus *G. K. Schulze, l. c.* 108.—Parag.
malpighiifolius *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 73 (1935).—Brit. Honduras.
Melchiorianus *G. K. Schulze in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 109 (1934).—Parag.
paraguariensis (*Chod.*) *G. K. Schulze, l. c.* 114: Ionidium paraguariense.
peninsularis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 59 (1933–5).—Calif. infer.
prunifolius (*Humb. & Bonpl.*) *G. K. Schulze in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 114 (1934): Viola prunifolia.
racemiferus *G. K. Schulze, l. c.* 110.—Venez.
rivalis (*Arech.*) *Herter, Fl. Urug. Pl. Vasc.* (*Estud. Bot. Reg. Urug.* iv.) 88 (1931): Ionidium rivale.
salacioides *G. K. Schulze in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 112 (1934).—Mexico.
subpoaya *G. K. Schulze, l. c.*—Bras. (Goyaz).
subsessilis *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 72 (1935).—Guatem.; Brit. Honduras.
supinus *G. K. Schulze in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 114 (1934): H. procumbens *Ule.*
velutinus *G. K. Schulze, l. c.* 111.—Parag.

HYBOCHILUS Schlechter (Orchidac.).
Huebneri *Mansf. in Fedde, Repert.* xxxvi. 61 (1934). —Bras. (Amaz.).

HYDNOCARPUS Gaertn. (Flacourtiac.; Bixac., Gen. Pl.).
Woodii *Merrill ex v. Slooten in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Ser. III. vii. 306 (1925), in obs., nomen; *Merrill in Univ. Calif. Publ. Bot.* xv. 208 (1929), descr.—Borneo.

HYDNORA Thunb. (Hydnorac.; Cytinac., Gen. Pl.).
Cornii *Vaccaneo in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1932, n. s. xxxix. 304.—Somal. Ital.
Michaelis *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. ii. Anhang, 17 (1932).—Tanganyika Terr.

HYDRANGEA L. (Saxifragac.).
amagiana *Makino in Journ. Jap. Bot.* viii. 31 (1932). —Japon. (Hondo).
Chungii *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 69.—China (Fokien).
Fargesi *Hort. ex F. Weber in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1931, xlvi. 68, 114.—Hort.
kwangsiensis *Hu in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 152. —China (Kwangsi).
sungpanensis *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 444 (1931).—China (Szechuan).

HYDRANTHELIUM H. B. & K. (Scrophulariac.).
obovatum (*Rafin.*) *Pennell in Acad. Nat. Sc. Philad.* Monogr. 1, *Scroph.* 630 (1935), in obs.: Macuillamia obovata.
repens (*Sw.*) *Pennell, l. c.*, in obs.: Gratiola repens.
rotundifolium (*Michx.*) *Pennell, l. c.*, in obs.: Monniera rotundifolia.

HYDRILLA L. C. Rich. (Hydrocharitac.).
polysperma *Blatter in Journ. & Proc. As. Soc. Beng.* 1930, n. s. xxvi. 356 (1931).—Ind. or. (Rajputana).

HYDROANZIA Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot. 1935, iv. 26: **Euhydrobryum** Koidz. in Y. Doi, Fl. Satsum. ii. 98 (1931), non Wedd. (Podostemac.).
floribunda (*Koidz.*) *Koidz. l. c.* 27: Hydrobryum floribundum.
japonica (*Imamura*) *Koidz. l. c.* 28: Hydrobryum japonicum.
puncticulata (*Koidz.*) *Koidz. l. c.*: Hydrobryum puncticulatum.

HYDROBRYUM Endl. (Podostemac.).
puncticulatum *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 178, in syn.: Euhydrobryum puncticulatum.

HYDROCHARELLA Spruce ex Rohrb. in Abh. Nat. Ges. Halle, xii. 56 (1871), in adnot.; et ex Benth. & Hook. f. Gen. Pl. iii. 452 (1883), in obs.: **Limnobium** L. C. Rich. (Hydrocharitac.).
chaetospora *Spruce ex Rohrb. in Abh. Nat. Ges. Halle*, xii. 56 (1871), in adnot., nomen.—Bras. (Amaz.).

HYDROCHARIS L. (Hydrocharitac.).
Chevalieri (*De Wild.*) *Dandy in Journ. Bot.* 1932, lxx. 227: Ottelia Chevalieri.
dubia (*Blume*) *Dandy, l. c.* 328: Pontederia dubia.
salifera *Pellegr. in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 182.—Afr. Gall. Centr.

HYDROCOTYLE L. (Umbellif.).
andina *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 27, Cuadro 24 (1934), nomen; *et l. c.* No. 29, p. 10 (1935), descr.—Colomb.
Bradei *Rossb. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 691 (1935).—Bras. (Rio de Janeiro).
Dahlgreni *Rose & Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 32 (1931).—Peruv.
feaniana *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 211 (1935).—Ins. Marquesas (Hivaoa).
Fetherstoniana *Jennings apud Fetherston in Torreya*, 1932, xxxii. 7.—U.S.A. (N. York).
Handelii *H. Wolff in Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 707 (1933).—China (Yunnan).
laxiflora *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 300.—Formosa.
pseudo-conferta *Masamune, l. c.* 301.—Formosa.
ranunculifolia *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 151.—Formosa.

HYDRODEA N. E. Brown (Ficoidac.).
Bossiana *Dinter in Kakteenk.* 1935, 27, in obs., nomen.—Hab. ?

HYDROGASTER Kuhlm. in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro, ii. 86 (1935). *TILIACEAE.*
trinervis *Kuhlm. l. c.*—Bras. (Espirito Santo).

HYDROMYSTRIA G. F. W. Mey. (Hydrocharitac.).
Sinclairi (*Benth.*) *Hauman in An. Mus. Nac. Buenos Aires,* xxvii. 326 (1915), in obs.: Limnobium Sinclairi.

HYDROSME Schott (Arac.).
Elliotii (*Hook. f.*) *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* ii. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 243 (1908), in obs.: Amorphophallus Elliotii.

HYDROSTACHYS Thou. (Hydrostachyac.; Podostemac., Gen. Pl.).
Decaryi *H. Perrier in Arch. Bot., Caen,* Bull. 1929, iii. 150, 151 (1931).—Madag.
Humblotii (*Engl.*) *H. Perrier, l. c.* 147: H. distichophyllus var. Humblotii.
inaequalis *Reim. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xii. 83 (1934).—Tanganyika Terr.
insignis *Mildbr. & Reim. l. c.* xi. 662 (1932).—Tanganyika Terr.
longifidus *H. Perrier in Arch. Bot., Caen,* Bull. 1929, iii. 157, 158 (1931).—Madag.
longipodus *H. Perrier, l. c.* 151, 152.—Madag.
maximus *H. Perrier, l. c.* 146, 147.—Madag.
monoicus *H. Perrier, l. c.* 144.—Madag.
multisquamatus *H. Perrier, l. c.* 149, 150.—Madag.
nervosus *H. Perrier, l. c.* 143.—Madag.
trifarius *H. Perrier, l. c.* 150.—Madag.

HYGROPHILA R. Br. (Acanthac.).
Chevalieri *Benoist in Bull. Soc. Bot. France,* 1914, lxi. Mém. 8, 278 (1917).—Sudan.
episcopalis (*Benoist*) *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine,* iv. 644 (1935): Nomaphila episcopalis.
erecta (*Burm. f.*) *Hochr. in Candollea,* v. 230 (1934), in obs.: Ruellia erecta.
stagnalis *Benoist in Bull. Soc. Bot. France,* 1914, lxi. Mém. 8, 277 (1917).—Guinea Gall.
tumbuctuensis *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1932, Sér. II. iv. 586.—Sudan. (Haut-Sénégal-Niger).

HYMENACHNE Beauv. (Gramin.).
assamica (*Hook. f.*) *Hitchcock in Lingnan Sc. Journ.* vii. 222 (1931): Panicum assamicum.

HYMENAEA L. (Legumin.).
adenotricha *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1932, Sér. II. iv. 727.—Bras. (Amaz.).
altissima *Ducke in Ann. Acad. Bras. Sc.* 1935, vii. 207.—Bras. (Rio de Janeiro).
Davisii *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 366.—Guiana Brit.
reticulata *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1932, Sér. II. iv. 726.—Bras. (Amaz.).

HYMENIDIUM Lindl. in Royle, Ill. Bot. Himal. 233 (Aug. 1835). *UMBELLIFERAE.*

HYMENOCALLIS Salisb. (Amaryllidac.).
bidentata *Small, Man. Southeast. Fl.* 323 (1933).—U.S.A. (Alabama).
Collieri *Small, l. c.* 322.—U.S.A. (Florida).
×festalis *Hort. ex Schmarse in Gartenflora,* 1933, lxxxii. 337.—Hort.
floridana (*Rafin.*) *C. V. Morton in Year Book Amer. Amaryll. Soc.* ii. 81 (1935): Tomodon floridanum.
jaliscensis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 33 (1933–5).—Mexico.
keyensis *Small, Man. Southeast. Fl.* 322 (1933).—U.S.A. (Florida).
Kimballiae *Small, l. c.* 323.—U.S.A. (Florida).
laciniata *Small, l. c.*—U.S.A. (Florida).
longipetala (*Lindl.*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., xi. 11 (1931): Elisena longipetala.
narcissiflora (*Jacq.*) *Macbride, l. c.*: Pancratium narcissiflorum.
pedunculata (*Herb.*) *Macbride, l. c.*: Ismene pedunculata.
sublimis (*Herb.*) *Macbride, l. c.*: Elisena sublimis.

HYMENOCALLIS:—
tridentata *Small, Man. Southeast. Fl.* 323 (1933).—U.S.A. (Florida).

HYMENOCARDIA Wall. (Euphorbiac.).
Beillei *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 286 (1928), in syn.: H. lyrata.
similis *Pax & K. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 18 (1921), in obs.—Cameroons.

HYMENOCYCLUS Dinter & Schwantes (Ficoidac.).
crassus *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 363 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).

HYMENODICTYON Wall. in Roxb. Fl. Ind., ed. Carey & Wall., ii. 148 (1824), in obs. *RUBIACEAE.*
epidendron *Mildbr.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 70 (1931), in clavi.—Fernando Po.
flaccidum *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 152 (1824).—Reg. Himal.
obovatum *Wall. l. c.* 153.—Ind. or. (Madras).

HYMENOPOGON Wall. in Roxb. Fl. Ind., ed. Carey & Wall., ii. 156 (1824). *RUBIACEAE.*
parasiticus *Wall. l. c.* 157.—Reg. Himal.

HYMENOSTEGIA Harms (Legumin.).
Aubrevillei *Pellegr. in Bull. Soc. Bot. France,* 1933, lxxx. 464.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).

HYMENOXYS Cass. (Compos.).
virgata *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1931, xviii. 439.—U.S.A. (Arizona).

HYOPHORBE Gaertn. (Palmae).
borbonica *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss,* i. 1153 (1895), in syn.: Dictyosperma album.
Commersonii *Mart. ex Becc. Palme Madag.* 20 (1912), in syn.: Neophloga Commersoniana.
lutescens *Hort. ex Jumelle in Cat. Pl. Madag., Palmae,* 9 (1933), in syn.: Chrysalidocarpus lutescens.

HYOSCYAMUS L. (Solanac.).
tibesticus *Maire in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1932, Sér. II. iv. 909.—Sahara Gall. (Tibesti).

HYOSPATHE Mart. (Palmae).
Lehmannii *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 859 (1933).—Colomb.
simplex *Burret, l. c.* 858.—Colomb.

HYPARRHENIA Anderss. (Gramin.).
baddadae *Chiov. Fl. Somala,* II. 440 (1932).—Somal. Ital.
Eberhardtii (*A. Camus*) *Hitchcock in Lingnan Sc. Journ.* vii. 247 (1931): Cymbopogon Eberhardtii.
effusa (*Balansa*) *A. Camus in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1931, Sér. II. iii. 760: Themeda effusa.
rhodesica *Stent & Rattray in Proc. Rhodes. Scientif. Assoc.* xxxii. (*Stent & Rattray, Grasses S. Rhodes.*) 14 (1933).—S. Rhodesia.

HYPERANTHERA Forsk. (Moringac.).
Ruspoliana (*Engl.*) *Chiov. Fl. Somala,* II. 11 (1932): Moringa Ruspoliana.

HYPERICUM L. (Guttif.; Hypericac., Gen. Pl.).
afromontanum *Bullock in Kew Bull.* 1932, 492.—Uganda; Kenya Col.
andjerinum *Font Quer & Pau in Font Quer, Iter Marocc.* 1930, No. 423 [1932].—Marocc.
comorense *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxxv. (*Hist. Nat. Pl.* v. Atlas iii.) t. 338 (1896).—Madag.
Eastwoodianum *I. M. Johnston in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 78 (1931).—Mexico (Arch. Revillagigedo).
foliosissimum *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 215.—Japon.
Goyanesii *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid,* Ser. Bot., No. 27, Cuadro 7 (1934), nomen; *et l. c.* No. 29, p. 9 (1935), descr.—Colomb.
gracilipes *Stapf ex Parry, Lakhers,* 587 (1932), nomen.—Ind. or. (Assam).
Humbertii *Staner in Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. 69 (1934).—Congo Belg.
immaculatum (*Murb.*) *C. D. Chase & Cernj. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles,* 1934, x. 894 (1935): H. quadrangulum var. immaculatum.

HYPERICUM:—
Kanae *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 161.—Japon.
keniense *Schweinf. in v. Hoehnel, Reise Rudolfsee,* 868 (1892).—Afr. trop. or. (Ruwenzori).
Kotoliani *Bellardi ex Colla, Herb. Pedem.* i. 464 (1833), in obs.—Gallia.
Lackeyi *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3190 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
lanuriense *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 403 (1932).—Congo Belg.
leprosiforme *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxvi. 129 (1934).—As. Min. (Lydia).
lutchuense *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 41.—Ins. Liukiu.
marylandicum *Birol. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 467 (1833).—Hab. ?
Momoseanum *Makino in Journ. Jap. Bot.* vii. 12 (1931).—Japon. (Hondo).
Muraianum *Makino, l. c.*—Japon. (Hondo).
Nabelekii *Stefanoff in Bull. Soc. Bot. Bulgar.* iv. 29 (1931).—Kurdistan Turc.
nigropunctatum *Norlindh in Bot. Notiser,* 1934, 103.—Rhodesia.
ovalifolium *Stefanoff in Kew Bull.* 1931, 30.—Syria.
patentissimum *Colla, Herb. Pedem.* i. 467 (1833).—Am. bor. ?
psilophytum (*Diels*) *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord,* 1935, xxvi. 195: H. suberosum var. psilophytum.
rubropunctatum *Makino in Journ. Jap. Bot.* vii. 11 (1931).—Japon. (Hondo).
spicatum *Bellardi ex Bert. in Colla, Herb. Pedem.* i. 466 (1833).—Aegypt.
Takeutianum *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 214.—Japon.
tauricum *R. Keller in Candollea,* iv. 279 (1931).—Crimea.
trigonum *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 403 (1931).—China (Yunnan).

HYPHEAR Danser (Loranthac.).
pseudodoratum (*Lingelsh.*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 61 (1933): Loranthus pseudo-odoratus.
Tanakae (*Van Tiegh.*) *Danser in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 223: Loranthus Tanakae.

HYPOBATHRUM Blume (Rubiac.).
multibracteatum *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3250 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).

HYPOCHOERIS L. (Compos.).
Boscoi *Sennen in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona,* xv. Ser. Bot. No. 1, 24 (1931), in obs., nomen.—Hispan.
crepioides (*Miyabe & Kudo*) *Tatewaki & Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 100: Picris crepioides.
hirta *Cyr. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 563 (1834).—Hab. ?
Robertia (*Sch. Bip.*) *Fiori in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* n. s. xvii. 655 (1910), in obs.: Achyrophorus Robertia.

HYPOCISTIS [Tourn.] Gerard, Fl. Gallo-Prov. 157 (1761). *RAFFLESIACEAE* (Cytinaceae, Gen. Pl.).

HYPOËSTES Soland. (Acanthac.).
peristrophoides *Hochr. in Candollea,* v. 240 (1934).—Java.
suaveolens *C. A. Gardner in For. Dep. Bull., W. Austral.* No. 32, 91 (1923).—W. Austral.

HYPOGON Rafin. (Labiat.).
verticillatus (*Baldw. ex Elliott*) *House in Bull. N. Y. State Mus.* 1920, Nos. 233–4, 67 (1921): Collinsonia verticillata.

HYPOGYNIUM Nees (Gramin.).
virgatum (*Desv.*) *Dandy in Journ. Bot.* 1931, lxix. 54: Andropogon virgatus.

HYPOLYTRUM L. C. Rich. (Cyperac.).
polystachyum *Cherm. in Bull. Soc. Bot. France,* 1933, lxxx. 507.—Gabon.
purpurascens *Cherm. l. c.* 508.—Gabon.
rhizomatanthum *Cherm. l. c.*—Gabon.

HYPOPITYS Hill (Pyrolac.; Monotropac., Gen. Pl.).
gracilescens *Domin, Vergl. Stud. Fichtensp. (Sitzb. Böhm. Ges. Wiss.)* 21 (1915), in adnot., pro syn.: Monotropa Hypopitys var. gracilescens *Domin*.

HYPOXIS L. (Amaryllidac.).
Longii *Fernald in Rhodora*, 1935, xxxvii. 410.—U.S.A. (Virginia).
uniflorata *Markötter in Ann. Univ. Stellenb.* 1930, viii. Sect. A, No. 1, 15.—Orange Free State.
Volkmanniae *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 257 (1931).—Hereroland.

HYPSELODERMA Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac. 886 (1932). *SAPINDACEAE.*
jubense (*Chiov.*) *Radlk. l. c.*: Haplocoelum jubense.

HYPSEOCHARIS Remy (Oxalidac.; Geraniac., Gen. Pl.).
malpasensis *Knuth in Fedde, Repert.* xxix. 219 (1931).—Boliv.

HYPTIS Jacq. (Labiat.).
arborescens *Epling in Fedde, Repert.* xxxiv. 100 (1933).—Nicarag.
armillata *Epling, l. c.* 126.—Cuba.
decipiens *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 53 (1933–5).—Calif. infer.
decurrens (*Blanco*) *Epling in Fedde, Repert.* xxxiv. 120 (1933): Pycnanthemum decurrens.
havanensis *Britton ex Epling, l. c.* 125.—Cuba.
jaliscana *Epling, l. c.* 120.—Mexico.
pinetorum *Epling, l. c.* 103.—Mexico.
psammophila *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 443 (1835).—Bras.
septentrionalis *Epling in Fedde, Repert.* xxxiv. 98 (1933).—Mexico.
subtilis *Epling, l. c.* 79.—Mexico?

HYSSOPUS L. (Labiat.).
borealis *Domin in Preslia*, xiii–xv. 197 (1935), in syn.: H. officinalis subsp. borealis *Domin*.
Judaeorum *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1933, xxxii. 22 (1934).—Hispan.
Passionis *Sennen & Elias, l. c.* 21.—Hispan.
Torresianus *Sennen, l. c.* 23, in syn.: H. Torresii.
Torresii *Sennen, l. c.*—Hispan.

HYSTERIONICA Willd. (Compos.).
caurina *I. M. Johnston in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcv. 54 (1931).—Argent.
pulchella *Cabrera in Not. Prelim. Mus. La Plata*, i. 323 (1931).—Argent.

HYSTRIX Moench (Gramin.).
Komarovii (*Roshev.*) *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 31: Asperella Komarovii.
sachalinensis *Ohwi in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 378.—Sakhalin.

I

IAERA H. F. Copeland in Philipp. Journ. Sc. 1932, xlvii. 82. *ERICACEAE.*
lanaënsis (*Merrill*) *H. F. Copeland, l. c.* 83: Vaccinium lanaënse.
Loheri (*Merrill*) *H. F. Copeland, l. c.* 85: Vaccinium Loheri.
lucida (*Merrill*) *H. F. Copeland, l. c.*: Diplycosia lucida.

IANTHE Salisb. (Amaryllidac.).
pusilla *N. E. Brown in Gard. Chron.* 1933, Ser. III. xciv. 24.—Afr. austr. (Cape Prov.).

IBERIS L. (Crucif.).
Dunalii (*Bubani*) *Cadevall & Sallent, Fl. Catal.* i. 174 (1913–15): Biauricula Dunalii.
Fiorii *H. Lindb. Itin. Mediterr. (Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 62 (1932).—Sicil.
Grosmiquelii *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 220 [1928].—Marocc.
libanotica *Post & Beauverd in Dinsm. Pl. Post. & Dinsm.* Fasc. i. 4 (1932); *Dinsm. in Fedde, Repert.* xxxiii. 102 (1933).—Libanus.
Soyerii *Bonnier & Layens in Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* i. 97 [1912].—Eur. centr.

IBETRALIA Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl. 1934, xxxi. 265. *RUBIACEAE.*
surinamensis *Bremek. l. c.* 265, 266.—Guiana Bat.

IBIDIUM Salisb. (Orchidac.).
floridanum *Wherry in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 49.—U.S.A. (Florida).

ICHNANTHUS Beauv. (Gramin.).
angustifolius *Swallen in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 16.—Colomb.
dasycoleos *Tutin in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 337.—Guiana Brit.
Trinii (*Kunth*) *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 245 (1931), in obs.: Panicum Trinii.

ICHNOCARPUS R. Br. (Apocynac.).
microcalyx *Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1254 (1933).—Siam.
oxypetalus *Pitard, l. c.* 1256.—Indo-China (Anam; Cambodia).

ICHTHYOTHERE Mart. (Compos.).
cordata *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 8, 39 (1932).—Bras. (Matto Grosso).
grandifolia *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 313.—Colomb.
palustris *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 8, 41 (1932).—Bras. (Matto Grosso).
terminalis (*Spreng.*) *Malme, l. c.* 39: Rolandra terminalis.

ICOMUM Hua (Labiat.).
gambicola *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 282 (1931), in clavi.—Guinea Gall.

IGUANURA Blume (Palmae).
arakudensis *Furtado in Fedde, Repert.* xxxv. 273 (1934).—Penins. Mal.
Ridleyana *Becc. in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa*, Mem., 1934, xliv. 173.—Borneo.

ILEX L. (Aquifoliac.; Ilicac., Gen. Pl.).
aggregata (*Ruiz & Pav.*) *Loes. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 95 (1931): Izquierdia aggregata.
angulata *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 266 (1935).—China (Hainan).
apiculata *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 162 (1934).—Sumatra.
atramentaria *Barton, Fl. Virg.* 67 (1812); cf. *Pennell in Bartonia*, 1925–6, No. 9, 28 (1926).—U.S.A. (Virginia).
Bartlettii *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 162 (1934).—Sumatra.
bonincola *Makino in Journ. Jap. Bot.* i. 21 (1917).—Ins. Bonin.
confertiflora *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 35 (1934).—China (Kwangtung).
confertifolia *Merrill in Sarawak Mus. Journ.* iii. 526 (1928).—Borneo.
dasyphylla *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* vii. 311 (1931).—China (Kwangtung).
dipyrena *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 473 (1820).—Nepal.
duarteënsis *Loes. in Fedde, Repert.* xxxiii. 181 (1933).—Santo Domingo.
duidae *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 384.—Venez.
euryifolia *Mori & Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 485.—Formosa.
ferruginea *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 657 (1933).—China (Yunnan).
flaveo-mollissima *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* xi. 14 (1932).—China (Fokien).
Forrestii *Comber in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 46 (1933).—E. Tibet; Yunnan.
Georgei *Comber, l. c.* 50.—China (Yunnan).
grandifolia *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 163 (1934).—Sumatra.
hainanensis *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 60 (1934).—China (Hainan).
impressa *Ekman & Loes. in Fedde, Repert.* xxxiii. 179 (1933).—Santo Domingo.
lancilimba *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* vii. 312 (1931).—China (Kwangtung).
latifrons *Chun in Sunyatsenia*, ii. 69 (1934).—China (Kwangtung).
Liebmannii *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 315 (1931).—Mexico.
longecaudata *Comber in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 54 (1933).—China (Yunnan).
Maclurei *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 35 (1934).—China (Kwangtung).
marquesensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 155 (1935).—Ins. Marquesas (Nukuhiva).
nanningensis *Hand.-Mazz. in Sinensia*, v. 2 (1934).—China (Kwangsi).
nebulosa *Barton, Fl. Virg.* 68 (1812); cf. *Pennell in Bartonia*, 1925–6, No. 9, 29 (1926).—U.S.A. (Virginia).
oblata (*W. E. Evans*) *Comber in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 55 (1933): I. intricata var. oblata.
orestes *Ridley in Kew Bull.* 1931, 35.—Borneo.
percoriacea *Tuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 449.—Ins. Bonin.
phanerophlebia *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 36 (1934).—China (Kwangtung).
pseudomacoucoua *Loes. in Fedde, Repert.* xxxiii. 180 (1933).—Santo Domingo.
pygmaea *McFarlin in Rhodora*, 1932, xxxiv. 17, 233, in adnot.—U.S.A. (Florida).
rarasanensis *Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1931, xxi. 154.—Formosa.
rhamnifolia *Merrill in Sunyatsenia*, i. 201 (1934).—China (Kwangtung).
salicina *Hand.-Mazz. in Sinensia*, iii. 187 (1933).—China (Kwangsi).
shweliensis *Comber in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 57 (1933).—China (Yunnan).
taitensis (*A. Gray*) *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 31 (1933): Byronia tahitensis.
theicarpa *Hand.-Mazz. in Sinensia*, iii. 188 (1933).—China (Kwangsi).
tugitakayamensis *Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1931, xxi. 153.—Formosa.
uraiensis *Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 486.—Formosa.
utilis *Moldenke in Phytologia*, i. 8 (1933).—Colomb.

ILJINIA Korovin in Bull. Univ. As. Centr. xx. 190, 214 (1935), in obs. *CHENOPODIACEAE.*
Regelii (*Bunge*) *Korovin, l. c.* 190, in obs.: Haloxylon Regelii.

ILLECEBRELLA Kuntze, Rev. Gen. iii. ii. 137 (1898); Post & Kuntze, Lexic. 297 (1903). *CARYOPHYLLACEAE.*

ILLICIUM L. (Magnoliac.).
cauliflorum *Merrill in Sarawak Mus. Journ.* iii. 522 (1928).—Borneo.
Cavaleriei (*Léveillé*) *Léveillé in Le Monde des Plantes*, 1916, xviii. 31, in obs.: Glochidion Cavaleriei.
daibuense *Yamamoto, Suppl. Ic. Pl. Formos.* Pt. 5, 22 (1932).—Formosa.

ILLIGERASTRUM Prain & Burkill in Kew Bull. 1933, 241, in adnot. *DIOSCOREACEAE.*

ILYSANTHES Rafin. (Scrophulariac.).
Anagallis (*Burm. f.*) *Hochr. in Candollea*, v. 208 (1934): Ruellia Anagallis.
multicaulis *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 44 (1931).—Cuba.
procumbens *Boldingh, Zakfl. Landbouwstr. Java*, 164 (1916).—Java.
ruellioides (*Colsm.*) *Hochr. in Candollea*, v. 206 (1934): Gratiola ruellioides.

IMPATIENS L. (Balsaminac.; Geraniac., Gen. Pl.).
Aliciae *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1934, 389.—Ind. or. (Travancore).
anaimudica *C. E. C. Fischer, l. c.* 1935, 92.—Ind. or. (Travancore).
bahanensis *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 648 (1933).—China (Yunnan).
barbata *Comber in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 244 (1934).—China (Yunnan).
bicornuta *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 460 (1824).—Reg. Himal.
bracteata *Colebr. ex Roxb. l. c.* 459.—Ind. or. (Assam).
calycina *Wall. in Roxb. l. c.* 463.—Nepal.
Catati *Baill. in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxix. (*Hist. Nat. Pl.* iii. Atlas ii.) t. 170 A (1891).—Madag.
ceratophora *Comber in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 245 (1934).—Upper Burma; Yunnan.
chimiliensis *Comber, l. c.* 246.—Upper Burma.

IMPATIENS:—
chlorosepala *Hand.-Mazz. in Beih. Bot. Centralbl.* lii. Abt. B. 167 (1934).—China (Kwangtung; Kwangsi).
coelotropis *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1934, 390. —Ind. or. (Travancore).
commelinoides *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 651 (1933).—China (Yunnan).
cothurnoides *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1931, 281.—Ind. or. (Assam).
cristata *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 456 (1824).—As. bor.-or.
Deistelii *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 300 (1921), in obs.—Cameroons.
dendricola *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1935, 157. —Ind. or. (Coorg).
fissibractea (*Peter*) *G. M. Schulze in Fedde, Repert.* xxxix. 22 (1935), in obs.: Petalonema fissibracteum.
grandis *Heyne in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 464 (1824).—Nepal; Assam.
heterophylla *Wall. in Roxb. l. c.* 458.—Ind. or. (Assam).
holocentra *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 647 (1933).—China (Yunnan).
leptura *Hook. f.*; *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1934, 391, 392, descr. ampl.—Ind. or. (Travancore).
linocentra *Hand.-Mazz. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1933, lxxxii. 250.—China (Shensi).
longicornu *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 462 (1824).—Reg. Himal.
magnifica *G. M. Schulze in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 518 (1935).—Tanganyika Terr.
microcentra *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 653 (1933).—China (Yunnan).
mollis *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 461 (1824).—Nepal.
nilgirica *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1931, 41.— Mont. Nilgiri.
phlyctidoceras *Bullock in Kew Bull.* 1932, 489.— Afr. trop. or. (Elgon).
platyadena *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1934, 393. —Ind. or. (Travancore).
pseudo-Kingii *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 646 (1933).—China (Yunnan).
purpurea *Hand.-Mazz. l. c.* 649.—China (Yunnan).
rectangula *Hand.-Mazz. l. c.*—China (Yunnan).
scabriuscula *Heyne in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 464 (1824).—Ind. or.
scapiflora *Heyne in Roxb. l. c.*—Ind. or.
sulcata *Wall. in Roxb. l. c.* 458.—Himal.
taronensis *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 652 (1933).—China (Yunnan).
thiochroa *Hand.-Mazz. l. c.* 651.—China (Yunnan).
tricaudata *G. M. Schulze in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 711 (1935).—Tanganyika Terr.
tripetala *Roxb. Hort. Beng.* 18 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 453 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 651 (1832).—Ind. or. (Assam).
umbellata *Heyne in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 464 (1824).—Ind. or.
urticifolia *Wall. in Roxb. l. c.* 457.—Reg. Himal.
xanthina *Comber in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 248 (1934).—Upper Burma; China (Yunnan ?).

IMPATIENTELLA H. Perrier in Bull. Acad. Malgache, 1927, n. s. x. 22 (1928). *BALSAMINACEAE.*
inaperta *H. Perrier, l. c.*—Madag.

INCARVILLEA Juss. (Bignoniac.).
Forrestii *Fletcher in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 310 (1935).—China (Yunnan).

INDIGOFERA L. (Legumin.).
acanthinocarpa *Blatter in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxvi. 482 (1933).—Ind. or. (Waziristan).
acutiflora *N. E. Brown in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. ii. p. xxiii. 373 (1932).— Transvaal.
aquae-nitentis *Bremek. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 241 (1933).—Transvaal.
atrata *N. E. Brown in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. ii. p. xxiii. 369 (1932).— Transvaal.

INDIGOFERA:—
atrinota *N. E. Brown in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. ii. p. xxiii. 369 (1932).— Transvaal.
Bolusii *N. E. Brown, l. c.* p. xxiv. 371.—Transvaal.
Boylei *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 220 (1894), in syn.: I. Gerardiana.
Burttii *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1932, lxx. 251.— Tanganyika Terr.
byobiensis *Hosokawa in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 200.—Formosa.
candidissima *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 198 (1932).—Hereroland; Great Namaq.
Chenii *Chien in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., ix. 150 (1934).—China (Nanking).
Chevalieri *Tisserant in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 163.—Afr. Gall. Centr.
Conradsii *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1932, lxx. 252. —Tanganyika Terr.
Dekindtii *Tisserant in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 169.—Angola.
djalonica *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 388, in clavi, 391 (1928); *Hutchinson & Dalziel in Kew Bull.* 1929, 16, descr.—Guinea Gall.; Nigeria.
egens *N. E. Brown in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. ii. p. xxiv. 369 (1932).— Transvaal.
Ellenbeckii *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1932, lxx. 253.—Abyss.
Fairchildi *E. G. Baker, l. c.* 252.—Guinea Gall.
Fuzi *Sieb. ex Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat.* iii. 44 (1867), in syn.: I. decora.
glabella *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 93 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
glabra *Chien in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., viii. 130 (1932).—China (Chekiang).
goniocarpa *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 341.—Tanganyika Terr.
grisophylla *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 93 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
gyrocarpa *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 78.—Tanganyika Terr.
Hewittii *E. G. Baker, l. c.* 1933, lxxi. 341.—N. Rhodesia.
Hundtii *Rossb. in Fedde, Repert.* xxxviii. 106 (1935). —Angola.
hygrobia *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 13, 69 (1931).—Bras. (Matto Grosso).
ischnoclada *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 812 (1933).—Tanganyika Terr.
kandoënsis *E. G. Baker in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxi. 301 (1932).—Congo Belg.
komiensis *Tisserant in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 170.—Afr. Gall. Centr.; Sudan. Gall.
latibracteata *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 812 (1933).—Tanganyika Terr.
Leendertziae *N. E. Brown in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. ii. p. xxiv. 367 (1932). —Transvaal.
leipzigiae *Bremek. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 241 (1933).—Transvaal.
Le-Testui *Tisserant in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 171.—Afr. Gall. Centr.
manyoniensis *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 340.—Tanganyika Terr.
micropetala *E. G. Baker, l. c.*—Tanganyika Terr.
minimifolia *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 29 (1935).—Kenya Col.
mittuensis *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1932, lxx. 252.—Sudan.
mollicoma *N. E. Brown in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. ii. p. xxiv. 370 (1932): I. Nelsonii *N. E. Brown.*
monosperma *Blatter in Journ. & Proc. As. Soc. Beng.* 1930, n. s. xxvi. 341 (1931).—Ind. or. (Bombay).
mossambicensis *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1932, lxx. 253.—Afr. Lusit. Or.
mounyinensis *Tisserant in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 168.—Angola.
neglecta *N. E. Brown in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. ii. p. xxiv. 371 (1932): I. endecaphylla *Harv.*
Noldeae *Rossb. in Fedde, Repert.* xxxviii. 106 (1935). —Angola.

INDIGOFERA:—
nummulariifolia (*L.*) *Livera ex Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 72 (1931): Hedysarum nummulariifolium.
Obermeijerae *Bremek. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 242 (1933).—Transvaal.
oligantha *Harms*; *E. G. Baker, Legum. Trop. Afr.* iii (1926), descr.—Congo Gall.
oubanguiensis *Tisserant in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 164.—Afr. Gall. Centr.; Sudan. Gall.
Pappei *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 94 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
parviflora *Heyne ex Wall.*; *Wight & Arn. Prodr. Fl. Ind. Or.* 201 (1834), descr.—Ind. or.
pauxilla *N. E. Brown in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. ii. p. xxiv. 370 (1932).— Transvaal.
porrigens *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* ii. 148 (1834).—Bras.
ramulosissima *Hosokawa in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 199.—Formosa.
rhodantha *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 94 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
sanguinea *N. E. Brown in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. ii. p. xxiv. 370 (1932).— Transvaal.
Schinzii *N. E. Brown, l. c.* p. xxiv. 372.—Transvaal.
Schliebenii *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 399 (1932).—Tanganyika Terr.
sericovexilla *C. T. White in Contrib. Arn. Arb.* No. iv. 44 (1933).—Austral. (Queensland).
subcorymbosa *Baker*; *Tisserant in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 269, descr. ampl.— Angola.
supralevis *N. E. Brown in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. ii. p. xxv. 371 (1932).— Transvaal.
tanganyikensis *E. G. Baker in Kew Bull.* 1932, 96. —Uganda; Tanganyika Terr.
Vanioti *Léveillé*; *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 324, descr. ampl.—China (Yunnan).
Wentzeliana *Harms in Engl. Jahrb.* xxx. 326 (1901). —Tanganyika Terr.

INDOCALAMUS Nakai (Gramin.).
debilis (*Thwait.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 342 (1931): Arundinaria debilis.

INEZIA Phillips in Kew Bull. 1932, 297. *COMPOSITAE.*
integrifolia (*Klatt*) *Phillips, l. c.*: Lidbeckia integrifolia.

INGA Scop. (Legumin.).
Capuchoi *Standley in Tropical Woods*, 1933, No. 33, 12.—Bras. (Pará).
crista *Colla, Herb. Pedem.* ii. 256 (1834), in obs.— Bras.
filamentosa *Colla, l. c.*, in obs.—Bras.
Jenmani *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 368.—Guiana Brit.
Lawranceana *Britton & Killip in Phytologia*, i. 23 (1933).—Colomb.
Melinonis *Sagot in Ann. Sc. Nat.* Sér. VI. xiii. 335 (1882).—Guiana Gall.
pulchriflora *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 37 (1935).—Bras. (Amaz.).
russotomentella *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 13, 39 (1931).—Bras. (Matto Grosso).
Schippii *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 132 (1932).—Brit. Honduras.
splendidissima *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 229 (1894), in syn.: Calliandra diademata.
torta *Colla, Herb. Pedem.* ii. 256 (1834), in obs.— Bras.
Ynga (*Vell.*) *J. W. Moore in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu*, x. No. 19, 6 (1934): Mimosa Ynga.

INOCARPUS J. R. & G. Forst. (Legumin.).
rubidus *F. M. Bailey in Queensl. Agric. Journ.* 1910, xxiv. 21, in obs.—N. Guin.

INTYBUS Zinn, Cat. Pl. Gott. 429 (1757); cf. Sprague in Kew Bull. 1934, 219: **Hieracium** L. (Compos.), partim.

INULA L. (Compos.).
chinensis (*Komarov*) *Komarov in Komarov & Klob.-Alis. Key Pl. Far East. Reg. USSR*, ii. 1024 (1932): I. britannica var. chinensis.
euxina *Sosn. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 108 (1934).—Caucas.
Forrestii *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 197 (1934).—China (Yunnan).
glanduligera *Kraschen. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 177 (1933), in syn.: Vicoa glanduligera.
japonica (*Miq.*) *Komarov in Komarov & Klob.-Alis. Key Pl. Far East. Reg. USSR*, ii. 1024 (1932): I. britannica var. japonica.
lanuginosa *Chang in Sinensia*, iii. 202 (1933).—China (Kweichau).
lineata (*Nyár.*) *Nyár. in Bul. Grăd. & Muz. Bot. Univ. Cluj*, 1934, xiv. 224 (1935), in obs.: I. salicina var. lineata.
Lozanoi *Caballero in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 28, 17 (1935).—Marocc.
paniculata (*Klatt*) *Burtt Davy in Kew Bull.* 1935, 570: Monactinocephalus paniculatus.
sicula (*L.*) *Bonnier & Layens in Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* vi. 10 [1923]: Erigeron siculus.
Wardii *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 197 (1934).—China (Szechuan).
×Weberi *Domin in Preslia*, xiii–xv. 228 (1935).—Czechoslovak.
yunnanensis *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 198 (1934).—China (Yunnan; Kwangtung).

IOCHROMA Benth. (Solanac.).
puniceum *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 371 (1935).—Ecuador.

IODES Blume (Icacinac.; Olacac., Gen. Pl.).
floribunda *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 166 (1934).—Sumatra.
Seguini (*Léveillé*) *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1934, xv. 3: Vitis Seguini.
Talbotii *Baker ex Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 457 (1928); *Hutchinson & Dalziel in Kew Bull.* 1929, 23.—Nigeria.
trichocarpa *Mildbr. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 260 (1921), in obs.—Cameroons.
Yatesii *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 165 (1934).—Sumatra.

IODOCEPHALUS Thorel ex Gagnep. (Compos.).
glandulosus *Kerr in Kew Bull.* 1935, 326.—Siam.

IONE Lindl. (Orchidac.).
bifurcatoflorens *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 440.—Formosa.
dichroma (*Rolfe*) *Gagnep. in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, vi. 437 (1933): Bulbophyllum dichromum.

IONIDIUM Vent. (Violac.).
agateoides *Schlechter ex G. K. Schulze in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 113 (1934), in syn.: Hybanthus agateoides.
dahomense *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 97 (1927), in syn.: Hybanthus enneaspermus.

IONOPSIDIUM Reichb. (Crucif.).
abulense (*Pau*) *Rothmaler in Cavanillesia*, vii. 112 (1935): Thlaspi abulense.

IPHIGENIA Kunth (Liliac.).
boinensis *H. Perrier in Lecomte, Not. Syst.* v. 71 (1935).—Madag.
stellata *Blatter in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxii. 734 (1928).—Ind. or. (Bombay).

IPO Pers. (Morac.).
saccidora (*Dalz.*) *Lyons, Plant Names Scientific & Popular*, ed. 2, 246 (1907): Antiaris saccidora.

IPOMOEA L. (Convolvulac.).
acaponetensis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 65 (1933–5).—Mexico.
aphylla *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 139 (1932).—Brit. Honduras.
atacorensis *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1933, Sér. II. v. 232.—Dahomey.

IPOMOEA:—
auxocalyx *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 819 (1933).—Tanganyika Terr.
azurea *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 710 (1895), in syn.: I. Nil.
bella *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1933, Sér. II. v. 231.—Afr. Gall. Centr.
Burridgei *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 710 (1895), in syn.: I. purpurea.
caerulea *Koen. ex Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 91 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 501 (1832).—Ind. or.
caerulescens *Roxb. Hort. Beng.* 14 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 90 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 500 (1832).—Hab.?
camporum *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 214, in clavi, 215 (1931).—Guinea Gall.
Candei (*A. Terracc.*) *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 92 (1935), in obs.: Sopubia Candei.
clavata (*G. Don*) *v. Ooststr. ex Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 3 (1931): Calonyction clavatum.
confertiflora *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 83 (1935).—Brit. Honduras.
elegantissima *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 713 (1895), in syn.: Convolvulus althaeoides.
erubescens *Hort. ex Vilmorin, l. c.* 710, in syn.: I. purpurea.
Fleuryana *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1933, Sér. II. v. 233.—Guinea Gall.
grandiflora (*L.*) *Roxb. Hort. Beng.* 14 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 87 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 497 (1832): Convolvulus grandiflorus.
halierca *I. M. Johnston in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 85 (1931).—Mexico (Arch. Revillagigedo).
imperialis *Hort. ex Bull. Ort. Bot. Napoli*, xi. p. VII. (1932), nomen.—Hort.
kermesina *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 710 (1895), in syn.: I. purpurea f. kermesina *Voss*.
kourankoënsis *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1933, Sér. II. v. 234.—Guinea Gall.
limbata (*Lindl.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 710 (1895): Pharbitis limbata.
Mina (*G. Don*) *Voss, l. c.* 707: Quamoclit Mina.
multiflora *Roxb. Hort. Beng.* 84 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 89 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 499 (1832).—Ind. or.
muricata (*L.*) *Roxb. l. c.* 14, nomen; *et l. c.*; *et l. c.*: Convolvulus muricatus.
oenotheriflora *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 212 (1931), in syn.: Meremia umbellata.
paranaënsis *Hoehne in Bol. Agric., S. Paulo*, 1934, xxxv. 475 (1935).—Bras. (Paraná).
pedunculosa *Chiov. Fl. Somala*, II. 327 (1932).—Somal. Ital.
pes-caprae (*L.*) *Sweet, Hort. Suburb. Lond.* 35 (1818): Convolvulus pes-caprae.
phoenicea *Roxb. Hort. Beng.* 14 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 92 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 502 (1832).—Ind. or.
Pickeli *Hoehne in Bol. Agric., S. Paulo*, 1934, xxxv. 477 (1935).—Bras. (Pernambuco).
pileata *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 94 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 504 (1832).—China.
pulcherrima *v. Ooststr. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 206.—Peruv.
pyrophila *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1933, Sér. II. v. 235.—Guinea Gall.
salicifolia *Roxb. Hort. Beng.* 14 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 88 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 498 (1832).—Ind. or. (Bengal).
senegambica *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1933, Sér. II. v. 234.—Senegal.
sepiaria *Koen. ex Roxb. Hort. Beng.* 14 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 90 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 499 (1832).—Ind. or.
speciosa (*Choisy*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 711 (1895): Pharbitis speciosa.
sudanica *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1933, Sér. II. v. 235.—Guinea Gall.

IPOMOEA:—
tenuicaulis *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1933, Sér. II. v. 233.—Afr. Gall. Centr.
Vestalii *Standley in Contrib. Arn. Arb.* No. v. 130 (1933).—Panamá (Ins. Barro Colorado).

IRENELLA Suesseng. in Fedde, Repert. xxxv. 318 (1934). *AMARANTHACEAE.*
chrysotricha *Suesseng. l. c.*—Ecuador.

IRESINE P. Br. (Amaranthac.).
ajuscana *Suesseng. & Beyerle in Fedde, Repert.* xxxix. 10 (1935).—Mexico.
Biemuelleri *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 872 (1895), in obs.—Hort.
Hoveyi *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in obs.—Hort.
laurifolia *Suesseng. in Fedde, Repert.* xxxv. 321 (1934).—Venez.
mexicana (*Moq.*) *Suesseng. l. c.* 322: Alternanthera mexicana.
obtusa *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 34 (1933–5).—Calif. infer.
Pilgeri *Suesseng. in Fedde, Repert.* xxxix. 12 (1935).—Colomb.
pulchella *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 34 (1933–5).—Calif. infer.
tenuis *Suesseng. in Fedde, Repert.* xxxv. 323 (1934).—Ecuador; Peruv.
Weberbaueri *Suesseng. l. c.*—Peruv.

IRIARTELLA H. Wendl. (Palmae).
stenocarpa *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 233 (1931).—Peruv.

IRIS L. (Iridac.).
acleantha *Small in Small & Alexander, Bot. Interpr. Iridac. Pl. Gulf States* (*Contrib. N. Y. Bot. Gard.* No. 327) 338 (1931).—U.S.A. (Louisiana).
alabamensis *Small, l. c.* 354.—U.S.A. (Alabama).
albilinea *Alexander in Small & Alexander, l. c.* 349.—U.S.A. (Louisiana).
alticristata *Small in Small & Alexander, l. c.* 353.—U.S.A. (Louisiana).
amankutanica *O. Fedtsch. ex Vved. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 571, 572 (1935), in syn.: Iris spp.
amnicola *Alexander in Small & Alexander, Bot. Interpr. Iridac. Pl. Gulf States* (*Contrib. N. Y. Bot. Gard.* No. 327) 348 (1931).—U.S.A. (Louisiana).
antilibanotica *Dinsm. in Post, Fl. Syria, Palest. & Sinai*, ed. 2, ii. 599 (1933); *Dinsm. Pl. Post. & Dinsm.* Fasc. II. 10 (1934) (*Publ. Am. Univ. Beirut*, Nat. Sc. Ser. No. 1; et No. 3).—Syria.
Arnoldiana *Busch ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 172 (1930).—Caucas.
atro-enantha *Small in Small & Alexander, Bot. Interpr. Iridac. Pl. Gulf States* (*Contrib. N. Y. Bot. Gard.* No. 327) 348 (1931).—U.S.A. (Louisiana).
auralata *Small, l. c.* 349.—U.S.A. (Louisiana).
auranitica *Dinsm. in Post, Fl. Syria, Palest. & Sinai*, ed. 2, ii. 601 (1933); *Dinsm. Pl. Post. & Dinsm.* Fasc. II. 11 (1934) (*Publ. Am. Univ. Beirut*, Nat. Sc. Ser. No. 1; et No. 3).—Palaest.
aurilinea *Alexander in Small & Alexander, Bot. Interpr. Iridac. Pl. Gulf States* (*Contrib. N. Y. Bot. Gard.* No. 327) 353 (1931).—U.S.A. (Louisiana).
×autosyndetica *Simonet in Compt. Rend.* 1934, cxcviii. 1173.—Cult.
basaltica *Dinsm. in Post, Fl. Syria, Palest. & Sinai*, ed. 2, ii. 597 (1933); *Dinsm. Pl. Post. & Dinsm.* Fasc. II. 9 (1934) (*Publ. Am. Univ. Beirut*, Nat. Sc. Ser. No. 1; et No. 3).—Libanus.
belgica *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 980 (1895), in syn.: I. variegata f. belgica *Spach*.
bifurcata *Small in Small & Alexander, Bot. Interpr. Iridac. Pl. Gulf States* (*Contrib. N. Y. Bot. Gard.* No. 327) 345 (1931).—U.S.A. (Louisiana).
Biggeri *Dinsm. in Post, Fl. Syria, Palest. & Sinai*, ed. 2, ii. 599 (1933); *Dinsm. Pl. Post. & Dinsm.* Fasc. II. 10 (1934) (*Publ. Am. Univ. Beirut*, Nat. Sc. Ser. No. 1; et No. 3).—Palaest.
Borzaeana (*Prodan*) *Prodan in Bul. Grăd. & Muz. Bot. Univ. Cluj*, 1934, xiv. 152 (1935), in obs.: I. arenaria var. Borzaeana.

IRIS:—

brevipes *Small in Small & Alexander, Bot. Interpr. Iridac. Pl. Gulf States* (*Contrib. N. Y. Bot. Gard.* No. 327) 355 (1931).—U.S.A. (Louisiana).
callilopha *Alexander in Small & Alexander, l. c.* 350. —U.S.A. (Louisiana).
callirhodea *Alexander, l. c.* 347.—U.S.A. (Louisiana).
cavarnae *Prodan, Fl. Dobrudscha*, etc. 15; cf. *Prodan in Bul. Grăd. & Muz. Bot. Univ. Cluj*, 1934, xiv. 185 (1935).—Ruman.
cerasioides *Alexander in Small & Alexander, Bot. Interpr. Iridac. Pl. Gulf States* (*Contrib. N. Y. Bot. Gard.* No. 327) 343 (1931).—U.S.A. (Louisiana).
chlorolopha *Small in Small & Alexander, l. c.* 338. —U.S.A. (Louisiana).
chrysolopha *Small, l. c.* 350.—U.S.A. (Louisiana).
citricristata *Small, l. c.* 353.—U.S.A. (Louisiana).
citriviola *Small, l. c.* 345.—U.S.A. (Louisiana).
cretica *Herb. ex Baker in Bot. Mag.* sub t. 6343 (1878), in syn.: I. cretensis.
crocinubia *Alexander in Small & Alexander, Bot. Interpr. Iridac. Pl. Gulf States* (*Contrib. N. Y. Bot. Gard.* No. 327) 341 (1931).—U.S.A. (Louisiana).
cyanantha *Alexander, l. c.* 344.—U.S.A. (Louisiana).
cyanochrysea *Small in Small & Alexander, l. c.* 348. —U.S.A. (Louisiana).
De-Winkeleri *Small, l. c.* 347.—U.S.A. (Louisiana).
Dykesii *Stapf in Bot. Mag.* t. 9282 (1932).—Hort.
ecristata *Alexander in Small & Alexander, Bot. Interpr. Iridac. Pl. Gulf States* (*Contrib. N. Y. Bot. Gard.* No. 327) 337 (1931).—U.S.A. (Louisiana).
elephantina *Small in Small & Alexander, l. c.* 352. —U.S.A. (Louisiana).
fluviatilis *Small, l. c.* 353.—U.S.A. (Louisiana).
Fomini *Woronow ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 285 (1928): I. acutiloba var. bimaculata *Fomin.*
formosana *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 115.—Formosa.
fourchiana *Small in Small & Alexander, Bot. Interpr. Iridac. Pl. Gulf States* (*Contrib. N. Y. Bot. Gard.* No. 327) 344 (1931).—U.S.A. (Louisiana).
fulvaurea *Small, l. c.* 340.—U.S.A. (Louisiana).
fumiflora *Alexander in Small & Alexander, l. c.*—U.S.A. (Louisiana).
fumifulva *Small in Small & Alexander, l. c.*—U.S.A. (Louisiana).
fuscaurea *Small, l. c.*—U.S.A. (Louisiana).
fuscirosea *Small, l. c.* 342.—U.S.A. (Louisiana).
fuscisanguinea *Alexander in Small & Alexander, l. c.* 349.—U.S.A. (Louisiana).
fuscivenosa *Small in Small & Alexander, l. c.* 341.— U.S.A. (Louisiana).
gentilliana *Alexander in Small & Alexander, l. c.* 345.—U.S.A. (Louisiana).
Glockiana *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxvi. 74 (1934).—As. Min. (Lydia).
Grossheimii *Woronow ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 255 (1928).—Caucas.
hauranensis *Dinsm. in Post, Fl. Syria, Palest. & Sinai*, ed. 2, ii. 598 (1933); *Dinsm. Pl. Post. & Dinsm.* Fasc. II. 10 (1934) (*Publ. Am. Univ. Beirut*, Nat. Sc. Ser. No. 1; et No. 3).—Palaest.
hermona *Dinsm. l. c.* 596; *et l. c.* 8.—Palaest.
hyrcana *Woronow ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 250 (1928).—Caucas.
ianthina *Alexander in Small & Alexander, Bot. Interpr. Iridac. Pl. Gulf States* (*Contrib. N. Y. Bot. Gard.* No. 327) 339 (1931).—U.S.A. (Louisiana).
× intercedens *Negodi in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1932, n. s. xxxix. 216, in obs.—Hort.
iochroma *Small in Small & Alexander, Bot. Interpr. Iridac. Pl. Gulf States* (*Contrib. N. Y. Bot. Gard.* No. 327) 348 (1931).—U.S.A. (Louisiana).
iocyanea *Small, l. c.* 344.—U.S.A. (Louisiana).
iodantha *Alexander in Small & Alexander, l. c.* 345. —U.S.A. (Louisiana).

IRIS:—

ioleuca *Alexander in Small & Alexander, Bot. Interpr. Iridac. Pl. Gulf States* (*Contrib. N. Y. Bot. Gard.* No. 327) 344 (1931).—U.S.A. (Louisiana).
iophaea *Alexander, l. c.* 338.—U.S.A. (Louisiana).
jordana *Dinsm. in Post, Fl. Syria, Palest. & Sinai*, ed. 2, ii. 598 (1933); *Dinsm. Pl. Post. & Dinsm.* Fasc. II. 9 (1934) (*Publ. Am. Univ. Beirut*, Nat. Sc. Ser. No. 1; et No. 3).—Palaest.
jugoslavica *Prodan in Bul. Grăd. & Muz. Bot. Univ. Cluj*, 1934, xiv. 145 (1935), in syn.: I. melitta var. jugoslavica *Prodan.*
Kamayama *Makino in Journ. Jap. Bot.* vii. 10 (1931): I. sanguinea var. violacea *Makino.*
karategina *B. Fedtsch. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 542 (1925).—As. centr.
kasruwana *Dinsm. in Post, Fl. Syria, Palest. & Sinai*, ed. 2, ii. 597 (1933); *Dinsm. Pl. Post. & Dinsm.* Fasc. II. 9 (1934) (*Publ. Am. Univ. Beirut*, Nat. Sc. Ser. No. 1; et No. 3).—Libanus.
kobasensis *Prodan in Bul. Grăd. & Muz. Bot. Univ. Cluj*, 1934, xiv. 157 (1935).—Bosnia.
Kobayashii *Kitagawa in Journ. Jap. Bot.* ix. 249 (1933).—Manchur.
kopetdagensis *Vved. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 575 (1935).—As. centr.
lancipetala *Alexander in Small & Alexander, Bot. Interpr. Iridac. Pl. Gulf States* (*Contrib. N. Y. Bot. Gard.* No. 327) 346 (1931).—U.S.A. (Louisiana).
latifolia (*Mill.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 982 (1895): Xiphion latifolium.
leptorrhiza *Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xxi. 151 (1935), in syn.: Juno leptorrhiza.
libyca *Mattei in Boll. Stud. Inform. Giard. Colon. Palermo*, iii. 93 (1916).—Libya.
lilacinaurea *Alexander in Small & Alexander, Bot. Interpr. Iridac. Pl. Gulf States* (*Contrib. N. Y. Bot. Gard.* No. 327) 343 (1931).—U.S.A. (Louisiana).
longepedicellata *Czecz. in Acta Soc. Bot. Polon.* 1932, ix. 44.—As. Min. (Galatia).
ludoviciana *Small in Small & Alexander, Bot. Interpr. Iridac. Pl. Gulf States* (*Contrib. N. Y. Bot. Gard.* No. 327) 339 (1931).—U.S.A. (Louisiana).
macrantha *Hort. ex Simonet in Bull. Soc. Nat. Hort. France*, 1935, Sér. VI. ii. 107.—Hort.
magnifica *Vved. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 571 (1935): I. caucasica var. major *Maxim.*
maracandica *Vved. l. c.* 573.—As. centr.
Marplei *Alexander in Small & Alexander, Bot. Interpr. Iridac. Pl. Gulf States* (*Contrib. N. Y. Bot. Gard.* No. 327) 346 (1931).—U.S.A. (Louisiana).
Mauritii *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 116 [1933], nomen.—Marocc.
mississippiensis *Alexander in Small & Alexander, Bot. Interpr. Iridac. Pl. Gulf States* (*Contrib. N. Y. Bot. Gard.* No. 327) 355 (1931).—U.S.A. (Louisiana; Mississippi; Alabama ?).
moricolor *Small in Small & Alexander, l. c.* 340.— U.S.A. (Louisiana).
nazarena (*Foster*) *Dinsm. in Post, Fl. Syria, Palest. & Sinai*, ed. 2, ii. 596 (1933); *Dinsm. Pl. Post. & Dinsm.* Fasc. II. 8 (1934) (*Publ. Am. Univ. Beirut*, Nat. Sc. Ser. No. 1; et No. 3): I. sari var. nazarena.
Nicolai *Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xxi. 151 (1935), in syn.: Juno Nicolai.
nigricans *Dinsm. in Post, Fl. Syria, Palest. & Sinai*, ed. 2, ii. 600 (1933); *Dinsm. Pl. Post. & Dinsm.* Fasc. II. 11 (1934) (*Publ. Am. Univ. Beirut*, Nat. Sc. Ser. No. 1; et No. 3).—Palaest.
Nyaradyana *Prodan in Bul. Grăd. & Muz. Bot. Univ. Cluj*, 1934, xiv. 176 (1935).—Ruman.
oenantha *Small in Small & Alexander, Bot. Interpr. Iridac. Pl. Gulf States* (*Contrib. N. Y. Bot. Gard.* No. 327) 344 (1931).—U.S.A. (Louisiana).
oölopha *Alexander in Small & Alexander, l. c.* 350. —U.S.A. (Louisiana).
pallidirosea *Alexander, l. c.* 347.—U.S.A. (Louisiana).
paludicola *Alexander, l. c.* 352.—U.S.A. (Louisiana).
parvicaerulea *Alexander, l. c.* 354.—U.S.A. (Louisiana).

IRIS:—

parvirosea *Small in Small & Alexander, Bot. Interpr. Iridac. Pl. Gulf States* (*Contrib. N. Y. Bot. Gard.* No. 327) 346 (1931).—U.S.A. (Louisiana).
parvula *Vved. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 563 (1935).—As. centr.
petrana *Dinsm. in Post, Fl. Syria, Palest. & Sinai*, ed. 2, ii. 599 (1933); *Dinsm. Pl. Post. & Dinsm.* Fasc. II. 10 (1934) (*Publ. Am. Univ. Beirut*, Nat. Sc. Ser. No. 1; et No. 3).—Palaest.; Arab.
phoenicis *Small in Small & Alexander, Bot. Interpr. Iridac. Pl. Gulf States* (*Contrib. N. Y. Bot. Gard.* No. 327) 349 (1931).—U.S.A. (Louisiana).
pinetorum *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 137 (1931).—U.S.A. (Calif.).
pluriscapis *Prodan in Bul. Grăd. & Muz. Bot. Univ. Cluj*, 1934, xiv. 138 (1935).—Cult.
Popovii *Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xxi. 152 (1935), in syn.: Juno Popovii.
pseudocristata *Small in Small & Alexander, Bot. Interpr. Iridac. Pl. Gulf States* (*Contrib. N. Y. Bot. Gard.* No. 327) 346 (1931).—U.S.A. (Louisiana).
pseudorossii *Chien in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., vi. 72 (1931).—China (Kiangsu; Anhwei).
purpurissata *Small in Small & Alexander, Bot. Interpr. Iridac. Pl. Gulf States* (*Contrib. N. Y. Bot. Gard.* No. 327) 340 (1931).—U.S.A. (Louisiana).
pyrrholopha *Alexander in Small & Alexander, l. c.* 339.—U.S.A. (Louisiana).
regalis *Small in Small & Alexander, l. c.* 343.— U.S.A. (Louisiana).
regifulva *Alexander in Small & Alexander, l. c.* 338. —U.S.A. (Louisiana).
rhodantha *Alexander, l. c.* 346.—U.S.A. (Louisiana).
rhodochrysea *Small in Small & Alexander, l. c.* 347.—U.S.A. (Louisiana).
rosiflora *Small, l. c.* 338.—U.S.A. (Louisiana).
rosilutea *Alexander in Small & Alexander, l. c.* 342. —U.S.A. (Louisiana).
rosipurpurea *Alexander, l. c.* 343.—U.S.A. (Louisiana).
rubea *Alexander, l. c.* 338.—U.S.A. (Louisiana).
rubicunda *Small in Small & Alexander, l. c.* 342.— U.S.A. (Louisiana).
rubrolilacina *Alexander in Small & Alexander, l. c.* 345.—U.S.A. (Louisiana).
salmonicolor *Small in Small & Alexander, l. c.* 339. —U.S.A. (Louisiana).
samariae *Dinsm. in Post, Fl. Syria, Palest. & Sinai*, ed. 2, ii. 598 (1933); *Dinsm. Pl. Post. & Dinsm.* Fasc. II. 9 (1934) (*Publ. Am. Univ. Beirut*, Nat. Sc. Ser. No. 1; et No. 3).—Palaest.
sarajevoënsis *Prodan in Bul. Grăd. & Muz. Bot. Univ. Cluj*, 1934, xiv. 135 et 137, in adnot. (1935).—Bosnia.
schizolopha *Alexander in Small & Alexander, Bot. Interpr. Iridac. Pl. Gulf States* (*Contrib. N. Y. Bot. Gard.* No. 327) 351 (1931).—U.S.A. (Louisiana).
serotina *Willk.*; *Font Quer in Cavanillesia*, v. 46 (1932), descr. emend.—Hispan.
splendens *O. Fedtsch. in Bull. Jard. Bot. Princ. URSS*, xxiii. 111 (1924), nomen; *Teofr. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 542 (1935), in syn.: I. Hoogiana.
squaluda *L. ex Prodan in Bul. Grăd. & Muz. Bot. Univ. Cluj*, 1934, xiv. 182 (1935), in obs., nomen. —Quid ?
subdecolorata *Vved. in Vved. & al., Key Fl. Tashkent*, 75 (1923).—Turkestan.
subfulva *Small in Small & Alexander, Bot. Interpr. Iridac. Pl. Gulf States* (*Contrib. N. Y. Bot. Gard.* No. 327) 337 (1931).—U.S.A. (Louisiana).
tadshikorum *Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xxi. 152 (1935), in syn.: Juno tadshikorum.
taochia *Woronow ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 256 (1928).—Caucas.
tenuifolia (*Vel.*) *Prodan in Bul. Grăd. & Muz. Bot. Univ. Cluj*, 1934, xiv. 156 (1935), in obs.: I. Reichenbachii var. tenuifolia.
Theresiae *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 116 [1933], nomen.—Marocc.

IRIS:—
Thomasii *Small in Small & Alexander, Bot. Interpr. Iridac. Pl. Gulf States* (*Contrib. N. Y. Bot. Gard.* No. 327) 348 (1931).—U.S.A. (Louisiana).
thianschanica (*Maxim.*) *Vved. in B. Fedtsch. Fl. Turkm.* i. 325 (1932): I. tenuifolia var. thianschanica.
typhifolia *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 94.—Manchur.
tyriana *Small in Small & Alexander, Bot. Interpr. Iridac. Pl. Gulf States* (*Contrib. N. Y. Bot. Gard.* No. 327) 342 (1931).—U.S.A. (Louisiana).
venulosa *Alexander in Small & Alexander, l. c.* 352.—U.S.A. (Louisiana).
vicaria *Vved. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 569 (1935).—As. centr.
violilutea *Alexander in Small & Alexander, Bot. Interpr. Iridac. Pl. Gulf States* (*Contrib. N. Y. Bot. Gard.* No. 327) 350 (1931).—U.S.A. (Louisiana).
violivenosa *Small in Small & Alexander, l. c.* 339.—U.S.A. (Louisiana).
viridis *Alexander in Small & Alexander, l. c.* 345.—U.S.A. (Louisiana).
viridivinea *Small in Small & Alexander, l. c.* 341.—U.S.A. (Louisiana).
Vvedenskyi *Nevski in B. Fedtsch. & al., Fl. Turkm.* i. 323 (1932).—Transcasp.
Westii *Dinsm. in Post, Fl. Syria, Palest. & Sinai*, ed. 2, ii. 596 (1933); *Dinsm. Pl. Post. & Dinsm.* Fasc. II. 8 (1934) (*Publ. Am. Univ. Beirut*, Nat. Sc. Ser. No. 1; et No. 3).—Libanus.
Wherryana *Small in Small & Alexander, Bot. Interpr. Iridac. Pl. Gulf States* (*Contrib. N. Y. Bot. Gard.* No. 327) 353 (1931).—U.S.A. (Louisiana).

IRYANTHERA Warb. (Myristicac.).
congestiflora *Macbride in Candollea*, v. 350 (1934).—Peruv.
tricornis *Ducke in Tropical Woods*, 1932, No. 31, 11; *et in Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro*, vi. 9 (1933).—Bras. (Amaz.).

ISACHNE R. Br. (Gramin.).
aethiopica *Stapf & C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1933, 300.—S. Thomé; Uganda; Kenya Col.; Tanganyika Terr.
Angladei *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1932, 323.—Ind. or. (Madras).
Bourneorum *C. E. C. Fischer, l. c.* 324.—Ind. or. (Madras; Mysore).
Caillei *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1934, xiv. 41.—Guinea Gall.
Fauriei *Ohwi in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 386.—Formosa.
Gossweileri *Stapf & C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1933, 301.—Angola.
guineënsis *Stapf & C. E. Hubbard, l. c.* 302.—Guinea Gall.
kiyalaënsis (*Vanderyst*) *Robyns in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 199 (1932), cum descr. latina: Panicum kiyalaënse.
Meeboldii *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1932, 323.—Ind. or. (Mysore).
nipponensis *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 30.—Corea; Japon.
ponapensis *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 200.—Ins. Carolin. (Ponape).
repens *Keng in Sunyatsenia*, i. 129 (1933).—China (Kwangtung; Hainan).
setosa *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1932, 247.—Ind. or. (Cochin; Travancore).
Trochainii *A. Camus in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1933, Sér. II. v. 250.—Senegal.

ISATIS L. (Crucif.).
apscheronica *N. Busch in Trav. Mus. Bot. Acad. Sc. URSS*, xxiv. 27 (1932).—Transcaucas.; Turkestan.
exauriculata *Bornm. in Magyar Bot. Lap.* 1931, xxx. 56.—As. Min. (Paphlagonia).
stenophylla *Bornm. & Gauba in Fedde, Repert.* xxxvi. 339 (1934).—Persia.
teheranica *Bornm. ex Bornm. & Gauba, l. c.* xxxix. 87 (1935).—Persia.

ISATIS:—
yezoënsis *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 66.—Corea; Sakhalin; Japon.

ISCHAEMUM L. (Gramin.).
Baileyi *C. E. Hubbard in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. sub t. 3263, p. 2 (1935).—Austral. (Queensland).
conjugatum *Roxb. Hort. Beng.* 8 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 323 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 321 (1832).—Ind. or. (Bengal).
corollatum (*Steud.*) *W. Watson in Atkinson, Gaz. N. W. Ind.* 392 (1882): Andropogon corollatus.
cuspidatum *Roxb. Hort. Beng.* 81 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 325 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 324 (1832).—Ind. or. (Bengal).
geniculatum *Roxb. l. c.* 8, nomen; *et l. c.* 324; *et l. c.* 322.—Ind. or. (Bengal).
juncifolium *Ballard & C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 107.—N. Rhodesia.
Koenigii (*Hook. f.*) *Stapf ex C. E. C. Fischer in Gamble, Fl. Madras*, 1722 (1934): I. aristatum (non *L.*) *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 126 (1896) subsp. Koenigii.
lanceolatum *Keng in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 155.—China (Yunnan).
mangaluricum (*Hackel*) *Stapf ex C. E. C. Fischer in Gamble, Fl. Madras*, 1723 (1934): I. aristatum (non *L.*) *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 126 (1896) var. mangaluricum.
Rangacharianum *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1933, 352.—Ind. or. (Malabar; Travancore).
repens *Roxb. Hort. Beng.* 82 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 325 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 323 (1832).—Penins. Mal.
semisagittatum *Roxb. l. c.* 8, nomen; *et l. c.* 322; *et l. c.* 320.—Ind. or. (Bengal).
speciosum (*Steud.*) *W. Watson in Atkinson, Gaz. N.W. Ind.* 392 (1882): Andropogon speciosus.
Stokesii *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 84, 53 (1931).—Polynes. (Ins. Rapa).
tenellum *Roxb. Hort. Beng.* 82 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 324 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 323 (1832).—Ind. or.
Thomsonianum *Stapf ex C. E. C. Fischer in Gamble, Fl. Madras*, 1722 (1934): I. murinum *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 135 (1896), non *Forst.*
travancorense *Stapf ex C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1933, 353.—Ind. or. (Travancore; Madras).

ISCHNEA F. Muell. (Compos.).
korythoglossa *Mattf. in Nova Guinea*, xiv. 526 (1932).—N. Guin.

ISCHNOSIPHON Koern. (Marantac.; Scitamin., Gen. Pl.).
flagellatus *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 351.—Bras. (Amaz.).
Killipii *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 55 (1931).—Peruv.
neotericus *Macbride, l. c.* 57.—Peruv.
ornatus *Macbride, l. c.*—Peruv.
verruculosus *Macbride, l. c.* 56.—Peruv.
wyomingensis *Macbride, l. c.* 57.—Peruv.

ISEILEMA Anderss. (Gramin.).
calvum *C. E. Hubbard in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3286 (1935).—N. Austral.; Queensland.
ciliatum *C. E. Hubbard, l. c.* sub t. 3286, p. 6.—Austral. (Queensland).
convexum *C. E. Hubbard, l. c.* p. 8.—Austral. (Queensland).
dolichotrichum *C. E. Hubbard, l. c.* t. 3285.—Austral. (Queensland).
trichopus (*Benth.*) *C. E. Hubbard, l. c.* sub t. 3286, p. 7: Anthistiria membranacea var. trichopus.
Windersii *C. E. Hubbard, l. c.* t. 3284.—Austral. (Queensland).

ISERTIA Schreb. (Rubiac.).
alba (*K. Schum. & Krause*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 346 (1931): Cassupa alba.
juruana (*K. Schum. & Krause*) *Standley, l. c.*: Cassupa juruana.
panamensis (*Standley*) *Standley, l. c.*: Cassupa panamensis.
Pittieri (*Standley*) *Standley, l. c.*: Cassupa Pittieri.
scarlatina (*K. Schum. & Krause*) *Standley, l. c.*: Cassupa scarlatina.

ISERTIA:—
verrucosa (*Humb. & Bonpl.*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 346 (1931): Cassupa verrucosa.

ISLAYA Backeb. Blätter Kakteenforsch. 1934, Pt. 3, [p. 5], nomen, Pt. 10, [p. 3], descr. *CACTACEAE*.
islayensis (*Först.*) *Backeb. l. c.* Pt. 3, [p. 5]: Echinocactus islayensis.
minor *Backeb. l. c.* Pt. 10, [p. 4].—Peruv.
molendensis *Backeb. l. c.* 1935, Pt. 7, [p. 7], in obs., nomen.—Peruv.

ISNARDIA L. (Onagrac.).
intermedia *Small & Alexander in Small, Man. Southeast. Fl.* 940 (1933).—U.S.A. (Florida).
media *Small, l. c.* 1506, sphalm.?: I. intermedia.

ISOBERLINIA Craib & Stapf (Legumin.).
tomentosa (*Harms*) *Craib & Stapf in Kew Bull.* 1912, 93: Berlinia tomentosa.

ISODICTYOPHORUS Briq. in Bull. Soc. Bot. France, 1914, lxi. Mém. 8, 285 (1917). *LABIATAE*.
Chevalieri *Briq. l. c.*—Senegal.

ISODON Schrad. (Labiat.).
koroënsis *Kudo in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1931, iii. 110.—Formosa.

ISOGLOSSA Oerst. (Acanthac.).
bracteosa *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1086 (1934).—Tanganyika Terr.
oreacanthoides *Mildbr. l. c.*—Tanganyika Terr.
ovata *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1932, 100.—Kenya Col.; Tanganyika Terr.
Schliebenii *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 98 (1934).—Tanganyika Terr.

ISOLEPIS R. Br. (Cyperac.).
gracilis *H. B. & K. Nov. Gen.* i. 223 (1816).—Colomb.

ISOLOMA Decne. (Gesneriac.).
bogotense *Nicholson, Ill. Dict. Gard.* ii. 201 (1885).—Colomb.
Ceciliae *Nicholson, l. c.*—Colomb.
digitaliflorum *Nicholson, l. c.*—Colomb.
Luciani (*André*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 793 (1895): Sciadocalyx Luciani.
Ortgiesii (*v. Houtte ex Planch.*) *Voss, l. c.*: Tydaea Ortgiesii.
Regelianum (*Warscz. ex Planch.*) *Voss, l. c.*: Gesneria Regeliana.

ISOLONA Engl. (Annonac.).
Soubreana *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 58 (1927), in clavi.—Liberia; Côte d'Ivoire.

ISOPAPPUS Torr. & Gray (Compos.).
validus *Rydb. in Brittonia*, i. 100 (1931).—U.S.A. (Kansas; Oklahoma; Texas).

ISOPTERA Scheff. (Dipterocarpac.).
dasyrrhachis *v. Slooten ex Endert in Tectona*, 1935, xxviii. 295, in syn.: Shorea dasyrrhachis.
seminis (*de Vriese*) *Burkill in Kew Bull.* 1935, 317; *Burkill, Dict. Econ. Prod. Mal. Penins.* ii. 1254 (1935), in obs.: Hopea seminis.
sumatrana *v. Slooten ex Thorenaar in Meded. Proefst. v. h. Boschw. Buitenzorg*, xvi. 115 (1926); cf. *Foxworthy in Malay. For. Rec.* No. 10, 238 (1932).—Penins. Mal.

ISOPYRUM L. (Ranunculac.).
arisanense (*Hayata*) *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 141: I. adiantifolium var. arisanense.
Numajirianum *Makino in Journ. Jap. Bot.* vii. 11 (1931).—Japon. (Hondo).
pteridifolium *Hand.-Mazz. in Beih. Bot. Centralbl.* xlviii. II. 304 (1931).—China (Kwangtung).
Yamatsutanum *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 80.—Manchur.

ISOSTIGMA Less. (Compos.).
Molfinianum *Sherff in Bot. Gaz.* 1931, xci. 312.—Argent.

ISOTOMA Lindl. (Campanulac.).
anethifolia *Summerhayes in Kew Bull.* 1932, 318.—Austral. (Queensland; N. S. Wales).

ISOTOMA:—
Armstrongii *E. Wimm. in Fedde, Repert.* xxxviii. 77 (1935).—Austral. (N. Territory).

ISOTREMA Rafin. (Aristolochiac.).
heterophylla (*Hemsl.*) *Stapf in Bot. Mag.* sub t. 8957 (1923), in obs.: Aristolochia heterophylla.
lasiops *Stapf, l. c.*, in adnot.—China (Hupeh).

ITEA L. (Saxifragac.).
amoena *Chun in Sunyatsenia*, i. 238 (1934).—China (Kwangtung).
fragrans *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 420 (1824).—Penins. Mal.
macrophylla *Wall. l. c.* 419.—Ind. or. (Assam).
umbellata *Roxb. Hort. Beng.* 85 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 419 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 632 (1832).—Arch. Mal.

ITOA Hemsl. (Flacourtiac.).
Stapfii (*Koord.*) *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1026 (1934): Poliothyrsis Stapfii.

IVANIA O. E. Schulz in Fedde, Repert. xxxiii. 188 (1933). *CRUCIFERAE.*
cremnophila (*I. M. Johnston*) *O. E. Schulz, l. c.*: Cardamine cremnophila.

IXERIS Cass. (Compos.).
capillaris *Nakai, Kamikochi-Tennenkinenbutsu-Chosahokoku*, 41 (1928); cf. *Kitamura in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 287, in syn.: I. stolonifera subsp. capillaris *Kitamura*.
Kimurana *Kitamura*; cf. *Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. p. (6), japonice; *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 133, in syn.: I. dentata subsp. Kimurana *Kitamura*.
lanceolata *Chang in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 514 (1932).—China (Kiangsu).
litoralis *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 132, in syn.: I. japonica subsp. litoralis *Kitamura*.
Makinoana (*Kitamura*) *Kitamura in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 284: Lactuca Makinoana.
musashensis *Makino & Hisauchi in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 43.—Japon.
Oldhami (*Maxim.*) *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 134: Lactuca Oldhami.
stenophylla (*Makino*) *Masamune, Prelim. Rep. Veg. Yakus.* 28 (1929); *Masamune in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* xi., Bot. No. 4, 458 (1934): Lactuca stenophylla.
transnokoënsis (*Sasaki*) *Kitamura in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 284: Lactuca transnokoënsis.
trifida *Kitamura, l. c.* 289, in clavi.—Japon.

IXIA L. (Iridac.).
angusta *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1931, xxi. 367, 369.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Duckittiae *L. Bolus, l. c.* 281, 282.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Framesii *L. Bolus, l. c.* 367, 369.—Afr. austr. (Cape Prov.).
namaquana *L. Bolus, l. c.* 369.—Little Namaq.
pauciflora *Lewis in S. Afr. Gard.* 1933, xxiii. 213.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Rouxii *Lewis, l. c.* 1931, xxi. 369.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Stohriae *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1931, xxi. 281, 282.—Afr. austr. (Cape Prov.).
trifolia *Lewis in Fl. Pl. S. Afr.* 1934, xiv. t. 543.—Afr. austr. (Cape Prov.).

IXIOLIRION Fisch. (Amaryllidac.).
ixiolirioides (*Regel*) *Dandy in Journ. Bot.* 1932, lxx. 329: Kolpakowskia ixiolirioides.

IXODONERIUM Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine, iii. 1228 (1933). *APOCYNACEAE.*
annamense *Pitard, l. c.*—Indo-China (Anam).

IXONANTHES Jack (Linac.).
papuana (*Schlechter*) *H. Winkler in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 126 (1931), in obs.: Discogyne papuana.

IXORA L. (Rubiac.).
Ackeringae (*Teysm. & Binn.*) *Valeton ex Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 185 (1934): Pavetta Ackeringae.

IXORA:—
acuminata *Roxb. Hort. Beng.* 10 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 393 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 383 (1832).—Ind. or. (Assam).
aneityensis *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 7.—N. Hebrides.
aurorea *Ridley in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 251.—Penins. Mal.
Bandhuca *Roxb. Hort. Beng.* 10 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 386 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 376 (1832).—Ind. or.
barbata *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 394; *et l. c.* 384.—Ind. or.
bauchiensis *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 87 (1931).—Nigeria.
betongensis *Craib in Kew Bull.* 1932, 425.—Siam.
bipindensis *K. Schum. ex Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 86, in clavi, 87 (1931).—Nigeria; Cameroons.
brachiata *Roxb. Hort. Beng.* 10 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 391 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 381 (1832).—Ind. or. (Bengal).
bracteolata *Craib in Kew Bull.* 1932, 426.—Siam.
brevidens *Craib, l. c.*—Siam.
carolinensis *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 268: I. confertiflora *Valeton*.
cinerea *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxxvi. (*Hist. Nat. Pl.* vi. Atlas iv.) t. 421 (1897).—Madag.
congesta *Roxb. Hort. Beng.* 83 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 397 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 387 (1832).—Ins. Molucc.
cremixora *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxxvi. (*Hist. Nat. Pl.* vi. Atlas iv.) t. 418 (1897).—Madag.
cuneifolia *Roxb. Hort. Beng.* 10 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 390 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 380 (1832).—Ind. or. (Bengal).
Curtisii *Ridley in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 254.—Sumatra.
degemensis *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 86, in clavi, 87 (1931).—Nigeria.
divaricata *Hutchinson & Dalziel, l. c.* 87, in clavi, 89.—Liberia.
duidae *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 412 (1931).—Venez.
ebarbata *Craib in Kew Bull.* 1932, 427.—Siam.
fastigiata (*Good*) *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 191 (1934): Pavetta fastigiata.
fulgens *Roxb. Hort. Beng.* 10 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 387 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 378 (1832).—Ins. Molucc.
fulgida *Ridley in Kew Bull.* 1934, 119; *et in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 254.—Borneo.
gigantea *Ridley in Journ. As. Soc. Straits*, lxxix. 83 (1918): I. grandifolia *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 143 (1880), non *Zoll. & Morr.*
Havilandii *Ridley in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 255.—Borneo.
Hayatae *Kanehira in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1931, xxi. 146: I. graciliflora *Hayata*.
hippoperifera *Bremek. in Hook. Ic. Pl.* xxxii. t. 3241 (1934).—Cameroons.
Hookeri (*Oudem.*) *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 194 (1934): Pavetta Hookeri.
hydrangeiformis *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 430 (1894), in syn.: I. congesta.
irosinensis *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3251 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
Kingiana *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 159 (1934): I. humilis *King & Gamble*.
kratensis *Craib in Kew Bull.* 1932, 427.—Siam.
Kroneana (*Miq.*) *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 196 (1934): Pavetta Kroneana.
Lakshnakarae *Craib in Kew Bull.* 1932, 428.—Siam.
lancifolia *Ridley in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 256.—Borneo.
lancisepala *Ridley, l. c.* 253.—Borneo.
laxissima (*K. Schum.*) *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 86, in clavi, 87 (1931): Chomelia laxissima.
Linderi *Hutchinson & Dalziel, l. c.*—Liberia.
lunutica *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1932, 292.—Borneo.
macrantha (*Steud.*) *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 194, 198 (1934): Pavetta macrantha.

IXORA:—
marquesensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 301 (1935).—Ins. Marquesas (Mohotani).
Marsdenii *Ridley in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 255.—Sumatra.
matangensis *Ridley, l. c.* 254.—Borneo.
Miquelii *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 192 (1934): Pavetta floribunda *Miq.*, non Ixora floribunda *Griseb.*
Mjoebergii *Merrill in Sarawak Mus. Journ.* iii. 536 (1928).—Borneo.
Nienkui *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 324 (1935).—China (Hainan).
nigrescens *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxxvi. (*Hist. Nat. Pl.* vi. Atlas iv.) t. 420 (1897).—Madag.
pantjarensis *Hochr. in Candollea*, v. 258 (1934).—Java.
Parkinsoniana *Craib in Kew Bull.* 1932, 428.—Siam.
Pavetta *Roxb. Hort. Beng.* 10 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 395 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 385 (1832).—Ind. or.
peruviana (*Spruce ex K. Schum.*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 296 (1931): Cephalanthus peruvianus.
planifolia *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 196 (1934): I. Korthalsiana *Boerl.*
raiateënsis *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 42 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
Ridleyi *Merrill in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 132 (1935): I. crassifolia *Ridley*.
rosea *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 398 (1820).—Ind. or. (Assam).
salicina *Ridley in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 253, in obs.: I. stenophylla *Ridley*, non Pavetta stenophylla *Korth.*
sessililimba *Merrill in Sarawak Mus. Journ.* iii. 536 (1928).—Borneo.
Shawii *Hort. ex Neumann in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1930, xlv. 183, in obs.—Hort.
spathoidea *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 303 (1935).—Ins. Marquesas (Hivaoa).
Stokesii *Forest Brown, l. c.* 304.—Polynes. (Ins. Rapa).
straminea *Craib in Kew Bull.* 1932, 429.—Siam.
stricta *Roxb. Hort. Beng.* 10 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 388 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 379 (1832).—Ins. Molucc.
surinamensis *Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 273.—Guiana Bat.
temehaniensis *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 43 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
tenuiflora *Roxb. Hort. Beng.* 83 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 397 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 387 (1832).—Ins. Molucc.
Teysmannii (*Hassk.*) *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 206 (1934): Pavetta Teysmanni.
tomentosa *Roxb. Hort. Beng.* 10 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 396 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 386 (1832).—Ind. or.
trichobotrys *Merrill in Sarawak Mus. Journ.* iii. 555 (1928).—Borneo.
undulata *Roxb. Hort. Beng.* 10 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 395 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 385 (1832).—Ind. or. (Bengal).
Valetonii *Hochr. in Candollea*, v. 261 (1934): I. odorata *Koord. & Valeton*.
Versteegii *Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 274.—Guiana Bat.
villosa *Roxb. Hort. Beng.* 10 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 392 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 383 (1832).—Ind. or. (Assam).
Volkensii *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 269: I. pulcherrima *Volkens*.

J

JACKIA Wall. in Roxb. Fl. Ind., ed. Carey & Wall., ii. 321 (1824). *RUBIACEAE.*
ornata *Wall. l. c.*—Arch. Mal.

JACKSONIA R. Br. (Legumin.).
argentea *C. A. Gardner in For. Dep. Bull., W. Austral.* No. 32, 54 (1923).—W. Austral.

JACOBINIA Moric. (Acanthac.).
carnea (*Lindl.*) *Nicholson, Ill. Dict. Gard.* ii. 206 (1885): Justicia carnea.
Pohliana (*Nees*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 810 (1895), in obs.: Cyrtanthera Pohliana.
splendens *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in syn.: J. magnifica.
velutina (*Nees*) *Voss in Vilmorin, l. c.*: Cyrtanthera Pohliana f. velutina.

JACQUEMONTIA Choisy (Convolvulac.).
Houseana *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 140 (1932).—Brit. Honduras.

JACQUESHUBERIA Ducke (Legumin.).
purpurea *Ducke in Tropical Woods*, 1932, No. 31, 14.—Bras. (Amaz.).

JACQUINIA L. (Theophrastac.; Myrsinac., Gen. Pl.).
cuneata *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 77 (1935).—Mexico.
paludicola *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 138 (1932).—Brit. Honduras.
Schippii *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 78 (1935).—Brit. Honduras.
Seleriana (sphalm. Sileriana Jacquinia) *Urb. & Loes. in Meded. Dep. Landb.* No. 17 (*Greshoff, Beschr. Gift. Pl. Vischv.* iii. Suppl.) 125 (1913), nomen.—Mexico; Guatem.

JAPONOLIRION Nakai (Liliac.).
Saitoi *Makino & Tatewaki in Journ. Jap. Bot.* vii. 5, 18 (1931).—Japon. (Hokkaido).

JASIONE L. (Campanulac.).
brevisepala *Rothmaler in Cavanillesia*, vii. 121 (1935).—Hispan.
castellana *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 101.—Hispan.
crispa (*Pourr.*) *G. Sampaio in Ann. Acad. Polyt. Porto*, xiv. 161 (1921): Phyteuma crispum.
prolifera *Bellardi ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 35 (1835), in obs.—Ital. ?

JASIONELLA Stoyanoff & Stefanoff, Fl. Bulg. ed. 2, 986 (1933). *CAMPANULACEAE.*
bulgarica (*Stoyanoff & Stefanoff*) *Stoyanoff & Stefanoff, l. c.*: Jasione bulgarica.

JASMINUM L. (Oleac.).
alongense *Gagnep. in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1052 (1933); *et in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 73.—Indo-China (Tonkin).
angustitubum *Knobl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 674 (1932).—Tanganyika Terr.
anodontum *Gagnep. in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1040 (1933); *et in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 73.—Indo-China (Anam; Cochinch.).
arborescens *Roxb. Hort. Beng.* 3 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 94 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 95 (1832).—Ind. or. (Bengal).
bracteatum *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 92; *et l. c.* 94.—Sumatra.
Brieyi *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 471 (1932).—Congo Belg.
chrysanthemum *Roxb. Hort. Beng.* 3 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 98 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 99 (1832).—Ind. or.
coarctatum *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 91; *et l. c.* 92.—Ind. or. (Bengal).
crassum *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 186 (1934).—Sumatra.
dispermum *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 99 (1820).—Nepal.
Duclouxii (*Léveillé*) *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1934, xv. 307: Melodinus Duclouxii.
Eberhardtii *Gagnep. in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1051 (1933); *et in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 73.—Indo-China (Tonkin).
elegans (*Hemsl.*) *Yamamoto in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1932, xxii. 410: J. undulatum var. elegans.

JASMINUM:—
Farreri *Gilmour in Bot. Mag.* t. 9351 (1934).—Burma.
Francii *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1933, Sér. II. v. 323.—N. Caled.
fuchsiifolium *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 74.—China (Kweichau).
Gibbsiae *Ridley in Kew Bull.* 1934, 121.—Borneo.
Harmandianum *Gagnep. in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1045 (1933); *et in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 74.—Laos; Cambodia; Cochinch.
Hemsleyi *Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1933, v. 55: J. undulatum var. elegans *Hemsl.*
heterophyllum *Roxb. Hort. Beng.* 3 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 99, 164 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 100 (1832).—Nepal.
Kajewskii *C. T. White in Contrib. Arn. Arb.* No. iv. 90 (1933).—Austral. (Queensland).
lanceolarium *Roxb. Hort. Beng.* 3 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 97 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 98 (1832).—Ind. or. (Assam).
Lang *Gagnep. in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1046 (1933); *et in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 74.—Indo-China (Tonkin; Anam).
latifolium *Roxb. Hort. Beng.* 3 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 93 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 95 (1832).—Ind. or. (Bengal).
laurifolium *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 91; *et l. c.* 92.—Reg. Himal.; Burma.
laxiflorum *Gagnep. in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1055 (1933); *et in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 75.—Indo-China (Anam; Cochinch.).
longisetum *Gagnep. l. c.* 1056; *et l. c.*—Tonkin; Anam; Cochinch.
Magentae *Guillaumin*; *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 697, descr. ampl.—N. Caled.
melastomifolium *Ridley in Kew Bull.* 1934, 122.—Borneo (Banguey).
multipetalum *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 187 (1934).—Sumatra.
paniculatum *Roxb. Hort. Beng.* 3 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 97 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 99 (1832).—China.
pedunculatum *Gagnep. in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1054 (1933); *et in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 76.—Indo-China (Tonkin; Anam).
pellucidum *Airy-Shaw in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3282 (1935).—Borneo.
Pierreanum *Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1042 (1933); *et in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 76.—Cambodia; Cochinch.
pinfaënse *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 77.—China (Kweichau).
promunturianum *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1933, lxxviii. Beibl. 19, 367.—N. Caled.
punctulatum *Chiov. Fl. Somala*, II. 279 (1932).—Somal. Ital.
rotundatum *Knobl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1078 (1934).—Tanganyika Terr.
rufo-hirtum *Gagnep. in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1057 (1933); *et in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 77.—Indo-China (Tonkin; Laos).
Schneideri *Léveillé in Le Monde des Plantes*, 1916, xviii. 31, in obs: Melodinus Duclouxii.
spectabile *Ridley in Kew Bull.* 1934, 122.—Borneo.
× stephanense *V. Lemoine, Cat.* No. 195, 9 (1921); *Meunissier in Rev. Hort.* 1927, n. s. xx. 643; *Kobuski in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 162.—China (Yunnan).
tonkinense *Gagnep. in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1053 (1933); *et in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 77.—Indo-China (Tonkin; Laos).
triandrum *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1932, 294.—Borneo.
tubiflorum *Roxb. Hort. Beng.* 80 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 96 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 97 (1832).—Arch. Mal.

JASMINUM:—
Wengeri *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1931, 283.—Ind. or. (Assam).
Wittei *Staner in De Wild. & Staner, Contrib. Fl. Katanga*, Suppl. iv. 80 (1932).—Congo Belg.

JATROPHA L. (Euphorbiac.).
aculeatissima *Colla, Herb. Pedem.* v. 112 (1836).—Bras.
decipiens *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 56 (1933–5).—Mexico.
Dichtar *Macbride in Candollea*, v. 381 (1934): J. ferox *Pax.*
mahafalensis *Jumelle & H. Perrier in Bull. Écon. Madag.* 1910, 179, 180.—Madag.
marginata *Chiov.*; *Chiov. Fl. Somala*, II. 391 (1932), descr.—Somal. Ital.
parvifolia *Chiov. Nuov. Contrib. Somal. Ital.* (*Atti Soc. Nat. e Mat. Modena*, lxvi.: 1935) 18 (1934).—Somaliland.
tetracantha *Chiov. Fl. Somala*, II. 393 (1932).—Somal. Ital.
trifida *Chiov. l. c.* 388.—Somal. Ital.

JATRORHIZA Miers ex Planch. in Hook. Ic. Pl. viii. sub t. 1759 (1848), in obs.; [Jateorhiza] Miers in Hook. Niger Fl. 212 (1849). *MENISPERMACEAE.*
macrantha (*Hook. f.*) *Exell & Mendonça in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. Suppl., 10: Cocculus macranthus.

JOBALBOA Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya, 19 (1935). *ICACINACEAE.*
aberdarica *Chiov. l. c.* 20.—Kenya Col.

JOBINIA Fourn. (Asclepiadac.).
chlorantha (*K. Schum.*) *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxv. A. No. 7, 3 (1933): Roulinia chlorantha.

JOHNIA Roxb. Hort. Beng. 5 (1814), nomen; Fl. Ind., ed. Carey & Wall., i. 172 (1820); Fl. Ind., ed. Carey, i. 168 (1832). *CELASTRACEAE.*
coromandeliana *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 173; *et l. c.* 169.—Ind. or.
salacioides *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 172; *et l. c.* 168.—Ind. or. (Bengal).

JOHRENIA DC. (Umbellif.).
lycaonica *Bornm. in Engl. Jahrb.* lxvii. 295 (1935).—As. Min. (Anatolia).

JOINVILLEA Gaudich. (Flagellariac.).
Bryanii *Christoph. in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 128, 44 (1935).—Samoa.

JONTHLASPI [Tourn.] All. Stirp. Nic. 119 (1757). *CRUCIFERAE.*

JOOSIA Karst. (Rubiac.).
dichotoma (*Ruiz & Pav.*) *Karst. Fl. Columb.* i. 9 (1858–61): Cinchona dichotoma.

JUANULLOA Ruiz & Pav. (Solanac.).
bicolor *Gleason in Phytologia*, i. 37 (1933).—Colomb.

JUGLANS L. (Juglandac.).
Hindsii (*Jepson*) *Jepson ex R. E. Smith in Univ. Calif. Agric. Exper. Stat. Bull.* No. 203, 27 (1909), in obs.; *Jepson in Madroña*, i. 57 (1917): J. californica var. Hindsii.
hopeiensis *Hu in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* 1932, iii. 173; *et l. c.* 1934, v. 305.—China (Chihli).

JULOCROTON Mart. (Euphorbiac.).
Ostenii *Herter, Fl. Urug. Pl. Vasc.* (*Estud. Bot. Reg. Urug.* iv.) 80 (1931), nomen.—Urug.

JUNCELLUS C. B. Clarke (Cyperac.).
Michelianus (*L.*) *Blatter & McCann in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxvii. 33 (1934): Scirpus Michelianus.

JUNCUS L. (Juncac.).
acutissimus (*Buchenau*) *Adamson in Journ. Linn. Soc., Bot.* l. 6 (1935): J. glaucus var. acutissimus.
× alpiniformis *Fernald in Rhodora*, 1933, xxxv. 235.—Newfoundland.
amblyocarpus *Rydb. in Brittonia*, i. 85 (1931): J. articulatus var. obtusatus *Engelm.*
amuricus (*Maxim.*) *Krecz. & Gontsch. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 516 (1935): J. bufonius var. amuricus.

JUNCUS:—
apiculatus *Adamson in Journ. Linn. Soc., Bot.* l. 27 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
arabicus (*Aschers. & Buchenau*) *Adamson, l. c.* 10: J. maritimus var. arabicus.
arianus *Krecz. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 99 (1932).—Turkestan.
atropurpureus *Adamson in Journ. Linn. Soc., Bot.* l. 30 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
bombonzanensis *Satake in Journ. Fac. Sc. Tokyo*, Sect. III. Bot. iv. 182 (1933).—Formosa.
brachytepalus *Krecz. & Gontsch. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 547, 630 (1935).—As. centr.
× Brueggeri *Domin in Preslia*, xiii–xv. 23 (1935).—Czechoslovak.
camptotropus *Krecz. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 99 (1932).—As. Min.
decipiens (*Buchenau*) *Nakai, Veg. Kamikochi*, 35 (1928); cf. *Miyabe & Kudo in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 299 (1932): J. effusus var. decipiens.
erythropodus *Krecz. in Bull. Univ. As. Med.* xxi. 176 (1935).—Eur. centr. et austr.; As. occ. et centr.
exilis *Osterh. in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1930, lvii. 559 (1931).—U.S.A. (Colorado).
fasciculiflorus *Adamson in Journ. Linn. Soc., Bot.* l. 8 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
filifolius *Adamson, l. c.* 36.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Fischerianus *Krecz. in Fl. Transbaical.* ii. 142 (1931); cf. *Komarov, Fl. URSS*, iii. 537 (1935).—Sibir. (Transbaical.).
× fulvescens *Fernald in Rhodora*, 1933, xxxv. 236.—Am. bor.-or.
gracillimus (*Buchenau*) *Krecz. & Gontsch. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 528, 627 (1935): J. compressus var. gracillimus.
heptopotamicus *Krecz. & Gontsch. l. c.* 530, 628.—Songaria.
jaxarticus *Krecz. & Gontsch. l. c.* 532, 628.—As. centr.
Juzepczukii *Krecz. & Gontsch. l. c.* 519, 625.—Caucas.; Sibir.
kansanus *Hermann in Papers Mich. Acad. Sc.* 1934, xx. 41 (1935).—U.S.A. (Kansas).
leucochlamys *Zing. ex Krecz. in Fl. Transbaical.* ii. 141 (1931); *Krecz. & Gontsch. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 526, 627 (1935).—Sibir.; Mongol.
Liebmanni *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 9 (1931): J. brevifolius *Liebm.*
litorum *Rydb. in Brittonia*, i. 85 (1931): J. balticus var. littoralis *Engelm.*
macrantherus *Krecz. & Gontsch. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 524, 626 (1935).—As. centr.
Marshallii *Pugsley in Journ. Bot.* 1931, lxix. 279, 282.—Scotia.
minutulus *Krecz. & Gontsch. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 520, 625 (1935).—As. occ.
mogadorensis *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 31 (1932).—Marocc.
nastanthus *Krecz. & Gontsch. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 517, 624 (1935).—As. occ. et centr.
Nevskii *Krecz. & Gontsch. l. c.* 545, 629.—Transcasp.; As. centr.
nikkoënsis *Satake in Journ. Fac. Sc. Tokyo*, Sect. III. Bot. iv. 185 (1933).—Japon. (Hondo).
× nodosiformis *Fernald in Rhodora*, 1933, xxxv. 235.—Newfoundland.
oligocephalus *Satake & Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 104.—Ins. Kuril.; Japon.
palensis *Maly in Glasnik Zemal. Muz. Bosn.-Herceg.* xlv. 57 (1933); cf. *Fedde, Repert.* xxxvi. 175 (1934).—Jugoslav.
pyrenaicus (*Cadevall & Pau*) *Cadevall & Pau in Cadevall & Font Quer, Fl. Catal.* v. 419 (1933), in obs.: J. stygius var. pyrenaicus.
rhiphaenus *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1929, No. 64 [1930], hybr. ?—Marocc.
rifeus *Pau & Font Quer ex Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 122 [1933], nomen.—Marocc.
Schischkini *Krylov & Sumnev. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1928, No. 7, p. 1.—Sibir.
sphagnetorum (*Buchenau*) *Adamson in Journ. Linn. Soc., Bot.* l. 29 (1935): J. capensis var. sphagnetorum.

JUNCUS:—
subcuneatus *Adamson in Journ. Linn. Soc., Bot.* l. 23 (1935).—Afr. austr.
subglobosus *Adamson, l. c.* 24.—Afr. austr.
suboxycarpus *Adamson, l. c.* 14.—Angola; Afr. austr.
sundaicus *Ridley in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 342.—Sumatra; Java.
taonanensis *Satake & Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 610.—Manchur.
Turczaninowii (*Buchenau*) *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 539, 629 (1935): J. lamprocarpus var. Turczaninowi.
turkestanicus *Krecz. & Gontsch. l. c.* 519, 625.—Persia; As. centr.
umbellatus *Adamson in Journ. Linn. Soc., Bot.* l. 38 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
viridifolius *Adamson, l. c.* 20.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Vvedenskyi *Krecz. in Bull. Univ. As. Centr.* xxi. 176 (1935).—As. centr.
Webbianus *Krecz. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 98 (1932).—Hispan.
yakeisidakensis *Satake in Journ. Fac. Sc. Tokyo*, Sect. III. Bot. iv. 189 (1933).—Japon. (Hondo).

JUNGIA L. f. (Compos.).
aceroides *Cuatrec. in An. Univ. Madrid*, iv. Fasc. 2, 227 (1935).—Ecuador.
vitocensis *Cuatrec. l. c.* 230.—Peruv.

JUNIPERUS L. (Pinac.; Conif., Gen. Pl.).
Ashei *Buchholz in Bot. Gaz.* 1930, xc. 329.—U.S.A. (Arizona; Colorado; Missouri; Arkansas).
Corneyana *Hort. ex Dallimore & A. B. Jackson, Handb. Conif.* 225 (1923), in syn.: Cupressus torulosa var. Corneyana.
cosnino *Lemmon in Sierra Cl. Bull.* iv. 123 (1902), in obs.—U.S.A. (Arizona).
Coxii *A. B. Jackson in New Fl. & Silv.* v. 33 (1932).—Upper Burma.
Ekmanii *Florin in Arkiv Bot., Stockh.* xxv. A. No. 5, 14 (1933).—Hispaniola.
formosana *Hayata in Journ. Coll. Sc. Tokyo*, xxv. Art. 19, 209 (1908).—Formosa.
rebunensis *Kudo, Medic. Pl. Hokk.* t. 6 (1922); cf. *Hara in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 796, in syn.: J. sibirica.
schugnanica *Komarov in Journ. Bot. URSS*, xvii. 482 (1932); *Komarov, Fl. URSS*, i. 190 (1934).—Hab. ?
seravschanica *Komarov, l. c.* 481; *Komarov, l. c.* 187.—Hab. ?
silicicola (*Small*) *L. H. Bailey, Cult. Conif. N. Amer.* 18, in adnot., 197, in obs. (1933): Sabina silicicola.
tsukusiensis *Masamune, Prelim. Rep. Veg. Yakus.* 39 (1929); *Masamune in Bot. Mag., Tokyo*, 1930, xliv. 50; *et in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* xi., Bot. No. 4, 131 (1934).—Japon. (Kiushiu); Formosa.
turcomanica *B. Fedtsch. in B. Fedtsch. & al., Fl. Turkm.* i. 14 (1932).—Transcasp.

JUNO Tratt. (Iridac.).
kopetdagensis *Vved. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 575 (1935), in syn.: Iris kopetdagensis.
leptorrhiza *Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xxi. 151 (1935).—As. centr.
linifolia (*O. Fedtsch.*) *Vved. l. c.* 152, in obs.: Iris linifolia.
maracandica *Vved. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 573 (1935), in syn.: Iris maracandica.
Nicolai *Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xxi. 151 (1935).—As. centr.
parvula *Vved. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 563 (1935), in syn.: Iris parvula.
Popovii *Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xxi. 152 (1935).—As. centr.
Rosenbachiana (*Regel*) *Vved. l. c.*, in obs.: Iris Rosenbachiana.
tadshikorum *Vved. l. c.*—As. centr.
vicaria *Vved. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 569 (1935), in syn.: Iris vicaria.

JUPUNBA Britton & Rose (Legumin.).
trapezifolia (*Vahl*) *Moldenke in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1932, lix. 155: Mimosa trapezifolia.

JURINEA Cass. (Compos.).
asperifolia *Iljin in Trans. Sc. Soc. Turk.* ii. 25 (1925).—Turkestan.
atropurpurea *C. Winkler ex Iljin, l. c.* 26.—Turkestan.
baissunensis *Iljin, l. c.*—Turkestan.
breviscapa *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxvi. 146 (1934).—As. Min. (Lydia).
caespitosa *C. Winkler ex O. & B. Fedtsch.*; *Iljin in Trans. Sc. Soc. Turk.* ii. 27 (1925), descr.—Turkestan.
Cooperi *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 21 (1933).—Tibet; Ind. or. (Sikkim).
crispo-undulata *Chang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 67 (1935).—Tibet.
Eduardi-Regelii *Iljin in Trans. Sc. Soc. Turk.* ii. 18 (1925).—Turkestan.
Gabrielae *Bornm. in Fedde, Repert.* xxxvi. 166 (1934).—Persia.
Georgei *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 21 (1933).—China (Yunnan).
Grossheimii *Sosn. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 172 (1934).—Caucas.
grumosa *Iljin in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 3, 107 (1928).—Turkestan. (Thian Shan).
hissarica *Iljin in Trans. Sc. Soc. Turk.* ii. 25 (1925).—Turkestan.
Lipskyi *Iljin, l. c.* 23.—Turkestan.
mirabilis *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 22 (1933).—China (Yunnan).
nargalensis *Iljin in Trans. Sc. Soc. Turk.* ii. 22 (1925).—Turkestan.
Paczoskiana *Iljin in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 345 (1932).—Rossia (Ukraine).
salicifolia *Gruner*; *Iljin, l. c.* 347, descr. emend.—Rossia (Ukraine).
sangardensis *Iljin in Trans. Sc. Soc. Turk.* ii. 25 (1925).—Turkestan.
serratuloides *Iljin, l. c.* 27.—Turkestan.
stenophylla *Iljin in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 185 (1933).—Ross. asiat. centr.
tapetodes *Iljin in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 344 (1932).—Transcasp.
taraxacifolia *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 23 (1933).—Upper Burma.
transhyrcana *Iljin in Trans. Sc. Soc. Turk.* ii. 17 (1925).—Turkestan.
Woronowii *Iljin in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 185 (1933).—Caucas.

JUSSIAEA L. (Onagrac.).
neglecta *Small, Man. Southeast. Fl.* 945 (1933).—U.S.A. (S. E. States).
pedunculata *Colla, Herb. Pedem.* ii. 385 (1834).—Bras.

JUSTICIA L. (Acanthac.).
aequalis *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iv. 748 (1935).—Indo-China (Tonkin).
alba *Roxb. Hort. Beng.* 3 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 117 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 116 (1832).—Ins. Andaman.
alboviridis *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iv. 736 (1935).—Indo-China (Tonkin).
calcicola *Benoist, l. c.* 747.—Indo-China (Tonkin).
campechiana *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 88 (1935).—Mexico.
canaliculata *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iv. 744 (1935).—Indo-China (Tonkin).
candida *Benoist, l. c.* 738.—Indo-China (Tonkin).
clauda *Benoist in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 605.—Indo-China (Anam).
Clemensorum *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iv. 751 (1935).—Indo-China (Anam).
cochinchinensis *Benoist, l. c.* 746.—Cochinch.
cupricola *Robyns in Nat. Tijdschr.* xiv. (*Congr. Num.*) 103 (1932), nomen.—Congo Belg.
decussata *Roxb. Hort. Beng.* 4 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 128 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 127 (1832).—Burma.
dolichopoda *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 721 (1935).—Tanganyika Terr.
Eberhardtii *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iv. 749 (1935).—Indo-China (Tonkin).
equitans *Benoist, l. c.* 747.—Indo-China (Laos).
Evrardi *Benoist, l. c.* 735.—Indo-China (Anam).

JUSTICIA:—
fastidiosa *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iv. 751 (1935).—Indo-China (Anam).
Geoffrayi *Benoist, l. c.* 749.—Cambodia.
glabra *Koen. ex Roxb. Hort. Beng.* 4 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 132 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 130 (1832).—Ind. or.
glomerulata *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iv. 738 (1935).—Laos; Anam; Cambodia.
heterocarpoides *Blatter in Journ. & Proc. As. Soc. Beng.* 1930, n. s. xxvi. 344 (1931).—Ind. or. (Rajputana).
heterotricha *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1088 (1934).—Tanganyika Terr.
Hochreutineri *Macbride in Candollea*, vi. 19 (1934): Adhatoda Lindeniana *Nees*, non Justicia Lindeniana *Macbride*.
inermis *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iv. 750 (1935).—Indo-China (Anam).
infirma *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 410 (1932).—Tanganyika Terr.
ingrata *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iv. 741 (1935).—Indo-China (Anam).
kampotiana *Benoist, l. c.*—Cambodia.
keniensis *Rendle in Journ. Bot.* 1932, lxx. 162.—Kenya Col.
lamifolia *Koen. ex Roxb. Hort. Beng.* 4 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 135 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 134 (1832).—Ind. or. (Bengal).
lanceolaria *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 122; *et l. c.* 121.—Ind. or. (Assam).
laotica *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iv. 733 (1935).—Indo-China (Laos).
latebrosa *Koen. ex Roxb. Hort. Beng.* 80 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 126 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 125 (1832).—Ind. or.
leptostachya *Boldingh, Zakfl. Landbouwstr. Java*, 27 (1916).—Java.
Lindeniana (*Nees*) *Macbride in Candollea*, vi. 18 (1934): Rhytiglossa Lindeniana.
longula *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iv. 737 (1935).—Indo-China (Tonkin).
macrosperma *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 169 (1931), in obs., nomen.—Afr. austr.-occ.
monetaria *Benoist in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 605.—Indo-China (Tonkin).
multinodis *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iv. 734 (1935).—Indo-China (Laos; Anam).
Myurus *Benoist, l. c.* 739.—Indo-China (Tonkin).
orixensis *Koen. ex Roxb. Hort. Beng.* 80 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 133 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 132 (1832).—Ind. or. (Madras).
panduriformis *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iv. 736 (1935).—Indo-China (Tonkin).
paupercula *Benoist, l. c.* 748.—Indo-China (Tonkin).
Poilanei *Benoist, l. c.* 750.—Indo-China (Tonkin).
polysperma *Roxb. Hort. Beng.* 3 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 120 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 119 (1832).—Ind. or. (Bengal).
prominens *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iv. 746 (1935).—Laos; Cochinch.
psammophila *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1089 (1934).—Tanganyika Terr.
pseudopolystachya *Cufod. in Archiv. Bot., Forli*, 1934, x. 49.—Costa Rica.
quinqueangularis *Koen. ex Roxb. Hort. Beng.* 80 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 134 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 133 (1832).—Ind. or. (Madras).
ramosissima *Roxb. l. c.* 4, nomen; *et l. c.* 130; *et l. c.* 129.—Ind. or.
rhodantha *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iv. 742 (1935).—Indo-China (Laos).
Schliebenii *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 411 (1932).—Tanganyika Terr.
speciosa *Roxb. Hort. Beng.* 4 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 123 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 122 (1832).—Ind. or. (Bengal).
striata (*Klotzsch*) *Bullock in Kew Bull.* 1932, 502: Adhatoda striata.
striolata *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 411 (1932).—Tanganyika Terr.
thyrsiflora *Roxb. Hort. Beng.* 3 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 116 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 114 (1832).—Ind. or. (Bengal).

JUSTICIA:—
tinctoria *Roxb. Hort. Beng.* 4 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 124 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 123 (1832).—Ind. or. (Bengal).
tomentosa *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 132; *et l. c.* 131.—Ind. or.
vagabunda *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iv. 734 (1935).—Indo-China (Tonkin).
verticillata *Roxb. Hort. Beng.* 80 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 135 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 135 (1832).—Ind. or.
vitellina *Roxb. l. c.* 3, nomen; *et l. c.* 117; *et l. c.* 115.—Ind. or. (Bengal).

JUTTADINTERIA Schwantes (Ficoidac.).
buchubergensis *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 169 (1931), in obs., nomen.—Afr. austr.-occ.
decumbens *Schick & Tisch. in Kakteenk.* 1933, 48.—Little Namaq.
tetrasepala *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 343 (1932).—Namaqualand.

K

KADSURA Juss. (Magnoliac.).
sorsogonensis *Elmer ex Merrill, Enum. Philipp. Fl. Pl.* ii. 153 (1923), pro syn.: K. philippinensis.

KADUA Cham. & Schlecht. (Rubiac.).
kamapuaana *Degener, Fl. Hawaiiensis*, Fam. 332 (1932).—Ins. Sandvic. (Oahu).
raiateënsis *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 43 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
rapensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 283 (1935).—Polynes. (Ins. Rapa).
rurutensis *Forest Brown, l. c.* 286.—Ins. Austral. (Rurutu).

KAEMPFERIA L. (Zingiberac.; Scitamin., Gen. Pl.).
angustifolia *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 16 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 17 (1832).—Ind. or. (Bengal).
Evansii *Blatter in Journ. & Proc. As. Soc. Beng.* 1930, n. s. xxvi. 359 (1931).—Ind. or. (Madras).
Kirkii (*Hook. f.*) *Wittm. & Peering in Gartenflora*, 1892, xli. 57: Cienkowskya Kirkii.
linearis *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 20 (1820).—Reg. Himal.
Montagui *Leighton in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 57, 59.—S. Rhodesia.
secunda *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 19 (1820).—Reg. Himal.

KAJEWSKIA Guillaumin in Journ. Arn. Arb. 1932, xiii. 113. *PALMAE.*
aneityensis *Guillaumin, l. c.*—N. Hebrides.

KALANCHOË Adans. (Crassulac.).
aleurodes *Stearn in Journ. Bot.* 1931, lxix. 164; *et in Gard. Chron.* 1931, Ser. III. lxxxix. 475.—Rhodesia.
ambolensis *Humbert in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1933, Sér. II. v. 164.—Madag.
arborescens *Humbert, l. c.* 163.—Madag.
Blossfeldiana *v. Poelln. in Fedde, Repert.* xxxv. 159 (1934): K. globulifera var. coccinea *H. Perrier.*
citrina *Schweinf. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 285 (1915), in obs.—Arab.; Erythraea.
Faustii *Font Quer in Cavanillesia*, vii. 149 (1935).—Marocc.
insignis (*N. E. Brown*) *N. E. Brown in Hand-List Tender Dicot. & Gnetac. Roy. Bot. Gard. Kew*, ed. 2, 109 (1931): Cotyledon insignis.
Lugardii *Bullock in Kew Bull.* 1932, 489.—Kenya Col.; Tanganyika Terr.
Schliebenii *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 385 (1935).—Tanganyika Terr.
secunda *Werderm. l. c.* 384.—Tanganyika Terr.
zimbabwensis *Rendle in Journ. Bot.* 1932, lxx. 90.—S. Rhodesia.

KALLSTROEMIA Scop. (Zygophyllac.).
hirsuta (*Benth.*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 177 (1931): Tribulus hirsutus.
hirsuta *L. Williams in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1935, xxii. 49.—U.S.A. (Texas).

KALLSTROEMIA:—
minuta (*Leichh.*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 177 (1931): Tribulus minutus.
platyptera (*Benth.*) *Engl. l. c.*: Tribulus platypterus.

KALMIOPSIS Rehder in Journ. Arn. Arb. 1932, xiii. 31. *ERICACEAE.*
Leachiana (*L. F. Henderson*) *Rehder, l. c.* 32: Rhododendron Leachianum.

KAOUE Pellegr. in Bull. Soc. Bot. France, 1933, lxxx. 464. *LEGUMINOSAE.*
Stapfiana (*A. Cheval.*) *Pellegr. l. c.* 465: Oxystigma Stapfianum.

KARATAS Mill. (Bromeliac.).
candida *Hort. ex Mez in Engl. Pflanzenreich, Bromeliac.* 46 (1934), in syn.: Aregelia laevis.
cardinalis *Hort. ex Mez, l. c.* 61, in syn.: Nidularium procerum.
Karatas (*L.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 963 (1895), in obs.: Bromelia Karatas.
serra (*Griseb.*) *Burkill in Kew Bull.* 1935, 317; *Burkill, Dict. Econ. Prod. Mal. Penins.* ii. 1279 (1935): Bromelia serra.
striata (*Hort.*) *Hort. ex Guillaumin & Poupion in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 1022: K. Innocentii var. striata.

KAROMIA Dop in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 1932, Sér. II. iv. 1052. *VERBENACEAE.*
fragrans *Dop, l. c.* 1053.—Indo-China (Anam).

KAYEA Wall. (Guttif.).
Catharinae *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. viii. 108 (1934).—Sumatra.

KEDROSTIS Medik. (Cucurbitac.).
angulata (*Berg.*) *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 91 (1932): Sicyos angulata.
crassirostrata *Bremek. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 260 (1933).—Transvaal.

KEENANIA Hook. f. (Rubiac.).
capitata (*Ridley*) *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 82 (1932): Myrioneuron capitatum.

KEGELIELLA Mansf. in Fedde, Repert. xxxvi. 60 (1934): **Kegelia** Reichb. f. (Orchidac.).
Kupperi *Mansf. l. c.*—Costa Rica.

KENNEDYA Vent. (Legumin.).
bimaculata *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 208 (1894), in syn.: Hardenbergia monophylla.

KENTIA Blume (Palmae).
Mayrii *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 707 (1933).—N. Guin.
singaporensis *Hort. ex Becc. in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1935, n. s. xlii. 55, in syn.: Ptychoraphis singaporensis.

KENTRANTHUS Neck. (Valerianac.).
Kellereri (*Stoyanoff, Stefanoff & Georgieff*) *Stoyanoff & Stefanoff, Fl. Bulg.* ed. 2, 965 (1933): K. longiflorus var. Kellereri.

KENTROPHYLLUM Neck. (Compos.).
riphaeum *Font Quer & Pau ex Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 711 [1928], in syn.: Carthamus riphaeus.

KENTROSIPHON N. E. Brown in Trans. Roy. Soc. S. Afr. xx. 271 (1932). *IRIDACEAE.*
Duftii (*Schinz*) *N. E. Brown, l. c.* 272: Antholyza Duftii.
gracilis *N. E. Brown, l. c.*—Afr. austr.-occ.
propinquus *N. E. Brown, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).
saccatus (*Klatt*) *N. E. Brown, l. c.* 271: Anisanthus saccatus.
Steingroveri (*Pax*) *N. E. Brown, l. c.* 272: Antholyza Steingroveri.

KERAUDRENIA J. Gay (Sterculiac.).
monocarpa *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 81 (1931), nomen.—W. Austral.

KERMADECIA Brongn. & Gris (Proteac.).
leptophylla *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 198.—N. Caled.
lutea *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 86.—N. Hebrides.

KERMADECIA:—
neurophylla *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1933, Sér. II. v. 325.—N. Caled.
pronyensis (*Guillaumin*) *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1935, lxxxii. 277, in obs.: Grevillea pronyensis.

KETUMBULIA Ehrenb. ex v. Poelln. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 1933, li. 121, in syn.: **Talinum** Adans. (Portulacac.).
splendida *Ehrenb. ex v. Poelln. l. c.*, in syn.: Talinum cuneifolium.

KHADIA N. E. Brown; N. E. Brown in Gard. Chron. 1931, Ser. III. lxxxix. 279, descr. ampl. *FICOIDACEAE.*
acutipetala (*N. E. Brown*) *N. E. Brown, l. c.*: Mesembryanthemum acutipetalum.
Beswickii (*L. Bolus*) *N. E. Brown, l. c.*: Mesembryanthemum Beswickii.
Nationae (*N. E. Brown*) *N. E. Brown, l. c.*: Mesembryanthemum Nationae.
Nelsoni *N. E. Brown, l. c.*—Transvaal.

KHAYA A. Juss. (Meliac.).
Dawei *Stapf ex Broun & Massey, Fl. Sudan*, 231 (1929).—Sudan; Uganda.

KICKXIA Dumort. (Scrophulariac.).
bombycina (*Boiss. & Blanche*) *K. H. Rechinger in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1935, lxxxiv. 175: Linaria bombycina.
Brunneri (*Benth.*) *Janchen in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1933, lxxxii. 152: Linaria Brunneri.
dichondrifolia (*Benth.*) *Janchen, l. c.*: Linaria dichondrifolia.
ramosissima (*Wall.*) *Janchen, l. c.*: Linaria ramosissima.
spartioides (*Brouss. ex Buch*) *Janchen, l. c.*: Linaria spartioides.

KIGELIA DC. (Bignoniac.).
Talbotii *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 238 (1931).—Nigeria.

KIGGELARIA L. (Flacourtiac.; Bixac., Gen. Pl.).
flavo-velutina *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 86 (1934).—Tanganyika Terr.

KINETOSTIGMA Dammer (Palmae).
nanum *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 318 (1932).—Costa Rica.
Tuerckheimii (*Dammer*) *Burret, l. c.* 317; *et in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, xlvi. 228 (1932), in adnot.: Malortiea Tuerckheimii.

KINUGASA Tatewaki & Sutô in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. xiv. 34 (1935). *LILIACEAE.*
japonica (*Franch. & Sav.*) *Tatewaki & Sutô, l. c.* 36: Trillidium japonicum.

KIRENGESHOMA Yatabe (Saxifragac.).
koreana *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 152.—Corea.

KIRGANELIA Juss. (Euphorbiac.).
lineata (*Willd.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 259 (1931): Zizyphus lineatus.

KIRKIA Oliv. (Simaroubac.).
pubescens *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxv. 481 (1932).—Transvaal.

KLAINEASTRUM Pierre ex A. Cheval. (Melastomatac.).
pulcherrimum (*Gilg*) *Pierre ex A. Cheval. Vég. Ut. Afr. Trop. Franç.* ix. 215 (1917), in obs.: Memecylon pulcherrimum.

KLAINEDOXA Pierre ex Engl. (Simaroubac.).
Mildbraedii *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 769 (1915), in obs.—Cameroons.

KLEINIA Mill. (Compos.).
Archeri *Compton in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 47.—Afr. austr. (Cape Prov.).
barbertonica (*Klatt*) *Burtt Davy in Kew Bull.* 1935, 569: Senecio barbertonicus.
ovoidea *Compton in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 48.—Afr. austr. (Cape Prov.).
pusilla *Dinter ex Range in Fedde, Repert.* xxxix. 58 (1935), in syn.: Senecio pusillus.
triantha *Chiov. Fl. Somala*, II. 268 (1932).—Somal. Ital.

KLEMACHLOA R. N. Parker in Indian Forester, 1932, lviii. 7. *GRAMINEAE.*
detinens *R. N. Parker, l. c.*—Burma.

KMERIA Dandy (Magnoliac.).
septentrionalis *Dandy in Journ. Bot.* 1931, lxix. 233.—China (Kwangsi).

KNAUTIA L. (Dipsacac.).
Alboi *Sennen*; *Szabó in Bot. Közl.* 1934, xxxi. 125, descr.—Hispan.
× Alleizettei *Chassagne & Szabó, l. c.* 141.—Gallia.
angustata (*Rouy*) *Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* v. 60 [1921]: K. sylvatica var. angustata.
arvernensis (*Briq.*) *Szabó in Bot. Közl.* 1934, xxxi. 132: K. subcanescens var. arvernensis.
arvernica *Chassagne & Szabó, l. c.* 128.—Gallia.
basaltica *Chassagne & Szabó, l. c.* 129.—Gallia.
burgalensis *Pau ex Font Quer in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, v. Ser. Bot. No. 5, 41 (1924).—Hispan.
catalaunica *Sennen ex Szabó in Bot. Közl.* 1934, xxxi. 126.—Pyren.
Chaberti *Szabó, l. c.* 130.—Helvet.
× Chassagnei *Szabó, l. c.* 138.—Gallia.
× Cousturieri *Sennen*; *Szabó, l. c.*, descr.—Hispan.
dipsacifolia (*Host*) *Kreutzer, Anthochron. Pl. Eur. Med.* 125, 223 (1840): Scabiosa dipsacifolia.
foreziensis *Chassagne & Szabó in Bot. Közl.* 1934, xxxi. 130.—Gallia.
Gussonei *Szabó, l. c.* 136.—Ital.
hirpina *Szabó, l. c.* 128.—Ital.
Lacaitae *Szabó, l. c.* 136.—Hispan.
× Lamottei *Chassagne & Szabó, l. c.* 140.—Gallia.
Losae *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 115.—Hispan.
Prosti *Chassagne & Szabó in Bot. Közl.* 1934, xxxi. 126.—Gallia.
rupicola (*Willk.*) *Szabó, l. c.* 124: K. subscaposa f. rupicola.
Salvadoris *Sennen ex Szabó, l. c.* 136.—Hispan.
× Sennenii *Szabó, l. c.* 140.—Hispan.
× sequanica *Szabó, l. c.*—Gallia.
Shepardi *Post & Beauverd in Dinsm. Pl. Post. & Dinsm.* Fasc. I. 7 (1932); *Dinsm. in Fedde, Repert.* xxxiii. 106 (1933).—Syria.
× spectabilis *Chassagne & Szabó in Bot. Közl.* 1934, xxxi. 140.—Gallia.
trachytica *Chassagne & Szabó, l. c.* 136.—Gallia.

KNIPHOFIA Moench (Liliac.).
corallina *Hort. ex Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. Fasc. suppl. 1, p. 8 (1934), nomen.—Hab.?
× elegans *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 306 (1924).—Hort.
subalpina *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 121 (1935).—Kenya Col.

KNOWLTONIA Salisb. (Ranunculac.).
Whytei *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 170 (1915), in obs.: Anemone Whyteana.

KNOXIA L. (Rubiac.).
umbellata *Banks ex Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 373 (1820), in syn.; *Spreng. Syst.* i. 406 (1825).—Nepal.
veronicoides *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxxvi. (*Hist. Nat. Pl.* vi. Atlas iv.) t. 441 (1897).—Madag.

KOBRESIA Willd. (Cyperac.).
humilis (*C. A. Mey. ex Trautv.*) *Sergievsk. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 111 (1935): Elyna humilis.
macrocarpa *Clokey in N. Am. Fl.* xviii. 5 (1931).—U.S.A. (Colorado).

KOCHIA Roth (Chenopodiac.).
Brownii *Hort. ex Ulbr. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 536 (1934), in syn.: K. tomentosa.
Cheelii *R. H. Anders. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, 1934, lix. 270.—Austral. (N. S. Wales).
Childsii *Hort. ex Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1933, xlviii. 146.—Hort.
Krylowi *Litw. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1929, No. 2, p. 1.—Sibir.
macroptera *Iljin in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 366 (1932), in syn.: K. melanoptera var. macroptera.

KOELERIA Pers. (Gramin.).
altaica (*Domin*) *Krylov, Fl. Sibir. Occ.* ii. 261 (1928): K. eriostachya var. altaica.
Buschiana (*Domin*) *Gontsch. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 328 (1934): K. gracilis var. Buschiana.
Gorodkowii *Roshev. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 296 (1932).—Sibir.
latifrons (*Domin*) *Rydb. in Brittonia*, i. 84 (1931): K. nitida var. latifrons.
Pohleana (*Domin*) *Gontsch. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 323 (1934): K. glauca var. Pohleana.
sclerophylla *P. Smirnow in Fedde, Repert.* xxx. 399 (1932).—Ross. centr.
wolgensis *P. Smirnow in Sprygin. Rastitelny pokrow sredne-wolshskogo kraja*, 60 (1931), nomen; cf. *P. Smirnow in Fedde, Repert.* xxx. 400 (1932), in syn.: K. sclerophylla.

KOELLIA Moench (Labiat.).
pauciflora *Small, Man. Southeast. Fl.* 1174 (1933).—U.S.A. (Georgia).

KOELLIKERIA Regel (Gesneriac.).
erinoides (*DC.*) *Mansf. in Fedde, Repert.* xxxviii. 28 (1935): Achimenes erinoides.

KOHLERIA Regel (Gesneriac.).
avilana *Cuatrec. in An. Univ. Madrid*, iv. Fasc. 2, 256 (1935).—Ecuador.
baezana *Cuatrec. l. c.* 257.—Ecuador.
sancti-josephi *Cuatrec. l. c.* 258.—Ecuador.

KOKIA Lewton (Malvac.).
Cookei *Degener, Fl. Hawaiiensis*, Fam. 221 (1934).—Ins. Sandvic.
kauaiensis (*Rock*) *Degener & Duvel in Degener, l. c.*: K. Rockii var. kauaiensis.

KOLOBOPETALUM Engl. (Menispermac.).
salmonicolor *Exell in Journ. Bot.* 1932, lxx. Suppl. 1, 215.—Congo Lusit.

KONIGA R. Br. (Crucif.).
variegata *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 77 (1894), in syn.: Alyssum maritimum f. variegatum *Voss.*

KOPSIA Blume (Apocynac.).
carolinensis *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 344.—Ins. Palau.
dasyrachis *Ridley in Kew Bull.* 1934, 123.—Borneo.
hainanensis *Tsiang in Sunyatsenia*, ii. 111 (1934).—China (Hainan).
Harmandiana *Pierre*; *Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1132 (1933), descr.—Indo-China (Anam).
jasminiflora *Pitard, l. c.* 1136.—Indo-China (Laos).
Pitardii *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 141 (1934), in adnot.: K. cochinchinensis *Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1134 (1933), non *O. Kuntze.*
tonkinensis *Pitard, l. c.* 1135.—Indo-China (Tonkin).

KORTHALSELLA Van Tiegh. (Loranthac.).
Dacrydii (*Ridley*) *Danser in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 758: Arceuthobium Dacrydii.
Feuana *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 58 (1935).—Ins. Marquesas (Fatuhiva).
Margaretae *Forest Brown, l. c.* 60.—Ins. Austral.
Mumfordii *Forest Brown, l. c.* 58.—Ins. Marquesas (Hivaoa).
rapensis *Forest Brown, l. c.* 57.—Polynes. (Ins. Rapa).

KOSTELETZKYA Presl (Malvac.).
Augusti *Hochr. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 252 (1917).—Guinea Gall.

KRASCHENINIKOWIA Turcz. (Caryophyllac.).
ciliata *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 1.—Japon.
Koidzumiana *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 82.—Corea; Japon.

KRASSERA Schwartz in Mitt. Inst. Bot. Hamburg, vii. 247 (1931). *MELASTOMATACEAE.*
ciliata *Schwartz, l. c.* 249.—Borneo.
dajakorum *Schwartz, l. c.*—Borneo.

KRAUSELLA H. J. Lam in Nova Guinea, xiv. 566 (1932). *SAPOTACEAE.*
polyneura (*K. Krause*) *H. J. Lam, l. c.* 567: Sideroxylon polyneurum.

KRAUSELLA:—
Schlechteri (*K. Krause*) *H. J. Lam in Nova Guinea*, xiv. 567 (1932): Beauvisagea Schlechteri.

KRAUSEOLA Pax & K. Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, xvi c. 308 (1934): **Pleiosepalum** Moss (Caryophyllac.).
mosambicina (*Moss*) *Pax & K. Hoffm. l. c.*: Pleiosepalum mosambicinum.

KRAUSSIA Harv. (Rubiac.).
incerta *Bullock in Kew Bull.* 1931, 256.—Transvaal.
Kirkii (*Hook. f.*) *Bullock, l. c.* 1934, 231: Rhabdostigma Kirkii.
Schlechteri (*K. Schum.*) *Bullock, l. c.*: Rhabdostigma Schlechteri.
speciosa *Bullock, l. c.* 1931, 256.—Tanganyika Terr.

KREMERIA Dur. (Compos.).
grandis (*L. ex Jackson*) *Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc*, iii. 777 (1934), in adnot.: Chrysanthemum grande.
multicaulis (*Desf.*) *Maire, l. c.*, in adnot.: Chrysanthemum multicaule.
Myconis (*L.*) *Maire, l. c.*: Chrysanthemum Myconis.

KREMERIELLA Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc, ii. 293 (1932): **Kremeria** Coss. & Dur. (Crucif.).
Cordylocarpus (*Coss. & Dur.*) *Maire, l. c.*: Kremeria Cordylocarpus.

KUALA Karst. & Triana in Triana, Nuev. Jen. i Esp. Fl. Neo-Granad. 21 (1854); Karst. in Linnaea, xxviii. 428 (1857); Sprague in Kew Bull. 1934, 396. *RUTACEAE.*
alata *Karst. & Triana, l. c.* 22; *Karst. l. c.* 429; *Sprague, l. c.*—Colomb.
laevis *Karst. & Triana, l. c.*; *Karst. l. c.*; *Sprague, l. c.*—Colomb.

KUDOA Masamune (Gentianac.).
paradoxa (*Alboff*) *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1933, xxiii. 205: Gentiana paradoxa.

KUDOACANTHUS Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 1933, xxiii. 94. *ACANTHACEAE.*
albo-nervosus *Hosokawa, l. c.* 95.—Formosa.

KUHNIA L. (Compos.).
Mosieri *Small, Man. Southeast. Fl.* 1329 (1933).—U.S.A. (Florida).

KUTCHUBAEA Fisch. (Rubiac.).
semisericea *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 71 (1935).—Bras. (Amaz.).
sericantha *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 355 (1931).—Peruv.
speciosa *Ducke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 478 (1932).—Bras. (Amaz.).

KYLLINGA Rottb. (Cyperac.).
anomala *Peter & Kükenth. in Engl. Pflanzenreich, Cyperac.-Scirp.-Cyp.* 35 (1935), in syn.: Cyperus transitorius.
ascolepidioides *Cherm. in Arch. Bot., Caen*, iv. Mém. No. 7, p. 4 (1931).—Afr. Gall. Centr.
cyperoides *Roxb. Hort. Beng.* 81 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 187 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 182 (1832).—Ind. or.
jubensis *Chiov. Fl. Somala*, II. 433 (1932).—Somal. Ital.
Tisseranti *Cherm. in Arch. Bot., Caen*, iv. Mém. No. 7, p. 6 (1931).—Afr. Gall. Centr.

L

LABATIA Sw. (Sapotac.).
euryphylla (*Standley*) *Standley in Tropical Woods*, 1932, No. 31, 43: Lucuma euryphylla.

LABLAB Adans. (Legumin.).
Lablab (*L.*) *Lyons, Plant Names Scientific & Popular*, 212 (1900): Dolichos Lablab.

LABORDIA Gaudich. (Loganiac.).
hypoleuca *Degener, Fl. Hawaiiensis*, Fam. 302 (1932).—Ins. Sandvic. (Oahu).

LABURNUM Medik. (Legumin.).
Laburnum (*L.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 198 (1894): Cytisus Laburnum.

LABURNUM:—
purpurascens *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 198 (1894), in syn.: L. vulgare.
variabile *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in syn.: L. vulgare.

LACCODISCUS Radlk. (Sapindac.).
Klaineanus *Pierre ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 280 (1921), in obs.; *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 1133 (1933), descr. ampl.—Cameroons; Gabon.
pseudostipularis *Radlk. ex Engl. l. c.*, in obs.; *Radlk. l. c.*, descr. ampl.—Cameroons.
spinuloso-dentatus *Radlk. ex Engl. l. c.*, in obs.; *Radlk. l. c.*, descr. ampl.—Guinea Hispan.

LACCOSPERMA Drude in Bot. Zeit. 1877, xxxv. 632, 635; G. Mann & H. Wendl. in Kerch. Palm. 249 (1878). *PALMAE.*
opacum (*G. Mann & H. Wendl.*) *Drude in Bot. Zeit.* 1877, xxxv. 635: Calamus opacus.

LACHENALIA Jacq. (Liliac.).
buchubergensis *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 167 (1931), in obs.; *et l. c.* xxx. 84 (1932), descr.—Great Namaq.
elegans *Barker in Fl. Pl. S. Afr.* 1933, xiii. t. 508.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Gillettii *Barker, l. c.* t. 506.—Afr. austr. (Cape Prov.).
haarlemensis *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 79 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
longibracteata *Phillips in Fl. Pl. S. Afr.* 1931, xi. t. 405.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Mathewsii *Barker in Fl. Pl. S. Afr.* 1931, xi. t. 422.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Salteri *Barker, l. c.* 1933, xiii. t. 505.—Afr. austr. (Cape Prov.).
subspicata *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 79 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).

LACHNAEA L. (Thymelaeac.).
elegans *Compton in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 20.—Afr. austr. (Cape Prov.).
glomerata *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 101 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
naviculifolia *Compton in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 21.—Afr. austr. (Cape Prov.).

LACHNANTHES Ell. (Haemodorac.).
caroliana (*Lam.*) *Dandy in Journ. Bot.* 1932, lxx. 329: Dilatris caroliana.

LACHNOPHYLLUM Bunge (Compos.).
hierosolymitanum *Eig in Fedde, Repert. Beih.* lxiii. 1. 114 (1931), nomen.—Palaest.

LACHNOPYLIS Hochst. (Loganiac.).
compacta *C. A. Smith in Kew Bull.* 1931, 40.—Sudan.
flocculosa *C. A. Smith, l. c.*—Angola.
guineënsis *Hutchinson & M. B. Moss in Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 20 (1931).—Sierra Leone; Gold Coast.
Mannii (*Gilg*) *Hutchinson & M. B. Moss, l. c.*: Nuxia Mannii.
scytophylla *C. A. Smith in Kew Bull.* 1931, 39.—Madag.

LACHNOSTOMA H. B. & K. (Asclepiadac.).
longifolium *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 789 (1933).—Peruv.

LACINIARIA Hill (Compos.).
angustifolia *Bush in Am. Midl. Nat.* 1931, xii. 315.—U.S.A. (Texas).
arenicola *Bush, l. c.* 314.—U.S.A. (Minnesota).
brachyphylla *Bush, l. c.* 317.—U.S.A. (Texas).
densispicata *Bush, l. c.* 313.—U.S.A. (Minnesota).
Herrickii *Steele ex Rydb. in Brittonia*, i. 99 (1931), in syn.: Liatris Herrickii.
leptostachya *Bush in Am. Midl. Nat.* 1931, xii. 314.—U.S.A. (Texas).
Ruthii *Alexander in Small, Man. Southeast. Fl.* 1335 (1933), an seq.—U.S.A. (S. E. States).
Ruthii *Bush in Am. Midl. Nat.* 1931, xii. 316.—U.S.A. (Texas).
Shortii *Alexander in Small, Man. Southeast. Fl.* 1335 (1933).—U.S.A. (E. States).
Tracyi *Alexander, l. c.*—U.S.A. (Alabama).

LACISTEMA Sw. (Lacistemac.).
curtum *Macbride in Candollea*, v. 393 (1934).—Peruv.
Nena *Macbride, l. c.* 392.—Peruv.
rosidiscum *Macbride, l. c.*—Peruv.

LACTUCA L. (Compos.).
ameristophylla (*Nakai*) *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1241 (1931): Crepidiastrum ameristophyllum.
callosa (*Klatt*) *Chang in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., ix. 127 (1934): Prenanthes callosa.
capillaris (*Nakai*) *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1241 (1931): Ixeris capillaris.
Cooperi *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 198 (1934).—Ind. or. (Sikkim).
cornigera *Pau & Font Quer, Iter Marocc.* 1929, No. 476 [1930].—Marocc.
× denticulatoplatyphylla *Makino in Journ. Jap. Bot.* i. 11 (1917).—Japon.
dracoglossa *Makino, l. c.* vii. 23 (1931).—Japon. (Hondo).
Dunlapii *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 177 (1931).—Cameroons.
Garrettii *Kerr in Kew Bull.* 1935, 332.—Siam.
glabra *Chang in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., ix. 128 (1934).—China (Yunnan).
glandulosissima *Chang, l. c.* 130.—China (Yunnan).
integrifolia *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 456 (1932).—Congo Belg.
Kimurana; cf. *Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. p. (6), japonice, in syn.: Ixeris Kimurana.
koshunensis (*Nakai*) *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1243 (1931): Crepidiastrum koshunense.
Lamii *Mattf. in Nova Guinea*, xiv. 530 (1932).—N. Guin.
Makinoana *Kitamura, Compos. Nov. Jap.* 26 (1931): L. dentata subvar. angustifolia *Makino.*
microcephala (*Nakai*) *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1244 (1931): Ixeris microcephala.
mira *Pavlov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1933, n.s. xlii. 128, 147.—Turkestan.
monocephala *Chang in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., ix. 132 (1934).—China (Yunnan).
musashensis *Makino ex Hisauchi in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 43, in syn.: Ixeris musashensis.
nikoënsis (*Nakai*) *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1245 (1931): Ixeris nikoënsis.
nipponica (*Nakai*) *Nakai ex Makino & Nemoto, l. c.* ed. 1, 75 (1925); *et l. c.* ed. 2, 1245 (1931): Ixeris nipponica.
pallidicoerulea *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 89 (1932).—Hereroland.
pinnatifida (*Lour.*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 397 (1935): Scorzonera pinnatifida.
procera *Schrad. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 542 (1834), in obs.—Hab. ?
pusilla *Mattf. in Nova Guinea*, xiv. 531 (1932).—N. Guin.
Putii *Kerr in Kew Bull.* 1935, 332.—Siam.
pyrenaica *Bellardi ex Pasch. in Colla, Herb. Pedem.* iii. 542 (1834).—Pyren. ?
Reviersii *Litard. & Maire in Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc*, No. xxvi. 22 (1930).—Marocc.
riparia *Kerr in Kew Bull.* 1935, 333.—Siam.
salicifolia (*K. Koch*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 255 (1934): Mulgedium salicifolium.
scandens *Chang in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., ix. 133 (1934).—China (Szechuan).
Serriola *L. Cent. Pl.* ii. 29 (1756); *L. Amoen. Acad.* iv. 328 (1759).—Eur. austr.
siamensis *Kerr in Kew Bull.* 1935, 333.—Siam.
× Stanekii *Domin in Preslia*, xiii–xv. 251 (1935).—Czechoslovak.
surugensis *Hisauchi in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 697, in syn.: Paraixeris surugensis.
taiwaniana (*Nakai*) *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1246 (1931): Crepidiastrum taiwanianum.
Takasei *Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1931, xxi. 224.—Formosa.
transnokoënsis *Sasaki, l. c.* 223.—Formosa.
trifida *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 58.—Formosa.
tuberosa *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 261 (1917).—Guinea Gall.

LACUNARIA Ducke (Quiinac.).
grandifolia *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 168 (1935).—Bras. (Amaz.).
pulchrinervis *Ducke, l. c.* 169.—Bras. (Amaz.).
Sampaioi *Ducke in Bol. Mus. Nac., Rio de Janeiro*, 1934, x. 103.—Bras. (Pará).

LADENBERGIA Klotzsch (Rubiac.).
amazonensis *Ducke in Tropical Woods*, 1932, No. 31, 21; *et in Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro*, vi. 93 (1933).—Bras. (Amaz.).
bullata (*Wedd.*) *Standley in Tropical Woods*, 1933, No. 34, 41: Cascarilla bullata.
Carua (*Wedd.*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 274 (1931): Cascarilla Carua.
crassifolia (*Pav. ex DC.*) *Standley, l. c.* 200: Cinchona crassifolia.
ferruginea *Standley, l. c.* viii. 336 (1931).—Peruv.
lucens *Standley, l. c.* vii. 362 (1931).—Venez.
Pavonii (*Lamb.*) *Standley, l. c.* 201: Cinchona Pavonii.
Riveroana (*Wedd.*) *Standley, l. c.*: Cascarilla Riveroana.
sericea *Standley, l. c.* 275.—Boliv.
tovarensis (*Karst.*) *Standley, l. c.* 364: Cinchona tovarensis.

LAELIA Lindl. (Orchidac.).
Gloedeniana *Hoehne in Bol. Agric., S. Paulo*, 1933, xxxiv. 624 (1934).—Bras. (S. Paulo).

×**LAELIO-CATTLEYA** Rolfe (Orchidac.).
amanda *Hort. ex Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 519, in obs.—Bras.
Mercieri *Guillaumin, l. c.* 518.—Bras. (S. Paulo).
porphyritis *Hort. ex Guillaumin, l. c.* 519, in obs.—Bras.

LAETIA Loefl. (Flacourtiac.; Bixac., Gen. Pl.).
ovalifolia *Macbride in Candollea*, v. 389 (1934).—Peruv.

LAGAROSIPHON Harv. (Hydrocharitac.).
tsotsorogensis *Bremek. & Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xvi. 401 (1935).—Bechuanaland Protect.

LAGASCA Cav. (Compos.).
media (*Blake*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 398 (1931): Nocca media.
pteropoda (*Blake*) *Standley, l. c.*: Nocca pteropoda.

LAGENANDRA Dalz. (Arac.).
Meeboldii (*Engl.*) *C. E. C. Fischer in Gamble, Fl. Madras*, 1576 (1931): Cryptocoryne Meeboldii.

LAGENARIA Ser. (Cucurbitac.).
claviformis *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 349 (1894), in syn.: L. Lagenaria.

LAGENOCARPUS Nees (Cyperac.).
Kunthii (Miq.) *Uitt. in Pulle, Fl. Surinam.* i. (*Meded. K. Ver. Kol. Inst. Amst.* xxx.) 132 (1934): Scleria Kunthii.

LAGERSTROEMIA L. (Lythrac.).
chekiangensis *Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., viii. 73 (1932).—China (Chekiang).
minuticarpa *Debberm. ex P. C. Kanj. in Assam Forest Rec., Bot.* i. 9 (1934).—Ind. or. (Sikkim; Assam).

LAGETTA Juss. (Thymelaeac.).
Lagetto (*Sw.*) *Nash in Journ. N. Y. Bot. Gard.* 1908, ix. 117: Daphne Lagetto.

LAGGERA Sch. Bip. (Compos.).
makarikariensis *Bremek. & Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xvi. 439 (1935).—Bechuanaland Protect.

LAGOCHILUS Bunge (Labiat.).
subhispidus *Knorr. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 169 (1933).—Ross. asiat. (Kasakstan.).
tianschanicus *Pavlov in Sovietsk. Bot.* 1934, No. 1, 27, in obs., nomen.—Turkestan.

LAGOPHYLLA Nutt. (Compos.).
scabrella (*Jepson*) *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 79 (1933–5): Hemizonia truncata var. scabrella.

LAGOTIS Gaertn. (Scrophulariac.; Selaginac., Gen. Pl.).
Blatteri *O. E. Schulz in Fedde, Repert.* xxxi. 161 (1933).—Ind. or. (Waziristan).
minor (*Willd.*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 325 (1931): Gymnandra minor.
reniformis (*Willd.*) *Standley, l. c.*: Gymnandra reniformis.
Takedana *Miyabe & Tatewaki in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.* xiii. 3 (1933).—Japon.
yesoënsis *Tatewaki, l. c.* 4, in syn.: L. Stelleri var. yesoënsis *Miyabe & Tatewaki*.

LAGREZIA Moq. (Amaranthac.).
angustifolia (*Schinz*) *Schinz in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 139, in obs.: Celosia angustifolia.
Boivinii (*Hook.*) *Schinz in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 35 (1934): Celosia Boivinii.
micrantha (*Baker*) *Schinz, l. c.*: Celosia micrantha.
minutiflora *Schinz in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 138.—Madag.
obcordata *Schinz in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 35 (1934), nomen.—Congo Belg.
spathulata (*Bojer*) *Schinz, l. c.*: Celosia spathulata.
spicata (*Spreng.*) *Schinz, l. c.*: Celosia spicata.

LAGUNCULARIA Gaertn. f. (Combretac.).
Martii *Colla, Herb. Pedem.* ii. 367 (1834).—Bras.

LAGYNIAS E. Mey. (Rubiac.).
lasiantha (*Sond.*) *Bullock in Kew Bull.* 1931, 274: Pachystigma lasianthum.
littoralis *Bullock & Greenway, l. c.* 1933, 148.—Ins. Pemba; Kenya Col.
pallidiflora *Bullock, l. c.* 1931, 273.—Tanganyika Terr.

LAMIUM L. (Labiat.).
formosanum (*Hayata*) *Nakai in Hayata, Gen. Ind. Fl. Formos.* 57 (1917); *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* 1016 (1931): Ajuga formosana.
lovcenicum *Rohlena in Mém. Soc. Sc. Bohême*, 1933, No. 8, p. 9 (1934).—Montenegro.

LAMPAYA R. Phil. (Verbenac.).
medicinalis *F. Phil. in Verh. Deutsch. Wiss. Ver. Santiago (Chile)*, i. 160 (1886), in obs.; *R. Phil. in An. Mus. Nac. Chile*, 1891, 58.—Chile.

LAMPRANTHUS N. E. Brown (Ficoidac.).
swartkopensis *Strohschn. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1935, lxxxiv. 292.—Afr. austr. (Cape Prov.).

LANDOLPHIA Beauv. (Apocynac.).
subturbinata *Stapf ex Dawe, Rep. Bot. Miss. Uganda Protect.* 50 (1906), nomen.—Uganda.

LANDUKIA Planch. (Vitac.).
heterophylla (*Blume*) *Boldingh, Zakfl. Landbouwstr. Java*, 181 (1916): Ampelopsis heterophylla.

LANGUAS Koenig (Zingiberac.; Scitamin., Gen. Pl.).
Allughas (*Roscoe*) *Burkill in Kew Bull.* 1935, 317; *Burkill, Dict. Econ. Prod. Mal. Penins.* ii. 1304 (1935), in obs.: Alpinia Allughas.
babeldaobensis *Kanehira in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 7.—Ins. Palau.
cannifolia (*Ridley*) *Burkill in Kew Bull.* 1935, 318; *Burkill, Dict. Econ. Prod. Mal. Penins.* ii. 1305 (1935): Alpinia cannifolia.
carolinensis (*Koidz.*) *Kanehira, Fl. Micrones.* 412 (1933): Alpinia carolinensis.
crocydocalyx *Merrill in Univ. Calif. Publ. Bot.* xv. 34 (1929): Alpinia crocydocalyx.
elegans (*K. Schum.*) *Burkill in Kew Bull.* 1935, 318; *Burkill, Dict. Econ. Prod. Mal. Penins.* ii. 1304 (1935), in obs.: Alpinia elegans.
iriomotensis *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 207, in syn.: Alpinia iriomotensis.
javanica (*Blume*) *Burkill in Kew Bull.* 1935, 318; *Burkill, Dict. Econ. Prod. Mal. Penins.* ii. 1310 (1935): Alpinia javanica.
mutica (*Roxb.*) *Degener, Fl. Hawaiiensis*, Fam. 76 (1932): Alpinia mutica.
Padacanca (*Val. ex K. Heyne*) *Burkill in Kew Bull.* 1935, 318; *Burkill, Dict. Econ. Prod. Mal. Penins.* ii. 1304 (1935), in obs.: Alpinia Padacanca.

LANGUAS:—
pahangensis (*Ridley*) *M. R. Henderson in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 125 (1933), in obs.: Alpinia pahangensis.
Parksii *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 91, 4 (1932).—Ins. Viti.
pinatubensis *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3225 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
purpurata (*Vieill.*) *Kanehira, Fl. Micrones.* 412 (1933); *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 24 (1933): Guillainia purpurata.
Rafflesiana (*Wall.*) *Burkill in Kew Bull.* 1935, 318; *Burkill, Dict. Econ. Prod. Mal. Penins.* ii. 1312 (1935): Alpinia Rafflesiana.
regia (*Val. ex K. Heyne*) *Burkill, l. c.*; *Burkill, l. c.* 1304, in obs.: Alpinia regia.
rufescens (*Thwait.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 282 (1931): Elettaria rufescens.
tarokoënsis *Sasaki, List Pl. Formos.* 118 (1928).—Formosa.
uviformis (*Horan.*) *Burkill in Kew Bull.* 1935, 318; *Burkill, Dict. Econ. Prod. Mal. Penins.* ii. 1304 (1935), in obs.: Alpinia uviformis.
vitellina (*Lindl.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 282 (1931): Amomum vitellinum.

LANNEA A. Rich. (Anacardiac.).
Cotoneaster (*Chiov.*) *Sacleux in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 453, in obs., 454, in clavi: Odina Cotoneaster.
floccosa *Sacleux, l. c.* 452.—Afr. Brit. Or.
lagdoënsis (*Engl. & K. Krause*) *Mildbr. in Engl. Jahrb.* lxv. 28 (1932): Sorindeia lagdoënsis.
malifolia (*Chiov.*) *Sacleux in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 453, in obs., 454, in clavi: Odina malifolia.
Rivae (*Chiov.*) *Sacleux, l. c.*: Odina Rivae.

LANTANA L. (Verbenac.).
×hybrida *Hort. ex Neubert's Deutsch. Gart. Mag.* x. 98 (1857); cf. *Index Londin.* iv. 39 (1930).—Hab. ?
longifolia *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 497 (1835).—Bras.
mollis *Colla, l. c.* 498.—Bras.
tenuifolia *Rusby in Phytologia*, i. 74 (1934).—Boliv.

LAPEYROUSIA Pourr. (Iridac.).
avasmontana *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 256 (1931).—Hereroland.
dolomitica *Dinter, l. c.* 255.—Great Namaq.
juncifolia (*Baker*) *N. E. Brown in Kew Bull.* 1931, 194: Watsonia juncifolia.
ramosissima *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 255 (1931).—Great Namaq.
Schimperi (*Aschers. & Klatt*) *Milne-Redhead in Kew Bull.* 1934, 307: Tritonia Schimperi.
viridis (*Ker-Gawl.*) *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 276: Tritonia viridis.

LAPHAMIA A. Gray (Compos.).
arizonica *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 159 (1931).—U.S.A. (Arizona).
quinqueflora *Steyerm. in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1932, xix. 392.—U.S.A. (Texas).
saxicola *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 159 (1931).—U.S.A. (Arizona).
villosa *Blake in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1932, xlv. 142.—U.S.A. (Calif.).

LAPITHEA Griseb. (Gentianac.).
capitata (*Rafin.*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 1051 (1933): Pleienta capitata.

LAPLACEA H. B. & K. (Theac.; Ternstroemiac., Gen. Pl.).
cymatoneura *Urb.*; *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxxiii. 176 (1933), descr. ampl.—Hispaniola.
Samuelssonii *O. C. Schmidt, l. c.* xxix. 16 (1931).—Hispaniola.

LAPORTEA Gaudich. (Urticac.).
Chingiana *Hand.-Mazz. in Sinensia*, ii. 1 (1931).—China (Kwangsi).
conduplicata *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3237 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
kusaiana *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 449.—Ins. Carolin. (Kusai).
latilanceolata *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3238 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).

LAPORTEA:—
saipanensis *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 277.—Ins. Marian. (Saipan).

LAPPA Zinn, Cat. Pl. Gott. 386 (1757); cf. Sprague in Kew Bull. 1934, 219: **Arctium** L. (Compos.).
crispa *J. Wolff ex Borza in Bul. Grăd. & Muz. Bot. Univ. Cluj*, 1921, i. 40, in obs., nomen; *Cretz. in Acta Faun. Fl. Univ., Bucureşti*, Ser. II. *Bot.*, i. Nos. 7–8, 1 (1933), in syn.: Arctium crispum.
Degeni *Chab. Herv. ex H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 153 (1932), in syn.: Arctium Degeni.

LAPPAGO Schreb. (Gramin.).
biflora *Roxb. Hort. Beng.* 82 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 284 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 281 (1832).—Ind. or.

LAPPULA Moench (Boraginac.).
Drobowi (*Popov*) *Pavlov in Sovietsk. Bot.* 1934, No. 1, 27, in obs.—Turkestan.
dubia (*O. Fedtsch.*) *A. Brand in Engl. Pflanzenreich, Borrag.-Borraginoid.-Cryptanth.* 142 (1931): Eritrichium dubium.
elegans *Piper ex A. Brand, l. c.* 128, in syn.: Hackelia elegans.
oligacantha (*Boiss.*) *Dinsm. in Post, Fl. Syria, Palest. & Sinai*, ed. 2, ii. (*Publ. Am. Univ. Beirut*, Nat. Sc. Ser. No. 1) 247 (1933); *Dinsm. in Fedde, Repert.* xxxiii. 110 (1933): Echinospermum oligacanthum.
subcaespitosa (*Popov*) *Pavlov in Sovietsk. Bot.* 1934, No. 1, 27, in obs.—Turkestan.

LAPSANA L. (Compos.).
Takasei (*Sasaki*) *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 100: Lactuca Takasei.

LARIX Mill. (Pinac.; Conif., Gen. Pl.).
carpatica (*Domin*) *Domin in Acta Bot. Bohem.* x. 4 (1931): L. decidua var. carpatica.
sudetica *Domin ex Degen in Bot. Közl.* 1931, xxviii. 66, in obs., nomen.—Czechoslovak.

LASERPITIUM L. (Umbellif.).
thalictrifolium *G. Sampaio in Ann. Acad. Polyt. Porto*, vii. 53 (1912).—Lusitan.

LASIACIS Hitchcock (Gramin.).
lancifolia *Swallen in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 436, 349 (1934).—Mexico.
papillosa *Swallen, l. c.*—Mexico; Brit. Honduras.

LASIAGROSTIS Link (Gramin.).
bromoides (*L.*) *Nevski & Roshev. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 72 (1934): Agrostis bromoides.
longearistata (*Boiss. & Hausskn.*) *Roshev. & Nevski in Komarov, l. c.* 73: Piptatherum longearistatum.
Nevskii *Roshev. ex Komarov, l. c.*, in syn.: L. longearistata.
Redowskyi (*Trin.*) *Woronow ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 69 (1928): Stipa Redowskyi.

LASIANTHERA Beauv. (Icacinac.; Olacac., Gen. Pl.).
tetrandra *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 328 (1824).—Ind. or. (Assam).

LASIANTHUS Jack (Rubiac.).
aristatus *Craib in Kew Bull.* 1933, 18.—Siam.
bicolor *Craib, l. c.* 19.—Siam.
brevidens *Craib, l. c.*—Siam.
brevipes *Craib, l. c.* 20.—Siam.
bulusanensis *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3252 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
chartaceus *Craib in Kew Bull.* 1933, 20.—Siam.
Foxworthyanus *Craib, l. c.* 21.—Siam.
incomptus *Craib, l. c.*—Siam.
Koi *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 47 (1934).—China (Hainan).
kwangtungensis *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* vii. 323 (1931).—China (Kwangtung).
Labordei (*Léveillé*) *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 340: Canthium Labordei.
lancilimbus *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 50 (1934).—China (Kwangtung).
lineolatus *Craib in Kew Bull.* 1933, 22.—Siam.
maculatus *Craib, l. c.*—Siam.
marginatus *Craib, l. c.* 23.—Siam.
nigrocarpus *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1932, xxii. 222: L. chinensis *Matsumura & Hayata, Enum. Pl. Formos.* 195 (1906), non *Benth.*
octonervius *Hand.-Mazz. in Sinensia*, v. 14 (1934).—China (Kwangsi).
penicillatus *Craib in Kew Bull.* 1933, 23.—Siam.
Perrottetii *Drake in Grandidier, Hist. Nat. Madag.* xxxvi. (*Hist. Nat. Pl.* vi. Atlas iv.) t. 429 (1897).—Madag.
puberulus *Craib in Kew Bull.* 1933, 24.—Siam.
Rabilii *Craib, l. c.*—Siam.
sarmentosus *Craib, l. c.* 25.—Siam.
saxorum *Craib, l. c.*—Siam.
scalaris *Craib, l. c.* 26.—Siam.
seikoomontanus *Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1935, vii. 148.—Formosa.
sepalinus *Ridley in Kew Bull.* 1934, 120.—Borneo.
setosus *Craib in Kew Bull.* 1933, 26.—Siam.
subaureus *Craib, l. c.* 27.—Siam.
subcalvus *Craib, l. c.*—Siam.
taiheizanensis (*Masamune & Suzuki*) *Masamune & Suzuki ex Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1118 (1931): Mephitidia taiheizanensis.
tenuicaudatus *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* vii. 324 (1931).—China (Kwangtung).
verticillatus (*Lour.*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. ii. 372 (1935): Dasus verticillatus.
virgatus *Craib in Kew Bull.* 1933, 28.—Siam.
zambalensis *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3209 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).

LASIARRHENUM I. M. Johnston (Boraginac.).
pinetorum *I. M. Johnston in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 187.—Mexico.

LASIOCOCCUS Small, Man. Southeast. Fl. 1008 (1933). *ERICACEAE.*
dumosus (*Andr.*) *Small, l. c.*: Vaccinium dumosum.
Mosieri (*Small*) *Small, l. c.* 1009: Gaylussacia Mosieri.
orocola *Small, l. c.*—U.S.A. (N. Carolina).

LASIOSIPHON Fresen. (Thymelaeac.).
calocephalus (*C. A. Mey.*) *Domke in Biblioth. Bot.* cxi. 95 (1934), in obs.: Arthrosolen calocephalus.
Kraussianus (*Meissn.*) *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 151 (1927): Gnidia Kraussiana.
sphaerocephalus (*Baker*) *Domke in Biblioth. Bot.* cxi. 95 (1934), in obs.: Arthrosolen sphaerocephalus.
suavissimus (*Dinter*) *Domke, l. c.* 91, in obs.: Gnidia suavissima.
Waterloti *Léandri in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 153.—Madag.

LATANIA Comm. (Palmae).
vera *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1148 (1895), in syn.: L. Commersonii.

LATEROPORA A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb. xxviii. 333 (1932). *ERICACEAE.*
ovata *A. C. Smith, l. c.* 334.—Panamá.

LATHRAEA L. (Orobanchac.).
arenaria (*Walp.*) *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xii. 429 (1929): Phelipaea arenaria.
chinfushanica *Hu & Tang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* v. 315 (1934).—China (Szechuan).
lavandulacea (*F. Schultz*) *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xii. 429 (1929): Phelipaea lavandulacea.

LATHYRUS L. (Legumin.).
atropatanus (*Grossheim*) *Širjaev in Bull. Soc. Bot. Bulgar.* vi. 62 (1934): Orobus atropatanus.
azureus *Dean in Fl. & Pomol.* 1882, 22.—Hab.?
Boissieri *Širjaev in Bull. Soc. Bot. Bulgar.* vi. 62 (1934), in obs.—Hab.?
Celakovskyi *Širjaev, l. c.* 61.—As. Min.
coruscans *Emberger & Maire*; *Emberger & Maire in Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc*, xi. Nos. 4–6, 98 (1931).—Marocc.
ecirrhosus *R. Phil. in Verh. Deutsch. Wiss. Ver. Santiago* (*Chile*), ii. 203 (1892), in obs.—Chile.
Fiorii *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 38 [1933], nomen.—Marocc.
Hasslerianus *Burkart in Rev. Fac. Agron. & Vet., Buenos Aires*, viii. 100 (1935).—Argent.
Haussknechtii *Širjaev in Bull. Soc. Bot. Bulgar.* vi. 62 (1934), in obs.; *et in Fedde, Repert.* xxxv. 377 (1934).—Armen. Turc.
Krylovii *Sergievsk. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1933, Nos. 3–4, p. 3.—Altai.
macranthus (*White*) *Rydb. in Brittonia*, i. 92 (1931): L. myrtifolius var. macranthus.
macranthus *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 214 (1894): Orobus grandiflorus.
Napoleonis *Hort. ex Vilmorin, l. c.* 212, in syn.: L. tingitanus.
nigrivalvis *Burkart in Rev. Fac. Agron. & Vet., Buenos Aires*, viii. 69 (1935).—Argent.
paranensis *Burkart, l. c.* 71.—Argent.; Urug.
Parodii *Burkart, l. c.* 100.—Argent.
saronensis *Eig in Fedde, Repert. Beih.* lxiii. 1. 113 (1931), nomen.—Palaest.
tukhtensis *Czecz. in Acta Soc. Bot. Polon.* 1932, ix. 36.—As. Min. (Paphlagonia).
Verae *Širjaev in Bull. Soc. Bot. Bulgar.* vi. 60 (1934).—Armen. Turc.

LAUBERTIA A. DC. (Apocynac.).
Pringlei (*Greenm.*) *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1931, xviii. 555: Streptotrachelus Pringlei.
sanctae-martae (*Rusby*) *R. E. Woodson, l. c.*: Echites sanctae-martae.

LAUNAEA Cass. (Compos.).
arabica (*Boiss.*) *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 163 (1932): Zollikoferia arabica.
cervicornis (*Boiss.*) *Font Quer & Rothmaler in Sched. Fl. Iber. Select.* Cent. 1. No. 99 (1934): Prenanthes cervicornis.
divaricata (*Desf.*) *Andréanszky in Ind. Hort. Bot. Univ. Budapest*, 107 (1932), in obs.: Sonchus divaricatus.
Foxii (*Post*) *Eig in Fedde, Repert. Beih.* lxiii. 1. 48 (1931): Zollikoferia Foxii.
Freyniana (*Huter, Porta & Rigo ex Porta*) *Pau in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 729 [1928]: Sonchus Freynianus.
integrifolia *Hagerup in D. K. Danske Vidensk. Selsk.*, Biol. Medd. ix. iv. 56 (1930).—Sudan.
longiloba (*Boiss. & Reut.*) *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1934, xxv. 308: Zollikoferia longiloba.
Popovii *Kraschen. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 180 (1933).—Ross. asiat. centr.
sarmentosa (*Willd.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 173 (1931): Prenanthes sarmentosa.
viminea (*Battand.*) *Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc*, iii. 846 (1934): Microrhynchus vimineus.

LAUREMBERGIA Berg. (Haloragac.).
Gossweileri *Exell in Journ. Bot.* 1933, lxxi. Suppl. 1, 231.—Angola.

LAURENTIA Adans. (Campanulac.).
giftbergensis (*Phillips*) *E. Wimm. in Fedde, Repert.* xxxviii. 77 (1935): Lobelia giftbergensis.
Maximiliana *E. Wimm. l. c.* 78.—Mexico.

LAUREOLA Hill (Thymelaeac.).
Gnidium *G. Sampaio ex Pereira in An. Fac. Sc. Porto*, xvii. 152 (1932), nomen.—Lusitan.

LAURUS L. (Laurac.).
caryophyllata *Lour. ex Gomes in Mem. Acad. Sc. Lisb. Cl. Sc. Pol. Mor. Bel.-Let.* n. s. iv. (1), 27 (1868); *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. ii. 15, 163 (1935), in syn.: Cinnamomum Caryophyllus.
paniculigera *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* v. 62 (1836), in obs.—Bras.
regia *D. Douglas in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. 127 (1836), in obs.—U.S.A. (Calif.).

LAUTEA Forest Brown (Cornac.).
Collenettei (*Riley*) *Forest Brown in Bull. Bishop Mus. Honolulu*, No. 130, 214 (1935): Corokia Collenettei.

LAVANDULA L. (Labiat.).
×Eliae *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1932, xxxi. 16.—Hispan.
Humbertii *Maire & Wilczek in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1934, xxv. 314.—Marocc.
×Sennenii *Font Quer in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, v. Ser. Bot. No. 3, 220 (1920).—Hispan.

LAVANDULA:—
tomentosa (*L. f.*) *Pau in Mem. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, i. Ser. Bot. No. 1, 60 (1922): L. Spica var. tomentosa.

LAVANGA Meissn. (Rutac.).
crassifolia *Tanaka in Meded. Herb. Leid.* No. 69, 8 (1931).—Sumatra; Penins. Mal.; Borneo.

LAVOISIERA DC. (Melastomatac.).
Campos-Portoana *Mell. Barr. in Ann. Acad. Bras. Sc.* 1935, vii. 188, in obs.; *et in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 8 (1935).—Bras. (Minas Geraes).
Cogniauxiana *Mell. Barr. in Ann. Acad. Bras. Sc.* 1935, vii. 188, in obs.—Bras.
Gouveana *Mell. Barr. l. c.* 10.—Bras. (Minas Geraes).
Marques-Lisboana *Mell. Barr. in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 9 (1935).—Bras. (Minas Geraes).
Sampaioana *Mell. Barr. l. c.* 10.—Bras. (Minas Geraes).

LAWIELLA Koidz.; Koidz. in Y. Doi, Fl. Satsum. ii. 94 (1931), descr. emend. *PODOSTEMACEAE.*
austrosatsumensis *Koidz. l. c.* 101.—Japon.
Doiana *Koidz.*; *Koidz. l. c.* 96, descr. emend.—Japon.

LAYIA Hook. & Arn. (Compos.).
leucopappa *Keck in Madroña*, iii. 17 (1935).—U.S.A. (Calif.).
Munzii *Keck, l. c.* 16.—U.S.A. (Calif.).

LEANDRA Raddi (Melastomatac.).
linearis *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 425.—Venez.
montana *Gleason in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1935, xxxii. 210.—Guiana Bat.
mucida *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 177 (1934).—Ecuador.
thyrsiflora *Markgraf, l. c.* xii. 690 (1935).—Bras. (Rio de Janeiro).

LEBECKIA Thunb. (Legumin.).
acanthoclada *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 168 (1931), in obs., nomen; *et l. c.* xxx. 196 (1932).—Great Namaq.
candicans *Dinter, l. c.* xxx. 198 (1932).—Great Namaq.
parvifolia (*Schinz*) *Harms in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 545 (1915), in obs.: L. multiflora var. parvifolia.
spathulifolia *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 197 (1932).—Great Namaq.

LEBRUNIA Staner in Bull. Jard. Bot. Brux. xiii. 105 (1934). *GUTTIFERAE.*
Bushaie *Staner, l. c.*—Congo Belg.

LECANOPHORA Speg.; Rodrigo in Not. Mus. La Plata, Bot., i. 41 (1935), descr. emend. *MALVACEAE.*
chubutensis (*Speg.*) *Rodrigo, l. c.* 51: Sida chubutensis.

LECANORCHIS Blume (Orchidac.).
cerina *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 291.—Formosa.
nigricans *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 470.—Japon.
Ohwii *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1933, xxiii. 208.—Formosa.
purpurea *Masamune, Prelim. Rep. Veg. Yakus.* 60 (1929); *Masamune in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* xi., Bot. No. 4, 577 (1934).—Japon. (Kiushiu).

LECHEA L. (Cistac.).
depressa *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 59 (1933–5).—Calif. infer.
exserta *Small, Man. Southeast. Fl.* 883 (1933).—U.S.A. (Florida).
myriophylla *Small, l. c.* 884.—U.S.A. (Florida).
prismatica *Small, l. c.* 882.—U.S.A. (Florida).

LECYTHIS Loefl. (Lecythidac.; Myrtac., Gen. Pl.).
Davisii *Sandwith in Kew Bull.* 1932, 213.—Guiana Brit.
gigantea *Knuth in Fedde, Repert.* xxxviii. 113 (1935).—Peruv.

LECYTHIS:—
hians *A. C. Smith in Phytologia*, i. 123 (1935).—Bras. (Amaz.).
Jarana (*Huber*) *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 381: Chytroma Jarana.

LEDOTHAMNUS Meissn. (Ericac.).
parviflorus *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 436.—Venez.

LEEA L. (Vitac.; Ampelidac., Gen. Pl.).
erecta *Hort. ex Voll & Brade in Rodriguesia*, i. No. 3, 59 (1935), nomen.—Hort.
hirta *Hornem.*; *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 469 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 656 (1832).—Ind. or. (Bengal).
integrifolia *Roxb. Hort. Beng.* 85 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 472 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 659 (1832).—Ind. or. (Madras).
longifoliola *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 33 (1935).—China (Hainan).
macrophylla *Roxb. ex Hornem.*; *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 465 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 653 (1832).—Ind. or. (Bengal).
pallidifolia *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 354.—Ins. Palau.
robusta *Roxb. Hort. Beng.* 18 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 468 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 655 (1832).—Ind. or. (Madras).
sandakanensis *Ridley in Kew Bull.* 1931, 499.—Borneo.
Staphylea *Roxb. Hort. Beng.* 18 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 471 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 658 (1832).—Ind. or.
tetramera *B. L. Burtt in Kew Bull.* 1935, 304.—Ins. Solomon. (Bougainville).

LEERSIA Sw. (Gramin.).
oncothrix *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 263.—N. Rhodesia.

LEFEBVRIA A. Rich. (Umbellif.).
angustisecta *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 829 (1921), in obs.—Cameroons.
Zenkeri *Engl. l. c.*, in obs.—Cameroons.

LEGOUSIA Durand (Campanulac.).
coloradoënsis (*Buckl.*) *Briq. in Candollea*, iv. 332 (1931): Specularia coloradoënsis.
Juliani (*Battand.*) *Briq. l. c.*, cum descr. ampl.: Specularia Juliani.

LEIOPHYLLUM Hedw. f. (Ericac.).
Hugeri (*Hort.*) *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 314 (1924): Ledum Hugeri.

LEIOPOA Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot. 1932, i. 66. *GRAMINEAE.*
blepharogyna *Ohwi, l. c.*—Corea.
nuda (*Hackel*) *Ohwi, l. c.* 67: Poa nuda.

LEIOTHRIX Ruhl. (Eriocaulac.).
affinis *Alv. Silv. Fl. Mont.* 286 (1928).—Bras. (Minas Geraes).
araxaënsis *Alv. Silv. l. c.* 308.—Bras. (Minas Geraes).
argentea *Alv. Silv. l. c.* 296.—Bras. (Minas Geraes).
barreirensis *Alv. Silv. l. c.* 283.—Bras. (Minas Geraes).
distichophylla *Alv. Silv. l. c.* 287.—Bras. (Minas Geraes).
dubia *Alv. Silv. l. c.* 306.—Bras. (Minas Geraes).
flexuosa *Alv. Silv. l. c.* 302.—Bras. (Minas Geraes).
glandulifera *Alv. Silv. l. c.* 294.—Bras. (Minas Geraes).
glauca *Alv. Silv. l. c.* 279.—Bras. (Minas Geraes).
Gomesii *Alv. Silv. l. c.* 289.—Bras. (Minas Geraes).
heterophylla *Alv. Silv. l. c.* 300.—Bras. (Minas Geraes).
itacambirensis *Alv. Silv. l. c.* 307.—Bras. (Minas Geraes).
lanifera *Alv. Silv. l. c.* 295.—Bras. (Minas Geraes).
linearis *Alv. Silv. l. c.* 298.—Bras. (Minas Geraes).
longipes *Alv. Silv. l. c.* 303.—Bras. (Minas Geraes).
Michaelii *Alv. Silv. l. c.* 304.—Bras. (Minas Geraes).
milho-verdensis *Alv. Silv. l. c.* 291.—Bras. (Minas Geraes).
polystemma *Alv. Silv. l. c.* 293.—Bras. (Minas Geraes).

LEIOTHRIX:—
retrorsa *Alv. Silv. Fl. Mont.* 299 (1928).—Bras. (Minas Geraes).
subulata *Alv. Silv. l. c.* 288.—Bras. (Minas Geraes).
tenuifolia *Alv. Silv. l. c.* 285.—Bras. (Minas Geraes).
triangularis *Alv. Silv. l. c.* 305.—Bras. (Minas Geraes).
trichopus *Alv. Silv. l. c.* 281.—Bras. (Minas Geraes).
trifida *Alv. Silv. l. c.* 277.—Bras. (Minas Geraes).
turbinata *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 331.—Venez.

LEIPHAIMOS Schlecht. & Cham. (Gentianac.).
ayariensis *Suesseng. in Fedde, Repert.* xxx. 277 (1932).—Bras. (Amaz.).

LEIPOLDTIA L. Bolus (Ficoidac.).
pauciflora *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. ii. 302 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).

LELEBA Rumph. ex Teijsm. & Binn. (Gramin.).
amakusensis *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 547.—Japon. (Kiushiu).
breviflora (*Munro*) *Nakai, l. c.* ix. 16 (1933): Bambusa breviflora.
dolichomerithalla (*Hayata*) *Nakai, l. c.*: Bambusa dolichomerithalla.
elegans *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 27.—Japon.
Faurei (*Hackel*) *Nakai in Journ. Jap. Bot.* ix. 16 (1933): Bambusa Faurei.
floribunda (*Buese*) *Nakai, l. c.* 10: Ischurochloa floribunda.
liukiuensis (*Hayata*) *Nakai, l. c.* 16: Bambusa liukiuensis.
multiplex (*Lour.*) *Nakai, l. c.* 14: Arundo multiplex.
naibunensis (*Hayata*) *Nakai, l. c.* 16: Arundinaria naibunensis.
Oldhami (*Munro*) *Nakai, l. c.*: Bambusa Oldhami.
pachinensis (*Hayata*) *Nakai, l. c.* 17: Bambusa pachinensis.
Shimadai (*Hayata*) *Nakai, l. c.*: Bambusa Shimadai.
tuldoides (*Munro*) *Nakai, l. c.*: Bambusa tuldoides.

LEMAIREOCEREUS Britton & Rose (Cactac.).
euphorbioides (*Haw.*) *Werderm. in Fedde, Repert. Sonder-Beih.* C. t. 84 (1934): Cereus euphorbioides.
Martinezi *G. Ortega*; *G. Ortega, Apuntes Fl. Indig. Sinaloa*, Fam. Cact. F. [No. 3] (1929), descr.—Mexico.
Standleyi *G. Ortega, Rev. Mexic. Biol.* vii. No. 5, 121; cf. *G. Ortega, Apuntes Fl. Indig. Sinaloa*, Fam. Cact. F. [No. 1] (1929).—Mexico.

LEOCEREUS Britton & Rose (Cactac.).
squamosus (*Gürke*) *Werderm. Bras. Säulenkakt.* 98 (1933): Cereus squamosus.

LEONTODON L. (Compos.).
Bollei *Sch. Bip. ex A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1935, xv. 885, in syn.: Thrincia hispida.
Gausseni *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 92.—Hispan.
glaberrimus *Bellardi ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 537 (1834).—Hab. ?
Ludovici *Pau & Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 70 [1933], nomen.—Marocc.
orarius *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1932, xxiii. 197.—Marocc.
×transsilvanicus *Nyár. in Bul. Grăd. & Muz. Bot. Univ. Cluj*, 1934, xiv. 222 (1935).—Transylv.
Vagneri *Margittai in Bot. Közl.* 1935, xxxii. 88.—Czechoslovak.

LEONTOPODIUM R. Br. (Compos.).
Amrheinii *Hort. ex Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1935, l. 345, in obs.—Hort.
hayachinense (*Takeda*) *Hara & Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 73: L. alpinum var. hayachinense.
×intermedium *Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1906, xii. 92.—Hort.
Junpeianum *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 102.—Manchur.
×lindavicum *Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1906, xii. 92.—Hort.
×macranthum *Sünderm. l. c.*—Hort.
perniveum *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 374.—Japon.

LEONTOPODIUM:—
shinanense *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 74.—Japon. (Hondo).
spathulatum *Kitamura, l. c.* 1933, ii. 176.—Japon.

LEONURUS L. (Labiat.).
manshuricus *Yabe, Ic. Fl. Manch.* i. t. 20 (1920); *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo,* 1934, xlviii. 108: L. sibiricus var. grandiflorus *Benth.*
membranifolius *Boldingh, Zakfl. Landbouwstr. Java,* 108 (1916).—Java.
pseudo-macranthus *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo,* 1934, xlviii. 109.—Manchur.

LEOPOLDIA Herb. in Bot. Mag. sub t. 2113 (1819), in adnot., nomen provis.; et in Trans. Hort. Soc. iv. 181 [1821]. *AMARYLLIDACEAE.*
reticulata (*L'Hérit.*) *Herb. l. c.*, in adnot., nomen provis.; *et l. c.*: Amaryllis reticulata.
striatifolia (*Sims*) *Herb. l. c.*, in adnot., nomen provis.; *et l. c.*: Amaryllis reticulata var. striatifolia.

LEOPOLDIA Parl. (Liliac.).
caucasica (*Griseb. ex Baker*) *Losinsk. in Komarov, Fl. URSS,* iv. 410 (1935): Muscari caucasicum.
longipes (*Boiss.*) *Losinsk. l. c.*: Muscari longipes.

LEPANTHES Sw. (Orchidac.).
duidensis *Ames & C. Schweinf. in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 346.—Venez.
Edwardsii *Ames in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* i. No. 4, p. 4 (1933).—Honduras.
hondurensis *Ames in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1931, xliv. 43.—Honduras.
polygonoides *L. B. Smith & Harris in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* ii. 34 (1934).—Ecuador.
pseudocaulescens *L. B. Smith & Harris, l. c.* 33.—Colomb.
saccosepala *L. B. Smith & Harris, l. c.* 35.—Ecuador.

LEPANTHOPSIS Ames in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ. i. No. 9, 3 (1933). *ORCHIDACEAE.*
anthoctenium (*Reichb. f.*) *Ames, l. c.* 7: Pleurothallis anthoctenium.
congestiflora (*Cogn.*) *C. Porto & Brade in Rodriguesia,* i. No. 2, 37 (1935): Pleurothallis congestiflora.
densiflora (*Barb. Rodr.*) *Ames in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* i. No. 9, 11 (1933): Lepanthes densiflora.
floripecten (*Reichb. f.*) *Ames, l. c.*: Pleurothallis floripecten.
melanantha (*Reichb. f.*) *Ames, l. c.* 19: Pleurothallis melanantha.
microlepanthes (*Griseb.*) *Ames, l. c.* 24: Pleurothallis microlepanthes.
unilateralis (*Cogn.*) *C. Porto & Brade in Rodriguesia,* i. No. 2, 37 (1935): Pleurothallis unilateralis.

LEPECHINIA Willd. (Labiat.).
aurifera (*Rusby*) *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 25 (1935): Alguelagum auriferum.
bella *Epling, l. c.* 21.—Boliv.
bullata (*Kunth*) *Epling, l. c.* 24: Sideritis bullata.
calycina (*Benth.*) *Epling in Munz, Man. S. Calif. Bot.* 447, 600 (1935): Sphacele calycina.
caulescens (*Ortega*) *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 20 (1935), in obs.: Horminum caulescens.
chamaedryoides (*Balb.*) *Epling, l. c.*: Dracocephalum chamaedryoides.
codon *Epling, l. c.* 23.—Peruv.
conferta (*Benth.*) *Epling, l. c.* 25: Sphacele conferta.
confusa (*Briq.*) *Epling, l. c.*: Sphacele confusa.
floribunda (*Benth.*) *Epling, l. c.* 22: Sphacele floribunda.
graveolens (*Regel*) *Epling, l. c.* 25: Astemon graveolens.
heteromorpha (*Briq.*) *Epling, l. c.* 26: Sphacele heteromorpha.
hirsuta (*Epling*) *Epling, l. c.* 19: Sphacele hirsuta.
humilis *Epling, l. c.*—Colomb.
inflata (*Briq.*) *Epling, l. c.* 24: Sphacele inflata.
lamiifolia (*Benth.*) *Epling, l. c.* 21: Sphacele lamiifolia.
lancifolia (*Epling*) *Epling, l. c.* 23: Sphacele lancifolia.
Meyeni (*Walp.*) *Epling, l. c.* 20: Stachys Meyeni.
mollis (*Epling*) *Epling, l. c.* 27: Sphacele mollis.
mutica (*Benth.*) *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 27 (1935): Sphacele mutica.
paniculata (*Kunth*) *Epling, l. c.* 26: Sideritis paniculata.
Radula (*Benth.*) *Epling, l. c.* 27: Sphacele Radula.
Salviae (*Lindl.*) *Epling, l. c.* 22: Stachys Salviae.
salviifolia (*Kunth*) *Epling, l. c.* 23: Sideritis salviifolia.
scobina *Epling, l. c.* 26.—Peruv.
speciosa (*A. St. Hil. ex Benth.*) *Epling, l. c.* 21: Sphacele speciosa.
subhastata (*Benth.*) *Epling, l. c.* 22: Sphacele subhastata.
tomentosa (*Benth.*) *Epling, l. c.* 19: Sphacele tomentosa.
vesiculosa (*Benth.*) *Epling, l. c.* 24: Hyptis vesiculosa.

LEPEOSTEGERES Blume (Loranthac.).
centiflorus *Van Tiegh. in Compt. Rend.* cliii. 1197 (1911), in obs.: Loranthus centiflorus ?
filamentosus *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 265 (1931).—Borneo.
inconspicuus *Danser, l. c.* 269.—Borneo.
parviflorus *Danser, l. c.* 271.—Borneo.

LEPIDAGATHIS Willd. (Acanthac.).
bandraënsis *Blatter in Journ. & Proc. As. Soc. Beng.* 1930, n. s. xxvi. 347 (1931).—Ind. or. (Bombay).
mendax *Benoist in Bull. Soc. Bot. France,* 1934, lxxxi. 602.—Indo-China (Anam).
submitis *Blatter in Journ. & Proc. As. Soc. Beng.* 1930, n. s. xxvi. 349 (1931).—Ind. or. (Madras).

LEPIDARIA Van Tiegh. (Loranthac.).
malaiana *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 314 (1931).—Penins. Mal.
oviceps *Danser, l. c.* 315.—Borneo.
pulchella *Danser, l. c.*—Borneo.
vaginata *Van Tiegh.*; *Danser, l. c.* 318, latine.—Borneo.

LEPIDIUM L. (Crucif.).
aletes *Macbride in Candollea,* v. 357 (1934): L. calycinum *Godr.*
inclusum *O. E. Schulz in Fedde, Repert.* xxxiii. 189 (1933).—Fuegia.
Nelsonii *L. Williams in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1934, lxi. 259.—U.S.A. (N. Mexico).
persicum *Boiss.*; *N. Busch in Bull. Acad. Sc. URSS,* Sér. VII. 1931, 452, descr. emend.—Armenia; Persia; Afghan.
tenellum *L. Williams in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1934, lxi. 259.—U.S.A. (Colorado).
tortum *L. Williams, l. c.* 260.—U.S.A. (Nevada; Utah).
Walpersii *Macbride in Candollea,* v. 357 (1934): L. lanceolatum *Walp.*
Weddellii *O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 391 (1932), in obs.: L. affine *Wedd.*

LEPIDOLOPHA C. Winkler (Compos.).
karatavica *Pavlov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1933, n.s. xlii. 127, 132.—Turkestan.

LEPIDOPETALUM Blume (Sapindac.).
triloculare *Kanehira*; cf. *Bot. Mag., Tokyo,* 1933, xlvii. 400, japonice.—Hab. ?

LEPIDOPHORUM Neck. (Compos.).
Grisleyi *G. Sampaio ex Pereira in An. Fac. Sc. Porto,* xvii. 233 (1932), nomen.—Lusitan.

LEPIDORRHACHIS (H. Wendl.) Burret in Fedde, Repert. xxiv. 292 (1928), in adnot.; Becc. in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa, Mem., 1934, xliv. 158. *PALMAE.*
[Clinostigma subgen. Lepidorrhachis H. Wendl.]
Mooreana (*H. Wendl. & Drude*) *Burret, l. c.*, in adnot.; *Becc. l. c.* 159: Clinostigma Mooreanum.
onchorhyncha *Becc. ex Martelli in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1935, n. s. xlii. 56, in syn.: Clinostigma onchorhynchum.

LEPINIA Decne. (Apocynac.).
ponapensis *Hosokawa in Bot. Mag., Tokyo,* 1934, xlviii. 529.—Ins. Carolin. (Ponape).

LEPISANTHES Blume (Sapindac.).
alaris *Zoll. ex Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 768 (1932), in syn.: Otophora alata.
trichocarpa (*Thwait.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon,* vi. Suppl., 55 (1931): Hemigyrosa trichocarpa.

LEPISMIUM Pfeiff. (Cactac.).
cereoides *Backeb. & Voll in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 155, 411 (1935).—Bras. (Rio de Janeiro).
chrysocarpum (*Löfgr.*) *Backeb. l. c.* 153: Rhipsalis chrysocarpa.
epiphyllanthoides (*Backeb.*) *Backeb. l. c.* 154: Rhipsalis epiphyllanthoides.
floccosum (*Salm-Dyck*) *Backeb. l. c.* 155: Rhipsalis floccosa.
gibberulum (*Weber*) *Backeb. l. c.*: Rhipsalis gibberula.
megalanthum (*Löfgr.*) *Backeb. l. c.*: Rhipsalis megalantha.
Neves-Armondii (*K. Schum.*) *Backeb. l. c.*: Rhipsalis Neves-Armondii.
Pacheco-Leonii (*Löfgr.*) *Backeb. l. c.* 154: Rhipsalis Pacheco-Leonii.
pulvinigerum (*G. A. Lindb.*) *Backeb. l. c.* 155: Rhipsalis pulvinigera.
puniceodiscum (*G. A. Lindb.*) *Backeb. l. c.*: Rhipsalis puniceodiscus.
trigonum (*Pfeiff.*) *Backeb. l. c.* 156: Rhipsalis trigona.
tucumanense (*Weber*) *Backeb. l. c.* 155: Rhipsalis tucumanensis.
Vollii *Backeb. l. c.* 156, 411.—Bras. (Rio de Janeiro).

LEPISTEMON Blume (Convolvulac.).
Chevalieri *J. Troch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1933, Sér. II. v. 328.—Afr. Gall. Centr.
decurrens *Hand.-Mazz. in Sinensia,* v. 6 (1934).—China (Kwangsi).
glaber *Hand.-Mazz. l. c.* 7.—China (Kwangsi).

LEPTALOË Stapf in Bot. Mag. t. 9300 (1933). *LILIACEAE.*
albida *Stapf, l. c.*—Transvaal.
×atrovirens *Hort. ex Poindexter in Cact. & Succ. Journ. Amer.* vi. 92 (1934).—Cult.
caricina (*A. Berger*) *Stapf in Bot. Mag.* sub t. 9300 (1933), in obs.: Aloë caricina.
graminifolia (*A. Berger*) *Stapf, l. c.*, in obs.: Aloë graminifolia.
Johnstonii (*Baker*) *Stapf, l. c.*, in obs.: Aloë Johnstoni.
minima (*Baker*) *Stapf, l. c.*, in obs.: Aloë minima.
myriacantha (*Haw.*) *Stapf, l. c.*, in obs.: Bowiea myriacantha.
parviflora (*Baker*) *Stapf, l. c.*, in obs.: Aloë parviflora.

LEPTASEA Haw. (Saxifragac.).
Wettsteinii *Bruegg. ex Engl. & Irmsch. in Engl. Pflanzenreich, Saxifragac.-Saxifr.* 708, indice (1919), sphalm.: Saxifraga Wettsteinii.

LEPTAULUS Benth. (Icacinac.; Olacac., Gen. Pl.).
Oddonii (*De Wild.*) *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 254 (1921), in obs.: Alsodeiopsis Oddoni.

LEPTOCENTRUM Schlechter (Orchidac.).
Schliebenii *Mansf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xii. 704 (1935).—Tanganyika Terr.

LEPTOCEREUS Britton & Rose (Cactac.).
Ekmanii (*Werderm.*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 302 (1935): Cereus Ekmanii.
Grantianus *Britton in Cact. & Succ. Journ. Amer.* v. 469 (1933).—Ind. occ. (Culebra).

LEPTOCHLOA Beauv. (Gramin.).
Brandegei (*Vasey*) *Hitchcock in U. S. Dep. Agric., Bur. Pl. Ind.,* Bull. 33, p. 21 (1903): Diplachne Brandegei.
ciliata *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. 1. 263 (1931), in clavi.—Tanganyika Terr.
panicoides (*Presl*) *Hitchcock in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 137: Megastachya panicoides.
polygama (*Fourn.*) *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 437 (1896): Gouinia polygama.
Pringlei *Beal, l. c.* 436.—U.S.A. (Arizona).
Tracyi (*Vasey*) *Beal, l. c.*: Diplachne Tracyi.
viscida (*Scribn.*) *Beal, l. c.* 434: Diplachne viscida.

LEPTODACTYLON Hook. & Arn. (Polemoniac.).
floribundum (*A. Gray*) *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 42: Gilia floribunda.
Melingii *Wiggins in Contrib. Dudley Herb. Stanford Univ.* i. 173 (1933).—Calif. infer.

LEPTODERMIS Wall. in Roxb. Fl. Ind., ed. Carey & Wall., ii. 191 (1824). *RUBIACEAE.*
lanceolata *Wall. l. c.*—Nepal.

LEPTOPHOENIX Becc. (Palmae).
Brassii *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 339 (1935).—N. Guin.
macrocarpa *Burret, l. c.* 340.—N. Guin.
Mayrii *Burret, l. c.* xi. 709 (1933).—N. Guin.
micrantha *Burret, l. c.* 710.—N. Guin.
microcarpa *Burret, l. c.* xii. 342 (1935).—N. Guin.
parvula *Becc. ex Martelli in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1935, n. s. xlii. 57, nomen.—Hab. ?
pterophylla *Becc. in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa*, Mem., 1934, xliv. 131.—N. Guin.
yulensis *Becc. l. c.* 130.—N. Guin.

LEPTOPLAX O. E. Schulz in Engl. Jahrb. lxvi. 92 (1933). *CRUCIFERAE.*
emarginata (*Boiss.*) *O. E. Schulz, l. c.* 93, in obs.: Ptilotrichum emarginatum.

LEPTOSIPHON Benth. (Polemoniac.).
hybridus *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 683 (1895), in syn.: Gilia micrantha.

LEPTOSPERMUM J. R. & G. Forst. (Myrtac.).
brachyandrum (*F. Muell.*) *Cheel in Journ. & Proc. Roy. Soc. N. S. Wales*, 1931, lxv. 199 (1932): Kunzea brachyandra.
semibaccatum *Cheel, l. c.* 203.—Austral. (Queensland; N. S. Wales).
sphaerocarpum *Cheel, l. c.* 204.—Austral. (N. S. Wales).
trivalvum *Cheel, l. c.* 201.—Austral. (N. S. Wales).
Whitei *Cheel, l. c.* 199: Agonis elliptica.

LEPTOTAENIA Nutt. (Umbellif.).
Bradshawii *Rose apud Mathias in Leafl. West. Bot.* i. 101 (1934).—U.S.A. (Oregon).

LEPTOTES Lindl. (Orchidac.).
pauloënsis *Hoehne in Bol. Agric., S. Paulo*, 1933, xxxiv. 620 (1934).—Bras. (S. Paulo).

LEPTURUS R. Br. (Gramin.).
geminatus *C. E. Hubbard in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3233 (1934).—Austral. (Queensland).
xerophilus *Domin in Biblioth. Bot.* lxxxv. 412 (1915).—Austral. (Queensland).

LERCHIA Zinn, Cat. Pl. Gott. 30 (1757); cf. Sprague in Kew Bull. 1934, 219: **Suaeda** Forsk. (Chenopodiac.).

LERROUXIA Caballero in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid, Ser. Bot., No. 28, 13 (1935). *PLUMBAGINACEAE.*
ifniensis *Caballero, l. c.* 15.—Marocc.

LESPEDEZA Michx. (Legumin.).
cyclobotrya *F. B. Forbes & Hemsl. in Journ. Linn. Soc., Bot.* xxiii. 180 (1887), sphalm.: L. cyrtobotrya.
densiflora *Uyeki, Not. Dendrol. Kor.* (1), 3 [1935].—Corea.
formosa (*Vogel*) *Koehne, Deutsche Dendrol.* 343 (1893): Desmodium formosum.
formosensis *Hosokawa in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1933, v. 287.—Formosa.
grandis *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 159.—Hort.
macrovirgata *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 100, hybr.?—Manchur.
spicata *Nakai & Maekawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 52.—Japon. (Hondo).
sylvestris *Hatusima in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 209, in syn.: L. pilosa.

LESQUERELLA S. Wats. (Crucif.).
beringiana *Tatewaki & Kobayashi in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxxvi. 49 (1934), in syn.: L. arctica.
bernardina *Munz in Bull. S. Calif. Acad. Sc.* 1932, xxxi. 62.—U.S.A. (Calif.).
lepidota (*Rose*) *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 36 (1933–5), in obs.: Synthlipsis lepidota.

LESQUERELLA:—
peninsularis *Wiggins in Contrib. Dudley Herb. Stanford Univ.* i. 166 (1933).—Calif. infer.
Purshii (*S. Wats.*) *Fernald in Rhodora*, 1933, xxxv. 267: L. arctica var. Purshii.
Sherwoodii *Peck in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1934, xlvii. 186.—U.S.A. (Oregon).

LESSERTIA DC. (Legumin.).
acanthorhachis (*Dinter*) *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 202 (1932): Indigofera acanthorhachis.
affinis *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxv. 380 (1932).—Transvaal.
cryptantha *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 201 (1932).—Great Namaq.
distans *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxv. 380 (1932).—Transvaal.
eremicola *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 169 (1931), in obs., nomen; *et l. c.* xxx. 201 (1932), descr.—Great Namaq.
Mossii *R. Young in Ann. Transvaal Mus.* xiv. 408 (1932).—Transvaal.
nana *R. Young, l. c.*—Transvaal.
Phillipsiana *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxv. 380 (1932).—Transvaal.
purpurea *R. Young in Ann. Transvaal Mus.* xiv. 413 (1932).—Transvaal.

LETTSOMIA Roxb. Hort. Beng. 13 (1814), nomen; Fl. Ind., ed. Carey & Wall., ii. 75 (1824); Fl. Ind., ed. Carey, i. 487 (1832). *CONVOLVULACEAE.*
aggregata *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 76; *et l. c.* 488.—Ind. or.
argentea *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 79; *et l. c.* 489.—Ind. or. (Bengal).
bona-nox *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 84; *et l. c.* 494.—Ind. or. (Bengal).
cuneata (*Willd.*) *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 81; *et l. c.* 491: Convolvulus cuneatus.
cymosa *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 82; *et l. c.* 492.—Ind. or. (Madras).
lanata *Ruiz & Pav. Fl. Peruv. & Chil. Prodr.* 77 (1794), in obs.—Peruv.
nervosa (*Burm. f.*) *Roxb. Hort. Beng.* 13 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 78 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 488 (1832): Convolvulus nervosus.
ornata *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 86; *et l. c.* 496.—Ind. or.
pomacea *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 83; *et l. c.* 493.—Ind. or. (Mysore).
setosa *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 80; *et l. c.* 490.—Ind. or.
splendens *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 75; *et l. c.* 487.—Ind. or. (Bengal).
strigosa *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 80; *et l. c.*—Ind. or. (Bengal).
tomentosa *Ruiz & Pav. Fl. Peruv. & Chil. Prodr.* 77 (1794), in obs.—Peruv.
uniflora *Roxb. Hort. Beng.* 84 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 85 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 495 (1832).—Ind. or.

LEUCADENDRON Berg. (Proteac.).
album (*Thunb.*) *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 97 (1932): Protea alba.
glaberrimum (*Schlechter*) *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 279 (1931), cum descr. ampl.: Leucospermum glaberrimum.
laureolum (*Lam.*) *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 97 (1932): Protea laureola.

LEUCAENA Benth. (Legumin.).
insularum (*Guillaumin*) *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1932, lxxvii. Beibl. 19, 176: Acacia insularum.

LEUCANTHEMUM Mill. (Compos.).
aragonense (*Asso*) *G. Sampaio in Ann. Acad. Polyt. Porto*, xiv. 162 (1921): Chrysanthemum aragonense.
Balsamita (*L.*) *Over. Fl. S. Dakota*, 108 (1932); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 137: Chrysanthemum Balsamita.
Catananche (*Ball*) *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1923, xiv. 151, in obs.: Chrysanthemum Catananche.
depressum (*Ball*) *Maire, l. c.*, in obs.: Chrysanthemum Gayanum var. depressum.

LEUCANTHEMUM:—
gaetulum (*Battand.*) *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1923, xiv. 151, in obs.: Chrysanthemum gaetulum.
ifniense *Font Quer in Cavanillesia*, vii. 150 (1935).—Marocc.
longifolium *Sennen in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xv. Ser. Bot. No. 1, 21 (1931), in obs., nomen.—Hispan.
Maresii (*Coss.*) *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1923, xiv. 151, in obs.: Pyrethrum Maresii.
maroccanum (*Battand.*) *Maire, l. c.*, in obs.: Chrysanthemum maroccanum.
mesatlanticum *Emberger & Maire*; *Emberger & Maire in Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc*, Nos. xxi–xxii. 38 (1930).—Marocc.
Pujiulae *Sennen in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xv. Ser. Bot. No. 1, 21 (1931), in obs., nomen.—Hispan.

LEUCAS R. Br. (Labiat.).
Chiatelliniana *Chiov. Fl. Somala*, II. 371 (1932).—Somal. Ital.
mogadoxensis *Chiov. l. c.* 370.—Somal. Ital.
pododiskos *Bullock in Kew Bull.* 1931, 275.—Tanganyika Terr.
riukiuensis *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 67.—Ins. Liukiu.
tricrenata *Bullock in Kew Bull.* 1932, 503.—Kenya Col.

LEUCHERIA Lag. (Compos.).
thermarum (*R. Phil.*) *R. Phil. in Verh. Deutsch. Wiss. Ver. Santiago (Chile)*, ii. 203 (1892), in obs.; *Reiche, Fl. Chile*, iv. 423 (1905): Chabraea thermarum.

LEUCOJUM L. (Amaryllidac.).
Fontianum *Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc*, iii. 870 (1934); L. tingitanum *Font Quer in Cavanillesia*, v. 47 (1932), non *Baker*.

LEUCOPHOLIS Gardn. (Compos.).
capitata (*Baker*) *Cufod. in Fedde, Repert.* xxxi. 329 (1933): Achyrocline capitata.
longifolia (*Baker*) *Cufod. l. c.* 330, in obs.: Chionolaena longifolia.

LEUCOPHRYS Rendle (Gramin.).
psammophila (*Welw. ex Rendle*) *Dandy in Journ. Bot.* 1931, lxix. 54: Panicum psammophilum.

LEUCOPOA Griseb. (Gramin.).
albida (*Turcz.*) *Krecz. & Bobr. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 495 (1934): Poa albida.
caucasica (*Hackel*) *Krecz. & Bobr. l. c.* 496: Festuca caucasica.
karatavica (*Bunge*) *Krecz. & Bobr. l. c.*: Poa karatavica.
Olgae (*Regel*) *Krecz. & Bobr. l. c.* 495: Molinia Olgae.
sclerophylla (*Boiss. & Hohen.*) *Krecz. & Bobr. l. c.* 497: Festuca sclerophylla.

LEUCOPOGON R. Br. (Epacridac.).
coryphilus *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1933, Sér. II. v. 248.—N. Caled.
Kingianus (*F. Muell.*) *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 105 (1931): Styphelia Kingiana.

LEUCOPSIS Baker (Compos.).
acuminata (*DC.*) *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 6, 43 (1932): Aplopappus acuminatus.
psammophila *Malme, l. c.*—Bras. (Rio Grande do Sul).

LEUCOSPERMUM R. Br. (Proteac.).
Catherinae *Compton in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 69.—Afr. austr. (Cape Prov.).
cereris *Compton, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).
cordifolium (*Knight*) *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 97 (1932): Leucadendron cordifolium.
Patersonii *Phillips in Bothalia*, ii. 474 (1928).—Afr. austr. (Cape Prov.).
phyllanthifolium (*Knight*) *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 97 (1932): Leucadendron phyllanthifolium.
wittebergense *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 280 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).

×**LEUCOTELLA** Schlechter (Orchidac.).
[Leucorchis × Nigritella.]

×LEUCOTELLA:—
Borisii (*Stoyanoff, Stefanoff & Georgieff*) *G. Keller & Soó in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 290 (1935): Gymnadenia Borisii.

LEUCOTHOË D. Don (Ericac.).
andina *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 478 (1935).—Peruv.
boliviensis *Sleum. l. c.* xii. 131 (1934).—Boliv.
columbiana *Sleum. l. c.* xii. 479 (1935).—Colomb.
minensis *Glaziou*; *Sleum. l. c.* 480, descr.—Bras. (Minas Geraes).
Niederleinii *Sleum. l. c.*—Bras. (S. Catharina).
rivularis *Sleum. l. c.* 481.—Bras. (Minas Geraes).
Uleana *Sleum. l. c.*—Bras. (Rio de Janeiro).

LEURANTHUS Knobl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xii. 117 (1934). *OLEACEAE.*
Woodianus (*Knobl.*) *Knobl. l. c.*: Olea Woodiana.

LEUROCLINE S. Moore (Boraginac.).
Chazaliei (*Boissieu*) *Bonnet ex A. Cheval. Expl. Bot. Afr. Occ. Franç.* 452 (1920): Lithospermum Chazaliei.

LEUZEA DC. (Compos.).
berardioides *Coss. in Bull. Soc. Dauph.* 1883, p. 413, No. 4000, nomen; *Battand. Contrib. Fl. Atlant.* 55 (1919), descr.—Marocc.

LEVISTICUM Hill (Umbellif.).
latifolium (*L. f.*) *Battand. Contrib. Fl. Atlant.* 40 (1919): Crithmum latifolium.

LEWISIA Pursh (Portulacac.).
disepala *Rydb. in N. Am. Fl.* xxi. 328 (1932).—U.S.A. (Calif.).
Eastwoodiana *Purdy in Leafl. West. Bot.* i. 20 (1932).—U.S.A. (Oregon).
Finchae *Purdy, l. c.*—U.S.A. (Oregon).
Heckneri *ex R. B. Smith in Gard. Chron.* 1931, Ser. III. xc. 131, in obs.; *C. V. Morton ex Gabrielson in New Fl. & Silv.* v. 53 (1932).—Calif.
minor *Rydb. in N. Am. Fl.* xxi. 327 (1932).—U.S.A. (Calif.; Nevada).
Purdyi *Gabrielson, West. Am. Alp.* 143, 144 (1932), in obs.—U.S.A. (Oregon).
rupicola *C. S. English in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1934, xlvii. 190.—U.S.A. (Oregon).
Whiteae *Purdy in Leafl. West. Bot.* i. 20 (1932).—U.S.A. (Oregon).

LEYCESTERIA Wall. in Roxb. Fl. Ind., ed. Carey & Wall., ii. 181 (1824). *CAPRIFOLIACEAE.*
crocothyrsos *Airy-Shaw in Hook. Ic. Pl.* xxxii. t. 3165 (1932); *et in Kew Bull.* 1932, 170.—Ind. or. (Assam).
formosa *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 182 (1824).—Reg. Himal.
gracilis (*Kurz*) *Airy-Shaw in Hook. Ic. Pl.* xxxii. sub t. 3165, t. 3166 (1932); *et in Kew Bull.* 1932, 174: Lonicera gracilis.

LIABUM Adans. (Compos.).
barahonense *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 85 (1931).—Santo Domingo.
brachypus (*Rydb.*) *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1932, xxii. 386, in obs.: Sinclairia brachypus.
dimidium *Blake, l. c.* 385.—Guatem.
longifolium (*Rusby*) *Blake, l. c.* 1935, xxv. 322: Munnozia longifolia.
oblanceolatum *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 89 (1931).—Santo Domingo.
ovatifolium *Urb. l. c.* 86.—Santo Domingo.
Poiteaui (*Cass.*) *Urb. l. c.* 87: Andromachia Poiteaui.
polycephalum *Urb. & Ekman, l. c.* 88.—Haiti.
selleanum *Urb. l. c.* 86.—Haiti.

LIATRIS Schreb. (Compos.).
Bebbiana *Rydb. in Brittonia*, i. 99 (1931).—U.S.A. (Nebraska; Illinois).
compacta (*Torr. & Gray*) *Rydb. l. c.* 98: L. squarrosa var. compacta.
fallacior (*Lunell*) *Rydb. Fl. Prairies & Plains Centr. N. Amer.* 780 (1932): Laciniaria fallacior.
glabrata *Rydb. in Brittonia*, i. 98 (1931).—U.S.A. (Central States).
Haywardii *Rydb. l. c.* 99.—U.S.A. (S. Dakota).
Herrickii *Rydb. l. c.*—U.S.A. (Minnesota).
hirsuta *Rydb. l. c.* 98.—U.S.A. (Central States).

LIATRIS:—
kansana (*Britton*) *Rydb. Fl. Prairies & Plains Centr. N. Amer.* 781 (1932): Laciniaria kansana.
ligulistylis (*A. Nelson*) *Rydb. in Brittonia*, i. 100 (1931): Laciniaria ligulistylis.
Ohlingerae (*Blake*) *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 49 (1934): Laciniaria Ohlingerae.
Rosendahlii *Rydb. in Brittonia*, i. 100 (1931).—U.S.A. (Minnesota).

LIBANOTIS Zinn, Cat. Pl. Gott. 226 (1757); cf. Sprague in Kew Bull. 1934, 219: **Seseli** L. (Umbellif.).

LICANIA Aubl. (Rosac.).
buxifolia *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 369.—Guiana Brit.
lata *Macbride in Candollea*, v. 369 (1934).—Peruv.
lifouana *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 166.—Ins. Loyauté.
longipedicellata *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 725.—Bras. (Amaz.).
lucida *Macbride in Candollea*, v. 369 (1934).—Peruv.
ovalifolia *Kleinh. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 180.—Guiana Bat.
Stahelii *Kleinh. l. c.* 181.—Guiana Bat.
trigonioides *Macbride in Candollea*, v. 368 (1934).—Peruv.

LICARIA Aubl.; H. Hallier in Meded. Herb. Leid. No. 35, 20 (1918): **Ocotea** Aubl. (Laurac.).

LICUALA Wurmb. (Palmae).
brevipes *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1149 (1895), in syn.: Copernicia robusta.
leptocalyx *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 706 (1933).—N. Guin.
linearis *Burret, l. c.* xii. 314 (1935).—N. Guin.
Naumannii *Burret, l. c.* 312.—Ins. Solomon.
pachycalyx *Burret, l. c.* xi. 705 (1933).—N. Guin.
paucisecta *Burret, l. c.* xii. 311 (1935).—N. Guin.
pulchella *Burret, l. c.* 315.—N. Guin.
Steinii *Burret, l. c.* xi. 707 (1933).—N. Guin.

LIGHTFOOTIA L'Hérit. (Campanulac.).
elata *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 74 (1935).—Kenya Col.
lycopodioides *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 686 (1932).—Tanganyika Terr.
polycephala *Mildbr. l. c.*—Tanganyika Terr.

LIGULARIA Cass. (Compos.).
chimiliensis *Chang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 61 (1935).—Upper Burma.
confertiflora *Chang, l. c.* 63.—China (Yunnan).
formosana (*Hayata*) *Masamune, List Seeds Taih. Bot. Gard.* 13 (1933); cf. *Masamune & Suzuki in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard.* 1933, iii. 70: L. tussilaginea var. formosana.
kaialpina *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 170.—Japon. (Hondo).
Kojimae *Kitamura, l. c.* 135.—Formosa.
lamarum (*Diels*) *Chang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 65 (1935), in obs.: Senecio lamarum.
Ledebourii (*Sch. Bip.*) *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 316 (1924): Senecio Ledebourii.
luchuensis (*Masamune*) *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 193: L. tussilaginea var. luchuensis.
parvifolia *Chang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 64 (1935).—China (Yunnan).
plantaginifolia (*Franch.*) *Mattf. ex Rehder & Kobuski in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 40: Senecio plantaginifolia.
pterodonta *Chang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 65 (1935).—China (Yunnan).
sagitta (*Maxim.*) *Mattf. ex Rehder & Kobuski in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 40: Senecio sagitta.
songarica (*Fisch.*) *Ling in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, ii. 532 (1934): Senecio songaricus.
stenocephala (*Maxim.*) *Chen in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* v. 74 (1934): Senecio stenocephalus.
tangutica (*Maxim.*) *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 317 (1924): Senecio tanguticus.
tenuicaulis *Chang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 66 (1935).—E. Tibet.
virgaurea (*Maxim.*) *Mattf. ex Rehder & Kobuski in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 40: Senecio virgaurea.

LIGULARIA:—
yunnanensis (*Franch.*) *Chang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 67 (1935), in obs.: Senecio yunnanensis.

LIGUSTICUM L. (Umbellif.).
Handelii *H. Wolff ex Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 723 (1933), in obs., nomen.—China (Szechuan).
hispidum (*Franch.*) *H. Wolff in Hand.-Mazz. l. c.*: Trachydium hispidum.
mongholicum (*Turcz.*) *Krylov, Fl. Sibir. Occ.* viii. 2014 (1935): Hansenia mongholica.
purpureopetalum *Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 206 (1932).—Sibir. or.

LIGUSTRUM L. (Oleac.).
glabrinerve *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3208 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
Hisauchii *Makino in Journ. Jap. Bot.* i. 3 (1916).—Japon.
indicum (*Lour.*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 307 (1935): Phillyrea indica.
Iwaki *Hisauchi in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 848, in syn.: L. japonicum var. crassifolium *Hisauchi*.
Kellermanni *Nicholson, Ill. Dict. Gard.* ii. 264 (1885), in syn.: L. japonicum.
microcarpum *Kanehira & Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1931, xxi. 146.—Formosa.
morrisonense *Kanehira & Sasaki, l. c.* 147.—Formosa.
neo-ebudicum *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 58.—N. Hebrides.
nepalense *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 151 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 149 (1832).—Nepal.
nokoënse *Masamune & Mori in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 191.—Japon.
pekinense (*Rupr.*) *K. Koch, Dendrol.* ii. 272 (1872), in obs.: Syringa pekinensis.
retusum *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 49 (1935).—China (Hainan).
Yuhkianum *Koidz. in Yuhki, Fl. Yamagata-praefect.* 78 (1934); cf. *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 150.—Japon.

LILAEOPSIS Greene (Umbellif.).
Hillii *Moreau in Physis*, xi. 478 (1935).—Argent.
patagonica *Moreau, l. c.* 480.—Argent.

LILIASTRUM Link (Liliac.).
Liliastrum (*L.*) *Lyons, Plant Names Scientific & Popular*, ed. 2, 272 (1907), in obs.: Anthericum Liliastrum.

LILICELLA L. C. Rich. ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. 1188 (1895), in obs. *TRIURIDACEAE.*

LILIUM L. (Liliac.).
amoenum *E. H. Wilson ex Stoker in Lily Year-Book*, 1935, 6, pro syn.: L. sempervivoideum.
aurantiacum *Weston, Univ. Bot.* iii. 453 (1772); *Dum. Cours. Bot. Cult.* ed. 2, ii. 197 (1811).—Austria; Ital.; Sibir.
×aurelianense *Debras in Lily Year-Book*, 1932, 116.—Cult.
Batemanniae (*Hort.*) *Wallace in Gard. Ill.* xxviii. 455 (1906); *Bailey, Stand. Cycl. Hort.* iv. 1877 (1916), hybr. ?: L. elegans var. Batemanniae.
biligulosum *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1098 (1895), in syn.: L. elegans var. sanguineum *Lindl.*
bosniacum *G. Beck in Ann. Nat. Hofmus., Wien*, 1887, ii. 47, pro var. L. carniolici.—Bosnia.
caucasicum *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1103 (1895), in syn.: L. monadelphum.
chrysanthum *Nakai & Maekawa in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 244.—Corea.
cordatum (*Thunb.*) *Koidz.*; *Airy-Shaw in Kew Bull.* 1931, 159: Hemerocallis cordata.
distichum *Nakai apud Kamib. Chosen Yuri Dzukai*, t. 7 (1915); *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, xxxi. 6 (1917), descr.—Corea.
incomparabile *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1099 (1895), in syn.: L. elegans var. incomparabile *Voss*.
jucundum *Hort. ex Vilmorin, l. c.* 1105, in syn.: L. Maximowiczii.

LILIUM:—
Kelleyanum *Lemmon in Sierra Cl. Bull.* iv. 300 (1903).—U.S.A. (Calif.).
Kelloggii *Purdy in Garden*, 1901, lix. 331.—U.S.A. (Oregon; Calif.).
macrophyllum (*D. Don*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1105 (1895): Fritillaria macrophylla.
Melpomene *Hort. ex Kronfeldt in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1932, xlvii. 195.—Japon.
nevadense *Eastw. in Leafl. West. Bot.* i. 41 (1933).—U.S.A. (Calif.).
Poilanei *Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, vi. 810 (1934); *et in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 619.—Indo-China (Tonkin; Laos).
pseudo-Grayi *Grove in Gard. Chron.* 1934, Ser. III. xcvi. 300, in obs.: L. Grayi *ex Gard. Chron.* 1901, Ser. III. xxx. 69; *Blomquist in Addisonia*, xviii. 19, tab. 586 (1933), non *S. Wats.*
purpureum (*T. Moore*) *Bull ex T. Moore in Florist*, 1874, 256, in obs.: L. washingtonianum var. purpureum.
Robinsonii *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1100 (1895), in syn.: L. pardalinum.
Wardii *Stapf ex W. W. Smith in Gard. Chron.* 1935, Ser. III. xcvii. 208.—Tibet.

LIMNALSINE Rydb. in N. Am. Fl. xxi. 295 (1932). *PORTULACACEAE.*
diffusa (*Nutt.*) *Rydb. l. c.*: Claytonia diffusa.

LIMNIA L. (Portulacac.).
adsurgens (*Suksdorf*) *Rydb. in N. Am. Fl.* xxi. 308 (1932): Claytonia parviflora var. adsurgens.
amplectens *A. Heller ex Rydb. l. c.* 309, in syn.: L. humifusa.
angustifolia (*Greene*) *Rydb. l. c.* 310: Claytonia perfoliata var. angustifolia.
bracteosa *Rydb. l. c.* 305.—U.S.A. (Calif.).
carnosa (*Greene*) *A. Heller ex Rydb. l. c.* 307: Claytonia perfoliata var. carnosa.
cordifolia (*S. Wats.*) *Rydb. l. c.* 306: Claytonia cordifolia.
diaboli *Rydb. l. c.* 312.—U.S.A. (Calif.).
glauca (*Nutt.*) *Rydb. l. c.* 311: Claytonia parviflora var. glauca.
guadalupensis *Rydb. l. c.*—Calif. infer. (Ins. Guadalupe).
Hassei *Rydb. l. c.*—Calif. super. & infer.
heterophylla (*Jepson*) *Rydb. l. c.* 306: Montia heterophylla.
humifusa (*Howell*) *Rydb. in Brittonia*, i. 88 (1931): Montia humifusa.
interrupta (*Suksdorf*) *Rydb. in N. Am. Fl.* xxi. 308 (1932): Montia interrupta.
membranacea *Rydb. l. c.*—U.S.A. (N. W. States).
mexicana *Rydb. l. c.* 309.—Mexico.
platyphylla *Rydb. l. c.* 307.—U.S.A. (Calif.).
rupestris (*Suksdorf*) *Rydb. l. c.* 311: Claytonia parviflora var. rupestris.
sarmentosa (*C. A. Mey.*) *Rydb. l. c.* 306: Claytonia sarmentosa.
tenuifolia (*Torr. & Gray*) *Rydb. l. c.* 313: Claytonia tenuifolia.
viridis (*Davidson*) *Rydb. l. c.*: Montia spathulata var. viridis.
washingtoniana (*Suksdorf*) *Rydb. l. c.* 305: Claytonia washingtoniana.

LIMNOPEUCE Zinn, Cat. Pl. Gott. 55 (1757); cf. Sprague in Kew Bull. 1934, 219: **Hippuris** L. (Haloragac.).

LIMNOPHILA R. Br. (Scrophulariac.).
fluviatilis *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 587.—Sudan. (Haut-Sénégal-Niger).
Kingii (*F. Muell.*) *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 117 (1931): Stemodia Kingii.
polystachyoides *Blatter in Journ. & Proc. As. Soc. Beng.* 1930, n. s. xxvi. 352 (1931).—Ind. or. (Bombay).
sessilis (*Benth.*) *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1932, 62: Stemodia sessilis.
stipitata (*Hayata*) *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1060 (1931): Ambulia stipitata.

LIMNORCHIS Rydb. (Orchidac.).
hologlottis (*Maxim.*) *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, iv. 666 (1935): Platanthera hologlottis.

LIMNORCHIS:—
woodlandensis *Nylander, Orchids Northern Maine*, No. 13 (1935); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 147.—U.S.A. (Maine).

LIMNOSIPANEA Hook. f. (Rubiac.).
Kuntzei *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 280 (1931).—Boliv.

LIMONIA L. (Rutac.).
littoralis (*Miq.*) *Backer, Schoolfl. Java*, 185 (1911): Paramignya littoralis.

LIMONIASTRUM Moench (Plumbaginac.).
ifniense (*Caballero*) *Font Quer in Cavanillesia*, vii. 150 (1935): Lerrouxia ifniensis.
majus *Lanza in Lav. Ist. Bot. Palermo*, 1932, iii. 50.—Hort.
Malenconianum *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1935, xxvi. 129.—Marocc.
Reinwardtii *Lanza in Lav. Ist. Bot. Palermo*, 1932, iii. 51, in obs.—Hort.
Weygandiorum *Maire & Wilczek in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1935, xxvi. 129.—Marocc.

LIMONIUM Mill. (Plumbaginac.).
acuminatum *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1934, xxiv. 124, 129, in adnot.—Afr. austr. (Cape Prov.).
amoenum (*C. H. Wright*) *R. A. Dyer in Kew Bull.* 1932, 155: Statice amoena.
anthericoides (*Schlechter*) *R. A. Dyer, l. c.*: Statice anthericoides.
asparagoides (*Coss. & Dur.*) *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 55: Statice asparagoides.
avenaceum (*C. H. Wright*) *R. A. Dyer in Kew Bull.* 1932, 155: Statice avenacea.
Beaumierianum (*Maire*) *Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc*, iii. 568 (1934): Statice Beaumieriana.
Braunii (*Bolle*) *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1935, xv. 928: Statice Braunii.
capense (*L. Bolus*) *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1934, xxiv. 124, in obs., 129, in adnot.: Statice capensis.
equisetinum (*Boiss.*) *R. A. Dyer in Kew Bull.* 1932, 155: Statice equisetina.
fallax (*Coss.*) *Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc*, iii. 568 (1934): Statice fallax.
Fausti *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 97 [1933], nomen alternativum: Statice Fausti.
Fergusoniae *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1934, xxiv. 124.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Gavilae *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 97 [1933], nomen alternativum: Statice Gavilae.
Gomezi-Jordanae *Sennen & Mauricio, l. c.*, nomen alternativum: Statice Gomezi-Jordanae.
haitense *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 13.—Haiti.
ifniense *Caballero in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 28, 11 (1935), in syn.: Statice ifniensis.
Limonium (*L.*) *Lyons, Plant Names Scientific & Popular*, 225 (1900), in obs.: Statice Limonium.
mauritanicum *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 188 (1931).—Mauritania.
Molesi *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 97 [1933], nomen alternativum: Statice Molesi.
Moureti (*Pitard*) *Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc*, iii. 569 (1934): Statice Moureti.
namaquanum *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1934, xxiv. 124.—Namaqualand.
palmyrense (*Post*) *Dinsm. Pl. Post. & Dinsm.* Fasc. i. 12 (1932); *Dinsm. in Post, Fl. Syria, Palest. & Sinai*, ed. 2, ii. (*Publ. Am. Univ. Beirut*, Nat. Sc. Ser. No. 1) 414 (1933); *et in Fedde, Repert.* xxxiii. 110 (1933): Statice palmyrensis.
paradoxum *Pugsley in Journ. Bot.* 1931, lxix. 46.—Hibern.; Cambria.
sanjurjoi *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 97 [1933], nomen alternativum: Statice sanjurjoi.
sebkarum (*Pomel*) *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1934, xxv. 308: Statice sebkarum.
teretifolium *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1934, xxiv. 124.—Afr. austr. (Cape Prov.).

LIMOSELLA L. (Scrophulariac.).
africana *Glück in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 76 (1934); *et in Engl. Jahrb.* lxvi. 540, 558 (1934).—Cameroons; Afr. trop. or.; Afr. austr.

LIMOSELLA:—
americana *Glück in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 75 (1934); *et in Engl. Jahrb.* lxvi. 534, 558 (1934).—N. Mexico; Mexico; Boliv.; Peruv.; Argent.
lineata *Glück, l. c.* 73; *et l. c.* 506, 555.—Afr. austr.; Madag.; N. Zel.; Reg. antarct.

LINANTHUS Benth. (Polemoniac.).
Peirsoni *Mason in Madroña*, ii. 23 (1931).—U.S.A. (Calif.).

LINARIA Mill. (Scrophulariac.).
afougueurensis *Coss. ex Battand. Contrib. Fl. Atlant.* 63 (1919).—Marocc.
ambigua *Popov ex Baranov in Journ. Turkest. Branch Russ. Geogr. Soc.* 1924, xvii. 3 (1925), nomen.—Turkestan. (Thian Shan).
arenaria *Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc*, iii. 672 (1934), sphalm.: L. arenicola.
arenicola *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1930, No. 590 [1932].—Marocc.
×brangensis *Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1931–2, Sér. II. xxiv. 235 (1933).—Gallia.
Burceziana *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1934, xxv. 312.—Alger.
filiformis *Colla, Herb. Pedem.* iv. 317 (1835).—Hab.?
Gombaultii *J. Thiéb. in Bull. Soc. Bot. France*, 1935, lxxxii. 191.—Syria.
Nottae *Durand-Duquesney in Bréb. Fl. Normand.* ed. 3, 208 (1859).—Gallia.
ochroleuca *Bréb. l. c.* ed. 2 (1849); *et l. c.* ed. 3, 209 (1859).—Gallia.
pectinata *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1928, No. 360 [1929].—Marocc.
Perrieri (*Rouy*) *Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1931–2, Sér. II. xxiv. 234 (1933), in obs., et in adnot.: L. vulgaris subsp. Perrieri.
pygmaea (*G. Sampaio*) *G. Sampaio in An. Acad. Polyt. Porto*, x. 124 (1915); *et in Bol. Soc. Brot.* Sér. II. x. 155, in adnot., 243 (1935): L. Munbyana var. pygmaea.
rhiphatlantica *Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 568 [1928].—Marocc.
sexpartita *Colla, Herb. Pedem.* iv. 318 (1835).—Hab.?
Vergneti *Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1931–2, Sér. II. xxiv. 228, 233 (1933), hybr.?—Gallia.
Weilleri *Emberger & Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1932, xxiii. 202.—Marocc.

LINDACKERIA Presl (Flacourtiac.; Bixac., Gen. Pl.).
Bequaerti *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 407 (1932).—Congo Belg.
Gilleti *De Wild. l. c.* 409.—Congo Belg.

LINDERA Thunb. (Laurac.).
angustifolia *Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., viii. 294 (1933).—China (Kiangsu).
annamensis *H. Liou, Laurac. Chine et Indochine*, 127 (1932).—Indo-China (Anam).
Chienii *Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., ix. 193 (1934).—China (Kiangsu).
Chunii *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* vii. 307 (1931); *H. Liou, Laurac. Chine et Indochine*, 134 (1932), descr. ampl.—China (Kwangsi; Kwangtung).
Eberhardtii *Lecomte*; *H. Liou, l. c.* 135, descr. ampl.—Hongkong; Indo-China (Anam).
Meissneri *King ex Hook. f.*; *H. Liou, l. c.* 126, descr. ampl.—Indo-China (Tonkin).
Myrrha (*Lour.*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. ii. 11, 167 (1935): Laurus Myrrha.
velutina *H. Liou, Laurac. Chine et Indochine*, 137 (1932).—China (Kweichau).

LINDERNIA All. (Scrophulariac.).
anagallidea (*Michx.*) *Pennell in Acad. Nat. Sc. Philad.* Monogr. 1, *Scroph.* 152 (1935): Gratiola anagallidea.
antipoda (*L.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 214 (1931): Ruellia antipoda.
cordifolia (*Colsm.*) *Hochr. in Candollea*, v. 205 (1934): Gratiola cordifolia.
dubia (*L.*) *Pennell in Acad. Nat. Sc. Philad.* Monogr. 1, *Scroph.* 141 (1935): Gratiola dubia.

LINDERNIA:—
glandulifera *Backer ex Demandt in Arch. Suikerind. Ned.-Ind., Meded. Proefst. Javasuikerind.* 1933, 133, nomen.—Hab. ?
pusilla (*Thunb.*) *Boldingh, Zakfl. Landbouwstr. Java*, 165 (1916); *Merrill in Philipp. Journ. Sc.* 1916, xi. 312 (1917): Selago pusilla.
rotundifolia (*L.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 214 (1931): Gratiola rotundifolia.
subracemosa *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 425 (1932).—Congo Belg.
tenuifolia (*Vahl*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 214 (1931): Gratiola tenuifolia.
viscosa (*Willd.*) *Boldingh, Zakfl. Landbouwstr. Java*, 165 (1916); *Merrill, Sp. Blanc.* 14 (1918): Hornemannia viscosa.

LINDMANIA Mez (Bromeliac.).
gracilis (*Rusby*) *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 78 (1934): Catopsis gracilis.
micrantha (*Lindl.*) *L. B. Smith, l. c.* 77: Pitcairnia micrantha.

LINOCIERA Sw. (Oleac.).
Broomeana (*Horne ex Oliv.*) *Knobl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1028 (1934): Noronhia Broomeana.
Cordemoyana *Knobl. l. c.* 1031: L. coriacea *Cordemoy*.
Harmandii *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 786 (1933).—Indo-China (Laos).
lanceolata *Knobl. in Fedde, Repert.* xxxiii. 177 (1933).—Santo Domingo.
Lebrunii *Staner in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxii. 244 (1932).—Uganda.
microstigma *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 786 (1933).—Indo-China (Laos; Cochinch.).
ovalis *Knobl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1029 (1934).—N. Guin.
Pierrei *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 786 (1933).—Indo-China.
pubescens (*H. B. & K.*) *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* vi. 1. 308 (1868), in obs.: Chionanthus pubescens.
pubicalyx *Ridley in Kew Bull.* 1934, 122.—Borneo (Ins. Gaya).
pubipaniculata *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 187 (1934).—Sumatra.
Robinsonii *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 787 (1933).—Indo-China (Anam).
Sangda *Gagnep. l. c.*—Indo-China (Anam; Cochinch.).
Thorelii *Gagnep. l. c.* 788.—Laos; Cambodia; Cochinch.
Urbanii *Knobl. in Fedde, Repert.* xxxiii. 178 (1933): L. pubescens *Urb. & Ekman*.
verticillata *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 788 (1933).—Indo-China (Anam).

LINOSPADIX H. Wendl. & Drude (Palmae).
aequisegmentosus (*Domin*) *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 331 (1935): Bacularia aequisegmentosa.
Albertisianus (*Becc.*) *Burret, l. c.*: Bacularia Albertisiana.
angustisectus (*Becc.*) *Burret, l. c.*: Bacularia angustisecta.
caninus (*Becc.*) *Burret, l. c.*: Bacularia canina.
leptostachys *Burret, l. c.* xi. 711 (1933).—N. Guin.
longicruris (*Becc.*) *Burret, l. c.* xii. 331 (1935): Bacularia longicruris.
microcaryus (*Domin*) *Burret, l. c.*: Bacularia microcarya.
pachystachys *Burret, l. c.* xi. 711 (1933).—N. Guin.
Palmerianus (*F. M. Bailey*) *Burret, l. c.* xii. 331 (1935): Bacularia Palmeriana.

LINUM L. (Linac.).
arenicola (*Small*) *H. Winkler in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 116 (1931): Cathartolinum arenicola.
Borzeanum *Nyár. in Bul. Grăd. & Muz. Bot. Univ. Cluj*, 1931, xi. 17.—Ruman.
Bracei (*Small*) *H. Winkler in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 116 (1931): Cathartolinum Bracei.
corallicola (*Small*) *H. Winkler, l. c.*: Cathartolinum corallicola.

LINUM:—
Doerfleri *K. H. Rechinger in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1935, lxxxiv. 147.—Creta.
Earlei (*Small*) *H. Winkler in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 116 (1931): Cathartolinum Earlei.
flagellare (*Small*) *H. Winkler, l. c.*: Cathartolinum flagellare.
Gomezi *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 146 [1933].—Marocc.
karataviense *Pavlov in Sovietsk. Bot.* 1934, No. 1, 25, in obs., nomen.—Turkestan.
lignosum (*Small*) *H. Winkler in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 116 (1931): Cathartolinum lignosum.
macrosepalum (*Small*) *H. Winkler, l. c.*: Cathartolinum macrosepalum.
Muelleri (*Small*) *H. Winkler, l. c.*: Cathartolinum Muelleri.
sedoides (*Porter*) *H. Winkler, l. c.*: Linum Kingii var. sedoides.
spicatum (*Pers.*) *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 95 (1932): L. strictum var. spicatum.
subteres (*Trel.*) *H. Winkler in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 116 (1931), in obs.; L. aristatum var. subteres.
Wrightii (*Small*) *H. Winkler, l. c.*: Cathartolinum Wrightii.

LIPARA Lour. ex Gomes in Mem. Acad. Sc. Lisb. Cl. Sc. Pol. Mor. Bel.-Let. n. s. iv. (1), 30 (1868); Merrill in Trans. Am. Phil. Soc. n. s. xxiv. II. 17, 227 (1935), in syn.: **Canarium** L. (Burserac.).
nigra *Lour. ex Gomes, l. c.*; *Merrill, l. c.*, in syn.: Canarium Pimela.

LIPARIS L. C. Rich. (Orchidac.).
Amesiana *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 124 (1931).—Borneo.
arcuata *J. J. Smith, l. c.* xii. 116 (1932).—Sumatra.
arrigens *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 25 (1935).—N. Guin.
Balansae *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 165.—Indo-China (Tonkin; Anam).
brunneolobata *Kerr in Journ. Siam. Soc., Nat. Hist. Suppl.*, ix. 227 (1933).—Indo-China (Laos).
chapaënsis *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 166.—Indo-China (Tonkin).
elongata *Fukuyama in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard.* 1933, iii. 82.—Formosa.
Endertii *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 122 (1931).—Borneo.
fantastica *Ames & C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* ii. 97 (1934).—Guatem.
flavo-viridis *Blatter & McCann in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxv. 260 (1931).—Ind. or. (Bombay).
gigantea *Tso in Sunyatsenia*, i. 136 (1933).—China (Kwangtung).
kemulensis *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 149 (1932): L. Amesiana *J. J. Smith*.
latialata *Mansf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 703 (1935).—Tanganyika Terr.
laurisilvatica *Fukuyama in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard.* 1933, iii. 83.—Formosa.
longiscapa (*Rolfe & Downie*) *Gagnep. in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, vi. 182 (1932): L. odorata var. longiscapa.
lycopodioides *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 121 (1931).—Borneo.
meniscophora *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 166.—Indo-China (Anam).
nikkoënsis *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 108.—Japon.
nokoënsis *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 435.—Formosa.
Petelotii *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 166.—Indo-China (Tonkin).
pilifera *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 114 (1932).—Sumatra.
sachalinensis *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 108.—Sakhalin.
sootenzanensis *Fukuyama in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard.* 1933, iii. 84.—Formosa.
suborbicularis *Summerhayes in Kew Bull.* 1934, 210.—S. Nigeria.

LIPARIS:—
Tateishii *Kudo in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1931, iii. 16.—Formosa.
tenella *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 149 (1932): L. tenuis *J. J. Smith*.
tenuis *J. J. Smith, l. c.* xi. 121 (1931).—Borneo.
tonkinensis *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 167.—Indo-China (Tonkin).
trullifera *Ames & C. Schweinf. in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 26 (1934).—Sumatra.

LIPOCARPHA R. Br. (Cyperac.).
senegalensis (*Lam.*) *Th. & H. Durand, Syll. Fl. Congol.* 619 (1909): Scirpus senegalensis.

LIPOCHAETA DC. (Compos.).
acris *Sherff in Bot. Gaz.* xcv. 83 (1933).—Ins. Sandvic.
alata *Sherff, l. c.* 81.—Ins. Sandvic.
Bryanii *Sherff, l. c.* 97.—Ins. Sandvic.
Degeneri *Sherff, l. c.* 84.—Ins. Sandvic.
Forbesii *Sherff, l. c.* 83.—Ins. Sandvic.
intermedia *Degener & Sherff, l. c.* 102.—Ins. Sandvic.
kahoolawensis *Sherff, l. c.* 98.—Ins. Sandvic.
perdita *Sherff, l. c.* 99.—Ins. Sandvic.
×procumbens *Degener & Sherff, l. c.* 94.—Ins. Sandvic.
profusa *Sherff, l. c.* 95.—Ins. Sandvic.
Rockii *Sherff, l. c.* 100.—Ins. Sandvic.
tenuis *Degener & Sherff, l. c.* 102.—Ins. Sandvic.
venosa *Sherff, l. c.* 100.—Ins. Sandvic.

LIPOSTOMA D. Don (Rubiac.).
erectum *Brade in Arch. Mus. Nac. Rio de Janeiro*, 1932, xxxiv. 122, in syn.: Standleya erecta.
Limae *Brade, l. c.* 121, in syn.: Standleya Limae.

LIPPIA L. (Verbenac.).
Briquetii *Moldenke in Torreya*, 1934, xxxiv. 9: L. floridunda *Briq.*
dauensis (*Chiov.*) *Chiov. Fl. Somala*, II. 359 (1932): Lantana dauensis.
incisa (*Small*) *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 42: Phyla incisa.
iodantha *Robinson & Greenm. ex Pringle in Garden & Forest*, 1896, ix. 103, in obs., 105, fig. 11.—Mexico.
lucens *Standley in Tropical Woods*, 1934, No. 37, 30.—Honduras.

LIRIOPE Lour. (Liliac.; Haemodorac., Gen. Pl.).
angustissima *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 201.—Formosa.
cernua (*Thunb.*) *Masamune in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* xi., Bot. No. 4, 559 (1934): Convallaria cernua.
koreana (*Palib.*) *Nakai in Veg. Mt. Chirisan*, 26, No. 84 (1915); *Mori, Enum. Cor. Pl.* 91 (1922); *Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 777: Ophiopogon spicatus var. koreanus.

LIRIOSMA Poepp. & Endl. (Olacac.).
gracilis *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 91.—Peruv.
singularis (*Vell.*) *Macbride in Candollea*, v. 350 (1934): Dulacia singularis.

LIRIOTHAMNUS Schlechter (Liliac.).
Adamsonii *Compton in Journ. Bot.* 1931, lxix. 10.—Afr. austr. (Cape Prov.).

LISIANTHUS L. (Gentianac.).
auratus *Standley in Tropical Woods*, 1934, No. 37, 29.—Honduras.
collinus *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 81 (1935).—Brit. Honduras.
congestus *Standley, l. c.* 82.—Guatem.

LISSOCHILUS R. Br. (Orchidac.).
micranthus *Kraenzl. in v. Hoehnel, Reise Rudolfsee*, 855 (1892), nomen; *et in Engl. Jahrb.* xvii. 53 (1893), descr.—Kenya Col.

LISTERA R. Br. (Orchidac.).
brevidens *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, iv. 613 (1935).—Sibir.
deltoidea *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 759.—Formosa.
Elliottii *Hook. ex Torr. Fl. N. York*, ii. 286 (1843), in obs., nomen.—U.S.A.
latilabra *Évrard ex Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 683.—Indo-China (Anam).

LISTERA:
macrantha *Fukuyama in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard.* 1933, iii. 86.—Formosa.
Makinoana *Ohwi in Bot. Mag., Tokyo,* 1931, xlv. 384: L. Savatieri *Makino in Bot. Mag., Tokyo,* 1905, xix. 7, non *Maxim.*
nankomontana *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo,* 1935, xlix. 291.—Formosa.
pseudonipponica *Fukuyama, l. c.* 665.—Formosa.
Suzukii *Masamune in Trop. Hort.* iii. 42 (1933); *et in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa,* 1933, xxiii. 209.—Formosa.
taizanensis *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo,* 1934, xlviii. 431.—Formosa.

LITHACHNE Beauv. (Gramin.).
horizontalis *Chase in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 189.—Bras. (Minas Geraes).

LITHOCARPUS Blume (Fagac.; Cupulif., Gen. Pl.).
Amherstianus (*Wall.*) *A. Camus in Riv. Scient.* 1931, xviii. 39: Quercus Amherstiana.
amygdalifolius (*Skan*) *Hayata, Gen. Ind. Fl. Formos.* 72 (1917); cf. *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 192 (1931): Quercus amygdalifolia.
annamitorum (*A. Cheval.*) *A. Camus in Riv. Scient.* 1931, xviii. 39: Pasania annamitorum.
Areca (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus, l. c.*: Pasania Areca.
argentatus (*Korth.*) *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 42 (1934): Quercus argentata.
arisanensis (*Hayata*) *Hayata, Gen. Ind. Fl. Formos.* 72 (1917); cf. *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 192 (1931): Quercus arisanensis.
bacgiangensis (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus in Riv. Scient.* 1931, xviii. 39: Pasania bacgiangensis.
Balansae (*Drake*) *A. Camus, l. c.*: Quercus Balansae.
baviensis (*Drake*) *A. Camus, l. c.*: Quercus baviensis.
Beccarianus (*Benth.*) *A. Camus, l. c.*: Quercus Beccariana.
bicoloratus (*Elmer*) *A. Camus, l. c.*: Quercus bicolorata.
blaoënsis *A. Camus in Rev. Bot. Appliq.* 1935, xv. 24.—Indo-China (Anam).
Bonnetii (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus in Riv. Scient.* 1931, xviii. 39: Pasania Bonnetii.
brevicaudatus (*Skan*) *Hayata, Gen. Ind. Fl. Formos.* 72 (1917); cf. *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 193 (1931): Quercus brevicaudata.
Burkillii *A. Camus in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1933, Sér. II. v. 88.—Penins. Mal.
calathiformis (*Skan*) *A. Camus in Riv. Scient.* 1931, xviii. 40: Quercus calathiformis.
cambodiensis *A. Camus in Lecomte, Not. Syst.* v. 73 (1935).—Cambodia.
castanopsisifolius (*Hayata*) *Hayata, Gen. Ind. Fl. Formos.* 72 (1917); cf. *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 193 (1931): Quercus castanopsisifolia.
cerebrinus (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus in Rev. Bot. Appliq.* 1935, xv. 25: Pasania cerebrina.
cerifer (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus in Riv. Scient.* 1931, xviii. 40: Pasania cerifera.
Clementianus (*King*) *A. Camus, l. c.*: Quercus Clementiana.
Clementis (*Merrill*) *A. Camus, l. c.* 39: Quercus Clementis.
coalitus (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus, l. c.*: Pasania coalita.
coinhensis (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus, l. c.* 40: Pasania coinhensis.
confragosus (*King*) *A. Camus, l. c.*: Quercus confragosa.
cratephorus (*C. E. C. Fischer*) *A. Camus in Lecomte, Not. Syst.* v. 75 (1935): Pasania cratephora.
cryptocarpus *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France,* 1934, lxxxi. 816 (1935).—Indo-China (Anam).
Curtisii (*King*) *A. Camus in Riv. Scient.* 1931, xviii. 40: Quercus Curtisii.
cyclophorus (*Endl.*) *A. Camus, l. c.*: Quercus cyclophora.
cyrtocarpus (*Drake*) *A. Camus, l. c.*: Quercus cyrtocarpa.
daphnoideus (*Blume*) *A. Camus, l. c.*: Quercus daphnoidea.

LITHOCARPUS:—
dinhensis (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus in Riv. Scient.* 1931, xviii. 40: Pasania dinhensis.
dodonaeifolius (*Hayata*) *Hayata, Gen. Ind. Fl. Formos.* 72 (1917); cf. *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 193 (1931); *A. Camus in Riv. Scient.* 1931, xviii. 40: Quercus dodonaeifolia.
Ducampii (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus, l. c.*: Pasania Ducampii.
Dunnii *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* x. 483 (1931).—China (Kwangtung; Fokien; Chekiang).
echinifer (*Merrill*) *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France,* 1934, lxxxi. 818 (1935): Quercus echinifera.
echinocarpus (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus in Riv. Scient.* 1931, xviii. 40: Pasania echinocarpa.
echinophorus (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus, l. c.*: Pasania echinophora.
Eichleri (*Wenzig*) *A. Camus, l. c.*: Quercus Eichleri.
elatus (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus, l. c.*: Pasania elata.
elephantum (*Hance*) *A. Camus, l. c.*: Quercus elephantum.
encleisocarpus (*Korth.*) *A. Camus, l. c.*: Quercus encleisocarpa.
erythrocarpus (*Ridley*) *A. Camus, l. c.*: Pasania erythrocarpa.
eucalyptifolius (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus, l. c.*: Pasania eucalyptifolia.
eumorphus (*Kurz*) *A. Camus, l. c.*: Quercus eumorpha.
farinulentus (*Hance*) *A. Camus, l. c.*: Quercus farinulenta.
Fenzelianus *A. Camus in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1932, Sér. II. iv. 912.—China (Hainan).
Finetii (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus in Riv. Scient.* 1931, xviii. 40: Pasania Finetii.
fissus (*Champ.*) *A. Camus in Rev. Bot. Appliq.* 1935, xv. 24: Quercus fissa.
formosanus (*Skan*) *Hayata, Gen. Ind. Fl. Formos.* 72 (1917); cf. *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 193 (1931): Quercus formosana.
Garrettianus (*Craib*) *A. Camus in Riv. Scient.* 1931, xviii. 40: Quercus Garretiana.
gigantophyllus (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus, l. c.*: Pasania gigantophylla.
grandifrons (*King ex Hook.*) *A. Camus, l. c.*: Quercus grandifrons.
gymnocarpus *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France,* 1934, lxxxi. 818 (1935).—Indo-China (Tonkin).
Hallieri (*Seem.*) *A. Camus in Riv. Scient.* 1931, xviii. 40: Quercus Hallieri.
Handelianus *A. Camus in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1934, Sér. II. vi. 93.—China (Hainan).
Harmandii (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus in Riv. Scient.* 1931, xviii. 40: Pasania Harmandii.
Hendersonianus *A. Camus in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1934, Sér. II. vi. 92.—Penins. Mal.
honbaënsis *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France,* 1934, lxxxi. 816 (1935).—Indo-China (Anam).
hypophaeus (*Hayata*) *Hayata, Gen. Ind. Fl. Formos.* 72 (1917); cf. *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 194 (1931): Quercus hypophaea.
impressivena (*Hayata*) *Hayata, l. c.*; cf. *Makino & Nemoto, l. c.*: Quercus impressivena.
Kawakamii (*Hayata*) *Hayata, l. c.*; cf. *Makino & Nemoto, l. c.*: Quercus Kawakamii.
kemmeratensis (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus in Riv. Scient.* 1931, xviii. 40: Pasania kemmeratensis.
Kingianus (*Gamble*) *A. Camus, l. c.* 41: Pasania Kingiana.
kodaihoënsis (*Hayata*) *Hayata, Gen. Ind. Fl. Formos.* 72 (1917); cf. *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 194 (1931): Quercus kodaihoënsis.
Konishii (*Hayata*) *Hayata, l. c.*; cf. *Makino & Nemoto, l. c.*: Quercus Konishii.
Krempfii (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus in Riv. Scient.* 1931, xviii. 41: Pasania Krempfii.
Kunstleri (*King*) *A. Camus, l. c.* 40: Quercus Kunstleri.
lampadarius (*Gamble*) *A. Camus, l. c.* 41: Pasania lampadaria.
laoticus (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus, l. c.*: Pasania laotica.

LITHOCARPUS:—
leiostachyus *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France,* 1934, lxxxi. 817 (1935).—Indo-China (Anam).
lepidocarpus (*Hayata*) *Hayata, Gen. Ind. Fl. Formos.* 72 (1917); cf. *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 194 (1931); *A. Camus in Riv. Scient.* 1931, xviii. 41: Quercus lepidocarpa.
leucostachyus *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France,* 1934, lxxxi. 817 (1935).—Indo-China (Anam).
Lindleyanus (*Wall.*) *A. Camus in Riv. Scient.* 1931, xviii. 41: Quercus Lindleyana.
longicaudatus (*Hayata*) *Hayata, Gen. Ind. Fl. Formos.* 72 (1917); cf. *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 194 (1931): Quercus longicaudata.
longipedicellatus (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus in Riv. Scient.* 1931, xviii. 41: Pasania longipedicellata.
Lycoperdon (*Skan*) *A. Camus, l. c.*: Quercus Lycoperdon.
Magneinii (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus, l. c.*: Pasania Magneinii.
magnificus (*Brandis*) *A. Camus, l. c.*: Quercus magnifica.
megastachyus (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus, l. c.*: Pasania megastachya.
microbalanus *A. Camus in Rev. Bot. Appliq.* 1935, xv. 24.—Indo-China (Anam).
microspermus *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France,* 1934, lxxxi. 818 (1935).—Indo-China (Anam).
nantoënsis (*Hayata*) *Hayata, Gen. Ind. Fl. Formos.* 72 (1917); cf. *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 195 (1931): Quercus nantoënsis.
Nariakii *Sasaki ex Kudo in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan,* 1931, iii. 388, in syn.: Synaedrys Nariakii.
nebularum *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France,* 1934, lxxxi. 818 (1935).—Indo-China (Anam).
nhatrangensis (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus in Riv. Scient.* 1931, xviii. 41: Pasania nhatrangensis.
obliquinervius (*Merrill*) *A. Camus, l. c.*: Quercus obliquinervia.
ochraceus (*Schottky*) *A. Camus, l. c.*: Pasania ochracea.
oligocarpus *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France,* 1934, lxxxi. 816 (1935).—Ins. Philipp. (Luzon).
Olla (*Kurz*) *A. Camus in Riv. Scient.* 1931, xviii. 41: Quercus Olla.
pachycarpus (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus, l. c.*: Pasania pachycarpa.
parvulus (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus, l. c.*: Pasania parvula.
Paviei (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus, l. c.*: Pasania Paviei.
Petelotii *A. Camus in Lecomte, Not. Syst.* v. 75 (1935).—Indo-China (Tonkin).
Pierrei (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus in Riv. Scient.* 1931, xviii. 41: Pasania Pierrei.
platyphyllus *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France,* 1934, lxxxi. 817 (1935).—Indo-China (Anam).
pleiocarpus *A. Camus in Lecomte, Not. Syst.* v. 74 (1935).—Indo-China (Tonkin).
poculiformis (*Seem.*) *A. Camus in Riv. Scient.* 1931, xviii. 41: Quercus poculiformis.
proboscideus (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus, l. c.*: Pasania proboscidea.
pseudoplatycarpus *A. Camus in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1932, Sér. II. iv. 914.—Penins. Mal.
pseudosundaicus (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus in Riv. Scient.* 1931, xviii. 41: Pasania pseudosundaica.
rajah (*Hance*) *A. Camus, l. c.*: Quercus rajah.
randaiensis (*Hayata*) *Hayata, Gen. Ind. Fl. Formos.* 72 (1917); cf. *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 195 (1931): Quercus randaiensis.
Rangerianus *A. Camus in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1932, Sér. II. iv. 912.—Penins. Mal.
reflexus (*King*) *A. Camus in Riv. Scient.* 1931, xviii. 41: Quercus reflexa.
Reinwardtii (*Korth.*) *A. Camus, l. c.*: Quercus Reinwardtii.
rhabdostachyus (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus, l. c.*: Pasania rhabdostachya.
rhioënsis (*Hance*) *A. Camus, l. c.*: Quercus rhioënsis.
rhombocarpus (*Hayata*) *Hayata, Gen. Ind. Fl. Formos.* 72 (1917); cf. *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 195 (1931): Quercus rhombocarpa.

LITHOCARPUS:—
Ridleyanus *A. Camus in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 913.—Penins. Mal.
Rodgerianus *A. Camus, l. c.* 1931, Sér. II. iii. 690. —Burma.
rotundatus (*Blume*) *A. Camus in Riv. Scient.* 1931, xviii. 41: Quercus rotundata.
Rouletii (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus, l. c.*: Pasania Rouletii.
rufus (*Seem.*) *A. Camus, l. c.*: Quercus rufa.
sabulicola (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus, l. c.* 42: Pasania sabulicola.
Scortechinii (*King*) *A. Camus, l. c.*: Quercus Scortechinii.
scyphiger (*Hance*) *A. Camus, l. c.*: Quercus scyphigera.
sootepensis (*Craib*) *A. Camus, l. c.*: Quercus sootepensis.
sphaerocarpus (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus, l. c.*: Pasania sphaerocarpa.
stenopus (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus, l. c.*: Pasania stenopus.
subnucifer *A. Camus in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 123.—Penins. Mal.
subreticulatus (*Hayata*) *Hayata, Gen. Ind. Fl. Formos.* 72 (1917); cf. *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 196 (1931): Quercus subreticulata.
Symingtonianus *A. Camus in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 913.—Penins. Mal.
taitoënsis (*Hayata*) *Hayata, Gen. Ind. Fl. Formos.* 72 (1917); cf. *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 196 (1931); *A. Camus in Riv. Scient.* 1931, xviii. 42: Quercus taitoënsis.
tenuinervis (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus, l. c.*: Pasania tenuinervis.
tephrocarpus (*Drake*) *A. Camus, l. c.*: Quercus tephrocarpa.
ternaticupula (*Hayata*) *Hayata, Gen. Ind. Fl. Formos.* 72 (1917); cf. *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 196 (1931): Quercus ternaticupula.
touranensis (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus in Riv. Scient.* 1931, xviii. 42: Pasania touranensis.
trachycarpus (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus, l. c.*: Pasania trachycarpa.
triqueter (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus, l. c.*: Pasania triquetra.
tubulosus (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus, l. c.*: Pasania tubulosa.
uraianus (*Hayata*) *Hayata, Gen. Ind. Fl. Formos.* 72 (1917); cf. *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 196 (1931); *A. Camus in Riv. Scient.* 1931, xviii. 42: Quercus uraiana.
vestitus (*Hickel & A. Camus*) *A. Camus, l. c.*: Pasania vestita.
Wenzigianus (*King*) *A. Camus, l. c.*: Quercus Wenzigiana.
Winklerianus (*Merrill*) *A. Camus, l. c.*: Quercus Winkleriana.
Woodii (*Hance*) *A. Camus, l. c.*: Quercus Woodii.
Wrayii (*King*) *A. Camus, l. c.*: Quercus Wrayii.
Yersinii *A. Camus in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 93.—Indo-China (Anam).

LITHOCOCCA Small ex Rydb. Fl. Prairies & Plains Centr. N. Amer. 664 (1932). *BORAGINACEAE.*
tenella (*Nutt.*) *Small ex Rydb. l. c.*: Lithospermum tenellum.

LITHOPHILA Sw. (Amaranthac.).
scirpoides (*Hook. f.*) *Schinz in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 84 (1934): Alternanthera scirpoides.

LITHOPS N. E. Brown (Ficoidac.).
Aucampiae *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 276, 306.—Afr. austr. (Griqualand West).
aurantiaca *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 344 (1932).—Afr. austr.-occ.
brevis *L. Bolus, l. c.*—Namaqualand.
Bromfieldii *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 452 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
diutina *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 345 (1932).—Namaqualand.
divergens *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 451 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Edithae *N. E. Brown in Cactus Journ.* ii. 70 (1934). —Great Namaq.?
elevata *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 345 (1932). —Afr. austr.-occ.
Elisabethae *Dinter in Kakteenk.* 1933, 50.—Afr. austr.-occ.
Erniana *Tisch. ex Jacobsen, Sukkulent.* 145 (1933).—Hab.?
gracilidelineata *Dinter, Südwestafr. Lithopsart.* 18 (1928).—Afr. austr.-occ.
halenbergensis *Tisch. in Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges.* 1932, iv. 281.—Afr. austr.-occ.
Helmuti *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1933, xxiii. 218. —Namaqualand.
Herrei *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 346 (1932). —Namaqualand.
kunjasensis *Dinter, Südwestafr. Lithopsart.* 14 (1928).—Afr. austr.-occ.
lactea *Schick & Tisch. in Kakteenk.* 1933, 49.— Great Namaq.
lateritia *Dinter, Südwestafr. Lithopsart.* 16 (1928). —Afr. austr.-occ.
Meyeri *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 102.— Namaqualand.
mickbergensis *Dinter, Südwestafr. Lithopsart.* 16 (1928).—Afr. austr.-occ.
rugosa *Dinter, l. c.* 15.—Afr. austr.-occ.
Schwantesii *Dinter, l. c.* 14.—Afr. austr.-occ.
translucens *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 347 (1932).—Namaqualand.
Triebneri *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 391 (1933).—Afr. austr.-occ.
umdausensis *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 347 (1932).— Namaqualand.
urikosensis *Dinter, Südwestafr. Lithopsart.* 15 (1928).—Afr. austr.-occ.
Vanzylii *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 177. —Afr. austr. (Bushmanland).

LITHOSPERMUM L. (Boraginac.).
croceum *Fernald in Rhodora*, 1935, xxxvii. 329.— Canada (Ontario); U.S.A.
× Froebelii *Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1906, xii. 92.—Hort.
Muelleri *I. M. Johnston in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 187.—Mexico.
viridiflorum *Roxb. Hort. Beng.* 13 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 4 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 455 (1832), pro syn.: Tournefortia viridiflora.

LITSEA Lam. (Laurac.).
aneityensis *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 85.—N. Hebrides.
auriculata *Chien & Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., vi. 59 (1931).—China (Chekiang).
baviensis *Lecomte*; *H. Liou, Laurac. Chine et Indochine*, 177 (1932), descr. ampl.—Indo-China (Laos; Anam).
Chenii *H. Liou, l. c.* 183.—China (Szechuan).
Chunii *Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., ix. 196 (1934).—China (Szechuan).
Eberhardtii *H. Liou, Laurac. Chine et Indochine*, 181 (1932).—Indo-China (Tonkin).
eugenioides *A. Cheval. ex H. Liou, l. c.* 173. —Cambodia.
honghoënsis *H. Liou in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 568.—China?
kotoënsis *Hayata ex Kanehira, Formos. Trees* [443] (1918), japonice.—Formosa.
Liyuyingi *H. Liou in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 566.—China (Yunnan).
magnifolia *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 83, 6 (1931).—Ins. Viti.
mollifolia *Chun in Sunyatsenia*, i. 236 (1934): L. mollis *Hemsl.*
Muelleri *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 449. —Mexico.
naufoënsis *Hayata ex Kamikoti in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 240, in syn.: L. dolichocarpa.
pseudo-elongata *H. Liou, Laurac. Chine et Indochine*, 179 (1932).—China (Kwangtung).
racemiflora *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 162.—N. Caled.
Sasakii *Kamikoti in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1932, xxii. 412.—Formosa.
tannaënsis *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 85.—N. Hebrides.
Veitchiana *Gamble*; *H. Liou, Laurac. Chine et Indochine*, 182 (1932), descr. ampl.—China (Szechuan).
viridis *H. Liou, l. c.* 188.—Indo-China (Anam).
wenshanensis *Hu in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* v. 308 (1934).—China (Yunnan).

LITTLEDALEA Hemsl. (Gramin.).
alaica (*Korsh.*) *Petrov ex Komarov, Fl. URSS*, ii. 553 (1934): Bromus alaicus.
racemosa *Keng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., ix. 136 (1934).—China (Szechuan).

LITTONIA Hook. f. (Liliac.).
obscura *Baker in Kew Bull.* 1894, 342, nomen; *Oliv. in Hook. Ic. Pl.* xxiv. t. 2365 (1895), descr. —Arab.

LIVISTONA R. Br. (Palmae).
boninensis (*Becc.*) *Nakai in Bull. Biogeogr. Soc. Jap.* i. No. 3, 255 (1930), nomen; *et in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 222: L. chinensis var. boninensis.
Brassii *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 309 (1935).—N. Guin.
Eastoni *C. A. Gardner in For. Dep. Bull., W. Austral.* No. 32, p. 36 (1923).—W. Austral.
japonica *Nakai apud Masamune, Prelim. Rep. Veg. Yak.* 50 (1929); cf. *Masamune & Suzuki in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard.* 1933, iii. 73.—Formosa (Kizan).
tonkinensis *Magalon*; *Magalon in Fedde, Repert.* xxix. 23 (1931).—Indo-China (Tonkin).
umbraculifera *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1149 (1895), in syn.: L. rotundifolia.

LOASA Adans. (Loasac.).
brasiliensis *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* ii. 451 (1834).—Bras.
profundilobata *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 370 (1935).—Ecuador.

LOBELIA L. (Campanulac.).
aguana *E. Wimm. in Fedde, Repert.* xxxviii. 86 (1935).—Guatem.
alexia *E. Wimm. l. c.*—Jamaica.
amabilis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 68 (1933–5).—Calif. infer.
Burttii *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1933, 473.— Tanganyika Terr.
calcarea *E. Wimm. in Fedde, Repert.* xxxviii. 83 (1935).—Mexico.
caudata (*Griseb.*) *Urb. Symb. Antill.* i. 455 (1900), in obs.: Tupa caudata.
clavata *E. Wimm. in Fedde, Repert.* xxxviii. 78 (1935).—China (Yunnan).
costaricana (*Planch. & Oerst.*) *E. Wimm. in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, xlvi. 239 (1932): Tupa costaricana.
cubana *Urb. Symb. Antill.* i. 455 (1900), in obs.: Tupa montana.
dealbata *E. Wimm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 104 (1934).—Tanganyika Terr.
depauperata *Gay ex E. Wimm. l. c.*, in syn.: L. alata.
digitalifolia (*Griseb.*) *Urb. Symb. Antill.* i. 455 (1900), in obs.: Tupa digitalifolia.
epilobioides *E. Wimm. in Fedde, Repert.* xxxviii. 79 (1935).—Celebes.
graciliflora *E. Wimm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 105 (1934).—Tanganyika Terr.
Hilaireana (*Kanitz*) *E. Wimm. in Rev. Sudamer. Bot.* 1935, ii. 106, in clavi: Haynaldia Hilaireana.
holotricha *E. Wimm. in Fedde, Repert.* xxxviii. 87 (1935).—Peruv.
× hybrida *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 576 (1894), in obs.—Hab.?
imberbis (*Griseb.*) *Urb. Symb. Antill.* i. 455 (1900), in obs.: Tupa imberbis.
imperialis *E. Wimm. in Rev. Sudamer. Bot.* 1935, ii. 94.—Bras.
infesta (*Griseb.*) *Urb. Symb. Antill.* i. 455 (1900), in obs.: Tupa infesta.
innominata *Rendle in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 274. —Jamaica.

LOBELIA:—
intermedia *Hauman in Bull. Cercle Bot. Congol.* ii. Fasc. 1 (*Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxv. Suppl.) p. [16], p. [19], in clavi (1934).—Congo Belg.
kamerunensis *Engl. ex Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 191, in clavi, 193 (1931).—Cameroons.
Kummeriae *Engl. in Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. 1907–8*, ii. 345 (1911), nomen; *et in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, viii. 398 (1923).—Afr. trop.
lasiocalycina *E. Wimm. in Fedde, Repert.* xxxviii. 81 (1935).—Congo Belg.
loretensis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 68 (1933–5).—Calif. infer.
niihauensis *St. John in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu*, ix. No. 14, 9 (1931).—Ins. Sandvic.
oahuensis *Rock*; *Hosaka in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu*, xi. No. 13, 11 (1935), descr. ampl.—Ins. Sandvic.
ovina *E. Wimm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 106 (1934).—Tanganyika Terr.
petiolata *Hauman in Bull. Cercle Bot. Congol.* ii. Fasc. 1 (*Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxv., Suppl.) p. [13], in obs., p. [19], in clavi (1934).—Congo Belg.
piscinula *E. Wimm. in Fedde, Repert.* xxxviii. 84 (1935).—Guatem.
poasensis *E. Wimm. in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, xlvi. 239 (1932).—Costa Rica.
Quarreana *E. Wimm. in Fedde, Repert.* xxxviii. 80 (1935).—Congo Belg.
Rensonii *E. Wimm. l. c.* 85.—Salvador.
Richardsonii *Hort. ex Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. Fasc. suppl. 1, p. 9 (1934), nomen.—Hab.?
rivalis *E. Wimm. in Fedde, Repert.* xxxviii. 80 (1935).—Congo Belg.
rupincola *Bert. ex Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot.* i. 277 (1834), in syn.; *Colla, Herb. Pedem.* iv. 41 (1835), descr.—Juan Fernandez.
Ryanii *Rendle in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 277.—Ind. occ. (Montserrat).
saliensis *E. Wimm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 107 (1934).—Tanganyika Terr.
Seleriana *E. Wimm. in Fedde, Repert.* xxxviii. 82 (1935).—U.S.A. (Texas); Mexico.
stenocarpa *E. Wimm. l. c.* 81.—Madag.
Stricklandae *Gilliland in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 248.—S. Rhodesia.
Stuhlmannii *Schweinf.*; *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1934, 76, descr.—Uganda.
suavibracteata *Hauman in Bull. Cercle Bot. Congol.* ii. Fasc. 1 (*Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxv., Suppl.) p. [17], p. [19], in clavi (1934).—Congo Belg.
sylvatica *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 82 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
trigona *Roxb. Hort. Beng.* 85 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 111 (1824); *Fl. Ind.* ed. *Carey*, i. 506 (1832).—Ind. or.
trivialis *E. Wimm. in Fedde, Repert.* xxxviii. 83 (1935).—Mexico.
tsotsorogensis *Bremek. & Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xvi. 437 (1935).—Bechuanaland Protect.
tubiflora *Wimm. ex G. Ortega, Apuntes Fl. Indig. Sinaloa* (*Cat. Sist. Pl. Sinaloa*) 31 (1929), nomen.—Mexico.
Turckheimii *Rendle in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 279.—Santo Domingo.
turgida *E. Wimm. in Fedde, Repert.* xxxviii. 82 (1935).—Afr. Lusit. Or.
Unamata *E. Wimm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 107 (1934).—Tanganyika Terr.
valida *L. Bolus in Kew Bull.* 1934, 260.—Afr. austr. (Cape Prov.).
xongorolana *E. Wimm. in Fedde, Repert.* xxxviii. 79 (1935).—Angola.
yucatana *E. Wimm. l. c.* 83.—Mexico.

LOBIVIA Britton & Rose (Cactac.).
Allegraiana *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 7, [p. 7], in obs., nomen; *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 232, 413 (1935), descr.—Peruv.
argentea *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 227, 413.—Boliv.

LOBIVIA:—
atrovirens *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 242, 414 (1935).—Argent.
aurea (*Britton & Rose*) *Backeb. in Kakteenfreund*, iii. 85 (1934); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 145: Echinopsis aurea.
Backebergii (*Werderm.*) *Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 9, [p. 7], in obs., nomen; *et l. c.* 1935, Pt. 12, [p. 6]: Echinopsis Backebergii.
Binghamiana *Backeb. l. c.* 1935, Pt. 7, [p. 7], in obs.; *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 232, 413 (1935).—Peruv.
breviflora *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 231, 413.—Argent.
carminantha *Backeb. l. c.* 228, 413.—Boliv.
Chereauniana (*Schlumb.*) *Backeb. l. c.* 231: Echinopsis Chereauniana.
chrysantha (*Werderm.*) *Backeb. l. c.* 236: Echinopsis chrysantha.
cylindrica *Backeb. l. c.* 244, 415.—Argent.
densispina (*Werderm.*) *Werderm. ex Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 238: Echinopsis densispina.
digitiformis *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 242, 414.—Argent.
Drijveriana *Backeb. in Kakteenfreund*, ii. Nos. 8 & 9 (1933); cf. *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 5, [p. 6].—Argent.
Duursmaiana *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 233, 414 (1935).—Argent.
euanthema *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 9, [p. 6]; *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 240, 414 (1935).—Boliv.
eucaliptana *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 242, 414.—Boliv.
Haageana *Backeb. in Kakteenfreund*, ii. No. 8 (1933); cf. *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 1, [p. 5].—Boliv.; Argent.
Hardeniana *Bödeker ex Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 228 (1935).—Hab.?
Hermanniana *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 9, [p. 9], in obs., nomen; *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 228, 413 (1935), descr.—Boliv.
Hertrichiana *Backeb. in Kakteenfreund*, ii. No. 9 (1933); cf. *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 1, [p. 8].—Peruv.
Higginsiana *Backeb. in Cactus Journ.* ii. 31 (1933).—Boliv.
Hossei (*Werderm.*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 237 (1935): Echinopsis Hossei.
incaica *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 7, [p. 7], in obs., nomen; *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 233, 413 (1935), descr.—Peruv.
iridescens *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 233, 414.—Boliv.; Argent.
Jajoiana *Backeb. in Kaktusář*, Číslo 7, Ročník IV, 1933, 70; cf. *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 6, [p. 8].—Argent.
Janseniana *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 239, 414 (1935).—Argent.
Johnsoniana *Backeb. l. c.* 234.—Boliv.
Kupperiana *Backeb. l. c.* 234, 414.—Boliv.
leucorhodon *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 9, [p. 7], in obs., nomen; *et l. c.* 1935, Pt. 12, [p. 5]; *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 234, 414 (1935), latine.—Boliv.
leucoviolacea *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 229, 413.—Boliv.
Marsoneri (*Werderm.*) *Backeb. l. c.* 426, indice, 237: Echinopsis Marsoneri.
mistiensis (*Werderm. & Backeb.*) *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 12, [p. 5]: Echinopsis mistiensis.
Nealeana *Backeb. l. c.* 1934, Pt. 1, [p. 6].—Argent.
neohaageana *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 243, 415 (1935).—Boliv.; Argent.
nigrispina *Backeb. l. c.* 235, 414.—Argent.
oreopogon *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen*, 85 (1931), sphalm.: L. oreopepon.
ororensis *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 243, 415 (1935).—Boliv.
pectinata *Backeb. l. c.*—Boliv.; Argent.
planiceps *Backeb. l. c.* 233, 414.—Peruv.
polycephala *Backeb. l. c.* 231, 413.—Argent.
pseudocachensis *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 5, [p. 5].—Argent.

LOBIVIA:—
pugionacantha (*Rose & Bödeker*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 235 (1935): Echinopsis pugionacantha.
pygmaea (*R. E. Fries*) *Backeb. l. c.* 241: Echinopsis pygmaea.
raphidacantha *Backeb. l. c.* 230, 413.—Boliv.
rebutioides *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 12, [p. 6].—Argent.
Rossii (*Bödeker*) *Bödeker ex Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 230 (1935): Echinopsis Rossii.
rubescens *Backeb. l. c.* 237.—Argent.
sanguiniflora *Backeb. l. c.* 235, 414.—Argent.
scoparia (*Werderm.*) *Werderm. ex Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 238: Echinopsis scoparia.
Steinmannii (*Britton & Rose*) *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 3, [p. 4]: Rebutia Steinmannii.
sublimiflora *Backeb. l. c.* 1935, Pt. 9, [p. 5].—Argent.
varians *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 230, 413 (1935).—Boliv.
Wegheiana *Backeb. in Bull. Cactéophiles Belg.* 1933, iii. No. 5; cf. *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 3, [p. 8].—Boliv.

LOBOSTEMON Lehm. (Boraginac.).
Bolusii *Levyns in Journ. Linn. Soc., Bot.* xlix. 422 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
decorus *Levyns, l. c.* 441.—Afr. austr. (Cape Prov.).
gracilis *Levyns, l. c.* 420.—Afr. austr. (Cape Prov.).
grandiflorus (*Andr.*) *Levyns, l. c.* 443: Echium grandiflorum.
horridus *Levyns, l. c.* 419.—Afr. austr. (Cape Prov.).
hottentoticus *Levyns, l. c.* 430.—Afr. austr. (Cape Prov.).
inconspicuus *Levyns in Kew Bull.* 1934, 101.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Marlothii *Levyns in Journ. Linn. Soc., Bot.* xlix. 442 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Muirii *Levyns, l. c.* 440.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Pearsonii *Levyns, l. c.* 425, in obs., 430.—Namaqualand; Cape Prov.
Wrightii *Schinz in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 146.—Afr. austr. (Cape Prov.).

LOEVIGIA Karst. & Triana in Triana, Nuev. Jen. i Esp. Fl. Neo-Granad. 22 (1854); Karst. in Linnaea, xxviii. 434 (1857); Sprague in Kew Bull. 1934, 396. *MELASTOMATACEAE.*
sericea *Karst. & Triana, l. c.* 23; *Karst. l. c.*; *Sprague, l. c.*—Colomb.

LOLIOLUM Krecz. & Bobr. in Komarov, Fl. URSS, ii. 544, 766 (1934). *GRAMINEAE.*
orientale (*Boiss.*) *Krecz. & Bobr. l. c.* 544: Nardurus orientalis.

LOLIUM L. (Gramin.).
cuneatum *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 547 (1934).—Hab.?
Lesdaini *Sennen in Mem. Acad. Cienc. Barcelona*, Ser. III. xx. No. 14, 10 (1928), in obs.—Hispan.
teres *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 19 (1932).—Marocc.

×**LOMATALOË** Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 1931, Sér. II. iii. 339. *LILIACEAE.* [ALOË × LOMATOPHYLLUM.]
Hoyeri (*Radl*) *Guillaumin, l. c.* 340: Aloë Hoyeri.

×**LOMATERIA** Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 1931, Sér. II. iii. 339. *LILIACEAE.* [GASTERIA × LOMATOPHYLLUM.]
gloriosa (*Radl*) *Guillaumin, l. c.* 340: Aloë hybrida var. gloriosa.

LOMATIUM Rafin. (Umbellif.).
insulare (*Eastw.*) *Munz, Man. S. Calif. Bot.* 358, 599 (1935): Peucedanum insulare.

LOMATOGONIUM A. Br. (Gentianac.).
brachyantherum (*C. B. Clarke*) *Schmid in Fedde, Repert.* xxxi. 61 (1932): Pleurogyne brachyanthera.

LOMATOPHYLLUM Willd. (Liliac.).
antsingyense *Léandri in Lecomte, Not. Syst.* v. 76 (1935).—Madag.

LONCHOCARPUS H. B. & K. (Legumin.).
amarus *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 63 (1935).—Brit. Honduras.

LONCHOCARPUS:—
Barlassinae *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 37 (1935).—Kenya Col.
capensis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 46 (1933–5).—Calif. infer.
Castilloi *Standley in Tropical Woods*, 1932, No. 32, 15.—Guatem.; Brit. Honduras.
chrysophyllus *Kleinh. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 174.—Guiana Bat.
Guilleminianus (*Tul.*) *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 13, 30 (1931): Neuroscapha Guilleminiana.
pallidus *Killip in Phytologia*, i. 149 (1935).—Bras. (Maranhão).
stipularis *C. T. White in Contrib. Arn. Arb.* No. iv. 45 (1933).—Austral. (Queensland).

LONICERA L. (Caprifoliac.).
acuminata *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 176 (1824).—Reg. Himal.
apodantha *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 84.—Formosa.
diversifolia *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 178 (1824).—Himal.
fragilis *Léveillé*; *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 337, descr. emend.—China (Yunnan).
fulva *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 51 (1934).—China (Kwangtung).
Ghiesbreghtiana *Hort. ex Rehder in Rep. Missouri Bot. Gard.* xiv. 136 (1903), in syn.: L. Ruprechtiana.
glabrata *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 175 (1824).—Nepal.
jasminifolia *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 199 (1934).—Sumatra.
Kawakamii (*Hayata*) *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1931, iii. 246: Coprosma Kawakamii.
Kungeana *Hao in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, ii. 392 (1934); vide *Contrib. Lab. Bot. Nat. Acad. Peiping*, i. 98 (1932), descr. latinam.—China (Chihli).
lanceolata *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 177 (1824).—Himal.
Leschenaultii *Wall. l. c.* 178.—Ind. or. (Madras).
Licenti *Hao in Contrib. Lab. Bot. Nat. Acad. Peiping*, i. 99 (1932).—China (Kansu).
ligustrina *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 179 (1824).—Nepal.
× Mirallesi *Sennen in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xv. Ser. Bot. No. 1, 20 (1931), in obs.—Hispan.
Serreana *Hand.-Mazz. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1934, lxxxiii. 234.—China (Shansi; Chihli).
Tellmanniana *Hort. ex Meissn. in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1934, xlix. 361.—Hort.
wulingensis *Nakai apud Nakai & Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo 1933*, Sect. iv. 1. (*Pl. Nov. Jehol.* I.) 11 (1934).—Manchur. (Jehol).

LOPEZIA Cav. (Onagrac.).
fuchsiodes *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 327 (1894), in syn.: L. macrophylla.

LOPHACME Stapf (Gramin.).
incompleta (*Roth*) *Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma*, viii. 350 (1908), in obs.: Chloris incompleta.

LOPHANTHUS Adans. (Labiat.).
communis *Colla, Herb. Pedem.* iv. 422 (1835): Hyssopus Lophanthus.

LOPHIOCARPUS Turcz. (Phytolaccac.).
Dinteri *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 138 (1915), in obs.—Damaraland.
gracilis (*A. W. Hill*) *Engl. l. c.*, in obs.: Microtea gracilis.

LOPHOCEREUS Britton & Rose (Cactac.).
Gatesii *M. E. Jones in Cact. & Succ. Journ. Amer.* v. 546 (1934).—Calif. infer.
Mieckleyanus *Weing. ex Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 326 (1935).—Hab.?

LOPHOCHLOA Reichb. (Gramin.).
obtusiflora (*Boiss.*) *Gontsch. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 338 (1934): Koeleria obtusiflora.

LOPHOLAENA DC. (Compos.).
brevipes *Phillips & C. A. Smith in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 236 (1933).—Afr. trop. or.

LOPHOLAENA:—
coriifolia (*Sond.*) *Phillips & C. A. Smith in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 234 (1933): Othonna coriifolia.
decurrens (*Hutchinson*) *Phillips & C. A. Smith, l. c.* 229: Othonna decurrens.
glaucescens *Phillips & C. A. Smith, l. c.* 233: L. Bainesii *S. Moore*, quoad descr., non Othonna Bainesii *Oliv. & Hiern.*
Whyteana (*Britten*) *Phillips & C. A. Smith, l. c.* 236: Othonna Whyteana.

LOPHOPETALUM Wight (Celastrac.).
Beccarianum *Pierre*; *Ridley in Kew Bull.* 1931, 38, descr. ampl.—Borneo.
Havilandii *Ridley, l. c.* 37.—Borneo.
multinervium *Ridley, l. c.* 39.—Borneo.
rigidum *Ridley, l. c.* 38.—Borneo.
sessilifolium *Ridley, l. c.* 37.—Borneo.
subsessile *Ridley, l. c.*—Borneo.

LOPHOSCHOENUS Stapf (Cyperac.).
chamaedendron *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 199.—N. Caled.
falcifolius *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1932, lxxvii. Beibl. 19, 77.—N. Caled.
fragilis *Däniker, l. c.* 78.—N. Caled.
stagnalis *Däniker, l. c.* 79.—N. Caled.
xyridioides (*Däniker*) *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 200: Schoenus xyridioides.

LOPHOSCIADIUM DC. (Umbellif.).
lophopterum (*Benth. & Hook. f.*) *Woronow ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 176 (1932): Ferula lophopterum.

LOPHOSPERMUM D. Don (Scrophulariac.).
spectabile *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 745 (1895), in syn.: Maurandia scandens *A. Gray*.

LOPHOSTOMA Meissn. (Thymelaeac.).
Bolleanum *Domke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 350 (1932).—Bras. (Amaz.).

LORANTHUS L. (Loranthac.).
acacietorum *Bullock in Kew Bull.* 1931, 271.—Tanganyika Terr.
amblyphyllus *Chiov. Fl. Somala*, II. 384 (1932).—Somal. Ital.
ampullaceus *Roxb. Hort. Beng.* 87 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 209 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 552 (1832).—Ind. or. (Assam).
aneityensis *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 88.—N. Hebrides.
anomalus *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 56 (1933–5).—Mexico.
Beauverdianus *F. M. Bailey in Queensl. Agric. Journ.* 1908, xxi. 294, in obs.: L. tenuifolius *F. M. Bailey*.
Bennettianus (*Miq.*) *Benth. & Hook. f. Gen. Pl.* iii. 208 (1880), in obs.: Phoenicanthemum Bennettianum.
brachyanthus *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. Anhang, 15 (1932).—Tanganyika Terr.
brachyphyllus *Peter, l. c.* 13.—Tanganyika Terr.
bracteatus *Heyne ex Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 220 (1824).—Ind. or.
Breyeri *Bremek. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 238 (1933).—Transvaal.
Buchwaldii *Sprague ex Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. 178 (1932), nomen.—Tanganyika Terr.
Carvalhi *Engl. in Engl. Jahrb.* xx. 87 (1894), in obs.—Afr. Lusit. Or.
caudatifolius *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 450.—Ins. Carolin. (Ponape).
Chingii *Cheng in Sinensia*, iv. 327 (1934).—China (Kwangsi).
chrysophyllus *Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz.* 60 [1823], nomen.—Hort.
clavatus *Roxb. Hort. Beng.* 87 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 210 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 553 (1832).—Ind. or. (Assam).
clusiifolius (*Eichl.*) *Danser in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 479, in adnot.: Psittacanthus clusiifolius.
Conradsii *Sprague ex Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. 178 (1932), nomen.—Tanganyika Terr.
cordifolius *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 222 (1824).—Kashmir.
cylindricus *Jack in Roxb. l. c.* 213.—Sumatra.

LORANTHUS:—
Delavayi (*Van Tiegh.*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.*, Nachtr., 131 (1897): Phyllodesmis Delavayi.
dichrostachydis *Chiov. Fl. Somala*, II. 386 (1932).—Somal. Ital.
Ehlersii *Schweinf. ex Engl.*; *Schweinf. in v. Hoehnel, Reise Rudolfsee*, 857 (1892), descr.—Tanganyika Terr.
eucalyptoides *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. Anhang, 16 (1932).—Tanganyika Terr.
ferrugineus *Roxb. Hort. Beng.* 87 (1814), nomen; *Jack in Malay Miscell.* i. No. 1, p. (9) (1820), descr.—Penins. Mal.; Sumatra.
ficivorus *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 89.—N. Hebrides.
Fockei *Splitg. ex K. Krause in Pulle, Fl. Surinam*, i. (*Meded. K. Ver. Kol. Inst. Amst.* xxx.) 21 (1932), in syn.: Phoradendron dimidiatum.
Forstenii (*Van Tiegh.*) *Engl. & K. Krause in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi b. 150 (1935): Rhizanthemum Forsteni.
gibberulosus *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France*, 1895, xlii. 82, in obs., sphalm.: L. gibberulus.
globosus *Roxb. Hort. Beng.* 25 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 206 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 550 (1832).—Ind. or. (Bengal).
goodeniifolius *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France*, 1895, xlii. 261, in obs., sphalm.: L. goodeniiflorus.
grandibracteatus *Benth. & Hook. f. Gen. Pl.* iii. 208 (1880), in obs.: L. grandibracteus.
grandiflorus *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.*, Nachtr., 129 (1897), sphalm.: L. grandifrons.
hedraeanthus *K. Krause in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi b. 163 (1935): Amyema sessiliflora.
igneus (*Scheff.*) *Benth. & Hook. f. Gen. Pl.* iii. 209 (1880), in obs.: Dendrophthoë ignea.
incarnatus *Jack in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 213 (1824).—Sumatra (Ins. Nias).
involucratus *Roxb. Hort. Beng.* 87 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 208 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 552 (1832).—Ind. or. (Bengal).
Jackii (Jacquii) *Korth. in Tijdschr. Nat. Geschied. & Physiol., Amst.* iii. 191, 193 (1836), in obs.—Ind. or. Bat.
Jodoniki *Sieb. in Sieb. & Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat.*, Sect. 1 (*Abh. Bayer. Akad.* iv. 193) 85 [1843], nomen.—Japon.
Kaempferi (*DC.*) *Maxim. in Bull. Acad. Sc. St. Pétersb.* xxii. 230 (1876): Viscum Kaempferi.
kimberleyensis *C. A. Gardner in For. Dep. Bull., W. Austral.* No. 32, 46 (1923).—W. Austral.
koumensis *Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1931, xxi. 155.—Formosa.
kramatensis (*Miq.*) *Korth. ex Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 1. 164 (1900): Dendrophthoë kramatensis.
lanuginosus *Heyne ex Eichl. in Mart. Fl. Bras.* v. II. 13 (1868), in obs.—Geront.
ligustrinus *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 219 (1824).—Nepal.
linguiformis *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. Anhang, 14 (1932).—Tanganyika Terr.
linifolius *Diels, Pflanzenw. West-Austral.* (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, vii.) 303 (1906), in obs.—W. Austral.
lobeliifolius *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France*, 1895, xlii. 261, in obs., sphalm.: L. lobeliiflorus.
longifolius *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. Anhang, 14 (1932).—Tanganyika Terr.
Maganda *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3201 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
maritimus *C. A. Gardner in For. Dep. Bull., W. Austral.* No. 32, 46 (1923).—W. Austral.
meridianus (*Danser*) *K. Krause in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi b. 148 (1935): Tapinostemma meridianum.
Merrittii *Merrill in Philipp. Journ. Sc.* 1909, iv. 134: L. nodosus *Engl.*
Ngurukizi *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1933, 470.—Tanganyika Terr.
nudiflorus *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.*, Nachtr., 129 (1897), sphalm.: L. nodiflorus.
obovatus *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. Anhang, 13 (1932).—Tanganyika Terr.

LORANTHUS:—
obtusus *Korth. in Tijdschr. Nat. Geschied. & Physiol., Amst.* iii. 191 (1836), in obs.—Ind. or. Bat.
odoratus *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 215 (1832).—Nepal.
patulus *Jack in Roxb. l. c.* 214.—Sumatra.
pentapetalus *Roxb. Hort. Beng.* 87 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 211 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 553 (1832).—Ind. or. (Assam).
polystachyus *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 217 (1824).—Ind. or.
ponapensis *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 450.—Ins. Carolin. (Ponape).
pulverulentus *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 221 (1824).—Nepal.
raiateënsis *J. W. Moore in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu*, x. No. 19, 7 (1934).—Ins. Societ. (Raiatea).
Rendelii *Engl. ex Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. 178 (1932), nomen.—Tanganyika Terr.
retusus *Jack in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 212 (1824).—Penins. Mal.
rhodanthus *Chiov. Fl. Somala*, II. 383 (1932).—Somal. Ital.
rugosus *Lecomte, Not. Syst.* iv. 36 (1923), in obs.—Afr. or.
Sandersonii *Harv. ex Benth. & Hook. f. Gen. Pl.* iii. 208 (1880), in obs.—Natal.
sogerensis (*S. Moore*) *K. Krause in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi b. 163 (1935): Elytranthe sogerensis.
Tanakae *Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap.* ii. 482 (1876).—Japon.
tetrapartitus *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1935, 278, et in sched. errat.—Tanganyika Terr.
tricolor *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. Anhang, 15 (1932).—Tanganyika Terr.
umbellatus *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 222 (1824).—Reg. Himal.
varians *Korth. in Verh. Bat. Genootsch.* xvii. 227, 243 (1839), in obs.—Borneo.
venustus *Fenzl ex Eichl. in Mart. Fl. Bras.* v. II. 14 (1868), in obs.—Bras.
vestitus *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 218 (1824).—Nepal.
viridiflorus *Wall. l. c.* 219.—Nepal.
Warmingii (*Eichl.*) *Danser in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 479, in adnot.: Psittacanthus Warmingii.
woodfordioides *Schweinf. ex Engl.*; *Schweinf. in v. Hoehnel, Reise Rudolfsee*, 856 (1892), descr.—Afr. trop. or.

LOREYA DC. (Melastomatac.).
quadrifolia *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 386.—Bras. (Matto Grosso).
strigosa *Gleason, l. c.* 385.—Bras. (Matto Grosso).

LORICARIA Wedd. (Compos.).
colombiana *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 29, 33 (1935).—Colomb.

×**LOROGL-ORCHIS** *E. G. Camus*; E. G. Camus in Morot, Journ. de Bot. vi. 110 (1892). *ORCHIDACEAE.*
[LOROGLOSSUM × ORCHIS.]
Lacazei *E. G. Camus*; *E. G. Camus, l. c.*—Gallia.

LOROGLOSSUM L. C. Rich. (Orchidac.).
Bolleanum (*Siehe*) *G. Camus in G. & A. Camus, Ic. Orch. Eur.* 123, 521 (1929): Aceras Bolleanum.

LOROPETALUM R. Br. (Hamamelidac.).
lanceum *Hand.-Mazz. in Sinensia*, ii. 123 (1932).—China (Kwangsi).

LOROSTEMON Ducke in Arquiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro, i. 210 (1935). *GUTTIFERAE.*
bombaciflorus *Ducke, l. c.*—Bras. (Amaz.).

LOTONONIS Eckl. & Zeyh. (Legumin.).
affinis *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxv. 389 (1932).—Transvaal.
Brierleyae *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1932, lxx. 255.—Orange Free State.
Bullonii *Emberger & Maire*; *Emberger & Maire in Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc*, Nos. XXI–XXII. 29 (1930).—Marocc.
Evansiana *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxvi. 388 (1932).—Transvaal.
mirabilis *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 200 (1932).—Great Namaq.

LOTONONIS:—
pariflora *N. E. Brown in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxvi. 388 (1932).—Transvaal.
Pottiae *Burtt Davy, l. c.* p. xxvi. 386.—Transvaal.
tenuipes *Burtt Davy, l. c.* p. xxvi. 387.—Transvaal.

LOTUS L. (Legumin.).
argenteus (*Lowe*) *Menezes, Fl. Madeira*, 49 (1914): Pedrosia argentea.
atlanticus *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 146 [1933]: Tetragonolobus Requieni.
atrococcineus *Hort. ex Heydt in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1934, xlix. 345, in obs.—Hort.
candidissimus *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1935, xv. 965.—Ins. C. Verde.
Embergeri *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 34 [1933], nomen.—Marocc.
Eylesii *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 294.—S. Rhodesia.
Krylovii *Schischk. & Sergievsk. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1932, Nos. 7–8, p. 5.—Ross. asiat.
macrocarpus *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 83 (1932).—Marocc.
Mandoni *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1935, xv. 965, in obs.: L. argenteus *Menezes*.
Oliveirae *A. Cheval. l. c.* 966.—Ins. C. Verde.
oxyphyllus *Harms in Engl. Jahrb.* xxx. 325 (1901).—Tanganyika Terr.
pseudo-creticus *Maire, Weiller & Wilczek in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1935, xxvi. 120, 200.—Marocc.
Simonae *Maire, Weiller & Wilczek, l. c.* 120, 201.—Marocc.
tibesticus *Maire in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 906.—Sahara Gall. (Tibesti).
Vidalii (*Pau*) *Sennen ex Pau in Cavanillesia*, v. 176 (1932): L. hispidus var. Vidalii.

LOUDETIA Hochst. (Gramin.).
acuminata (*Stapf*) *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 429: Trichopteryx acuminata.
ambiens (*K. Schum.*) *C. E. Hubbard, l. c.* 431: Trichopteryx ambiens.
angolensis *C. E. Hubbard, l. c.* 426.—Angola.
annua (*Stapf*) *C. E. Hubbard, l. c.* 429: Trichopteryx annua.
barbata *A. Br. ex Steud. Syn. Pl. Glum.* i. 238 (1854), in syn.: Tristachya barbata.
Bequaertii (*De Wild.*) *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 431: Trichopteryx Bequaertii.
camerunensis (*Stapf*) *C. E. Hubbard, l. c.*: Trichopteryx camerunensis.
capillipes *C. E. Hubbard, l. c.* 432.—Guinea Gall.
cerata (*Stapf*) *C. E. Hubbard, l. c.* 429: Trichopteryx cerata.
coarctata (*A. Camus*) *C. E. Hubbard, l. c.* 428: Tristachya coarctata.
crassipes *C. E. Hubbard, l. c.* 430.—Angola.
Demeusei (*De Wild.*) *C. E. Hubbard, l. c.* 429: Trichopteryx Demeusei.
densispica (*Rendle*) *C. E. Hubbard, l. c.* 428: Trichopteryx densispica.
eriopoda *C. E. Hubbard, l. c.* 433.—Cameroons.
filifolia *Schweickerdt in Kew Bull.* 1935, 207.—Transvaal.
flavida (*Stapf*) *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 429: Trichopteryx flavida.
glabrata (*K. Schum.*) *C. E. Hubbard, l. c.* 431: Trichopteryx glabrata.
Gossweileri *C. E. Hubbard, l. c.* 428.—Angola.
Hitchcockii *C. E. Hubbard, l. c.* 1935, 309.—Rhodesia.
hordeiformis (*Stapf*) *C. E. Hubbard, l. c.* 1934, 431: Trichopteryx hordeiformis.
lanata (*Stent & Rattray*) *C. E. Hubbard, l. c.* 429: Trichopteryx lanata.
longipes *C. E. Hubbard, l. c.* 430.—Angola.
lualabaënsis (*De Wild.*) *C. E. Hubbard, l. c.* 1935, 309, in obs.: Trichopteryx lualabaënsis.
migiurtina (*Chiov.*) *C. E. Hubbard, l. c.* 1934, 429: Trichopteryx migiurtina.
pennata (*Chiov.*) *C. E. Hubbard, l. c.* 428: Trichopteryx pennata.
phragmitoides (*Peter*) *C. E. Hubbard, l. c.*: Trichopteryx phragmitoides.

LOUDETIA:—
simplex (*Nees*) *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 431: Trichopteryx simplex.
ternata (*Stapf*) *C. E. Hubbard, l. c.*: Trichopteryx ternata.
Thomasii *C. E. Hubbard, l. c.* 427.—Uganda.
togoënsis (*Pilger*) *C. E. Hubbard, l. c.* 431: Trichopteryx togoënsis.
trigemina *C. E. Hubbard, l. c.* 432.—Nigeria.
Vanderystii (*De Wild.*) *C. E. Hubbard, l. c.* 428: Trichopteryx Vanderystii.

LOURYA Baill. (Liliac.).
Weberi *Pierre ex L. Rodrig. in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, vi. 667 (1934).—Indo-China (Tonkin).

LOUVELIA Jumelle & Perrier (Palmae).
albicans *Jumelle in Ann. Mus. Col. Marseille*, 1933, Sér. V. i. Fasc. 1, 5.—Madag.

LOVOA Harms (Meliac.).
trachysiphon *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 808 (1915), in obs., sphalm.: L. brachysiphon *Sprague*.

LOXANTHERA Blume (Loranthac.).
formosa *Chalon, Rev. Loranth.* 30 (1870), in obs.—Hab.?
loxanthera (*DC.*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 90 (1933): Loranthus loxantherus.

LOXOPTERA O. E. Schulz in Engl. Jahrb. lxvi. 93 (1933). *CRUCIFERAE.*
stenophylla (*Muschl.*) *O. E. Schulz, l. c.*, in obs.: Cremolobus stenophyllus.

LOXOSTEMON Hook. f. & Thoms. (Crucif.).
repens (*Franch.*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 362 (1931): Dentaria repens.

LOXOSTIGMA C. B. Clarke (Gesneriac.).
begoniifolium (*Léveillé*) *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 199 (1934): Didissandra begoniifolia.
Forrestii *Anthony, l. c.*—China (Yunnan).

LOZANELLA Greenm. (Ulmac.).
enantiophylla (*Donn. Smith*) *Killip & Morton in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 339: Trema enantiophylla.
permollis *Killip & Morton, l. c.* 338.—Boliv.

LOZANIA Mutis (Lacistemac.).
bipinnata *L. B. Smith in Phytologia*, i. 138 (1935).—Colomb.
Klugii (*Mansf.*) *Mansf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 596 (1932): Monandrodendron Klugii.
pedicellata (*Standley*) *L. B. Smith in Phytologia*, i. 138 (1935): Lacistema pedicellatum.
Pittieri (*Blake*) *L. B. Smith, l. c.*: Lacistema Pittieri.

LUCILIOPSIS Wedd. (Compos.).
Isernii *Cuatrec. in An. Univ. Madrid*, iv. Fasc. 2, 231 (1935).—Ecuador.

LUCKHOFFIA White & Sloane in S. Afr. Gard. 1935, xxv. 36, 37. *ASCLEPIADACEAE.*
Beukmannii (*Luckhoff*) *White & Sloane, l. c.*: Stapelia Beukmannii.

LUCUMA Mol. emend. A. DC. (Sapotac.).
anibifolia *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 389.—Bras. (Matto Grosso).
dissepala (*K. Krause*) *Ducke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 588 (1932): Vitellaria dissepala.
Espinae *Standley in Tropical Woods*, 1932, No. 30, p. 29, nomen; *et l. c.* 1932, No. 32, p. 21, descr.—Colomb.
garcinioides (*K. Krause*) *H. J. Lam in Nova Guinea*, xiv. 568 (1932): Sideroxylon garcinioides.
Gutta *Ducke in Ann. Acad. Bras. Sc.* 1934, vi. 208.—Bras. (Amaz.; Pará).
inflexa *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 388.—Bras. (Matto Grosso).
Lecomtei *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 458, nomen; *et in Lecomte, Not. Syst.* v. 15 (1935), descr.—N. Caled.
paraënsis *Standley in Tropical Woods*, 1933, No. 33, 13.—Bras. (Pará).
platyphylla *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 388.—Bras. (Matto Grosso).

LUDWIGIA L. (Onagrac.).
brevipes (*Long*) *Eames in Rhodora*, 1933, xxxv. 228: Ludwigiantha brevipes.
lacustris *Eames, l. c.*—U.S.A. (Connecticut; Rhode Island).
Mullerti *Mullert in Aquarium*, iii. 43, 64; cf. *L. H. Bailey, Cycl. Amer. Hort.* 948 (1900).—Am. austr.
parviflora *Roxb. Hort. Beng.* 11 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 440 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 419 (1832).—Ind. or. (Bengal).
Prieurea *J. Troch. in Bull. Soc. Bot. France*, 1935, lxxxii. 141, in obs., 144: Prieurea senegalensis.
prostrata *Roxb. Hort. Beng.* 11 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 441 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 420 (1832).—Burma.
spathulifolia *Small, Man. Southeast. Fl.* 943 (1933).—U.S.A. (Florida).

LUEHEA Willd. (Tiliac.).
nobilis *Linden & Planch.*; *Sprague in Kew Bull.* 1926, 42.—Venez.
tarapotina *Macbride in Candollea*, v. 382 (1934).—Peruv.

LUEHEOPSIS Burret (Tiliac.).
violacea *Standley in Tropical Woods*, 1933, No. 33, 13.—Bras. (Pará).

LUETZELBURGIA Harms (Legumin.).
auriculata (*Allemão*) *Ducke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 584 (1932): Tipuana auriculata.

LUFFA Mill. (Cucurbitac.).
Astori *Svenson in Am. Journ. Bot.* 1935, xxii. 256.—Ins. Galapag.; Ecuador.; Peruv.
Luffa (*L.*) *Lyons, Plant Names Scientific & Popular*, 231 (1900): Momordica Luffa.

LUISIA Gaudich. (Orchidac.).
amboinensis *Schlechter ex Mansf. in Fedde, Repert. Beih.* lxxiv. 7, t. 73, fig. 291 (1934), sine descr.—Ins. Molucc. (Amboina).
botanensis *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 442.—Formosa.
cordata *Fukuyama, l. c.* 1934, xlviii. 306.—Formosa.
cordatilabia *Ames & Quisumb. in Philipp. Journ. Sc.* 1933, lii. 459 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
Evangelinae *Blatter & McCann in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxv. 493 (1932).—Ind. or. (Bombay).
macrantha *Blatter & McCann, l. c.* 492.—Ind. or. (Bombay).
pseudotenuifolia *Blatter & McCann, l. c.*—Ind. or. (Bombay).
truncata *Blatter & McCann, l. c.* 491.—Ind. or. (*Bombay*).

LUNANIA Hook. (Flacourtiac.; Samydac., Gen. Pl.).
sessiliflora *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 74 (1935).—Brit. Honduras.

LUPINUS L. (Legumin.).
bicolor (*Merino*) *Rothmaler in Cavanillesia*, vii. 114 (1935): L. hispanicus var. bicolor.
Buchtienii *Rusby in Phytologia*, i. 56 (1934).—Boliv.
Luthereaui *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1935, xxvi. 154.—Sahara.
platanophilus *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 17, 29 (1930).—U.S.A. (Arizona).
× regalis (*Hort.*) *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 328 (1924): 'L. polyphyllus regalis'.
speciosus *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 196 (1894), in syn.: L. pubescens.
Tatei *Rusby in Phytologia*, i. 57 (1934).—Boliv.
utahensis *Moldenke in Torreya*, 1934, xxxiv. 9: L. Lupinus.
velutinus *Pau in Font Quer, Iter Marocc.* 1930, No. 289 [1932].—Marocc.

LUXEMBURGIA A. St. Hil. (Ochnac.).
duidae *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 389.—Venez.
longifolia *Gleason, l. c.* 390.—Venez.

LUZULA DC. (Juncac.).
atlantica *Braun-Blanquet*; *Litard. & Maire in Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc*, No. xxvi. 36 (1930), descr. ampl.—Marocc.
bulbosa (*Wood*) *Rydb. in Brittonia*, i. 85 (1931): L. campestris var. bulbosa.

LUZULA:—
capitata (*Miq.*) *Nakai, Veg. Mt. Apoi*, 76; cf. *Miyabe & Kudo in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 295 (1932): L. campestris var. capitata.
× cechica *Domin in Preslia*, xiii–xv. 23 (1935).—Czechoslovak.
formosana *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 79.—Formosa.
kamtschadalorum (*G. Samuelsson*) *Gorodk. ex Krylov, Fl. Sibir. Occ.* iii. 551 (1929): L. arcuata var. kamtschadalorum.
Kobayasii *Satake in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 186.—Ins. Aleut.
murrea *P. Fourn. in Le Monde des Plantes*, 1935, xxxvi. 12, in obs.—Gallia.
Pohleana *Krecz. ex Andreev in Trav. Mus. Bot. Acad. Sc. URSS*, xxiii. 164 (1931).—Ross. arct. (Penins. Kanin).
pseudo-sudetica *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 571 (1935): L. angustifolia *K. Koch*.
sibirica *Krecz. in Fl. Transbaical.* ii. 144 (1931); *et in Komarov, Fl. URSS*, iii. 574, 631 (1935).—Sibir.; Mongol.
taiwaniana *Satake in Journ. Fac. Sc. Tokyo*, Sect. III. Bot. iv. 202 (1933).—Formosa.

LYCASTE Lindl. (Orchidac.).
× Groganii *E. Cooper in Rev. Hort.* 1931, xxxix. 232.—Hab.?
longiscapa *Hort. ex Gard. Chron.* 1928, Ser. III. lxxxiv. 358; *E. Cooper in Orch. Rev.* 1930, xxxviii. 168; *Summerhayes in Bot. Mag.* t. 9400 (1935).—Colomb.?
suaveolens *Summerhayes, l. c.* t. 9231 (1931).—Hab.?

LYCHNIS L. (Caryophyllac.).
Arkwrighti *Hort. ex Heydt in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1932, xlvii. 111.—Hort.
cabulica *Aitch. in Journ. Linn. Soc., Bot.* xix. 153 (1882); *Boiss. Fl. Or.* Suppl., 102 (1888), in syn.: Silene citrina.
capensis *Bellard. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 336 (1833).—Hab.?
furcata (*Rafin.*) *Fernald in Rhodora*, 1932, xxxiv. 22: Silene furcata.
incarnata *Balb. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 336 (1833), in obs.—Ital.?
parciflora *Colla, l. c.*—Ital.?
subintegra (*Hayek*) *Turrill in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3228 (1934): L. Flos-cuculi subsp. subintegra.
ugoënsis *Makino in Journ. Jap. Bot.* vii. 31 (1931), nomen.—Japon. (Hondo).

LYCHNODISCUS Radlk. (Sapindac.).
grandifolius *Radlk. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.*, Nachtr. iii. 206 (1907), in obs.—Cameroons.
papillosus *Radlk. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. ii. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 282 (1921), in obs.; *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 1140 (1933), descr. ampl.—Afr. Gall. Centr.

LYCIANTHES Hassl. (Solanac.).
novogranatensis *Moldenke in Phytologia*, i. 16 (1933).—Colomb.

LYCIUM L. (Solanac.).
Comberi *C. L. Hitchcock in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1932, xix. 313.—Argent.
cyathiformum *C. L. Hitchcock, l. c.* 218.—Boliv.
densifolium *Wiggins in Contrib. Dudley Herb. Stanford Univ.* i. 198 (1934).—Calif. infer.
dispermum *Wiggins, l. c.* 204.—Mexico.
minimum *C. L. Hitchcock in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1932, xix. 225.—Ins. Galapag.
ovalilobum *C. L. Hitchcock, l. c.* 233.—Argent.
pubitubum *C. L. Hitchcock, l. c.* 237.—Argent.
salinicola *Verdoorn in Fl. Pl. S. Afr.* 1933, xiii. t. 487.—Orange Free State; Cape Prov.
truncatum *Wang in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, ii. 103 (1934).—China (Kansu; Shansi).
Venturii *C. L. Hitchcock in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1932, xix. 232.—Argent.

LYCOCHLOA G. Samuelsson in Arkiv Bot., Stockh. xxv. A. No. 8, 4 (1933). *GRAMINEAE.*
avenacea *G. Samuelsson, l. c.*—Syria.

LYCOPERSICON Mill. (Solanac.).
[Lycopersicum Hill.]

LYCOPERSICON:—
bipinnatifidum *R. Phil. in Verh. Deutsch. Wiss. Ver. Santiago (Chile)*, ii. 108 (1890), nomen; *et in An. Mus. Nac. Chile*, 1891, 63, descr.—Chile.

LYCOPUS L. (Labiat.).
attenuatus *ex Benner in Bartonia*, 1934, No. 16, 49 (1935), in obs., pro syn.: L. rubellus var. lanceolatus *Benner*.
hirtellus *Komarov in Komarov & Klob.-Alis. Key Pl. Far East. Reg. USSR*, ii. 908 (1932).—Ross. asiat. or.
ramosissimus (*Makino*) *Makino in Journ. Jap. Bot.* i. 14 (1917): L. Maackianus var. ramosissimus.

LYGEUM Loefl. ex L. Gen. Pl. ed. 5, 27 (1754). *GRAMINEAE.*

LYONIA Ell. (Asclepiadac.).
palustris (*Pursh*) *Small, Fl. Miami*, 149 (1913): Ceropegia palustris.

LYONIA Nutt. (Ericac.).
montecristina *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 33 (1932).—Santo Domingo.

LYSIANA Van Tiegh. (Loranthac.).
banksiana (*Guillaumin*) *Danser in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 223, 227, cum descr. emend.: Elytranthe banksiana.
miniata (*S. Moore*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 91 (1933): Loranthus miniatus.

LYSICHITUM Schott (Arac.).
album (*Hort.*) *Makino in Journ. Jap. Bot.* vii. 15 (1931): L. camtschatcense var. album.
americanum *Hultén & St. John in Svensk Bot. Tidskr.* 1931, xxv. 455 (1932).—Am. bor.

LYSICLESIA A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb. xxviii. 517 (1932). *ERICACEAE.*
caudata *A. C. Smith, l. c.* 518.—Colomb.
minor *A. C. Smith, l. c.* 519.—Colomb.

LYSIELLA Rydb. (Orchidac.).
oligantha (*Turcz.*) *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, iv. 663 (1935): Platanthera oligantha.

LYSILOMA Benth. (Legumin.).
cayucense *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 39 (1933–5).—Calif. infer.

LYSIMACHIA L. (Primulac.).
alternifolia *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 26 (1824).—Ind. or.
ardisioides *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 302.—Japon.
aspera *Hand.-Mazz. in Sinensia*, v. 5 (1934).—China (Kwangsi).
caerulea *Hort. ex Härle in Biblioth. Bot.* civ. 9 (1932), in obs., pro syn.—Hab.?
debilis *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 25 (1824).—Nepal.
evalvis *Wall. l. c.* 27.—Ind. or.
Huitsunae *Chien in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., ix. 28 (1933).—China (Anhwei).
Liui *Chien, l. c.* 26.—China (Szechuan).
lobelioides *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 29 (1824).—Ind. or.
Navillei (*Léveillé*) *Hand.-Mazz. in Journ. Arn. Arb.* 1934, xv. 293: Diospyros Navillei.
nigropunctata *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 191.—Japon.
platyphylla *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. viii. 134 (1934).—Sumatra.
polycephala *Chien in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., ix. 24 (1933).—China (Szechuan).
pyramidalis *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 28 (1824).—Ind. or.
rapensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 221 (1935).—Polynes. (Ins. Rapa).
recurvata (*Matsumura*) *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 302: L. decurrens var. recurvata.
stolonifera *Migo in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 387.—China (Kiangsu).
Tashiroi *Makino in Journ. Jap. Bot.* vii. 13 (1931).—Japon. (Kiushiu).

LYSIONOTUS D. Don (Gesneriac.).
hainanensis *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 321 (1935).—China (Hainan).

LYSIOSEPALUM F. Muell. (Stereuliac.).
involucratum (*Turcz.*) *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 81 (1931): Thomasia involucrata.

LYSIOSTYLES Benth. (Convolvulac.).
sericea *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., viii. 322 (1931).—Honduras.

LYSIPOMIA H. B. & K. (Campanulac.).
hirta *E. Wimm. in Fedde, Repert.* xxxviii. 87 (1935).—Peruv.

LYTHRUM L. (Lythrac.).
divaricatum *Colla, Herb. Pedem.* ii. 400 (1834).—Bras.
intermedium *Fisch. ex Colla, l. c.* 399.—Sibir. (Transbaikal.).

M

MAACKIA Rupr. (Legumin.).
chekiangensis *Chien in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China,* Bot. Ser., viii. 132 (1932).—China (Chekiang).
tenuifolia (*Hemsl.*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 544 (1933): Euchresta tenuifolia.

MABA J. R. & G. Forst. (Ebenac.).
cacharensis *Das & P. C. Kanj. in Assam Forest Rec., Bot.* i. 15 (1934).—Ind. or. (Assam).
Cooperi *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 6, in clavi, 7 (1931).—Liberia.
Janowskyi *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements,* vii. 163 (1933), in syn.: Diospyros Janowskyi.
palauensis *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo,* 1934, xlviii. 405.—Ins. Palau.
savaiiensis *Christoph. in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 128, 173 (1935).—Samoa.
soubreana *A. Cheval.; Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 6 (1931), in syn.: Diospyros piscatoria.
tahanensis *Bakh. in Gard. Bull. Straits Settlements,* vii. 163 (1933), in syn.: Diospyros tahanensis.

MABEA Aubl. (Euphorbiac.).
acutissima *Killip in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1934, xxiv. 49.—Colomb.
eximia *Ducke*; *Ducke in Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro,* vi. 61 (1933), descr. emend.—Reg. Amaz.

MACAGLIA Rich. ex Vahl (Apocynac.).
Quebracho-blanco (*Schlecht.*) *Lyons, Plant Names Scientific & Popular,* ed. 2, 286 (1907): Aspidosperma Quebracho-blanco.

MACAIREA DC. (Melastomatac.).
duidae *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 416.—Venez.
lanata *Gleason, l. c.*—Venez.
linearis *Gleason, l. c.* 417.—Venez.

MACARANGA Thou. (Euphorbiac.).
attenuata *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 102, 31 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
Bartlettii *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 161 (1934).—Sumatra.
eloba *Pax & K. Hoffm. in Mitt. Inst. Bot. Hamburg,* vii. 228 (1931).—Borneo.
Kanehirae *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa,* 1935, xxv. 27.—Ins. Carolin. (Ponape).
neomildbraediana *Lebrun in Ann. Soc. Sc. Brux.* liv. Sér. B, 160 (1934), cum descr. ampl.: M. Mildbraediana *Pax & K. Hoffm.* (1914).
sanguinea *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 91, 17 (1932).—Ins. Viti.

MACHAERANTHERA Nees (Compos.).
hiemalis *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 580.—U.S.A. (Calif.).

MACHAERIUM Pers. (Legumin.).
complanatum *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro,* ii. 46 (1935).—Bras. (Amaz.).
habroneurum *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 63 (1935).—Brit. Honduras.
melanophyllum *Standley in Tropical Woods,* 1931, No. 27, 13.—Venez.
Millei *Standley, l. c.* 1935, No. 42, 30.—Ecuador.
multifoliolatum *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1932, Sér. II. iv. 734.—Bras. (Amaz.).
Quinata (*Aubl.*) *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 359: Nissolia Quinata.

MACHAERIUM:—
rosescens *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 64 (1935).—Brit. Honduras.
Woodworthii *Standley in Contrib. Arn. Arb.* No. v. 81 (1933).—Panamá (Ins. Barro Colorado).

MACHAIROPHYLLUM Schwantes (Ficoidac.).
acuminatum *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. ii. 485 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Baxteri *L. Bolus, l. c.* 486.—Afr. austr. (Cape Prov.).
stenopetalum *L. Bolus, l. c.* Pt. ii. 303 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).

MACHAONIA Humb. & Bonpl. (Rubiac.).
Urbaniana *Standley in N. Am. Fl.* xxxii. 222 (1934).—Cuba.
Williamsii *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., viii. 357 (1931).—Peruv.

MACHILUS Nees (Laurac.).
acuminatissimus (*Hayata*) *Kanehira in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan,* 1934, vi. 12: Cinnamomum acuminatissimum.
glaucinus *A. Cheval. ex H. Liou, Laurac. Chine et Indochine,* 59 (1932).—Indo-China (Anam).
holadenus *H. Liou, l. c.* 54.—China (Yunnan).
leptophyllus *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 252 (1931).—China (Chekiang; Fokien; Kwangtung).
multinervius *H. Liou, Laurac. Chine et Indochine,* 56 (1932).—China (Kweichau).
taiwanensis *Kamikoti in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa,* 1934, xxiv. 277.—Formosa.
viridis *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 253 (1931).—China (Yunnan).

MACLEANIA Hook. (Ericac.; Vacciniac., Gen. Pl.).
amplexicaulis *A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 367 (1932).—Colomb.
compacta *A. C. Smith, l. c.* 369.—Mexico.
crassa *A. C. Smith, l. c.* 373.—Colomb.
hirtiflora (*Benth.*) *A. C. Smith, l. c.* 382: Thibaudia hirtiflora.
linearifolia (*Donn. Smith*) *A. C. Smith, l. c.* 368: M. cordata var. linearifolia.
mollis *A. C. Smith in Phytologia,* i. 132 (1935).—Ecuador.
nervosa *A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 380 (1932).—Colomb.
racemosa *Cufod. in Archiv. Bot., Forlì,* 1933, ix. 199.—Costa Rica.
reducta *A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 380 (1932).—Ecuador.
rupestris (*H. B. & K.*) *A. C. Smith in Phytologia,* i. 131 (1935): Thibaudia rupestris.
stricta *A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 364 (1932).—Colomb.

MACODES Lindl. (Orchidac.).
angustilabris *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 90 (1931).—Borneo.

MACOUBEA Aubl.; H. Hallier in Meded. Herb. Leid. No. 35, 22 (1918). *APOCYNACEAE.*

MACROCARPAEA Gilg (Gentianac.).
domingensis *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 30 (1931).—Santo Domingo.

MACROCENTRUM Hook. (Melastomatac.).
fruticosum *Gleason in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1935, xxxii. 207.—Guiana Bat.
glandulosum *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 422.—Venez.
pusillum *Gleason, l. c.*—Venez.

MACROCHAETIUM Steud. (Cyperac.).
hexandrum (*H. Pfeiff.*) *H. Pfeiff. in Fedde, Repert.* xxix. 186 (1931), in obs.: Ideleria hexandra.
Neesii (*Kunth*) *Kükenth. in Fedde, Repert.* xxix. 194 (1931), in obs.: Ideleria Neesii.

MACROCHLAENA Hand.-Mazz. Symb. Sin. Pt. vii. 720 (1933). *UMBELLIFERAE.*
glaucocarpa *Hand.-Mazz. l. c.*—China (Hunan).

MACROCNEMUM P. Br. (Rubiac.).
cuencanum *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., vii. 200 (1931): Cinchona ovalifolia *Humb. & Bonpl.*
obovatum *Ruiz ex Standley, l. c.* 280, in syn.: Bathysa obovata.
parviflorum *Roxb. Hort. Beng.* 85 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 144 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 525 (1832).—Ins. Molucc.

MACROCNEMUM:—
stipulaceum *Roxb. Hort. Beng.* 85 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 144 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 525 (1832).—Ins. Molucc.

MACROLOBIUM Schreb. (Legumin.).
coeruleum (*Taub.*) *Harms in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 475 (1915), in obs.: Vouapa coerulea.
confertum *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 371.—Venez.
debile *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1932, Sér. II. iv. 729.—Bras. (Amaz.).
ivorense *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 347 (1928), in syn.: M. limba.
longipedicellatum *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro,* ii. 40 (1935).—Bras. (Amaz.).
microcalyx *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1932, Sér. II. iv. 729.—Bras. (Amaz.).
Sargosii (*Pellegr.*) *Pellegr. in Bull. Soc. Bot. France,* 1930, lxxvii. 666 (1931): Englerodendron Sargosii.
splendidum (*A. Cheval.*) *Pellegr. l. c.* 667, in obs.: Berlinia splendida.
Stephanii *A. Cheval. Vég. Ut. Afr. Trop. Franç.* ix. 165 (1917); *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France,* 1914, lxi. Mém. 8, 257 (1917).—Gabon.
Vignei *Hoyle in Kew Bull.* 1933, 171.—Gold Coast.

MACROMERIA D. Don (Boraginac.).
barbigera *I. M. Johnston in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 189.—Mexico.
leontis *I. M. Johnston, l. c.* 188.—Mexico.

MACROPHARYNX Rusby (Apocynac.).
anomala *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1934, xxi. 614.—Ecuador.
spectabilis (*Stadelm.*) *R. E. Woodson, l. c.* 1931, xviii. 552: Echites spectabilis.

MACROPSYCHANTHUS Harms (Legumin.).
carolinensis *Kanehira & Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa,* 1934, xxiv. 414.—Ins. Carolin. (Truk).

MACROSCEPIS H. B. & K. (Asclepiadac.).
equatorialis *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1931, xviii. 559.—Ecuador.
retusa *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 787 (1933).—Peruv.

MACROSIPHONIA Muell.-Arg. (Apocynac.).
dulcis *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 577.—Mexico.

MACROSOLEN Blume (Loranthac.).
ampullaceus (*Roxb.*) *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France,* 1895, xlii. 442, in obs.: Loranthus ampullaceus.
Beccarii *Van Tiegh. ex Beccari, For. Born.* 518–19 (1902); cf. *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 277 (1931), descr. ampl.—Borneo.
bellus *Danser in Philipp. Journ. Sc.* 1935, lviii. 48.—Ins. Philipp. (Catanduanes).
borneanus *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 278 (1931).—Borneo.
Brandisianus (*Kurz*) *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France,* 1895, xlii. 442, in obs.: Loranthus Brandisianus.
carinatulus (*Wall.*) *Van Tiegh. l. c.*, in obs.: Loranthus carinatulus.
cochinchinensis (*Lour.*) *Van Tiegh. l. c.* 1894, xli. 122, in obs.: Loranthus cochinchinensis.
crassus *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 285 (1931).—Borneo.
curvinervis *Danser, l. c.* 286.—Borneo.
flammeus *Danser in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 230.—Borneo.
floridus *Danser, l. c.* 232, 239.—Borneo.
formosus (*Blume*) *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 1. 827 (1856): Loranthus formosus.
globosus (*Roxb.*) *Van. Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France,* 1895, xlii. 442, in obs.: Loranthus globosus.
javanus *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 289 (1931).—Java.
Kunstleri (*King*) *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France,* 1895, xlii. 442, in obs.: Loranthus Kunstleri.
latifolius *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 291 (1931).—Borneo.

MACROSOLEN:—
Lowii (*King*) *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France*, 1895, xlii. 442, in obs.: Loranthus Lowii.
nobilis *Danser in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 240.—Borneo.
patulus (*Jack*) *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 1. 831 (1856): Loranthus patulus.
pusillus *Danser in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 238.—Borneo.
sphaerocarpus (*Blume*) *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 1. 830 (1856): Loranthus sphaerocarpus.
splendidus *Danser in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 234.—Borneo.
subumbellatus (*Blume*) *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France*, 1895, xlii. 442, in obs.: Loranthus subumbellatus.
sumatranus *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 299 (1931).—Sumatra.
tenuiflorus *Danser, l. c.* 300.—Borneo.
tetragonus (*Blume*) *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 1. 829 (1856): Loranthus tetragonus.
trigonus (*Wight & Arn.*) *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France*, 1895, xlii. 442, in obs.: Loranthus trigonus.
tubiflorus (*Ridley*) *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 303 (1931): Elytranthe tubiflora.
viridiflorus (*Wall.*) *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France*, 1895, xlii. 442, in obs.: Loranthus viridiflorus.

MACROTOMIA DC. (Boraginac.).
ugamensis *Popov in Journ. Turkest. Branch Russ. Geogr. Soc.* 1924, xvii. 26 (1925).—Turkestan. (Thian Shan).

MACROZAMIA Miq. (Cycadac.).
amabilis *Hort. ex Bull, Cat.* 7 (1847); cf. *Engl. Pflanzenreich, Cycadac.* 88 (1932).—Hab.?
breviformis *Hort. ex Schuster in Engl. l. c.* 130, in syn.: Ceratozamia mexicana.
elegantissima *Hort. ex Bull, Cat.* 7 (1847); cf. *Engl. Pflanzenreich, Cycadac.* 88 (1932).—Hab.?
eximia *Bull, l. c.*; cf. *Engl. l. c.*—Hab.?
Hilli *Bull, l. c.*; cf. *Engl. l. c.*—Hab.?
pulchra *Bull, l. c.*; cf. *Engl. l. c.*—Hab.?
pungens *Lehm. ex Schuster in Engl. l. c.* 94, in syn.: M. tridentata.

MACUILLAMIA Rafin. (Scrophulariac.).
Eiseni (*Kellogg*) *Pennell in Acad. Nat. Sc. Philad.* Monogr. 1, *Scroph.* 57 (1935), in adnot.: Ranapalus Eiseni.

MADHUCA J. F. Gmel. (Sapotac.).
leucodermis (*K. Krause*) *H. J. Lam in Nova Guinea*, xiv. 556 (1932): Illipe leucodermis.
malabarica (*Bedd.*) *R. N. Parker in Indian Forester*, 1931, lvii. 489: Bassia malabarica.
microphylla (*Hook.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 179 (1931): Bassia microphylla.
pubicalyx *Ridley in Kew Bull.* 1934, 121.—Borneo.
Ridleyi *H. J. Lam in Gard. Bull. Straits Settlements*, ix. 105 (1935).—Penins. Mal.

MADIA Molina (Compos.).
Hallii *Keck in Madroña*, iii. 5 (1935).—U.S.A. (Calif.).
nutans (*Greene*) *Keck, l. c.*: Callichroa nutans.
Wheeleri (*A. Gray*) *Keck, l. c.* 4: Hemizonia Wheeleri.

MAERUA Forsk. (Capparidac.).
Deckenii (*Chiov.*) *Chiov. Fl. Somala*, II. 8 (1932): Capparis Deckenii.
erythreae *Gilg & Benedict ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 253 (1915), in obs.—Erythraea.
floribunda *Fenzl in Flora*, 1844, xxvii. 312, nomen.—Aethiop.
Gorinii *Chiov. Fl. Somala*, II. 8 (1932).—Somal. Ital.
Hoehnelii *Schweinf. ex Engl.*; *Schweinf. in v. Hoehnel, Reise Rudolfsee*, 868 (1892), descr.—Afr. trop. or.
pygmaea *Gilg*; *Gilg-Benedict in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 502 (1935), descr. emend.—Tanganyika Terr.
Rogeoni *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 584.—Sudan. (Haut-Sénégal-Niger).

MAERUA:—
rosmarinoides (*Sond.*) *Hochst. ex Pax in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* iii. II. 234 (1891), in obs.; *Gilg & Benedict in Engl. Jahrb.* liii. 240 (1915): Niebuhria rosmarinoides.
Vitis-idaeifolia *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 4 (1935).—Kenya Col.

MAESA Forsk. (Myrsinac.).
ambrymensis *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1935, lxxxii. 350.—N. Hebrides.
argentea *C. B. Clarke in Hook. Fl. Brit. Ind.* iii. 510 (1882).—Reg. Himal.
Aubertii *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1935, lxxxii. 350.—N. Hebrides.
banksiana *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 58.—N. Hebrides.
djalonis *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 16 (1931), in syn.: M. lanceolata.
dubia *C. B. Clarke in Hook. Fl. Brit. Ind.* iii. 510 (1882).—Ind. or. (Malabar).
hirsuta *Walker in Papers Mich. Acad. Sc.* 1934, xx. 232 (1935).—China (Kweichau; Kwangsi).
insignis *Chun in Sunyatsenia*, ii. 81 (1934).—China (Kwangtung).
macilenta *Walker in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 479.—China (Yunnan).
macrophylla *C. B. Clarke in Hook. Fl. Brit. Ind.* iii. 510 (1882).—Reg. Himal.
mollis *DC. in Rev. Hort.* Sér. III. iii. 92 (1849), in adnot.—Asia?
nuda *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 16 (1931).—Guinea Gall.
oligotricha *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 185 (1934).—Sumatra.
Perlarius (*Lour.*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n.s. xxiv. II. 47, in obs., 298 (1935): Dartus Perlarius.
salicifolia *Walker in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 480.—China (Kwangtung).
taiheizanensis *Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1931, xxi. 252.—Formosa.

MAESOBOTRYA Benth. (Euphorbiac.).
brevispicata *Pax in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 15 (1921), in obs.—Gabon.
dissitiflora *Pax, l. c.*, in obs.—Cameroons.
fallax *Pax, l. c.*, in obs.—Cameroons.
intermedia *Pax, l. c.*, in obs.—Cameroons.
Pynaertii *Pax, l. c.*, in obs.—Congo Belg.
scariosa *Pax, l. c.*, in obs.—Cameroons.

MAESOPSIS Engl. (Rhamnac.).
Tessmannii *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 309 (1921), in obs.—Guinea infer.

MAGALLANA Cav. (Tropaeolac.; Geraniac., Gen. Pl.).
trialata *Suesseng. in Fedde, Repert.* xxx. 276 (1932).—Argent.

MAGDALENAEA Brade in Arquiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro, i. 235 (1935). *SCROPHULARIACEAE.*
Limae *Brade, l. c.* 236.—Bras. (Rio de Janeiro).

MAGNISTIPULA Engl. (Rosac.).
pallidiflora *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 308 (1915), in obs.—Cameroons.

MAGNOLIA L. (Magnoliac.).
amoena *Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., ix. 280 (1934).—China (Chekiang).
australis *Ashe in Torreya*, 1931, xxxi. 39.—U.S.A. (S. E. States).
borealis *Kudo, Medic. Pl. Hokk.* t. 47 (1922); *Hara in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 17, in syn.: M. Kobus var. borealis *Sarg.*
Brozzonii (*Hort.*) *Hort. ex Millais, Magnolias*, 56, 87 (1927): M. Soulangeana var. Brozzonii.
Ekmanii *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, p. 12 (1931).—Haiti.
emarginata *Urb. & Ekman, l. c.* p. 11.—Haiti.
heptapeta (*Buc'hoz*) *Dandy in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 103: Lassonia heptapeta.
pallescens *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, p. 10 (1931).—Santo Domingo.

MAGNOLIA:—
quinquepeta (*Buc'hoz*) *Dandy in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 103: Lassonia quinquepeta.
Zenii *Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., viii. 291 (1933).—China (Kiangsu).

MAHONIA Nutt. (Berberidac.).
amplectens *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 145 (1931).—U.S.A. (Calif.).
bijuga *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 331 (1931).—China (Szechuan).
huiliensis *Hand.-Mazz. l. c.* 329.—China (Szechuan).
Piperiana *Abrams in Phytologia*, i. 91 (1934).—U.S.A. (Oregon; Calif.).
Schochii *C. K. Schneider in Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 329 (1931).—China (Kweichau).
Sonnei *Abrams in Phytologia*, i. 92 (1934).—U.S.A. (Calif.).
sumatrensis *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 55 (1934).—Sumatra.
toluacensis *Bean, Trees & Shrubs Brit. Isles*, iii. 52 (1933), in syn.: Berberis toluacensis.

MAHUREA Aubl. (Guttif.; Ternstroemiac., Gen. Pl.).
tomentosa *Ducke in Arquiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, i. 208 (1935); *et in Tropical Woods*, 1935, No. 43, 22.—Bras. (Amaz.).

MAIANTHEMUM Web. in Wigg. (Liliac.).
nipponicum *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1924, xxxviii. p. (181), in obs., japonice.—Japon.

MAIHUENIA Phil. (Cactac.).
andicola *Comber, Field Notes Andes Exped. 1925–6 & 1926–7*, 1 [1928].—Argent.

MAJORANA Mill. (Labiat.).
Maru (*L.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 847 (1895), in obs.: Origanum Maru.

MALABAILA Hoffm. (Umbellif.).
lefeburioides *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 821 (1921), in syn.: Erythroselinum lefeburioides.
Princeae *Engl. & H. Wolff, l. c.* 830, in obs.—Nyasaland.
Stolzii *Engl. & H. Wolff, l. c.*, in obs.—Tanganyika Terr.

MALACOCARPUS Salm-Dyck (Cactac.).
leucocarpus (*Arech.*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 252 (1935): Echinocactus leucocarpus.
mollendensis *Backeb. in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1931, xlvi. 207, in obs., nomen.—Peruv.
tetracanthus (*Lem.*) *R. Mey. in Monatsschr. Kakteenk.* 1894, iv. 143: Echinocactus tetracanthus.
Vorwerckianus (*Werderm.*) *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 11, [p. 5], in obs., nomen; *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 253 (1935): Echinocactus Vorwerckianus.

MALACOTHRIX DC. (Compos.).
Blairii (*Munz & I. M. Johnston*) *Munz & I. M. Johnston in Munz, Man. S. Calif. Bot.* 591, 601 (1935): Stephanomeria Blairii.

MALACURUS Nevski in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS, Ser. I. Fasc. 1, 19, 27 (1933), sine descr.; et in Acta Univ. As. Med. Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 38 (1934), descr. *GRAMINEAE.*
lanatus (*Korsh.*) *Nevski, l. c.* 19, in obs.; *et l. c.*: Elymus lanatus.

MALANEA Aubl. (Rubiac.).
boliviana *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 295 (1931).—Boliv.; Peruv.

MALAXIS Soland. (Orchidac.).
Chevalieri *Summerhayes in Kew Bull.* 1934, 208.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
lunata (*Schlechter*) *Ames in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 129, in obs.: Microstylis lunata.
Maclaudii (*Finet*) *Summerhayes in Kew Bull.* 1934, 208: Microstylis Maclaudii.
melanotoessa *Summerhayes, l. c.* 209.—Liberia.
neo-ebudica *Ames in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 109, 128.—N. Hebrides.
prorepens (*Kraenzl.*) *Summerhayes in Kew Bull.* 1934, 208: Microstylis prorepens.

MALAXIS:—
Reichei (*Schlechter*) *Ames & C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* iii. 124 (1935): Microstylis Reichei.
Soulei *L. Williams in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1934, xxi. 343: Microstylis montana.
Weberbaueriana (*Kraenzl.*) *Summerhayes in Kew Bull.* 1934, 208: Liparis Weberbaueriana.

MALCOLMIA R. Br. corr. Spreng. (Crucif.).
calycina *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 9 [1933], nomen.—Marocc.
mamorensis *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 63 (1932).—Marocc.

MALESHERBIA Ruiz & Pav. (Malesherbiac.; Passiflorac., Gen. Pl.).
humilis *Poepp. in Froriep, Notiz. Gebiet Natur-u. Heilk.* Ser. I. xxiii. 291 (1829), in adnot.—Chile.
tubulosa (*Cav.*) *J. St.-Hil. Expos. Fam. Nat.* ii. 357 (1805): Gynopleura tubulosa.

MALLEOLA J. J. Smith & Schlechter (Orchidac.).
callosa *Carr in Journ. As. Soc. Mal.* xi. 101 (1933).—Sumatra.
paniculata *Carr, l. c.* 100.—Sumatra.

MALLOTUS Lour. (Euphorbiac.).
Beillei *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 307 (1928), in syn.: M. oppositifolius.
brachythyrsus *Merrill in Sarawak Mus. Journ.* iii. 526 (1928).—Borneo.
Castanopsis *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* x. 487 (1931).—China (Kwangtung).
palauensis *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 25.—Ins. Palau.
ponapensis *Hosokawa, l. c.* 26.—Ins. Carolin. (Ponape).
pseudoverticillatus *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 23 (1935).—China (Hainan).
Stewardii *Merrill ex Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* x. 488 (1931).—China or.

MALMEA R. E. Fries (Annonac.).
costaricensis *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* x. 320 (1931).—Costa Rica.
cuspidata *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 78 (1931).—Peruv.
depressa (*Baill.*) *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* x. 43 (1930): Annona depressa.
Dielsiana (*Saff.*) *R. E. Fries, l. c.* 42: Cymbopetalum Dielsianum.
discolor *R. E. Fries, l. c.* xii. 202 (1934).—Guiana Brit.
hypoglauca (*Standley*) *R. E. Fries, l. c.* x. 321 (1931): Guatteria hypoglauca.
lucida *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 78 (1931).—Ecuador.
Raimondii (*Diels*) *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* x. 320 (1931): Guatteria Raimondii.
xanthochlora (*Diels*) *R. E. Fries, l. c.* 45: Guatteria xanthochlora.

MALOPE L. (Malvac.).
rhodoleuca *Maire, Contrib. Étude Fl. Afr. Nord*, Fasc. 21, reimpr. p. 1 (1933); *Maire in Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc*, 1933, xiii. 266 (1934).—Marocc.

MALOUETIA A. DC. (Apocynac.).
gracillima *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1935, xxii. 265.—Bras. (Amaz.).
Killipii *R. E. Woodson, l. c.* 1931, xviii. 551.—Peruv.
Mexiae *R. E. Woodson, l. c.* 1935, xxii. 246.—Bras. (Amaz.; Pará).
peruviana *R. E. Woodson, l. c.* 259.—Peruv.

MALPIGHIA L. (Malpighiac.).
Ekmanii *Niedenzu in Fedde, Repert.* xxxiii. 71 (1933).—Haiti.

MALUS Mill. (Rosac.).
atropurpurea *Hort. ex Pollanetz in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1933, xlviii. 242.—Hort.
Eleyi *Hort. ex Pollanetz, l. c.*; *et l. c.* 1934, xlix. 319.—Hort.
grandiflora (*Asami*) *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 191: M. prunifolia var. grandiflora.
hupehensis (*Pampan.*) *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 207: Pyrus hupehensis.

MALUS:—
Malus *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 275 (1894), in syn.: Pyrus Malus.
manshurica (*Maxim.*) *Komarov in Bull. Jard. Bot. Rép. Russe*, xxiv. 146 (1925): M. baccata var. manshurica.
Rockii *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 206.—China (Yunnan).
sibirica (*Maxim.*) *Komarov in Komarov & Klob.-Alis. Key Pl. Far East. Reg. USSR*, ii. 638 (1932): M. baccata var. sibirica.

MALVA L. (Malvac.).
aspera *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 386 (1833).—Bras.
cristata (*Boiss.*) *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 16 [1933]: M. parviflora var. cristata.
cypriana *D. Don ex R. Walpole, Mem. Eur. As. Turkey*, 254 (1817), nomen.—Cyprus.
Duri *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 107, nomen.—Hispan.
ononidifolia *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 386 (1833).—Bras.
pulchella *Hort. ex Colla, l. c.* 385.—Hab.?

MALVASTRUM A. Gray (Malvac.).
casabambense *Stuckert in An. Soc. Cient. Argent.* 1932, cxiv. 24.—Argent.
confertum *Parish ex Jepson, Man. Fl. Pl. Calif.* 631 (1925), pro syn.: Sidalcea Hickmani.
dimorphum *Howell in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xxi. 331 (1935).—Ins. Galapag.
famatinense *Hieron. ex Stuckert in An. Soc. Cient. Argent.* 1932, cxiv. 29, in syn.: Nototriche famatinensis.
modioliforme (*Kuntze*) *Stuckert, l. c.* 26: Malveopsis modioliformis.
Pennellii *Ulbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 524 (1932).—Peruv.
scoparioides *Ulbr. l. c.* 525.—Peruv.
tuberculatum *A. W. Hill in Kew Bull.* 1933, 486.—Argent.

MALVAVISCUS Adans. (Malvac.).
elegans *Linden & Planch.*; *Gürke in Mart. Fl. Bras.* xii. III. 537 (1892); *Sprague in Kew Bull.* 1926, 41.—Venez.
Malvaviscus (*L.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 142 (1894): Hibiscus Malvaviscus.
speciosus *Linden & Planch.*; *Gürke in Mart. Fl. Bras.* xii. III. 538 (1892); *Sprague in Kew Bull.* 1926, 41.—Venez.
Williamsii *Ulbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 545 (1932).—Peruv.

MAMMILLARIA Haw. (Cactac.).
albescens *Tiegel in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1933, xlviii. 260.—Mexico.
albiarmata *Bödeker in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 397 (1935), nomen.—Hab.?
albicans (*Britton & Rose*) *A. Berger, Kakteen*, 308 (1929): Neomammillaria albicans.
auriareolis *Tiegel in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1933, xlviii. 412.—Mexico.
Bachmannii *Bödeker in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 403 (1935), nomen.—Mexico.
balsasensis *Bödeker in Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges.* 1931, iii. 121; *et in Kakteenk.* 1933, 195, descr. ampl.—Mexico.
Baxteriana (*Gates*) *Bödeker in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 398 (1935): Neomammillaria Baxteriana.
Blossfeldiana *Bödeker in Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges.* 1931, iii. 209.—Mexico.
bogotensis *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen*, 98 (1931); *et in Fedde, Repert.* xxx. 65 (1932).—Colomb.
Brauneana *Bödeker in Kakteenk.* 1933, 113.—Mexico.
Bullardiana (*Gates*) *Bödeker in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 387 (1935): Neomammillaria Bullardiana.
calacantha *Tiegel in Kakteenk.* 1933, 232.—Mexico.
Chaffeyi (*Britton & Rose*) *Backeb. Neue Kakteen*, 16 (1931), in obs.: Escobaria Chaffeyi.
denudata (*Engelm.*) *A. Berger, Kakteen*, 288 (1929): M. lasiacantha var. denudata.
Dietrichiae *Tiegel in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1933, xlviii. 413.—Mexico.
Droegeana *Hildm. ex Schelle, Handb. Kakteenkult.* 257 (1907), in syn.: M. rhodantha var. Droegeana *K. Schum.*
Ekmanii *Werderm. in Fedde, Repert.* xxix. 242 (1931).—Hispaniola.
esperanzaënsis *Bödeker in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 392 (1935).—Mexico.
estanzuelensis *Hort. ex A. Berger, Kakteen*, 287 (1929).—Mexico.
Fobeana *Bödeker in Kakteenk.* 1933, 154.—Mexico?
Fraileana (*Britton & Rose*) *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 4, [p. 6]: Neomammillaria Fraileana.
gilensis *Bödeker in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 385 (1935), nomen.—Hab.?
glareosa *Bödeker, l. c.* 403, nomen.—Calif. infer.
guerreronis (*Bravo*) *Bödeker, l. c.* 391: Neomammillaria guerreronis.
Haehneliana *Bödeker in Kakteenk.* 1934, 27.—Mexico.
Halbingeri *Bödeker, l. c.* 1933, 9.—Mexico.
Hamiltonhoytea (*Bravo*) *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen*, 99 (1931): Neomammillaria Hamiltonhoytea.
Hennisii *Bödeker in Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges.* 1932, iv. 7.—Venez.
Herrerae *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 276 (1931).—Mexico.
Hutchisoniana (*Gates*) *Bödeker in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 387 (1935): Neomammillaria Hutchisoniana.
icamolensis *Bödeker in Kakteenk.* 1933, 168.—Mexico.
jaliscana (*Britton & Rose*) *Bödeker, Mammill.-Vergl.-Schlüss.* 35 (1933); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 145: Neomammillaria jaliscana.
Knebeliana *Bödeker in Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges.* 1932, iv. 52.—Mexico.
Leei *Rose ex Bödeker, Mammill.-Vergl.-Schlüss.* 17 (1933), in syn.; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 145: Escobaria Leei.
Lengdobleriana *Bödeker in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 381 (1935), nomen.—Hab.?
leucantha *Bödeker in Kakteenk.* 1933, 233.—Mexico.
longicoma (*Britton & Rose*) *A. Berger, Kakteen*, 292 (1929): Neomammillaria longicoma.
longiflora (*Britton & Rose*) *A. Berger, l. c.* 296: Neomammillaria longiflora.
Marshalliana (*Gates*) *Bödeker in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 398 (1935): Neomammillaria Marshalliana.
melispina *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 226 (1934).—Mexico.
Mendeliana (*Bravo*) *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen*, 100 (1931): Neomammillaria Mendeliana.
microheliopsis *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 278 (1931).—Mexico.
Mieheana *Tiegel in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1933, xlviii. 397.—Mexico.
Milleri (*Britton & Rose*) *Bödeker, Mammill.-Vergl.-Schlüss.* 30 (1933); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 145: Neomammillaria Milleri.
Morganiana *Tiegel in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1933, xlviii. 397.—Mexico.
multiformis (*Britton & Rose*) *Backeb. Neue Kakteen*, 19 (1931), in obs.; *Bödeker, Mammill.-Vergl.-Schlüss.* 26 (1933); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 145: Neomammillaria multiformis.
multimamma *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 392 (1935): M. polythele *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* 559 (1898), non *Mart.*
Nelsonii (*Britton & Rose*) *Bödeker, Mammill.-Vergl.-Schlüss.* 37 (1933); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 145: Neomammillaria Nelsonii.
neocoronaria *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 392 (1935): M. coronaria *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* 555 (1898), non *Haw.*
occidentalis (*Britton & Rose*) *Bödeker, Mammill.-Vergl.-Schlüss.* 36 (1933); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 145: Neomammillaria occidentalis.
Ochoterenae (*Bravo*) *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen*, 98 (1931): Neomammillaria Ochoterenae.
Ortizrubiana (*Bravo*) *Werderm. l. c.* 95: Neomammillaria Ortizrubiana.

MAMMILLARIA: -
pacifica (*Gates*) *Bödeker in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 398 (1935): Neomammillaria pacifica.
Palmeri (*Coult.*) *Bödeker, l. c.* 394: Cactus Palmeri.
Patoni (*Bravo*) *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen*, 97 (1931): Neomammillaria Patoni.
phitauiana (*Baxter*) *Werderm. l. c.* 96: Neomammillaria phitauiana.
Posseltiana *Bödeker in Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges.* 1932, iv. 99.—Mexico.
Pringlei (*Coult.*) *K. Brandegee in Zoë*, v. 7 (1900): Cactus Pringlei.
pseudo-Rekoi *Bödeker in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 389 (1935), nomen.—Mexico.
pygmaea (*Britton & Rose*) *A. Berger, Kakteen*, 296 (1929): Neomammillaria pygmaea.
roseocentra *Bödeker & Ritter in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 382 (1935), nomen.—Mexico.
Runyonii (*Britton & Rose*) *Bödeker, Mammill.-Vergl.-Schlüss.* 52 (1933); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 145: Neomammillaria Runyonii.
saetigera *Bödeker & Tiegel in Kakteenk.* 1934, 190.—Mexico.
Schmollii (*Bravo*) *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen*, 98 (1931): Neomammillaria Schmollii.
Sheldonii (*Britton & Rose*) *Bödeker, Mammill.-Vergl.-Schlüss.* 30 (1933); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 145: Neomammillaria Sheldonii.
sinistrohamata *Bödeker in Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges.* 1932, iv. 162.—Mexico.
Slevinii (*Britton & Rose*) *Bödeker, Mammill.-Vergl.-Schlüss.* 44 (1933); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 145: Neomammillaria Slevinii.
Solisii (*Britton & Rose*) *Bödeker, l. c.* 35; *et l. c.*: Neomammillaria Solisii.
strobilina *Tiegel in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1933, xlviii. 329.—Mexico.
surculosa *Bödeker in Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges.* 1931, iii. 78.—Mexico.
Swinglei (*Britton & Rose*) *Bödeker, Mammill.-Vergl.-Schlüss.* 33 (1933); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 145: Neomammillaria Swinglei.
tenampensis (*Britton & Rose*) *A. Berger, Kakteen*, 325 (1929): Neomammillaria tenampensis.
Vaupelii *Tiegel in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1933, xlviii. 412.—Mexico.
viridiflora (*Britton & Rose*) *Bödeker, Mammill.-Vergl.-Schlüss.* 36 (1933); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 145: Neomammillaria viridiflora.
Wagneriana *Bödeker in Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges.* 1932, iv. 199.—Mexico.
Weingartiana *Bödeker, l. c.* 219.—Mexico.
Werdermanii *H. Weiss in Kakteenfreund*, iii. 18 (1934), nomen; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 143.—Hab. ?
Wiesingeri *Bödeker in Kakteenk.* 1933, 204.—Mexico.
xanthina (*Britton & Rose*) *Bödeker, Mammill.-Vergl.-Schlüss.* 47 (1933); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 145: Neomammillaria xanthina.
Zeilmanniana *Bödeker in Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges.* 1931, iii. 227.—Mexico.

MANAGA Aubl.; H. Hallier in Meded. Herb. Leid. No. 35, 21 (1918): **Salacia** L. (Hippocrateac.).

MANCOA Wedd. (Crucif.).
foliosa (*Wedd.*) *O. E. Schulz in Engl. Jahrb.* lxvi. 98 (1933): Hutchinsia foliosa.

MANDEVILLA Lindl. (Apocynac.).
achrestogyne (*R. E. Woodson*) *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1933, xx. 677: Dipladenia achrestogyne.
acutiloba (*A. DC.*) *R. E. Woodson, l. c.* 1932, xix. 54: Echites acutiloba.
albo-viridis (*Rusby*) *R. E. Woodson, l. c.* 69: Dipladenia albo-viridis.
anceps *R. E. Woodson, l. c.* 75.—Bras.
angustifolia (*Malme*) *R. E. Woodson, l. c.* 1933, xx. 710: Dipladenia angustifolia.
apocynifolia (*A. Gray*) *R. E. Woodson, l. c.* 1932, xix. 65: Echites apocynifolia.
atroviolacea (*Stadelm.*) *R. E. Woodson, l. c.* 1933, xx. 724: Echites atroviolacea.
bella (*Pittier*) *R. E. Woodson, l. c.* 717: Dipladenia bella.

MANDEVILLA:—
bogotensis (*H. B. & K.*) *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1932, xix. 73: Echites bogotensis.
boliviensis (*Hook. f.*) *R. E. Woodson, l. c.* 1933, xx. 716: Dipladenia boliviensis.
bracteosa (*Rusby*) *R. E. Woodson, l. c.* 742: Echites bracteosa.
Bridgesii (*Muell.-Arg.*) *R. E. Woodson, l. c.* 1932, xix. 67: Amblyanthera Bridgesii.
callista *R. E. Woodson, l. c.* 1933, xx. 700.—Colomb.
cercophylla *R. E. Woodson, l. c.* 1932, xix. 61.—Peruv.
cereola *R. E. Woodson, l. c.* 1933, xx. 712.—Ecuador; Boliv.
coccinea (*Hook. & Arn.*) *R. E. Woodson, l. c.* 734: Echites coccinea.
congesta (*H. B. & K.*) *R. E. Woodson, l. c.* 675: Echites congesta.
crassinoda (*Gardn.*) *R. E. Woodson, l. c.* 703: Echites crassinoda.
cuspidata (*Rusby*) *R. E. Woodson, l. c.* 730: Dipladenia cuspidata.
Donnell-Smithii *R. E. Woodson, l. c.* 1932, xix. 54.—Guatem.
equatorialis *R. E. Woodson, l. c.* 65.—Ecuador.
erecta (*Vell.*) *R. E. Woodson, l. c.* 62: Echites erecta.
eximia (*Hemsl.*) *R. E. Woodson, l. c.* 1933, xx. 706: Dipladenia eximia.
Fendleri (*Muell.-Arg.*) *R. E. Woodson, l. c.* 1932, xix. 70: Amblyanthera Fendleri.
fragilis *R. E. Woodson, l. c.* 59.—Boliv.
fragrans (*Stadelm.*) *R. E. Woodson, l. c.* 1933, xx. 713: Echites fragrans.
glabra (*Rusby*) *R. E. Woodson, l. c.* 709: Dipladenia glabra.
glandulosa (*Ruiz & Pav.*) *R. E. Woodson, l. c.* 1932, xix. 66: Echites glandulosa.
grata *R. E. Woodson, l. c.* 68.—Argent.
illustris (*Vell.*) *R. E. Woodson, l. c.* 1933, xx. 727: Echites illustris.
immaculata *R. E. Woodson, l. c.* 721.—Bras. (S. Paulo; Paraná).
Jamesonii *R. E. Woodson, l. c.* 1932, xix. 58.—Ecuador.
lancifolia *R. E. Woodson, l. c.* 74.—Venez.
laxa (*Ruiz & Pav.*) *R. E. Woodson, l. c.* 68: Echites laxa.
linearis (*Muell.-Arg.*) *R. E. Woodson, l. c.* 1933, xx. 733: Dipladenia linearis.
lucida *R. E. Woodson, l. c.* 718.—Bras. (Rio de Janeiro).
Luetzelburgii (*Ross & Markgraf*) *R. E. Woodson, l. c.* 698: Dipladenia Luetzelburgii.
Martiana (*Stadelm.*) *R. E. Woodson, l. c.* 702: Echites Martiana.
mexicana (*Muell.-Arg.*) *R. E. Woodson, l. c.* 1932, xix. 65: Amblyanthera mexicana.
minor *R. E. Woodson, l. c.* 1933, xx. 711.—Argent.
Moricandiana (*A. DC.*) *R. E. Woodson, l. c.* 705: Dipladenia Moricandiana.
Muelleri *R. E. Woodson, l. c.* 717: Dipladenia scabra.
Myriophyllum (*Taub.*) *R. E. Woodson, l. c.* 682: Dipladenia Myriophyllum.
oblongifolia (*R. E. Woodson*) *R. E. Woodson, l. c.* 708: Dipladenia oblongifolia.
Pavonii (*A. DC.*) *R. E. Woodson, l. c.* 1932, xix. 73: Echites Pavonii.
pendula (*Ule*) *R. E. Woodson, l. c.* 1933, xx. 725: Dipladenia pendula.
Pentlandiana (*A. DC.*) *R. E. Woodson, l. c.* 1932, xix. 63: Laseguea Pentlandiana.
permixta *R. E. Woodson, l. c.* 1933, xx. 715.—Bras. (Bahia).
platydactyla *R. E. Woodson, l. c.* 1932, xix. 55.—Mexico.
polyantha *K. Schum.*; *R. E. Woodson, l. c.* 73, descr.—Peruv.
pycnantha (*Steud.*) *R. E. Woodson, l. c.* 60: Echites pycnantha.
riparia (*H. B. & K.*) *R. E. Woodson, l. c.* 58: Echites riparia.
rosana (*Donn.-Smith*) *R. E. Woodson, l. c.* 56: Echites rosana.
rugosa (*Benth.*) *R. E. Woodson, l. c.* 384: Echites rugosa.

MANDEVILLA:—
rutila *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1932, xix. 385.—Boliv.
Sagittarii *R. E. Woodson, l. c.* 72.—Colomb.
sancta (*Stadelm.*) *R. E. Woodson, l. c.* 1933, xx. 726: Echites sancta.
Sanderi (*Hemsl.*) *R. E. Woodson, l. c.* 720: Dipladenia Sanderi.
Schlimii (*Muell.-Arg.*) *R. E. Woodson, l. c.* 1932, xix. 70: Amblyanthera Schlimii.
scorpioidea *R. E. Woodson, l. c.* 56.—Mexico.
scutifolia *R. E. Woodson, l. c.* 57.—Peruv.
Sellowii (*Muell.-Arg.*) *R. E. Woodson, l. c.* 1933, xx. 719: Dipladenia Sellowii.
sertuligera *R. E. Woodson, l. c.* 1932, xix. 383.—Mexico.
spigeliiflora (*Stadelm.*) *R. E. Woodson, l. c.* 1933, xx. 736: Echites spigeliiflora.
splendens (*Hook. f.*) *R. E. Woodson, l. c.* 707: Echites splendens.
subcarnosa (*Benth.*) *R. E. Woodson in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 453: Echites subcarnosa.
subpaniculata *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1932, xix. 71: Echites macrophylla *A. Zahlbr.*
subsagittata (*Ruiz & Pav.*) *R. E. Woodson, l. c.* 69: Echites subsagittata.
subsessilis (*A. DC.*) *R. E. Woodson, l. c.* 59: Echites subsessilis.
surinamensis (*Pulle*) *R. E. Woodson, l. c.* 1933, xx. 704: Dipladenia surinamensis.
symphytocarpa (*G. F. W. Mey.*) *R. E. Woodson, l. c.* 1932, xix. 70: Echites symphytocarpa.
syrinx *R. E. Woodson, l. c.* 53.—Mexico.
tenuifolia (*Mikan*) *R. E. Woodson, l. c.* 1933, xx. 679: Echites tenuifolia.
torosa (*Jacq.*) *R. E. Woodson, l. c.* 1932, xix. 64: Echites torosa.
Trianae *R. E. Woodson, l. c.* 70.—Colomb.
tubiflora (*Mart. & Gal.*) *R. E. Woodson, l. c.* 52: Echites tubiflora.
urophylla (*Hook. f.*) *R. E. Woodson, l. c.* 1933, xx. 722: Dipladenia urophylla.
velutina (*Mart. ex Stadelm.*) *R. E. Woodson, l. c.* 731: Echites velutina.
venulosa (*Muell.-Arg.*) *R. E. Woodson, l. c.* 723: Dipladenia venulosa.
villosa (*Miers*) *R. E. Woodson, l. c.* 1932, xix. 70: Laseguea villosa.

MANDRAGORA L. (Solanac.).
Shebbearei *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1934, 260.—Tibet.

MANETTIA Mutis ex L. (Rubiac.).
asclepiadacea *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 332 (1931).—Peruv.
Bradei *Standley, l. c.* 330.—Bras. (S. Paulo).
campanulacea *Standley, l. c.* 327.—Bras. (Minas Geraes).
Fiebrigii *Standley, l. c.* vii. 264 (1931).—Boliv.
Hoehnei *Standley, l. c.* viii. 329 (1931).—Bras. (S. Paulo).
Holwayi *Standley, l. c.* vii. 186 (1931).—Ecuador.
hotteana *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 43 (1932).—Haiti.
minutiflora *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 326 (1931).—Bras. (Minas Geraes).
myrtifolia *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 427 (1894), in syn.: Bouvardia mollis.
paranensis *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 331 (1931).—Bras. (Paraná).
paucinervis *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 43 (1932).—Haiti.
paulina *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 328 (1931).—Bras. (S. Paulo).
Samuelssoniana *Standley, l. c.* 330.—Argent.
Tatei *Standley, l. c.* vii. 265 (1931).—Boliv.
teresitae *Standley, l. c.* 187.—Ecuador.
tomantha *Standley, l. c.* viii. 326 (1931).—Bras. (Goyaz).
tomentosa (*Rusby*) *Standley, l. c.* vii. 265 (1931): Lygistum tomentosum.

MANGIFERA L. (Anacardiac.).
Beccarii *Ridley in Kew Bull.* 1933, 194.—Borneo.
caesia *Jack in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 441 (1824).—Sumatra.
Havilandi *Ridley in Kew Bull.* 1933, 194.—Borneo.
oppositifolia *Roxb. Hort. Beng.* 18 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 434 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 640 (1832).—Burma.
quadrifida *Jack ex Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 440 (1824).—Sumatra; Arch. Mal.
sylvatica *Roxb. Hort. Beng.* 18 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 438 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 644 (1832).—Reg. Himal.

MANGLIETIA Blume (Magnoliac.).
aromatica *Dandy in Journ. Bot.* 1931, lxix. 231.—China (Kwangsi).
Chingii *Dandy, l. c.* 232.—China (Kwangsi).
tenuipes *Dandy, l. c.*—China (Kwangsi).

MANIHOT Mill. (Euphorbiac.).
neoglaziovii *Pax & K. Hoffm. ex Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste Braz.* iii. 141 (1923) [*Insp. Fed. Obras Secc.* Publ. 57], nomen; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 151.—Bras. (Rio Grande do Norte).

MANILKARA Adans. (Sapotac.).
amazonica (*Huber*) *Standley in Tropical Woods*, 1933, No. 34, 41: Mimusops amazonica.
bidentata (*A. DC.*) *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1932, xii. 270: Mimusops bidentata.
dahomeyensis *Pierre ex A. Cheval. Expl. Bot. Afr. Occ. Franç.* 394 (1920), nomen.—Dahomey.
darienensis (*Pittier*) *Standley in Tropical Woods*, 1932, No. 31, 45: Mimusops darienensis.
excelsa (*Ducke*) *Standley, l. c.* 1933, No. 34, 41: Mimusops excelsa.
Huberi (*Ducke*) *Standley, l. c.* 1933, No. 33, 19: Mimusops Huberi.
paraënsis (*Huber*) *Standley, l. c.* 1933, No. 34, 41: Mimusops paraënsis.
Roxburghiana (*Wight*) *R. N. Parker in Indian Forester*, 1931, lvii. 489: Mimusops Roxburghiana.
spectabilis (*Pittier*) *Standley in Tropical Woods*, 1932, No. 31, 45: Mimusops spectabilis.
udoido *Kanehira, Fl. Micrones.* 304 (1933), japonice; *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 677, latine.—Ins. Palau.

MANISURIS L. f. (Gramin.).
acuminata (*Hackel*) *C. E. C. Fischer in Gamble, Fl. Madras*, 1761 (1934): Rottboellia acuminata.
altissima (*Poir.*) *Hitchcock in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1934, xxiv. 292: Rottboellia altissima.
forficulata *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1933, 355.—Ind. or. (Bombay; Cochin).
granularis *L. Amoen. Acad.* x., Diss. Bot. 40 (1779).—Hab.?
sulcata (*Stapf*) *Dandy in Journ. Bot.* 1931, lxix. 54: Peltophorus sulcatus.

MANNAGETTAEA H. Smith in Acta Hort. Gothoburg. 1933, viii. 135. *OROBANCHACEAE.*
Hummelii *H. Smith, l. c.* 138.—China (Kansu).
labiata *H. Smith, l. c.* 137.—China (Szechuan).

MANNIA Hook. f. (Simaroubac.).
Kerstingii (*Engl.*) *Harms in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 371 (1931): Simarubopsis Kerstingii.
Simarubopsis *Pellegr. in Bull. Soc. Bot. France*, 1930, lxxvii. 665 (1931), in obs.—Côte d'Ivoire.

MANTISALCA Cass. (Compos.).
amberboides (*Caballero*) *Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc*, iii. 819 (1934): Microlonchus amberboides.

MANTISIA Sims (Zingiberac.; Scitamin., Gen. Pl.).
Wengeri *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1931, 283.—Ind. or. (Assam).

MANULEA L. (Scrophulariac.).
buchubergensis *Dinter ex Range in Fedde, Repert.* xxxviii. 263 (1935), nomen.—Namaqualand.
gracillima *Dinter ex Range, l. c.*, nomen.—Namaqualand.
minuscula *Dinter ex Range, l. c.* 264, nomen.—Namaqualand.
polyantha *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 772 (1895), in syn.: Sutera polyantha.

MAPANIA Aubl. (Cyperac.).
angustifolia *Uitt. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1935, xxxii. 197.—Borneo.
caudata *Kükenth. in Fedde, Repert.* xxix. 201 (1931).—Borneo.
flagellaris *Uitt. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1935, xxxii. 198.—Borneo.
fluviatilis *Sandwith in Kew Bull.* 1933, 495.—Guiana Brit.
insignis *Sandwith, l. c.* 496.—Guiana Brit.
latifolia *Uitt. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1935, xxxii. 199.—Borneo.
monostachya *Uitt. l. c.* 194.—Borneo.
Richardsii *Uitt. l. c.* 195.—Borneo.
rostrata *Elmer ex Uitt. l. c.* 189, in syn.: Paramapania rostrata.
surinamensis *Uitt. in Pulle, Fl. Surinam.* i. (*Meded. K. Ver. Kol. Inst. Amst.* xxx.) 128 (1934): M. montana *Uitt.*

MAPOURIA Aubl. (Rubiac.).
Fockeana (*Miq.*) *Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 286, in obs.: Psychotria Fockeana.
microdon (*DC.*) *Bremek. l. c.* 287, in obs.: Rondeletia microdon.
opaca *Bremek. l. c.* 289.—Guiana Bat.
ornithophila *Bremek. l. c.* 288.—Guiana Bat.
wonotobensis *Bremek. l. c.* 287.—Guiana Bat.

MAPPIA Jacq. (Icacinac.; Olacac., Gen. Pl.).
obtusifolia *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 28 (1935).—China (Hainan).

MARANTA L. (Marantac.; Scitamin., Gen. Pl.).
Regeliana *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 955 (1895), in syn.: Calathea Bachemiana.

MARCELLIA Baill. (Amaranthac.).
leptacantha *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. Anhang, 26 (1932).—Tanganyika Terr.

MARCELLIOPSIS Schinz in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, xvi. c. 48 (1934). *AMARANTHACEAE.*
denudata (*Hook. f.*) *Schinz, l. c.*: Sericocoma denudata.
Dinteri (*Schinz*) *Schinz, l. c.*: Marcellia Dinteri.
splendens (*Schinz*) *Schinz, l. c.*: Marcellia splendens.
Welwitschii (*Hook. f.*) *Schinz, l. c.*: Sericocoma Welwitschii.

MARCGRAVIA L. (Marcgraviac.; Ternstroemiac., Gen. Pl.).
longifolia *Macbride in Candollea*, v. 386 (1934).—Peruv.
Schippii *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 71 (1935).—Brit. Honduras.
strenua *Macbride in Candollea*, v. 386 (1934).—Peruv.
Williamsii *Macbride, l. c.*—Peruv.

MARILA Sw. (Guttif.; Ternstroemiac., Gen. Pl.).
magnifica *Linden & Planch.*; *Sprague in Kew Bull.* 1926, 44.—Venez.

MARIPA Aubl. (Convolvulac.).
fasciculata *v. Ooststr. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 195.—Peruv.
Kuhlmannii (*Hoehne*) *Ducke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 589 (1932): Dicranostyles Kuhlmannii.
peruviana *v. Ooststr. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 197.—Peruv.
rugosa *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 747.—Bras. (Amaz.).
Williamsii *v. Ooststr. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 196.—Peruv.

MARISCOPSIS Cherm. (Cyperac.).
hyalinus (*Vahl*) *Ballard in Kew Bull.* 1932, 458: Cyperus hyalinus.

MARISCUS Gaertn. (Cyperac.).
Blatteri *McCann in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxvii. 532 (1934).—Ind. or. (Bombay).
compactus *Boldingh, Zakfl. Landbouwstr. Java*, 77 (1916).—Java.
dubius (*Rottb.*) *Kükenth. in Gamble, Fl. Madras*, 1644 (1931); *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1931, 263, in obs.: Cyperus dubius.

MARISCUS:—
karisimbiensis *Cherm. in Bull. Soc. Bot. France*, 1935, lxxxii. 335.—Congo Belg.
Quarrei *Cherm. in De Wild. & Staner, Contrib. Fl. Katanga*, Suppl. v. 14 (1933), nomen; *et in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiv. 294 (1934), descr.; *et in Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. 277 (1935).—Congo Belg.
Roxburghianus (*C. B. Clarke*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 309 (1931): M. paniceus var. Roxburghianus.

MARISCUS Zinn; cf. Sprague in Kew Bull. 1934, 219: **Cladium** P. Br. (Cyperac.).
Bidwellii (*Stapf*) *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 20 (1933), cum descr.: Vincentia Bidwellii.
elevatus *J. W. Moore, l. c.*—Ins. Societ. (Raiatea).
Meyenii (*Kunth*) *J. W. Moore, l. c.* 22, in obs., et in adnot.: Baumea Meyenii.
ouveanus *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1932, lxxvii. Beibl. 19, 83.—Ins. Loyauté.
pennatus *Schinz & Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 462, nomen.—N. Caled.
societensis *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 21 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).

MARKEA L. C. Rich. (Solanac.).
parviflora *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 747; *et in Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro*, vi. 89 (1933).—Bras. (Amaz.).
porphyrobaphes *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 488.—Guiana Brit.

MARRUBIUM L. (Labiat.).
Fontianum *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1933, xxiv. 226.—Marocc.
Guilliermondii *Emberger in Compt. Rend.* 1935, cc. 1780, in obs., nomen.—Marocc.
× segobricense *Pau ex Font Quer in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, v. Ser. Bot. No. 3, 216 (1920), in obs.—Hispan.
supinum (*Steph. ex Willd.*) *Hu ex P'ei in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., x. 53 (1935): Leonurus supinus.
Werneri *Maire, Contrib. Étude Fl. Afr. Nord*, Fasc. 21, reimpr. p. 2 (1933); *Maire in Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc*, 1933, xiii. 271 (1934).—Marocc.

MARSDENIA R. Br. (Asclepiadac.).
carnea *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1934, xxi. 611.—China (Szechuan).
Cavaleriei (*Léveillé*) *Hand.-Mazz. ex R. E. Woodson in Journ. Arn. Arb.* 1934, xv. 318: Metaplexis Cavaleriei.
lauretiana *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1931, xviii. 562.—Peruv.
yunnanensis (*Léveillé*) *R. E. Woodson in Journ. Arn. Arb.* 1934, xv. 317: Gongronema yunnanense.

MARSYPOPETALUM Scheff. (Annonac.).
pallidum (*Blume*) *Backer, Schoolfl. Java*, 36 (1911): Guatteria pallida.

MARTINELLA Baill. (Bignoniac.).
insculpta *Sprague & Sandwith in Kew Bull.* 1934, 101.—Venez.; Guiana Brit.
iquitoënsis *A. Sampaio in Ann. Acad. Bras. Sc.* 1935, vii. 122.—Peruv.
verrucosa (*Standley*) *Standley in Contrib. Arn. Arb.* No. v. 138 (1933): Adenocalymma verrucosa.

MARTINEZIA Ruiz & Pav. (Palmae).
Ernesti *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 327 (1932): M. Ulei *Dammer* (1915).
Killipii *Burret, l. c.* 326.—Colomb.

MARTIODENDRON Gleason in Phytologia, i. 141 (1935): **Martiusia** Benth. (Legumin.).
elatum (*Ducke*) *Gleason, l. c.*: Martiusia elata.
excelsum (*Benth.*) *Gleason, l. c.*: Martiusia excelsa.
macrocarpon *Gleason, l. c.* 142.—Bras. (Amaz.).
parvifolium (*Benth.*) *Gleason, l. c.* 141: Martiusia parvifolia.

MARTYNIA L. (Martyniac.; Pedaliac., Gen. Pl.).
Jussieui (*Steud.*) *Howell in Leafl. West. Bot.* i. 40 (1933): Proboscidea Jussieui.

MASCAGNIA Bert. (Malpighiac.).
dissimilis *Morton & Moldenke in Phytologia*, i. 19 (1933).—Colomb.

MASCAGNIA:—
dumetorum *Morton in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1932, xlv. 53.—Colomb.
hirsuta *Niedenzu in Fedde, Repert.* xxxiii. 69 (1933).—Bras. (Amaz.).
hondensis *Morton in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1932, xlv. 52.—Colomb.
loretensis *Morton, l. c.* 49.—Peruv.
nobilis *Morton, l. c.* 51.—Peruv.
Pittieri *Morton, l. c.* 50.—Colomb.

MASDEVALLIA Ruiz & Pav. (Orchidac.).
Schroederae *Boos in Gartenflora*, 1931, lxxx. 13.—Am. trop. centr. & austr.

MASOALA Jumelle in Ann. Mus. Col. Marseille, 1933, Sér. V. i. Fasc. 1, 8. *PALMAE.*
madagascariensis *Jumelle, l. c.*—Madag.

MASSONIA Thunb. (Liliac.).
Bolusiae *Barker in Fl. Pl. S. Afr.* 1931, xi. t. 429.—Afr. austr. (Cape Prov.).
modesta *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 79 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
triflora *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 276 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).

MATAYBA Aubl. (Sapindac.).
oligandra *Sandwith in Kew Bull.* 1935, 123.—Guiana Brit.

MATELIA Aubl. (Asclepiadac.).
stenopetala *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 485.—Guiana Brit.; Bras. (Rio Negro).

MATHEWSIA Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. 140 (1832). *CRUCIFERAE.*
foliosa *Hook. & Arn. l. c.*—Chile.

MATISIA Humb. & Bonpl. (Bombacac.; Malvac., Gen. Pl.).
Castano *Karst. & Triana in Triana, Nuev. Jen. i Esp. Fl. Neo-Granad.* 24 (1854); *Karst. in Linnaea*, xxviii. 430 (1857); *Sprague in Kew Bull.* 1934, 396.—Colomb.
coloradorum *Benoist in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 335.—Am. austr.
longiflora *Gleason in Phytologia*, i. 26 (1933).—Colomb.

MATRICARIA L. (Compos.).
alba *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 509 (1894), in syn.: Chrysanthemum Parthenium.
capitellata *Battand. & Pitard in Pitard, Contrib. Étude Fl. Maroc*, 20 (1918).—Marocc.
eximia *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 509 (1894), in syn.: Chrysanthemum Parthenium.
morifolia (*Ramat.*) *Ramat. in Journ. Hist. Nat., Paris*, ii. 240 (1792), in obs.: Chrysanthemum morifolium.
otaviensis *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 90 (1932).—Hereroland.
Tchihatchewii (*Boiss.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 504 (1894): Chamaemelum Tchihatchewii.

MATTFELDIA Urb. in Arkiv Bot., Stockh. xxiii. A. No. 11, 90 (1931). *COMPOSITAE.*
triplinervis *Urb. l. c.*—Haiti.

MATTHIOLA R. Br. (Crucif.).
alyssifolia (*DC.*) *Bornm. in Fedde, Repert.* xxxix. 80 (1935): Hesperis alyssifolia.
caboverdeana *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1935, Sér. II. vii. 139.—Ins. C. Verde.
fruticulosa (*L.*) *Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc*, ii. 311 (1932): Cheiranthus fruticulosus.
littorea (*Buch*) *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1935, xv. 992, in obs.: Cheiranthus littoreus.
vallesiaca (*J. Gay*) *Boiss. Fl. Or.* i. 153 (1867), in obs., nomen; *Ces. Pass. & Gib. Comp. Fl. Ital.* 853 [1867–86], in clavi: Cheiranthus vallesiacus.

MATTIA Schult. (Boraginac.).
oblongifolia *Popov ex Baranov in Journ. Turkest. Branch Russ. Geogr. Soc.* 1924, xvii. 20, 33 (1925), nomen.—Turkestan. (Thian Shan).

MATTIASTRUM A. Brand (Boraginac.).
Dielsii *Bornm. in Engl. Jahrb.* lxvi. 236 (1934).—Afghan.

MATTIASTRUM:—
paphlagonicum *Bornm. in Magyar Bot. Lap.* 1931, xxx. 69.—As. Min. (Paphlagonia).

MAUGHANIA N. E. Brown in Journ. Cact. & Succ. Soc. Amer. ii. 389 (1931). *FICOIDACEAE.*
insignis *N. E. Brown, l. c.* 390.—Afr. austr. (Cape Prov.).

MAURANDIA Ortega (Scrophulariac.).
alba *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 745 (1895), in syn.: M. semperflorens f. alba *Voss.*
albiflora *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in syn.: M. semperflorens.
petrophila *Coville & Morton in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 292.—U.S.A. (Calif.).

MAURITIELLA Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xii. 609 (1935). *PALMAE.*
aculeata (*H. B. & K.*) *Burret, l. c.*: Mauritia aculeata.
armata (*Mart.*) *Burret, l. c.* 611: Mauritia armata.
Duckei *Burret, l. c.* 609.—Bras. (Amaz.).
Huebneri (*Burret*) *Burret, l. c.* 611: Mauritia Huebneri.
intermedia (*Burret*) *Burret, l. c.*: Mauritia intermedia.
macroclada (*Burret*) *Burret, l. c.*: Mauritia macroclada.
Martiana (*Spruce*) *Burret, l. c.*: Mauritia Martiana.
peruviana (*Becc.*) *Burret, l. c.*: Mauritia peruviana.
pumila (*Wallace*) *Burret, l. c.*: Mauritia pumila.
subinermis (*Spruce*) *Burret, l. c.*: Mauritia subinermis.

MAXILLARIA Ruiz & Pav. (Orchidac.).
angustissima *Ames, F. T. Hubbard & C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* iii. 41 (1934): M. acutifolia *Schlechter.*
Barbozae *Löfgr.*; *Hoehne in Bol. Agric., S. Paulo*, 1933, xxxiv. 630 (1934), descr. emend.—Bras. (Mons Itatiaia).
Cogniauxiana *Hoehne, l. c.* 632.—Bras. (S. Paulo; Paraná).
flava *Ames, F. T. Hubbard & C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* iii. 41 (1934): Ornithidium ramonense *Schlechter*, non Maxillaria ramonensis *Schlechter.*

MAYTENUS Molina (Celastrac.).
microphylla *Urb. Ekman & Loes. in Fedde, Repert.* xxxiii. 182 (1933).—Haiti.
pseudoboaria *Loes. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 29 (1934).—Peruv.

MAZUS Lour. (Scrophulariac.).
stolonifer *Makino in Cat. Sem. Hort. Bot. Univ. Tokyo*, 17 (1896); cf. *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1063 (1931), japonice.—Japon.
taihokuensis *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 194.—Formosa.

MECONIA Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 275 (1855), in obs. *PAPAVERACEAE.*

MECONOPSIS Vig. (Papaverac.).
× Coxiana *G. Taylor in New Fl. & Silv.* vi. 45 (1933).—Hort.
Dhwojii *G. Taylor in Gard. Chron.* 1932, Ser. III. xcii. 41.—Nepal.
Georgei *G. Taylor, Gen. Meconopsis*, 86 (1934).—China (Yunnan).
gracilipes *G. Taylor, l. c.* 38.—Nepal.
× Harleyana *G. Taylor in New Fl. & Silv.* vi. 48 (1933).—Hort.
longipetiolata *G. Taylor in Gard. Chron.* 1932, Ser. III. xcii. 41.—Nepal.
× Musgravei *G. Taylor in New Fl. & Silv.* vi. 46 (1933), hybr. artif.—Cult.
neglecta *G. Taylor, Gen. Meconopsis*, 102 (1934).—Ind. or. (Chitral).
pseudovenusta *G. Taylor, l. c.* 85.—Tibet; China (Szechuan; Yunnan).
× Sarsonsii *Hort. ex Gard. Chron.* 1930, Ser. III. lxxxvii. 414; *et l. c.* 1930, Ser. III. lxxxviii. 11; *et l. c.* 1935, Ser. III. xcvii. 433.—Hort.
Smithiana (*Hand.-Mazz.*) *G. Taylor ex Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 337 (1931): Cathcartia Smithiana.
villosa (*Hook. f.*) *G. Taylor, Gen. Meconopsis*, 28 (1934): Cathcartia villosa.

MEDICAGO L. (Legumin.).
compressa *Biroli ex Colla, Herb. Pedem.* ii. 100 (1834).—Hab.?
Juliae *Sennen in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 186, in obs., nomen.—Marocc.
Leonis *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 146 [1933], nomen.—Marocc.
monantha *Blatter in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxvi. 969 (1933).—Ind. or. (Waziristan).
plicata (*Boiss.*) *Sirjaev in Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk, Brno*, No. 102, 33 (1928), in obs.: Trigonella plicata.
polonica *Bellardi ex Balb. in Colla, Herb. Pedem.* ii. 100 (1834).—Hab.?
pseudogranatensis *Blatter in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxvi. 969 (1933).—Ind. or. (Waziristan).
Schischkinii *Sumnev. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1932, Nos. 1–2, p. 5.—Ross. asiat.
Trautvetterii *Sumnev. l. c.* p. 3.—Ross. asiat. (Kasakstan.).
viscidula *Bellardi ex Colla, Herb. Pedem.* ii. 100 (1834).—Hab.?

MEDINILLA Gaudich. (Melastomatac.).
acutissimifolia *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. XII. 144 (1932).—Madag.
albiflora *H. Perrier, l. c.*—Madag.
ankaizinensis *H. Perrier, l. c.* 176.—Madag.
Baroni *Baker in Journ. Linn. Soc., Bot.* xxv. 317 (1890), in obs.: M. divaricata *Baker* (1887).
bigradata *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. XII. 147 (1932).—Madag.
caudatifolia *Schwartz in Mitt. Inst. Bot. Hamburg*, vii. 252 (1931).—Borneo.
Chermezonii *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. XII. 150 (1932).—Madag.
crassiramea *M. R. Henderson in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 103 (1933).—Penins. Mal.
cucullata *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. XII. 179 (1932).—Madag.
dajakorum *Schwartz in Mitt. Inst. Bot. Hamburg*, vii. 254 (1931).—Borneo.
Decaryi *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. XII. 176 (1932).—Madag.
diversifolia *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 670.—Ins. Carolin. (Kusai).
falcata *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. XII. 159 (1932).—Madag.
gratiosa *Stapf in Kew Bull.* 1933, 184.—Penins. Mal.
hainanensis *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 292 (1935).—China (Hainan).
heteromorphophylla *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 260.—N. Hebrides.
intermedia *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. XII. 180 (1932).—Madag.
ivohibeënsis *H. Perrier, l. c.* 169.—Madag.
lemurum *H. Perrier, l. c.*—Madag.
mandrakensis *H. Perrier, l. c.* 151.—Madag.
micranthera *H. Perrier, l. c.* 153.—Madag.
Negrito *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3203 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
neo-ebudica *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 260.—N. Hebrides.
rotundiflora *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. XII. 153 (1932).—Madag.
rubella *H. Perrier, l. c.* 154.—Madag.
tsinjoarivensis *H. Perrier, l. c.* 150.—Madag.
Viguieri *H. Perrier*; *H. Perrier, l. c.* 148, descr.—Madag.

MEDIOCALCAR J. J. Smith (Orchidac.).
angustum *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 175 (1934).—N. Guin.
Doctersii *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 31 (1935).—N. Guin.
selebicum *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxv. 476 (1933).—Celebes.
vanikorense *Ames in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 136.—Ins. Santa Cruz; N. Hebrides.

MEDIOLOBIVIA Backeb. Blätter Kakteenforsch. 1934, Pt. 2, [p. 3]. *CACTACEAE.*
aureiflora (*Backeb.*) *Backeb. l. c.* [p. 4]: Rebutia aureiflora.
Boedekeriana *Backeb. l. c.* [p. 6].—Argent.
Duursmaiana *Backeb. l. c.* 1934, Pt. 9, [p. 6].—Argent.
elegans *Backeb. l. c.* [p. 5].—Argent.

MEDIOLOBIVIA:—
longiseta (*Backeb.*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 247 (1935): M. aureiflora var. longiseta.
rubelliflora *Backeb. l. c.* 247, 415.—Argent.
rubriflora *Backeb. l. c.*—Argent.

MEEHANIA Britton (Labiat.).
montis-koyae *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 107.—Japon. (Hondo).

MEGACARPAEA DC. (Crucif.).
megalocarpa *Schischk. ex Krylov, Fl. Sibir. Occ.* vi. 1270 (1931), in syn.: M. laciniata.

MEGALERANTHIS Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot. 1935, iv. 130. *RANUNCULACEAE.*
saniculifolia *Ohwi, l. c.* 131.—Corea.

MEGAPTERIUM Spach (Onagrac.).
brachycarpum (*A. Gray*) *Rydb. in Brittonia*, i. 93 (1931): Oenothera brachycarpa.

MEGARRHENA Schrad. ex Nees in Mart. Fl. Bras. ii. 1. 5 (1842), in syn.: **Comostemum** Nees (Cyperac.).
montevidensis *Schrad. ex Nees, l. c.*, in syn.: Comostemum montevidense.

MEGARRHIZA Torr. & Gray (Cucurbitac.).
macrocarpa (*Greene*) *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 43: Echinocystis macrocarpa.

MEGASTACHYA Beauv. (Gramin.).
Eragrostis (*L.*) *Roem. & Schult. Syst. Veg.* ii. 575, in obs., 584 (1817): Briza Eragrostis.

MEIBOMIA Adans. (Legumin.).
adhaerens *Rusby in Phytologia*, i. 58 (1934).—Boliv.
adpressa *Rusby, l. c.*—Boliv.
Chapmanii (*Britton*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 734 (1933): M. paniculata var. Chapmanii.
nummularia *Rusby in Phytologia*, i. 59 (1934).—Boliv.
pubens (*Torr. & Gray*) *Rydb. in Brittonia*, i. 92 (1931): Desmodium paniculatum var. pubens.
simpliciflora *Rusby in Phytologia*, i. 60 (1934).—Boliv.
tetrasperma *Rusby, l. c.*—Boliv.
trigona *Gándara in Mem. y Rev. Soc. Cient. 'Antonio Alzate'*, li. 113 (1931).—Am. centr. (Salvador).

MEIOGYNE Miq. (Annonac.).
montana (*Blume*) *Backer, Schoolfl. Java*, 29 (1911): Uvaria montana.

MEKISTUS Lour. ex Gomes in Mem. Acad. Sc. Lisb. Cl. Sc. Pol. Mor. Bel.-Let. n. s. iv. (1), 29 (1868); Merrill in Trans. Am. Phil. Soc. n. s. xxiv. ii. 16, 282 (1935), in syn.: **Quisqualis** L. (Combretac.).
sinensis *Lour. ex Gomes, l. c.*; *Merrill, l. c.*, in syn.: Quisqualis indica.

MELALEUCA L. (Myrtac.).
Brongniartii *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1933, lxxviii. Beibl. 19, 318: M. pungens *Brongn. & Gris.*
Cheelii *C. T. White in Proc. Roy. Soc. Queensl.* 1931, xliii. 16 (1932).—Austral. (Queensland).
monticola *J. M. Black in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1934, lviii. 179.—S. Austral.
rotundifolia *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 313 (1894), in syn.: Regelia ciliata.
suberosa (*Schau.*) *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 91 (1931): Calothamnus suberosus.

MELAMPODIUM L. (Compos.).
anomalum *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 72 (1933–5).—Mexico.
minutiflorum *M. E. Jones, l. c.*—Mexico.

MELAMPYRUM L. (Scrophulariac.).
Variscorum *Rothmaler in Mitt. Thüring. Bot. Ver.* n. f. xli. 85, 86 (1933).—German.

MELANDRIUM Roehl. (Caryophyllac.).
baicalense *A. Tolmatch. in Trav. Mus. Bot. Acad. Sc. URSS*, xxiv. 265 (1932).—Sibir.
Fedtschenkoanum (*Preobr.*) *Schischk. in Trav. Mus. Bot. Acad. Sc. URSS*, xxiv. 34 (1932): Silene Fedtschenkoana.
glabellum *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 47 (1934).—Formosa.

MELANDRIUM:—
gracile *A. Tolmatch. in Trav. Mus. Bot. Acad. Sc. URSS*, xxiv. 261 (1932).—Sibir. or.
irikutense *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 95.—Manchur.
nesophilum (*Holm*) *A. Tolmatch. in Trav. Mus. Bot. Acad. Sc. URSS*, xxiv. 254, 267 (1932), in obs.: Lychnis nesophila.
nubigena *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 48 (1934).—Formosa.
persicum (*Boiss. & Buhse*) *Bornm. in Fedde, Repert.* xxxix. 92 (1935): M. eriocalycinum var. persicum.
taimyrense *A. Tolmatch. in Trav. Mus. Bot. Acad. Sc. URSS*, xxiv. 264 (1932).—Sibir. arct. (Penins. Taimyr.).
Taylorae (*B. L. Robinson*) *A. Tolmatch. l. c.* 267, in obs.: Lychnis Taylorae.

MELANOCENCHRIS Nees (Gramin.).
abyssinica (*R. Br. ex Fresen.*) *Hochst. in Flora*, 1855, xxxviii. 274, in obs.: Eutriana abyssinica.
monoica (*Rottl.*) *C. E. C. Fischer in Gamble, Fl. Madras*, 1831 (1934); *et in Kew Bull.* 1935, 148, in obs.: Pommereulla monoica.

MELANOCHYLA Hook. f. (Anacardiac.).
axillaris *Ridley in Kew Bull.* 1933, 198.—Borneo.

MELANOCOMMIA Ridley in Kew Bull. 1933, 198. *ANACARDIACEAE.*
borneënsis *Ridley, l. c.*—Borneo.

MELANOPHYLLA Baker (Cornac.).
Humbloti *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxxv. (*Hist. Nat. Pl.* v. Atlas iii.) t. 400 (1896).—Madag.

MELANORRHOEA Wall. (Anacardiac.).
pilosa *Ridley in Kew Bull.* 1931, 448.—Penins. Mal.
speciosa *Ridley, l. c.* 1933, 197.—Borneo.
tricolor *Ridley, l. c.* 196.—Borneo.

MELANOSELINUM Hoffm. (Umbellif.).
annuum *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1935, Sér. II. vii. 144, in obs.—Ins. C. Verde.
Bischoffii (*Schmidt*) *A. Cheval. l. c.*, in obs.: Tornabenea Bischoffii.
hirtum (*Schmidt*) *A. Cheval. l. c.*, in obs.: Tornabenea hirta.
insulare (*Parl. ex Webb*) *A. Cheval. l. c.*, in obs.: Tornabenea insularis.
Moniza (*Masf.*) *A. Cheval. l. c.*, in obs.: Thapsia Moniza.
tenuissimum *A. Cheval. l. c.* 143.—Ins. C. Verde.

MELANOXYLON Schott (Legumin.).
amazonicum *Ducke in Tropical Woods*, 1932, No. 31, 15; *et in Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro*, vi. 27 (1933).—Bras. (Amaz.).

MELANTHERA Rohr (Compos.).
cinerea *Schweinf. ex Engl.*; *Schweinf. in v. Hoehnel, Reise Rudolfsee*, 862 (1892), descr.—Afr. trop. or.
gambica *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 146 (1931).—Gambia.
parviceps *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1932, xxii. 384.—Brit. Honduras.
sokodensis *Muschl. ex Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 146 (1931).—Guinea (Togo).

MELASTOMA L. (Melastomatac.).
decemfidum *Roxb.*; *Jack in Trans. Linn. Soc.* xiv. 6 (1825).—Penins. Mal.
grandifolium *Schwartz in Mitt. Inst. Bot. Hamburg*, vii. 237 (1931).—Borneo.
Kudoi *Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1931, xxi. 113.—Formosa.
pinatubense *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3204 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
suffruticosum *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 42 (1935).—China (Hainan).

MELHANIA Forsk. (Sterculiac.).
parviflora *Chiov. Fl. Somala*, II. 31 (1932).—Somal. Ital.

MELICA L. (Gramin.).
anomala *Scribn. ex Beal, Grasses N. Amer.* ii. 311 (1896), in syn.: Epicampes anomala.
atropatana *Schischk. in Bull. Mus. Géorgie*, 1920–2, i. 1 (1922).—Transcaucas.; Persia.
callosa (*Turcz.*) *Ohwi in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 195: Avena callosa.

MELICA:—
canescens (*Regel*) *Lavrenko ex Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 10 (1934); *Lavrenko in Komarov, Fl. URSS*, ii. 344, 752 (1934): M. Cupani var. canescens.
diandra *Roxb. Hort. Beng.* 8 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 329 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 327 (1832).—Ind. or.
digitata *Roxb. l. c.* 82, nomen; *et l. c.* 328; *et l. c.* 326.—Ind. or.
guruguensis *Sennen in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 192, in obs., nomen.—Marocc.
kumana *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 1.—Japon.
latifolia *Roxb. Hort. Beng.* 8 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 330 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 328 (1832).—Ind. or. (Assam).
Linnaei *Hackel ex Papp in Engl. Jahrb.* lxv. 292 (1932), in syn.: M. ciliata var. Linnaei *Hackel.*
multinervosa *Vasey in Beal, Grasses N. Amer.* ii. 501 (1896).—U.S.A. (Texas).
nana *Beal, l. c.* 504: M. argentea *Beal.*
Parishii *Vasey ex Beal, l. c.* 500.—U.S.A. (Calif.).
refracta *Roxb. Hort. Beng.* 8 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 329 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 327 (1834).—Ins. Molucc.
scabrata *Scribn. ex Piper & Beattie, Fl. Palouse Reg.* 25 (1901).—U.S.A. (N. W. States).
Turczaninowiana *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 142: M. Gmelini *Turcz. ex Trin.*

MELICOPE J. R. & G. Forst. (Rutac.).
grandifolia *B. L. Burtt in Kew Bull.* 1935, 300.—Ins. Solomon. (Bougainville).
philippinensis (*Elmer*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 233 (1931): Tetractoma philippinensis.

MELICYTUS J. R. & G. Forst. (Violac.).
fasciger *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 91, 20 (1932).—Ins. Viti.

MELILOTUS Mill. (Legumin.).
Balbisiana *Colla, Herb. Pedem.* ii. 111 (1834).—Hab.?
incisa *Biroli ex Colla, l. c.*—Eur.

MELINIS Beauv. (Gramin.).
Gossweileri *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 113.—Angola.

MELIOSMA Blume (Sabiac.).
crassifolia *Hand.-Mazz. in Sinensia*, iii. 191 (1933).—China (Kwangsi).
dilatata *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 212 (1931).—China (Chekiang; Kiangsu).
irazuensis *Standley in Archiv. Bot., Forli*, 1933, ix. 194.—Costa Rica.
latifolia *Ridley in Kew Bull.* 1933, 193.—Borneo.
Laui *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 32 (1935).—China (Hainan).
nesites *I. M. Johnston in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 73 (1931).—Mexico (Arch. Revillagigedo).
palustris *Kuhlm. in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 85 (1935).—Bras. (Amaz.).
rufo-pilosa *M. R. Henderson in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 96 (1933).—Penins. Mal.
sarawakensis *Ridley in Kew Bull.* 1933, 193, in obs.: M. grandifolia *Lecomte.*
Sinii *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 213 (1931).—China (Kwangsi).
trichocarpa *Hand.-Mazz. in Sinensia*, v. 17 (1934).—China (Kweichau).

MELITTIS L. (Labiat.).
speciosa *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 856 (1895), in syn.: M. Melissophyllum.

MELLIODENDRON Hand.-Mazz. (Styracac.).
Wangianum *Hu in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* v. 314 (1934).—China (Szechuan).

MELOCACTUS Link & Otto (Cactac.).
Acunai *León in Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.* 1934, viii. 205.—Cuba.
Antonii (*Britton*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 342 (1935): Cactus Antonii.

MELOCACTUS:—
bahiensis (*Britton & Rose*) *Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste Braz.* iii. 111 (1923) [*Insp. Fed. Obras Secc.* Publ. 57]; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 151: Cactus bahiensis.
Guitarti *León in Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.* 1934, viii. 207.—Cuba.
horridus *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 227 (1934).—Bras. (Pernambuco).
Jansenianus *Backeb. in Kakteenfreund*, ii. 54 (1933); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 143; *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 2, [p. 2].—Peruv.
macrodiscus *Werderm. in Fedde, Repert. Sonder-Beih.* C. t. 47 (1932).—Bras. (Bahia).
matanzanus *León in Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.* 1934, viii. 206.—Cuba.
pruinosus *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 228 (1934).—Bras. (Bahia).
salvadorensis *Werderm. l. c.*—Bras. (Bahia).
Townsendianus *Backeb. Neue Kakt.* 44 (1931), in obs.; *Backeb. in Cact. & Succ. Journ. Amer.* iii. 130 (1932), in obs.—Peruv.
unguispinus *Backeb. l. c.*, in obs.; *Backeb. l. c.*, in obs.—Peruv.
Zehntneri (*Britton & Rose*) *Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste Braz.* iii. 111 (1923) [*Insp. Fed. Obras Secc.* Publ. 57]; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 151: Cactus Zehntneri.

MELOCANNA Trin. (Gramin.).
arundina *C. E. Parkinson in Indian Forester*, 1935, lxi. 326: M. humilis *Kurz*.

MELODINUS J. R. & G. Forst. (Apocynac.).
annamensis *Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1107 (1933).—Indo-China (Anam).
cochinchinensis (*Lour.*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. ii. 310 (1935): Oncinus cochinchinensis.
erianthus *Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1109 (1933).—Indo-China (Tonkin).
honbaënsis *A. Cheval. ex Pitard, l. c.* 1102.—Indo-China (Anam).
lancifolius *Ridley in Kew Bull.* 1934, 123.—Borneo.
minutiflorus *Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1105 (1933).—Indo-China (Anam).
myrtifolius *Pitard, l. c.* 1106.—Indo-China (Anam).
neo-ebudicus *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 17.—N. Hebrides.
silvaticus *Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1108 (1933).—Indo-China (Anam).
ternifolius *Pierre ex Pitard, l. c.* 1100, in syn.: Winchia ternifolia.
tonkinensis *Pitard, l. c.* 1107.—Indo-China (Tonkin).

MELODORUM Hook. f. & Thoms. (Annonac.).
Baillonii (*Guillaumin*) *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 689: Uvaria Baillonii.
Beccarii *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 85 (1931).—Borneo.
Kingii *Boerl. in Ic. Bogor.* i. 134 (1899), in obs.—Penins. Mal.
multivenium *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 85 (1931).—Borneo.

MELOLOBIUM Eckl. & Zeyh. (Legumin.).
accedens *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. ii. p. xxvii. 390 (1932).—Transvaal.

MELOTHRIA L. (Cucurbitac.).
fernandensis *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 178, 179 (1927); *Hutchinson & Dalziel in Kew Bull.* 1928, 215.—Fernando Po.
gracilipes *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 199 (1934).—Sumatra.
kelungensis (*Hayata*) *Hayata ex Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1161 (1931): Zehneria kelungensis.

MEMECYLON L. (Melastomatac.).
aberrans *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. xii. 194 (1932).—Madag.
ankarense *H. Perrier, l. c.* 221.—Madag.
anomalum *H. Perrier, l. c.* 195.—Madag.

MEMECYLON:—
arcuato-marginatum *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 766 (1921), in obs.—Cameroons.
Bachmannii *Engl. l. c.* 768, in obs.—Pondoland.
bebaiense *Gilg ex Engl. l. c.* 766, in obs.—Cameroons.
boinense *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. xii. 220 (1932).—Madag.
cauliflorum *H. Perrier, l. c.* 209.—Madag.
coeruleo-violaceum *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 765 (1921), in obs.—Cameroons.
corymbiforme *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. xii. 198 (1932).—Madag.
Danguyanum *H. Perrier, l. c.* 210.—Madag.
dasyanthum *Gilg & Lederm. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 768 (1921), in obs.—S. Nigeria; Cameroons.
Dinklagei *Gilg ex Engl. l. c.* 764, in obs.—Liberia.
eglandulosum *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. xii. 208 (1932).—Madag.
fernandianum *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 765 (1921), in obs.—Fernando Po.
Fleuryi *Jacq.-Félix in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1935, Sér. II. vii. 148.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
gabonense (*Pierre*) *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 765 (1921), in obs.: Klaineastrum gabonense.
galeatum *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. xii. 197 (1932).—Madag.
giganteum *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 126 (1931).—Zeylan.
Gossweileri *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 769 (1921), in obs.—Angola.
gracillimum *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 127 (1931).—Zeylan.
griseo-violaceum *Gilg & Lederm. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 766 (1921), in obs.—Cameroons.
hainanense *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 44 (1934).—China (Hainan).
Humberti *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. xii. 196 (1932).—Madag.
Johnstonii *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 766 (1921), in obs.—Cameroons.
lateriflorum (*G. Don*) *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 196 (1934): Pavetta lateriflora.
liberiae *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 768 (1921), in obs.—Liberia.
longipetalum *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. xii. 205 (1932).—Madag.
Louvelianum *H. Perrier, l. c.* 217.—Madag.
lutambense *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 717 (1935).—Tanganyika Terr.
macrodendron *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 740, 768 (1921), in obs.—Cameroons.
majungense *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. xii. 210 (1932).—Madag.
mananjebense *H. Perrier, l. c.* 211.—Madag.
matitanense *H. Perrier, l. c.* 206.—Madag.
merguicum (*King*) *King in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. ii. 83 (1900): M. oleifolium var. merguicum.
minimifolium *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. xii. 211 (1932).—Madag.
myrtilloides *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1078 (1934).—Tanganyika Terr.
natalense *Markgraf, l. c.*, in obs.: M. australe *Gilg & Schlechter*.
nodosum (*Engl.*) *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 768 (1921), in obs.: Eugenia nodosa.
octocostatum *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 294 (1935).—China (Hainan).
oreophilum *Gilg & Lederm. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 765 (1921), in obs.—Cameroons.
peculiare *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. xii. 196 (1932).—Madag.
peracuminatum *H. Perrier, l. c.* 214.—Madag.

MEMECYLON:—
perakense *Merrill in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 132 (1935): M. gracilipes *Ridley*.
petiolatum *Trimen ex Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 126 (1931).—Zeylan.
pseudoangulatum *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. xii. 204 (1932).—Madag.
Rauschianum *Gilg & Lederm. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 766 (1921), in obs.—Cameroons.
roseum *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. xii. 216 (1932).—Madag.
sambiranense *H. Perrier, l. c.* 200.—Madag.
Schliebenii *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 672 (1932).—Tanganyika Terr.
sessile *A. Cheval.*; *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 687, descr.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
sphaerothyrsum *Schwartz in Mitt. Inst. Bot. Hamburg*, vii. 257 (1931).—Borneo.
Stolzii *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 765 (1921), in obs.—Tanganyika Terr.
subcuneatum *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. xii. 218 (1932).—Madag.
subsessile *H. Perrier, l. c.* 214.—Madag.
tamifolium *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 764 (1921), in obs.—Congo Belg.
tenuifolium *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. xii. 202 (1932).—Madag.
Tessmannii *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 764 (1921), in obs.—Guinea Hispan.
Viguierianum *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. xii. 219 (1932).—Madag.

MEMORA Miers (Bignoniac.).
cinnabarina *A. Sampaio in Arch. Mus. Nac. Rio de Janeiro*, 1933, xxxv. 76, in obs., nomen.—Bras. (Pará).
cuminaënsis *A. Sampaio, l. c.* 149, in obs., nomen.—Bras. (Pará).
ovata (*Bureau & K. Schum.*) *Sprague & Sandwith in Kew Bull.* 1932, 93: Tanaecium ovatum.
Rondoni *A. Sampaio in Arch. Mus. Nac. Rio de Janeiro*, 1933, xxxv. 87, in obs., nomen.—Bras. (Pará).
tridenticalyx *A. Sampaio, l. c.* 55, in obs., nomen.—Bras. (Pará).

MENDONCIA Vell. (Acanthac.).
aurea *Leonard in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 147.—Peruv.
belizensis *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 142 (1932).—Brit. Honduras.
Killipii *Leonard in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 149.—Peruv.
Klugii *Leonard, l. c.* 145.—Peruv.
pedunculata *Leonard, l. c.* 150.—Peruv.
peruviana *Leonard, l. c.* 148.—Peruv.
Smithii *Leonard, l. c.* 145.—Peruv.

MENODORA Humb. & Bonpl. (Oleac.).
Muellerae *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 451.—Mexico.
pinnatisecta *Steyerm. in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1932, xix. 133.—Argent.

MENTHA L. (Labiat.).
aequifrons *Trautm. & Urum. in Bot. Közl.* 1934, xxxi. 255 (1935), in syn.: M. longifolia subsp. aequifrons *Trautm. & Urum.*
amplexicaulis *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1934, xxxiii. 112 (1935), descr.—Hispan.
balcanica *Trautm. & Urum. in Bot. Közl.* 1934, xxxi. 254 (1935), in syn.: M. longifolia subsp. balcanica *Trautm. & Urum.*
balearica *Sennen & Pau in Bol. Soc. Ibér.* 1934, xxxiii. 64 (1935).—Ins. Balear. (Mallorca).
barcinonensis *Sennen, l. c.* 62.—Hispan.
× Barnolae *Sennen, l. c.* 64.—Hispan.
Bianoris *Sennen, l. c.* 65.—Ins. Balear. (Mallorca).
Bofilli *Sennen, l. c.* 61.—Hispan.
bojanaënsis *Trautm. & Urum. in Bot. Közl.* 1934, xxxi. 257 (1935), in syn.: M. longifolia var. bojanaënsis *Trautm. & Urum.*
brachyclada *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1934, xxxiii. 115 (1935), descr.—Hispan.

MENTHA:—
brevidentata *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1934, xxxiii. 114 (1935), descr.—Hispan.
Briqueti *Sennen*; *Sennen, l. c.*, descr.—Hispan.
caput-Medusae *Trautm. & Urum. in Bot. Közl.* 1934, xxxi. 257 (1935), in syn.: M. aquatica subsp. caput-Medusae *Trautm. & Urum.*
×caroliana *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1934, xxxiii. 111 (1935), in obs.—Hispan.
castellana *Sennen & Elias, l. c.* 69.—Hispan.
Chrysostomi *Sennen, l. c.* 1935, xxxiv. 25.—Hispan.
cuneifolia (*Lej. & Court.*) *Domin in Preslia*, xiii–xv. 200 (1935): M. arvensis var. cuneifolia.
demissa *Trautm. & Urum. in Bot. Közl.* 1934, xxxi. 257 (1935), in syn.: M. longifolia var. demissa *Trautm. & Urum.*
despecta *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1934, xxxiii. 74 (1935), descr.—Hispan.
Dionisiana *Sennen*; *Sennen, l. c.* 109, descr.—Hispan.
diversifolia *Sennen, l. c.* 61.—Hispan.
Domingoi *Sennen*; *Sennen, l. c.* 1935, xxxiv. 24, descr.—Hispan.
×Eliae *Sennen, l. c.* 1934, xxxiii. 72 (1935).—Hispan.
falcato-dentata *Trautm. & Urum. in Bot. Közl.* 1934, xxxi. 257 (1935), in syn.: M. longifolia var. falcato-dentata *Trautm. & Urum.*
flavescens *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1934, xxxiii. 116 (1935), descr.—Hispan.
Fontqueri *Sennen*; *Sennen, l. c.* 1935, xxxiv. 32, descr.—Hispan.
fuliginosa *Trautm. & Urum. in Bot. Közl.* 1934, xxxi. 256 (1935), in syn.: M. longifolia subsp. fuliginosa *Trautm. & Urum.*
gallica (*Topitz*) *Domin in Preslia*, xiii–xv. 199 (1935): M. arvensis f. gallica.
Garretae *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1934, xxxiii. 68 (1935).—Hispan.
×Gayeri *Trautm. in Bot. Közl.* 1933, xxx. 31.—Hungar.
glabra *Bellardi ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 430 (1835).—Hab.?
×Gundisalvi *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1935, xxxiv. 28.—Hispan.
Hieronymi *Sennen, l. c.* 1934, xxxiii. 60 (1935), in obs.—Hispan.
×hircina *Fraser in Journ. Bot.* 1932, lxx. 40.—Ins. Azor. (Fayal).
incisifolia *Trautm. & Urum. in Bot. Közl.* 1934, xxxi. 254 (1935), in syn.: M. longifolia subsp. incisifolia *Trautm. & Urum.*
Joffrei *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1935, xxxiv. 30, descr.—Hispan.
Josephi *Sennen, l. c.* 26.—Hispan.
jucunda *Sennen, l. c.* 1934, xxxiii. 66 (1935).—Hispan.
×Kuemmerlei *Trautm. in Bot. Közl.* 1933, xxx. 31.—Hungar.
Leonis *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1935, xxxiv. 27.—Hispan.
libidinosa *Trautm. & Urum. in Bot. Közl.* 1934, xxxi. 253 (1935), in syn.: M. longifolia subsp. libidinosa *Trautm. & Urum.*
litigiosa *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1934, xxxiii. 73 (1935), descr.—Hispan.
Lloverana *Sennen, l. c.* 63.—Hispan.
×Lykana *Trautm. in Bot. Közl.* 1933, xxx. 31.—Hungar.
macedonica *Trautm. & Urum. l. c.* 1934, xxxi. 256 (1935), in syn.: M. longifolia var. macedonica *Trautm. & Urum.*
maurorum *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 88 [1933], nomen.—Marocc.
mentita *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1934, xxxiii. 107 (1935), descr.—Hispan.
Merdinah *Backer ex Ochse & Bakh. Veg. Dutch E. Ind.* 354 (1931).—Java.
microdonta *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1934, xxxiii. 110 (1935), descr.—Hispan.
microstachya *Sennen*; *Sennen, l. c.* 112, descr.—Hispan.
mixta *Sennen*; *Sennen, l. c.* 107, descr.—Hispan.
modesta *Trautm. & Urum. in Bot. Közl.* 1934, xxxi. 253 (1935), in syn.: M. longifolia subsp. modesta *Trautm. & Urum.*
murcica *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1934, xxxiii. 60 (1935), in syn.: M. Hieronymi.

MENTHA:—
mutabilis (*Topitz*) *Domin in Preslia*, xiii–xv. 199 (1935): M. arvensis f. mutabilis.
nativitatis-Mariae *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1934, xxxiii. 104 (1935), descr.—Hispan.
nepalensis *Spin ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 430 (1835).—Hab.?
obtuso-dentata (*Topitz*) *Domin in Preslia*, xiii–xv. 199 (1935): M. arvensis f. obtuso-dentata.
omissa *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1934, xxxiii. 103 (1935), descr.—Hispan.
ovatifrons *Trautm. & Urum. in Bot. Közl.* 1934, xxxi. 255 (1935), in syn.: M. longifolia subsp. ovatifrons *Trautm. & Urum.*
pachystachya *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1934, xxxiii. 117 (1935), descr.—Hispan.
pagana (*Topitz*) *Domin in Preslia*, xiii–xv. 201 (1935): M. longifolia var. pagana.
parviflora *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1934, xxxiii. 67 (1935), descr.—Hispan.
×Pedroi *Sennen, l. c.* 1935, xxxiv. 24.—Hispan.
pedunculata *Hu & Tsai in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* 1931, ii. 259.—China (Szechuan).
petitrix *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1934, xxxiii. 110 (1935), descr.—Hispan.
petrophila *Déségl. & Durand ex Durand & Pittier in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxi. 199 (1882), nomen.—Helvet.
platyphylla *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1934, xxxiii. 60 (1935).—Hispan.
×Poiretiana *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 88 [1933].—Marocc.
polyclada *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1934, xxxiii. 113 (1935), descr.—Hispan.
Portavellae *Sennen, l. c.* 67.—Hispan.
praeclara (*Topitz*) *Domin in Preslia*, xiii–xv. 199 (1935): M. arvensis var. praeclara.
procera *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1934, xxxiii. 105 (1935), descr.—Hispan.
psiloclada *Sennen*; *Sennen, l. c.* 115, descr.—Hispan.
reflexifolia *Déségl. Notes & Obs. Pl. France & Suisse* (1878); cf. *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxi. 197 (1882).—Hab.?
rigens *Déségl. & Durand ex Durand & Pittier in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxi. 197 (1882); *et l. c.* xxv. 320 (1886): M. reflexifolia *Déségl.*
roseiflora *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1934, xxxiii. 62 (1935).—Hispan.
sino-Malinvaudi *Léveillé, Cat. Pl. Yunnan*, [4] (1917): M. Malinvaldi *Léveillé & Vaniot.*
sofiana *Trautm. in Bot. Közl.* 1932, xxix. 111, 118.—Bulgar.
stenoclada *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1934, xxxiii. 74 (1935), descr.—Hispan.
submissa *Trautm. & Urum. in Bot. Közl.* 1934, xxxi. 255 (1935), in syn.: M. longifolia subsp. submissa *Trautm. & Urum.*
teriana *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1935, xxxiv. 25, hybr.?—Hispan.
Theresitae *Sennen*; *Sennen, l. c.* 29, descr.—Hispan.
valdetomentosa *Sennen*; *Sennen, l. c.* 1934, xxxiii. 116 (1935), descr.—Hispan.
Verdagueri *Sennen, l. c.* 68.—Hispan.
virescens *Sennen*; *Sennen, l. c.* 73, descr.—Hispan.
×Wagneriana *Trautm. in Bot. Közl.* 1933, xxx. 31.—Hungar.

MENTZELIA L. (Loasac.).
acerosa *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 17, 30 (1930).—U.S.A. (Idaho).
albescens (*Gill. & Arn.*) *Herter, Fl. Urug. Pl. Vasc.* (*Estud. Bot. Reg. Urug.* iv.) 89 (1931): Bartonia albescens.
argillosa *J. Darlington in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1934, xxi. 153.—U.S.A. (Utah).
barrancae *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 60 (1933–5).—Mexico.
humilis (*Rydb.*) *J. Darlington in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1934, xxi. 155: Touterea humilis.
laciniata (*Rydb.*) *J. Darlington, l. c.* 173: Touterea laciniata.
longiloba *J. Darlington, l. c.* 176.—U.S.A. (Calif.; Utah).
oreophila *J. Darlington, l. c.* 175.—U.S.A. (Calif.).
puberula *J. Darlington, l. c.* 177.—U.S.A. (Calif.; Arizona).
strictissima (*Wooton & Standley*) *J. Darlington, l. c.* 163: Nuttallia strictissima.

MEPHITIDIA Reinw. (Rubiac.).
nigrocarpa *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1932, xxii. 461, nomen.—Formosa (Ins. Samasana).
Odajimae *Masamune, l. c.* 1934, xxiv. 211.—Formosa.

MERCURIALIS L. (Euphorbiac.).
glabra *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 68 (1933–5).—Mexico.

MERENDERA Ramond (Liliac.).
candidissima *Misczenko ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 190 (1928).—Caucas.
longifolia *Hutchinson in Kew Bull.* 1931, 414.—Somaliland.
provincialis *Gandoger ex Stefanoff, Monogr. Colchicum* (*Sbornik B'lghar. Akad. Nauk.* xxii.) 59 (1926), in syn.: Colchicum filifolium.

MERIANIA Sw. (Melastomatac.).
axinioides *Gleason in Am. Journ. Bot.* 1932, xix. 741.—Boliv.
duidae *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 419.—Venez.
intonsa *Gleason, l. c.* 223.—Peruv.
tolimana *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 26, p. 25 (1933).—Colomb.

MERIANTHERA Kuhlm. in Arquiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro, i. 231 (1935). *MELASTOMATACEAE.*
pulchra *Kuhlm. l. c.*—Bras. (Espirito Santo).

MERIOLIX Rafin. (Onagrac.).
oblanceolata *Rydb. in Brittonia*, i. 93 (1931).—U.S.A. (Kansas).

MERREMIA Dennst. (Convolvulac.).
geophiloides *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1933, Sér. II. v. 236.—Guinea Gall.
Gorinii *Chiov. Fl. Somala*, II. 324 (1932).—Somal. Ital.
grandiflora *v. Ooststr. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 203.—Peruv.
hastifolia *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1933, Sér. II. v. 236.—Dahomey; Afr. Gall. Centr.
petaloidea (*Choisy*) *Burkill in Kew Bull.* 1935, 318; *Burkill, Dict. Econ. Prod. Mal. Penins.* ii. 1456 (1935): Ipomoea petaloidea.
Weberbaueri *v. Ooststr. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 200.—Peruv.

MERRILLIODENDRON Kanehira in Bot. Mag., Tokyo, 1934, xlviii. 920. *ICACINACEAE.*
rotense *Kanehira, l. c.*—Ins. Marian. (Rota).

MERTENSIA Roth (Boraginac.).
Cooperae *Peck in Torreya*, 1932, xxxii. 151.—U.S.A. (Oregon).
ochroleuca *Ikonn.-Galitz. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 769 (1932).—Mongol.
ovalifolia (*DC.*) *A. Brand in Engl. Pflanzenreich, Borrag.-Borraginoid.-Cryptanth.* 199 (1931): Eritrichium ovalifolium.
pterocarpa (*Turcz.*) *Tatewaki & Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 25: Steenhammera pterocarpa.
secundiflora (*DC.*) *A. Brand in Engl. Pflanzenreich, Borrag.-Borraginoid.-Cryptanth.* 200 (1931): Eritrichium secundiflorum.
yezoënsis *Tatewaki & Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 106, in syn.: M. pterocarpa var. yezoënsis.

MERYTA J. R. & G. Forst. (Araliac.).
capitata *Christoph. in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 128, 161 (1935).—Samoa.
lucida *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 34 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).

MESADENIA Rafin. (Compos.).
Muhlenbergii (*Sch. Bip.*) *Rydb. Fl. Prairies & Plains Centr. N. Amer.* 873 (1932): Senecio Muhlenbergii.

MESECHITES Muell.-Arg. (Apocynac.).
bicorniculata (*Rusby*) *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1932, xix. 387: Echites bicorniculata.
citrifolia (*H. B. & K.*) *R. E. Woodson, l. c.*: Echites citrifolia.

MESECHITES:—
Mansoana (*A. DC.*) *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1933, xx. 636: Echites Mansoana.
minima (*Britton & P. Wilson*) *R. E. Woodson, l. c.* 1932, xix. 386: Echites minima.
sanctae-crucis (*S. Moore*) *R. E. Woodson, l. c.* 387: Echites sanctae-crucis.

MESEMBRYANTHEMUM L. (Ficoidac.).
albescens (*N. E. Brown*) *Hort. ex Hand-List Tender Dicot. & Gnetac. Roy. Bot. Gard. Kew*, ed. 2, 126 (1931): Conophytum albescens.
album *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 365 (1932). —Afr. austr. (Cape Prov.).
arenosum *L. Bolus, l. c.* 367.—Afr. austr. (Cape Prov.).
arrectum (*N. E. Brown*) *Hort. ex Hand-List Tender Dicot. & Gnetac. Roy. Bot. Gard. Kew*, ed. 2, 126 (1931): Glottiphyllum arrectum.
austricola *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 453 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Brunnthalerianum *A. Berger ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 152 (1915), in obs.—Natal.
cauliferum (*N. E. Brown*) *Hort. ex Hand-List Tender Dicot. & Gnetac. Roy. Bot. Gard. Kew*, ed. 2, 127 (1931): Conophytum cauliferum.
cedarbergense *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 487 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
ceriseum *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 327 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
citrinum *L. Bolus, l. c.* 326.—Afr. austr. (Cape Prov.).
copiosum *L. Bolus, l. c.* 324.—Hab.?
dulce *L. Bolus, l. c.* 328.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Ernestii *L. Bolus, l. c.* 327.—Afr. austr. (Cape Prov.).
excedens *L. Bolus, l. c.* 324.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Fergusoniae *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 427 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Galpiniae *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 328 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
globosum *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 234 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
gracilipes *L. Bolus*; *L. Bolus, l. c.* 236, descr. emend. —Afr. austr. (Cape Prov.).
Herrei *L. Bolus, l. c.* 276.—Little Namaq.
Hollandii *L. Bolus, l. c.* 274.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Hortenseae (*N. E. Brown*) *Hort. ex Hand-List Tender Dicot. & Gnetac. Roy. Bot. Gard. Kew*, ed. 2, 128 (1931): Muiria Hortenseae.
Hurlingii *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 427 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
laxum *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 406 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Leightoniae *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 488 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Leipoldtii (*N. E. Brown*) *Hort. ex Hand-List Tender Dicot. & Gnetac. Roy. Bot. Gard. Kew*, ed. 2, 128 (1931): Conophytum Leipoldtii.
leptosepalum *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 489 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Mariae *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 329 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
marinum *A. Berger ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 153 (1915), in obs.—Afr. austr.-occ.
Martleyi *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 366 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Middlemostii *L. Bolus, l. c.* 329.—Afr. austr. (Cape Prov.).
nardouwense *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 407 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Neilii (*N. E. Brown*) *Hort. ex Hand-List Tender Dicot. & Gnetac. Roy. Bot. Gard. Kew*, ed. 2, 129 (1931): Glottiphyllum Neilii.
palustre *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 325 (1932). —Afr. austr. (Cape Prov.).
parkhuisense *L. Bolus, l. c.* 364.—Afr. austr. (Cape Prov.).
pellucidum (*Schwantes*) *Hort. ex Hand-List Tender Dicot. & Gnetac. Roy. Bot. Gard. Kew*, ed. 2, 129 (1931): Conophytum pellucidum.
persistens *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 235 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).

MESEMBRYANTHEMUM:—
piquetbergense *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 325 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
plenum *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 407 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
praecipitatum *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 330 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
prominulum *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 408 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
pulchrum (*N. E. Brown*) *Hort. ex Hand-List Tender Dicot. & Gnetac. Roy. Bot. Gard. Kew*, ed. 2, 129 (1931): Frithia pulchra.
recurvum *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 367 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
× Rothii *Hort. ex Jacobsen, Sukkulent.* 171 (1933), in syn.: Pleiospilos Rothii.
rubrum *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 275 (1931). —Little Namaq.
Salteri *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 428 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Sauerae *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 409 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
× Schickii *Hort. ex Poindexter in Cact. & Succ. Journ. Amer.* vi. 51 (1934).—Hort.
Shandii *N. E. Brown in Gard. Chron.* 1921, Ser. III. lxx. 151, fig. 61 C.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Sibbettii *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 251 (1931).—Hab.?
spinescens *Pax ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 154 (1915), in obs.—Namaqualand.
squalidum *N. E. Brown in Kew Bull.* 1931, 197.— Afr. austr. (Cape Prov.).
Steingroeveri *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 154 (1915), in obs.—Afr. austr.-occ.
superans *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 348 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
thermarum *L. Bolus, l. c.* 365.—Afr. austr. (Cape Prov.).
tulbaghense *L. Bolus, l. c.* 364.—Afr. austr. (Cape Prov.).
vernicolor *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 304 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Villiersii *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 489 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).

MESOPTERA Rafin. Herb. Rafinesq. 73 (1833). *ORCHIDACEAE.*
lilifolia (*A. Rich. ex Lindl.*) *Rafin. l. c.*: Liparis lilifolia.
Loeseli (*A. Rich.*) *Rafin. l. c.*: Liparis Loeseli.

MESOSETUM Steud. (Gramin.).
angustifolium (*Swallen*) *Swallen in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1933, xxiii. 460, in obs.: Peniculus angustifolius.

MESPILUS L. (Rosac.).
odorata (*Bosc ex DC.*) *Colla, Herb. Pedem.* ii. 353 (1834), in obs., cum descr.: Crataegus odorata.

MESSERSMIDIA L. (Boraginac.).
argentea (*L.*) *I. M. Johnston in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 164: Tournefortia argentea.
gnaphalodes (*L.*) *I. M. Johnston, l. c.* 165: Heliotropium gnaphalodes.

METASTELMA R. Br. (Asclepiadac.).
mirifolium *Gleason & Moldenke in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 460.—Venez.
Schlechteri *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 34 (1931): M. ditassoides *Schlechter* (1916).
strictum *Gleason & Moldenke in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 457.—Venez.

METATROPHIS Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu, No. 130, 34 (1935). *MORACEAE.*
Margaretae *Forest Brown, l. c.* 35.—Polynes. (Ins. Rapa).

METEROSTACHYS Nakai in Bot. Mag., Tokyo, 1935, xlix. 74, in adnot., 210. *CRASSULACEAE.*
sikokianus (*Makino*) *Nakai, l. c.*: Cotyledon sikokiana.

METHYSTICUM Rafin. (Piperac.).
excelsum (*Forst. f.*) *Lyons, Plant Names Scientific & Popular*, 247 (1900): Piper excelsum.

METHYSTICUM:—
Methysticum (*Forst. f.*) *Lyons, Plant Names Scientific & Popular*, 247 (1900): Piper Methysticum.

METROSIDEROS Banks (Myrtac.).
dolichander *Schlechter ex Guillaumin*; *Schlechter ex Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 10, descr.—N. Caled.
oreomyrtus *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1933, lxxviii. Beibl. 19, 308.—N. Caled.

METROXYLON Rottb. (Palmae).
amicarum (*H. Wendl.*) *Hook. f. in Kew Rep.* 1882, 68 (1884): Sagus amicarum.
carolinense (*Dingl.*) *Becc. in Denkschr. Akad. Wiss. Wien, Math.-Nat.* 1913, lxxxix. 502, fig. 5 c. (1914): Coelococcus carolinensis.
salomonense (*Warb.*) *Becc. l. c.* 502: Coelococcus salomonensis.
vitiense (*H. Wendl.*) *Hook. f. in Kew Rep.* 1882, 68 (1884): Sagus vitiensis.

MEYENIA Backeb. in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit. 1931, xlvi. 187. *CACTACEAE.*
Weberbaueri *Backeb. l. c.*—Peruv.

MEYNA Roxb. (Rubiac.).
hainanensis *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 57 (1935).—China (Hainan).

MEZOBROMELIA L. B. Smith in Proc. Am. Acad. lxx. 151 (1935). *BROMELIACEAE.*
bicolor *L. B. Smith, l. c.*—Colomb.

MEZONEURUM Desf. (Legumin.).
robustum *C. T. White in Contrib. Arn. Arb.* No. IV. 43 (1933).—Austral. (Queensland).

MICHELIA L. (Magnoliac.).
Champava *Lour. ex Gomes in Mem. Acad. Sc. Lisb. Cl. Sc. Pol. Mor. Bel.-Let.* n. s. iv. 27 (1868), sphalm.; *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 15, 159 (1935): M. Champaca.
formosana (*Kanehira*) *Masamune & Suzuki in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard.* 1933, iii. 57: M. compressa var. formosana.
mollis (*Dandy*) *McLaughl. in Tropical Woods*, 1933, No. 34, p. 36: Elmerrillia mollis.

MICONIA Ruiz & Pav. (Melastomatac.).
aguitensis *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 426.—Venez.
Alfredi *Kraenzl. in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 155.—Costa Rica.
amambayensis *Kraenzl. l. c.* 156.—Parag.
aprica *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 244.—Peruv.
aristata *Gleason, l. c.* 427.—Venez.
atropilis *Cogn. & Gleason in Brittonia*, i. 114 (1932).—Colomb.?
axinaeoides *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1932, lix. 368.—Boliv.
azuensis *Urb. & Ekman*; *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 24 (1931), descr. ampl. —Santo Domingo.
bifaria *Urb. & Ekman, l. c.* 25.—Santo Domingo.
biglandulosa *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1932, lix. 367.—Peruv.
Cabucu *Hoehne in Ostenia*, 299 (1933).—Bras. (S. Paulo).
caesia *Cogn. & Gleason in Brittonia*, i. 116 (1932). —Colomb.
campanensis *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 18 (1931).—Santo Domingo.
catalpifolia *Kraenzl. in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 153.—Ind. occ. (Dominica).
clavistila *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 229.—Peruv.
compacta *Gleason, l. c.* 230.—Peruv.
Cookii *Gleason in Phytologia*, i. 43 (1933).—Peruv.
cretacea *Gleason in Am. Journ. Bot.* 1932, xix. 744. —Boliv.
Cuatrecasae *Markgraf in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 26, p. 27 (1933).—Colomb.
curvipetiolata *Cogn. & Gleason in Brittonia*, i. 113 (1932).—Colomb.
diaphanea *Gleason in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1935, xxxii. 213.—Guiana Bat..
Dielsiana *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 22 (1931).—Santo Domingo.

MICONIA:—
Dielsii *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 180 (1934).—Ecuador.
disparilis (*Standley*) *R. O. Williams in Fl. Trinidad & Tobago*, i. 388 (1934): Ossaea disparilis.
fissa *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1932, lix. 363.—Bras. (Amaz.).
flaccida *Gleason, l. c.* 1931, lviii. 226.—Peruv.
frontinoana *Cogn. & Gleason in Brittonia*, i. 117 (1932).—Colomb.
gibba *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 179 (1934).—Ecuador.
Herrerae *Gleason in Am. Journ. Bot.* 1932, xix. 745.—Peruv.
icosandra *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 239.—Peruv.
inanis *Cogn. & Gleason in Brittonia*, i. 118 (1932).—Ecuador.
Klugii *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 240.—Peruv.
lasiostyla *Gleason, l. c.* 243.—Peruv.
leandroides *Cogn. & Gleason in Brittonia*, i. 121 (1932).—Ecuador.
longiracemosa *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 232.—Peruv.
Macbridei *Gleason, l. c.* 246.—Peruv.
manicata *Cogn. & Gleason in Brittonia*, i. 122 (1932).—Colomb.
Mansfeldiana *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 21 (1931).—Santo Domingo.
Martiniana *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 233.—Peruv.
megalantha *Gleason in Phytologia*, i. 33 (1933).—Colomb.
megaphylla *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1932, lix. 363.—Boliv.
membranicalyx *Gleason, l. c.* 1931, lviii. 234.—Bras. (Pará).
mesmeana *Gleason in Phytologia*, i. 44 (1933).—Colomb.
monciona *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 17 (1931).—Santo Domingo.
mutisella *Gleason in Phytologia*, i. 47 (1933).—Colomb.?
Mutisiana *Markgraf in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 26, p. 26 (1933).—Colomb.
nigripes *Cogn. & Gleason in Brittonia*, i. 119 (1932).—Colomb.
nobilis *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 235.—Peruv.
obliqua *Gleason in Am. Journ. Bot.* 1932, xix. 743.—Boliv.
ochroleuca *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 138 (1932).—Brit. Honduras.
ocoana *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 20 (1931).—Santo Domingo.
pachydonta *Gleason in Phytologia*, i. 41 (1933).—Peruv.
plena *Gleason, l. c.* 31.—Colomb.
pseudo-radula *Cogn. & Gleason in Brittonia*, i. 120 (1932).—Colomb.
pterogona *Gleason in Am. Journ. Bot.* 1932, xix. 746.—Peruv.
pubicalyx *Gleason, l. c.* 742.—Boliv.
rudis *Cogn. & Gleason in Brittonia*, i. 123 (1932).—Colomb.
ruficalyx *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 235, in obs.; *et in Brittonia*, i. 181 (1932).—Guiana Brit.
sancti-ramoni *Kraenzl. in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 157.—Costa Rica.
savannarum *R. O. Williams in Fl. Trinidad & Tobago*, i. 374 (1934).—Trinidad.
semota *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 177 (1934).—Peruv.; Ecuador.
Shattuckii *Standley in Contrib. Arn. Arb.* No. v. 119 (1933).—Panamá (Ins. Barro Colorado).
silicicola *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 428.—Venez.; Guiana Brit.
sphagnicola *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 19 (1931).—Santo Domingo.
spinulidentata *Cogn. & Gleason in Brittonia*, i. 125 (1932).—Colomb.
subtriloba *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 429.—Venez.

MICONIA:—
summa *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 26, p. 25 (1933).—Colomb.
surinamensis *Gleason in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1935, xxxii. 212.—Guiana Bat.
tenensis *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 178 (1934).—Ecuador.
tetrasperma *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 237.—Peruv.
triangularis *Gleason, l. c.* 1932, lix. 369.—Colomb.
tubulosa *Gleason in Phytologia*, i. 32 (1933).—Colomb.
valenciana *Kraenzl. in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 154.—Trinidad.
viejana *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 20 (1931).—Santo Domingo.

MICRANDRA Benth. (Euphorbiac.).
brownsbergensis *Lanj. Euphorbiac. Surinam*, 34 (1931).—Guiana Bat.

MICRANTHUS Wendl. (Acanthac.).
dorsiflorus (*Retz.*) *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1932, 63: Ruellia dorsiflora.

MICRARGERIA Benth. (Scrophulariac.).
filiformis (*Schum. & Thonn.*) *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 223 (1931): Gerardia filiformis.

MICRECHITES Miq. (Apocynac.).
ferruginea *Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1260 (1933).—Indo-China (Laos).
sinensis *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 215 (1931).—China (Kwangsi).

MICROCHLOA R. Br. (Gramin.).
indica (*L. f.*) *Beauv. Agrostogr.* Explic. Pl. p. 13, Pl. xx. fig. 8 (1812): Nardus indica.
patentiflora *Stent & Rattray in Proc. Rhodes. Scientif. Assoc.* xxxii. (*Stent & Rattray, Grasses S. Rhodes.*) 59 (1933).—S. Rhodesia.

MICROCNEMUM Ung.-Sternb. (Chenopodiac.).
coralloides (*Loscos & Pardo*) *Font Quer in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1925, xxv. 98: Arthrocnemum coralloides.

MICROCOS L. (Tiliac.).
bifida *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 603 (1935).—N. Guin.
Creaghii *Ridley in Kew Bull.* 1933, 490.—Borneo.
ovato-lanceolata *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 163 (1934).—Borneo.
paucicostata *Burret, l. c.* xii. 602 (1935).—Borneo.
phaneroneura *Burret, l. c.* xii. 163 (1934).—Borneo.
psilonema *Burret, l. c.* 164.—N. Guin.
reticulata *Ridley in Kew Bull.* 1933, 490.—Borneo.
stylocarpoides *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 162 (1934).—Borneo.

MICROCULCAS Peter in Nachr. Ges. Wiss. Gött. Math.-phys. Kl. pp. 185–225 (1929); cf. K. Krause in Engl. Jahrb. lxiv. Literaturber. p. 9 (1931). *ARACEAE.*

MICROJAMBOSA Blume (Myrtac.).
bankensis *Hassk. Hort. Bogor. Descr.*, sive *Retziae*, ed. nov. 276 (1858).—Ins. Sunda (Banca).

MICROKENTIA H. Wendl. (Palmae).
heterophylla *Becc. ex Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1932, lxxvii. Beibl. 19, 87, nomen.—N. Caled.

MICROLECANE Sch. Bip. (Compos.).
occidentalis *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 143 (1931).—Guinea Gall.

MICROLICIA D. Don (Melastomatac.).
sphagnicola *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 215.—Peruv.

MICROLOMA R. Br. (Asclepiadac.).
Archeri *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 305 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).

MICROLONCHUS Cass. (Compos.).
amberboides *Caballero in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 11, 35 (1917).—Marocc.

MICROMERIA Benth. (Labiat.).
alpestris *Urb.*; *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 36 (1931), descr. ampl.—Santo Domingo.
formosana *Marquand in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3230 (1934).—Formosa.

MICROMERIA:—
× glandulosa *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1933, xxxii. 62 (1934), in obs.—Ins. Balear. (Mallorca).
× Knochei *Sennen & Bianor. l. c.* 63.—Ins. Balear. (Mallorca).
parvula *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 103 (1935).—Kenya Col.
yezoënsis *Miyabe & Tatewaki in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.* xiv. 8 (1935).—Japon. (Yezo).

MICROMONOLEPIS Ulbr. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, xvi c. 499 (1934). *CHENOPODIACEAE.*
pusilla (*Torr.*) *Ulbr. l. c.* 500: Monolepis pusilla.

MICROMYRTUS Benth. (Myrtac.).
flaviflora (*F. Muell.*) *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 96 (1931): Thryptomene flaviflora.
hymenonema (*F. Muell.*) *C. A. Gardner, l. c.*: Thryptomene hymenonema.
trachycalyx (*F. Muell.*) *C. A. Gardner, l. c.*: Thryptomene trachycalyx.

MICROPIPER Miq. (Piperac.).
humile (*Vahl*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 400 (1933): Peperomia humilis.
leptostachyon (*Nutt.*) *Small, l. c.*: Piper leptostachyon.

MICROPSIS DC. (Compos.).
involucrata (*Lam.*) *Cabrera in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 429: Gnaphalium involucratum.

MICRORHYNCHUS Less. (Compos.).
vimineus *Battand. Contrib. Fl. Atlant.* 57 (1919)—Marocc.

MICROSACCUS Blume (Orchidac.).
borneënsis *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz* Sér. III. xi. 156 (1931).—Borneo.
truncatus *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 52 (1932).—Penins. Mal.
Wenzelii *Ames*; *Ames & Quisumb. in Philipp. Journ. Sc.* 1932, xlix. 499, descr. emend.—Ins. Philipp. (Luzon).

MICROSEMMA Labill. (Flacourtiac.; Ternstroemiac., Gen. Pl.).
Calleana *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 285.—N. Caled.
Le-Ratii *Guillaumin, l. c.* 284.—N. Caled.
ovata *Guillaumin, l. c.* 285.—N. Caled.
setosa *C. T. White in Contrib. Arn. Arb.* No. iv. 69 (1933).—Austral. (Queensland).
sphaerocarpa *Baill. ex Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 285.—N. Caled.

MICROSERIS D. Don (Compos.).
Teakleana *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 139 (1931), nomen.—W. Austral.

MICROSPERMIA Frič (Cactac.).
nivosa *Frič ex Backeb. in Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 12, [p. 3], in syn.: Parodia nivosa.
sanguiniflora *Frič ex Backeb. l. c.* [p. 4], in syn.: Parodia sanguiniflora.

MICROSTACHYS A. Juss. (Euphorbiac.).
lanceolata *Splitg. ex Lanj. Euphorbiac. Surinam*, 170 (1931); *et in Pulle, Fl. Surinam*, ii. (*Meded. K. Ver. Kol. Inst. Amst.* xxx.) 84 (1932), pro syn.: Sebastiania corniculata var. micrantha *Muell.-Arg.*

MICROSTEGIUM Nees (Gramin.).
biaristatum (*Steud.*) *Keng in Sinensia*, iii. 92 (1932), in obs.: Andropogon biaristatus.
biforme *Keng, l. c.* 91.—China (Kwangsi).
glabratum (*Brongn.*) *Hosokawa in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1934, vi. 663: Eulalia glabrata.
Hendersonii (*C. E. Hubbard*) *C. E. Hubbard in Hutchinson, Fam. Fl. Pl.* ii. Monocot., 227 (1934): Pollinia Hendersonii.
spectabile (*Trin.*) *Hosokawa in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1935, vii. 310: Pollinia spectabilis.

MICROSTYLIS Nutt. (Orchidac.).
Clemensii *J. J. Smith in Brittonia*, i. 108 (1931).—Borneo.
densiflora (*A. Rich.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 272 (1931): Liparis densiflora.

MICROSTYLIS:—
Finetii *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 167.—Indo-China (Anam).
graciliscapa (*Ames & C. Schweinf.*) *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 119 (1931): Malaxis graciliscapa.
humicola *A. Sampaio, List. Orch. Herv. Mus. Nac. Rio de Janeiro*, 24 (1923), nomen.—Bras. (Rio de Janeiro).
iriomotensis *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 208.—Ins. Liukiu (Iriomote).
kabensis *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 111 (1932).—Sumatra.
kizanensis *Masamune in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard.* 1933, iii. 75.—Formosa (Kizan).
Margaretae *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 84, 171 (1931).—Ins. Austral.
protracta *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 20 (1935).—N. Guin.
ranauensis *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 112 (1932).—Sumatra.
reniloba *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 4 (1932).—Penins. Mal.
roohutuensis *Fukuyama in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1932, xxii. 415.—Formosa.
Schliebenii *Mansf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 808 (1933).—Tanganyika Terr.
sublobata *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 118 (1931).—Borneo.
subtiliscapa *J. J. Smith, l. c.* xii. 149 (1932): M. graciliscapa *J. J. Smith*, non *Schlechter*.
tripartita *J. J. Smith, l. c.* 113.—Ins. Molucc. (Amboina).
verruculosa *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 20 (1935).—N. Guin.

MICROTATORCHIS Schlechter (Orchidac.).
Doctersii *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 77 (1935).—N. Guin.
erosula *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 211 (1934).—N. Guin.
flava *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 76 (1935).—N. Guin.
Steenisii *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxix. 250 (1931).—Java.
triangulipetala *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 78 (1935).—N. Guin.

MICROTROPIS Wall. (Celastrac.).
osmanthoides (*Hand.-Mazz.*) *Hand.-Mazz. in Sinensia*, iii. 189 (1933): Chingithamnus osmanthoides.
rigida *Ridley in Kew Bull.* 1931, 36.—Borneo.
Scottii *R. N. Parker in Fedde, Repert.* xxix. 104 (1931).—Burma (Tenasserim).
sumatrana *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 164 (1934).—Sumatra.

MIERSIELLA Urb. (Burmanniac.).
aristata *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 59.—Guiana Brit.
costata (*Miers*) *Sandwith, l. c.*: Dictyostegia costata.

MIKANIA Willd. (Compos.).
acrensis *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 31 (1934).—Bras. (Amaz.).
additicia *B. L. Robinson, l. c.*—Bras. (Rio de Janeiro).
Allartii *B. L. Robinson, l. c.* n. s. xcvi. 23 (1931).—Venez.
Almagroi *Cuatrec. in An. Univ. Madrid*, iv. Fasc. 2, 233 (1935).—Ecuador.
anomala *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 70 (1933–5).—Mexico.
Archeri *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcvi. 24 (1931).—Colomb.
archidonensis *Cuatrec. in An. Univ. Madrid*, iv. Fasc. 2, 234 (1935).—Ecuador.
Bradei *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 32 (1934).—Bras. (S. Paulo).
calcarulata *B. L. Robinson, l. c.* 33.—Parag.
camporum *B. L. Robinson, l. c.*—Bras. (S. Paulo).
capricorni *B. L. Robinson, l. c.* 34.—Bras. (S. Paulo).
cardiophylla *B. L. Robinson in Candollea*, v. 171 (1934).—Bras. (Rio de Janeiro).
Casarettoi *B. L. Robinson, l. c.* 172.—Bras. (Rio de Janeiro).

MIKANIA:—
Chaseae *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 35 (1934).—Bras. (Minas Geraes).
chocensis *B. L. Robinson, l. c.* n. s., c. 17 (1932).—Colomb.
cordata (*Burm. f.*) *B. L. Robinson, l. c.* n. s. civ. 65 (1934): Eupatorium cordatum.
cyanosma *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 69 (1931).—Haiti.
cynanchifolia (*Baker*) *Hook. & Arn. ex Baker*; *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 6, 39 (1932); *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 63 (1934), cum descr.: M. scandens var. cynanchifolia.
decumbens *Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 52 (1933).—Bras. (Minas Geraes).
dissecta *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 73 (1931).—Haiti.
duidensis *B. L. Robinson in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 485.—Venez.
Dusenii *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcvi. 24 (1931).—Argent.; Bras. (Paraná).
eriostrepta *B. L. Robinson, l. c.* n. s. civ. 35 (1934).—Bras. (S. Paulo).
gracillima *Dusén ex Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 61 (1933), in syn.: M. apiifolia var. gracillima *Malme*.
Guilleminii *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcvi. 26 (1931).—Bras. (Rio de Janeiro).
hastato-cordata *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 6, 39 (1932).—Bras. (Rio Grande do Sul).
Hoehnei *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 36 (1934).—Bras. (S. Paulo).
Hoffmanniana *Dusén ex Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 54 (1933).—Bras. (Paraná).
hotteana *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 72 (1931).—Haiti.
infesta *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 37 (1934).—Peruv.
iquitosensis *B. L. Robinson, l. c.* 38.—Peruv.
Iserniana *Cuatrec. in An. Univ. Madrid*, iv. Fasc. 2, 235 (1935).—Ecuador.
Klugii *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 38 (1934).—Peruv.
Lawrancei *B. L. Robinson, l. c.* 39.—Colomb.
malacolepis *B. L. Robinson, l. c.* 40.—Bras. (Minas Geraes).
minima (*Baker*) *B. L. Robinson, l. c.* 60: M. scandens var. minima.
Mosenii *Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 53 (1933).—Bras. (Minas Geraes).
Mutisiana *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat. Madrid*, Ser. Bot., No. 27, Cuadro 8 (1934), nomen; *et l. c.* No. 29, p. 18 (1935), descr.—Colomb.
nebularum *Dusén ex Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 56 (1933), in syn.: M. smaragdina var. nebularum *Malme*.
neglecta *B. L. Robinson in Candollea*, v. 173 (1934).—Bras.
panamensis *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 41 (1934).—Panamá.
pilcomayensis (*Hassler*) *B. L. Robinson, l. c.* 64: M. scandens var. pilcomayensis.
platyloba *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 72 (1931).—Santo Domingo.
polychaeta *Urb.*; *Urb. l. c.* 68, descr. ampl.—Haiti.
producta *Urb. & Ekman, l. c.* 70.—Santo Domingo.
rhomboidea *Urb. & Ekman, l.c.* 71.—Haiti.
Riedeliana *Casaretto ex B. L. Robinson in Candollea*, v. 174 (1934).—Bras. (Rio de Janeiro).
sagittifera *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 68 (1934).—Bechuanaland Protect.
smaragdina *Dusén ex Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 55 (1933).—Bras. (Paraná).
stenomeres *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 43 (1934).—Bras. (Rio de Janeiro).
stereolepis *B. L. Robinson, l. c.* 44.—Ecuador.
sublaxa *Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 58 (1933).—Bras. (Paraná).
trachypleura *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 46 (1934).—Bras. (Minas Geraes; S. Paulo); Parag.; Argent.

MIKANIA:—
Werdermannii *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 47 (1934).—Boliv.
Widgrenii *B. L. Robinson, l. c.* n. s. xcvi. 27 (1931).—Bras. (Minas Geraes).
yapasensis *B. L. Robinson, l. c.* n. s. civ. 48 (1934).—Peruv.

MILA Britton & Rose (Cactac.).
Kubeana *Werderm. & Backeb. in Backeb. Neue Kakteen*, 83 (1931); *et in Fedde, Repert.* xxx. 63 (1932).—Peruv.
Kubei *Backeb. in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1931, xlvi. 187, in obs.—Peruv.
Nealeana *Backeb. in Cactus Journ.* ii. 31 (1933), in obs., nomen; *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 11, [p. 2], descr.—Peruv.

MILDBRAEDIA Pax (Euphorbiac.).
Balboana *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 112 (1935).—Kenya Col.

MILIUM L. (Gramin.).
filiforme *Roxb. Hort. Beng.* 8 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 316 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 314 (1832).—Ind. or.
sanguinale (*Burm. f.*) *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 317; *et l. c.* 315: Panicum sanguinale.

MILIUSA Leschen. (Annonac.).
filipes *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 223 (1935).—China (Hainan).
glochidioides *Hand.-Mazz. in Sinensia*, iii. 185 (1933).—China (Kwangsi).

MILLETTIA Wight & Arn. (Legumin.).
acuticarinata *E. G. Baker in Bol. Soc. Brot.* Sér. II. viii. 104 (1933).—Angola.
Kennedyi *Hoyle in Kew Bull.* 1934, 184.—S. Nigeria.
nepalensis *R. N. Parker in Kew Bull.* 1931, 42.—Nepal.
pilosa *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 381, in clavi, 382 (1928); *Hutchinson & Dalziel in Kew Bull.* 1928, 403.—Nigeria.

MILLINGTONIA Roxb. (Sabiac.).
pinnata *Roxb. Hort. Beng.* 3 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 103 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 104 (1832).—Ind. or. (Assam).

MILNEA Roxb. Hort. Beng. 18 (1814), nomen; Fl. Ind., ed. Carey & Wall., ii. 430 (1824); Fl. Ind., ed. Carey, i. 637 (1832). *MELIACEAE*.
edulis *Roxb. l. c.*; *et l. c.*; *et l. c.*—Ind. or. (Assam).

MIMOSA L. (Legumin.).
callithrix *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 13, 50 (1931).—Bras. (Matto Grosso).
Dutrae *Malme, l. c.* 10.—Bras. (Rio Grande do Sul).
glutinosa *Malme, l. c.* 51.—Bras. (Matto Grosso).
inaequalis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 39 (1933–5).—Mexico.
invisa *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* ii. 255 (1834).—Bras.
lagunensis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 39 (1933–5).—Calif. infer.
Lawranceana *Britton & Killip in Phytologia*, i. 23 (1933).—Colomb.
lophantha *Vent. Descr. Pl. Nouv. Jard. Cels*, indice (1800): M. distachya *Vent.*
mazatlana *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 40 (1933–5).—Mexico.
mexicana (*Hemsl. & Rose*) *M. E. Jones, l. c.* 39, in obs.: Climacorachis mexicana.
pachycarpoides *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 13, 53 (1931).—Bras. (Matto Grosso).
pinetorum *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 131 (1932).—Brit. Honduras.
plumifolia *Kleinh. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 167.—Guiana Bat.
polychaeta *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 13, 48 (1931).—Bras. (Matto Grosso).
scalpens *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 58 (1935).—Brit. Honduras.
unijuga *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 39 (1933–5), in obs.: Climacorachis fruticosa.
Wherryana (*Britton*) *Standley in Tropical Woods*, 1933, No. 34, 40: Mimosopsis Wherryana.
Wilsonii *Standley in Contrib. Arn. Arb.* No. v. 73 (1933).—Panamá (Ins. Barro Colorado).

MIMULOPSIS Schweinf. (Acanthac.).
alpina *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 94 (1935).—Kenya Col.
glandulosa *Baker in Journ. Linn. Soc., Bot.* xxv. 338 (1890).—Madag.
glandulosa (*Lindau*) *Bullock in Kew Bull.* 1931, 275: Epiclastopelma glandulosum.
longisepala *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1081 (1934).—Tanganyika Terr.

MIMULUS L. (Scrophulariac.).
Flemingii *Munz, Man. S. Calif. Bot.* 477, 601 (1935): M. parviflorus *Grant.*
Grantianus *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 153 (1931).—U.S.A. (Calif.).
Groomii *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 760 (1895), in syn.: M. rivularis.
× nobilis *Hort. ex Vilmorin, l. c.* 761, in syn.: M. hybridus.
× pardinus *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in syn.: M. hybridus.
perluteus *Voss in Vilmorin, l. c.* 759: M. luteus.
quinquevulnerus *Hort. ex Vilmorin, l. c.* 760, in syn.: M. rivularis.
Roezlii *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in syn.: M. cupreus f. Roezlii *Voss.*
× rubinus *Hort. ex Vilmorin, l. c.* 761, in syn.: M. hybridus.
speciosus *Hort. ex Vilmorin, l. c.* 760, in syn.: M. rivularis.
szechuanensis *Pai in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, ii. 119 (1934).—China (Szechuan).
tigridiodes *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 760 (1895), in syn.: M. cupreus f. tigridiodes *Voss.*
tigrinus *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in syn.: M. cupreus.
Wolfi *Eastw. in Leafl. West. Bot.* i. 44 (1933).—U.S.A. (Calif.).
Youngii *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 760 (1895), in syn.: M. rivularis.

MIMUSOPS L. (Sapotac.).
Heckelii (*A. Cheval.*) *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 14 (1931): Dumoria Heckelii.
Paolii (*Chiov.*) *Chiov. Fl. Somala*, II. 276 (1932), in ic.: M. densiflora var. Paolii.
Schliebenii *Mildbr. & G. M. Schulze in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 197 (1934).—Tanganyika Terr.

MINUARTIA L. (Caryophyllac.).
Akinfiewi (*Schmalh.*) *Woronow ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 390 (1930): Alsine Akinfiewi.
Brotherana (*Trautv.*) *Woronow ex Grossheim, l. c.* 394: Stellaria Brotherana.
campestris *L. Sp. Pl.* ed. 1, 89, fol. cancell. (1753); *Loefl. Iter Hispan.* 122 (1758).—Hispan.
capillaris (*Poir.*) *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 244: Arenaria capillaris.
circassica (*Alboff*) *Woronow ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 393 (1930): Alsine circassica.
dichotoma *L. Sp. Pl.* ed. 1, 89, fol. cancell. (1753); *Loefl. Iter Hispan.* 121 (1758).—Hispan.
gracilipes *Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 200 (1932), nomen alternativ.—Sibir. (Marit. Prov.).
granuliflora (*Fenzl*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 391 (1930): Alsine granuliflora.
hispanica *L. Sp. Pl.* ed. 1, i. 89 (1753).—Hispan.
hondoënsis *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 82, in syn.: M. arctica var. hondoënsis *Ohwi.*
inamoena (*C. A. Mey.*) *Woronow ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 394 (1930): Alsine inamoena.
Kryloviana *Schischk. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1930, No. 1, p. 1.—Sibir.
lanuginosa (*Coste*) *Braun-Blanquet in Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1930, n. s. lxxvi. 67 (1931), in obs.: Alsine lanuginosa.
longinquipratensis *P. Fourn. in Le Monde des Plantes*, 1934, xxxv. 5, in obs., in adnot.—Gallia.
macrophylla *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 33 (1935).—Bras. (Amaz.).
maroccana *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 160 [1928].—Marocc.
montana *L. Sp. Pl.* ed. 1, 90, fol. cancell. (1753); *Loefl. Iter Hispan.* 122 (1758).—Hispan.
procumbens (*Vahl*) *Zohary in Beih. Bot. Centralbl.* lii. Abt. B. 576 (1935): Arenaria procumbens.

MINUARTIA:—
rhodocalyx (*Alboff*) *Woronow ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 394 (1930): Alsine rhodocalyx.
subuniflora (*Alboff*) *Woronow ex Grossheim, l. c.* 392: Alsine subuniflora.
Wilczekii *Maire & Sennen in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1934, xxv. 295, in obs., nomen provis.—Marocc.

MIRABILIS L. (Nyctaginac.).
acuta (*Reiche*) *Heimerl in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 456 (1932): Oxybaphus ovatus var. acutus.
bracteosa (*Griseb.*) *Heimerl, l. c.* 457, in obs.: Oxybaphus bracteosus.
Carletoni (*Standley*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 305 (1931): Allionia Carletoni.
ciliata (*Standley*) *Standley, l. c.* 306: Allionia ciliata.
coahuilensis (*Standley*) *Standley, l. c.* 305: Allionia coahuilensis.
comata (*Small*) *Standley, l. c.* 306: Allionia comata.
cordifolia (*Kunze ex Choisy*) *Heimerl in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 454 (1932): Oxybaphus cordifolius.
decipiens (*Standley*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 305 (1931): Allionia decipiens.
elegans (*Choisy*) *Heimerl in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 454 (1932): Oxybaphus elegans.
exaltata (*Standley*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 305 (1931): Allionia exaltata.
expansa (*Ruiz & Pav.*) *Standley, l. c.* xi. 113 (1931): Calyxhymenia expansa.
gausapoides (*Standley*) *Standley, l. c.* viii. 305 (1931): Allionia gausapoides.
glabra (*S. Wats.*) *Standley, l. c.* 304: Oxybaphus glaber.
grandiflora (*Standley*) *Standley, l. c.* 307: Allionia grandiflora.
Grayana (*Standley*) *Standley, l. c.* 306: Allionia Grayana.
himalaica (*Edgew.*) *Heimerl in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 454 (1932): Oxybaphus himalaicus.
lanceolata (*Rydb.*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 305 (1931): Allionia lanceolata.
longipes (*Standley*) *Standley, l. c.* 306: Allionia longipes.
microchlamydea (*Standley*) *Standley, l. c.* 304: Allionia microchlamydea.
oligantha (*Standley*) *Standley, l. c.* 306: Hesperonia oligantha.
pauciflora (*Buckl.*) *Standley, l. c.* 305: Oxybaphus pauciflorus.
polyphylla (*Standley*) *Standley, l. c.* 306: Hesperonia polyphylla.
pumila (*Standley*) *Standley, l. c.* 305: Allionia pumila.
rotundifolia (*Greene*) *Standley, l. c.*: Allionia rotundifolia.
sanguinea *Heimerl in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 451 (1932).—Mexico.
suffruticosa (*Standley*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 306 (1931): Allionia suffruticosa.
Trolli *Heimerl in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 455 (1932).—Chile.
Urbani *Heimerl*; *Heimerl, l. c.* 453, descr. ampl.—Mexico.

MISCANTHIDIUM Stapf (Gramin.).
fuscescens *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 806 (1933).—Tanganyika Terr.

MISCANTHUS Anderss. (Gramin.).
neo-coreanus *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 694.—Corea.
polydactylos (*L.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1191 (1895): Andropogon polydactylos.

MISCHOCARPUS Blume (Sapindac.).
flexuosus (*Lour.*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 39, in obs., 249 (1935): Vateria flexuosa.
Guillauminii *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 672.—Ins. Carolin. (Truk).
oppositifolius (*Lour.*) *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* vii. 313 (1931): Pedicellia oppositifolia.

MISCHOGYNE Exell in Journ. Bot. 1932, lxx. Suppl. 1, 213. *ANNONACEAE.*
michelioides *Exell, l. c.*—Angola.

MITELLA L. (Saxifragac.).
Doiana *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 302.—Japon. (Kiushiu).
formosana (*Hayata*) *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 77: M. japonica var. formosana.
obconica *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 63.—Japon. (Kiushiu).

MITOPHYLLUM O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xi. 872 (1933). *CRUCIFERAE.*
pachyrhizum (*Kar. & Kir.*) *O. E. Schulz, l. c.*: Arabis pachyrhiza.

MITOSTIGMA Decne. (Asclepiadac.).
caudatum *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 4, 6 (1934).—Argent.

MITRACARPUS Zucc. (Rubiac.).
megapotamicus (*Spreng.*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 331 (1931): Spermacoce megapotamicus.
recurvatus *Standley, l. c.* viii. 384 (1931).—Bras. (Goyaz ?).
rigidifolius *Standley, l. c.*—Bras. (Bahia).

MITRAGYNA Korth. (Rubiac.).
Brunonis (*Wall. ex G. Don*) *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 11 (1932): Nauclea Brunonis.

MITRASACME Labill. (Loganiac.).
capillaris *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 420 (1820).—Nepal.
foliosa *C. A. Gardner in For. Dep. Bull., W. Austral.* No. 32, 86 (1923).—W. Austral.

MITRASACMOPSIS Jovet in Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, Sér. VI. xii. 589 (1935). *LOGANIACEAE.*
quadrivalvis *Jovet, l. c.* 590, 592.—Madag.

MITREOLA R. Br. Prodr. 450 (1810). *LOGANIACEAE.*
Perrieri *Jovet in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 292.—Madag.
turgida *Jovet, l. c.* 296.—Madag.

MITREPHORA Hook. f. & Thoms. (Annonac.).
javanica Backer, *Schoolfl. Java*, 33 (1911).—Java.

MITROPHYLLUM Schwantes (Ficoidac.).
abbreviatum *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 368 (1932).—Namaqualand.
Framesii *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 289 (1931).—Little Namaq.
niveum *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 471 (1934).—Little Namaq.
roseum *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 349 (1932).—Namaqualand.
Schickianum *Tisch. in N. E. Brown, Tisch. & Karst. Mesembr.* 268 (1931).—Little Namaq.
tenuifolium *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 409 (1933).—Namaqualand.

MIYAKEA Miyabe & Tatewaki in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. xiv. 2 (1935). *RANUNCULACEAE.*
integrifolia *Miyabe & Tatewaki, l. c.*—Sakhalin.

MIZONIA A. Cheval.; A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France, 1914, lxi. Mém. 8, 302 (1917), descr.; et in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 1935, Sér. II. vii. 217. *AMARYLLIDACEAE.*
centralis *A. Cheval.*; *A. Cheval. l. c.* 303, descr.; *et l. c.*—Afr. Gall. Centr.

MOCANERA Juss. (Theac.; Ternstroemiac., Gen. Pl.).
canariensis *J. St.-Hil. Expos. Fam. Nat.* ii. 371 (1805).—Ins. Canar.

MOCQUERYSIA Hua (Flacourtiac.).
epipetiola *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 411 (1932).—Congo Belg.

MOLDAVICA L. (Labiat.).
thymiflora (*L.*) *Rydb. in Brittonia*, i. 94 (1931): Dracocephalum thymiflorum.

MOLINAEA Comm. ex Juss. (Sapindac.).
sulcata *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 1130 (1933).—Madag.

MOLINERIA Colla (Amaryllidac.).
oligantha *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1932, 349.—Ind. or. (Assam).

MOLLIA Mart. (Tiliac.).
cuneata *Baehni in Candollea*, v. 418 (1934).—Bras. (Pará).
intricata *Baehni, l. c.*—Bras. (Pará).
lucens *Baehni, l. c.* 423.—Bras. (Rio Negro).
paraënsis *Baehni, l. c.* 419.—Bras. (Pará).
Sprucei *Baehni, l. c.* 420.—Bras. (Amaz.).

MOLLIA Willd. (Caryophyllac.).
memphitica (*Delile*) *Colla, Herb. Pedem.* ii. 473 (1834): Polycarpaea memphitica.
villosa *Delile ex Colla, l. c.*—Hab.?

MOLLINEDIA Ruiz & Pav. (Monimiac.).
casca *Macbride in Candollea*, v. 352 (1934).—Peruv.
caudata *Macbride, l. c.* 351.—Peruv.
Killipii *Macbride, l. c.*—Peruv.
Krukovii *A. C. Smith in Phytologia*, i. 114 (1935).—Bras. (Amaz.).
simulans *Macbride in Candollea*, v. 352 (1934).—Peruv.

MOLLUGO L. (Ficoidac.).
Crockeri *Howell in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xxi. 20 (1933).—Ins. Galapag.
floriana (*B. L. Robinson*) *Howell, l. c.* 21: M. flavescens var. floriana.
insularis *Howell, l. c.* 19.—Ins. Galapag.
striata *Howell, l. c.*—Ins. Galapag.
suffruticosa *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. ii. Anhang, 29 (1932).—Tanganyika Terr.
tenuissima *Peter, l. c.* 28.—Tanganyika Terr.

MOLLUGOPHYTUM M. E. Jones, Contrib. West. Bot. No. 18, 35 (1933–5), in obs. *CARYOPHYLLACEAE.*
crassifolium (*Benth.*) *M. E. Jones, l. c.*: Drymaria crassifolia.
holosteoides (*Benth.*) *M. E. Jones, l. c.*: Drymaria holosteoides.
polycarpoides (*A. Gray*) *M. E. Jones, l. c.*: Drymaria polycarpoides.
sperguloides (*A. Gray*) *M. E. Jones, l. c.*: Drymaria sperguloides.

MOLTKIA Lehm. (Boraginac.).
×Kemal-paschii *Bornm. in Magyar Bot. Lap.* 1931, xxx. 66.—As. Min.

MOMORDICA L. (Cucurbitac.).
Marlothii *Harms in Fedde, Repert.* xxxvi. 269 (1934).—Bechuanaland Protect.
procera *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 182 (1927), in syn.: Cucumeropsis edulis.
repens *Bremek. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 261 (1933).—Transvaal.
Schliebenii *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1090 (1934).—Tanganyika Terr.

MONADENIUM Pax (Euphorbiac.).
coccineum *Pax in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix c. 222 (1931).—Afr. or.
succulentum *Schweickerdt in Kew Bull.* 1935, 274.—Kenya Col.

MONANDRODENDRON Mansf. (Flacourtiac.).
Klugii *Mansf. in Fedde, Repert.* xxx. 178 (1932).—Peruv.
peruvianum *Mansf. l. c.* xxix. 161 (1931).—Peruv.

MONANTHES Haw. (Crassulac.).
icterica (*Webb ex Bolle*) *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.* xxxviii. Sect. B, 492 (1929): Petrophyes icterica.
subcrassicaulis (*Kuntze*) *Praeger, l. c.* 496: Sempervivum Monanthes var. subcrassicaulis.

MONANTHOTAXIS Baill. (Annonac.).
oligandra *Exell in Journ. Bot.* 1932, lxx. Suppl. 1, 209.—Congo Lusit.

MONARDA L. (Labiat.).
austromontana *Epling in Madroña*, iii. 28 (1935).—U.S.A. (Arizona; N. Mexico); Mexico.
fruticulosa *Epling, l. c.* 26.—U.S.A. (Texas).
mexicana *Epling, l. c.*—Mexico.

MONARDELLA Benth. (Labiat.).
Robinsonii *Epling in Munz, Man. S. Calif. Bot.* 451, 600 (1935).—U.S.A. (Calif.).

MONDO Adans. (Liliac.).
formosanum *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 45 (1934).—Formosa.
gracile (*Kunth*) *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 148: Ophiopogon gracilis.
koreanum (*Palib.*) *Hatsusima, Bot. Surv. S. Chosen*, Rep. v. (1934); cf. *Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 370, japonice: Ophiopogon spicatus var. koreanus.
longifolium *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 45 (1934).—Japon. (Kiushiu).
scabrum *Ohwi, l. c.* 46.—Formosa.
umbraticola (*Hance*) *Ohwi, l. c.* 45, in obs.: Ophiopogon umbraticola.

MONECHMA Hochst. (Acanthac.).
ciliatum (*Jacq.*) *Milne-Redhead in Kew Bull.* 1934, 304: Justicia ciliata.

MONELYTRUM Hackel (Gramin.).
annuum *Goossens in Kew Bull.* 1934, 197.—Afr. austr.-occ.

MONILARIA Schwantes (Ficoidac.).
microstigma *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. ii. 331 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
ramulosa (*L. Bolus*) *L. Bolus, l. c.*: Schwantesia ramulosa.
salmonea *L. Bolus, l. c.* 355.—Afr. austr. (Cape Prov.).
vestita *Schwantes in Jacobsen, Sukkulent.* 163 (1933), nomen, cum ic.—Hab.?

MONIUM Stapf (Gramin.).
trichaetum *Reznik in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 1046.—Guinea Gall.

MONNINA Ruiz & Pav. (Polygalac.).
acutifolia *Chodat in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1932–3, Sér. II. xxv. 206 (1934).—Peruv.
amarella *Chodat, l. c.* 200.—Peruv.
arbuscula *Chodat, l. c.* 222.—Peruv.
connectisepala *Chodat, l. c.* 213.—Peruv.
densecomata *Chodat, l. c.* 209.—Peruv.
duidae *Blake in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 381.—Venez.
equatoriensis *Chodat in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1932–3, Sér. II. xxv. 207 (1934).—Ecuador.
filifolia *Chodat, l. c.* 198.—Peruv.
glaberrima *Chodat, l. c.* 215.—Colomb.
huacachiana *Chodat, l. c.* 210.—Peruv.
huallagensis *Chodat, l. c.* 223.—Peruv.
Killipii *Chodat, l. c.* 204.—Peruv.
laurifolia *Chodat, l. c.* 208.—Peruv.
lingua *Chodat, l. c.* 216.—Ecuador.
Macbridei *Chodat, l. c.* 199.—Peruv.
macrosepala *Chodat, l. c.* 218.—Peruv.
menthoides *Chodat, l. c.* 219.—Peruv.
multicomata *Chodat, l. c.* 211.—Colomb.
pachycoma *Chodat, l. c.* 220.—Peruv.
petiolaris *Chodat, l. c.* 214.—Peruv.
polygonoides *Chodat, l. c.* 200.—Peruv.
pseudo-polystachya *Chodat, l. c.* 217.—Peruv.
Smithii *Chodat, l. c.* 216.—Colomb.
subspeciosa *Chodat, l. c.* 203.—Colomb.
tenuifolia *Chodat, l. c.* 212.—Peruv.
tomentella *Chodat, l. c.* 210.—Peruv.
Trianae *Chodat, l. c.* 221.—Colomb.
Vitis-Idaea *Chodat, l. c.* 208.—Peruv.

MONOCHAETUM Naud. (Melastomatac.).
subglabrum *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 220.—Peruv.

MONOCHASMA Maxim. (Scrophulariac.).
japonicum (*Maxim.*) *Makino in Journ. Jap. Bot.* vii. 29 (1931): M. Shearei var. japonicum.

MONODORA Dunal (Annonac.).
Gibsoni *Bullock ex Burtt Davy, Check-Lists For. Trees & Shrubs Brit. Emp.* No. 1, Uganda, 20 (1935).—Uganda.
somalensis *Chiov. Fl. Somala*, II. 2 (1932).—Somal. Ital.

MONOLEPIS Schrad. (Chenopodiac.).
patagonica *Ulbr. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 499 (1934).—Patag.

MONOPETALANTHUS Harms (Legumin.).
Jenseni *Gram in Bot. Tidsskr.* xlii. 416 (1934).—Congo Belg.

MONOPYLE Moritz (Gesneriac.).
Iserniana *Cuatrec. in An. Univ. Madrid*, iv. Fasc. 2, 254 (1935).—Ecuador.
subdimidiata (*Klotzsch & Hanst.*) *Mansf. in Fedde, Repert.* xxxviii. 28 (1935): Koellikeria subdimidiata.

MONOTAGMA K. Schum. (Marantac.).
anathronum *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 58 (1931).—Peruv.
contrariosum *Macbride, l. c.*—Peruv.
dolosum *Macbride, l. c.*—Peruv.
spicatum (*Aubl.*) *Macbride, l. c.* 14: Maranta spicata.

MONOTES A. DC. (Dipterocarpac.).
cordatus *Hutchinson in Kew Bull.* 1931, 246.—N. Rhodesia.
Gilgii *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 520 (1921), in obs.—Congo Belg.
glandulosissimus *Hutchinson in Kew Bull.* 1931, 246.—N. Rhodesia.
Hutchinsonianus *Exell in Journ. Bot.* 1932, lxx. Suppl. 1, 219.—Angola.
loandensis *Exell, l. c.* 220.—Angola.
lukuluensis *Hutchinson in Kew Bull.* 1931, 247.—N. Rhodesia.
obliquinervis *Hutchinson, l. c.*—N. Rhodesia.
oblongifolius *Hutchinson, l. c.* 248.—N. Rhodesia.
Stevensonii *Burtt Davy ex Bancroft in Am. Journ. Bot.* 1935, xxii. 511, in obs., nomen.—N. Rhodesia.
tomentellus *Hutchinson & Milne-Redhead in Kew Bull.* 1931, 248.—S. Rhodesia.

MONOTREMA Koern. (Rapateac.).
xyridoides *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 332.—Venez.

MONOTROPA L. (Pyrolac.; Monotropac., Gen. Pl.).
gracilescens *Domin, Vergl. Stud. Fichtensp.* (*Sitzb. Böhm. Ges. Wiss.*) 21 (1915), in adnot., pro syn.: M. Hypopitys var. gracilescens *Domin*.

MONOTROPASTRUM H. Andres in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xii. 697 (1935). *PYROLACEAE.*
ampullaceum *H. Andres, l. c.* 698.—China (Szechuan).
arisanarum *H. Andres, l. c.*—Formosa.
macrocarpum *H. Andres, l. c.*—Ind. or. (Sikkim); China (Yunnan; Szechuan).

MONSONIA L. (Geraniac.).
depressa *Dinter ex Schinz in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 144.—Great Namaq.

MONSTERA Adans. (Arac.).
guatemalensis *H. H. Bartlett in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 17 (1935), nomen.—Am. centr.
Killipii *K. Krause in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 614 (1932).—Peruv.
latiloba *K. Krause, l. c.* 615.—Peruv.

MONTIA L. (Portulacac.).
alpina *Eastw. in Leafl. West. Bot.* i. 11 (1932).—U.S.A. (Calif.).
alsinoides (*Sims*) *Pax & K. Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 259 (1934): Claytonia alsinoides.
andina *Rydb. in N. Am. Fl.* xxi. 316 (1932).—Mexico; Boliv.; Chile.
australasica (*Hook. f.*) *Pax & K. Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 259 (1934): Claytonia australasica.
bracteosa (*Rydb.*) *Pax & K. Hoffm. l. c.*: Limnia bracteosa.
calycina (*Colenso*) *Pax & K. Hoffm. l. c.*: Claytonia calycina.
cordifolia (*S. Wats.*) *Pax & K. Hoffm. l. c.*: Claytonia cordifolia.
diaboli (*Rydb.*) *Pax & K. Hoffm. l. c.*: Limnia diaboli.
Funstonii *Rydb. in N. Am. Fl.* xxi. 316 (1932).—U.S.A. (Calif.).
intermedia *Decker ex v. Poelln. in Fedde, Repert.* xxx. 317 (1932), in syn.: M. limosa.
mexicana (*Rydb.*) *Pax & K. Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 259 (1934): Limnia mexicana.

MONTIA:—
minima *Rydb. in N. Am. Fl.* xxi. 315 (1932).—Calif. infer.
pallida *Peck in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1934, xlvii. 185.—U.S.A. (Oregon).
platyphylla (*Rydb.*) *Pax & K. Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 259 (1934): Limnia platyphylla.
stenophylla *Rydb. in N. Am. Fl.* xxi. 315 (1932).—Calif. super. et infer.
utahensis (*Tidestr.*) *Pax & K. Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 259 (1934): Claytonia utahensis.

MONTIASTRUM Rydb. (Portulacac.).
dichotomum (*Nutt.*) *Rydb. in N. Am. Fl.* xxi. 296 (1932): Claytonia dichotoma.
Howellii (*S. Wats.*) *Rydb. l. c.*: Montia Howellii.

MONTJOLYA Friesen in Bull. Soc. Bot. Genève, 1931–2, Sér. II. xxiv. 142 (1933). *BORAGINACEAE.*
angustifolia (*West*) *Friesen, l. c.* 180: Varronia angustifolia.
Brittoni (*Millsp.*) *Friesen, l. c.*: Varronia Brittoni.
Brownei *Friesen, l. c.*, nomen.—Hab. ?
bullata (*L.*) *Friesen, l. c.* 142: Varronia bullata.
cylindristachya (*Ruiz & Pav.*) *Friesen, l. c.* 181: Varronia cylindristachya.
ferruginea (*Lam.*) *Friesen, l. c.*: Varronia ferruginea.
floribunda (*Desv.*) *Friesen, l. c.*: Varronia floribunda.
guianensis (*Desv.*) *Friesen, l. c.* 142: Varronia guianensis.
integrifolia (*Desv.*) *Friesen, l. c.* 181: Varronia integrifolia.
leptoclada (*Urb. & Britton*) *Friesen, l. c.* 182: Cordia leptoclada.
lucayana (*Millsp.*) *Friesen, l. c.*: Varronia lucayana.
macrostachya (*Ruiz & Pav.*) *Friesen, l. c.*: Varronia macrostachya.
martinicensis (*Jacq.*) *Friesen, l. c.*: Varronia martinicensis.
mollis (*West*) *Friesen, l. c.*: Varronia mollis.
obliqua (*Ruiz & Pav.*) *Friesen, l. c.*: Varronia obliqua.
tomentosa (*Lam.*) *Friesen, l. c.* 183: Varronia tomentosa.

MONTRAVELIA Montrouz. (Bignoniac.).
montana *v. Steenis in Rec. Trav. Bot. Néerl.* xxiv. 927 (1927), nomen.—N. Caled.

MONVILLEA Britton & Rose (Cactac.).
Lindenzweigiana (*Gürke*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 183 (1935): Cereus Lindenzweigianus.
Paxtoniana *Backeb. l. c.* 428, indice, 183, pro syn.: M. Cavendishii.
Smithiana (*Britton & Rose*) *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 12, [p. 7], in obs.: Cephalocereus Smithianus.

MOONIA Arn. (Compos.).
moluccana (*Blume*) *Koster in Fedde, Repert.* xxxiv. 17 (1933): Verbesina moluccana.

MOORIA Montrouz. (Myrtac.).
angustifolia (*E. G. Baker*) *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 690; *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1933, lxxviii. Beibl. 19, 310: Cloëzia angustifolia.
sessilifolia (*Brongn. & Gris*) *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 9: Cloëzia sessilifolia.

MOPEX Lour. ex Gomes in Mem. Acad. Sc. Lisb. Cl. Sc. Pol. Mor. Bel.-Let. n. s. iv. (1), 30 (1868); Merrill in Trans. Am. Phil. Soc. n. s. xxiv. II. 18, 258, in obs. (1935). *TILIACEAE* ?
sinensis *Lour. ex Gomes, l. c.*; *Merrill, l. c.*: Triumfetta Bartramia ?

MOQUILEA Aubl. (Rosac.).
Kuntzeana (*Urb.*) *R. O. Williams in Fl. Trinidad & Tobago*, i. 314 (1932): Licania Kuntzeana.
leucosepala (*Griseb.*) *R. O. Williams, l. c.* 315: Licania leucosepala.
pyrifolia (*Griseb.*) *R. O. Williams, l. c.* 314: Licania pyrifolia.
riparia *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1934, lxi. 192.—Bras. (Maranhão).

MOQUINIA DC. (Compos.).
argentina *Cabrera in Not. Mus. La Plata, Bot.* i. 56 (1935).—Argent.
argyrea *Dusén ex Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 112 (1933).—Bras. (Paraná).
orbiculata *Malme, l. c.* 113.—Bras. (Paraná).
sordida (*Less.*) *Malme, l. c.* 109: Spadonia polymorpha var. sordida.

MORA Schomb. (Legumin.).
Gonggrijpii (*Kleinh.*) *Sandwith in Kew Bull.* 1932, 398: Dimorphandra Gonggrijpii.

MORAEA Mill. (Iridac.).
Barnardii *L. Bolus in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 122.—Afr. austr. (Cape Prov.).
bipartita *L. Bolus, l. c.* 123.—Afr. austr. (Cape Prov.).
coelestis *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 984 (1895), in syn.: Cypella plumbea.
Homblei *De Wild. in De Wild. & Staner, Contrib. Fl. Katanga*, Suppl. iv. 7 (1932).—Congo Belg.
incurva *Lewis in S. Afr. Gard.* 1933, xxiii. 167, 168.—Afr. austr. (Cape Prov.).
obtusa *N. E. Brown in Kew Bull.* 1931, 195.—Afr. austr. (Cape Prov.).
tulbaghensis *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 276.—Afr. austr. (Cape Prov.).

MORENIA Ruiz & Pav. (Palmae).
linearis (*Ruiz & Pav.*) *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 316 (1932): Martinezia linearis.
montana (*Humb. & Bonpl.*) *Burret, l. c.*: Kunthia montana.

MORICANDIA DC. (Crucif.).
populifolia *Battand. Contrib. Fl. Atlant.* ii (1919).—Marocc.

MORINDA L. (Rubiac.).
angustifolia *Roxb. Hort. Beng.* 15 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 201 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 547 (1832).—Ind. or. (Bengal).
Beccariana *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. 205 (1879), in obs.—Borneo.
boninensis *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 57 (1934).—Ins. Bonin.
bracteata *Roxb. Hort. Beng.* 15 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 198 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 544 (1832).—Ind. or. (Madras).
cinnamomea *Craib in Kew Bull.* 1932, 433.—Siam.
exserta *Roxb. Hort. Beng.* 15 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 199 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 545 (1832).—Ind. or. (Bengal).
longifolia *Craib in Kew Bull.* 1932, 434.—Siam.
multiflora *Roxb. Hort. Beng.* 15 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 200 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 546 (1832).—Ind. or. (Central Prov.).
nana *Craib in Kew Bull.* 1932, 434.—Siam.
pumila *Craib, l. c.* 435.—Siam.
scabrida *Craib, l. c.*—Siam.
scandens *Roxb. Hort. Beng.* 86 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 202 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 548 (1832).—Ind. or.
tinctoria *Roxb. l. c.* 15, nomen; *et l. c.* 197; *et l. c.* 543.—Ind. or.

MORINGA Adans. (Moringac.).
Moringa (*L.*) *Millsp. in Publ. Field Columb. Mus.*, Bot. Ser., i. 490 (1902): Guilandina Moringa.
ovalifoliolata *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 852 (1921), in obs., sphalm.: M. ovalifolia.

MORISIA J. Gay (Crucif.).
monanthos (*Viv.*) *Barbey, Fl. Sard. Compend.* 173 (1884): Sisymbrium monanthos.

MORMODES Lindl. (Orchidac.).
citrina *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 939 (1895), in syn.: M. colossus.
Guentheriana (*Kraenzl.*) *Mansf. in Fedde, Repert.* xxx. 260 (1932), in obs.: Catasetum Guentherianum.

MORTONIA A. Gray (Celastrac.).
aspera *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 56 (1933–5).—Calif. infer.

MOSIERA Small, Man. Southeast. Fl. 936 (1933). *MYRTACEAE.*
bahamensis (*Kiaersk.*) *Small, l. c.* 937: Eugenia bahamensis.
longipes (*Berg*) *Small, l. c.*: Eugenia longipes.

MOSLA Buch.-Ham. (Labiat.).
remotiflora *Sun in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., vii. 55 (1932).—China (Kiangsu).

MOSSIA N. E. Brown (Ficoidac.).
Verdoorniae *N. E. Brown in Cactus Journ.* iii. 11 (1934).—Orange Free State.

MOSTUEA Didrichs. (Loganiac.).
gracilipes *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 675 (1932).—Tanganyika Terr.
hymenocardioides *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 20 (1931).—Guinea Gall.; Sierra Leone.
Sennii *Chiov. Fl. Somala*, II. 304 (1932).—Somal. Ital.

MOURIRIA Juss. (Melastomatac.).
buxifolia *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 31 (1932).—Santo Domingo.
completens (*Pittier*) *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 151 (1931): Aulacocarpus completens.
Marshallii *Burtt Davy in Leafl. For. Dep., Trinidad & Tobago*, No. 4, p. 3 (1931); *Burtt Davy & Sandwith in Kew Bull.* 1932, 317.—Trinidad.
micradenia *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 171 (1935).—Bras. (Amaz.).
pachyphylla *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 151 (1931): Aulacocarpus crassifolius.
plinioides *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 32 (1932).—Haiti.
Sellowiana (*Berg*) *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 150 (1931): Aulacocarpus Sellowianus.

MUCUNA Adans. (Legumin.).
Castanea *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xi. 44 (1932).—China (Hainan).
diabolica *Backer ex Keuch. in Meded. Proefst. Thee*, No. xc. 33 (1924).—Java.
Holtoni (*Kuntze*) *Moldenke in Phytologia*, i. 7 (1933): Stizolobium Holtoni.
irritans *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxvii. 414 (1932).—Transvaal.
japonica *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 57.—Japon.
pacifica *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 123.—Ins. Marian. (Saipan).
ponapeana *Hosokawa, l. c.* 122.—Ins. Carolin. (Ponape).

MUEHLENBERGIA Schreb. (Gramin.).
alta *Hitchcock in N. Am. Fl.* xvii. 461 (1935): Epicampes expansa *Fourn.*, non Muehlenbergia expansa *Trin.*
angustifolia *Swallen in N. Am. Fl.* xvii. 457 (1935).—Mexico.
brevifolia *Scribn. ex Beal, Grasses N. Amer.* ii. 254 (1896).—Mexico.
breviligula *Hitchcock in N. Am. Fl.* xvii. 458 (1935).—Guatem.
crispiseta *Hitchcock, l. c.* 440.—Mexico.
distans *Swallen in N. Am. Fl.* xvii. 461 (1935).—Mexico.
elongata *Scribn. ex S. Wats.*; *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 251 (1896), descr.—Mexico.
erectifolia *Swallen in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 15.—Colomb.
firma *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 243 (1896).—Mexico.
Fournieriana *Hitchcock in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1933, xxiii. 453: Epicampes Berlandieri.
gigantea (*Fourn.*) *Hitchcock in N. Am. Fl.* xvii. 460 (1935): Epicampes gigantea.
involuta *Swallen in Am. Journ. Bot.* 1932, xix. 436.—U.S.A. (Texas).
lanata (*H. B. & K.*) *Hitchcock in N. Am. Fl.* xvii. 459 (1935): Agrostis lanata.
laxa *Hitchcock, l. c.* 445.—Mexico.
leptoura (*Piper*) *Hitchcock, l. c.* 468: Epicampes leptoura.
Lindheimeri *Hitchcock in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1934, xxiv. 291.—U.S.A. (Texas).

MUEHLENBERGIA:—
longiligula *Hitchcock in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 136: Epicampes ligulata *Scribn. ex Vasey*, non Muehlenbergia ligulata *Scribn. & Merrill.*
lycuroides *Vasey ex Beal, Grasses N. Amer.* ii. 239 (1896).—Mexico.
macrotis (*Piper*) *Hitchcock in N. Am. Fl.* xvii. 463 (1935): Epicampes macrotis.
macroura (*H. B. & K.*) *Hitchcock, l. c.* 468: Crypsis macroura.
magna *Hitchcock, l. c.* 460: Epicampes Bourgaei.
Meziana *Hitchcock, l. c.* 461: Epicampes minutiflora *Mez*, non Muehlenbergia minutiflora *Hitchcock.*
mutica (*Rupr.*) *Hitchcock, l. c.* 459: Epicampes mutica.
nebulosa *Scribn. ex Beal, Grasses N. Amer.* ii. 247 (1896).—Mexico.
nigra *Hitchcock in N. Am. Fl.* xvii. 468 (1935).—Mexico; Guatem.
Porteri *Scribn. ex Beal, Grasses N. Amer.* ii. 259 (1896).—U.S.A. (Calif.; Arizona; N. Mexico; Texas); Mexico.
Presliana *Hitchcock in N. Am. Fl.* xvii. 462 (1935): Epicampes stricta *J. & C. Presl*, non Muehlenbergia stricta *Kunth.*
pubescens (*H. B. & K.*) *Hitchcock, l. c.* 460: Agrostis pubescens.
pulcherrima *Scribn. ex Beal, Grasses N. Amer.* ii. 240 (1896).—Mexico.
ramosa (*Hackel*) *Makino in Journ. Jap. Bot.* i. 13 (1917): M. japonica var. ramosa.
rigens (*Benth.*) *Hitchcock in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1933, xxiii. 453: Epicampes rigens.
robusta (*Fourn.*) *Hitchcock in N. Am. Fl.* xvii. 462 (1935): Epicampes robusta.
strictior *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 263 (1896).—Mexico.
subbiflora *Hitchcock in N. Am. Fl.* xvii. 437 (1935).—Mexico.
Torreyana (*Schult.*) *Hitchcock in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 136: Agrostis Torreyana.
utilis (*Torr.*) *Hitchcock in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1933, xxiii. 453: Vilfa utilis.
villiflora *Hitchcock in N. Am. Fl.* xvii. 470 (1935): Vilfa pubescens *Fourn.*, non Muehlenbergia pubescens *Hitchcock.*
Watsoniana *Hitchcock, l. c.* 471: M. scabra *S. Wats.*

MUELLERA L. f. (Legumin.).
frutescens (*Aubl.*) *Standley in Tropical Woods*, 1933, No. 34, 41: Coublandia frutescens.

MUIRIA C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ. 70 (1931), nomen; C. A. Gardner in Journ. Roy. Soc. W. Austral. 1932–3, xix. 83 (1934), descr. *RUTACEAE.*
Hassellii (*F. Muell.*) *C. A. Gardner in Journ. Roy. Soc. W. Austral.* 1932–3, xix. 83 (1934): Chorilaena Hassellii.
montana *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 70 (1931), nomen; *C. A. Gardner in Journ. Roy. Soc. W. Austral.* 1932–3, xix. 83 (1934), in syn.: M. Hassellii.

×**MUIRIO-GIBBAEUM** Jacobsen, Sukkulent. 164 (1933); Jacobsen, Succ. Pl. 221 (1935). *FICOIDACEAE.*

MUKDENIA Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot. 1935, iv. 120: **Aceriphyllum** Engl. (Saxifragac.).
Rossii (*Oliv.*) *Koidz. l. c.*: Saxifraga Rossii.

MULGEDIUM Cass. (Compos.).
roseum *Popov & Vved. in Journ. Turkest. Branch Russ. Geogr. Soc.* 1924, xvii. 29 (1925).—Turkestan. (Thian Shan).

MULINUM Pers. (Umbellif.).
chillanense *R. Phil. in Verh. Deutsch. Wiss. Ver. Santiago (Chile)*, ii. 204 (1892), in obs.; *et in An. Univ. Chile*, lxxxv. 707 (1894).—Chile.

MUNDULEA Benth. (Legumin.).
phylloxylon *R. Viguier ex Basse in Ann. Sc. Nat.* 1934, Sér. X. xvi. 171, nomen.—Madag.
sericea (*Willd.*) *A. Cheval. in Compt. Rend.* 1925, clxxx. 1521, in obs.: Cytisus sericeus.
striata (*Bojer*) *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. 389 (1883): Dalbergia striata.

MUNRONIA Wight (Meliac.).
palawanensis (*Merrill*) *Harms in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 1917, xxxv. 80: Turraea palawanensis.
simplicifolia *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 18 (1935).—China (Hainan).

MURALTIA Neck. (Polygalac.).
Rogersii *N. E. Brown in Kew Bull.* 1931, 448.—Afr. austr. (Cape Prov.).

MURDANNIA Royle, Ill. Bot. Himal. 403 (1840). *COMMELINACEAE.*

MURRAYA Koenig (Rutac.).
sorsogonensis *Elmer ex Tanaka in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1932, xxii. 423, in syn.: M. crenulata.

MUSA L. (Musac.; Scitamin., Gen. Pl.).
Corbierii *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1934, xiv. 519.—Hort.
glauca *Roxb. Hort. Beng.* 19 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 490 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 669 (1832).—Burma.
Kaguna *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 119 (1935).—Kenya Col.
nepalensis *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 492 (1824).—Nepal.
ornata *Roxb. Hort. Beng.* 19 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 488 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 666 (1832).—Ind. or.
splendida *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1934, xiv. 517.—Indo-China (Tonkin).
superba *Roxb. Hort. Beng.* 19 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 489 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 667 (1832).—Ind. or.

MUSANGA C. Sm. ex R. Br. (Morac.; Urticac., Gen. Pl.).
cecropioides *R. Br. apud Tedlie in Bowdich, Miss. Ashantee*, 372 (1819).—Afr. trop.

MUSCARI Mill. (Liliac.).
Aaronsohnii *Oppenheimer & Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1930, Sér. II. xxii. 278 (1931).—Palaest.
cedretorum *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 120 [1933], nomen.—Marocc.
coeruleum *Losinsk. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 421, 745 (1935).—Caucas.
Colchicum *Grossheim in Trud. Azerb. Otdyel. Zakavk. Fil. Akad. Nauk SSSR*, Sect. Bot., i. 50 (1933).—Transcaucas.
cyaneo-violaceum *Turrill in Bot. Mag.* t. 9372 (1934).—Bulgar.
dolichanthum *Woronow & Tron in Komarov, Fl. URSS*, iv. 417, 744 (1935).—Transcaucas.
elegans *Misczenko ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 237 (1928).—Caucas.
flaccidum *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxvi. 73 (1934).—As. Min. (Lydia).
giennense *Pau & Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xii. 249 (1929).—Hispan.
lacrimalis *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 120 [1933], nomen.—Marocc.
Muscari (*L.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1124 (1895): Hyacinthus Muscari.
mutilatum (*Trautv.*) *Misczenko ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 236 (1928): M. comosum var. mutilatum.
Steupii *Woronow & Tron in Komarov, Fl. URSS*, iv. 418, 745 (1935).—Transcaucas.
Turkewiczii (*Woronow*) *Losinsk. in Komarov, l. c.* 420: Hyacinthella Turkewiczi.
Woronowii *Tron & Losinsk. in Komarov, l. c.* 418, 744.—Transcasp.

MUSCARIMIA Kostel. Index Pl. Hort. Prag. (1844). *LILIACEAE.*
Muscari (*L.*) *Losinsk. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 411 (1935): Hyacinthus Muscari.
orientalis *Kostel. Index Pl. Hort. Prag.* (1844), nomen.—Hab.?

MUSSAENDA L. (Rubiac.).
corymbosa *Roxb. Hort. Beng.* 15 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 226 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 556 (1832).—Ind. or. (Malabar); Zeylan.
Garrettii *Craib in Kew Bull.* 1931, 444.—Siam.
hainanensis *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 58 (1935).—China (Hainan).

MUSSAENDA:—
incana *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 229 (1824).—Nepal.
kuliangensis *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* xi. 527 (1932).—China (Fokien).
Linderi *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 101, in clavi, 103 (1931).—Liberia.
macrophylla *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 228 (1824).—Nepal.
nivea *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 100, in clavi, 101 (1931).—Côte d'Ivoire; Gold Coast.
pinatubensis *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3210 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
punctata *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxxvi. (*Hist. Nat. Pl.* vi. Atlas iv.) t. 447 (1897).—Madag.
punctulata *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 101, in clavi, 103 (1931).—Liberia.
raiateënsis *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 44 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
uniflora *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 100, in clavi, 101 (1931).—Guinea Gall.; Liberia.

MUTISIA L. f. (Compos.).
anomala *Lillo*; *Cabrera in Not. Prelim. Mus. La Plata*, iii. 157 (1934), descr. ampl.—Argent.
bicolor (*Domke*) *Cuatrec. in An. Univ. Madrid*, iv. Fasc. 2, 237 (1935), in obs.: M. viciifolia var. bicolor.
Castellanosii *Cabrera in Not. Prelim. Mus. La Plata*, i. 329 (1931).—Argent.
Hieronymi *Sodiro ex Cabrera, l. c.* iii. 167 (1934).—Ecuador.
microcephala *Sodiro ex Cabrera, l. c.* 168.—Ecuador.
Rimbachii *Sodiro ex Harris in Rhodora*, 1933, xxxv. 257.—Ecuador.
venusta *Blake in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1933, xlvi. 191.—Peruv.

MYCELIS Cass. (Compos.).
glandulosa (*Boiss.*) *Hayek in Fedde, Repert. Beih.* xxx. II. 842 (1931): Cephalorrhynchus glandulosus.
hispida (*Bieb.*) *Hayek, l. c.*: Prenanthes hispida.

MYCERINUS A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl. 1931, lviii. 441. *ERICACEAE.*
sclerophyllus *A. C. Smith, l. c.* 442.—Venez.

MYCETIA Reinw. (Rubiac.).
brachybotrys *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 195 (1934).—Sumatra.
oligodonta *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xi. 56 (1932).—China (Hainan).
sumatrana *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 196 (1934).—Sumatra.
Yatesii *Merrill, l. c.* 197.—Sumatra.

MYOPORUM Banks & Soland. (Myoporac.).
perforatum *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 822 (1895), in syn.: M. laetum.
rapense *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 278 (1935).—Polynes. (Ins. Rapa).
rimatarense *Forest Brown, l. c.* 280.—Ins. Austral (Rimatara).
Stokesii *Forest Brown, l. c.* 277.—Ins. Austral.
Wilderi *Skottsb. in Acta Hort. Gothoburg.* 1933, viii. 165.—Ins. Cook (Rarotonga).

MYOSANTHUS Desv. Journ. de Bot. iii. [No. 5] 227 [1816]. *CARYOPHYLLACEAE.*
aquaticus (*L.*) *Desv. l. c.*: Cerastium aquaticum.

MYOSOTIS L. (Boraginac.).
albomarginata *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 126 (1932).—Marocc.
baltica *Samuelsson ex H. Lindb. in Mem. Soc. Faun. Fl. Fenn.* 1933–4, No. 10, 94 (1934), pro syn.: M. laxa *Lehm.*
daurica *Pall. ex A. Brand in Engl. Pflanzenreich, Borrag.-Borraginoid.-Cryptanth.* 193 (1931), in syn.: Eritrichium dauricum.
macrosiphon *Font Quer & Maire in Cavanillesia*, iv. 66 (1931).—Marocc.
nankotaizanensis *Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1931, xxi. 155.—Formosa.

MYOSOTIS:—
ovalifolia *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 9 (1824).—Nepal.
patula *Delastre, Fl. Dépt. Vienne*, 295 (1842).—Gallia.
repens *G. Don ex Hook. Fl. Scot.* 67 (1821), in obs.; *G. Don, Gen. Syst.* iv. 344 (1837).—Scotia.
Senneniana *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1933, xxiv. 222.—Marocc.

MYOSURUS L. (Ranunculac.).
clavicaulis *Peck in Torreya*, 1932, xxxii. 149.—U.S.A. (Oregon).

MYRCIA DC. (Myrtac.).
aguitensis *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 409.—Venez.
collina (*DC.*) *Macbride in Candollea*, v. 394 (1934): Eugenia collina.
compressa *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 410.—Venez.
granulata *R. O. Williams in Fl. Trinidad & Tobago*, i. 340 (1934).—Trinidad.
hirtellifolia *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 411.—Venez.
Luetzelburgii *Burret ex Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste Braz.* iii. 201 (1923) [*Insp. Fed. Obras Secc.* Publ. 57], nomen.; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 151.—Bras. (Espirito Santo).
tiburoniana *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 18 (1932).—Haiti.

MYRIACTIS Less. (Compos.).
bipinnatisecta *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 136.—Formosa.
formosana *Kitamura, l. c.* 135.—Formosa.
Warburgii *Diels ex v. Steenis in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 189 (1934), in obs., nomen.—Celebes.

MYRIALEPIS Becc. (Palmae).
triquetra (*Becc.*) *Becc. apud Becc. & Hook. f. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. 480 (1893), in obs.: Calamus triqueter.

MYRIANTHUS Beauv. (Morac.; Urticac., Gen. Pl.).
Mildbraedii *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. Anhang, 10 (1932).—Tanganyika Terr.

MYRICA L. (Myricac.).
Humbertii *Staner & Lebrun in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiii. 304 (1933).—Congo Belg.
microbracteata *Weimarck in Bot. Notiser*, 1934, 87.—Rhodesia.
Mossii *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. 435 (1932), nomen.—Transvaal.
oligadenia *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. Anhang, 1 (1932).—Tanganyika Terr.

MYRIOCARPA Benth. (Urticac.).
Tatei *Rusby in Phytologia*, i. 52 (1934).—Boliv.

MYRIONEURON R. Br. (Rubiac.).
oligoneuron *Hand.-Mazz. in Sinensia*, v. 21 (1934).—China (Kweichau).

MYRIOPHYLLUM L. (Haloragac.).
Eggelingi *Hort. ex A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1934, xiv. 482, nomen.—Hab. ?
oguraënse *Miki in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 335.—Japon. (Hondo).
tetrandrum *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 470 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 451 (1832).—Ind. or.
tuberculatum *Roxb. Hort. Beng.* 12 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 471 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 451 (1832).—Ind. or.

MYRIOPUS Small, Man. Southeast. Fl. 1131 (1933). *BORAGINACEAE.*
poliochros (*Spreng.*) *Small, l. c.*: Tournefortia poliochros.
volubilis (*L.*) *Small, l. c.*: Tournefortia volubilis.

MYRISTICA L. (Myristicac.).
chartacea *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 83, 5 (1931).—Ins. Viti.
cucullata *Markgraf in Engl. Jahrb.* lxvii. 166 (1935).—N. Guin.
fusca *Markgraf, l. c.* 158.—N. Guin.
glomerata (*Blanco*) *Kudo & Masamune in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard.* 1932, ii. 89: Sterculia glomerata.

MYRISTICA:—
insularis *Kanehira, Fl. Micrones.* 115 (1933), japonice; *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 671, latine.—Ins. Palau.
velutina *Markgraf in Engl. Jahrb.* lxvii. 165 (1935).—N. Guin.

MYRMECHIS Blume (Orchidac.).
kinabaluensis *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 188 (1935).—Borneo.

MYRMECODIA Jack (Rubiac.).
sorsogonensis *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3253 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).

MYRMECOIDES Elmer, Leafl. Philipp. Bot. ix. 3253 (1934), sphalm.: **Myrmecodia** Jack (Rubiac.).

MYROSMA L. f. (Marantac.; Scitamin., Gen. Pl.).
lutea (*Jacq.*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 59 (1931), in obs.: Maranta lutea.
stromanthoides *Macbride, l. c.*—Peruv.

MYRSINE L. (Myrsinac.).
aurantiaca *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 300 (1824).—Ind. or.
bifaria *Wall. l. c.* 296.—Reg. Himal.
brasiliensis *Colla, Herb. Pedem.* iv. 95 (1835).—Bras.
capitellata *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 295 (1824).—Nepal.
pachysandra *Wall. l. c.* 297.—Penins. Mal.
semiserrata *Wall. l. c.* 293.—Nepal.
undulata *Wall. l. c.* 299.—Nepal.

MYRTILLOCACTUS Console (Cactac.).
grandiareolatus *Bravo in An. Inst. Biol. Mexico*, 1932, iii. 16.—Mexico.
mixtecensis *Bravo ex Hertrich in Cact. & Succ. Journ. Amer.* iii. 178 (1932), in obs., pro syn.: M. grandiareolatus.

MYRTOPSIS Engl. (Rutac.).
calophylla (*Baill.*) *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1920, lxvii. 65, in clavi: Pelea calophylla.
corymbosa (*Labill.*) *Guillaumin, l. c.* 66, in clavi: Eriostemon corymbosus.
Deplanchei (*Baill.*) *Guillaumin, l. c.* 65, in clavi: Pelea Deplanchei.
myrtoidea (*Baill.*) *Guillaumin, l. c.* 66, in clavi: Pelea myrtoidea.
pomaderridifolia (*Baill.*) *Guillaumin, l. c.*: Evodia pomaderridifolia.

MYRTUS L. (Myrtac.).
aneityensis *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 254.—N. Hebrides.
Bidwillii *Benth. Fl. Austral.* iii. 275 (1866).—Austral. (Queensland).
flavicans *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 15 (1932).—Santo Domingo.
nummularioides (*Britton & P. Wilson*) *Urb. l. c.* 16, in obs.: Psidium nummularioides.
psychotrioides *Colla, Herb. Pedem.* ii. 432 (1834).—Am. austr. ?

MYSTACIDIUM Lindl. (Orchidac.).
longifolium *Kraenzl. in v. Hoehnel, Reise Rudolfsee*, 855 (1892), nomen; *et in Engl. Jahrb.* xvii. 57 (1893), descr.—Kenya Col.

MYXA Friesen in Bull. Soc. Bot. Genève, 1931–2, Sér. II. xxiv. 136 (1933). *BORAGINACEAE.*

MYXOPYRUM Blume (Oleac.).
Pierrei *Gagnep. in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1084 (1933); *et in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 78.—Indo-China (Anam; Cochinch.).

N

NAEGELIA Regel (Gesneriac.).
× hybrida *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 791 (1895), in syn.: Smithiantha hybrida.

NAJAS L. (Naiadac.).
armata *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 8 (1932): N. muricata *Delile*.

NAJAS:—
Hoehnei *W. Koch in Ber. Schweiz. Bot. Ges.* xliv. 340 (1935).—Bras. (S. Paulo).
multidentata *W. Koch, l. c.* 341.—Brit. Honduras.
oguraënsis *Miki in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 775.—Japon.
olivacea *C. O. Rosend. & Butters in Rhodora*, 1935, xxxvii. 347.—U.S.A. (Minnesota).
pseudograminea *W. Koch in Ber. Schweiz. Bot. Ges.* xliv. 339 (1935).—Java.
tenuicaulis *Miki in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 776.—Japon. (Hondo).
yezoënsis *Miyabe in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 97 (1931).—Japon. (Yezo).

NALETONIA Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl. 1934, xxxi. 284. *RUBIACEAE.*
violacea (*Aubl.*) *Bremek. l. c.* 285, cum descr. emend.: Nonatelia violacea.

NAMA L. (Hydrophyllac.).
psammophilum *Goodman in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1932, xix. 177.—U.S.A. (Idaho).
Stevensii *Hitchcock in Am. Journ. Bot.* 1933, xx. 525.—U.S.A. (Oklahoma).
xylopodum (*Wooton & Standley*) *Hitchcock, l. c.* 428: Marilaunidium xylopodum.

NAMIBIA Dinter & Schwantes (Ficoidac.).
ponderosa (*Dinter*) *Dinter & Schwantes ex Jacobsen, Succ. Pl.* 222 (1935): Mesembryanthemum ponderosum.

NANANTHUS N. E. Brown (Ficoidac.).
aloides *N. E. Brown in Gard. Chron.* 1931, Ser. III. lxxxix. 133: Mesembryanthemum aloides.
difformis *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 392 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Jamesii *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 304 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Pole-Evansii *N. E. Brown in Gard. Chron.* 1931, Ser. III. lxxxix. 133.—Afr. austr. (Cape Prov.).

NANOCNIDE Blume (Urticac.).
dichotoma *Chien in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser. ix., 142 (1934).—China (Nanking).
pilosa *Migo in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 386.—China (Kiangsu).

NARCISSUS L. (Amaryllidac.).
albescens *Pugsley in Journ. Roy. Hort. Soc.* 1933, lviii. 82: Ajax albicans.
alpestris *Pugsley, l. c.* 79.—Pyren.
asturicus *Barr ex Pugsley, l. c.* 69, in syn.: N. pallidiflorus f. asturicus *Pugsley*.
asturiensis (*Jord.*) *Pugsley, l. c.* 40: Ajax asturiensis.
calcicola *Mendonça*; *Mendonça in Bol. Soc. Brot.* vii. 318 (1929–30), descr. ampl.—Lusitan.
caucasicus (*Fomin*) *Gorschkova in Komarov, Fl. URSS*, iv. 492 (1935): N. lacticolor var. caucasicus.
confusus *Pugsley in Journ. Roy. Hort. Soc.* 1933, lviii. 59.—Hispan.
Gayi (*Henon*) *Pugsley, l. c.* 72: Ajax Gayi.
Johnstonii *Pugsley, l. c.* 37.—Lusitan.
leonensis *Pugsley, l. c.* 75.—Hispan.
longispathus *Pugsley, l. c.* 54.—Hispan.
macrolobus (*Jord.*) *Pugsley, l. c.* 71: Ajax macrolobus.
Mauritii *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 117 [1933], nomen.—Marocc.
nevadensis *Pugsley in Journ. Roy. Hort. Soc.* 1933, lviii. 62.—Hispan.
pallidiflorus *Pugsley, l. c.* 69.—Hispan.
parviflorus (*Jord.*) *Pugsley, l. c.* 49: Ajax parviflorus.
pisanus *Pugsley, l. c.* 59.—Ital.
portensis *Pugsley, l. c.* 61.—Lusitan.
Poujastou *Barr ex Pugsley, l. c.* 70, in syn.: N. pallidiflorus var. intermedius *Pugsley*.
verbanensis (*Herbert*) *Herbert, Amaryllidac.* t. 37, fig. 2, (1837); *Roem. Syn. Monogr.* Fasc. IV. 240 (1847): N. poeticus var. verbanensis.

NARDURUS Reichb. (Gramin.).
demnatensis (*Murb.*) *Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc*, i. 78 (1931): Festuca demnatensis.
Krausei (*Regel*) *Krecz. & Bobr. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 540 (1934): Festuca Krausei.

NARDURUS:—
tuberculosus (*Moris*) *Hayek in Fedde, Repert. Beih.* xxx. III. 295 (1932): Catapodium tuberculosum.
Woronowii *Schischk. in Bull. Mus. Géorgie*, 1920–2, i. 3 (1922).—Transcaucas.; Persia.

NAREGAMIA Wight & Arn. (Meliac.).
africana (*Welw.*) *Exell in Journ. Bot.* 1932, lxx. Suppl. 1, 223: N. alata var. africana.

NASSAUVIA Comm. (Compos.).
fuegiana (*Speg.*) *Cabrera in Physis*, x. 285 (1931): Strongylomopsis fuegiana.

NASTURTIUM R. Br. (Crucif.).
clavatum (*Rydb.*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 312 (1931): Rorippa clavata.
Eggersii *O. E. Schulz in Fedde, Repert.* xxxiii. 285 (1934).—Colomb.; Ecuador.
Gambelii (*S. Wats.*) *O. E. Schulz in Engl. Jahrb.* lxvi. 98 (1933): Cardamine Gambelii.
japonicum *Hort. ex A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1934, xiv. 482, nomen.—Hab.?
longipes *Engl. ex O. E. Schulz in Fedde, Repert.* xxxiii. 274 (1934), in syn.: N. nudiusculum.
microtites (*B. L. Robinson*) *O. E. Schulz, l. c.* xxxiv. 134 (1933): Sisymbrium microtites.
nudiusculum (*E. Mey.*) *O. E. Schulz, l. c.* xxxiii. 274 (1934): Arabis nudiuscula.
obtusulum (*Miq.*) *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 149: N. montanum var. obtusulum.
Sinapis (*Burm. f.*) *O. E. Schulz in Fedde, Repert.* xxxiii. 278 (1934): Sisymbrium Sinapis.
Tweediei *O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 228 (1931).—Patag.
Williamsii (*Britton*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 312 (1931): Rorippa Williamsii.

NASTURTIUM Zinn, Cat. Pl. Gott. 326 (1757); cf. Sprague in Kew Bull. 1934, 219: **Thlaspi** L. (Crucif.).

NATHUSIA Hochst. (Oleac.).
obliquifoliolata (*Gilg*) *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 78 (1935): Schrebera obliquifoliolata.

NAUCLEA Korth. (Rubiac.).
brunnea *Craib in Kew Bull.* 1931, 208; *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 5 (1932), descr. ampl.—Siam.
Cadamba *Roxb. Hort. Beng.* 14 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 121 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 512 (1832).—Ind. or. (Bengal).
cordata *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 118; *et l. c.* 509.—Zeylan.
glabra *Roxb. l. c.* 86, nomen; *et l. c.* 121; *et l. c.* 512.—Ins. Molucc.
macrophylla *Roxb. l. c.* 14, nomen; *et l. c.* 120; *et l. c.* 511.—Ins. Molucc. (Amboina).
nipponica *Masamune in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* xi., Bot. No. 4, 415 (1934): Adina globiflora *Maxim. in Engl. Jahrb.* vi. 67 (1885), non *Salisb.*
ovalifolia *Roxb. Hort. Beng.* 86 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 124 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 516 (1832).—Ind. or. (Assam).
rotundifolia *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.*; *et l. c.*—Ind. or. (Bengal).
sessilifolia *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.*; *et l. c.* 515.—Ind. or. (Bengal).
tetrandra *Roxb. l. c.* 14, nomen; *et l. c.* 125; *et l. c.* 516.—Ind. or. (Assam).
undulata *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 117; *et l. c.* 508.—Ins. Molucc.

NAUCLEOPSIS Miq. (Morac.; Urticac. Gen. Pl.).
Chiguila *Benoist in Publ. Mus. Hist. Nat., Paris*, No. 3, 78 (1933).—Ecuador.
stipularis *Ducke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 580 (1932).—Bras. (Pará).

NAUTILOCALYX Linden (Gesneriac.).
lacteus *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 489.—Guiana Brit.

NAUTOCHILUS Bremek. in Ann. Transvaal Mus. xv. 252 (1933). *LABIATAE.*
amabilis *Bremek. l. c.* 254.—Transvaal.
Breyeri *Bremek. l. c.* 255.—Transvaal.

NAUTOCHILUS:—
labiatus (*N. E. Brown*) *Bremek. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 253 (1933): Orthosiphon labiatus.
urticifolius *Bremek. l. c.*—Transvaal.

NAVARRETIA Ruiz & Pav. (Polemoniac.).
Savagei *L. F. Henderson in Rhodora*, 1931, xxxiii. 205.—U.S.A. (Oregon).

NAVIA Schult. f. (Bromeliac.).
brachyphylla *L. B. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 339.—Venez.
duidae *L. B. Smith, l. c.* 338.—Venez.

NECTANDRA Roland. (Laurac.).
acuminata (*Nees & Mart.*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 19 (1931): Persea acuminata.
comasensis *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxxi. 185 (1933).—Peruv.
Herrerae *O. C. Schmidt, l. c.* 188.—Peruv.
praeclara *Sandwith in Kew Bull.* 1932, 224.—Guiana Brit.
Sawadai *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxxi. 187 (1933).—Peruv.
Steinbachii *O. C. Schmidt, l. c.* 186.—Boliv.
superba *A. C. Smith in Phytologia*, i. 120 (1935).—Bras. (Amaz.).
trinitatis *Brooks in Leafl. For. Dep., Trinidad & Tobago*, No. 4, pp. 19, 23, 43 (1931), nomen.—Trinidad; Tobago?
Williamsii *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxxi. 188 (1933).—Peruv.

NEEA Ruiz & Pav. (Nyctaginac.).
boliviana *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 81 (1931).—Boliv.
Brittonii *Standley, l. c.* 80: N. macrophylla *Britton ex Rusby.*
cauliflora *Heimerl in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 129 (1934).—Bras. (Amaz.).
dimorphophylla *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 78 (1931).—Boliv.
emarginata *Ruiz & Pav. ex Domke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 723 (1935), in obs., pro syn.: Daphnopsis Pavonii.
mapirensis *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 78 (1931).—Boliv.
Williamsii *Standley, l. c.* viii. 309 (1931).—Peruv.
Woronovii *Standley, l. c.* xi. 77 (1931).—Colomb.

NEERIJA Roxb. Hort. Beng. 86 (1814), nomen; Fl. Ind., ed. Carey & Wall., ii. 444 (1824); Fl. Ind., ed. Carey, i. 646 (1832). *CELASTRACEAE.*
dichotoma *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.*; *et l. c.*—Ind. or.

NEILLIA D. Don (Rosac.).
glabrata (*Rydb.*) *Bean in Kew Bull.* 1934, 224: Opulaster glabratus.
hypomalaca *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 337.—China (Yunnan).
intermedia (*Rydb.*) *Bean in Kew Bull.* 1934, 224: Opulaster intermedius.
stellata (*Rydb.*) *Bean, l. c.*: Opulaster stellatus.

NELUMBO Adans. (Nymphaeac.).
pentapetala (*Walt.*) *Fernald in Rhodora*, 1934, xxxvi. 23: Nymphaea pentapetala.

NEMASTYLIS Nutt. (Iridac.).
floridana *Small in Journ. N. Y. Bot. Gard.* 1931, xxxii. 266, in adnot.—U.S.A. (Florida).
Huyanae *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 13 (1931).—Peruv.

NEMESIA Vent. (Scrophulariac.).
angustifolia *Grant ex Range in Fedde, Repert.* xxxviii. 262 (1935), nomen.—Namaqualand.
compacta *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 751 (1895), in syn.: N. versicolor f. compacta *Voss.*
densifolia *Grant ex Range in Fedde, Repert.* xxxviii. 262 (1935), nomen.—Namaqualand.
Marlothii *Grant ex Range, l. c.* 263, nomen.—Namaqualand.
odoratissima *Dinter ex Range, l. c.* 262, in syn.: N. angustifolia.
ramosa *Grant ex Range, l. c.* 263, nomen.—Namaqualand.
zimbabwensis *Rendle in Journ. Bot.* 1932, lxx. 95.—S. Rhodesia.

NEMOPHILA Nutt. (Hydrophyllac.).
coelestis *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 688 (1895), in syn.: N. Menziesii.
Evermanni *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 152 (1931).—U.S.A. (Calif.).
insularis *Eastw. l. c.* xxi. 282 (1935).—U.S.A. (Calif.).

NEOBAKERIA Schlechter (Liliac.).
Visseriae *Barnes in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 72.—Afr. austr. (Cape Prov.).

NEOBAUMANNIA Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr. ii. 132 (1931): **Baumannia** K. Schum. (Rubiac.).
hedyotoidea (*K. Schum.*) *Hutchinson & Dalziel, l. c.*: Baumannia hedyotoidea.

NEOBESSEYA Britton & Rose (Cactac.).
asperispina (*Bödeker*) *Bödeker ex Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 379 (1935): Coryphantha asperispina.
Nuttallii *Bödeker, Mammill.-Vergl.-Schlüss.* 15 (1933); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 145.—U.S.A. (Montana).
Zilziana (*Bödeker*) *Bödeker ex Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 379 (1935): Coryphantha Zilziana.

NEOCINNAMOMUM H. Liou, Laurac. Chine et Indochine, 82, 86 (1932). *LAURACEAE.*
caudatum (*Nees*) *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 64 (1934): Cinnamomum caudatum.
Delavayi (*Lecomte*) *H. Liou, Laurac. Chine et Indochine*, 90 (1932): Cinnamomum Delavayi.
Lecomtei *H. Liou, l. c.* 93.—China (Tonkin).
parvifolium (*Lecomte*) *H. Liou, l. c.* 88: Cinnamomum parvifolium.
Poilanei *H. Liou, l. c.* 92.—Indo-China (Anam).
yunnanense *H. Liou, l. c.* 90.—China (Yunnan).

NEOCLEMENSIA Carr in Gard. Bull. Straits Settlements, viii. 180 (1935). *ORCHIDACEAE.*
spathulata *Carr, l. c.*—Borneo.

NEOCLEOME Small, Man. Southeast. Fl. 577 (1933). *CAPPARIDACEAE.*
serrata (*Jacq.*) *Small, l. c.*: Cleome serrata.
spinosa (*Jacq.*) *Small, l. c.*: Cleome spinosa.

NEOCOUMA Pierre (Apocynac.).
Duckei *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 337 (1932).—Bras. (Amaz.).

NEODREGEA C. H. Wright (Liliac.).
Glassii *C. H. Wright*; *Garside in Kew Bull.* 1935, 298, descr. emend.—Afr. austr. (Cape Prov.).

NEODYPSIS Baill. (Palmae).
ceraceus *Jumelle in Ann. Mus. Col. Marseille*, 1933, Sér. V. i. Fasc. 1, 18.—Madag.
compactus *Jumelle, l. c.* 13.—Madag.
Decaryi *Jumelle, l. c.* 15.—Madag.
gracilis *Jumelle, l. c.* 19.—Madag.
loucoubensis *Jumelle, l. c.* 17.—Madag.

NEOGUNNIA Pax & K. Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, xvi c. 225 (1934): **Gunnia** F. Muell. (Ficoidac.).
Drummondii (*Benth.*) *Pax & K. Hoffm. l. c.*: Gunnia Drummondii.
septifraga (*F. Muell.*) *Pax & K. Hoffm. l. c.*: Gunnia septifraga.

NEOHENRYA Hemsl. (Apocynac.).
angustissima *Hemsl. in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1892, xix. 97, sphalm.: N. Augustiniana.

NEOLINDLEYA Kraenzl. (Orchidac.).
camtschatica (*Cham.*) *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, iv. 646 (1935): Orchis camtschatica.

NEOLITSEA Merrill (Laurac.).
buisanensis *Yamamoto & Kamikoti in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1932, xxii. 411.—Formosa.
cambodiana *Lecomte*; *H. Liou, Laurac. Chine et Indochine*, 143 (1932), descr. ampl.—Kwangsi; Laos; Cambodia.
Chuii *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* vii. 306 (1931).—China (Kwangtung).
daibuensis *Kamikoti in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1932, xxii. 411.—Formosa.
elaeocarpa *H. Liou, Laurac. Chine et Indochine*, 144 (1932).—Indo-China (Tonkin; Anam).

NEOLITSEA:—
ferruginea *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* vii. 305 (1931).—China (Kwangtung).
fuscata (*Thwait.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 248 (1931): Litsea fuscata.
gracilipes (*Hemsl.*) *H. Liou, Laurac. Chine et Indochine*, 143 (1932): Litsea gracilipes.
Koidzumii *Kamikoti in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 241: N. latifolia *Koidz.*
kwangsiensis *H. Liou, Laurac. Chine et Indochine*, 146 (1932).—China (Kwangsi).
latifolia *Koidz. in Y. Doi, Fl. Satsum.* ii. 104 (1931).—Japon.
oblongifolia *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 234 (1935).—China (Hainan).
obtusifolia *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 6 (1935).—China (Hainan).
phanerophlebia *Merrill, l. c.* vii. 305 (1931).—China (Kwangtung).
Poilanei *H. Liou, Laurac. Chine et Indochine*, 149 (1932).—Indo-China (Anam).
polycarpa *H. Liou, l. c.* 150.—Indo-China (Tonkin; Anam).
zeylanica *Merrill*; *H. Liou, l. c.* 153, descr. ampl.—China (Kwangsi); Indo-China (Anam).

NEOLLOYDIA Britton & Rose (Cactac.).
Gielsdorfiana (*Werderm.*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 366 (1935): Echinocactus Gielsdorfianus.
grandiflora (*Otto*) *F. M. Knuth, l. c.* 368: Mammillaria grandiflora.
Knuthiana (*Bödeker*) *F. M. Knuth, l. c.* 367: Echinocactus Knuthianus.
Roseana (*Bödeker*) *F. M. Knuth, l. c.* 368: Echinocactus Roseanus.
Sauerii (*Bödeker*) *F. M. Knuth, l. c.* 367: Echinocactus Sauerii.
Viereckii (*Werderm.*) *F. M. Knuth, l. c.* 368: Echinocactus Viereckii.

NEOLOURYA L. Rodrig. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 1934, Sér. II. vi. 96. *HAEMODORACEAE.*
Pierrei *L. Rodrig. l. c.* 97.—Cochinch.
Weberi *L. Rodrig. l. c.*—Indo-China (Tonkin).

NEOMAMMILLARIA Britton & Rose (Cactac.).
Baxteriana *Gates apud M. E. Jones in Cact. & Succ. Journ. Amer.* vi. 3 (1934).—Calif. infer.
Blossfeldiana (*Bödeker*) *Gates, l. c.* iv. 371 (1933), cum descr. emend.: Mammillaria Blossfeldiana.
Bullardiana *Gates apud M. E. Jones, l. c.* vi. 4 (1934).—Calif. infer.
capensis *Gates, l. c.* iv. 372 (1933).—Calif. infer.
Dawsonii *Houghton in Cact. & Succ. Journ. Amer.* vii. 88 (1935).—Calif. infer.
dolichocentra (*Lem.*) *Tieg. in An. Inst. Biol., Mexico*, 1934, v. 269, in obs.: Mammillaria dolichocentra.
Echinops (*Scheidw.*) *Fosb. in Bull. S. Calif. Acad. Sc.* 1931, xxx. 56, in obs.: Mammillaria Echinops.
guerreronis *Bravo in An. Inst. Biol., Mexico*, 1932, iii. 395.—Mexico.
Hamiltonhoytea *Bravo, l. c.* 1931, ii. 130.—Mexico.
Hoffmanniana *Tieg. in An. Inst. Biol., Mexico*, 1934, v. 269.—Mexico.
Hutchisoniana *Gates apud M. E. Jones in Cact. & Succ. Journ. Amer.* vi. 4 (1934).—Calif. infer.
longimamma (*DC.*) *Fosb. in Bull. S. Calif. Acad. Sc.* 1931, xxx. 58, in obs.: Mammillaria longimamma.
Marshalliana *Gates apud M. E. Jones in Cact. & Succ. Journ. Amer.* vi. 4 (1934).—Calif. infer.
Mendeliana *Bravo in An. Inst. Biol., Mexico*, 1931, ii. 195.—Mexico.
Ochoterenae *Bravo, l. c.* 127.—Mexico.
Ortizrubiana *Bravo, l. c.* 193.—Mexico.
pacifica *Gates apud M. E. Jones in Cact. & Succ. Journ. Amer.* vi. 5 (1934).—Calif. infer.
Patoni *Bravo in An. Inst. Biol., Mexico*, 1931, ii. 129.—Mexico.
pectinata (*B. Stein*) *Fosb. in Bull. S. Calif. Acad. Sc.* 1931, xxx. 58, in obs.: Pelecyphora pectinata.
phitauiana *Baxter in Journ. Cact. & Succ. Soc. Amer.* ii. 472 (1931).—U.S.A. (Texas).
radiosa (*Engelm.*) *Rydb. Fl. Prairies & Plains Centr. N. Amer.* 562 (1932): Mammillaria radiosa.
Schmollii *Bravo in An. Inst. Biol., Mexico*, 1931, ii. 123, 128.—Mexico.

NEOMAMMILLARIA:—
sinaloënsis *Rose in G. Ortega, Apuntes Fl. Indig. Sinaloa*, Fam. Cact., S. [No. 3] (1929).—Mexico.
sphaerica (*Dietr.*) *Fosb. in Bull. S. Calif. Acad. Sc.* 1931, xxx. 58, in obs.: Mammillaria sphaerica.
tetrancistra (*Engelm.*) *Fosb. l. c.* 57, in obs.: Mammillaria tetrancistra.
uberiformis (*Zucc.*) *Fosb. l. c.* 58, in obs.: Mammillaria uberiformis.
Zeyeriana (*F. Haage*) *Fosb. l. c.* 56, in obs.: Mammillaria Zeyeriana.

NEOMANDONIA Hutchinson, Fam. Fl. Pl. ii. Monocot., 57 (1934): **Mandonia** Hassk. (Commelinac.).

NEOMANNIOPHYTON Pax & K. Hoffm. (Euphorbiac.).
Chevalieri *Beille in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 295 (1917).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).

NEOMOLINIA Honda (Gramin.).
mandshurica (*Maxim.*) *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 2: Diarrhena mandshurica.

NEONAUCLEA Merrill (Rubiac.).
Navillei (*Léveillé*) *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 319: Cephalanthus Navillei.
rheophila *v. Steenis in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 175, in obs., 199, 200 (1932).—Ind. or. Bat. (Ins. Siantan).
truncata (*Hayata*) *Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1935, vii. 149: Nauclea truncata.

NEOPELTANDRA Gamble (Euphorbiac.).
parvifolia (*Wight*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 256 (1931): Peltandra parvifolia.

NEOPHLOGA Baill. (Palmae).
andasiensis *Jumelle & H. Perrier ex Becc. apud Martelli in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1934, n. s. xli. 717 (1935), nomen.—Madag.
Humberti *Jumelle in Ann. Mus. Col. Marseille*, 1933, Sér. V. i. Fasc. 1, 20.—Madag.

NEOPHYLUM Van Tiegh. (Loranthac.).
artense *Van Tiegh in Bull. Soc. Bot. France*, 1896, xliii. 242, in obs -N. Caled.

NEOPORTERIA Britton & Rose (Cactac.).
ambigua (*Hildm. ex K. Schum.*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 259 (1935): Echinocactus ambiguus.
Aspillagai (*Söhrens*) *Backeb. l. c.*: Echinocactus Aspillagai.
Fobeana (*Mieckley*) *Backeb. l. c.*: Echinocactus Fobeanus.
Kunzei (*Förster*) *Backeb. l. c.* 260: Echinocactus Kunzei.
napina (*R. Phil.*) *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 9, [p. 4]: Echinocactus napinus.
Odieri (*Lem. ex Salm-Dyck*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 261 (1935): Echinocactus Odierii.
Reichii (*K. Schum.*) *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 9, [p. 3]: Echinocactus Reichii.
senilis (*R. Phil.*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 262 (1935): Echinocactus senilis.

NEOPREISSIA Ulbr. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, xvi c. 519 (1934). *CHENOPODIACEAE.*
cinerea (*Poir.*) *Ulbr. l. c.* 520: Atriplex cinerea.
isatidea (*Moq.*) *Ulbr. l. c.*: Atriplex isatidea.

NEORAIMONDIA Britton & Rose (Cactac.).
gigantea *Backeb. in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1931, xlvi. 187, in obs.—Peruv.
roseiflora *Backeb. in Cact. & Succ. Journ. Amer.* iii. 131 (1932), in obs.—Peruv.

NEORAUTANENIA Schinz (Legumin.).
brachypus (*Harms*) *C. A. Smith in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxvii. 418 (1932): Dolichos brachypus.
coriacea *C. A. Smith, l. c.* p. xxvii. 417.—Transvaal.
deserticola *C. A. Smith, l. c.*—Bechuanaland.
edulis *C. A. Smith, l. c.* p. xxviii. 418.—Transvaal.
ficifolia (*Benth.*) *C. A. Smith, l. c.* p. xxviii. 417: Rhynchosia ficifolia.
Lugardii (*N. E. Brown*) *C. A. Smith, l. c.*: Galactia Lugardii.

NEORAUTANENIA:—
Rogersii (*L. Bolus*) *C. A. Smith in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxviii. 417 (1932): Pueraria Rogersii.
Seineri (*Harms*) *C. A. Smith, l. c.* p. xxviii. 418: Dolichos Seineri.

NEOREGELIA L. B. Smith in Contrib. Gray Herb. n. s. civ. 78 (1934): **Aregelia** Mez in DC. Monogr. Phan. ix. 61 (1896), non Kuntze (Bromeliac.).
ampullacea (*E. Morr.*) *L. B. Smith, l. c.*: Nidularium ampullaceum.
bahiana (*Ule*) *L. B. Smith in Proc. Am. Acad.* lxx. 152 (1935): Nidularium bahianum.
carcharodon (*Baker*) *L. B. Smith, l. c.*: Karatas carcharodon.
concentrica (*Vell.*) *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 78 (1934): Tillandsia concentrica.
eleutheropetala (*Ule*) *L. B. Smith, l. c.*: Nidularium eleutheropetalum.
laevis (*Mez*) *L. B. Smith, l. c.*: Aregelia laevis.
Morreniana (*Ant.*) *L. B. Smith, l. c.* 79: Karatas Morreniana.
sarmentosa (*Regel*) *L. B. Smith, l. c.*: Nidularium sarmentosum.
spectabilis (*T. Moore*) *L. B. Smith, l. c.*: Nidularium spectabile.
tristis (*Beer*) *L. B. Smith in Proc. Am. Acad.* lxx. 153 (1935): Bromelia tristis.

NEOSTENANTHERA Exell in Journ. Bot. 1935, lxxiii. Suppl., 5: **Stenanthera** Engl. & Diels (Annonac.).
bakuana (*A. Cheval. ex Hutchinson & Dalziel*) *Exell, l. c.* 6: Stenanthera bakuana.
gabonensis (*Engl. & Diels*) *Exell, l. c.*: Stenanthera gabonensis.
hamata (*Benth.*) *Exell, l. c.*: Oxymitra hamata.
macrantha (*Mildbr. & Diels*) *Exell, l. c.*: Stenanthera macrantha.
micrantha *Exell, l. c.* 5.—Congo Lusit.
myristicifolia (*Oliv.*) *Exell, l. c.* 6: Oxymitra myristicifolia.
neurosericea (*Diels*) *Exell, l. c.*: Stenanthera neurosericea.
pluriflora (*De Wild.*) *Exell, l. c.*: Stenanthera pluriflora.

NEOTTIA L. C. Rich. emend. Lindl. (Orchidac.).
asiatica *Ohwi in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 384: N. micrantha *Lindl.*
subsessilis *Ohwi, l. c.* 385.—Japon.

NEOTYSONIA Dalla Torre & Harms, Gen. Siphonog. 540 (1905): **Tysonia** F. Muell. (Compos.).

NEPENTHES L. (Nepenthac.).
Burbidgeae *Hook. f. ex Burbidge*; *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 467 (1935), descr. emend.—Borneo.
ephippiata *Danser*; *Danser in Mitt. Inst. Bot. Hamburg*, vii. 217 (1931), descr. emend.—Borneo.
× Henryana *Nicholson, Ill. Dict. Gard.* iv. 572 (1888).—Hab. ?
spathulata *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 465 (1935).—Sumatra.

NEPETA L. (Labiat.).
Alexeenkoi *Woronow ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 293 (1932), in syn.: N. brevifolia.
antiatlantica *Emberger & Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1932, xxiii. 206.—Marocc.
bipunctata *Rich. ex Epling in Fedde, Repert.* xxxiv. 104 (1933), in obs., pro syn.: Hyptis mutabilis.
Candeliana *Maire*; *Emberger & Maire in Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc*, xi. Nos. 4–6, 106 (1931).—Marocc.
Ceballosii *Vicioso & Pau in Cavanillesia*, iv. 55 (1931).—Hispan.
× ceretana *Sennen in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xv. Ser. Bot. No. 1, 29 (1931), in obs.—Hispan.
Laurentii *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1933, xxxii. 20 (1934).—Ins. Balear. (Mallorca).
santoana *Popov in Trans. Turkest. Univ., Tashkent*, No. 4 (*Vég. Monts Sary-Taou, etc.*) 57, 64 (1922).—Turkestan.
× Secundarei *Sennen in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 525.—Pyren.
somkhetica *Kapell. in Monit. Jard. Bot. Tiflis*, 1928–30, n. s. Pt. 5, 35 (1931).—Armen.

NEPHELAPHYLLUM Blume (Orchidac.).
laciniatum *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxv. 459 (1933).—Celebes.
verruculosum *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 200 (1935).—Borneo.

NEPHELIUM L. (Sapindac.).
Hosei *Ridley in Kew Bull.* 1933, 191.—Borneo.
obovatum *Ridley, l. c.*—Borneo.

NEPHRODESMUS Schindl. (Lægumin.).
ferrugineus *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1932, lxxvii. Beibl. 19, 186.—N. Caled.

NEPHTHYTIS Schott (Arac.).
triphylla *Hort. ex Nash in L. H. Bailey, Standard Cycl. Hort.* iv. 2136 (1916).—Hab.?

NERINE Herb. (Amaryllidac.).
alta *Barker in Fl. Pl. S. Afr.* 1935, xv. t. 563.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Breachiae *Barker, l. c.* t. 566.—Afr. austr. (Cape Prov.).
crispa *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1008 (1895), in syn.: N. undulata.
falcata *Barker in Fl. Pl. S. Afr.* 1933, xiii. t. 511.—Transvaal.
filamentosa *Barker, l. c.* 1935, xv. t. 569.—Afr. austr. (Cape Prov.).
gaberonensis *Bremek. & Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xvi. 409 (1935).—Bechuanaland Protect.
Krigei *Barker in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 137, 143.—Rhodesia.
Peersii *Barker in Fl. Pl. S. Afr.* 1935, xv. t. 562.—Afr. austr. (Cape Prov.).
tulbaghensis *Barker, l. c.* t. 565.—Afr. austr. (Cape Prov.).

NERVILIA Comm. (Orchidac.).
calcicola *Kerr in Journ. Siam Soc., Nat. Hist. Suppl.* ix. 242 (1933).—Indo-China (Laos).
Hallbergii *Blatter & McCann in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxv. 726 (1932).—Ind. or. (Bombay).
hispida *Blatter & McCann, l. c.* 728.—Ind. or. (Bombay).
infundibulifolia *Blatter & McCann, l. c.* 725.—Ind. or. (Bombay).
monantha *Blatter & McCann, l. c.* 724.—Ind. or. (Bombay).
petaloidea *Carr in Journ. As. Soc. Mal.* xi. 68 (1933).—Sumatra.

NESAEA Comm. ex Juss. (Lythrac.).
Jaegeri *Koehne ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 653 (1921), in obs.—Afr. or.
Winkleri *Koehne ex Engl, l. c.*, in obs.—Kenya Col.

NESOBIUM R. Phil. ex Fuentes in Rev. Chil. Hist. Nat. 1932, xxxvi. 160, in obs., in syn.: **Parietaria** L. (Urticac.).
felicianum *R. Phil. ex Fuentes, l. c.*, in obs., in syn.: Parietaria feliciana.

NESOGENES A. DC. (Verbenac.).
glandulosus (*Scott Elliot*) *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 821 (1933), in obs.: Acharitea glandulosa.
Mansfeldianus *Mildbr. l. c.* 820.—Tanganyika Terr.

NESOLUMA Baill.; Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu, No. 130, 223. (1935), descr. emend. *SAPOTACEAE.*

NESTLERA Spreng. (Compos.).
rosenioides *Hutchinson ex Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 318 (1931), in obs.—Afr. austr. (Cape Prov.).

NEUONTOBOTRYS O. E. Schulz (Crucif.).
Berningeri *O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 392 (1932).—Chile.

NEURADOPSIS Bremek. & Oberm. in Ann. Transvaal Mus. xvi. 415 (1935). *ROSACEAE.*
austro-africana (*Schinz*) *Bremek. & Oberm. l. c.*: Neurada austro-africana.
bechuanensis *Bremek. & Oberm. l. c.* 416.—Bechuanaland Protect.
grieloidea *Bremek. & Oberm. l. c.* 415.—Bechuanaland Protect.

NEUROLAENA R. Br. (Compos.).
Schippii *B. L. Robinson in Rhodora*, 1935, xxxvii. 62.—Brit. Honduras.

NEUROLEPIS Meissn. (Gramin.).
mollis *Swallen in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xii. 14.—Colomb.

NEUROPELTIS Wall. in Roxb. Fl. Ind., ed. Carey & Wall., ii. 43 (1824). *CONVOLVULACEAE.*
racemosa *Wall. l. c.* 44.—Penins. Mal.

NEUROTHECA Salisb. (Gentianac.).
longidens *Staner in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiii. 223 (1933), nomen.—Congo Belg.

NEUWIEDIA Blume (Orchidac.).
annamensis *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 350.—Indo-China (Anam).
Balansae *Baill. ex Gagnep. l. c.*—Indo-China (Tonkin; Anam).

NEVSKIELLA Krecz. & Vved. in Acta Univ. As. Med. Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 22 (1934). *GRAMINEAE.*
gracillima (*Bunge*) *Krecz. & Vved. l. c.*: Bromus gracillimus.

NEYRAUDIA Hook. f. (Gramin.).
arundinacea (*L.*) *Henrard in Meded. Herb. Leid.* No. 58, 8 (1929), in obs.: Aristida arundinacea.
Reynaudiana (*Kunth*) *Keng ex Hitchcock in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 131: Arundo Reynaudiana.
Thouarsii *Pilger ex Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. 1. 309 (1931), in syn.: N. madagascariensis.

NICOTIANA L. (Solanac.).
clarionensis *Clausen, Zeitschr. f. Ind. Amstamm.-u. Vererb.* Suppl. 1, 549 (1928); *East, Bibl. Genet.* iv. 249, 251 (1928), nomen; cf. *I. M. Johnston in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 94 (1931), in syn.: N. Stocktoni.
Collae *R. Phil. in Verh. Deutsch. Wiss. Ver. Santiago (Chile)*, ii. 108 (1890), nomen; *et in An. Univ. Chile*, xc. 765 (1895), descr.—Chile.
fatuhivensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 261 (1935).—Ins. Marquesas (Fatuhiva).
Ingulba *J. M. Black in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1933, lvii. 156.—Austral. centr.
nesophila *I. M. Johnston in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 93 (1931).—Mexico (Arch. Revillagigedo).
×Sanderae *Hort. ex Gard. Chron.* 1903, Ser. III. xxxiv. 256.—Hort.
tomentosiformis *Goodspeed in Bot. Gaz.* 1932, xciii. 340, 341, in obs.; *et in Ostenia*, 309 (1933).—Boliv.

NIDORELLA Cass. (Compos.).
Nobrei *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1935, xv. 875.—Ins. C. Verde.

NIDULARIUM Lem. (Bromeliac.).
billbergioides (*Schult. f.*) *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcv. 42 (1931): Hohenbergia billbergioides.
kermesianum *Fritz Muell. ex Ule in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xvi. 359 (1898), nomen; *Mez in Engl. Pflanzenreich, Bromeliac.* 62 (1934), descr.—Bras. (S. Catharina).
princeps (*Baker*) *E. Morr. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 963 (1895): Karatas princeps.
sanguinarium *Hort. ex C. Cheval. in Bull. Soc. Nat. Hort. France*, 1931, Sér. V. iv. 687.—Hort.

NIEMEYERA F. Muell. (Sapotac.).
chartacea (*F. M. Bailey*) *C. T. White in Contrib. Arn. Arb.* No. iv. 87 (1933): Lucuma chartacea.
papuana *H. J. Lam in Nova Guinea*, xiv. 557 (1932).—N. Guin.

NIEREMBERGIA Ruiz & Pav. (Solanac.).
fruticosa *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 738 (1895), in syn.: N. frutescens.

NIGELLA L. (Ranunculac.).
cristata *ex Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. Fasc. suppl. 1, p. 9 (1931), nomen.—Hab.?

NIGRITELLA L. C. Rich. (Orchidac.).
×Kaeseri *Braun-Blanquet in Veröff. Geobot. Inst. Rübel*, vii. 361 (1932).—Helvet.

NIOBE Salisb. (Liliac.).
caerulea (*Andr.*) *Nash in Torreya*, 1911, xi. 7: Hemerocallis caerulea.
Fortunei (*Baker*) *Nash, l. c.*: Funkia Fortunei.

NIOBE:—
japonica (*Thunb.*) *Nash in Torreya*, 1911, xi. 4: Aletris japonica.
plantaginea (*Lam.*) *Nash, l. c.* 3: Hemerocallis plantaginea.
Sieboldiana (*Hook.*) *Nash, l. c.* 6: Funkia Sieboldiana.
undulata (*Otto & Dietr.*) *Nash, l. c.* 5: Funkia undulata.

NIPHAEA Lindl. (Gesneriac.).
alba *Hort. ex Heydt in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1933, xlviii. 243.—Hort.

NIPHOGETON Schlecht. (Umbellif.).
scaber (*H. Wolff*) *Macbride in Candollea*, v. 395 (1934): Oreosciadium scabrum.

NIPPONORCHIS Masamune in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ. xi., Bot. No. 4, 592 (1934): **Finetia** Schlechter (Orchidac.).
falcata (*Thunb.*) *Masamune, l. c.*: Orchis falcata.

NISSOLIA Jacq. (Legumin.).
Hintoni *Sandwith in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3248 (1934).—Mexico.

NISSOLOIDES M. E. Jones, Contrib. West. Bot. No. 18, 135 (1933–5). *LEGUMINOSAE.*
cylindrica *M. E. Jones, l. c.*—Mexico.

NITROPHILA S. Wats. (Chenopodiac.).
atacamensis (*R. Phil.*) *Hieron. ex Ulbr. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 455 (1934): Glaux atacamensis.
densiflora (*R. Phil.*) *Ulbr. l. c.*: Glaux densiflora.
Kunzei *Ulbr. l. c.*—Patag.
mexicana *Ulbr. l. c.*—Mexico.
mucronata (*R. Phil.*) *Ulbr. l. c.*: Glaux mucronata.

NIVENIA R. Br. (Proteac.).
roodebergensis *Compton in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 70.—Afr. austr. (Cape Prov.).

NIVENIA Vent. (Iridac.).
concinna *N. E. Brown in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 267 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
dispar *N. E. Brown, l. c.* 268.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Stokoei (*Guthrie*) *N. E. Brown, l. c.* 267: Aristea Stokoei.

NOGRA Merrill in Trans. Am. Phil. Soc. n. s. xxiv. 11. 201 (1935): **Grona** Benth. & Hook. f. Gen. Pl. i. 535 (1865), non Lour. (Legumin.).
Dalzellii (*Baker*) *Merrill, l. c.*: Grona Dalzellii.
filicaulis (*Kurz*) *Merrill, l. c.*: Grona filicaulis.
Grahami (*Wall. ex Benth.*) *Merrill, l. c.*: Glycine Grahami.

NOLANA L. (Nolanac.; Convolvulac., Gen. Pl.).
bracteosa (*R. Phil.*) *R. Phil. in Verh. Deutsch. Wiss. Ver. Santiago (Chile)*, ii. 108 (1890); *Reiche, Fl. Chile*, v. 417 (1910): Sorema bracteosa.
crassulifolia *Poepp. in Froriep, Notiz. Gebiet Natur-u. Heilk.* Ser. I. xxiii. 276 (1829), in adnot.—Chile.
sedifolia *Poepp. l. c.*, in adnot.—Chile.

NOLDEANTHUS Knobl. in Fedde, Repert. xxxviii. 74 (1935). *OLEACEAE.*
angolensis *Knobl. l. c.*—Angola.

NOMAPHILA Blume (Acanthac.).
episcopalis *Benoist in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 600.—Cambodia.

NONATELIA Aubl. (Rubiac.).
hispida *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 187 (1824).—Ind. or. (Assam).

NONEA Medik. (Boraginac.).
palmyrensis (*Post*) *G. Samuelsson in Svensk Bot. Tidskr.* 1935, xxix. 379: Anchusa palmyrensis.

NOPALEA Salm-Dyck (Cactac.).
cochenillifera (*L.*) *Lyons, Plant Names Scientific & Popular*, 261 (1900): Cactus cochenillifer.

NOPALXOCHIA Britton & Rose (Cactac.).
Ackermannii (*Haw.*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 161 (1935): Epiphyllum Ackermannii.

NORANTEA Aubl. (Marcgraviac.; Ternstroemiac., Gen. Pl.).
curva *Macbride in Candollea*, v. 385 (1934).—Peruv.

NORTHEA Hook. f. (Sapotac.).
Hoshinoi *Kanehira in Tropical Woods*, 1932, No. 29, 5, in obs., nomen; *et in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 489, descr.—Ins. Carolin. (Ponape).

NORTHIOPSIS Kanehira, Fl. Micrones. 302 (1933), japonice; Kanehira in Bot. Mag., Tokyo, 1933, xlvii. 677, latine. *SAPOTACEAE.*
Hoshinoi (*Kanehira*) *Kanehira, ll. cc.*: Northia Hoshinoi.

NOSEMA Prain (Labiat.).
cochinchinense (*Lour.*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 343 (1935): Dracocephalum cochinchinense.

NOTELAEA Vent. (Oleac.).
azorica *Tutin in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 101.—Ins. Azor.

NOTHAPHOEBE Blume (Laurac.).
annamensis *A. Cheval. ex H. Liou, Laurac. Chine et Indochine*, 80 (1932).—Indo-China (Anam).
boninensis (*Koidz.*) *Koidz. ex Kamik. in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard.* 1933, iii. 80: Machilus boninensis.
Fargesii *H. Liou, Laurac. Chine et Indochine*, 78 (1932).—China (Szechuan).
Poilanei *H. Liou, l. c.* 77.—Indo-China (Anam).

NOTHOFAGUS Blume (Fagac.; Cupulif., Gen. Pl.).
truncata (*Colenso*) *Cockayne in Bull. N. Zeal. State For. Serv.* No. 4, Pt. I. 21 (1926): Fagus truncata.

NOTHOLIRION Wall. (Liliac.).
campanulatum *Cotton & Stearn in Lily Year-Book*, 1934, 19.—Tibet; Sikkim; Upper Burma; Yunnan.
hyacinthinum (*E. H. Wilson*) *Stapf in Kew Bull.* 1934, 96: Lilium hyacinthinum.
Thomsonianum (*Royle*) *Stapf, l. c.* 95: Lilium Thomsonianum.

NOTHOPEGIA Blume (Anacardiac.).
borneënsis *Ridley in Kew Bull.* 1933, 197.—Borneo.

NOTHOSCORDUM Kunth (Liliac.).
fictile *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 12 (1931).—Peruv.
hirtellum (*Kunth*) *Herter, Ind. Sem. Hort. Montevid.* vii. 12 (1926–7); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 114; *Herter, Fl. Urug. Pl. Vasc.* (*Estud. Bot. Reg. Urug.* iv.) 48 (1931): Triteleia hirtella.
texanum *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 17, 21 (1930).—U.S.A. (Arizona).
tubiflorum (*Rendle*) *Stearn in Kew Bull.* 1931, 107: Allium tubiflorum.

NOTOBUXUS Oliv. (Buxac.; Euphorbiac., Gen. Pl.).
obtusifolius *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 710 (1935).—Tanganyika Terr.

NOTOCACTUS A. Berger (Cactac.).
caespitosus (*Speg.*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 253 (1935): Echinocactus caespitosus.
Graessneri (*K. Schum.*) *A. Berger, Kakteen*, 343 (1929); *Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 257 (1935): Echinocactus Graessneri.
minimus *Frič & Krzg. ex Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 253, in syn.: N. caespitosus.
Mueller-Melchersii *Frič*; *Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 254, 415, descr.—Urug.
Mueller-Moelleri *Frič ex Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 254, in obs., nomen.—Hab. ?
pampeanus (*Speg.*) *A. Berger ex Backeb. & F. M. Knuth, l. c.*, in obs.: Echinocactus pampeanus.
rubriflorus *Hort. ex Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* —Urug.
submammulosus (*Lem.*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 255: Echinocactus submammulosus.
Velenovskii *Frič*; *Backeb. l. c.*, descr.—Urug.

NOTONIA DC. (Compos.).
Bequaerti *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 444 (1932).—Congo Belg.
Dalzielii *Hutchinson in Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 149 (1931).—Nigeria.
lunulata (*Chiov.*) *Chiov. Fl. Somala*, II. 268 (1932), cum descr. ampl.: Monadenium lunulatum.
shevaroyensis *Fyson in Journ. Ind. Bot. Soc.* 1932, xi. 49.—Ind. or. (Madras).

NOTONIA :—
urundiensis *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 443 (1932). —Congo Belg.

NOTOPLEURA (Benth. & Hook. f.) Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl. 1934, xxxi. 289, 290. *RUBIACEAE.*
[PSYCHOTRIA sect. NOTOPLEURA Benth. & Hook. f.]
longissima (*Standley*) *Bremek. l. c.* 290, in obs.: Psychotria longissima.
micayensis (*Standley*) *Bremek. l. c.*, in obs.: Psychotria micayensis.
tapajozensis (*Standley*) *Bremek. l. c.*, in obs.: Psychotria tapajozensis.
uliginosa (*Sw.*) *Bremek. l. c.*, in obs.: Psychotria uliginosa.

NOTOTRICHE Turcz. (Malvac.).
armeriifolia *A. W. Hill in Kew Bull.* 1935, 160.—Peruv.
caesia *A. W. Hill, l. c.* 1933, 486.—Argent.
candaravica *Ulbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 531 (1932).—Peruv.
coactilis *A. W. Hill in Kew Bull.* 1932, 78.—Boliv.
foetida *Ulbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 530 (1932).—Peruv.
leucosphaera *A. W. Hill in Kew Bull.* 1932, 78.—Boliv.
nivea *A. W. Hill, l. c.* 79.—Boliv.
rosulata *A. W. Hill, l. c.* 1933, 485.—Argent.
ticsanica *Ulbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 531 (1932).—Peruv.
Trollii *Ulbr. l. c.* 532.—Boliv.
violacea *A. W. Hill in Kew Bull.* 1932, 79.—Boliv.
Werdermannii *Ulbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 529 (1932).—Chile.

NOTOTRICHIUM Hillebr. (Amaranthac.).
fulvum *Schinz in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 142.—Ins. Sandvic.

NOTYLIA Lindl. (Orchidac.).
Bernoullii *Schlechter ex Mansf. in Fedde, Repert. Beih.* lix. 6, t. 81, fig. 321 (1931), sine descr.—Am. centr.
sagittifera *Link, Klotzsch & Otto, Ic. Pl. Rar. Hort. Berol.* i. 43, t. 18 (1840): N. multiflora *Lindl.*

NOULETIA Endl. Gen. 1407, No. 4124/1 (1839). *BIGNONIACEAE.*

NOVOSIEVERSIA Bolle in Fedde, Repert. Beih. lxxii. 23 (1933). *ROSACEAE.*
glacialis (*Adams*) *Bolle, l. c.*: Geum glaciale.

NOYERA Tréc. (Morac.; Urticac., Gen. Pl.).
glabrifolia *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 722.—Bras. (Amaz.).

NUIHONIA Dop in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, 1931, lxi. 182. *ERICACEAE.*
sclerantha *Dop, l. c.* 183.—Indo-China (Anam).

NUPHAR Sm. (Nymphaeac.).
bombycinum (*G. S. Mill. & Standley*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 311 (1931): Nymphaea bombycina.
chartaceum (*G. S. Mill. & Standley*) *Standley, l. c.*: Nymphaea chartacea.
fluviatile (*Harper*) *Standley, l. c.*: Nymphaea fluviatilis.
fraternum (*G. S. Mill. & Standley*) *Standley, l. c.* 310: Nymphaea fraterna.
ludovicianum (*G. S. Mill. & Standley*) *Standley, l. c.* 311: Nymphaea ludoviciana.
microcarpum (*G. S. Mill. & Standley*) *Standley, l. c.*: Nymphaea microcarpa.
oguraënse *Miki in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 334.—Japon. (Hondo).
orbiculatum (*Small*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 311 (1931): Nymphaea orbiculata.
ovatum (*G. S. Mill. & Standley*) *Standley, l. c.*: Nymphaea ovata.
ozarkanum (*G. S. Mill. & Standley*) *Standley, l. c.* 310: Nymphaea ozarkana.
puberulum (*G. S. Mill. & Standley*) *Standley, l. c.* 311: Nymphaea puberula.

NUPHAR :—
subintegerinum *Miki in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 334, sphalm.: N. subintergerrimum.
ulvaceum (*G. S. Mill. & Standley*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist. Chicago*, Bot. Ser., viii. 311 (1931): Nymphaea ulvacea.

NUXIA Comm. (Loganiac.).
Siebenlistii *Gilg in Siebenlist, Forstw. Deutsch-Ostafr.* 113 (1914).—Tanganyika Terr.

NYCTELEA Scop. (Hydrophyllac.).
americana *Moldenke in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1932, lix. 155: Ellisia Nyctelea.
membranacea (*Benth.*) *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 42: Ellisia membranacea.
Torreyi (*A. Gray*) *Tidestr. l. c.*: Ellisia Torreyi.

NYCTICALANTHUS Ducke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xi. 341 (1932). *RUTACEAE.*
speciosus *Ducke, l. c.*—Bras. (Amaz.).

NYMPHAEA L. (Nymphaeac.).
Burttii *Pring & R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1933, xx. 1.—Afr. trop.
×cultorum *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 358 (1924).—Hort.
Daubeniana *Hort. ex O. Thomas in Journ. Hort.* 1885, Ser. III. xi. 362 (1886).—Hab. ?
divaricata *Hutchinson in Kew Bull.* 1931, 246.—N. Rhodesia.
primulina *Hutchinson, l. c.* 245.—N. Rhodesia.
Vernayi *Bremek. & Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xvi. 412 (1935).—Bechuanaland Protect.

NYMPHOZANTHUS L. C. Rich. (Nymphaeac.).
ozarkanus (*G. S. Mill. & Standley*) *Palmer & Steyerm. in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1935, xxii. 538: Nymphaea ozarkana.

O

OBERONIA Lindl. (Orchidac.).
Acarus *Evrard ex Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 168.—Indo-China (Anam).
Bellii *Blatter & McCann in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxv. 256 (1931).—Ind. or. (Bombay).
brachyphylla *Blatter & McCann, l. c.* 257.—Ind. or. (Bombay).
dalatensis *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 168.—Indo-China (Anam).
fallax *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 22 (1935). —N. Guin.
gigantea *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 295.—Formosa.
japenensis *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 168 (1934).—N. Guin.
langbianensis *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 168.—Indo-China (Anam).
Latifii *J. J. Smith in Gard. Bull. Straits Settlements*, ix. 89 (1935).—Sumatra.
lingmalensis *Blatter & McCann in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxv. 255 (1931).—Ind. or. (Bombay).
longhutensis *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 119 (1931).—Borneo.
Makinoi *Masamune in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* xi., Bot. No. 4, 583 (1934): O. japonica f. major *Makino.*
plumea *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 23 (1935). —N. Guin.
pterorachis *Tso in Sunyatsenia*, i. 135 (1933).—China (Kwangtung).
reversidens *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 21 (1935).—N. Guin.
Sedgwickii *Blatter & McCann in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxv. 257 (1931).—Ind. or. (Bombay).
spiralis *Blatter & McCann, l. c.* 256.—Ind. or. (Bombay).
umbonata *Blatter & McCann, l. c.* 259.—Ind. or. (Bombay).
watuwilensis *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxv. 471 (1933).—Celebes.

OBIONE Gaertn. (Chenopodiac.).
alexandrina (*Boiss.*) *Ulbr. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 506 (1934): Atriplex alexandrina.

OBIONE :—
angustifolia (*R. Phil.*) *Ulbr. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 508 (1934): Atriplex angustifolia.
atacamensis (*R. Phil.*) *Ulbr. l. c.*: Atriplex atacamensis.
axillaris (*R. Phil.*) *Ulbr. l. c.*: Atriplex axillaris.
Cachiyuyu (*F. Kurtz*) *Ulbr. l. c.*: Atriplex Cachiyuyu.
ceratophylla (*Kuntze*) *Ulbr. l. c.*: Atriplex ceratophylla.
chilensis (*Colla*) *Ulbr. l. c.*: Atriplex chilensis.
clivicola (*I. M. Johnston*) *Ulbr. l. c.*: Atriplex clivicola.
cordulata (*Jepson*) *Ulbr. l. c.* 506: Atriplex cordulata.
coronata (*S. Wats.*) *Ulbr. l. c.* 507: Atriplex coronata.
corrugata (*S. Wats.*) *Ulbr. l. c.* 508: Atriplex corrugata.
crystallina (*Ehrenb.*) *Ulbr. l. c.* 506: Atriplex crystallina.
decumbens (*S. Wats.*) *Ulbr. l. c.* 507: Atriplex decumbens.
flabellum (*Bunge ex Boiss.*) *Ulbr. l. c.* 506: Atriplex flabellum.
fruticulosa (*Jepson*) *Ulbr. l. c.* 507: Atriplex fruticulosa.
glaucescens (*R. Phil.*) *Ulbr. l. c.* 508: Atriplex glaucescens.
graciliflora (*M. E. Jones*) *Ulbr. l. c.* 507: Atriplex graciliflora.
hypsophila (*I. M. Johnston*) *Ulbr. l. c.*: Atriplex hypsophila.
Hystrix (*R. Phil.*) *Ulbr. l. c.* 508: Atriplex Hystrix.
julacea (*S. Wats.*) *Ulbr. l. c.*: Atriplex julacea.
leucoclada (*Boiss.*) *Ulbr. l. c.* 506: Atriplex leucoclada.
Lorentzii (*Kuntze*) *Hieron. ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 266 (1898), in syn.; *Ulbr. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 508 (1934): Atriplex Lorentzii.
macrostyla (*Speg.*) *Ulbr. l. c.*: Atriplex macrostyla.
Madariagae (*R. Phil.*) *Ulbr. l. c.*: Atriplex Madariagae.
moneta (*Bunge ex Boiss.*) *Ulbr. l. c.* 506: Atriplex moneta.
mucronata (*R. Phil.*) *Ulbr. l. c.* 508: Atriplex mucronata.
myriophylla (*R. Phil.*) *Ulbr. l. c.*: Atriplex myriophylla.
obovata (*Moq.*) *Ulbr. l. c.*: Atriplex obovata.
oppositifolia (*S. Wats.*) *Ulbr. l. c.*: Atriplex oppositifolia.
pamparum (*Griseb.*) *Ulbr. l. c.*: Atriplex pamparum.
Parishii (*S. Wats.*) *Ulbr. l. c.* 507: Atriplex Parishii.
Parryi (*S. Wats.*) *Ulbr. l. c.* 508: Atriplex Parryi.
pentandra (*Jacq.*) *Ulbr. l. c.* 507: Axyris pentandra.
podocarpa (*R. Phil.*) *Ulbr. l. c.* 508: Atriplex podocarpa.
polyphylla (*R. Phil.*) *Ulbr. l. c.*: Atriplex polyphylla.
Powelli (*S. Wats.*) *Ulbr. l. c.* 507: Atriplex Powellii.
Reichei (*Volkens ex Dusén*) *Ulbr. l. c.* 508: Atriplex Reichei.
retusa (*Remy*) *Ulbr. l. c.*: Atriplex retusa.
saccaria (*S. Wats.*) *Ulbr. l. c.* 507: Atriplex saccaria.
sagittifolia (*Speg.*) *Ulbr. l. c.* 508: Atriplex sagittifolia.
spinifera (*Macbride*) *Ulbr. l. c.*: Atriplex spinifera.
taltalensis (*I. M. Johnston*) *Ulbr. l. c.*: Atriplex taltalensis.
tenuissima (*A. Nelson*) *Ulbr. l. c.* 507: Atriplex tenuissima.
transandina (*I. M. Johnston*) *Ulbr. l. c.* 508: Atriplex transandina.
tularensis (*Coville*) *Ulbr. l. c.* 507: Atriplex tularensis.
vulgatissima (*Speg.*) *Ulbr. l. c.* 508: Atriplex vulgatissima.
Wolfi (*S. Wats.*) *Ulbr. l. c.* 507: Atriplex Wolfi.
Wrightii (*S. Wats.*) *Ulbr. l. c.*: Atriplex Wrightii.

OCEANOPAPAVER Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France, 1932, lxxix. 226. *PAPAVERACEAE.*
neo-caledonicum *Guillaumin, l. c.*—N. Caled.

OCHAGAVIA R. Phil. (Bromeliac.).
carnea (*Beer*) *L. B. Smith & Looser in Rev. Univ. Chile*, xviii. 1078 (1934): Bromelia carnea.

OCHAGAVIA :—
Chamissonis (*Mez*) *L. B. Smith & Looser in Rev. Univ. Chile*, xviii. 1078 (1934): Rhodostachys Chamissonis.
grandiflora (*R. Phil.*) *Mez in Engl. Pflanzenreich, Bromeliac.* 206 (1935): Rhodostachys grandiflorus.
Leiboldiana (*Mez*) *L. B. Smith & Looser in Rev. Univ. Chile*, xviii. 1078 (1934): Rhodostachys Leiboldianus.
Lindleyana (*Lem.*) *Mez in Engl. Pflanzenreich, Bromeliac.* 204 (1935): Bromelia Lindleyana.

OCHLANDRA Thwait. (Gramin.).
Perrieri *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1935, lxxxii. 310.—Madag.
scriptoria (*Dennst.*) *C. E. C. Fischer in Gamble, Fl. Madras*, 1863 (1934); *et in Kew Bull.* 1935, 149, in obs.: Bambusa scriptoria.
Wightii (*Munro*) *C. E. C. Fischer, l. c.* 1864; *et l. c.*, in obs.: Bambusa Wightii.

OCHNA Schreb. (Ochnac.).
inermis (*Forsk.*) *Schweinf. Arab. Pfl. Aegypt. Alger. & Jemen*, 148 (1912): Euonymus inermis.
insculpta *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 68 (1934).—Kenya Col.
integerrima (*Lour.*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 11, 265 (1935): Elaeocarpus integerrimus.
keniensis *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 69 (1934).—Kenya Col.
Stolzii *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 480 (1921), in obs.; *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 69 (1934), descr. ampl.—Tanganyika Terr.

OCHRADENUS Delile (Resedac.).
somalensis *Baker; Chiov. Fl. Somala*, II. 12 (1932), descr. ampl.—Somaliland.

OCHROCARPOS Thou. Hist. Vég. Isles Austr. Afr. ed. 2, t. 26, cum anal. (1805); Thou. Gen. Nov. Madag. 15 (1806); Sprague in Kew Bull. 1934, 90. *GUTTIFERAE.*
madagascariensis *DC.; Sprague, l. c.* 89, descr. ampl.—Madag.

OCHROSIA Juss. (Apocynac.).
alyxioides *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 18.—N. Hebrides.
novo-caledonica *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1933, lxxviii. Beibl. 19, 385.—N. Caled.
silvatica *Däniker, l. c.* 386.—N. Caled.

OCHTHOCOSMUS Benth. (Linac.).
Gillettae *Hutchinson in Kew Bull.* 1931, 249.—N. Rhodesia.

OCIMUM L. (Labiat.).
Chevalieri *Briq. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 279 (1917).—Afr. Gall. Centr.
cyclophyllum (*Chiov.*) *Chiov. Fl. Somala*, II. 367 (1932), in ic.: Becium affine var. cyclophyllum.
villosum *Forsk. Fl. Aegypt.-Arab.* cxv. No. 369 (1775): O. Zatarhendi var. *β. Forsk. l. c.* 110.

OCOTEA Aubl. (Laurac.).
arenaënsis *Brooks in Leafl. For. Dep., Trinidad & Tobago*, No. 4, pp. 19, 23, 43 (1931), nomen; *et in Kew Bull.* 1933, 217, descr.—Trinidad.
campechiana *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 56 (1935).—Guatem.; Brit. Honduras.
Cufodontisii *O. C. Schmidt in Archiv. Bot., Forli*, 1935, n. s. i. 50.—Costa Rica.
cuneata (*Nees*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 18 (1931): Oreodaphne cuneata.
duidensis *Moldenke in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 363.—Venez.
esmeraldana *Moldenke, l. c.* 362.—Venez.
Froesii *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1934, lxi. 191.—Bras. (Maranhão).
glaucophylla *Moldenke in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 364.—Venez.
jumbillensis *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxxi. 182 (1933).—Peruv.
Keriana *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 104.—Peruv.
Killipii *A. C. Smith, l. c.* 108.—Peruv.
licanioides *A. C. Smith, l. c.* 107.—Peruv.
Lundellii *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 56 (1935).—Guatem.; Brit. Honduras.

OCOTEA :—
Meziana *Brooks in Leafl. For. Dep., Trinidad & Tobago*, No. 4, pp. 19, 23, 43 (1931), nomen.—Trinidad; Tobago.
munacensis *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxxi. 185 (1933).—Peruv.
olivacea *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 105.—Peruv.
Ottoschmidtii *Macbride in Candollea*, v. 355 (1934): O. Weberbaueri *O. C. Schmidt.*
otuzcensis *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxxi. 183 (1933).—Peruv.
Poeppigiana (*Nees*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 18 (1931): Oreodaphne Poeppigiana.
Raimondii *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxxi. 184 (1933).—Peruv.
revoluta *Moldenke in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 365.—Venez.
Smithiana *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxxi. 182 (1933).—Colomb.
sublanuginosa (*Nees*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 19 (1931): Oreodaphne sublanuginosa.
tenella *A. C. Smith in Phytologia*, i. 119 (1935).—Bras. (Amaz.).
tomentella *Sandwith in Kew Bull.* 1935, 130.—Guiana Brit.
trinitatis *Brooks in Leafl. For. Dep., Trinidad & Tobago*, No. 4, pp. 19, 24, 43 (1931), nomen.—Trinidad; Tobago ?
venosa *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 365.—Venez.
Weberbaueri *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxxi. 181 (1933).—Peruv.

OCTARRHENA Thwait. (Orchidac.).
flava *Carr in Journ. As. Soc. Mal.* xi. 97 (1933).—Sumatra.
hastipetala *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxv. 499 (1933).—Celebes.

OCTODON Thonn. (Rubiac.).
Bequaerti *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 432 (1932), in syn.: Borreria Bequaerti.

OCTOKNEMA Pierre (Olacac.).
aruwimiensis *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 661 (1932).—Congo Belg.
orientalis *Mildbr. l. c.* 660.—Tanganyika Terr.

OCTOLEPIS Oliv. (Thymelaeac.).
Pierreana *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 628 (1921), in obs.—Gabon.

OCTOMERIA R. Br. (Orchidac.).
Beyrodtiana *Schlechter ex Mansf. in Fedde, Repert. Beih.* lviii. t. 38, fig. 149 (1930), sine descr.—Am. austr.
Duckei *A. J. Sampaio, List. Orch. Herv. Mus. Nac., Rio de Janeiro*, 25 (1923), nomen.—Bras. (Rio de Janeiro).
erosilabia *C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* iii. 85 (1935).—Guiana Brit.
exigua *C. Schweinf. l. c.* 86.—Guiana Brit.
hondurensis *Ames in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* i. No. 4, 1 (1933).—Honduras.
integrilabia *C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* iii. 87 (1935).—Guiana Brit.
minor *C. Schweinf. l. c.* 89.—Guiana Brit.
parvula *C. Schweinf. l. c.* 90.—Guiana Brit.

ODINA Roxb. (Anacardiac.).
minimifolia *Chiov. Fl. Somala*, II. 154 (1932).—Somal. Ital.

ODONTADENIA Benth. (Apocynac.).
affinis *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1931, xviii. 549.—Peruv.
anomala (*Huerck & Muell.-Arg.*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 35 (1931): Anisolobus anomalus.
augusta *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1931, xviii. 548.—Peruv.
cognata (*Stadelm.*) *R. E. Woodson, l. c.* 546: Echites cognata.
cordigera *R. E. Woodson, l. c.* 1935, xxii. 282.—Peruv.
funigera *R. E. Woodson, l. c.* 274.—Bras. (Amaz.).
glauca *R. E. Woodson, l. c.* 1931, xviii. 550.—Venez.

ODONTADENIA :—
gracilipes (*Stadelm.*) *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1935, xxii. 294: Echites gracilipes.
Hoffmannseggiana (*Steud.*) *R. E. Woodson in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 392: Echites Hoffmannseggiana.
Killipii *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1931, xviii. 546.—Peruv.
lauretiana *R. E. Woodson & Steyerm. l. c.* 1935, xxii. 289.—Peruv.
laxiflora (*Rusby*) *R. E. Woodson, l. c.* 1932, xix. 386: Laubertia laxiflora.
neglecta *R. E. Woodson, l. c.* 1935, xxii. 277.—Bras. (Amaz.).
Perrottetii (*A. DC.*) *R. E. Woodson, l. c.* 1931, xviii. 546: Anisolobus Perrottetii.
polyneura (*Urb.*) *R. E. Woodson, l. c.*: Rhabdadenia polyneura.
Sandwithiana *R. E. Woodson, l. c.* 547.—Guiana Brit.
Schippii *R. E. Woodson, l. c.* 1935, xxii. 292.—Brit. Honduras.
stemmadeniifolia *R. E. Woodson, l. c.* 1931, xviii. 548.—Peruv.
surinamensis *R. E. Woodson, l. c.* 1935, xxii. 276.—Guiana Bat.
verrucosa (*Roem. & Schult.*) *K. Schum. ex Markgraf in Pulle, Fl. Surinam,* iv. (*Meded. K. Ver. Kol. Inst. Amst.* xxx.) 53 (1932), in obs.: Echites verrucosa.

ODONTITES Zinn, Cat. Pl. Gott. 289 (1757); Boehm. in Ludw. Def. Gen. Pl. ed. 3, 126 (1760); Haller, Hist. Stirp. Helv. i. 134 (1768); Moench, Meth. 439 (1794); Sprague in Kew Bull. 1934, 219. *SCROPHULARIACEAE.*
estonica *Nenjukov in Ann. Soc. Nat. Univ. Tartu.* 1934, xli. 316 (1935), in obs., nomen.—Esthonia.
mesatlantica *Emberger & Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord,* 1931, xxii. 58.—Marocc.
pyrenaea (*Bubani*) *Rothmaler in Cavanillesia,* vii. 120 (1935): Euphrasia pyrenaea.
Rameauana *Emberger in Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc,* 1932, No. xxxiii. 41 (1933).—Marocc.

ODONTOGLOSSUM H. B. & K. (Orchidac.).
cochlearilabre *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1931, Sér. II. iii. 174.—Hab.?
mapiriense *Mansf. in Fedde, Repert.* xxxvi. 62 (1934).—Boliv.

ODONTONYCHIA Small (Caryophyllac.).
interior *Small, Man. Southeast. Fl.* 483 (1933).—U.S.A. (Florida).

ODONTOPHORUS N. E. Brown (Ficoidac.).
albus *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. ii. 490 (1935).—Little Namaq.
Herrei *L. Bolus, l. c.* 491.—Little Namaq.

ODONTOSTEPHANA Alexander in Small, Man. Southeast. Fl. 1076 (1933). *ASCLEPIADACEAE.*
Baldwyniana (*Sweet*) *Alexander, l. c.* 1077: Gonolobus Baldwynianus.
carolinensis (*Jacq.*) *Alexander, l. c.*: Cynanchum carolinense.
decipiens *Alexander, l. c.*—U.S.A. (E. States).
flavidula (*Chapm.*) *Alexander, l. c.* 1078: Gonolobus flavidulus.
floridana (*Vail*) *Alexander, l. c.*: Vincetoxicum floridanum.
obliqua (*Jacq.*) *Alexander, l. c.* 1077: Cynanchum obliquum.
Shortii (*A. Gray*) *Alexander, l. c.*: Gonolobus Shortii.

OEDEMATOPUS Planch. & Triana (Guttif.).
duidae *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 406.—Venez.

OENANTHE L. (Umbellif.).
benghalensis *Kurz in Journ. As. Soc. Beng.* xlvi. ii. 115 (1877), in clavi.—Ind. or.
Kudoi *Suzuki & Yamamoto in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa,* 1932, xxii. 408.—Formosa.
maroccana *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1928, No. 297 [1929].—Marocc.
Normanii *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 517 (1934).—China (Fokien).

OENANTHE :—
palustris (*Chiov.*) *C. Norman in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 135: Stephanorossia palustris.
procumbens (*H. Wolff*) *C. Norman, l. c.* 1932, lxx. 140: Volkensiella procumbens.
Uhligii (*H. Wolff*) *C. Norman, l. c.*: Peucedanum Uhligii.

OENOCARPUS Mart. (Palmae).
Dryanderae *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 865 (1933).—Colomb.
grandis *Burret, l. c.* xii. 612 (1935).—Bras. (Amaz.).
Hoppii *Burret, l. c.* xi. 1041 (1934).—Bras. (Pará) cult.
iriartoides *Karst. & Triana in Triana, Nuev. Jen. i Esp. Fl. Neo-Granad.* 15 (1854); *Sprague in Kew Bull.* 1934, 395, 397.—Colomb.
macrocalyx *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 1043 (1934).—Bras. (Matto Grosso).
panamanus *L. H. Bailey, Gentes Herbarum,* iii. 71 (1933).—Panamá.

OENOSTACHYS Bullock (Iridac.).
abyssinicus (*A. Brongn.*) *N. E. Brown in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xx. 280 (1932): Antholyza abyssinica.

OENOTHERA L. (Onagrac.).
ammophiloides *Gates & Catcheside in Journ. Linn. Soc., Bot.* xlix. 180 (1933).—Canada (Nova Scotia).
Bertolonii *B. Wells in Journ. Roy. Hort. Soc.* 1935, lx. 485, in obs.—Hab.?
candida *Bellardi ex Colla, Herb. Pedem.* ii. 383 (1834).—Hab.?
Cockerelli *H. H. Bartlett ex de Vries, Gruppenw. Artb. Oenoth.* 56 (1913).—U.S.A. (Colorado).
deserticola (*Loes.*) *Munz in Am. Journ. Bot.* 1932, xix. 758: Xylopleurum deserticola.
Engelmanni (*Wooton & Standley*) *Munz, l. c.* 1931, xviii. 316: Anogra Engelmanni.
grandis (*Britton*) *Rydb. Fl. Prairies & Plains Centr. N. Amer.* 573 (1932): O. laciniata var. grandis.
guttata (*Greene*) *Gates in Journ. Linn. Soc., Bot.* xlix. 183 (1933): Onagra guttata.
kernensis *Munz in Am. Journ. Bot.* 1931, xviii. 737.—U.S.A. (Calif.).
Kunthiana (*Spach*) *Munz, l. c.* 1932, xix. 759: Hartmannia Kunthiana.
latifolia (*Rydb.*) *Munz, l. c.* 1931, xviii. 321: Anogra latifolia.
neomexicana (*Small*) *Munz, l. c.* 317: Anogra neomexicana.
Parodiana *Munz in Physis,* xi. 283 (1933); *et in Am. Journ. Bot.* 1935, xxii. 662, latine.—Argent.; Parag.; Urug.
phlebophylla *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 41: Chylismia venosa *A. Nelson & Kennedy,* non Oenothera venosa *Shull & Bartlett.*
Purpusii *Munz in Am. Journ. Bot.* 1932, xix. 759.—Mexico.
runcinata (*Engelm.*) *Munz, l. c.* 1931, xviii. 323: O. albicaulis var. runcinata.
Rydbergii *House in Bull. N. Y. State Mus.* 1920, Nos. 233–4, 61 (1921): Onagra strigosa.
simplex (*Small*) *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 41: Anogra simplex.
subglobosa (*Small*) *Weatherby & Griscom in Rhodora,* 1934, xxxvi. 48: Kneiffia subglobosa.
taraxacoides (*Wooton & Standley*) *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 41: Lavauxia taraxacoides.
Toumeyi (*Small*) *Tidestr. l. c.*: Galpinsia Toumeyi.
Veitchiana *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.,* ed. 3, *Sieb. & Voss,* i. 330 (1894), in syn.: O. Bistorta.
Veitchiana (*Small*) *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 41: Sphaerostigma Veitchianum.
Victorini *Gates & Catcheside in Journ. Linn. Soc., Bot.* xlix. 182 (1933).—Canada (Quebec).
Watsoni *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 41: O. brevipes var. parviflora *S. Wats.,* non O. parviflora *L.*

OFTIA Adans. (Myoporac.).
glabra *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 309 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).

OGCODEIA Bureau (Morac.; Urticac., Gen. Pl.).
acreana *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 421 (1932).—Am. austr. (Rio Acre).

OGCODEIA :—
caloneura (*Huber*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., xi. 17 (1931): Olmedia caloneura.
glabra (*Spruce ex Pittier*) *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 418 (1932), cum descr.: Naucleopsis glabra.
guianensis *Mildbr. l. c.* 422.—Guiana Brit.
Naga (*Pittier*) *Mildbr. l. c.* 420: Naucleopsis Naga.
pseudo-Naga *Mildbr. l. c.* 419.—Am. austr. (Rio Acre).
Sandwithiana *Mildbr. l. c.* 422, cum descr. ampl.: Duguetia glabra.
Tamamuri *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., xi. 64 (1931).—Peruv.
Ulei (*Warb.*) *Macbride, l. c.* 16: Acanthosphaera Ulei.
venosa *Ducke ex Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 423 (1932); *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1932, Sér. II. iv. 720.—Bras. (Amaz.).

OISTANTHERA Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xii. 547, 550 (1935). *APOCYNACEAE.*
Telfairiana (*Wall.*) *Markgraf, l. c.* 547: Tabernaemontana Telfairiana.

OLAX L. (Olacac.).
imbricata *Roxb. Hort. Beng.* 5 (1814), nomen; *Fl. Ind.,* ed. *Carey & Wall.,* i. 169 (1820); *Fl. Ind.,* ed. *Carey,* i. 164 (1832).—Ind. or. (Bengal).
laxiflora *Ridley in Kew Bull.* 1931, 34.—Ins. Kei.
multiflora *Ridley, l. c.*—Celebes.
pentandra *Sleum. in Fedde, Repert.* xxxviii. 208 (1935).—Tanganyika Terr.
rosea *Ridley in Kew Bull.* 1931, 33.—Borneo.

OLDENLANDIA L. (Rubiac.).
alata *Koen. ex Roxb. Hort. Beng.* 11 (1814), nomen; *Fl. Ind.,* ed. *Carey & Wall.,* i. 442 (1820); *Fl. Ind.,* ed. *Carey,* i. 421 (1832).—Ind. or.
assimilis (*Tutcher*) *Chun in Sunyatsenia,* i. 310 (1934): Hedyotis assimilis.
Bodinieri (*Léveillé*) *Chun, l. c.*: Hedyotis Bodinieri.
chrysotricha (*Palib.*) *Chun, l. c.* 311: Anotis chrysotricha.
clausa *Blatter in Journ. & Proc. As. Soc. Beng.* 1930, n. s. xxvi. 343 (1931).—Ind. or. (Rajputana).
comata *Craib in Kew Bull.* 1931, 441.—Siam.
confusa *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 130, in clavi, 131 (1931).—Senegal; Togo; Cameroons.
cryptantha (*Dunn*) *Chun in Sunyatsenia,* i. 311 (1934): Hedyotis cryptantha.
crystallina *Roxb. Hort. Beng.* 11 (1814), nomen; *Fl. Ind.,* ed. *Carey & Wall.,* i. 443 (1820); *Fl. Ind.,* ed. *Carey,* i. 422 (1832).—Ind. or. (Bengal).
diffusa (*Willd.*) *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 444; *et l. c.* 423: Hedyotis diffusa.
Dusenii *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., viii. 343 (1931).—Bras. (Paraná).
Esquirolii (*Léveillé*) *Chun in Sunyatsenia,* i. 311 (1934): Hedyotis Esquirolii.
glabra (*Honda*) *Honda in Bot. Mag., Tokyo,* 1933, xlvii. 297: O. hirsuta var. glabra.
gracilipes *Craib in Kew Bull.* 1931, 441.—Siam.
hainanensis *Chun in Sunyatsenia,* i. 311 (1934): Hedyotis oligantha *Merrill* (1923).
herbacea (*Willd.*) *Roxb. Hort. Beng.* 11 (1814), nomen; *Fl. Ind.,* ed. *Carey & Wall.,* i. 445 (1820); *Fl. Ind.,* ed. *Carey,* i. 424 (1832): Hedyotis herbacea.
Lakshnakarae *Craib in Kew Bull.* 1931, 442.—Siam.
lanceolata *Craib, l. c.*—Siam.
Leclercii *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1933, Sér. II. v. 162.—Sahara.
leopoldvillensis *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 427 (1932).—Congo Belg.
longipetala (*Merrill*) *Chun in Sunyatsenia,* i. 312 (1934): Hedyotis longipetala.
Mairei (*Léveillé*) *Chun, l. c.*: Hedyotis Mairei.
Marcanii *Craib in Kew Bull.* 1931, 443.—Siam.
Matthewii (*Dunn*) *Chun in Sunyatsenia,* i. 312 (1934): Hedyotis Matthewii.
Mellii (*Tutcher*) *Chun, l. c.* 313: Hedyotis Mellii.
nigrescens *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. a. No. 4, 36 (1932).—Santo Domingo.

OLDENLANDIA :—
oligantha (*Merrill*) *Chun in Sunyatsenia*, i. 313 (1934): Hedyotis oligantha.
paridiflora (*Dunn*) *Chun*, *l. c.*: Hedyotis paridiflora.
parva *J. Troch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 604.—Senegal.
platystipula (*Merrill*) *Chun in Sunyatsenia*, i. 313 (1934): Hedyotis platystipula.
psammophila *Chiov. Fl. Somala*, II. 232 (1932).—Somal. Ital.
pulcherrima (*Dunn*) *Chun in Sunyatsenia*, i. 314 (1934): Hedyotis pulcherrima.
ramosa *Roxb. Hort. Beng.* 11 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 445 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 424 (1832).—Burma.
rutshuruensis *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 428 (1932).—Congo Belg.
sarcophylla *Chiov. Fl. Somala*, II. 233 (1932).—Somal. Ital.
scopulorum *Bullock in Kew Bull.* 1932, 497.—Afr. trop. or. (Elgon).
Sedgwickii *Blatter in Journ. & Proc. As. Soc. Beng.* 1930, n. s. xxvi. 344 (1931).—Ind. or. (N. Kanara).
viarum *Craib in Kew Bull.* 1931, 443.—Siam.
Wulsinii (*Merrill*) *Chun in Sunyatsenia*, i. 314 (1934): Hedyotis Wulsinii.
yakusimensis *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1931, iii. 393.—Japon.
yunnanensis (*Léveillé*) *Chun in Sunyatsenia*, i. 314 (1934): Hedyotis yunnanensis.
zoutpansbergensis *Bremek. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 257 (1933).—Transvaal.

OLEA L. (Oleac.).
dioica *Roxb. Hort. Beng.* 3 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 105 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 106 (1832).—Ind. or.
Gagnepainii *Knobl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1028 (1934): O. macrophylla *Gagnep.*
guineënsis *Hutchinson & C. A. Smith in Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 26 (1931).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
kilimandscharica *Knobl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 200 (1934).—Tanganyika Terr.
macrophylla *Gagnep. in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1075 (1933).—Indo-China (Laos).
Mildbraedii (*Gilg & Schellenb.*) *Knobl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 673 (1932): Campanolea Mildbraedii.
paniculata *Roxb. Hort. Beng.* 80 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 104 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 105 (1832).—Ind. or. (Madras).
Pervilleana *Knobl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1027 (1934).—Madag.
Schliebenii *Knobl. l. c.* xii. 199 (1934).—Tanganyika Terr.

OLEARIA Moench (Compos.).
boorabbinensis *Hochr. in Candollea*, v. 305 (1934).—W. Austral.
lepidota *Mattf. in Nova Guinea*, xiv. 520 (1932).—N. Guin.
platyphylla *Mattf. l. c.* 519.—N. Guin.
rapae *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 337 (1935).—Polynes. (Ins. Rapa).

OLIGANTHES Cass. (Compos.).
vernonioides (*Kunth*) *Mattf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 687 (1935): Pollalesta vernonioides.

OLIGONEURON Small (Compos.).
Jacksonianum *Small, Man. Southeast. Fl.* 1509 (1933), sphalm.: O. Jacksonii.
Jacksonii (*Kuntze*) *Small, l. c.* 1361: Aster Jacksonii.
Riddellii (*Frank*) *Rydb. Fl. Prairies & Plains Centr. N. Amer.* 799 (1932): Solidago Riddellii.

OLINIA Thunb. (Oliniac.; Lythrac., Gen. Pl.).
abyssinica *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 624 (1921), in obs., nomen.—Hab. ?
discolor *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 669 (1932).—Tanganyika Terr.

OMPHALEA L. (Euphorbiac.).
guyanensis *Klotzsch ex Lanj. Euphorbiac. Surinam*, 163 (1931); *et in Pulle, Fl. Surinam*, ii. (*Meded. K. Ver. Kol. Inst. Amst.* xxx.) 77 (1932), pro syn.: O. diandra.

OMPHALOCARPUM Beauv. (Sapotac.).
pachysteloides *Mildbr. ex Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 13 (1931).—Sierra Leone; Cameroons.

OMPHALODES Mill. (Boraginac.).
ciliaris (*Bur. & Franch.*) *A. Brand in Engl. Pflanzenreich, Borrag.-Borraginoid.-Cryptanth.* 25 (1931): Schistocaryum ciliare.
erecta *I. M. Johnston in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 204.—Mexico.
Omphaloides (*L.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 693 (1895): Cynoglossum Omphaloides.

OMPHALOLAPPULA A. Brand in Engl. Pflanzenreich, Borrag.-Borraginoid.-Cryptanth. 135 (1931). *BORAGINACEAE.*
concava (*F. Muell.*) *A. Brand*, *l. c.*: Echinospermum concavum.

ONAGRA Mill. (Onagrac.).
guttata *Greene ex Gates, Mutat. Factor Evol.* 30 (1915), in obs.—U.S.A. (N. Mexico.).

ONCELLA Van Tiegh. (Loranthac.).
curviramea (*Engl.*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 97 (1933): Loranthus curvirameus.
poecilobotrys (*Werth*) *Danser*, *l. c.*: Loranthus poecilobotrys.

ONCIDIUM Sw. (Orchidac.).
Hoehneanum *Schlechter ex Mansf. in Fedde, Repert. Beih.* lviii. 5 (1930), in syn.: O. Zikanianum.
hondurense *Ames in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* i. No. 5, 1 (1933).—Honduras.

ONCOBA Forsk. (Flacourtiac.; Bixac., Gen. Pl.).
micrantha *Gilg in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 565 (1921), in obs.—Congo Belg.

ONCOCALYX Van Tiegh. (Loranthac.).
rhamnifolius (*Engl.*) *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France*, 1895, xlii. 258, 740: Loranthus rhamnifolius.

ONCODOSTIGMA Diels (Annonac.).
Wilsonii *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 224.—N. Hebrides.

ONCOSTYLUS (Schlecht.) Bolle in Fedde, Repert. Beih. lxxii. 27 (1933). *ROSACEAE.*
[GEUM sect. ONCOSTYLUS Schlecht.]
albiflorus (*Hook. f.*) *Bolle*, *l. c.* 30: Sieversia albiflora.
Cockaynei *Bolle*, *l. c.*: Geum parviflorum *Kirk, Students' Fl. N. Zel.* 129 (1898), non *Sm.*
divergens (*Cheesem.*) *Bolle*, *l. c.* 29: Geum divergens.
involucratus (*Juss. ex Pers.*) *Bolle*, *l. c.* 31: Geum involucratum.
Lechlerianus (*Schlecht.*) *Bolle*, *l. c.* 32: Geum Lechlerianum.
leiospermus (*Petrie*) *Bolle*, *l. c.* 30: Geum leiospermum.
pusillus (*Petrie*) *Bolle*, *l. c.* 31: Geum pusillum.
renifolius (*F. Muell.*) *Bolle*, *l. c.* 28: Geum renifolium.
uniflorus (*J. Buch.*) *Bolle*, *l. c.* 29: Geum uniflorum.

ONOBRYCHIS Mill. (Legumin.).
bertiscea *Širjaev & K. H. Rechinger in Fedde, Repert.* xxxviii. 325 (1935).—Albania.
calabrica *Širjaev in Bull. Soc. Bot. Bulgar.* iv. 10 (1931).—Ital.
Gaubae *Bornm. in Fedde, Repert.* xxxix. 114 (1935).—Persia.
Krausei *Širjaev in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 379 (1932).—As. Min. (Cappadocia).
lasistanica *Širjaev in Bull. Soc. Bot. Bulgar.* iv. 14 (1931).—Hab. ?
Mairei *Širjaev*, *l. c.* 11.—Algeria.
Senneni *Širjaev*, *l. c.* 9.—Hab. ?
spinescens *Bornm. & Gauba in Fedde, Repert.* xxxix. 115 (1935), in obs.—Persia.

ONONIS L. (Legumin.).
Bullonii *Emberger & Maire ex Širjaev in Beih. Bot. Centralbl.* xlix. II. 634 (1932), in syn.: O. cephalantha.
Candeliana *Maire*; *Emberger & Maire in Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc*, xi. Nos. 4–6, 95 (1931).—Marocc.

ONONIS :—
Chevalieri *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 146 [1933], nomen.—Marocc.
curtipendula *Salzm. ex Širjaev in Beih. Bot. Centralbl.* xlix. II. 534 (1932), in syn.: O. cintrana.
Doerfleri *Hal. ex Širjaev*, *l. c.* 517, in syn.: O. Verae
inclusa *Hort. ex Colla, Herb. Pedem.* ii. 82 (1834).—Hab. ?
Jahandiezii *Maire & Weiller in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 41.—Marocc.
Krausei *Širjaev in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 380 (1932).—As. Min.
Loberae *Sennen in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1932, xxiii. 272, in obs., nomen.—Marocc.
marocana *Battand. & Pitard in Pitard, Contrib. Étude Fl. Maroc*, II (1918).—Marocc.
orygalis *Boiss. & Reut. ex Širjaev in Beih. Bot. Centralbl.* xlix. II. 539 (1932), in syn.: O. Reuteri.
pedicellaris *Širjaev in Fedde, Repert.* xxxvi. 388 (1934).—Marocc.
penduliflora *Pau in Font Quer, Iter Marocc.* 1930, No. 325 [1932].—Marocc.
pseudocephalantha *Emberger & Maire*; *Emberger & Maire in Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc* xi. Nos. 4–6, 96 (1931).—Marocc.
pseudo-serotina *Battand. & Pitard in Pitard, Contrib. Étude Fl. Maroc*, 12 (1918).—Marocc.
remotiflora *Pau ex Širjaev in Beih. Bot. Centralbl.* xlix. II. 559 (1932), in syn.: O. hispida subsp. arborescens *Širjaev.*
Schousboei *Coss. ex Pitard*; *Pitard, Contrib. Étude Fl. Maroc*, 13 (1918), descr.—Marocc.
simulata *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1928, No. 182 [1929].—Marocc.
stenophylla *Coss. ex Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc*, ii. 374 (1932), nomen.—Marocc.
Verae *Širjaev in Beih. Bot. Centralbl.* xlix. II. 517 (1932).—Marocc.; Creta.
zygantha *Maire & Wilczek in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1935, xxvi. 128.—Marocc.

ONOPORDON L. (Compos.).
kerkeranum *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 67 [1933], nomen.—Marocc.
lanuginosum (*Woronow*) *Sosn. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 191 (1934).—Caucas.
mesatlanticum *Emberger & Maire*; *Emberger & Maire in Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc*, Nos. xxi.–xxii. 40 (1930).—Marocc.
Murbeckii *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 165 (1932).—Marocc.
murcicum *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 99.—Hispan.

ONOSMA L. (Boraginac.).
afghanica *Bornm. in Engl. Jahrb.* lxvi. 234 (1934).—Afghan.
angustissima *Hausskn. & Bornm. in Magyar Bot. Lap.* 1931, xxx. 71.—As. Min. (Paphlagonia).
bracteata *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 13 (1824).—Kashmir.
bracteosa *Hausskn. & Bornm.*; *Bornm. in Magyar Bot. Lap.* 1931, xxx. 73, descr. emend. et ampl.—As. Min.
Briquetii *Czecz. in Acta Soc. Bot. Polon.* 1932, ix. 42.—As. Min. (Paphlagonia).
decumbens *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 704 (1895), in syn.: Arnebia decumbens.
deserticola *Bornm. in Magyar Bot. Lap.* 1931, xxx. 77.—As. Min. (Paphlagonia).
discedens *Hausskn. & Bornm. l. c.* 78.—Armen. Turc.
Drenowskii *Degen & Javorka in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 74.—Bulgar.
emodi *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 11 (1824).—Nepal.
irrigans *Popov in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 19, 29 (1935).—Turkestan. (Mons. Alatau).
maroccana *Pau in Font Quer, Iter Marocc.* 1930, No. 538 [1932].—Marocc.
paphlagonica *Bornm. in Magyar Bot. Lap.* 1931, xxx. 75.—As. Min.

ONYCHOPETALUM R. E. Fries in Acta Hort. Berg. x. 148 (1931). *ANNONACEAE.*
amazonicum *R. E. Fries*, *l. c.* 149.—Bras. (Pará).

OÖCARPON Micheli (Onagrac.).
torulosum (*Arn.*) *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 28 (1931): Jussiaea torulosa.

OPERCULINA Silva Manso (Convolvulac.).
passifloroides (*Benth. ex Meissn.*) *Ducke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 474 (1932): Maripa passifloroides.
sericantha (*Miq.*) *v. Ooststr. in Pulle, Fl. Surinam*, iv. (*Meded. K. Ver. Kol. Inst. Amst.* xxx.) 87 (1932): Ipomoea sericantha.

OPHIOCEPHALUS Wiggins in Contrib. Dudley Herb. Stanford Univ. i. 175 (1933). *SCROPHULARIACEAE.*
angustifolius *Wiggins, l. c.* 176.—Calif. infer.

OPHIOPOGON Ker-Gawl. (Liliac.; Haemodorac., Gen. Pl.).
formosanus *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 45 (1934), in syn.: Mondo formosanum.
humilis *L. Rodrig. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 95.—Cambodia.
peliosanthifolius *L. Rodrig. l. c.*—Indo-China (Laos).
platyphyllus *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 211 (1935).—China (Hainan).
scaber *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 46 (1934), in syn.: Mondo scabrum.
stenophyllus (*Merrill*) *L. Rodrig. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 95: Peliosanthes stenophylla.

OPHIORRHIZA L. (Rubiac.).
aggregata *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 60 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 137, descr. ampl.—Siam.
alata *Craib, l. c.* 61; *Craib, l. c.* 138, descr. ampl.—Siam.
angkae *Craib, ll. cc.*, descr. ampl.—Siam.
approximata *Craib, l. c.*; *Craib, l. c.* 139, descr. ampl.—Siam.
argostemmoides *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3254 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
bambusetorum *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 62 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 139, descr. ampl.—Siam.
bicolor *Craib, l. c.*; *Craib, l. c.* 140, descr. ampl.—Siam.
bicolor *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3211 (1934), non praec.—Ins. Philipp. (Luzon).
calcarea *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 63 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 141, descr. ampl.—Siam.
ciliata *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3256 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
condensa *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 64 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 141, descr. ampl.—Siam.
Hayatana *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 57 (1934): O. stenophylla *Hayata*.
inaequifolia *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3257 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
kratensis *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 65 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 142, descr. ampl.—Siam.
longifolia *Craib, l. c.* 66; *Craib, l. c.*, descr. ampl.—Siam.
longipes *Craib, l. c.*; *Craib, l. c.* 143, descr. ampl.—Siam.
longituba *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 44 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
maquilingensis *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3258 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
membranacea *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 67 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 143, descr. ampl.—Siam.
oblonga *Craib, l. c.*; *Craib, l. c.* 144, descr. ampl.—Siam.
patula *Craib, ll. cc.*, descr. ampl.—Siam.
plumbea *Craib, l. c.* 68; *Craib, l. c.* 145, descr. ampl.—Siam.
pseudoinconspicua *Hochr. in Candollea*, v. 248 (1934).—Java.
Ridleyana *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 69 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 145, descr. ampl.—Siam.
Ridleyi *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 198 (1934): O. bracteata *Ridley*.

OPHIORRHIZA :—
ripicola *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 69 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 146, descr. ampl.—Siam.
rugosa *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 547 (1824).—Nepal.
Schmidtiana *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 70 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 147, descr. ampl.—Siam.
sorsogonensis *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3260 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
subaequalis *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 71 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 147, descr. ampl.—Siam.
subpunicea *Craib, l. c.*; *Craib, l. c.* 148, descr. ampl.—Siam.
tomentosa *Jack ex Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 546 (1824).—Sumatra; Penins. Mal.
villosa *Roxb. Hort. Beng.* 85 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 546 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 702 (1832).—Ind. or.
zambalensis *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3212 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).

OPHIORRHIZIPHYLLON Kurz (Acanthac.).
hypoleucum (*Benoist*) *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iv. 637 (1935): Staurogyne hypoleuca.
Poilanei *Benoist, l. c.*—Indo-China (Laos).

OPHIURUS Gaertn. f. (Gramin.).
cochinchinensis (*Lour.*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 39, in obs., 72 (1935): Phleum cochinchinense.

OPHRYS L. (Orchidac.).
algerica *Fleischm. ex G. Keller in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. iii. t. 12, fig. 2a. (1931), sine descr.—Alger.
×anomala *Renz in Fedde, Repert.* xxx. 109 (1932).—Creta.
×argentariensis *Ruppert in Fedde, Repert.* xxxi. 381 (1933).—Ital.
asiatica *G. Keller in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. iii. t. 14, fig. 3 (1931), sine descr.—Hab. ?
×Bourlieri *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 315.—Alger.
caucasica *Woronow*; *Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 261 (1928), descr. ross.—Caucas.
×devenensis *Chouard in Bull. Sc. Bourg.* ii. 83–6 (1932); *P. Fourn. in Le Monde des Plantes*, 1934, xxxv. 14.—Gallia.
Dyris *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 65.—Marocc.
×Hoeppneri *Ruppert in Fedde, Repert.* xxxi. 382 (1933).—Ital.
mimnolea *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxvi. 78 (1934).—As. Min. (Lydia).
monrealensis *G. Keller ex G. Keller & Soó in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 51 (1931), in obs., hybr. ?—Sicil.
Passionis *Sennen in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xv. Ser. Bot. No. 1, 35 (1931), in obs., nomen.—Hispan.
×Pouyannei *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 315.—Alger.
taurica (*Aggéenko*) *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, iv. 728 (1935): O. aranifera var. taurica.

OPHTHALMOPHYLLUM Dinter & Schwantes (Ficoidac.).
Caroli (*Lavis*) *Tisch. in Kakteenk.* 1935, 86, in obs.: Conophytum Caroli.
Dinteri *Schwantes ex Jacobsen, Succ. Pl.* 226 (1935).—Hab. ?
Fulleri *Lavis in L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 472 (1934).—Bushmanland.
Herrei *Lavis, l. c.* Pt. II. 473 (1935).—Namaq.
Jacobsenianum *Schwantes ex Jacobsen, Succ. Pl.* 228 (1935).—Hab. ?
Maughanii (*N. E. Brown*) *Schwantes ex Jacobsen, l. c.*: Conophytum Maughanii.
Pillansii *L. Bolus ex Jacobsen, l. c.*—Hab. ?
praesectum (*N. E. Brown*) *Schwantes ex Jacobsen, l. c.*: Conophytum praesectum.
Schlechteri *Schwantes ex Jacobsen, Sukkulent.* 168 (1933); *Schwantes ex Jacobsen, Succ. Pl.* 228 (1935).—Hab. ?
Schuldtii *Schwantes ex Jacobsen, Succ. Pl.* 229 (1935).—Namaq.
Triebneri *Schwantes ex Jacobsen, l. c.*—Hab. ?

OPHTHALMOPHYLLUM:—
verrucosum *Lavis in L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 473 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).

OPILIA Roxb. (Opiliac.; Olacac., Gen. Pl.).
obovata *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. Anhang, 12 (1932).—Tanganyika Terr.
parviflora *Volk. ex Peter, l. c.* xl. II. 147, nomen.—Tanganyika Terr.
Stapfiana (*Hutchinson & Dalziel*) *Sleum. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi b. 38 (1935): Urobotrya Stapfiana.

OPLISMENUS Beauv. (Gramin.).
anomalus *Mez ex Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. I. 220 (1931), in clavi.—Tanganyika Terr.
Volkensii (*Pilger*) *Mez ex Peter, l. c.* 222: Acritochaete Volkensii.

OPOPANAX Koch (Umbellif.).
armeniacus *Bordz. in Fedde, Repert.* xxx. 378 (1932).—Armen.
armenus *Fisch. & Mey. ex Bordz. l. c.* 379, in obs.—Armen.

OPULASTER Medik. (Rosac.).
ribesifolius *Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 202 (1932), nomen alternativ.—Sibir. (Marit. Prov.); Corea.

OPUNTIA Mill. (Cactac.).
acaulis *Ekman & Werderm. in Fedde, Repert.* xxix. 230 (1931).—Hispaniola.
albisaetacens *Backeb. in Cactus Journ.* ii. 33 (1933), in obs.; *et in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 127, 411 (1935), descr.—Boliv.
albisetosa *Hildm. ex Hirscht in Monatsschr. Kakteenk.* 1900, x. 48, in obs., pro syn.: O. sulphurea.
albispinosa *Mieckley ex Lindemuth & Dams in Monatsschr. Kakteenk.* 1904, xiv. 178, in obs., nomen.—Boliv.
alpicola *K. Schum. ex Dams in Monatsschr. Kakteenk.* 1903, xiii. 95, in obs.—Chile.
arkansana *Engelm. ex Hirscht in Monatsschr. Kakteenk.* 1898, viii. 115, in obs., nomen.—Hab. ?
atrocapensis *Small, Man. Southeast. Fl.* 905 (1933).—U.S.A. (Florida).
atroviridis *Werderm. & Backeb. in Backeb. Neue Kakteen*, 63 (1931); *et in Fedde, Repert.* xxx. 59 (1932).—Peruv.
aurea *Baxter in Cact. & Succ. Journ. Amer.* v. 489 (1933).—U.S.A. (Utah).
balearica *Weber ex Hirscht in Monatsschr. Kakteenk.* 1898, viii. 175, in obs., pro syn.: O. inermis.
barbata *K. Brandegee ex Purpus in Monatsschr. Kakteenk.* 1900, x. 97, in obs.—U.S.A. (Utah).
boliviensis *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 128, 411 (1935).—Boliv.
Bravoana *Baxter apud Eastwood in Cact. & Succ. Journ. Amer.* v. 436 (1933); *Baxter in An. Inst. Biol. Mexico*, 1933, iv. 149.—Calif. infer.
Camachoi *Espinosa in Rev. Chil. Hist. Nat.* 1933, xxxvii. 126.—Chile.
Camuessa *Weber ex Bois, Dict. Hort.* 895 (1898), in syn.: O. robusta.
carrizalensis *R. Phil. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.*, Nachtr., 152 (1903), pro syn.: O. Geissei.
catingicola *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 223 (1934).—Bras. (Bahia).
Cedergreniana *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 128, 411 (1935).—Argent.
corallicola (*Small*) *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen*, 66 (1931): Consolea corallicola.
cumulicola *Small, Man. Southeast. Fl.* 907 (1933).—U.S.A. (Florida).
deserta *D. Griff. in Monatsschr. Kakteenk.* 1913, xxiii. 132.—U.S.A. (S. W. States).
diplacantha *Hort. ex A. Berger, Hort. Mortol.* 232 (1912), nomen.—Mexico ?
Echios *Howell in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xxi. 49 (1933): O. myriacantha *Weber*.
Ekmanii *Werderm. in Fedde, Repert.* xxix. 225 (1931).—Hispaniola.
erecta *Hort. ex K. Schum. in Monatsschr. Kakteenk.* 1901, xi. 181, in obs., nomen.—Hab. ?
erectoclada *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 128, 411 (1935).—Argent.
falcata *Ekman & Werderm. in Fedde, Repert.* xxix. 228 (1931).—Hispaniola.

OPUNTIA :—
geometrica *Castellanos in Kakteenk.* 1934, 172.—Argent.
gorda *D. Griff. in Monatsschr. Kakteenk.* 1913, xxiii. 134.—Mexico.
Greenii *Engelm. ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 431 (1896), in syn.: O. mesacantha.
Hattoniana *Britton & Rose in Johnston & Tryon, Rep. Prickly Pear Comm.* 97 (1914).—Santo Domingo.
Hitchcocki *G. Ortega, Apuntes Fl. Indig. Sinaloa,* Fam. Cact. C. [No. 12] (1929).—Mexico.
hypogaea *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen,* 64 (1931); *et in Fedde, Repert.* xxx. 59 (1932).—Argent.
icterica *D. Griff. in Monatsschr. Kakteenk.* 1913, xxiii. 138.—Mexico.
Kuehnrichiana *Werderm. & Backeb. in Backeb. Neue Kakteen,* 64 (1931); *et in Fedde, Repert.* xxx. 59 (1932).—Peruv.
Kuehnrichii *Backeb. in Cact. & Succ. Journ. Amer.* iii. 132 (1932), in obs.: O. Kuehnrichiana?
Labouretiana *Hort. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* 717 (1898), in obs.—Hort.
lagunae *Baxter apud Bravo in An. Inst. Biol. Mexico,* 1932, iii. 181.—Calif. infer.
Ledienii *Hort. ex A. Berger, Hort. Mortol.* 233 (1912): O. Bergeriana.
Lemaireana *Console ex Bois, Dict. Hort.* 894 (1898).—Hab.?
magnifica *Small, Man. Southeast. Fl.* 910 (1933).—U.S.A. (Florida).
margaritana (*Coult.*) *Baxter in Journ. Cact. & Succ. Soc. Amer.* ii. 388 (1931): O. pycnantha var. margaritana.
Maxoni *G. Ortega, Apuntes Fl. Indig. Sinaloa,* Fam. Cact. C. [No. 11] (1929).—Mexico.
megasperma *Howell in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xxi. 46 (1933).—Ins. Galapag.
micrarthra *D. Griff. in Monatsschr. Kakteenk.* 1913, xxiii. 130.—Mexico.
Miquelii *Monv. in Hort. Univ.* i. 218 (1839).—Chile.
Moelleri *A. Berger, Kakteen,* 57 (1929); *Y. Wright in Cact. & Succ. Journ. Amer.* iv. 282 (1932), descr. ampl.—Mexico.
Molfinoi (*Speg.*) *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen,* 65 (1931): Maihueniopsis Molfinoi.
nemoralis *D. Griff. in Monatsschr. Kakteenk.* 1913, xxiii. 133.—U.S.A. (Texas).
nitens *Small, Man. Southeast. Fl.* 906 (1933).—U.S.A. (Florida).
oplocarpa *Engelm. ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 431 (1896), in syn.: O. mesacantha.
Parkeri *Engelm. ex Coult. l. c.* 446, in syn.: O. echinocarpa.
parva *A. Berger, Hort. Mortol.* 234 (1912).—Am. trop.
Piccolominiana *Parl. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* 741 (1898), in syn.: O. robusta.
polycarpa *Small, Man. Southeast. Fl.* 906 (1933).—U.S.A. (Florida).
recondita *D. Griff. in Monatsschr. Kakteenk.* 1913, xxiii. 131.—Mexico.
Rileyi *G. Ortega, Apuntes Fl. Indig. Sinaloa,* Fam. Cact. C. [No. 8] (1929).—Mexico.
riojana *Hosseus ex Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 429, indice, 113 (1935), in syn.: Tephrocactus riojanus.
Robinsoni *G. Ortega, Apuntes Fl. Indig. Sinaloa,* Fam. Cact. C. [No. 10] (1929).—Mexico.
Ruthei *Hort. ex A. Berger, Hort. Mortol.* 235 (1912).—Mexico.
santamaria *Baxter in Cact. & Succ. Journ. Amer.* iv. 283 (1932), in obs.—Calif. infer. (Ins. Magdalena).
saxicola *Howell in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xxi. 45 (1933).—Ins. Galapag.
silvestris *Backeb. in Cactus Journ.* i. 7 (1932).—Am. austr.
Spraguei *G. Ortega, Apuntes Fl. Indig. Sinaloa,* Fam. Cact. C. [No. 6] (1929).—Mexico.
stipata (*Coult.*) *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* 679, 830 (1898): O. leptocaulis var. stipata.
subinermis *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 8, [p. 6].—Boliv.

OPUNTIA :—
tenuiflora *Small, Man. Southeast. Fl.* 908 (1933).—U.S.A. (Florida).
tilcarensis *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 128, 411 (1935).—Argent.
tribuloides *D. Griff. in Monatsschr. Kakteenk.* 1913, xxiii. 137.—Mexico.
turbinata *Small, Man. Southeast. Fl.* 910 (1933).—U.S.A. (Georgia; Florida).
Tweediei *Hort. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* 745 (1898), in syn.: O. sulphurea.
Udonis *Weing. in Kakteenk.* 1933, 71.—Peruv.
undosa *D. Griff. in Monatsschr. Kakteenk.* 1913, xxiii. 139: O. undulata *D. Griff.*
Urbaniana *Werderm. in Fedde, Repert.* xxix. 229 (1931).—Hispaniola.
verticosa *Weing. in Kakteenk.* 1933, 72.—Peruv.
Weingartiana *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 8, [p. 4].—Boliv.
Whitneyana *Baxter, Calif. Cactus,* 37 (1935).—U.S.A. (Calif.).
zacana *Howell in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xxi. 48 (1933).—Ins. Galapag.

ORANIA Zippel (Palmae).
disticha *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xii. 321 (1935).—N. Guin.

ORBIGNYA Mart. (Palmae).
Barbosiana *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 690 (1932): O. speciosa *Barb. Rodr.* (1903).
Cohune (*Mart.*) *Dahlgren apud Standley in Tropical Woods,* 1932, No. 30, 3: Attalea Cohune.
polysticha *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 324 (1932).—Peruv.

×**ORCHI-ACERAS** E. G. Camus (Orchidac.).
[ACERAS × ORCHIS.]
bispurium *G. Keller in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 113 (1931).—Helvet.
Bivonae (*Todaro*) *Soó in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 111 (1931): Orchis Bivonae.

×**ORCHICOELOGLOSSUM** Aschers. & Graebn. (Orchidac.).
[COELOGLOSSUM × ORCHIS.]
Kaspari *Domin in Preslia,* xiii–xv. 50 (1935).—Czechoslovak.
Kellerianum *Duffort ex G. Keller & Soó in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 299 (1935), in obs., et in adnot.—Gallia.
Shakespeareanum *G. Keller, l. c.* 298, in obs.—Anglia.
turcestanicum *G. Keller & Soó, l. c.* 299.—Turkestan.

×**ORCHIDANACAMPTIS** Labrie in Guétrot, Pl. Hybr. France, 1926, ii. 51 (1927); E. G. & A. Camus, Icon. Orch. Eur. 521 (1929). *ORCHIDACEAE.*
[ANACAMPTIS × ORCHIS.]
Guetroti *Labrie, l. c.*; *E. G. & A. Camus, l. c.*—Gallia.

ORCHIDANTHA N. E. Brown (Musac.).
calcarea *M. R. Henderson in Gard. Bull. Straits Settlements,* vii. 125 (1933).—Penins. Mal.

×**ORCHIGYMNADENIA** E. G. Camus (Orchidac.).
[GYMNADENIA × ORCHIS.]
Dowalli *G. Keller ex G. Keller & Soó in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 284 (1935), in syn.: O. Wintoni.
Fuchsii *G. Keller & Soó, l. c.* 283.—Alpes.
gracilis (*A. Camus*) *G. Keller & Soó, l. c.*: O. Heinzeliana var. gracilis.
Jeanjeanii *G. Keller, l. c.* 285.—Gallia.
reserata (*Pau*) *Soó in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 284 (1935): Orchis reserata.
St.-Quintinii *Godfery, Monogr. Brit. Orchid.* 145 (1933).—Anglia.
Zollikoferi (*Stoyanoff*) *G. Keller & Soó in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 285 (1935): Orchis Zollikoferi.

×**ORCHIMANTOGLOSSUM** Aschers. & Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. iii. 799 (1907): **Lorogl-Orchis** E. G. Camus (Orchidac.).
[HIMANTOGLOSSUM × ORCHIS.]
Lacazei (*E. G. Camus*) *Aschers. & Graebn. l. c.*: Lorogl-Orchis Lacazei.

ORCHIPEDUM Breda, Kuhl & Hass. (Orchidac.).
Wenzelii (*Ames*) *J. J. Smith in Blumea,* i. 214 (1934), in obs.: Adenostylis Wenzelii.

ORCHIS L. (Orchidac.).
×adriatica *Soó in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 142, in obs., 193 (1932).—Yugoslav.; Ins. Corfu.
africana *Klinge in Acta Hort. Petrop.* xvii. 1. 156, in clavi, 186 (1898).—Eur. austr. occ.; Afr. bor.
alpestris *Pugsley in Journ. Linn. Soc., Bot.* xlix. 587 (1935).—Eur. centr.
altaica (*Reichb. f.*) *Soó in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 214 (1933): O. incarnata subvar. altaica.
amblyoloba *Nevski in Komarov, Fl. URSS,* iv. 707, 753 (1935).—Caucas.
×argentarii *G. Keller ex G. Keller & Soó in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 154 (1932), in obs.—Ital.
×Aschersoni (*Rouy*) *Soó, l. c.* 188: O. Nicodemi var. Aschersoni.
baltica *Klinge in Acta Hort. Petrop.* xvii. 1. 153, in clavi, 170 (1898).—Eur.; Asia.
×Beckeriana *Höppn. ex G. Keller & Soó in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 251, 258 (1933).—German.
×bispuria *G. Keller, l. c.* ii. 113 (1931), nomen alternativ.—Helvet.
Bruhnsiana (*Gruner*) *Majorov ex Grossheim, Fl. Kavkaza,* i. 263 (1928): O. papilionacea var. Bruhnsiana.
×Burolletiana *Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc,* iii. 872 (1934).—Marocc.
Cartaliniae *Klinge in Acta Hort. Petrop.* xvii. 1. 158, in clavi, 196 (1898).—Reg. Caucas.; Armen.; Persia.
caucasica (*Klinge*) *Klinge, l. c.* 155, in clavi, 181: O. cordigera var. caucasica.
×Cerii *Guadagno in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1922, n. s. xxix. 66 (1923).—Ital. (Ins. Capri).
×Christii *G. Keller in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 194 (1932).—Ital.
cilicica *Klinge in Acta Hort. Petrop.* xvii. 1. 156, in clavi, 187 (1898): O. incarnata var. olocheilos *Boiss.*
×Curtisii *Druce in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles,* 1931, ix. 669 (1932).—Anglia.
×Danguyana *P. Fourn. in Bull. Soc. Bot. France,* 1931, lxxviii. 434.—Gallia.
×Dubreuilhi *G. Keller & Jeanjean in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 253 (1933).—Gallia.
Elisabethae *G. Keller ex G. Keller & Soó in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 190 (1932), in syn.: O. Penzigiana.
euxina *Nevski in Komarov, Fl. URSS,* iv. 709 (1935): O. cordigera *Kraenzl. in Fedde, Repert. Beih.* lxv. 39 (1931), non *Fries.*
georgica *Klinge in Acta Hort. Petrop.* xvii. 1. 151, in clavi, 166 (1898).—Reg. Caucas.; Persia?
×Godferyana *Soó in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 257 (1933).—Anglia.
×gracilis *Höppn. ex G. Keller & Soó, l. c.* 252.—German.
×Guffroyi *P. Fourn. in Bull. Soc. Bot. France,* 1931, lxxviii. 434.—Gallia.
holocheilos *G. Keller & Soó in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 228 (1933): O. olocheilos.
hungarica *Pant. ex G. Keller & Soó, l. c.* 227, in syn.: O. cordigera f. Rochelii *Klinge.*
instabilis *G. Keller ex G. Keller & Soó, l. c.* 252, in syn.: O. Thellungiana.
×jailae *Soó, l. c.* ii. 190 (1932).—Crimea.
×kabyliensis *G. Keller in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 260 (1933).—Alger.
Kellerii *Hunziker ex G. Keller & Soó, l. c.* ii. 166 (1932), in obs., pro syn.: O. fallax.
×Krylowi *Soó, l. c.* ii. 211 (1933), in obs.—Sibir. occ.
Kunihikoana *Masamune & Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo,* 1935, xlix. 663.—Formosa.
×Lamarquei *G. Keller & Jeanjean in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 260 (1933).—Gallia.
lancibractea *Grossheim, Fl. Kavkaza,* i. 269 (1928); *Nevski in Komarov, Fl. URSS,* iv. 708 (1935), in syn.: O. triphylla.
leucoglossa *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxvi. 76 (1934).—As. Min. (Lydia).
×ligustica *Ruppert in Fedde, Repert.* xxxi. 374 (1933).—Ital.

ORCHIS :—
×Litardierei *Ruppert & Lebrun in Fedde, Repert.* xxxv. 104 (1934).—Corsica.
×Magyari *Soó in Bot. Közl.* 1934, xxxi. 227 (1935).—Hungar.
Maireana *G. Keller ex G. Keller & Soó in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 167 (1932), in syn.: O. patens var. atlantica *Battand. & Trab.*
maurusia *Emberger & Maire*; *Emberger & Maire in Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc*, xi. Nos. 4–6, 109 (1931).—Marocc.
×nummiana *P. Fourn. in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 433.—Gallia.
osmanica *Klinge in Acta Hort. Petrop.* xvii. 1. 157, in clavi, 188 (1898).—As. Min.; Caucas.
Palczewskii *Kraenzl. in Fedde, Repert. Beih.* lxv. 45 (1931).—Sibir. or.
pardalina *Pugsley in Journ. Linn. Soc., Bot.* xlix. 581 (1935).—Anglia; Hollandia; Gallia ?
×Peltieri *G. Keller in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 190 (1932).—Alger.
×permixta *Soó in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 196 (1932).—Crimea.
pseudofragrans *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, iv. 682 (1935), in obs.—Hab. ?
Russowii (*Klinge*) *Klinge in Acta Hort. Petrop.* xvii. 1. 154, in clavi, 177 (1898): O. angustifolia var. Russowii.
siciliensis *Klinge, l. c.* 151, in clavi, 165.—Reg. Mediterr.
×sphagnicola *Höppn. ex G. Keller & Soó in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 252, 259 (1933).—German.
×Steegeri *Höppn. ex G. Keller & Soó, l. c.* 252.—German.
taiwanensis *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 290.—Formosa.
takasago-montana *Masamune in Trop. Hort.* iii. 45 (1933); *et in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 206.—Formosa.
×Thellungiana *Braun-Blanquet in Veröff. Geobot. Inst. Rübel*, vii. 349 (1932).—Helvet.
×thriftiensis *Renz in Fedde, Repert.* xxx. 103 (1932).—Creta.
tingitana *Dur. ex G. Keller & Soó in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 230 (1933), in syn.: O. elata.
×tremezzinae *G. Keller, l. c.* ii. 187 (1932).—Ital.
Tschiebozi *G. Keller, l. c.* 196, in syn.: O. Drudei.
turcestanica *Klinge in Acta Hort. Petrop.* xvii. 1. 155, in clavi, 183 (1898).—As. temp.
×Ugrinskyana *Soó in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 186 (1932).—Ross. austr.
×Ulehlae *Podpěra*; *Podpěra apud Soó, l. c.* 199, descr.—Czechoslovak.
vomeracea *Burm. f. in Nov. Act. Phys.-Med. Acad. Nat. Cur.* iv. App., 237 (1770).—Corsica.
×Wulffiana *Soó in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 194 (1932).—Crimea.
zahlensis *Bouloumoy, Fl. Lib. et Syr.* 417 (1930), indice.—Hab. ?
×Zollikoferi *Stoyanoff in Bull. Soc. Bot. Bulgar.* v. 100 (1932).—Bulgar.

×**ORCHISERAPIAS** E. G. Camus (Orchidac.).
[ORCHIS × SERAPIAS.]
Jeanjeanenis [sic] *G. Keller ex Jeanjean in Act. Soc. Linn. Bordeaux*, 1930, lxxxii. Proc.-Verb. 58, in obs., sphalm.: O. Jeanjeanii.
Jeanjeanii *G. Keller in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 102 (1931), pro syn.: O. capitata.
Orphanidesii *G. Keller, l. c.*, in obs.—Graecia.
tremezzinae *G. Keller, l. c.* 104.—Ital.

ORCHYLLIUM Barnh. (Lentibulariac.).
Humboldtii (*Schomb.*) *Barnh. in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 469: Utricularia Humboldtii.
Schimperi (*Schenk*) *Barnh. l. c.*: Utricularia Schimperi.

ORCUTTIA Vasey (Gramin.).
tenuis *Hitchcock in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 131.—U.S.A. (Calif.).

OREACANTHUS Benth. (Acanthac.).
montifuga *Milne-Redhead in Hook. Ic. Pl.* xxxii. t. 3197 (1933).—N. Rhodesia.
Schliebenii *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 824 (1933).—Tanganyika Terr.

OREOBLITON Durieu (Chenopodiac.).
Cardosoi *Boerl. ex A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1935, xv. 1005, in syn.: Beta procumbens.

OREOBOLUS R. Br. (Cyperac.).
distichus (*Ridley*) *Kükenth. & v. Steenis in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 292 (1935), in obs.: Schoenus distichus.

OREOBROMA Howell (Portulacac.).
acaule (*H. B. & K.*) *Rydb. in N. Am. Fl.* xxi. 326 (1932), in obs.: Calandrinia acaulis.
affine (*Gill. & Arn.*) *Rydb. l. c.*, in obs.: Calandrinia affinis.
bernardinum (*Davidson*) *Rydb. l. c.* 325: Lewisia bernardina.
Congdoni *Rydb. l. c.* 322.—U.S.A. (Calif.).
exarticulatum (*St. John*) *Rydb. l. c.* 324: Lewisia exarticulata.
glandulosum *Rydb. l. c.* 325.—U.S.A. (Calif.).
Heckneri *Morton in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1931, xliv. 9.—U.S.A. (Calif.).
Kelloggii (*K. Brandegee*) *Rydb. in N. Am. Fl.* xxi. 326 (1932): Lewisia Kelloggii.
mexicanum *Rydb. l. c.*—Mexico.
yosemitanum (*Jepson*) *Rydb. l. c.*: Lewisia yosemitana.

OREOCARYA Greene (Boraginac.).
Clemensae (*Payson*) *A. Brand in Engl. Pflanzenreich, Borrag.-Borraginoid.-Cryptanth.* 72, 83 (1931): Cryptantha Clemensae.
Williamsii *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 578.—U.S.A. (Utah).

OREOCEREUS Riccob. (Cactac.).
Bruennowii *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 430, indice, 187 (1935), pro syn.: O. Trollii.
fossulatus (*Labour.*) *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 6, [p. 6]; *Backeb. in Kakteenfreund*, iii. 14 (1934); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 143: Pilocereus fossulatus.
Hendriksenianus (*Backeb.*) *Backeb. in Cact. & Succ. Journ. Amer.* v. 438 (1933), in obs.; *Backeb. in Cactus Journ.* ii. 4 (1933), in obs.; *et in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 186, 411 (1935), cum descr.: Cereus Hendriksenianus.

OREOCHARIS Benth. (Gesneriac.).
cinnamomea *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 200 (1934).—China (Yunnan).
elliptica *Anthony, l. c.*—Tibet; Yunnan.
Georgei *Anthony, l. c.* 202.—China (Szechuan; Yunnan).

OREOCNIDE Miq. (Urticac.).
Boniana (*Gagnep.*) *Hand.-Mazz. in Sinensia*, ii. 3 (1931), in obs.: Villebrunea Boniana.
kwangsiensis *Hand.-Mazz. l. c.* 2.—China (Kwangsi).
tremula *Hand.-Mazz. in Beih. Bot. Centralbl.* xlviii. 11. 297 (1931).—China (Kwangsi; Kwangtung).

OREODENDRON C. T. White in Contrib. Arn. Arb. No. iv. 74 (1933). *THYMELAEACEAE.*
biflorum *C. T. White, l. c.*—Austral. (Queensland).

OREOMYRRHIS Endl. (Umbellif.).
gracilis *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1931, iii. 20.—Formosa.
papuana *Buwalda ex v. Steenis in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 255 (1934), nomen.—N. Guin.

OREOPANAX Decne. & Planch. (Araliac.).
apurimacensis *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 288 (1931).—Peruv.
cissoides *Harms, l. c.* xi. 484 (1932).—Peruv.
coriaceus *Decne. & Planch.*; *Harms, l. c.* 485, descr.—Colomb.
crataegodorus *Harms, l. c.* xi. 288 (1931).—Colomb.
cyclophyllus *Harms, l. c.* xi. 486 (1932).—Colomb.
iodophyllus *Harms, l. c.* xi. 289 (1931).—Peruv.
iotrichus *Harms, l. c.* xii. 694 (1935).—Ecuador.
Killipii *Harms, l. c.* xi. 486 (1932).—Colomb.
lachnocephalus *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 77 (1935).—Brit. Honduras.
latissimus *Cufod. in Archiv. Bot., Forlì*, 1933, ix. 198.—Costa Rica.

OREOPANAX :—
oroyanus *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 289 (1931).—Peruv.
Raimondii *Harms, l. c.* 290.—Peruv.
Rosei *Harms, l. c.*—Ecuador.
santanderianus *Harms, l. c.* xi. 486 (1932).—Colomb.
Schimpffii *Harms, l. c.* xii. 695 (1935).—Ecuador.
Schultzei *Harms, l. c.* xi. 291 (1931).—Colomb.
simplicifolius *Hort. ex C. Schroeter in Schweiz. Gart.* No. 7, p. 9 (1931), in obs.—Hort.
thaumasiophyllus *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 291 (1931).—Boliv.
tolimanus *Harms, l. c.* xi. 786 (1933).—Colomb.
Trollii *Harms, l. c.* xi. 292 (1931).—Boliv.
Williamsii *Harms, l. c.* xi. 487 (1932).—Peruv.

OREORCHIS Lindl. (Orchidac.).
bilamellata *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 436.—Formosa.
Ohwii *Fukuyama, l. c.* 1935, xlix. 296.—Formosa.

ORICIOPSIS Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, xix a. 308 (1931). *RUTACEAE.*
glaberrima *Engl. l. c.*—Cameroons.

×**ORIGANOMAJORANA** Domin in Preslia, xiii–xv. 197 (1935), in adnot. *LABIATAE.*
[MAJORANA × ORIGANUM.]
Applii *Domin, l. c.*, in adnot.—Czechoslovak.

ORIGANUM L. (Labiat.).
×adonidis *Mouterde in Ann. Fac. Franç. Méd. Beyrouth*, No. 6, reimpr. p. 4 (1935).—Syria.
×Barbarae *Bornm. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlviii. 615 (1898).—Libanus.
elegans *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1933, xxxii. 75 (1934).—Hispan.
×Font-Queri *Pau in Font Quer, Iter Marocc.* 1930, No. 578 [1932].—Marocc.
Grosii *Pau & Font Quer in Font Quer, l. c.* 1928, No. 352 [1929].—Marocc.
Paui *Martinez in Mem. Soc. Esp. Hist. Nat.* xiv. 463 (1934).—Hispan.
×symeonis *Mouterde in Ann. Fac. Franç. Méd. Beyrouth*, No. 6, reimpr. p. 3 (1935).—Syria.
tyttanthum *Gontsch. in Delect. Sem. Inst. Bot. Sect. Tadshik. Akad. Sc. URSS*, 12 (1934).—As. centr.

ORINUS Hitchcock in Journ. Wash. Acad. Sc. 1933, xxiii. 136. *GRAMINEAE.*
arenicola *Hitchcock, l. c.*—Kashmir.

ORMENIS Cass. (Compos.).
africana (*Jord. & Fourr.*) *Litard. & Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc*, iii. 765 (1934): Santolina africana.
maialis *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 60 [1933], nomen.—Marocc.

ORMOCARPUM Beauv. (Legumin.).
aromaticum *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1932, lxx. 253.—Tanganyika Terr.
Klainei *Tisserant in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 334, 335.—Cameroons; Gabon.
setosum *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. 11. p. xxviii. 425 (1932).—Afr. Lusit. Or.
trachycarpum (*Taub.*) *Harms in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 609 (1915), in obs.: Diphaca trachycarpa.

ORMOSIA Jacks. (Legumin.).
elliptilimba *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 31 (1934).—China (Hainan).
Getuliana *Kuhlm. & C. Porto in Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro*, vi. 113 (1933).—Bras. (Mons Itatiaia).
pinnata (*Lour.*) *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 12 (1935): Cynometra pinnata.
Taiana *Chiao in Sinensia*, iii. 349 (1933).—China (Kiangsu).
toledoana *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 64 (1935).—Brit. Honduras.

ORNITHOGALUM L. (Liliac.).
aestivum *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1934, xxiv. 50, 55.—Afr. austr. (Cape Prov.).
angustifolium *L. Bolus, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).
arianum *Lipsky ex B. Fedtsch. & al., Fl. Turkm.* i. 306 (1932).—Transcasp.
Brownleei *Leighton in S. Afr. Gard.* 1933, xxiii. 61, 71.—Afr. austr. (Cape Prov.).

ORNITHOGALUM:—
capillifolium *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 80 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
ceresianum *Leighton in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 72.—Afr. austr. (Cape Prov.).
convallarioides *H. Perrier in Lecomte, Not. Syst.* v. 68 (1935).—Madag.
distans *L. Bolus in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 71.—Afr. austr. (Cape Prov.).
excelsum *Diels ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* ii. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 302 (1908), in obs.—Transvaal.
Fergusoniae *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 57, 59.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Fischerianum *Kraschen. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 392 (1935): O. brachystachys *Fisch.*
Hermannii *Leighton in S. Afr. Gard.* 1933, xxiii. 61, 71.—Afr. austr. (Cape Prov.).
inclusum *Leighton, l. c.* 1934, xxiv. 50.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Leipoldtii *L. Bolus in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 71.—Afr. austr. (Cape Prov.).
limosum *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 80 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
magnum *Kraschen. & Schischk. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 391, 743 (1935): O. arcuatum *Boiss. Fl. Or.* v. 215 (1884), non *Stev.*
petraeum *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 81 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
pygmaeum *A. Duthie in Ann. Univ. Stellenb.* 1928, vi. Sect. A, No. 3, p. 2.—Afr. austr. (Cape Prov.).
ranunculoides *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1933, xxiii. 61, 71.—Namaqualand.
Richardii *Leighton in S. Afr. Gard.* 1933, xxiii. 61, 71.—Afr. austr. (Bushmanland).
Schischkini *Kraschen. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 386, 743 (1935).—Transcaucas.
Shelkovnikovi *Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 228 (1928).—Caucas.
splendens *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1931, xxi. 13, in obs., 14.—Afr. austr. (Cape Prov.).
strictum *L. Bolus in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 72.—Afr. austr. (Cape Prov.).
subcoriaceum *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1934, xxiv. 50, 55.—Afr. austr. (Cape Prov.).
transcaucasicum *Misczenko ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 230 (1928).—Caucas.
unifolium *R. A. Dyer in Rec. Albany Mus.* iv. 111 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Vandermerwei *Barnes in S. Afr. Gard.* 1931, xxi. 14.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Watermeyeri *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1931, xxi. 14.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Woronowii *Kraschen. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 384, 743 (1935).—Crimea; Reg. Caucas.

ORNITHOPUS L. (Legumin.).
×compressus *Pau in Mem. Soc. Esp. Hist. Nat.* xii. 316 (1924).—Marocc.

OROBANCHE L. (Orobanchac.).
akiana *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 676.—Japon.
ariana *Gontsch. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 173 (1933).—Ross. asiat. centr.
columbiana *St. John & English in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1931, xliv. 34.—U.S.A. (Washington).
cyanescens *H. Smith in Acta Hort. Gothoburg.* 1933, viii. 130.—China (Szechuan).
Ducellieri *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1932, xxiii. 203.—Alger.
Dugesii (*S. Wats.*) *Munz in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1930, lvii. 613 (1931): Aphyllon Dugesii.
eximia *H. Smith in Acta Hort. Gothoburg.* 1933, viii. 132.—China (Szechuan).
gallica *Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1932–3, Sér. II. xxv. 313 (1934), in obs.—Gallia.
libanotica (*Schweinf. ex Boiss.*) *Dinsm. in Post, Fl. Syria, Palest. & Sinai*, ed. 2, ii. (*Publ. Am. Univ. Beirut*, Nat. Sc. Ser., No. 1) 313 (1933): Phelipaea libanotica.
megalantha *H. Smith in Acta Hort. Gothoburg.* 1933, viii. 131.—China (Szechuan).
sinensis *H. Smith, l. c.* 128.—China (Szechuan).

OROBUS L. (Legumin.).
atropatanus *Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 375 (1930).—Caucas.

OROBUS:—
speciosus *Hausskn. ex Širjaev in Bull. Soc. Bot. Bulgar.* vi. 62 (1934), in syn.: Lathyrus Haussknechtii.

OROPETIUM Trin. (Gramin.).
africanum (*Cosson & Durieu*) *Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma*, viii. 345 (1908), in obs.: Kralikia africana.

OROPHEA Blume (Annonac.).
parvifolia *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. viii. 59 (1934).—Sumatra.
rhytidophylla *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 82 (1931).—N. Guin.

OROSTACHYS (DC.) Fisch. (Crassulac.).
aggregeatus (*Makino*) *Hara in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 73: Cotyledon aggregeata.
Boehmeri (*Makino*) *Hara, l. c.*, in adnot.: Sedum Boehmeri.
Iwarenge (*Makino*) *Hara, l. c.*, in adnot.: Cotyledon Iwarenge.
polycephalus (*Makino*) *Hara, l. c.*, in adnot.: Cotyledon polycephala.

OROYA Britton & Rose (Cactac.).
neoperuviana *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 282, 416 (1935).—Peruv.

ORTHAEA Klotzsch (Ericac.; Vacciniac., Gen. Pl.).
apophysata (*Griseb.*) *A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 516 (1932): Sophoclesia apophysata.
breviflora *A. C. Smith, l. c.* 513.—Peruv.
cavendishioides *A. C. Smith, l. c.* 511.—Colomb.
constans *A. C. Smith, l. c.* 512.—Boliv.
hispida *A. C. Smith, l. c.* 517.—Guiana Brit.
ignea *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 131 (1934).—Peruv.
pendula *Tutin in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 335.—Guiana Brit.

ORTHODON Benth. & Oliv. (Labiat.).
angustifolius (*Maxim.*) *Masamune in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* xi., Bot. No. 4, 391 (1934): Mosla angustifolia.
Fordii (*Maxim.*) *Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 89: Mosla Fordii.
lysimachiiflorus (*Hayata*) *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1932, xxii. 232, in obs., japonice: Mosla lysimachiiflora.
punctulatus (*J. F. Gmel.*) *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 68: Ocimum punctulatum.

ORTHOPOGON R. Br. (Gramin.).
Bolosii *Vayreda in Cavanillesia*, iv. 61 (1931), nomen.—Hispan.

ORTHOSIA Decne. (Asclepiadac.).
itatiaiensis *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxv. A. No. 7, 2 (1933).—Bras. (Rio de Janeiro).

ORTHOSIPHON Benth. (Labiat.).
angolensis *G. Taylor in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl. 2, 154.—Angola.
bigibber *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 102 (1935).—Kenya Col.
Chevalieri *Briq. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 284 (1917).—Congo Gall.
grandiflorus (*Blume*) *Boldingh, Zakfl. Landbouwstr. Java*, 110 (1916): Ocimum grandiflorum.
nigripunctatus *G. Taylor in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl. 2, 153.—Angola.
ornatus (*S. Moore*) *Good in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl. 2, 152, in adnot.: Hemizygia ornata.
pascuensis *G. Taylor in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl. 2, 152.—Angola.
pseudornatus *Good in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl. 2, 151.—Angola.
rufinervis *G. Taylor in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl. 2, 153.—Angola.
tenuifrons *Briq. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 283 (1917).—Congo Gall.
wulfenioides (*Diels*) *Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 98: Coleus wulfenioides.
xylorrhizus *Briq. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 282 (1917).—Sudan. Gall.

ORTHOTHYLAX (Hook. f.) Skottsb. in Engl. Jahrb. lxv. 264 (1932). *PHILYDRACEAE.*
[Philydrum sect. vel subgen. Orthothylax Hook. f.]

ORTHOTHYLAX:—
glaberrimus (*Hook. f.*) *Skottsb. in Engl. Jahrb.* lxv. 265 (1932): Philydrum glaberrimum.

ORYCTANTHUS Eichl. (Loranthac.).
Archeri *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1932, lix. 516.—Colomb.
diversifolius (*Benth.*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi b. 174 (1935): Loranthus diversifolius.
Grahamii (*Benth.*) *Engl. l. c.*: Loranthus Grahami.
lucarquensis (*H. B. & K.*) *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1932, lix. 516: Loranthus lucarquensis.
Oerstedii (*Oliv.*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi b. 174 (1935): Loranthus Oerstedi.
ovalifolius (*Ruiz & Pav.*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 17 (1931): Loranthus ovalifolius.
tehuacanensis (*Oliv.*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi b. 174 (1935): Loranthus tehuacanensis.

ORYZA L. (Gramin.).
australiensis *Domin*; *C. E. Hubbard in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3232 (1934), descr. emend.—N. Austral.; Queensland.
formosana *Masamune & S. Suzuki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 320.—Formosa.
guineënsis *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1932, xii. 1022, in syn.: O. brachyantha.
paraguayensis *Franch. in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun*, viii. 365 (1893), in syn.: O. sativa var paraguayensis *Franch.*
parviflora (*R. Br.*) *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. 1063 (1892): Potamophila parviflora.
Stapfii *Roshev. in Bull. Applied Bot., Leningrad*, 1931, xxvii. No. 4, pp. 15, 35, in clavi, 51.—Sudan.
Tisseranti *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1932, xii. 1024.—Afr. Gall. Centr.

ORYZOPSIS Michx. (Gramin.).
ferganensis *Litw. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 116, 742 (1934).—Ross. asiat. centr.
Kingii (*Boland.*) *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 229 (1896): Stipa Kingii.
kokanica (*Regel*) *Roshev. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 115, 742 (1934): Milium caerulescens var. kokanicum.
kopetdaghensis *Roshev. in Komarov, l. c.* 117, 743.—Transcasp.
latifolia *Roshev. l. c.* 116, 743.—Ross. asiat. centr.
longearistata (*Boiss. & Hausskn.*) *Roshev. in B. Fedtsch. & al., Fl. Turkm.* i. 82 (1932): Piptatherum longearistatum.
Macounii (*Scribn.*) *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 229 (1896): Stipa Macounii.
sibirica (*Lam.*) *Beal, l. c.* 226: Stipa sibirica.

OSBECKIA L. (Melastomatac.).
andringitrensis *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. xii. 12 (1932).—Madag.
Beckettii *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 121 (1931).—Zeylan.
bicolor *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. xii. 15 (1932).—Madag.
chrysophylla (*DC.*) *H. Perrier, l. c.* 14: Rousseauxia chrysophylla.
Humberti *H. Perrier, l. c.* 13.—Madag.
lanata *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 121 (1931).—Zeylan.
Luxeni *De Wild. in De Wild. & Staner, Contrib. Fl. Katanga*, Suppl. v. 48 (1933).—Congo Belg.
mandrarensis *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. xii. 11 (1932).—Madag.
melastomatoides *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 293 (1935).—China (Hainan).
pauciramosa *Jacques-Félix in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1935, Sér. II. vii. 368.—Congo Belg.
recalva *Bedd. ex Gamble, Fl. Madras*, 494 (1919), in syn.: O. rostrata.
rosea *Fyson in Journ. Ind. Bot. Soc.* 1932, xi. 49.—Mont. Nilgiri.
tamatavensis *H. Perrier in Mém. Acad. Malgache*, Fasc. xii. 17 (1932).—Madag.

OSHIMELLA Masamune & Suzuki in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan, 1934, vi. 571. *GESNERIACEAE.*
formosana *Masamune & Suzuki, l. c.*—Formosa.

OSHIMELLA:—
Sasakii (*Hayata*) *Masamune & Suzuki in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1934, vi. 571: Rhynchoglossum Sasakii.

OSMANTHUS Lour. (Oleac.).
americanus (*L.*) *Knobl. in Fedde, Repert.* xxxiv. 139 (1933), in adnot.: Olea americana.
megacarpus *Small, Man. Southeast. Fl.* 1043 (1933), in syn.: Amarolea megacarpa.
pedunculatus *Gagnep. in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1063 (1933); *et in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 78.—Indo-China (Tonkin).
Welwitschii (*Knobl.*) *Knobl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1031 (1934): Mayepea Welwitschii.

×**OSMAREA** Hort. ex Gard. Chron. 1931, Ser. III. lxxxix. 438, in obs. *OLEACEAE*.
[Osmanthus × Phillyrea.]
Burkwoodii *Hort. l. c.*, in obs.—Hort.

OSMIA Sch. Bip. (Compos.).
gracillima *Sch. Bip. ex Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 8, 23 (1932), in syn.: Eupatorium lineare.

OSMORHIZA Rafin. (Umbellif.).
divaricata (*Britton*) *Piper in Piper & Beattie, Fl. Palouse Reg.* 130 (1901): Washingtonia divaricata.
villicaulis (*Fernald*) *Rydb. in Brittonia*, i. 93 (1931): O. longistylis var. villicaulis.

OSSAEA DC. (Melastomatac.).
boliviensis (*Cogn.*) *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 259: Clidemia boliviensis.
Buchtieni *Gleason in Am. Journ. Bot.* 1932, xix. 751.—Boliv.
bullifera (*Pilger*) *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 260: Leandra bullifera.
cucullata *Gleason, l. c.*—Peruv.
disparilis *Standley in Contrib. Arn. Arb.* No. v. 120 (1933).—Panamá (Ins. Barro Colorado).
polychaeta *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 27 (1931).—Santo Domingo.
reticulata (*Cogn.*) *Ekman ex Urb. l. c.*: Henriettella reticulata.

OSTEOCARPUS R. Phil. (Nolanac.).
brevifolius *R. Phil. in Verh. Deutsch. Wiss. Ver. Santiago* (*Chile*), ii. 108 (1890), nomen; *et in An. Univ. Chile*, xci. 40 (1895), descr.—Chile.

OSTEOMELES Lindl. (Rosac.).
lanata *Nakai in Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 473 (1931), japonice.—Japon.

OSTEOSPERMUM L. (Compos.).
asperulum (*DC.*) *Norlindh in Bot. Notiser*, 1933, 170: O. coriaceum var. asperulum.
decumbens *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 87 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
lancifolium *Norlindh in Bot. Notiser*, 1933, 168.—Afr. austr. (Cape Prov.).
lanosum (*DC.*) *Compton & Pillans in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 324 (1931): O. moniliferum var. lanosum.
monticola *Norlindh in Bot. Notiser*, 1933, 166.—Natal.
striatum *Burtt Davy in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 106.—Transvaal.
Thodei *Markötter in Ann. Univ. Stellenb.* 1930, viii. Sect. A, No. 1, 49.—Orange Free State.

OSTODES Blume (Euphorbiac.).
muricata *Pax in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix c. 157 (1931).—Penins. Mal.

OSTREOCARPUS L. C. Rich. ex Endl. Gen. Pl. ii. 1396 (1840), pro syn.: **Aspidosperma** Mart. & Zucc. (Apocynac.).
Quebracho *Köhler, Med.-Pfl.*, Atlas, iii. p. 48, sub t. 214 (1898), in syn.: Aspidosperma Quebracho.

OSTRYOCARPUS Hook. f. (Legumin.).
Laurentii (*De Wild.*) *Harms in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 638 (1915), in obs.: Dalbergia Laurentii.

OSTRYODERRIS Dunn (Legumin.).
Brownii *Hoyle in Kew Bull.* 1932, 262.—Gold Coast.
Stuhlmannii (*Taub.*) *Dunn ex Harms in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 644 (1915), in obs.: Deguelia Stuhlmannii.

OSYRIS L. (Santalac.).
densifolia *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. Anhang, 11 (1932).—Tanganyika Terr.
laeta *Peter, l. c.*—Tanganyika Terr.
oblanceolata *Peter, l. c.*—Tanganyika Terr.

OTACHYRIUM Nees (Gramin.).
inaequale (*Pilger*) *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 239 (1931), in obs.: Panicum inaequale.
Pterigodium (*Trin.*) *Pilger, l. c.*, in obs.: Panicum Pterigodium.

OTHONNA L. (Compos.).
alba *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 321 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
crassicaulis *Compton, l. c.* 322.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Herrei *Pillans in Kakteenk.* 1934, 215.—Namaqualand.
papulosa *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 167 (1931), in obs., nomen.—Afr. austr.-occ.

OTHONNOPSIS Jaub. & Spach (Compos.).
cneorifolia *Ind. Kew.* ii. 384 (1894); *Phillips & C. A. Smith in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 235 (1933), in syn.: Lopholaena cneorifolia.

OTIOPHORA Zucc. (Rubiac.).
caerulea (*Hiern*) *Bullock in Kew Bull.* 1933, 471: Pentanisia caerulea.
pycnostachys *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C. 393 (1895).—Afr. trop. or.

OTOBA Karst. (Myristicac.).
novogranatensis *Moldenke in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1932, lix. 156: Myristica Otoba.

OTOMERIA Benth. (Rubiac.).
Blommaertii *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 429 (1932).—Congo Belg.
tenuis *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 129 (1931), in clavi.—Sudan Gall.

OTOPHORA Blume (Sapindac.).
acuminata *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 769 (1932).—Borneo.
anomala *Radlk. l. c.* 766.—Borneo.
bijuga *Radlk.*; *Radlk. l. c.* 765, descr. ampl.—Borneo.
edulis *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1932, 178.—Borneo.
glandulosa *Radlk.*; *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 763 (1932), descr. ampl.—Borneo.
lancifolia *Radlk. l. c.* 766.—Borneo.
latifolia *Ridley in Kew Bull.* 1933, 190.—Borneo.
macrocarpa *Ridley, l. c.*—Borneo.
styligera *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 774 (1932).—Borneo.

OTOSTEGIA Benth. (Labiat.).
Kaiseri *V. Täckh. in Svensk Bot. Tidskr.* 1932, xxvi. 379.—Penins. Sinaic.

OTTELIA Pers. (Hydrocharitac.).
acuminata (*Gagnep.*) *Dandy in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 137: Boottia acuminata.
australis *Bremek. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 235 (1933).—Transvaal.
Balansae (*Gagnep.*) *Dandy in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 137: Oligolobos Balansae.
Bodinieri (*Léveillé & Vaniot*) *Dandy, l. c.* 138: Hydrocharis Bodinieri.
brachyphylla (*Gürke*) *Dandy, l. c.*: Boottia brachyphylla.
Cavaleriei *Dandy, l. c.* 1935, lxxiii. 215.—China (Yunnan).
cordata (*Wall.*) *Dandy, l. c.* 1934, lxxii. 137: Boottia cordata.
crispa (*Hand.-Mazz.*) *Dandy, l. c.* 1935, lxxiii. 216: Boottia crispa.
cylindrica (*T. C. E. Fries*) *Dandy, l. c.* 1934, lxxii. 137: Boottia cylindrica.
Esquirolii (*Léveillé & Vaniot*) *Dandy, l. c.*: Boottia Esquirolii.
exserta (*Ridley*) *Dandy, l. c.*: Boottia exserta.
Fischeri (*Gürke*) *Dandy, l. c.*: Boottia Fischeri.
kunenensis (*Gürke*) *Dandy, l. c.*: Boottia kunenensis.
lanceolata (*Gagnep.*) *Dandy, l. c.* 138: Boottia lanceolata.
macrantha (*C. H. Wright*) *Dandy, l. c.*: Boottia macrantha.

OTTELIA:—
muricata (*C. H. Wright*) *Dandy in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 138: Boottia muricata.
polygonifolia (*Gagnep.*) *Dandy, l. c.* 1935, lxxiii. 214: Boottia polygonifolia.
Schinziana (*Aschers. & Gürke*) *Dandy, l. c.* 1934, lxxii. 138: Boottia Schinziana.
somalensis *Chiov. Fl. Somala*, II. 413 (1932).—Somal. Ital.
Stratiotes (*T. C. E. Fries*) *Dandy in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 138: Boottia Stratiotes.
Thorelii (*Gagnep.*) *Dandy, l. c.* 139: Boottia Thorelii.
Vernayi *Bremek. & Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xvi. 401 (1935).—Bechuanaland Protect.
yunnanensis (*Gagnep.*) *Dandy in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 138: Xystrolobos yunnanensis.

OTTOCHLOA Dandy in Journ. Bot. 1931, lxix. 54: **Hemigymnia** Stapf (Gramin.).
Arnottiana (*Nees*) *Dandy, l. c.* 55: Panicum Arnottianum.
fusca (*Ridley*) *Dandy, l. c.*: Hemigymnia fusca.
gracillima *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 445.—Austral. (Queensland).
malabarica (*L.*) *Dandy in Journ. Bot.* 1931, lxix. 55: Poa malabarica.
nodosa (*Kunth*) *Dandy, l. c.*: Panicum nodosum.

OTTONIA Spreng. (Piperac.).
aguadana *Trelease in Proc. Am. Phil. Soc.* 1935, lxxv. 695, in clavi, 696.—Bras. (Minas Geraes).
albo-punctata *Trelease, l. c.* 696.—Bras. (Minas Geraes).
apodostachya *Trelease, l. c.* 695, in clavi, 697.—Bras. (S. Catharina).
Armondi *Trelease, l. c.*—Bras. (Rio de Janeiro).
atrosanguinea (*C. DC.*) *Trelease, l. c.* 698: Piper atrosanguineum.
baptisiana (*C. DC.*) *Trelease, l. c.*: Piper baptisianum.
brevistipitata (*C. DC.*) *Trelease, l. c.*: Piper brevistipitatum.
Burchellii *Trelease, l. c.* 695, in clavi, 699.—Bras. (Rio de Janeiro).
Clausseni *Trelease, l. c.* 694, in clavi, 699.—Bras. (Minas Geraes).
colliculorum *Trelease, l. c.*—Bras. centr. or.
cordulatifolia *Trelease, l. c.* 696, in clavi, 700.—Parag.
Douglasii *Trelease, l. c.* 695, in clavi, 701.—Bras. (Rio de Janeiro).
Dusenii *Trelease, l. c.* 696, in clavi, 702.—Bras. (Paraná).
Edwallii *Trelease, l. c.* 695, in clavi, 702.—Bras. (S. Paulo).
elocalis *Trelease, l. c.* 695, in clavi, 703.—Bras. centr. or.?
frutescens (*C. DC.*) *Trelease, l. c.* 703: Piper frutescens.
gibbimontis *Trelease, l. c.* 695, in clavi, 704.—Bras. (Rio de Janeiro).
Glazioui *Trelease, l. c.*—Bras. (Rio de Janeiro).
grandifolia *Trelease, l. c.* 696, in clavi, 705.—Bras. (Minas Geraes).
Hammari *Trelease, l. c.*—Bras. (S. Paulo).
Hoehnei *Trelease, l. c.* 694, in clavi, 705.—Bras. (S. Paulo).
ituana *Trelease, l. c.* 694, in clavi, 706.—Bras. (S. Paulo).
janeiroënsis (*C. DC.*) *Trelease, l. c.* 706: Piper janeiroënse.
lancifolia *Trelease, l. c.* 695, in clavi, 706.—Bras. (Minas Geraes).
latilimba (*C. DC.*) *Trelease, l. c.* 706: Piper Selloi var. latilimbum.
Loefgreni *Trelease, l. c.* 694, in clavi, 707.—Bras. (S. Paulo).
machadoënsis (*C. DC.*) *Trelease, l. c.* 707: Piper machadoënse.
Mendoncae *Trelease, l. c.* 695, in clavi, 708.—Bras. (Rio de Janeiro).
Mexiae *Trelease, l. c.* 694, in clavi, 709.—Bras. (Minas Geraes).
miguelitensis *Trelease, l. c.* 695, in clavi, 709.—Bras. (Minas Geraes).
Mosenii *Trelease, l. c.* 696, in clavi, 710.—Bras. (S. Paulo).

OTTONIA :—
[Arctottonia] Muelleri (*C. DC.*) *Trelease in Proc. Am. Phil. Soc.*, 1930, lxix. 315: Piper Muelleri.
Muelleri *Trelease, l. c.* 1935, lxxv. 696, in clavi, 710, non praec.—Bras. (S. Catharina).
Novaesii *Trelease, l. c.* 694, in clavi, 711.—Bras. (S. Paulo).
ovata (*Vahl*) *Trelease, l. c.* 711: Piper ovatum.
palhosana *Trelease, l. c.* 694, in clavi, 712.—Bras. (S. Catharina).
peruibensis *Trelease, l. c.*—Bras. (S. Paulo).
praecox (*C. DC.*) *Trelease, l. c.* 712: Piper praecox.
Riedelii *Trelease, l. c.* 694, in clavi, 713.—Bras. centr. or.
rio-feioana *Trelease, l. c.* 695, in clavi, 713.—Bras. centr. or.
santa-annae *Trelease, l. c.*—Bras. (S. Paulo).
santa-ludoviciana *Trelease, l. c.* 694, in clavi, 714.—Bras.
santa-ritana *Trelease, l. c.* 695, in clavi, 714.—Bras. (Minas Geraes).
Schwackeae *Trelease, l. c.*—Bras. (S. Catharina).
stationis *Trelease, l. c.* 696, in clavi, 714.—Bras. (Bahia).
striaticaulis *Trelease, l. c.* 695, in clavi, 715.—Bras.
subglauca (*C. DC.*) *Trelease, l. c.* 715: Piper subglaucum.
taperana *Trelease, l. c.* 695, in clavi, 715.—Bras. (Pernambuco).
Usterii *Trelease, l. c.* 694, in clavi, 716.—Bras. (S. Paulo).

OURATEA Aubl. (Ochnac.).
amplectens (*Stapf*) *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 488 (1921), in obs.: Gomphia amplectens.
angustifolia (*Vahl*) *Baill. Hist. Pl.* iv. 366 (1873), in obs.: Gomphia angustifolia.
axillaris (*Oliv.*) *Engl. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 260 (1903): Gomphia axillaris.
bella *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 489 (1921), in obs.—Cameroons.
crocea (*Griff.*) *Burkill in Kew Bull.* 1935, 318; *Burkill, Dict. Econ. Prod. Mal. Penins.* ii. 1614 (1935): Ochna crocea.
dissitiflora *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 490 (1921), in obs.—Cameroons; Afr. Gall. Centr.
dolichopoda *Gilg & Mildbr. ex Engl. l. c.*, in obs.—Cameroons.
edeënsis *Gilg ex Engl. l. c.* 491, in obs.—Cameroons.
homaliifolia *Gilg & Mildbr. ex Engl. l. c.*, in obs.—Cameroons.
Hookeri (*Planch.*) *Burkill in Kew Bull.* 1935, 318; *Burkill, Dict. Econ. Prod. Mal. Penins.* ii. 1615 (1935): Gomphia Hookeri.
iquitosensis *Macbride in Candollea*, v. 382 (1934).—Peruv.
Jabotapita (*L.*) *Baill. Hist. Pl.* iv. 366 (1873), in obs.: Gomphia Jabotapita.
Killipii *Macbride in Candollea*, v. 383 (1934).—Peruv.
monantha *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 487 (1921), in obs.—Liberia.
nigroviolacea *Gilg ex Engl. l. c.* 490, in obs.—Cameroons.
oblanceolata *Gilg & Mildbr. ex Engl. l. c.* 491, in obs.—Cameroons.
platyclada *Gilg ex Engl. l. c.*, in obs.—Cameroons.
riparia *Gilg & Lederm. ex Engl. l. c.*, in obs.—Nigeria.
Schoenleiniana (*Klotzsch*) *Gilg in Engl. Jahrb.* xxxiii. 264 (1903): Gomphia Schoenleiniana.
Schusteri *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 489 (1921), in obs.—Tanganyika Terr.
sturiensis *Gilg ex Engl. l. c.*, in obs.—Congo Belg.
subcordata (*Stapf*) *Engl. l. c.*, in obs.: Gomphia subcordata.
tarapotensis *Macbride in Candollea*, v. 384 (1934).—Peruv.
Tessmanniana *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 490 (1921), in obs.—Guinea infer.; Cameroons.
Thorbeckii *Gilg ex Engl. l. c.* 491, in obs.—Cameroons.

OURATEA:—
Warneckei *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 490 (1921), in obs.—Tanganyika Terr.
Williamsii *Macbride in Candollea*, v. 384 (1934).—Peruv.

OURISIA Comm. ex Juss. (Scrophulariac.).
lactea *Cockayne & Allan ex Cockayne & Sledge in Journ. Linn. Soc., Bot.* xlix. 128 (1932).—N. Zel.

OUROUPARIA Aubl. (Rubiac.).
setiloba (*Benth.*) *Sasaki, List Pl. Formos.* 385 (1928): Uncaria setiloba.

OVIEDA L. (Verbenac.).
fragrans (*Willd.*) *Hitchcock in Mem. Torr. Bot. Cl.* xii. 63 (1902): Clerodendron fragrans.

OXALIS L. (Oxalidac.; Geraniac., Gen. Pl.).
aetheria *Macbride in Candollea*, vi. 8 (1934): O. pygmaea *l A. Gray*.
aridicola *Saster in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 129.—Afr. au tr. (Cape Prov.).
atrata *Weintroub in Journ. Bot.* 1931, lxix. 210.—Afr. austr. (Cape Prov.).
atropurpurea *Hort. ex Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc*, ii. 448 (1932), in syn.: O. corniculata var. purpurea *Parl.*
attaquana *Salter in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 78.—Afr. austr. (Cape Prov.).
avilensis *Pittier in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 137.—Venez.
azanaquensis *Knuth in Fedde, Repert.* xxix. 217 (1931).—Boliv.
Balansae *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 702.—N. Caled.
brevisepala *Weintroub in Journ. Bot.* 1931, lxix. 209.—Afr. austr. (Cape Prov.).
brunneo-pilosa *Knuth in Fedde, Repert.* xxix. 215 (1931).—Boliv.
cajalbanensis *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 12 (1932).—Cuba.
callimarginata *Weintroub in Journ. Bot.* 1931, lxix. 209.—Afr. austr. (Cape Prov.).
camisaoënsis *Knuth in Fedde, Repert.* xxxviii. 194 (1935).—Bras. (Bahia).
campicola *Salter in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 131.—Afr. austr. (Cape Prov.).
cathara *Salter, l. c.* 75.—Namaqualand.
cotagaitensis *Knuth in Fedde, Repert.* xxix. 215 (1931).—Boliv.
densissima *Rusby in Phytologia*, i. 61 (1934).—Boliv.
deserticola *Salter in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 115.—Afr. austr. (Cape Prov.).
dilatata *L. Bolus in Journ. Bot.* 1931, lxix. 48.—Afr. austr. (Cape Prov.).
flaviuscula *Salter in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 132.—Namaqualand.
fragilis *Salter, l. c.* 134.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Framesii *L. Bolus in Journ. Bot.* 1931, lxix. 48.—Little Namaq.
furcillata *Salter in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 111.—Namaqualand.
glandulosa (*Knuth*) *Pittier in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 138: O. pubescens var. glandulosa.
guatemalensis *Knuth in Fedde, Repert.* xxix. 214 (1931).—Guatem.
helicoides *Salter in Fl. Pl. S. Afr.* 1935, xv. 579.—Namaqualand.
Hochreutineri *Macbride in Candollea*, vi. 9 (1934): O. patula *Knuth*.
inaequalis *Weintroub in Journ. Bot.* 1931, lxix. 207.—Afr. austr. (Cape Prov.).
inconspicua *Salter in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 113.—Namaqualand.
intermedia *Herter, Fl. Urug. Pl. Vasc.* (*Estud. Bot. Reg. Urug.* iv.) 75 (1931), nomen.—Urug.
involuta *Salter in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 120.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Jahnii *Pittier in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 138.—Venez.
Knuthii *Herter, Fl. Urug. Pl. Vasc.* (*Estud. Bot. Reg. Urug.* iv.) 75 (1931): O. uruguayensis *Knuth*.
lasiorhiza *Salter in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 124.—Afr. austr. (Cape Prov.).
levis *Salter, l. c.* 118.—Afr. austr. (Cape Prov.).
longipes *Weintroub in Journ. Bot.* 1931, lxix. 208.—Afr. austr. (Cape Prov.).

OXALIS :—
Louisae *Salter in Journ. Bot.* 1932, lxx. 282.—Namaqualand.
maculata *Rippa in Bull. Soc. Nat. Napoli*, xix. 171 (1905); *et in Boll. Ort. Bot. Palermo*, x. 180, 184 (1911).—Hort.
marcapatensis *Knuth in Fedde, Repert.* xxix. 216 (1931).—Peruv.
membranacea *Weintroub in Journ. Bot.* 1931, lxix. 209.—Afr. austr. (Cape Prov.).
meridensis *Pittier in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 137.—Venez.
nodulosa *Pittier, l. c.* 139.—Venez.
oculata *Salter in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 136.—Afr. austr. (Cape Prov.).
organensis *Knuth ex Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste Braz.* iii. 205 (1923) [*Insp. Fed. Obras. Secc.* Publ. 57]; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 151, nomen.—Bras.
parvicormus *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 167, 168 (1931), in obs.—Afr. austr.-occ.
petraea *Salter in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 138.—Afr. austr. (Cape Prov.).
picchensis *Knuth in Fedde, Repert.* xxix. 214 (1931).—Peruv.
pinoënsis *Knuth, l. c.* 213.—Boliv.
polyrhiza *Knuth, l. c.* 217.—Peruv.
pseudoarenaria *Knuth, l. c.* xxxviii. 196 (1935).—Peruv.
quispicanchensis *Knuth, l. c.* xxix. 218 (1931).—Peruv.
reflexa *Salter in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 140.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Rippae *Mattei in Riv. Fis. Mat. e Sc. Nat. Pavia*, ix. 10; cf. *Rippa in Bull. Ort. Bot. Napoli*, xi. 5 (1932): O. maculata *Rippa*.
simplex *Salter in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 81.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Sonderana (*Kuntze*) *Macbride in Candollea*, vi. 8 (1934): Acetosella Sonderana.
sphaerocarpa *Weintroub in Journ. Bot.* 1931, lxix. 210.—Afr. austr. (Cape Prov.).
squamiflora *Weintroub, l. c.* 208.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Staffordiana *Knuth in Fedde, Repert.* xxxviii. 195 (1935).—Peruv.
stenopetala *Salter in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 142.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Stokoei *Weintroub in Journ. Bot.* 1931, lxix. 207.—Afr. austr. (Cape Prov.).
strigosa *Salter in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 122.—Afr. austr. (Cape Prov.).
suteroides *Salter, l. c.* 116.—Afr. austr. (CapeProv.).
Taimoni *Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 51.—Formosa.
Tatei *Rusby in Phytologia*, i. 62 (1934).—Boliv.
Trollii *Knuth in Fedde, Repert.* xxix. 218 (1931).—Boliv.
urubambensis *Knuth, l. c.* 216.—Peruv.
vigita *Balb. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 533 (1833).—Hab.?
villosula *Knuth in Fedde, Repert.* xxxviii. 195 (1935).—Peruv.
virgata *Rusby in Phytologia*, i. 62 (1934).—Boliv.
Werdermannii *Knuth in Fedde, Repert.* xxxviii. 196 (1935).—Bras. (Pernambuco).
Williamsii *Knuth, l. c.* 195.—Peruv.
xantha *Salter in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 77.—Afr. austr. (Cape Prov.).
zonulata *L. Bolus in Journ. Bot.* 1931, lxix. 49.—Little Namaq.

OXANDRA A. Rich. (Annonac.).
Asbecki (*Pulle*) *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* x. 167 (1931): Bocagea Asbecki.
Krukoffii *R. E. Fries, l. c.* xii. 199 (1934).—Bras. (Pará).
longipetala *R. E. Fries, l. c.* x. 170 (1931).—Panamá.
macrophylla *R. E. Fries, l. c.* 173.—Peruv.
Martiana (*Schlecht.*) *R. E. Fries, l. c.* 165: Guatteria Martiana.
nitida *R. E. Fries, l. c.* 160.—Bras. (Rio de Janeiro).
oblongifolia *R. E. Fries, l. c.* 169.—Colomb.
panamensis *R. E. Fries, l. c.* 168.—Panamá.
sessiliflora *R. E. Fries, l. c.* 172.—Bras. (Pará).
sphaerocarpa *R. E. Fries, l. c.* xii. 198 (1934).—Peruv.

OXERA Labill. (Verbenac.).
oreophila *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 479.—N. Caled.

OXYANTHUS DC. (Rubiac.).
laxiflorus *K. Schum. ex Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 79, in clavi, 80 (1931).—Nigeria; Cameroons.

OXYCOCCOIDES (Benth. & Hook. f.) Nakai (Ericac.).
erythrocarpus (*Michx.*) *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1917, xxxi. 247, in obs.: Vaccinium erythrocarpum.

OXYGONUM Burch. (Polygonac.).
cordofanum (*Meissn.*) *Dammer in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* iii. 1. A. 30 (1892): Ceratogonum cordofanum.
fagopyroides *Dammer ex Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. 186 (1932), in clavi.—Tanganyika Terr.
fruticosum *Dammer*; *Milne-Redhead in Kew Bull.* 1933, 142, descr. ampl.—Angola; N. Rhodesia.
hirtum *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. Anhang, 18 (1932).—Tanganyika Terr.
leptopus *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 810 (1933).—Tanganyika Terr.
Magdalenae *Dammer ex Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. 186 (1932), in clavi.—Tanganyika Terr.
pachybasis *Milne-Redhead in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3215 (1933).—N. Rhodesia.
tenerum *Milne-Redhead, l. c.* t. 3216.—N. Rhodesia.
Wittei *Staner in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxi. 329 (1932).—Congo Belg.

OXYMITRA Hook. f. & Thoms. (Annonac.).
Beccarii *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 83 (1931).—Borneo.

OXYPETALUM R. Br. (Asclepiadac.).
arenicola *Hauman ex Lillo in Physis*, iv. 416 (1919).—Argent.
arvense (*Vell.*) *Macbride in Candollea*, v. 401 (1934): Asclepias arvensis.
attenuatum (*Rusby*) *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxv. A. No. 14, p. 15 (1934): Schistogyne attenuata.
Schlechteri *Malme, l. c.* xxv. A. No. 7, 15 (1933): Schistogyne oxypetaloides.
Schulzii *Malme, l. c.* xxvi. A. No. 4, 12 (1934).—Argent.; Urug.
subriparium *Malme, l. c.* xxv. A. No. 7, 14 (1933).—Bras. (Minas Geraes).

OXYPTERYX Greene (Asclepiadac.).
Curtissii (*A. Gray*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 1072 (1933): Asclepias Curtissii.

OXYRHACHIS Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xi. 652 (1932). *GRAMINEAE.*
Mildbraediana *Pilger, l. c.*—Tanganyika Terr.

OXYSPORA DC. (Melastomatac.).
sumatrana *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 176 (1934).—Sumatra.

OXYTENANTHERA Munro (Gramin.).
monadelpha (*Thwait.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 342 (1931): Dendrocalamus monadelphus.

OXYTHECA Nutt. (Polygonac.).
insignis (*Curran*) *Goodman in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1934, xxi. 91: Chorizanthe insignis.

OXYTROPIS DC. (Legumin.).
albertina (*Greene*) *Rydb. Fl. Prairies & Plains Centr. N. Amer.* 484 (1932): Aragallus albertinus.
alpestris *Schischk. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1932, Nos. 7–8, p. 4.—Altai.
Anertii *Nakai, Fl. Mt. Peik-tu-san*, 66 (1918), nomen; *Mori, Enum. Pl. Cor.* 220 (1922); *Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. II. (*Contrib. Cogn. Fl. Mansh*; *Pl. Nov. Jehol.* II. ii.) 125 (1935), descr.—Manchur.
Bungeana *Schischk. in Krylov, Fl. Sibir. Occ.* vii. 1744 (1933): O. Gebleri *Fisch. ex Bunge*, non O. Gebleriana *Schrenk.*
Echidna *Vved. in Trans. Sc. Soc. Turk.* ii. 29 (1925).—Turkestan.
Fomini *Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 340 (1930); *Woronow in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 216 (1933).—Caucas.

OXYTROPIS:—
hailarensis *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 907.—Manchur.
hidaka-montana *Miyabe & Tatewaki in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.* xiii. 2 (1933).—Japon.
Itoana *Tatewaki in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxix. 202 (1933).—Ins. Kuril.
karataviensis *Pavlov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n. s. xliv. 39.—Turkestan.
Karjagini *Grossheim in Trud. Azerb. Otdyel. Zakavk. Fil. Akad. Nauk SSSR*, Sect. Bot., i. 54 (1933).—Armen.
Komei *Saposhn. in Trans. Tomsk. Branch Russ. Bot. Soc.* i. Nos. 1–2, p. 31 (1921); cf. *Krylov, Fl. Sibir. Occ.* vii. 1754 (1933).—Sibir.
koreana *Nakai*; *Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. II. (*Contrib. Cogn. Fl. Mansh.*: *Pl. Nov. Jehol.* II. ii.) 20 (1935), descr.—Manchur.; Corea.
kubanensis *Leskov in Journ. Russ. Bot. Soc.* xvi. No. 1, 74; cf. *Leskov in Trav. Mus. Bot. Acad. Sc. URSS*, xxv. 38 (1932).—Caucas.
Kudoana *Miyabe & Tatewaki in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.* xiii. 1 (1933).—Japon.
Politovii *Sumnev. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1933, Nos. 1–2, p. 3.—Altai.
shokanbetsuensis *Miyabe & Tatewaki in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.* xiv. 75 (1935).—Japon. (Yezo).
Sumneviczii *Krylov in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1932, Nos. 7–8, p. 1.—Altai.
thessala *Turrill in Kew Bull.* 1935, 54: O. olympica *Turrill.*
Varlakovii *Sergievsk. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1933, Nos. 1–2, p. 9.—Sibir. (Transbaikal.).
yezoënsis *Nakai, Rep. Veg. Daisetsu Mts.* 68 (1930); cf. *Miyabe & Tatewaki in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.* xiii. 2 (1933): O. japonica var. sericea *Koidz.*

OYEDAEA DC. (Compos.).
oxylepis *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 334.—Peruv.

P

PACHYCENTRIA Blume (Melastomatac.).
lanceolata *Schwartz in Mitt. Inst. Bot. Hamburg*, vii. 255 (1931).—Borneo.
oligosperma *Schwartz, l. c.* 256.—Borneo.

PACHYCORMUS Coville in Cent. Dict., rev. ed. 6708 (1911); Goldman in Contrib. U. S. Nat. Herb. xvi. 344 (1916); Standley in Contrib. U. S. Nat. Herb. xxiii. 671 (1923). *ANACARDIACEAE.*
discolor (*Benth.*) *Coville, l. c.*; *Goldman, l. c.*; *Standley, l. c.*: Schinus discolor.

PACHYGONE Miers (Menispermac.).
sinica *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 209 (1931).—China (Kwangtung; Kwangsi).

PACHYLARNAX Dandy (Magnoliac.).
pleiocarpa *Dandy in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 313.—Ind. or. (Assam).

PACHYLOBUS G. Don (Burserac.).
deliciosus (*A. Cheval.*) *Pellegr. in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 714 (1934): Sorindeia deliciosa.
macrophyllus (*Oliv.*) *Engl. Jahrb.* xliv. 138 (1909), in clavi: Canarium macrophyllum.
paniculatus *Hoyle in Kew Bull.* 1934, 187.—Gold Coast.

PACHYLOMA DC. (Melastomatac.).
scandens *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 65 (1935).—Bras. (Amaz.).

PACHYPHYTUM Link, Klotzsch & Otto (Crassulac.).
chloranthum *Walth. in Cact. & Succ. Journ. Amer.* iii. 12 (1931).—Mexico ?
heterosepalum (*Rose*) *Walth. l. c.* vii. 70 (1935): Echeveria heterosepala.

PACHYPODIUM Lindl. (Apocynac.).
ambongense *H. Poisson in Bull. Acad. Malgache*, 1922–3, n. s. vi. 162 (1924).—Madag.

PACHYPODIUM:—
griquense *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 83, 84.—Afr. austr. (Griqualand West).
horombense *H. Poisson in Bull. Acad. Malgache*, 1922–3, n. s. vi. 165 (1924), in obs. et in adnot.—Madag.
jasminiflorum *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 83, 84.—Afr. austr. (Cape Prov.).
menabeum *Léandri in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 141.—Madag.

×**PACHYRANTIA** Walth. in Cact. & Succ. Journ. Amer. iii. 11 (1931), in obs. *CRASSULACEAE.* [COURANTIA × PACHYPHYTUM.]
clavifolia (*A. Berger*) *Walth. l. c.* 13, in adnot.: Echeveria clavifolia.

PACHYRHIZANTHE (Schlechter) Nakai in Bot. Mag., Tokyo, 1931, xlv. 109. *ORCHIDACEAE.* [CYMBIDIUM sect. PACHYRHIZANTHE Schlechter.]
aberrans (*Finet*) *Nakai, l. c.* 110: Yoania aberrans.
aphylla (*Ames & Schlechter*) *Nakai, l. c.* 109: Cymbidium aphyllum.
macrorhizos (*Lindl.*) *Nakai, l. c.*: Cymbidium macrorhizon.
nipponica (*Franch. & Savat.*) *Nakai, l. c.*: Bletia nipponica.
sagamiensis *Nakai, l. c.* 110.—Japon.

PACHYRHIZUS Rich. (Legumin.).
Ahipa (*Wedd.*) *Parodi in An. Acad. Nat. Agron. & Vet. Buenos Aires*, i. 137 (1935); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 147: Dolichos Ahipa.

PACHYSTELA Pierre (Sapotac.).
argentea *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 264 (1917).—Dahomey.
conferta *Radlk. in Ann. Mus. Congo*, Bot., Sér. II. i. 1. 33 (1899), in obs.—Afr. trop.
lenticellosa *Radlk. l. c.*, in obs.—Afr. trop.
longistyla *Radlk. l. c.*, in obs.: Vincentella longistyla.
micrantha (*A. Cheval.*) *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 10, in clavi, 11 (1931): Mimusops micrantha.

PACHYSTYLUS K. Schum. (Rubiac.).
Zippelianus (*Miq.*) *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 208 (1934): Pavetta Zippeliana.

×**PACHYVERIA** Hort. ex Haage & Schmidt apud A. Berger in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. xviii a. 481 (1930). *CRASSULACEAE.* [ECHEVERIA × PACHYPHYTUM.]
clavata *Walth. in Cact. & Succ. Journ. Amer.* vi. 55 (1934).—Hab. ?
clavifolia (*A. Berger*) *Walth. l. c.*: Echeveria clavifolia.
glauca *Haage & Schmidt apud A. Berger in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xviii a. 482 (1930).—Hort.
mirabilis (*Deleuil ex E. Morr.*) *Walth. in Cact. & Succ. Journ. Amer.* vi. 55 (1934): Echeveria mirabilis.
pachyphytoides (*de Smet ex E. Morr.*) *Walth. l. c.* iii. 12 (1931); *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 524, in adnot.: Echeveria pachyphytoides.
Scheideckeri (*de Smet*) *Walth. in Cact. & Succ. Journ. Amer.* vi. 55 (1934): Echeveria Scheideckeri.
sobrina (*A. Berger*) *Walth. l. c.* iii. 12 (1931): Echeveria sobrina.
sodalis (*A. Berger*) *Walth. l. c.*: Echeveria sodalis.

PAEDERIA L. (Rubiac.).
diffusa (*Britton*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 330 (1931): Manettia diffusa.
erecta *Roxb. Hort. Beng.* 15 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 519 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 685 (1832).—Ind. or. (Assam).
hirsuta *Craib in Kew Bull.* 1933, 28.—Siam.
pallida *Craib, l. c.*—Siam.
pilosa *Craib, l. c.* 29.—Siam.
recurva *Roxb. Hort. Beng.* 15 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 518 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 684 (1832).—Ind. or. (Bengal).
scandens (*Lour.*) *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 163 (1934): Gentiana scandens.

PAEDERIA :—
stenobotrya *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xi. 57 (1932).—China (Hainan).
ternata *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 520 (1824).—Ind. or. (Assam).

PAEONIA L. (Ranunculac.).
abchasica *Misczenko ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 92 (1930).—Caucas.
tomentosa (*Lomak.*) *Busch ex Grossheim, l. c.* 91; *Stapf in Bot. Mag.* t. 9249 (1931): P. Wittmanniana var. tomentosa.
Woodwardii *Cox, Pl. Introd. R. Farrer*, 43 (1930).—China (Kansu).

PAEPALANTHUS Mart. (Eriocaulac.).
accrescens *Alv. Silv. Fl. Mont.* 96 (1928).—Bras. (Minas Geraes).
actinocephaloides *Alv. Silv. l. c.* 135.—Bras. (Minas Geraes).
acutalis *Alv. Silv. l. c.* 258.—Bras. (Minas Geraes).
acutipilus *Alv. Silv. l. c.* 173.—Bras. (Minas Geraes).
aequalis (*Vell.*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 43 (1931): Dupatya aequalis.
aereus *Alv. Silv. Fl. Mont.* 161 (1928).—Bras. (Minas Geraes).
albescens *Alv. Silv. l. c.* 229.—Bras. (Minas Geraes).
albiceps *Alv. Silv. l. c.* 172.—Bras. (Minas Geraes).
albo-vaginatus *Alv. Silv. l. c.* 233.—Bras. (Paraná).
albo-villosus *Alv. Silv. l. c.* 33.—Bras. (Minas Geraes).
Allemanii *Diogo in Bol. Mus. Nac. Rio de Janeiro*, i. 27 (1923).—Bras. (Ceará).
arborescens *Alv. Silv. Fl. Mont.* 205 (1928).—Bras. (Minas Geraes).
arenicola *Alv. Silv. l. c.* 144.—Bras. (Minas Geraes).
argillicola *Alv. Silv. l. c.* 108.—Bras. (Minas Geraes).
ascendens *Alv. Silv. l. c.* 237.—Bras. (Minas Geraes).
ater *Alv. Silv. l. c.* 247.—Bras. (Minas Geraes).
babyloniensis *Alv. Silv. l. c.* 188.—Bras. (Minas Geraes).
baraunensis *Alv. Silv. l. c.* 112.—Bras. (Minas Geraes).
barbulatus *Alv. Silv. l. c.* 211.—Bras. (Minas Geraes).
barreirensis *Alv. Silv. l. c.* 260.—Bras. (Minas Geraes).
batatalensis *Alv. Silv. l. c.* 77.—Bras. (Minas Geraes).
Benedicti *Alv. Silv. l. c.* 238.—Bras. (Minas Geraes).
bifrons *Alv. Silv. l. c.* 206.—Bras. (Minas Geraes).
bombacinus *Alv. Silv. l. c.* 82.—Bras. (Minas Geraes).
brevicaulis *Alv. Silv. l. c.* 28.—Bras. (Minas Geraes).
bulbosus *Alv. Silv. l. c.* 184.—Bras. (Minas Geraes).
cabralensis *Alv. Silv. l. c.* 220.—Bras. (Minas Geraes).
cachambuensis *Alv. Silv. l. c.* 50.—Bras. (Minas Geraes).
caldensis *Alv. Silv. l. c.* 186.—Bras. (Minas Geraes).
callocephalus *Alv. Silv. l. c.* 29.—Bras. (Minas Geraes).
callophyllus *Alv. Silv. l. c.* 217.—Bras. (Minas Geraes).
canastrensis *Alv. Silv. l. c.* 228.—Bras. (Minas Geraes).
capillatus *Alv. Silv. l. c.* 79.—Bras. (Minas Geraes).
capitatus *Alv. Silv. l. c.* 164.—Bras. (Minas Geraes).
castaneus *Alv. Silv. l. c.* 249.—Bras. (Minas Geraes).
chapadensis *Alv. Silv. l. c.* 232.—Bras. (Minas Geraes).
chloronema *Alv. Silv. l. c.* 121.—Bras. (Minas Geraes).
chlorophyllus *Alv. Silv. l. c.* 80.—Bras. (Minas Geraes).
chloropus *Alv. Silv. Fl. Mont.* 24 (1928).—Bras. (Minas Geraes).
chrysolepis *Alv. Silv. l. c.* 256.—Bras. (Minas Geraes).
chrysophorus *Alv. Silv. l. c.* 176.—Bras. (Minas Geraes).
cipoënsis *Alv. Silv. l. c.* 218.—Bras. (Minas Geraes).
comans *Alv. Silv. l. c.* 262.—Bras. (Minas Geraes).
comosus *Alv. Silv. l. c.* 129.—Bras. (Minas Geraes).
complanatus *Alv. Silv. l. c.* 244.—Bras. (Minas Geraes).
conicus *Alv. Silv. l. c.* 136.—Bras. (Minas Geraes).
convexus *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 328.—Venez.
coronarius *Alv. Silv. Fl. Mont.* 63 (1928).—Bras. (Minas Geraes).
crateriformis *Alv. Silv. l. c.* 60.—Bras. (Minas Geraes).
cryocephalus *Alv. Silv. l. c.* 116.—Bras. (Minas Geraes).
cuspidatus *Alv. Silv. l. c.* 49.—Bras. (Minas Geraes).
cylindraceus *Alv. Silv. l. c.* 130.—Bras. (Minas Geraes).
Dielsii (*Ruhl.*) *Macbride in Candollea*, v. 348 (1934): Leiothrix Dielsii.
diffusus *Alv. Silv. Fl. Mont.* 208 (1928).—Bras. (Minas Geraes).
diversifolius *Alv. Silv. l. c.* 47.—Bras. (Minas Geraes).
duidae *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 329.—Venez.
extremensis *Alv. Silv. Fl. Mont.* 163 (1928).—Bras. (Minas Geraes).
fasciculifer *Alv. Silv. l. c.* 73.—Bras. (Minas Geraes).
fimbriatus *Alv. Silv. l. c.* 197.—Bras. (Minas Geraes).
fuscus *Alv. Silv. l. c.* 243.—Bras. (Minas Geraes).
garimpensis *Alv. Silv. l. c.* 251.—Bras. (Minas Geraes).
gibbosus *Alv. Silv. l. c.* 142.—Bras. (Minas Geraes).
glaucophyllus *Alv. Silv. l. c.* 23.—Bras. (Minas Geraes).
glaucopodus *Alv. Silv. l. c.* 99.—Bras. (Minas Geraes).
globulifer *Alv. Silv. l. c.* 240.—Bras. (Minas Geraes).
gneissicola *Alv. Silv. l. c.* 124.—Bras. (Minas Geraes).
Gomesii *Alv. Silv. l. c.* 67.—Bras. (Minas Geraes).
goncalensis *Alv. Silv. l. c.* 259.—Bras. (Minas Geraes).
grao-mogolensis *Alv. Silv. l. c.* 133.—Bras. (Minas Geraes).
Gustavii *Alv. Silv. l. c.* 227.—Bras. (Minas Geraes).
habenulifer *Alv. Silv. l. c.* 263.—Bras. (Minas Geraes).
hemiglobosus *Alv. Silv. l. c.* 181.—Bras. (Minas Geraes).
heterocaulon *Alv. Silv. l. c.* 203.—Bras. (Minas Geraes).
heteropus *Alv. Silv. l. c.* 139.—Bras. (Minas Geraes).
heterotrichus *Alv. Silv. l. c.* 200.—Bras. (Minas Geraes).
hippotrichophyllus *Herzog in Fedde, Repert.* xxix. 208 (1931).—Bras. (Pará ?).
hymenolepis *Alv. Silv. Fl. Mont.* 183 (1928).—Bras. (Minas Geraes).
implicatus *Alv. Silv. l. c.* 158.—Bras. (Minas Geraes).
insignis *Alv. Silv. l. c.* 193.—Bras. (Minas Geraes).
itacambirensis *Alv. Silv. l. c.* 123.—Bras. (Minas Geraes).
itambeënsis *Alv. Silv. l. c.* 46.—Bras. (Minas Geraes).
jordanensis *Alv. Silv. l. c.* 92.—Bras. (Minas Geraes).
lanatus *Alv. Silv. l. c.* 42.—Bras. (Minas Geraes).
latipes *Alv. Silv. l. c.* 230.—Bras. (Minas Geraes).
leiothricoides *Alv. Silv. l. c.* 127.—Bras. (Minas Geraes).
leucocyaneus *Tutin in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 336.—Guiana Brit.
linearifolius *Alv. Silv. Fl. Mont.* 57 (1928).—Bras. (Minas Geraes).
lombensis *Alv. Silv. l. c.* 180.—Bras. (Minas Geraes).
longicaulis *Alv. Silv. l. c.* 236.—Bras. (Minas Geraes).
luteolus *Alv. Silv. l. c.* 86.—Bras. (Minas Geraes).
lycopodioides *Alv. Silv. l. c.* 160.—Bras. (Minas Geraes).
macrocaulon *Alv. Silv. l. c.* 169.—Bras. (Minas Geraes).
maculatus *Alv. Silv. l. c.* 167.—Bras. (Minas Geraes).
melanthus *Alv. Silv. l. c.* 74.—Bras. (Minas Geraes).
Michaelii *Alv. Silv. l. c.* 39.—Bras. (Minas Geraes).
microphorus *Alv. Silv. l. c.* 149.—Bras. (Minas Geraes).
milho-verdensis *Alv. Silv. l. c.* 131.—Bras. (Minas Geraes).
minimus *Alv. Silv. l. c.* 107.—Bras. (Minas Geraes).
moedensis *Alv. Silv. l. c.* 234.—Bras. (Minas Geraes).
montanus *Alv. Silv. l. c.* 76.—Bras. (Minas Geraes).
myriophyllus *Alv. Silv. l. c.* 147.—Bras. (Minas Geraes).
nanus *Alv. Silv. l. c.* 52.—Bras. (Minas Geraes).
nigricans *Alv. Silv. l. c.* 89.—Bras. (Minas Geraes).
nigricaulis *Alv. Silv. l. c.* 88.—Bras. (Minas Geraes).
nigriflorus *Alv. Silv. l. c.* 25.—Bras. (Minas Geraes).
niveo-niger *Alv. Silv. l. c.* 246.—Bras. (Minas Geraes).
nodifer *Alv. Silv. l. c.* 212.—Bras. (Minas Geraes).
nudus *Alv. Silv. l. c.* 215.—Bras. (Minas Geraes).
obconicus *Alv. Silv. l. c.* 111.—Bras. (Minas Geraes).
ocreatus *Alv. Silv. l. c.* 165.—Bras. (Minas Geraes).
orthoblepharus *Alv. Silv. l. c.* 62.—Bras. (Minas Geraes).
orthogonalis *Alv. Silv. l. c.* 85.—Bras. (Minas Geraes).
oyapockensis *Herzog in Fedde, Repert.* xxix. 206 (1931).—Bras. (Pará).
parallelinervius *Alv. Silv. Fl. Mont.* 65 (1928).—Bras. (Minas Geraes).
parvifolius *Alv. Silv. l. c.* 91.—Bras. (Minas Geraes).
pauperrimus *Herzog in Fedde, Repert.* xxix. 206 (1931).—Bras. (Amaz.).
perbracchiatus *Alv. Silv. Fl. Mont.* 137 (1928).—Bras. (Minas Geraes).
percrassus *Alv. Silv. l. c.* 214.—Bras. (Minas Geraes).
peruvianus (*Ruhl.*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 8 (1931): Syngonanthus peruvianus.
plagiostigma *Alv. Silv. Fl. Mont.* 117 (1928).—Bras. (Minas Geraes).
platycaulis *Alv. Silv. l. c.* 27.—Bras. (Minas Geraes).
plumipes *Alv. Silv. l. c.* 201.—Bras. (Minas Geraes).
polyandrus *Alv. Silv. l. c.* 140.—Bras. (Minas Geraes).
polycladus *Alv. Silv. l. c.* 189.—Bras. (Minas Geraes).
praedensatus *Alv. Silv. l. c.* 120.—Bras. (Minas Geraes).
pulvinatus *Alv. Silv. l. c.* 37.—Bras. (Minas Geraes).
ramosissimus *Alv. Silv. l. c.* 209.—Bras. (Minas Geraes).
reflexus *Alv. Silv. l. c.* 157.—Bras. (Minas Geraes).
refractifolius *Alv. Silv. l. c.* 171.—Bras. (Minas Geraes).
rhizocephalus *Alv. Silv. l. c.* 126.—Bras. (Minas Geraes).
rhizomatosus *Alv. Silv. l. c.* 148.—Bras. (Minas Geraes).
rigidifolius *Alv. Silv. l. c.* 66.—Bras. (Minas Geraes).

PAEPALANTHUS:—
robustus *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 330.—Venez.
rufescens *Alv. Silv. Fl. Mont.* 104 (1928).—Bras. (Minas Geraes).
rufo-albus *Alv. Silv. l. c.* 94.—Bras. (Minas Geraes).
Ruhlandii *Alv. Silv. l. c.* 118.—Bras. (Minas Geraes).
salticola *Herzog in Fedde, Repert.* xxix. 207 (1931).—Bras. (Amaz.).
Schlechteri (*Ruhl.*) *Macbride in Candollea*, v. 348 (1934): Syngonanthus Schlechteri.
scopulifer *Alv. Silv. Fl. Mont.* 98 (1928).—Bras. (Minas Geraes).
sericeus *Alv. Silv. l. c.* 84.—Bras. (Minas Geraes).
serrinhensis *Alv. Silv. l. c.* 44.—Bras. (Minas Geraes).
similis *Alv. Silv. l. c.* 199.—Bras. (Minas Geraes).
sphaerulifer *Alv. Silv. l. c.* 103.—Bras. (Minas Geraes).
spiralifolius *Alv. Silv. l. c.* 178.—Bras. (Minas Geraes).
spirifer *Alv. Silv. l. c.* 195.—Bras. (Minas Geraes).
spirophorus *Alv. Silv. l. c.* 175.—Bras. (Minas Geraes).
stenolepis *Alv. Silv. l. c.* 43.—Bras. (Minas Geraes).
stephanophorus *Alv. Silv. l. c.* 40.—Bras. (Minas Geraes).
tenuicaulis *Alv. Silv. l. c.* 113.—Bras. (Minas Geraes).
tricholepis *Alv. Silv. l. c.* 32.—Bras. (Minas Geraes).
vaginans *Alv. Silv. l. c.* 166.—Bras. (Minas Geraes).
velutinus *Alv. Silv. l. c.* 145.—Bras. (Minas Geraes).
viridipes *Alv. Silv. l. c.* 115.—Bras. (Minas Geraes).
xanthopus *Alv. Silv. l. c.* 70.—Bras. (Minas Geraes).

PAGAMEA Aubl. (Rubiac.; Loganiac., Gen. Pl.).
conferta *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 419 (1931).—Venez.
garryoides *Standley, l. c.* 420.—Venez.
montana *Gleason & Standley, l. c.* 421.—Venez.

PAGESIA Rafin. (Scrophulariac.).
acuminata (*Walt.*) *Pennell in Acad. Nat. Sc. Philad.* Monogr. 1, *Scroph.* 65 (1935): Gratiola acuminata.
dianthera (*Sw.*) *Pennell, l. c.* 69: Lindernia dianthera.
peduncularis (*Benth.*) *Pennell, l. c.* 65: Herpestis peduncularis.
procumbens (*Mill.*) *Pennell, l. c.* 68: Erinus procumbens.

PAGIANTHA Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xii. 546, 549 (1935). *APOCYNACEAE.*
cerifera (*Panch. & Séb.*) *Markgraf, l. c.* 546: Tabernaemontana cerifera.
corymbosa (*Roxb.*) *Markgraf, l. c.*: Tabernaemontana corymbosa.
dichotoma (*Roxb.*) *Markgraf, l. c.*: Tabernaemontana dichotoma.
Heyneana (*Wall.*) *Markgraf, l. c.*: Tabernaemontana Heyneana.
koroana *Markgraf, l. c.* 546, 549.—Ins. Viti.
macrocarpa (*Jack*) *Markgraf, l. c.* 546: Tabernaemontana macrocarpa.
megacarpa (*Merrill*) *Markgraf, l. c.*: Tabernaemontana megacarpa.
oligantha (*Merrill*) *Markgraf, l. c.*: Tabernaemontana oligantha.
Pandacaqui (*Poir.*) *Markgraf, l. c.*: Tabernaemontana Pandacaqui.
sphaerocarpa (*Blume*) *Markgraf, l. c.*: Tabernaemontana sphaerocarpa.
subglobosa (*Merrill*) *Markgraf, l. c.* 547: Tabernaemontana subglobosa.

PAIVAEUSA Welw. (Euphorbiac.; Burserac., Gen. Pl.).
orientalis *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 710 (1935).—Tanganyika Terr.

PALAFOXIA Lag. (Compos.).
fastigiata *DC. Prodr.* v. 125 (1836).—Am. bor.

PALAOEA Kanehira in Bot. Mag., Tokyo, 1935, xlix. 271. *SAPINDACEAE.*
falcata *Kanehira, l. c.*—Ins. Palau.

PALAQUIUM Blanco (Sapotac.).
Karrak *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 339.—Ins. Carolin. (Ponape).
neo-ebudicum *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 15.—N. Hebrides.
pseudocalophyllum *H. J. Lam in Nova Guinea*, xiv. 552 (1932): P. montanum *Schlechter.*
Stehlinii *Christoph. in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 128, 168 (1935).—Samoa.
Sukoei *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1933, 365.—Burma (Tenasserim).

PALAUA Cav. (Malvac.).
lomageiton *Ulbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 516 (1932).—Peruv.

PALIAVANA Vell. (Gesneriac.).
tenuiflora *Mansf. in Fedde, Repert.* xxxviii. 27 (1935).—Bras. (Bahia).
Werdermanni *Mansf. l. c.*—Bras. (Minas Geraes).

PALICOUREA Aubl. (Rubiac.).
balnearia *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 229 (1931).—Ecuador.
Buchtienii *Standley, l. c.* 317.—Boliv.
calantha *Standley, l. c.* 229.—Ecuador.
chimboracensis *Standley, l. c.* 231.—Ecuador.
circinata (*Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.*) *Standley, l. c.* 464: Psychotria circinata.
cornifolia *Standley, l. c.* 318.—Boliv.
corymbifera (*Muell.-Arg.*) *Standley, l. c.* viii. 380 (1931): Psychotria corymbifera.
cyclotis *Standley, l. c.* vii. 231 (1931).—Ecuador.
egena *Standley, l. c.* 232.—Ecuador.
exiguiflora *Standley, l. c.* 319.—Boliv.?
flavifolia (*Rusby*) *Standley, l. c.* 320: Psychotria flavifolia.
fulgens (*Muell.-Arg.*) *Standley, l. c.* viii. 380 (1931): Psychotria fulgens.
graciliflora *Standley, l. c.* vii. 233 (1931).—Ecuador; Colomb.
grandiflora (*H. B. & K.*) *Standley, l. c.* 466: Nonatelia grandiflora.
Heilbornii *Standley, l. c.* 234.—Ecuador.
Holmgrenii *Standley, l. c.*—Ecuador.
hospitalis *Standley, l. c.* 235.—Ecuador?
huigrensis *Standley, l. c.*—Ecuador.
Jamesonii *Standley, l. c.* 236.—Ecuador.
lanata (*Muell.-Arg.*) *Standley, l. c.* viii. 381 (1931): Psychotria lanata.
Lobbii *Standley, l. c.* vii. 237 (1931).—Ecuador.
macrophylla (*H. B. & K.*) *Standley, l. c.* 321: Nonatelia macrophylla.
macrothyrsa (*Muell.-Arg.*) *Standley, l. c.* 468: Psychotria macrothyrsa.
malacophylla *Standley, l. c.* 322.—Boliv.
mapirensis *Standley, l. c.*—Boliv.
oreadium *Standley, l. c.* 239.—Ecuador.
ovalifolia (*Rusby*) *Standley, l. c.* 323: Psychotria ovalifolia.
pachypodina (*Muell.-Arg.*) *Standley, l. c.* viii. 381 (1931): Psychotria pachypodina.
Pearcei *Standley, l. c.* vii. 324 (1931).—Boliv.
pluricostata *Standley, l. c.* 240.—Ecuador.
radicans *Standley, l. c.* 325.—Boliv.
rudgeoides (*Muell.-Arg.*) *Standley, l. c.* viii. 381 (1931): Psychotria rudgeoides.
Seemannii *Standley, l. c.* vii. 240 (1931).—Ecuador.
stenoclada (*Muell.-Arg.*) *Standley, l. c.* viii. 380 (1931): Psychotria stenoclada.
stenosepala *Standley, l. c.* vii. 241 (1931).—Ecuador.
subaeneo-fusca (*Muell.-Arg.*) *Standley, l. c.* viii. 381 (1931): Psychotria subaeneo-fusca.
tenuis *Standley, l. c.* vii. 326 (1931).—Boliv.
verrucifera *Standley, l. c.* 327.—Boliv.?

PALIURUS Mill. (Rhamnac.).
Hemsleyanus *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 74: P. orientalis *Hemsl.*

PALLENIS Cass. (Compos.).
× Caballeroi *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 99, in obs.—Hispan.
madritensis *Sennen, l. c.*—Hispan.

PALURA Buch.-Ham. (Symplocac.; Styracac., Gen. Pl.).
coreana (*Léveillé*) *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 773: Cotoneaster coreanus.
macrostroma (*Hayata*) *Kanehira & Sasaki in Sasaki, List Pl. Formos.* 332 (1928): Symplocos macrostroma.

PAMIANTHE Stapf ex Gard. Chron. 1933, Ser. III. xciii. 106, sine descr.; Stapf in Bot. Mag. t. 9315 (1933), descr. *AMARYLLIDACEAE.*
Andreana (*Baker*) *Stapf in Bot. Mag.* sub t. 9315 (1933), in obs.: Ismene Andreana.
peruviana *Stapf ex Gard. Chron.* 1933, Ser. III. xciii. 106; *Stapf in Bot. Mag.* sub t. 9315 (1933).—Peruv.
quitoënsis (*Herb.*) *Stapf in Bot. Mag.* sub t. 9315 (1933), in obs.: Hymenocallis quitoënsis.

PANCOVIA Willd. (Sapindac.).
angustifolia *Radlk. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 276 (1921), in obs.; *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 807 (1932).—Congo Belg.
Holtzii *Gilg ex Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 802 (1932).—Tanganyika Terr.
Klaineana *Pierre ex Radlk. l. c.* 796, in syn.: Chytranthus Klaineanus.
polyantha *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 276 (1921), in obs.—Cameroons.
subcuneata *Radlk. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.*, Nachtr. III. 203 (1907), in obs.—Sierra Leone.
thyrsiflora *Gilg ex Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 703 (1932), in syn.: Aphania senegalensis.

PANCRATIUM L. (Amaryllidac.).
barcinonense *Sennen in Mem. Acad. Cienc. Barcelona*, Ser. III. xx. No. 14, 9 (1928), in obs.—Hispan.
Donaldi *Blatter in Journ. & Proc. As. Soc. Beng.* 1930, n. s. xxvi. 360 (1931).—Ind. or. (Bombay).

PANDANUS L. (Pandanac.).
aimiriikensis *Martelli in Kanehira, Fl. Micrones.* 60 (1933), japonice; *et in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 125, latine.—Ins. Palau.
Ala-Kai *Martelli in Univ. Calif. Publ. Bot.* xvii. 174 (1933).—Ins. Cook (Rarotonga).
brachypodus *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 425.—Ins. Carolin. (Enchabi).
Brookei *Martelli in Proc. Roy. Soc. N. S. Wales*, 1933, xlv. 26 (1934).—Austral. (Queensland).
crustatus *Martelli in Univ. Calif. Publ. Bot.* xvii. 173 (1933).—Ins. Cook (Rarotonga).
cuspidatus *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1158 (1895), in syn.: P. Lais.
cylindricus *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 63.—Ins. Carolin. (Ponape).
dilatatus *Kanehira, l. c.*—Ins. Carolin. (Ponape).
distinctus *Martelli in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa*, Mem., 1932, xlii. 117, in clavi; *et in Univ. Calif. Publ. Bot.* xvii. 153 (1933).—Ins. Societ. (Tahiti).
divergens *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 60.—Ins. Palau.
duriocarpoides *Kanehira, l. c.* 525.—Ins. Carolin. (Yap).
duriocarpus *Martelli in Kanehira, Fl. Micrones.* 62 (1933), japonice; *et in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 116, latine.—Ins. Palau.
enchabiensis *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 429.—Ins. Carolin. (Enchabi).
erythrophloeus *Kanehira, l. c.* 66.—Ins. Palau.
Eyesyes *Kanehira, l. c.* 526.—Ins. Carolin. (Kusai).
Hosinoi *Kanehira, l. c.* 103.—Ins. Carolin. (Ponape).
insularis *Kanehira, l. c.* 527.—Ins. Carolin. (Kusai).
jaluitensis *Kanehira, l. c.* 103.—Ins. Marshall (Jaluit).
Kanehirae *Martelli in Kanehira, Fl. Micrones.* 65 (1933), japonice; *et in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 119, latine.—Ins. Palau.
katensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 84, 42 (1931).—Ins. Tuamotu.
korrensis *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 106.—Ins. Palau.

PANDANUS:—
kusaiensis *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 107.—Ins. Carolin. (Kusai).
Lakatwa *Kanehira, l. c.* 529.—Ins. Marshall (Jaluit).
lanutooënsis *Martelli in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu*, x. No. 13, 19 (1934).—Samoa.
laticanaliculatus *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 188.—Ins. Marshall (Jaluit).
macrocephalus *Kanehira, l. c.* 428.—Ins. Carolin. (Mokiel).
macrojeanneretia *Martelli in Kanehira, Fl. Micrones.* 66 (1933), japonice; *et in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 121, latine.—Ins. Palau.
Mei *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 84, 40 (1931).—Ins. Marquesas.
mendanensis *Martelli in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa*, Mem., 1932, xlii. 226.—Ins. Marquesas.
navigatorum *Martelli in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu*, x. No. 13, 8 (1934).—Samoa.
obliquus *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 530.—Ins. Marshall (Jaluit).
× odontoides *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 197.—Ins. Palau.
Okamotoi *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 107.—Ins. Palau.
palawensis *Martelli in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 124.—Ins. Palau.
palkilensis *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 197.—Ins. Carolin. (Ponape).
papeariensis *Martelli in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa*, Mem., 1932, xlii. 117, in clavi; *et in Univ. Calif. Publ. Bot.* xvii. 153 (1933).—Ins. Societ. (Tahiti).
patina *Martelli in Kanehira, Fl. Micrones.* 67 (1933), japonice; *et in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 127, latine.—Ins. Carolin. (Ponape).
peliliuensis *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 113.—Ins. Palau.
ponapensis *Martelli in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 121.—Ins. Carolin. (Ponape).
prismaticus *Martelli in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa*, Mem., 1932, xlii. 117, in clavi; *et in Univ. Calif. Publ. Bot.* xvii. 152 (1933).—Ins. Societ. (Tahiti).
rapensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 84, 45 (1931).—Polynes. (Ins. Rapa).
rhombocarpus *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 426.—Ins. Carolin. (Enchabi).
rotundatus *Kanehira, l. c.* 429.—Ins. Carolin. (Ponape).
salailuaënsis *Martelli in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu*, x. No. 13, p. 12 (1934).—Samoa.
schizocarpus *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 84, 45 (1931).—Ins. Tuamotu.
scopulorum *Martelli in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu*, x. No. 13, p. 9 (1934).—Samoa.
sinensis (*Warb.*) *Martelli in Kanehira, Fl. Micrones.* 69 (1933): P. tectorius var. sinensis.
subulorum *Martelli in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu*, x. No. 13, p. 12 (1934).—Samoa.
tamaruensis *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 16 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
tauensis *Martelli in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu*, x. No. 13, p. 14 (1934).—Samoa.
temehaniensis *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 17 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
tessellatus *Martelli in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa*, Mem., 1932, xlii. 117, in clavi; *et in Univ. Calif. Publ. Bot.* xvii. 154, 174 (1933).—Ins. Societ. (Tahiti); Ins. Cook (Rarotonga).
tomilensis *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 530.—Ins. Carolin. (Yap).
trukensis *Kanehira, l. c.* 190.—Ins. Carolin.; Ins. Marshall.
tuamotensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 84, 43 (1931).—Ins. Tuamotu.
turritus *Martelli in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu*, x. No. 13, p. 17 (1934).—Samoa.
tutuilaënsis *Martelli, l. c.* 11.—Samoa.
upoluensis *Martelli, l. c.* 15.—Samoa.
Utiyamai *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 190.—Ins. Carolin. (Ponape).
Volkensii *Kanehira, l. c.* 111.—Ins. Carolin. (Yap).

PANDERIA Fisch. & Mey. (Chenopodiac.).
turkestanica *Iljin in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 364 (1932).—Ross. asiat. (Kasakstan); Songaria.

PANDIAKA Benth. & Hook. f. (Amaranthac.).
Benthami (*Lopr.*) *Schinz in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 64 (1934): Achyranthes Benthami.
lanuginosa (*Schinz*) *Schinz, l. c.*: Achyranthes lanuginosa.
longipedunculata *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. Anhang, 24 (1932).—Tanganyika Terr.
nodosa (*Vahl*) *Schinz in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 64 (1934): Achyranthes nodosa.

PANDOREA Spach (Bignoniac.).
nervosa *v. Steenis in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 149.—Austral. (Queensland).

PANICULARIA Fabr. (Gramin.).
Fernaldii (*Hitchcock*) *Hitchcock in Bull. N. Y. State Mus.* 1920, Nos. 233–4, 11 (1921): Glyceria pallida var. Fernaldii.

PANICUM L. (Gramin.).
acuminatifolium *Robyns, Esp. Congol. Panic.* (*Mém. Inst. Col. Belge*, 4to, Sect. Sc. Nat. & Méd. i. Fasc. 6) reimpr. p. 27 (1932).—Congo Belg.
amplectens (*Stapf*) *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 241 (1931), in obs.: Acroceras amplectens.
barbatum *Roxb. Hort. Beng.* 7 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 285 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 282 (1832).—Hab. ?
Bartlettii *Swallen in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 436, p. 346 (1934).—Mexico; Guatem.; Brit. Honduras.
bechuanense *Bremek. & Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xvi. 403 (1935).—Bechuanaland Protect.
breviscrobs (*Doell*) *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 242 (1931), in obs.: Ichnanthus breviscrobs.
conjugatum *Roxb. Hort. Beng.* 82 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 291 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 288 (1832).—Ind. or.
corymbosum *Roxb. l. c.* 7, nomen; *et l. c.* 295; *et l. c.* 292.—Ind. or. (Madras).
costatum *Roxb. l. c.* 8, nomen; *et l. c.* 314; *et l. c.* 312.—Mauritius.
curvifolium *Swallen in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 316.—Venez.
cuspidatum *Roxb. Hort. Beng.* 7 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 301 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 298 (1832).—Ind. or. (Bengal).
djalonense *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1934, xiv. 27.—Guinea Gall.
frumentaceum *Roxb. Hort. Beng.* 7 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 307 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 304 (1832).—Ind. or.
glaucocladum *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1933, 501.—Sierra Leone.
guatemalense *Swallen in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1933, xxiii. 460.—Guatem.
gynerioides (*Griseb.*) *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 243 (1931), in obs.: Coleataenia gynerioides.
Henryi (*Rendle*) *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1367 (1931): Digitaria Henryi.
hirsutum *Koen. ex Roxb. Hort. Beng.* 7 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 303 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 300 (1832).—Ind. or.
holcoides *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 288; *et l. c.* 285.—Ind. or.
Homblei *Robyns, Esp. Congol. Panic.* (*Mém. Inst. Col. Belge*, 4to, Sect. Sc. Nat. & Méd. i. Fasc. 6) reimpr. p. 35 (1932).—Congo Belg.
Humbertii *Robyns, l. c.*, reimpr. p. 61.—Congo Belg.
ihosyense *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 54.—Madag.
involucratum *Roxb. Hort. Beng.* 7 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 287 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 284 (1832).—Ind. or.
kaietukense *Tutin in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 340.—Guiana Brit.

PANICUM:—
katentaniense *Robyns, Esp. Congol. Panic.* (*Mém. Inst. Col. Belge*, 4to, Sect. Sc. Nat. & Méd. i. Fasc. 6) reimpr. p. 57 (1932).—Congo Belg.
kisantuense *Vanderyst*; *Robyns, l. c.*, reimpr. p. 25, descr. ampl.—Congo Belg.
koolauense *St. John & Hosaka in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu*, xi. No. 13, 3 (1935).—Ins. Sandvic.
lepidum *Hochst. ex Chiov. in Ann. Bot., Roma*, v. 61 (1906), in adnot.—Abyss.
longiculme *Swallen in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 15.—Colomb.
lukwangulense *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 380 (1935).—Tanganyika Terr.
margaritiferum *Robyns, Esp. Congol. Panic.* (*Mém. Inst. Col. Belge*, 4to, Sect. Sc. Nat. & Méd. i. Fasc. 6) reimpr. p. 36 (1932).—Congo Belg.
marunguense *Robyns, l. c.*, reimpr. p. 37.—Congo Belg.
membranaceum *Robyns, l. c.*, reimpr. p. 41.—Congo Belg.
montanum *Roxb. Hort. Beng.* 82 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 315 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 313 (1832).—Ind. or. (Madras).
nervosum *Roxb. l. c.* 8, nomen; *et l. c.* 314; *et l. c.* 311.—Nepal.
nigromarginatum *Robyns, Esp. Congol. Panic.* (*Mém. Inst. Col. Belge*, 4to, Sect. Sc. Nat. & Méd. i. Fasc. 6) reimpr. p. 24 (1932).—Congo Belg.
niihauense *St. John in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu*, ix. No. 14, 5 (1931).—Ins. Sandvic.
oreades *Domin in Biblioth. Bot.* lxxxv. 297 (1915), in adnot.: P. aequiglume *Hook. f.*
oryzicola *Vasinger in Bull. Appl. Bot., Leningrad*, 1930–1, xxv. No. 4, 125 (1931), in obs.—As. or.
Palackyanum *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1930, lxxvii. 638 (1931).—Madag.
palmatum *Hort. ex Schleicher in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1933, xlviii. 351.—Hort.
paludosum *Roxb. Hort. Beng.* 8 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 310 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 307 (1832).—Ind. or. (Madras).
pellitoides *Forest Brown & St. John in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu*, x. No. 12, 3 (1934).—Ins. Sandvic.
pertenue (*Büse*) *Boerl. in Ann. Jard. Bot. Buitenz.* viii. 51 (1889): Digitaria pertenuis.
Pilgeri *Herter, Fl. Urug. Pl. Vasc.* (*Estud. Bot. Reg. Urug.* iv.) 29 (1931), nomen.—Urug.
plicatum *Roxb. Hort. Beng.* 8 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 313 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 311 (1832).—Sumatra.
Pole-Evansii *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 113.—N. Rhodesia.
pseudoinfestum *Chiov. Fl. Somala*, II. 447 (1932).—Somal. Ital.
pycnoclados *Tutin in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 340.—Guiana Brit.
ramosius *Hitchcock in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 6: P. Beecheyi *Hitchcock in Mem. Bishop Mus., Honolulu*, viii. No. 3, 183 (1922), non *Hook. & Arn.*
Robynsii *A. Camus in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1933, Sér. II. v. 336: P. Humbertii *Robyns.*
Sapini (*Vanderyst*) *Robyns, Esp. Congol. Panic.* (*Mém. Inst. Col. Belge*, 4to, Sect. Sc. Nat. & Méd. i. Fasc. 6) reimpr. p. 34 (1932): Isachne Sapini.
sarmentosum *Roxb. Hort. Beng.* 8 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 311 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 308 (1832).—Sumatra.
secernendum *Hochst. ex Pirotta in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 158 (1897), in syn.; *et ex Mez in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, vii. 68 (1917), descr.—Abyss.
Sennii *Chiov. Fl. Somala*, II. 446 (1932).—Somal. Ital.
serrulatum *Roxb. Hort. Beng.* 8 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 309 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 307 (1832).—Ind. or.
Simpsoni (*Vasey*) *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 109 (1896): P. sanguinale var. Simpsoni.
sonorum *Beal, l. c.* 130.—Mexico.
spicatum (*Willd.*) *Roxb. Hort. Beng.* 7 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 286 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 283 (1832): Holcus spicatus.

PANICUM:—
Stapfianum *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 76 (1932): P. minus *Stapf*.
strictum *Roxb. Hort. Beng.* 7 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 306 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 303 (1832).—Ind. or. (Bengal).
Tatei *Swallen in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 316.—Venez.
tenellum *Roxb. Hort. Beng.* 7 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 309 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 306 (1832).—Ind. or.
tenue *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 313 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 310 (1832).—Ind. or.
tomentosum *Roxb. Hort. Beng.* 7 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 303 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 301 (1832).—Ind. or.
transiens *Swallen in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 436.—Mexico.
Trochainii (*A. Camus*) *A. Camus ex Stapf & C. E. Hubbard in Prain, Fl. Trop. Afr.* ix. 1098 (1934), in obs.: Isachne Trochainii.
tropidoblephare *Tutin in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 339.—Guiana Brit.
tsaratananense *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1930, lxxvii. 638 (1931).—Madag.
uliginosum *Roxb. Hort. Beng.* 8 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 310 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 308 (1832).—Ind. or.
variifolium *Swallen in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 436, p. 345 (1934).—Mexico.
Vaseyanum *Scribn. ex Beal, Grasses N. Amer.* ii. 140 (1896).—Mexico.

PANKE Molina (Haloragac.).
Dominii *Kraj. in Acta Bot. Bohem.* ix. 50 (1930), in syn.: Gunnera Dominii.

PANOPSIS Salisb. (Proteac.).
acuminata (*Meissn.*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 66 (1931): Andripetalum rubescens var. acuminatum.
sessilifolia (*L. C. Rich.*) *Sandwith in Kew Bull.* 1932, 226: Roupala sessilifolia.

PAPAVER L. (Papaverac.).
amurense *Hort. ex Karrer in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1935, l. 427.—Sibir. (Amur).
Dahlianum *Nordh. in Bergens Mus. Årbok*, 1931, Naturvidensk. Rekke, No. 2, 46; *et in Fedde, Repert.* xxix. 307 (1931): P. radicatum subsp. brachyphyllum *A. Tolmatch.*
himalaycum *Cretz. in Acta Faun. Fl. Univ., Bucureşti*, Ser. II. Bot., i. No. 16, 1 (1934).—Reg. Himal.
lapponicum (*A. Tolmatch.*) *Nordh. in Bergens Mus. Årbok*, 1931, Naturvidensk. Rekke, No. 2, 45; *et in Fedde, Repert.* xxix. 307 (1931): P. radicatum subsp. lapponicum.
Miyabeanum *Tatewaki ex Miyabe & Tatewaki in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.* xiv. 5 (1935), in syn.: P. nudicaule subsp. xanthopetalum *Fedde.*
×Nicholsoni *Druce in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1931, ix. 634 (1932).—Anglia.
Parkmannii *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 63 (1894), in syn.: P. alpinum.
pulvinatum *A. Tolmatch. in Trav. Mus. Bot. Acad. Sc. URSS*, xxiv. 269 (1932).—Sibir. arct. (Penins. Taimyr).
relictum (*Lundstr.*) *Nordh. in Bergens Mus. Årbok*, 1931, Naturvidensk. Rekke, No. 2, 45; *et in Fedde, Repert.* xxix. 306 (1931): P. nudicaule subsp. relictum.
×rupivagum *Druce in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1930, ix. 258 (1931).—Anglia.
Sheperdi *Post ex Dinsm. in Post, Fl. Syria, Palest. & Sinai*, ed. 2, i. (*Publ. Am. Univ. Beirut*, Nat. Sc. Ser. No. 1) 32 (1932).—Syria.
sinense *Thunb. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 103 (1833). —Hab.?
tianschanicum *Popov ex Pavlov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1933, n. s. xlii. 126, nomen; *Popov in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 84 (1934), in obs.—Turkestan. (Thian Shan).

PAPHIOPEDILUM Pfitz. (Orchidac.).
×Holdenii *Hort. ex F. Meyer in Gartenflora*, 1934, lxxxiii. 98, in obs.—Hort.
Macfarlanei *Hort. ex F. Meyer, l. c.* 93, in obs.—Hort.

PAPHIOPEDILUM:—
Wardii *Summerhayes in Gard. Chron.* 1932, Ser. III. xcii. 446.—Upper Burma.

PAPPAGROSTIS Roshev. in Komarov, Fl. URSS, ii. 230, 749 ([Sept.] 1934). *GRAMINEAE.*
pappophorea (*Hackel*) *Roshev. l. c.* 231: Calamagrostis pappophorea.

PAPUANTHES Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz. Sér. III. xi. 360 (1931). *LORANTHACEAE.*
Albertisii (*Van Tiegh.*) *Danser, l. c.*: Diplatia Albertisii.

PARABARIUM Pierre (Apocynac.).
Chevalieri *Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1212 (1933).—Indo-China (Anam).
Chunianum *Tsiang in Sunyatsenia*, ii. 119 (1934). —China (Kwangsi; Kwangtung).
hainanense *Tsiang, l. c.* 123.—China (Hainan).
Handelianum *Tsiang, l. c.* 121.—China (Kwangsi).
velutinum *Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1214 (1933).—Hab.?

PARABOEA (C. B. Clarke) Ridley (Gesneriac.).
Bakeri *M. R. Henderson in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 115 (1933).—Penins. Mal.
Bettiana *M. R. Henderson, l. c.* 116.—Penins. Mal.
floribunda *M. R. Henderson, l. c.* 117.—Penins. Mal.

PARACALANTHE Kudo (Orchidac.).
megalophora *Miyabe & Kudo in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 386 (1932): Calanthe tricarinata *Maxim. in Mél. Biol.* viii. 644 (1872), non *Lindl.*

PARACARYUM Boiss. (Boraginac.).
caelestinum (*Lindl.*) *Ind. Kew.* ii. 423 (1894); *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 695 (1895): Cynoglossum coelestinum.
paphlagonicum *Bornm. in Magyar Bot. Lap.* 1931, xxx. 69, in syn.: Mattiastrum paphlagonicum.
Shepardi *Post & Beauverd in Dinsm. Pl. Post. & Dinsm.* Fasc. i. 8 (1932); *Dinsm. in Fedde, Repert.* xxxiii. 107 (1933).—Syria.

PARACELASTRUS Miq. (Celastrac.).
densiflorus (*Wight*) *F. N. Williams in Bull. Herb. Boiss.* 1905, Sér. II. v. 224, in obs.: Microtropis densiflora.
microcarpus (*Wight*) *F. N. Williams, l. c.*, in obs.: Microtropis microcarpa.
ovalifolius (*Wight*) *F. N. Williams, l. c.*, in obs.: Microtropis ovalifolia.
ramiflorus (*Wight*) *F. N. Williams, l. c.*, in obs.: Microtropis ramiflora.
Wallichianus (*Wight ex Thwait.*) *F. N. Williams, l. c.*, in obs.: Microtropis Wallichiana.

PARACYCLEA Kudo & Yamamoto in Bot. Mag., Tokyo, 1932, xlvi. 157. *MENISPERMACEAE.*
insularis (*Makino*) *Kudo & Yamamoto, l. c.*: Cissampelos insularis.
Ochiaiana (*Yamamoto*) *Kudo & Yamamoto, l. c.* 158: Cissampelos Ochiaiana.

PARADRYPETES Kuhlm. in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro, ii. 84 (1935). *EUPHORBIACEAE.*
ilicifolia *Kuhlm. l. c.*—Bras. (Minas Geraes; Espirito Santo).

PARAGEUM Nakai & Hara in Bot. Mag., Tokyo, 1935, xlix. 124. *ROSACEAE.*
calthifolium (*Menzies*) *Nakai & Hara, l. c.* 125: Geum calthifolium.
macranthum (*Kearn. ex Rydb.*) *Hara, l. c.* 124, in adnot.: Sieversia macrantha.
montanum (*L.*) *Hara, l. c.*, in adnot.: Geum montanum.
Peckii (*Pursh*) *Hara, l. c.*, in adnot.: Geum Peckii.
radiatum (*Michx.*) *Hara, l. c.*, in adnot.: Geum radiatum.

PARAÏXERIS Nakai (Compos.).
surugensis *Hisauchi in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 697.—Japon.

PARAJUSTICIA Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine, iv. 756 (1935), sine descr. *ACANTHACEAE.*
Peteloti *Benoist, l. c.*—Indo-China (Tonkin).

PARALINOSPADIX Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xii. 331 (1935). *PALMAE.*
amischus *Burret, l. c.* 335.—N. Guin.
arfakianus (*Becc.*) *Burret, l. c.* 333: Linospadix arfakianus.
caudiculatus (*Becc.*) *Burret, l. c.* 335: Linospadix caudiculatus.
flabellatus (*Becc.*) *Burret, l. c.* 334: Linospadix flabellatus.
Forbesii (*Ridley*) *Burret, l. c.*: Linospadix Forbesii.
geonomiformis (*Becc.*) *Burret, l. c.* 335: Linospadix geonomiformis.
Hollrungii (*Becc.*) *Burret, l. c.* 334: Linospadix Hollrungii.
Julianettii (*Becc.*) *Burret, l. c.*: Linospadix Julianetti.
leptostachys (*Burret*) *Burret, l. c.* 335: Linospadix leptostachys.
Micholitzii (*Ridley*) *Burret, l. c.* 334: Linospadix Micholitzii.
microspadix (*Becc.*) *Burret, l. c.* 335: Linospadix microspadix.
multifidus (*Becc.*) *Burret, l. c.* 334: Linospadix multifidus.
pachystachys (*Burret*) *Burret, l. c.* 335: Linospadix pachystachys.
pauciflorus (*Ridley*) *Burret, l. c.*: Linospadix pauciflorus.
Petrickianus (*Sander*) *Burret, l. c.* 334: Linospadix Petrickianus.
pusillus (*Becc.*) *Burret, l. c.*: Linospadix pusillus.
Schlechterii (*Becc.*) *Burret, l. c.* 335: Linospadix Schlechterii.

PARAMACHAERIUM Ducke (Legumin.).
ormosioides (*Ducke*) *Ducke in Tropical Woods*, 1935, No. 41, 6: Pterocarpus ormosioides.

PARAMAPANIA Uitt. in Rec. Trav. Bot. Néerl. 1935, xxxii. 186. *CYPERACEAE.*
amboinensis *Uitt. l. c.* 191.—Ins. Molucc. (Amboina).
gracillima (*Kükenth. & Merrill*) *Uitt. l. c.* 190: Mapania gracillima.
johorensis *Uitt. l. c.* 191.—Penins. Mal.
lucbanensis (*Elmer*) *Uitt. l. c.* 190: Mapania lucbanensis.
montana (*Lauterb. & K. Schum.*) *Uitt. l. c.* 200, in obs., nomen provis.: Mapania montana.
radians (*C. B. Clarke*) *Uitt. l. c.* 188: Mapania radians.
rostrata *Uitt. l. c.* 189.—Ins. Philipp. (Luzon).
simplex (*Ridley*) *Uitt. l. c.* 190: Thoracostachyum simplex.

PARAMIGNYA Wight (Rutac.).
cuspidata (*Ridley*) *Burkill in Gard. Bull. Straits Settlements*, v. 213 (1931): Atalantia cuspidata.
glabra *Tanaka in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1932, xxii. 425, in syn.: P. grandiflora.
lobata *Burkill in Gard. Bull. Straits Settlements*, v. 214 (1931): Atalantia hispida *Ridley, Fl. Mal. Penins.* i. 357 (1922), non *Pierre ex Guillaumin.*
missionis (*Oliv.*) *Burkill, l. c.* 213, in obs.: Atalantia missionis.
Ridleyi *Burkill, l. c.* 214: P. Griffithii *Ridley, Fl. Mal. Penins.* i. 356 (1922), non *Hook. f.*
trimera (*Oliv.*) *Burkill, l. c.* 213, in obs.: Atalantia trimera.

PARANEPHELIUM Miq. (Sapindac.).
chinense *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 30 (1935).—China (Kweichau; Hainan); Indo-China (Anam).

PARANOMUS Salisb. (Proteac.).
laxus (*Schlechter*) *N. E. Brown in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 262 (1933): Nivenia laxa.
Marlothii (*Phillips*) *N. E. Brown, l. c.*: Nivenia Marlothii.
reflexus (*Phillips & Hutchinson*) *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 97 (1932): Nivenia reflexa.
tomentosus (*Phillips & Hutchinson*) *N. E. Brown in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 264 (1933): Nivenia tomentosa.

PARAPHLOMIS Prain (Labiat.).
brevidens *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 193 (1934).—Sumatra.
lancidentata *Sun in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., x. 30 (1935).—China (Chekiang).

PARAPHLOMIS:—
tomentoso-capitata *Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1934, vi. 556.—Formosa.

PARAPHYADANTHE Mildbr. (Flacourtiac.).
suffruticosa *Milne-Redhead in Hook. Ic. Pl.* xxxii. t. 3168 (1932).—N. Rhodesia.

PARATECOMA Kuhlm. in Minist. Agric. Serv. Fl. Bras. Bol. No. 4 (Nov. Gen. Bignoniac.) 3 (1931). *BIGNONIACEAE.*
diandra *Kuhlm. l. c.*—Bras. (Minas Geraes).
Peroba (*Record*) *Kuhlm. l. c.*, in nota: Tecoma Peroba.

PARATHESIS Hook. f. (Myrsinac.).
rubella *Moldenke in Phytologia*, i. 11 (1933).—Colomb.

PARATROPHIS Blume (Morac.; Urticac., Gen. Pl.).
australiana *C. T. White in Contrib. Arn. Arb.* No. iv. 15 (1933).—Austral. (Queensland).
glabra (*Merrill*) *v. Steenis in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 8: Gironniera glabra.

PARAVALLARIS Pierre (Apocynac.).
microphylla *Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1181 (1933).—Indo-China (Anam).

PARDUYNA Salisb. (Liliac.).
undulata (*R. Br.*) *Dandy in Journ. Bot.* 1932, lxx. 330: Schelhammera undulata.

PARECTENIUM Stapf in Ind. Lond. iv. 548 (1930): **Paractaenum** Beauv. (Gramin.).

PAREIRA Lour. ex Gomes in Mem. Acad. Sc. Lisb. Cl. Sc. Pol. Mor. Bel.-Let. n. s. iv. (1), 28 (1868); Merrill in Trans. Am. Phil. Soc. n. s. xxiv. ii. 16 (1935). *VITACEAE.*
brava *Lour. ex Gomes, l. c.*; *Merrill, l. c.*, pro syn.: Botria africana.

PAREUGENIA Turrill (Myrtac.).
oblongifolia *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 83, 23 (1931).—Ins. Viti.

PARHABENARIA Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 1932, Sér. II. iv. 597. *ORCHIDACEAE.*
cambodiana *Gagnep. l. c.*—Cambodia.

PARIETARIA L. (Urticac.).
nummularia *Small, Man. Southeast. Fl.* 434 (1933). —U.S.A. (Florida).

PARINARI Aubl. (Rosac.).
Aubrevillei *Pellegr. in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 440.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
baoulensis *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 317 (1928), in syn.: P. Kerstingii.
canescens *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 370.—Venez.
cardiophylla *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 33 (1935).—Bras. (Amaz.).
Krukovii *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 353.—Bras. (Matto Grosso).
latifolia *M. R. Henderson in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 102 (1933).—Penins. Mal.
nalaënsis *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 289 (1931).—Congo Belg.
palauensis *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 282.—Ins. Palau.
parilis *Macbride in Candollea*, v. 367 (1934).—Peruv.
parvifolia *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 374.—Guiana Brit.
petiolata *v. Malm in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 630 (1932).—Ins. Sunda (Flores).
Swynnertonii *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 308 (1915), in obs.—S. Rhodesia.
Vassoni *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 317 (1928), in syn.: P. Kerstingii.

PARIS L. (Liliac.).
manshurica *Komarov in Komarov & Klob.-Alis. Key Pl. Far East. Reg. USSR*, i. 385 (1931); *Komarov, Fl. URSS*, iv. 473, 748 (1935).—Manchur.

PARISHIA Hook. f. (Anacardiac.).
borneënsis *Ridley in Kew Bull.* 1933, 200.—Borneo.
Lowei *Ridley, l. c.* 201.—Borneo.
minor *Ridley, l. c.*—Borneo.
polycarpa *Ridley, l. c.* 200.—Borneo.
sericea *Ridley, l. c.* 201.—Borneo.

PARITI Adans. (Malvac.).
macrophyllum (*Roxb.*) *Degener, Fl. Hawaiiensis*, Fam. 221 (1932): Hibiscus macrophyllus.

PARKIA R. Br. (Legumin.).
decussata *Ducke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 472 (1932).—Bras. (Amaz.; Pará).
igneiflora *Ducke, l. c.*—Bras. (Amaz.).
Korom *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 286.—Ins. Carolin. (Ponape).

PARNASSIA L. (Saxifragac.).
brevistyla (*Brieg.*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 434 (1931): P. Delavayi var. brevistyla.
cacuminum *Hand.-Mazz. l. c.* 433.—China (Szechuan).
dilatata *Hand.-Mazz. in Sinensia*, ii. 135 (1932).—China (Kweichau).
obovata *Hand.-Mazz. l. c.* 134.—China (Kweichau).
scaposa *Mattf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 306 (1931).—China (Szechuan).

PARODIA Speg. (Cactac.).
aureicentra *Backeb. in Cactus* (*Belg.*) iv. 57 (1934); *et in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 268, 416 (1935).—Argent.
aureispina *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 7, [p. 6].—Argent.
carminata *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 268, 416 (1935).—Argent.
catamarcensis *Backeb. l. c.* 269, 416.—Argent.
chrysacanthion (*K. Schum.*) *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 3, [p. 2]: Echinocactus chrysacanthion.
Faustiana *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 266, 415 (1935).—Argent.
macrancistra *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 11, [p. 7], in obs., nomen.—Argent.
microthele *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 266, 415 (1935).—Hab.?
mutabilis *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 7, [p. 8].—Argent.
nivosa *Backeb. l. c.* 1934, Pt. 12, [p. 3].—Argent.
rubricentra *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 267, 415 (1935).—Argent.
sanguiniflora *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 12, [p. 4].—Argent.
Schwebsiana (*Werderm.*) *Backeb. l. c.* 1935, Pt. 3, [p. 1]: Echinocactus Schwebsianus.
scopaoides *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 272, 416 (1935).—Argent.
setifer *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 7, [p. 7].—Argent.
Stuemeri (*Werderm.*) *Backeb. in Cactus* (*Belg.*) iv. 57 (1934); *et in Kakteenfreund*, iv. 50 (1935); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 147: Echinocactus Stuemeri.
tilcarensis (*Werderm. & Backeb.*) *Backeb. in Kakteenfreund*, iv. 50 (1935); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 147: Echinocactus Stuemeri var. tilcarensis.

PARONYCHIA Mill. (Caryophyllac.; Illecebrac., Gen. Pl.).
anatolica *Czecz. in Acta Soc. Bot. Polon.* 1932, ix. 34.—As. Min. (Galatia; Paphlagonia).
Beauverdi *Czecz. l. c.*—As. Min. (Galatia).
montana (*Small*) *Pax & K. Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 300 (1934): Anychiastrum montanum.
pseudo-aretioides *Emberger & Maire*; *Emberger & Maire in Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc*, Nos. xxi–xxii. 27 (1930).—Marocc.
pulvinata (*Small*) *Pax & K. Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 300 (1934): Nyachia pulvinata.

PAROPSIA Nor. (Flacourtiac.; Passiflorac., Gen. Pl.).
adenostegia (*Stapf*) *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 572 (1921), in obs.: Androsiphonia adenostegia.
Schliebeniana *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 475 (1935).—Tanganyika Terr.

PAROSELA Cav. (Legumin.).
Paysoniae *L. Williams in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1934, lxi. 262.—U.S.A. (N. Mexico).
Sawadae *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 24 (1931).—Peruv.
Smithii *Macbride in Candollea*, v. 370 (1934).—Peruv.

PAROSELA:—
villosa (*Rydb.*) *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 40: Thornbera villosa.

PARRYA R. Br. (Crucif.).
asperrima (*B. Fedtsch.*) *Popov in Vved. & al., Key Fl. Tashkent*, 143 (1924); *et in Bull. Univ. As. Centr.* ix. Suppl., 28 (1925): P. nudicaulis var. asperrima.
grandiflora (*C. A. Mey.*) *Schischk. in Krylov, Fl. Sibir. Occ.* vi. 1394 (1931): Draba grandiflora.
schugnana *Lipschitz in Fedde, Repert.* xxxviii. 31 (1935).—Turkestan.

PARSONSIA P. Br. (Lythrac.).
dispersa *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 63 (1933–5).—Mexico.
Parsonsia (*L.*) *Britton in Mem. Torr. Bot. Cl.* xii. 53 (1902): Lythrum Parsonsia.
purpureocalycis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 64 (1933–5).—Calif. infer.
Watsoni (*M. E. Jones*) *M. E. Jones, l. c.* 69, in obs.: Cuphea Watsoni.

PARSONSIA R. Br. (Apocynac.).
densivestita *C. T. White in Contrib. Arn. Arb.* No. iv. 92 (1933).—Austral. (Queensland).
goniostemon *Hand.-Mazz. in Sunyatsenia*, ii. 165 (1934).—China (Kwangsi).
Howii *Tsiang in Sunyatsenia*, ii. 167 (1934).—China (Hainan).
neo-ebudica *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 20.—N. Hebrides.
satureioides *Rusby in Phytologia*, i. 69 (1934).—Boliv.

PARTHENOCISSUS Planch. (Vitac.).
suberosus *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 681 (1933).—China (Kweichau).

PASANIA Oerst. (Fagac.; Cupulif., Gen. Pl.).
attenuata (*Rehder*) *Chun in Ic. Pl. Sinic.* Fasc. 4, p. 3 (1935): Lithocarpus attenuatus.
brunnea (*Rehder*) *Chun in Sunyatsenia*, i. 221 (1934): Lithocarpus brunneus.
craterophora *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1932, 319.—Penins. Mal.
Elizabethae (*Tutcher*) *Chun in Sunyatsenia*, i. 221 (1934): Quercus Elizabethae.
paniculata (*Hand.-Mazz.*) *Chun, l. c.* ii. 67 (1934): Lithocarpus paniculatus.
Rodgeriana *A. Camus in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 690, nomen alternativ.—Burma.

PASPALIDIUM Stapf (Gramin.).
caespitosum *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 446. —Austral. (Queensland).
Clementii (*Domin*) *C. E. Hubbard, l. c.* 447: Panicum Clementii.
constrictum (*Domin*) *C. E. Hubbard, l. c.*: Panicum constrictum.
platyrrhachis *C. E. Hubbard, l. c.* 262.—N. Rhodesia.
tabulatum (*Hackel*) *C. E. Hubbard, l. c.* 448: Panicum tabulatum.

PASPALUM L. (Gramin.).
almum *Chase in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1933, xxiii. 137.—U.S.A. (Texas).
Berterianum *Balb. ex Colla, Herb. Pedem.* vi. 129 (1836).—Hab.?
chacoënse *Parodi in Physis*, xi. 132 (1932).—Argent.
Chaseanum *Parodi, l. c.* 129.—Argent.
galapageium *Chase in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xxi. 297 (1935).—Ins. Galapag.
glaucifolium *Berter ex Colla, Herb. Pedem.* vi. 129 (1836), in syn.: P. Berterianum.
Horneri *Henrard in Blumea*, i. 306 (1935), in obs.: P. hirsutum *Büse in Pl. Jungh.* 383 (1854), non *Retz.*
hydrophilum *Henrard in Meded. Herb. Leid.* No. 45, 1, errata (1922).—Parag.
longifolium *Roxb. Hort. Beng.* 7 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 283 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 280 (1832).—Sumatra?
longum *Chase in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 52 (1931).—Mexico (Arch. Revillagigedo).
Mayanum *Chase in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 436, p. 342 (1934).—Mexico.

PASPALUM:—
Ostenii *Herter, Fl. Urug. Pl. Vasc.* (*Estud. Bot. Reg. Urug.* iv.) 30 (1931), nomen.—Urug.
pertenue (*Büse*) *Backer in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. II. xii. 25 (1913): Digitaria pertenuis.
Pittieri *Hackel ex Tonduz*; *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 88 (1896), descr.—Mexico.
redundans *Chase in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xxi. 300 (1935).—Ins. Galapag.
scandens *Tutin in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 338.—Guiana Brit.
sparsum *Chase in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 436, p. 341 (1934).—Mexico.
subfalcatum (*Doell*) *Tutin in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 338, in obs.: Panicum subfalcatum.
tenuissimum *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 24 (1933–5).—Calif. infer.

PASSIFLORA L. (Passiflorac.).
isotriloba *Cufod. in Archiv. Bot., Forlì*, 1933, ix. 196.—Costa Rica.
kwangtungensis *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 38 (1934).—China (Kwangtung).
loretensis *Killip in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 349.—Peruv.
maculifolia *Masters in Gard. Chron.* 1902, Ser. III. xxxii. 334.—Venez.
pilosissima *Killip in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 348.—Colomb.
Tatei *Killip & Rusby in Phytologia*, i. 66 (1934).—Boliv.
vittata *Hort. ex Bois in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 766, pro syn.: P. trifasciata.

PASTOREA Tod. (Crucif.).
Prolongi (*Boiss.*) *O. E. Schulz in Engl. Jahrb.* lxvi. 97 (1933), in obs.: Thlaspi Prolongi.
Saviana (*Caruel*) *O. E. Schulz, l. c.*: Bivonaea Saviana.

PATAGONULA L. Sp. Pl. ed. 1, 149 (1753). *BORAGINACEAE.*
americana *L., l. c.*—Patag.

PATRINIA Juss. (Valerianac.).
diandra *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 619.—Manchur.

PAUA Caballero in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. xvi. 540 (1916). *COMPOSITAE.*
maroccana *Caballero, l. c.* 541.—Marocc.

PAULLINIA L. (Sapindac.).
africana *R. Br. apud Tedlie in Bowdich, Miss. Ashantee*, 373 (1819).—Afr. trop.
aspera *Radlk.*; *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 254 (1931), descr. emend.—Bras. (Matto Grosso).
Baileyi *Standley in Contrib. Arn. Arb.* No. v. 95 (1933).—Panamá (Ins. Barro Colorado).
brevispica *Fourn. ex Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 271 (1931), in syn.: P. tomentosa.
dasyphylla *Radlk.*; *Radlk. l. c.* 337 (1932), descr. emend.—Bras. (Matto Grosso).
prismatocarpa *Salzm. ex Radlk. l. c.* 346, in syn.: P. weinmanniifolia.
Sprucei *Macbride in Candollea*, vi. 12 (1934): P. riparia *Radlk.*
Tatei *Rusby in Phytologia*, i. 64 (1934).—Boliv.
Wetmorei *Standley in Contrib. Arn. Arb.* No. v. 96 (1933).—Panamá (Ins. Barro Colorado).
Williamsi *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 27 (1931).—Peruv.

PAULOWNIA Sieb. & Zucc. (Scrophulariac.).
coreana *Uyeki in Bull. Agric. Suigen, Corea*, i. 20, fig. 16 (1925); cf. *Höfker in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1932, xliv. 417.—Corea.
shensiensis *Pai in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, iii. 60 (1935).—China (Shensi).
viscosa *Hand.-Mazz. in Sinensia*, v. 7 (1934).—China (Kwangsi).

PAURIDIANTHA Hook. f. (Rubiac.).
canthiifolia *Hook. f. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iii. 71 (1877), sphalm.: P. canthiiflora.

PAUROTIS O. F. Cook (Palmae).
Schippii *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 303 (1935).—Brit. Honduras.

PAUSANDRA Radlk. (Euphorbiac.).
flagellorhachis *Lanj. Euphorbiac. Surinam*, 30 (1931).—Guiana Bat.

PAUSANDRA:—
integrifolia *Lanj. in Kew Bull.* 1932, 183.—Guiana Brit.

PAUSINYSTALIA Pierre (Rubiac.).
reticulata *Hutchinson*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 71 (1931), in syn.: P. Lane-Poolei.
Sankeyi *Hutchinson & Dalziel, l. c.* 70, in clavi, 71.—Nigeria.

PAVETTA L. (Rubiac.).
agrostiphylla *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 89 (1934): P. angustifolia *Thwait.*
amabilis *Bremek. l. c.* 100.—Burma.
apiculata *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 89, in clavi, 91 (1931).—Guinea Gall.; Gold Coast.
arabica *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 126 (1934).—Arab.
aspera *Craib in Kew Bull.* 1932, 430.—Siam.
assamica *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 119 (1934).—Assam; Burma.
australiensis *Bremek. l. c.* 124.—Austral. (Queensland).
axillaris *Bremek. l. c.* 85.—Sumatra; Java; Borneo.
Backeri *Bremek. l. c.* 120.—Ins. Kangean.
baconiella *Bremek. l. c.* 73.—Cameroons.
bangweënsis *Bremek. l. c.* 79.—Cameroons.
basilanensis *Bremek. l. c.* 87.—Ins. Philipp. (Basilan).
Batesiana *Bremek. l. c.* 152.—Cameroons.
Bauchei *Bremek. l. c.* 117.—Indo-China (Anam).
bengalensis *Bremek. l. c.* 99.—Ind. or. (Bengal; Kanara).
bilineata *Bremek. l. c.* 140.—Sudan.
birmahica *Bremek. l. c.* 115.—Burma.
blanda *Bremek. l. c.* 94.—Ind. or. (Madras; Mysore; Cochin); Zeylan.
brachysiphon *Bremek. l. c.* 74.—Cameroons.
bracteata *Pav. ex Moldenke in Brittonia*, i. 436 (1934), in syn.: Aegiphila insignis.
brevituba *Craib in Kew Bull.* 1932, 431.—Siam.
Brownii *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 125 (1934).—Austral. bor.
Burttii *Bremek. l. c.* 147.—Tanganyika Terr.
buruensis *Bremek. l. c.* 123.—Ins. Molucc. (Buru; Ceram).
calophylla *Bremek. l. c.* 90.—Ind. or. (Madras).
calothyrsa *Bremek. l. c.* 67: P. macrothyrsa *K. Krause.*
cambodiensis *Bremek. l. c.* 118.—Cambodia.
candelabra *Bremek. l. c.* 133.—Congo Belg.
capensis (*Houttuyn*) *Bremek. l. c.* 166: Crinita capensis.
caudata *Bremek. l. c.* 105.—Sumatra.
celebica *Bremek. l. c.* 107.—Celebes.
cellulosa *Bremek. l. c.* 75.—Congo Belg.
Chevalieri *Bremek. l. c.* 115.—Indo-China (Anam).
concanica *Bremek. l. c.* 81.—Ind. or. (Madras).
condorensis *Bremek. l. c.* 116.—Cochinch.
congensis *Bremek. l. c.* 67.—Congo Belg.
coriacea *Bremek. l. c.* 69.—Congo Belg.; Uganda.
coronifera *Bremek. l. c.* 82.—Sumatra.
crassicaulis *Bremek. l. c.* 112.—Ind. or. (Madras ?).
Cumingii *Bremek. l. c.* 109.—Ins. Philipp. (Luzon).
Dalei *Bremek. l. c.* 72.—Kenya Col.
Deflersii *Bremek. l. c.* 127.—Arab.
dolichantha *Bremek. l. c.* 175.—Tanganyika Terr.
dolichosiphon *Bremek. l. c.* 143.—Abyss.; Erythraea; Gallaland.
eketensis *Bremek. l. c.* 75.—S. Nigeria; Cameroons.
eritreënsis *Bremek. l. c.* 143.—Erythraea.
Erlangeri *Bremek. l. c.* 144.—Somaliland.
Exellii *Bremek. l. c.* 73.—Fernando Po.
fascifolia *Bremek. l. c.* 177.—Afr. Lusit. Or.
Finlaysoniana *Wall.*; *Bremek. l. c.* 116, descr.—Siam.
flaviflora (*K. Schum.*) *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 90, in clavi, 92 (1931): Exechostylus flaviflorus.
formosa *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 85 (1934).—Penins. Mal.
fruticosa *Craib in Kew Bull.* 1932, 431.—Siam.
funebris *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 63 (1934).—Congo Belg.
gabonica *Bremek. l. c.* 77.—Cameroons; Gabon.
Gamblei *Bremek. l. c.* 114.—Burma.

PAVETTA:—
Gardneri *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 89 (1934).—Zeylan.
Geoffrayi *Bremek. l. c.* 117.—Cambodia.
globularis *Bremek. l. c.* 160.—Angola.
glomerata *Bremek. l. c.* 93.—Zeylan.
gorontalensis *Bremek. l. c.* 110.—Celebes.
Gossweileri *Bremek. l. c.* 64.—Angola.
granitica *F. Muell. ex Bremek. l. c.* 123.—Austral. (Queensland).
Griffithii *Bremek. l. c.* 99.—Bhutan.
Haareri *Bremek. l. c.* 171.—Tanganyika Terr.
herbacea *Bremek. l. c.* 173.—Angola.
Hierniana *Bremek. l. c.* 76.—S. Nigeria; Gabon.; Cameroons.
hirtiflora *Bremek. l. c.* 161.—Transvaal.
Hochstetteri *Bremek. l. c.* 182.—Abyss.; Erythraea; Sudan. Brit.
Hohenackeri *Bremek. l. c.* 98.—Ind. or. (Madras).
hongkongensis *Bremek. l. c.* 104.—China (Kwangtung; Hainan).
Humbertii *Bremek. l. c.* 177.—Congo Belg.
hygrophytica *Bremek. l. c.* 68.—Gold Coast; Cameroons.
hymenophylla *Bremek. l. c.*—Tanganyika Terr.
insignis *Bremek. l. c.* 65.—Sudan.; Congo Belg.; Uganda.
insulana *Valeton ex Bremek. l. c.* 124.—Austral. bor.
intermedia *Bremek. l. c.* 71.—Liberia; Cameroons; Congo Belg.
ituriensis *Bremek. l. c.* 142.—Congo Belg.
ixorifolia *Bremek. l. c.* 79.—Guinea Gall.
Johnstonii *Bremek. l. c.* 147.—Nyasaland.
kasaica *Bremek. l. c.* 69.—Congo Belg.
kedahica *Bremek. l. c.* 83.—Penins. Mal.; Sumatra.
kenyensis *Bremek. l. c.* 149.—Kenya Col.
kyimbilensis *Bremek. l. c.*—Tanganyika Terr.
laeta *Bremek. l. c.* 82.—Ind. or. (Madras).
lampongensis *Bremek. l. c.* 87.—Sumatra; Arch. Riau; Banca.
lamurensis *Bremek. l. c.* 148.—Uganda.
laoticensis *Bremek. l. c.* 101.—Indo-China (Laos).
lasiocalyx *Bremek. l. c.* 96.—Borneo.
lasioclada (*K. Krause*) *Mildbr. ex Bremek. l. c.* 62: Chomelia lasioclada.
leucosphaera *Bremek. l. c.* 148.—Uganda.
linearifolia *Bremek. l. c.* 128.—Zanzibar.
loandensis (*S. Moore*) *Bremek. l. c.* 172: Canthium loandense.
longibrachiata *Bremek. l. c.* 75.—Cameroons.
longistipulata *Bremek. l. c.* 78.—S. Nigeria; Cameroons.
luzonica *Bremek. l. c.* 109.—Ins. Philipp. (Luzon).
Macraei *Bremek. l. c.* 89.—Zeylan.
madrassica *Bremek. l. c.* 91.—Ind. or. (Madras).
Maitlandii *Bremek. l. c.* 142.—Uganda; Kenya Col.
makassarica *Bremek. l. c.* 87.—Celebes.
malacophylla *Bremek. l. c.* 81.—Zeylan.
mannioides *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 89, in clavi, 91 (1931).—Nigeria.
Marlothii *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 174 (1934).—Bechuanaland Protect.
melanochroa *Bremek. l. c.* 105.—Cambodia.
micrantha *Bremek. l. c.* 74.—Congo Belg.
mindanaënsis *Bremek. l. c.* 88.—Ins. Philipp. (Mindanao).
mirabilis *Bremek. l. c.* 84.—Borneo.
mocambicensis *Bremek. l. c.* 153.—Afr. Lusit. Or.
mollissima *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 89, in clavi, 91 (1931).—Gold Coast.
moluccana *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 123 (1934).—Ins. Molucc. (Amboina; Ceram).
Muelleri *Bremek. l. c.* 124.—Austral. (N. Territory).
multiflora (*Koorders & Valeton*) *Bremek. l. c.* 106: P. indica f. multiflora.
Napieri (*Ridley*) *Bremek. l. c.* 96: Tarenna Napieri.
neglecta *Bremek. l. c.* 92.—Ind. or. (Bengal; Assam).
nemoralis *Bremek. l. c.* 94.—Ind. or. (Cochin; Madras).
nervosa *Craib in Kew Bull.* 1932, 432.—Siam.
nigrescens *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 89, in clavi, 91 (1931).—Sierra Leone.
nitida (*Schum. & Thonn.*) *Hutchinson & Dalziel, l. c.*: Ixora nitida.
nova-guineënsis *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 111 (1934).—N. Guin.

PAVETTA:—
nyassica *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 150 (1934).—Nyasaland; Tanganyika Terr.
obanica *Bremek. l. c.* 77.—S. Nigeria.
oblanceolata *Bremek. l. c.* 91.—Ind. or. (Madras).
oblongifolia (*Hiern*) *Bremek. l. c.* 65: P. Baconia var. oblongifolia.
obovalis *Bremek. l. c.* 107.—Celebes.
olivifolia *Chiov. Fl. Somala,* II. 252 (1932).—Somal. Ital.
ombrophila *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 133 (1934).—Cameroons.
oresitropha *Bremek. l. c.* 73.—Fernando Po.
ovaliloba *Bremek. l. c.* 181.—Tanganyika Terr.
palembangensis *Bremek. l. c.* 86.—Sumatra.
peninsularis *Bremek. l. c.* 84.—Siam; Penins. Mal.; Borneo.
petiolaris *Wall.*; *Craib in Kew Bull.* 1932, 432, descr.—Siam.
Pierrei *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 101 (1934).—Cambodia.
pilosa *Craib in Kew Bull.* 1932, 433.—Siam.
Pitardii *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 83 (1934).—Siam; Indo-China.
platycalyx *Bremek. l. c.* 137.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
platyphylla *Chiov. Fl. Somala,* II. 248 (1932); *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 161 (1934).—Somaliland.
plumosa *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 89, in clavi, 91 (1931).—Nigeria.
polyantha *Wall.*; *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 103 (1934), descr.—Assam; China (Yunnan; Kwangsi).
polyneura *Bremek. l. c.* 119.—Burma (Tenasserim).
praecox *Bremek. l. c.* 114.—Ind. or. (Kanara; Madras).
praeterita *Bremek. l. c.* 92.—Ind. or. (Madras).
pusilliflora *Bremek. l. c.* 117.—Siam.
Reinwardtii *Bremek. l. c.* 121.—Java; Timor?
renidens (*K. Krause*) *Bremek. l. c.* 25, in obs., 132: Psychotria renidens.
rhodesiaca *Bremek. l. c.* 181.—Afr. trop.
rhombifolia *Bremek. l. c.* 64.—Sierra Leone; N. Nigeria; Gabon.
rufipila *Bremek. l. c.* 26, in obs., 137.—Tanganyika Terr.
Ruttenii *Bremek. l. c.* 88.—Ins. Molucc. (Ceram; Halmahera).
salicina (*Ridley*) *Bremek. l. c.* 103: Webera salicina.
Sarasinorum *Bremek. l. c.* 110.—Celebes.
scabrifolia *Bremek. l. c.* 100.—China (Yunnan).
Scaettae *Bremek. l. c.* 155.—Congo Belg.
scandens *Bremek. l. c.* 177.—Kenya Col.; Tanganyika Terr.
Schweinfurthii *Bremek. l. c.* 66.—Sudan.; Afr. Gall. Centr.
Sennii *Chiov. Fl. Somala,* II. 251 (1932); *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 159 (1934).—Somaliland.
sepium *K. Schum.*; *Bremek. l. c.* 178, descr. emend.—Tanganyika Terr.
siamica *Bremek. l. c.* 120.—Cochinch.; Cambodia; Siam; Penins. Mal.
silvicola *Bremek. l. c.* 145.—Kenya Col.; Tanganyika Terr.
sinensis *Lour. ex Gomes in Mem. Acad. Sc. Lisb. Cl. Sc. Pol. Mor. Bel.-Let.* n. s. iv. (1), 28 (1868); *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 16, 369 (1935), in syn.: P. arenosa.
Smythei *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 90, in clavi, 92 (1931).—Sierra Leone.
Staudtii *Hutchinson & Dalziel, l. c.* 89, in clavi, 91.—Nigeria.
stemonogyne *Mildbr. ex Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 131 (1934).—Cameroons.
Stocksii *Bremek. l. c.* 113.—Ind. or. (Bombay).
striatula *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 90, in clavi, 91 (1931).—Sierra Leone.
Stuhlmannii *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 155 (1934).—Tanganyika Terr.
subumbellata *Bremek. l. c.* 176.—Tanganyika Terr.
sumbawensis *Bremek. l. c.* 121.—Ins. Sunda (Sumbawa; Timor).
swatowica *Bremek. l. c.* 104.—China (Kwangtung).
tendagurensis *Bremek. l. c.* 154.—Tanganyika Terr.
tetramera (*Hiern*) *Bremek. l. c.* 18, in obs., 134: Tarenna tetramera.

PAVETTA:—
Thomsoni *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 99 (1934).—Ind. or. austr.
Thwaitesi *Bremek. l. c.* 94.—Zeylan.
Tisserantii *Bremek. l. c.* 63.—Afr. Gall. Centr.
tonkinensis *Bremek. l. c.* 103.—Indo-China (Tonkin).
trachyphylla *Bremek. l. c.* 102.—Indo-China (Anam).
transjubensis *Chiov. Fl. Somala,* II. 249 (1932).—Somal. Ital.
translucens *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 120 (1934).—Cambodia.
travancorica *Bremek. l. c.* 81.—Ind. or. (Travancore).
trichosphaera *Bremek. l. c.* 138.—Kenya Col.; Tanganyika Terr.
tristis *Bremek. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 260 (1933): P. opaca *Bremek.*
umtalensis *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 128 (1934).—S. Rhodesia.
uniflora *Bremek. in Hook. Ic. Pl.* xxxii. t. 3194 (1933).—Kenya Col.
urundensis *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 66 (1934).—Afr. centr.
Valetonii *Bremek. l. c.* 111.—N. Guin.
Vanderijstii *Bremek. l. c.* 68.—Congo Belg.
venusta *Bremek. l. c.* 78.—Cameroons.
wargalensis *Bremek. l. c.* 145.—Somal. Brit.
Wildemannii *Bremek. l. c.* 18, in obs., 134: Chomelia longifolia *De Wild.*, non Pavetta longifolia *Miq.*
yambatensis *Bremek. l. c.* 74.—Congo Belg.
zoutpansbergensis *Bremek. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 260 (1933).—Transvaal.

PAVONIA Cav. (Malvac.).
Bangii *Ulbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 543 (1932).—Boliv.
Burchellii (*DC.*) *R. A. Dyer in Kew Bull.* 1932, 152: Althaea Burchellii.
glabra (*R. Br.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon,* vi. Suppl., 29 (1931): Urena glabra.
haematophthalmos *Chiov. Fl. Somala,* II. 21 (1932).—Somal. Ital.
lanceolata *Colla, Herb. Pedem.* i. 398 (1833).—Bras.
leptocalyx (*Sond.*) *Ulbr. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 388 (1921), in obs.: Hibiscus leptocalyx.
Martii *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 397 (1833).—Bras.
parva *Ulbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 543 (1932): P. nana *Ulbr.*
Rogersii *N. E. Brown in Kew Bull.* 1932, 95.—Rhodesia.
Sennii *Chiov. Fl. Somala,* II. 23 (1932).—Somal. Ital.

PAXIA Herter, Fl. Urug. Pl. Vasc. (Estud. Bot. Reg. Urug. iv.) 80 (1931), sine descr. *EUPHORBIACEAE.*
acaulis *Herter, l. c.*, nomen.—Urug.
rhizantha (*Pax & K. Hoffm.*) *Herter, l. c.*: Ditaxis rhizantha.
rosularis (*Pax & K. Hoffm.*) *Herter, l. c.*: Ditaxis rosularis.

PEARSONIA Dummer (Legumin.).
mucronata *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal,* Pt. II. p. xxviii. 384 (1932).—Transvaal.

PECTINARIA Haw. (Asclepiadac.).
tulipiflora *Luckhoff in S. Afr. Gard.* 1934, xxiv. 101, 106, in adnot.—Afr. austr. (Cape Prov.).

PECTIS L. (Compos.).
falcata *Cufod. in Archiv. Bot., Forli,* 1933, ix. 202.—Costa Rica.
glabra *Howell in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xxi. 333 (1935).—Ins. Galapag.
mornicola *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 83 (1931).—Haiti.
purpurascens *Urb. & Ekman, l. c.* 82.—Santo Domingo.
subeglandulosa *Urb. & Ekman, l. c.* 83.—Haiti.

PECTOCARYA DC. (Boraginac.).
recurvata *I. M. Johnston in Contrib. Arn. Arb.* No. III. 97 (1932).—Calif. super. et infer.; Arizona.

PEDDIEA Harv. (Thymelaeac.).
bambuseti *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 629 (1921), in obs.—Congo Belg.
brachypoda *Gilg & Lederm. ex Engl. l. c.*, in obs.—Cameroons.
lanceolata *Domke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 670 (1932).—Tanganyika Terr.
Mildbraedii *Engl. & Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 629 (1921), in obs.—Congo Belg.
montana *Domke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 670 (1932).—Tanganyika Terr.
multiflora (*De Wild.*) *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 629 (1921), in obs.: P. longipedicellata var. multiflora.
potamophila *Gilg ex Engl. l. c.*, in obs.—Afr. trop.
puberula *Domke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xii. 386 (1935).—Tanganyika Terr.
rapaneoides *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 629 (1921), in obs.—Congo Belg.
subcordata *Domke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xii. 387 (1935).—Tanganyika Terr.

PEDICELLARIA Schrank (Capparidac.).
gynandra (*L.*) *Chiov. Fl. Somala,* II. 5 (1932): Cleome gynandra.

PEDICULARIS L. (Scrophulariac.).
anthemifolia *Fisch. ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 370 (1835).—Altai.
atrosanguinea *Pennell & Thompson in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1934, lxi. 443.—U.S.A. (Washington).
flavida *Pennell, l. c.* 445.—U.S.A. (Oregon; Calif.).
iwatensis *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 54 (1934).—Japon. (Hondo).
latifolia *Pennell in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1934, lxi. 448.—Brit. Columb.; Washington; Idaho.
Morasi *L. & M. Gortani ex Fiori, Nuov. Fl. Anal. Ital.* ii. 377 (1926).—Ital.
pachyrhiza *Pennell in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1934, lxi. 445.—U.S.A. (Oregon).
paddoënsis *Pennell, l. c.* 444.—U.S.A. (Washington).
Paysoniana *Pennell, l. c.* 446.—U.S.A. (Rocky Mts.).
pubescens (*Bunge ex Komarov*)*Pai in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping,* ii. 125 (1934): P. Sceptrum-Carolinum var. pubescens.
schizocalyx (*Willk.*) *Rothmaler in Cavanillesia,* vii. 119 (1935): P. comosa var. schizocalyx.
talassica *Vved. ex Baranov in Journ. Turkest. Branch Russ. Geogr. Soc.* 1923, xvi. 139, nomen.—Turkestan. (Thian Shan).
Tatianae *Bordz. in Fedde, Repert.* xxxvi. 305 (1934).—Caucas.
Thompsonii *Pennell in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1934, lxi. 447.—U.S.A. (Washington).

PEDILANTHUS Neck. (Euphorbiac.).
Brittoni (*Millsp.*) *Pax & K. Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix c. 223 (1931): Cubanthus Brittoni.

PEGANUM L. (Zygophyllac.; Rutac., Gen. Pl.).
texanum *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 47 (1933–5).—U.S.A. (Texas).

PEGIA Colebr. (Anacardiac.).
bijuga *Hand.-Mazz. in Sinensia,* iii. 186 (1933).—China (Kwangsi).
sarmentosa (*Lecomte*) *Hand.-Mazz. l. c.* 187, in obs.: Phlebochiton sarmentosum.

PEGLERA Bolus (Rhizophorac.).
Carvalhoi (*Engl.*) *H. Winkler in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 121 (1931): Nectaropetalum Carvalhoi.

PEGOLETTIA Cass. (Compos.).
Anol *Range in Fedde, Repert.* xxxviii. 279 (1935), nomen.—Namaqualand.

PELARGONIUM L'Hérit. (Geraniac.).
Angelina *Hort. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 517 (1833), nomen.—Hort.
aridum *R. A. Dyer in Kew Bull.* 1932, 445: P. dissectum *Steud.*
benguellense (*Welw. ex Oliv.*) *Warb. Kunene-Sambesi-Exped.* 268 (1903): P. flabellifolium var. benguellense.

PELARGONIUM :—
caledonicum *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 229, 232.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Eberlanzii *Knuth in Fedde, Repert.* xxxiv. 147 (1933).—Afr. austr.-occ.
Emelianum *Hort. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 518 (1833), nomen.—Hab. ?
Fergusoniae *L. Bolus in Kew Bull.* 1934, 258.—Afr. austr. (Cape Prov.).
frutetorum *R. A. Dyer in Kew Bull.* 1932, 446.—Afr. austr. (Cape Prov.).
gracillimum *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 91 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Hollandii *Leighton in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 229, 232.—Afr. austr. (Cape Prov.).
hospitans *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 169 (1931), in obs., nomen.—Afr. austr.-occ.
karooicum *Compton & Barnes in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 295 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
×kewense *R. A. Dyer in Journ. Roy. Hort. Soc.* 1934, lix. 214.—Hab. ?
Leopoldianum *Hort. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 519 (1833), nomen.—Hab. ?
leptum *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 229, 232.—Afr. austr. (Cape Prov.).
majestuosum *Hort. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 519 (1833), nomen.—Hab. ?
mollicomum *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 92 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
parvirostre *R. A. Dyer in Kew Bull.* 1932, 445.—Afr. austr. (Cape Prov.).
pulcherrimum *Leighton in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 229, 232.—Afr. austr. (Cape Prov.).
pulsatillum *Hort. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 520 (1833), nomen.—Hab. ?
reclinatum *Hort. ex Colla, l. c.* 521, nomen.—Hab. ?
salmoneum *R. A. Dyer in Kew Bull.* 1932, 447.—Afr. austr. (Cape Prov.).

PELEA A. Gray (Rutac.).
fatuhivensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 130, p. 129 (1935).—Ins. Marquesas (Fatuhiva).
nukuhivensis *Forest Brown, l. c.* p. 127.—Ins. Marquesas (Nukuhiva).

PELECYPHORA Ehrenb. (Cactac.).
pectinata *B. Stein in Gartenflora,* 1885, xxxiv. 25.—Mexico.
pseudopectinata *Backeb. in Kakteenk.* 1935, 98.—Mexico.

PELIOSANTHES Andrews (Liliac.; Haemodorac., Gen. Pl.).
campanulata (*Baill.*) *L. Rodrig. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1934, Sér. II. vi. 96: Lourya campanulata.
dasystachys *Diels ex L. Rodrig. in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine,* vi. 672 (1934).—Indo-China (Tonkin).
Labroyana *Pierre ex L. Rodrig. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1934, Sér. II. vi. 96.—Indo-China (Tonkin).
Mantegazziana (*Pampan.*) *Pampan. in Bull. Soc. Tosc. Ortic.* 1905, Ser. III. x. 52, in obs.: P. Teta var. Mantegazziana.
serrulata *L. Rodrig. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1934, Sér. II. vi. 96.—Cambodia; Cochinch.

PELLACALYX Korth. (Rhizophorac.).
Lobbii (*Hook. f.*) *Schimper in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* iii. vii. 54 (1893): Plaesiantha Lobbii.

PELLEGRINIA Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xii. 287 (1935): **Ceratostema** Juss. (Ericac.).
buxifolia (*Gardn. & Fielding*) *Sleum. l. c.* 288: Ceratostema buxifolium.
coccinea (*Hoerold*) *Sleum. l. c.*: Ceratostema coccineum.
coronaria (*Linden*) *Sleum. l. c.*: Ceratostema coronarium.
dichogama (*Cuatrec.*) *Sleum. l. c.* 289: Ceratostema dichogamum.
fabulosa (*Sleum.*) *Sleum. l. c.*: Ceratostema fabulosum.
Graebneriana (*Hoerold*) *Sleum. l. c.* 288: Ceratostema Graebnerianum.
grandiflora (*Ruiz & Pav.*) *Sleum. l. c.*: Ceratostema grandiflorum.

PELLEGRINIA :—
guascensis (*Cuatrec.*) *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xii. 289 (1935): Cavendishia guascensis.
Harmsiana (*Hoerold*) *Sleum. l. c.* 288: Ceratostema Harmsianum.
hirsuta (*Ruiz & Pav.*) *Sleum. l. c.*: Ceratostema hirsutum.
lanceolata (*Benth.*) *Sleum. l. c.*: Ceratostema lanceolatum.
Lobbii (*A. C. Smith*) *Sleum. l. c.*: Ceratostema Lobbii.
longepedicellata (*Sleum.*) *Sleum. l. c.* 289: Ceratostema longepedicellatum.
Mandoni (*Britton*) *Sleum. l. c.* 288: Ceratostema Mandoni.
microphylla (*Hoerold*) *Sleum. l. c.*: Ceratostema microphyllum.
parvifolia (*Benth.*) *Sleum. l. c.* 289: Ceratostema parvifolium.
Pearcei (*Britton*) *Sleum. l. c.*: Rusbya Pearcei.
pubiflora (*Wedd.*) *Sleum. l. c.*: Ceratostema pubiflorum.
rigida (*Benth.*) *Sleum. l. c.* 288: Ceratostema rigidum.
Rimbachii (*A. C. Smith*) *Sleum. l. c.* 289: Ceratostema Rimbachii.
speciosa (*André*) *Sleum. l. c.* 288: Ceratostema speciosum.
spectabilis (*Rusby*) *Sleum. l. c.*: Ceratostema spectabile.

PELLIONIA Gaudich. (Urticac.).
begoniifolia *Hort. ex O. Krause in Planta,* xiii. 70 (1931), in obs.—Hab. ?
rostrata *Valeton ex v. Steenis in Arch. Hydrobiol.,* Suppl.-Band, xi. 300 (1932), in syn.: Polychroa rostrata.

PELTASTES R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard. 1932, xix. 375. *APOCYNACEAE.*
colombianus *R. E. Woodson, l. c.* 378.—Colomb.
giganteus *R. E. Woodson, l. c.*—Boliv.
macrocalyx (*Muell.-Arg.*) *R. E. Woodson, l. c.* 376: Echites macrocalyx.
malviflorus *R. E. Woodson, l. c.*—Bras. (Paraná).
peltatus (*Vell.*) *R. E. Woodson, l. c.*: Echites peltata.
stemmadeniiflorus *R. E. Woodson, l. c.* 377.—Parag.

PELTOGYNE Vogel (Legumin.).
altissima *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1932, Sér. II. iv. 726.—Bras. (Amaz.).
catingae *Ducke in Tropical Woods,* 1932, No. 31, 13; *et in Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro,* vi. 20 (1933).—Bras. (Amaz.).
excelsa *Ducke, l. c.* 12; *et l. c.* 18.—Bras. (Amaz.).
micrantha *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro,* ii. 39 (1935).—Bras. (Amaz.).
rigida *Ducke in Tropical Woods,* 1932, No. 31, 13.—Bras. (Amaz.).

PELTOSPERMUM DC. (Apocynac.).
Quebracho *Köhler, Med.-Pfl.,* Atlas, iii. p. 48, sub t. 214 (1898), in syn.: Aspidosperma Quebracho.

PELTOSTIGMA Walp. (Rutac.).
eximium *Morton in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1933, xlvi. 83.—Mexico.

PENDULINA Willk. (Crucif.).
ilarcitana *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 109.—Hispan.

PENIANTHUS Miers (Menispermac.).
Gossweileri *Exell in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. Suppl., 8.—Congo Lusit.

PENICULUS Swallen in Am. Journ. Bot. 1932, xix. 581. *GRAMINEAE.*
angustifolius *Swallen, l. c.*—Brit. Honduras.

PENIOCEREUS Britton & Rose (Cactac.).
Rosei *G. Ortega, Rev. Mexic. Biol.* vi. No. 5 (1926); cf. *G. Ortega, Apuntes Fl. Indig. Sinaloa,* Fam. Cact. H. [No. 1] (1929).—Mexico.

PENNISETUM L. C. Rich. (Gramin.).
albicauda *Stapf & C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1933, 294.—Afr. austr.-occ.
americanum (*L.*) *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* B, 51 (1895): Panicum americanum.
ancylochaete *Stapf & C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1933, 294.—N. Nigeria.

PENNISETUM :—
atrichum *Stapf & C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1933, 282.—Afr. trop.
Barteri *Stapf & C. E. Hubbard, l. c.* 287.—N. Nigeria.
catabasis *Stapf & C. E. Hubbard, l. c.* 281.—Uganda; Kenya Col.
cauda-ratti (*Schumacher*) *Franch. in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun,* 1895, viii. (*Contrib. Fl. Congo Franç.* 52) 360 (1896): Panicum cauda-ratti.
Chevalieri *Stapf & C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1933, 285.—Afr. Gall. Centr.
Chudeaui *Maire & Trabut in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1931, Sér. II. iii. 523.—Sahara.
cinereum *Stapf & C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1933, 298.—Gold Coast.
cupreum *Hitchcock in L. H. Bailey, Standard Cycl. Hort.* v. 2537 (1916), in obs.—Hab. ?
Dalzielii *Stapf & C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1933, 290.—N. Nigeria.
darfuricum *Stapf & C. E. Hubbard, l. c.* 283.—Sudan. (Darfur).
Davyi *Stapf & C. E. Hubbard, l. c.* 278.—Nyasaland.
Dowsonii *Stapf & C. E. Hubbard, l. c.* 279.—Kenya Col.
durum *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 163 (1896).—Mexico.
echinurus (*K. Schum.*) *Stapf & C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1933, 270: P. spicatum var. echinurus.
exile *Stapf & C. E. Hubbard, l. c.* 277.—Tanganyika Terr.
fallax (*Fig. & De Not.*) *Stapf & C. E. Hubbard, l. c.* 270: Penicillaria fallax.
Franchetianum *Stapf & C. E. Hubbard, l. c.* 277.—Gabon.
gambiense *Stapf & C. E. Hubbard, l. c.* 297.—Gambia; Gold Coast.
geniculatum (*Thunb.*) *Phillips, S. Afr. Grasses* (*S. Afr. Agric. Ser.* vi.) 219 (1931): Cenchrus geniculatus.
gibbosum *Stapf & C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1933, 299.—N. Nigeria.
glaucocladum *Stapf & C. E. Hubbard ex Stent & Rattray in Proc. Rhodes. Scientif. Assoc.* xxxii. (*Stent & Rattray, Grasses S. Rhodes.*) 38 (1933), nomen; *Stapf & C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1933, 276, descr.—Rhodesia.
Gossweileri *Stapf & C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1933, 274.—Congo Lusit.
grandiflorum *Stapf & C. E. Hubbard, l. c.* 280.—Kenya Col.
Haareri *Stapf & C. E. Hubbard, l. c.* 273.—Tanganyika Terr.
Henryanum *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 84, 61 (1931).—Ins. Marquesas.
leonis *Stapf & C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1933, 296.—Sierra Leone.
macropogon *Stapf & C. E. Hubbard ex Stent & Rattray in Proc. Rhodes. Scientif. Assoc.* xxxii. (*Stent & Rattray, Grasses S. Rhodes.*) 38 (1933), nomen; *Stapf & C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1933, 275, descr.—S. Rhodesia.
Maiwa *Stapf & C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1933, 297.—S. et N. Nigeria.
malacochaete *Stapf & C. E. Hubbard, l. c.* 295.—Tanganyika Terr.
marquisense *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 84, 63 (1931).—Ins. Marquesas.
massaicum *Stapf*; *Stapf & C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1933, 273, descr. emend.—Kenya Col.; Tanganyika Terr.
niloticum *Stapf & C. E. Hubbard, l. c.* 293.—Senegamb.; Cameroons; Sudan.; Aegypt.
ochrops *Stapf & C. E. Hubbard, l. c.* 284.—N. Nigeria.
orthochaete *Stapf & C. E. Hubbard, l. c.* 292.—Sudan.
perspeciosum *Stapf & C. E. Hubbard, l. c.* 291.—Sudan.
pycnostachyum (*Steud.*) *Stapf & C. E. Hubbard, l. c.* 270: Cenchrus pycnostachyus.
robustum *Stapf & C. E. Hubbard, l. c.* 286.—Angola.
Rogeri *Stapf & C. E. Hubbard, l. c.* 285.—Senegal.
salifex *Stapf & C. E. Hubbard, l. c.* 279.—Uganda; Kenya Col.; Tanganyika Terr.
Sampsonii *Stapf & C. E. Hubbard, l. c.* 289.—N. Nigeria.

PENNISETUM:—
Scaettae *Robyns, Fl. Agrost. Congo Belge*, ii. 344 (1934); *Robyns in Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. 3 (1934).—Congo Belg.
Schliebenii *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 804 (1933).—Tanganyika Terr.
sclerocladum *Stapf & C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1933, 288.—Gambia.
Sieberianum (*Schlecht.*) *Stapf & C. E. Hubbard, l. c.* 270: Penicillaria Sieberiana.
Simeonis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 84, 61 (1931).—Ins. Marquesas.
stenorrhachis *Stapf & C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1933, 270: P. tenue *Mez*.
stenostachyum (*Klotzsch ex A. Br.*) *Stapf & C. E. Hubbard, l. c.*: Penicillaria stenostachya.
subangustum (*Schumacher*) *Stapf & C. E. Hubbard, l. c.* 271: Panicum subangustum.
typhoides (*Burm. f.*) *Stapf & C. E. Hubbard, l. c.*: Alopecurus typhoides.
vulpinum (*A. Br.*) *Stapf & C. E. Hubbard, l. c.* 270: Penicillaria vulpina.

PENSTEMON Mitch. (Scrophulariac.).
acaulis *L. Williams in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1934, xxi. 345.—U.S.A. (Wyoming).
alluviorum *Pennell in Small, Man. Southeast. Fl.* 1203 (1933); *et in Acad. Nat. Sc. Philad.* Monogr. 1, *Scroph.* 210 (1935), descr. ampl.—U.S.A. (W. States).
amabilis *G. N. Jones in Research Stud. State Coll. Wash.* 1930, ii. 126 (1931).—U.S.A. (Washington).
bracteatus *Keck in Leafl. West. Bot.* i. 82 (1934).—U.S.A. (Utah).
brevisepalus *Pennell in Small, Man. Southeast. Fl.* 1204 (1933); *et in Acad. Nat. Sc. Philad.* Monogr. 1, *Scroph.* 227 (1935), descr. ampl.—U.S.A. (E. States).
Brittonorum *Pennell ex Peattie in Journ. E. Mitchell Sc. Soc.* xlv. 276 (1930); *Pennell in Small, Man. Southeast. Fl.* 1204 (1933).—U.S.A. (E. States).
connatifolius *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1931, xviii. 437.—U.S.A. (Arizona).
Deamii *Pennell in Acad. Nat. Sc. Philad.* Monogr. 1, *Scroph.* 212 (1935).—U.S.A. (Illinois; Indiana).
exsertus *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1931, xviii. 438.—U.S.A. (Arizona).
hesperius *Peck in Torreya*, 1932, xxxii. 152.—U.S.A. (Oregon).
× hybridus *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 767 (1895), in syn.: P. Hartwegii var. hybridus *Voss*.
laxiflorus *Pennell in Acad. Nat. Sc. Philad.* Monogr. 1, *Scroph.* 229 (1935).—U.S.A. (S.E. States).
Lyalli (*A. Gray*) *A. Gray, Syn. Fl. N. Amer.* ed. 2, ii. Pt. 1, 440 (1886): P. Menziesii var. Lyalli.
Nelsonae *Keck & Thompson in Rhodora*, 1935, xxxvii. 419.—U.S.A. (Washington).
neotericus *Keck in Univ. Calif. Publ. Bot.* xvi. 398 (1932).—U.S.A. (Calif.).
oklahomensis *Pennell in Acad. Nat. Sc. Philad.* Monogr. 1, *Scroph.* 237 (1935).—U.S.A. (Oklahoma).
pallescens *Osterh. in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1930, lvii. 559 (1931).—U.S.A. (Colorado).
Pickettii *St. John in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1931, xliv. 33.—U.S.A. (Washington).
regalis *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 578.—U.S.A. (N. Mexico).
scapoides *Keck in Univ. Calif. Publ. Bot.* xvi. 379 (1932).—U.S.A. (Calif.; Nevada).
Wherryi *Pennell in Acad. Nat. Sc. Philad.* Monogr. 1, *Scroph.* 228 (1935).—U.S.A. (Oklahoma; Arkansas).
wisconsinensis *Pennell, l. c.* 234.—U.S.A. (Wisconsin).

PENTADENIA Hanst. (Gesneriac.).
Isernii *Cuatrec. in An. Univ. Madrid*, iv. Fasc. 2, 247 (1935), in syn.: Columnea Isernii.

PENTADESMA Sabine (Guttif.).
Exelliana *Staner in Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. 151 (1934).—Congo Belg.
Lebrunii *Staner, l. c.* 149.—Congo Belg.

PENTADIPLANDRA Baill. (Tiliac.).
dasyanthus (*Gilg*) *Exell in Journ. Bot.* 1927, lxv. Suppl. 1, 48, in obs.: Cercopetalum dasyanthum.

PENTAGONIA Benth. (Rubiac.).
orthoneura *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 212 (1931).—Ecuador.
Sprucei *Standley, l. c.*—Ecuador.
subauriculata *Standley, l. c.* viii. 347 (1931).—Peruv.
velutina *Standley, l. c.*—Peruv.

PENTANISIA Harv. (Rubiac.).
parviflora *Stapf ex Bullock in Kew Bull.* 1933, 80, in obs.—Afr. trop. or. (Elgon).

PENTAPHRAGMA Wall. (Campanulac.).
Bartlettii *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 201 (1934).—Sumatra.
integrifolium *Merrill, l. c.* 202.—Sumatra.
obtusifolium *Merrill in Sarawak Mus. Journ.* iii. 556 (1928).—Borneo.
Winitii *Craib apud Kerr in Kew Bull.* 1935, 334.—Siam.

PENTARRHINUM E. Mey. (Asclepiadac.).
iringense *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 404 (1932).—Tanganyika Terr.

PENTAS Benth. (Rubiac.).
flammea *Chiov. Fl. Somala*, II. 231 (1932).—Somal. Ital.
graniticola *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1933, 146.—Tanganyika Terr.
magnifica *Bullock in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3265 (1935).—Tanganyika Terr.

PENTASCHISTIS Stapf (Gramin.).
ampla (*Th. Dur. & Schinz*) *McClean in S. Afr. Journ. Sc.* 1926, xxiii. 282: Achneria ampla.
aurea (*Th. Dur. & Schinz*) *McClean, l. c.*: Achneria aurea.
Bachmannii *McClean, l. c.*: Achneria curvifolia.
capillaris (*Stapf*) *McClean, l. c.* 281: Achneria capillaris.
Chrysurus (*K. Schum.*) *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. 1. 303 (1931): Danthonia Chrysurus.
Ecklonii (*Th. Dur. & Schinz*) *McClean in S. Afr. Journ. Sc.* 1926, xxiii. 282: Achneria Ecklonii.
Galpinii (*Stapf*) *McClean, l. c.*: Achneria Galpinii.
Mannii *Stapf ex Maitland in Kew Bull.* 1932, 425, in obs., nomen.—Cameroons.
microphylla (*Th. Dur. & Schinz*) *McClean in S. Afr. Journ. Sc.* 1926, xxiii. 282: Achneria microphylla.
pilosogluma *McClean, l. c.*: Achneria hirsuta.
setifolia (*Stapf*) *McClean, l. c.*: Achneria setifolia.
Steudelii *McClean, l. c.* 281: Achneria capensis.

PENTASPADON Hook. f. (Anacardiac.).
minutiflora *B. L. Burtt in Kew Bull.* 1935, 305.—Ins. Solomon. (Bougainville).
teleianthera *Ridley in Kew Bull.* 1933, 199.—Borneo.

PENTASPATELLA Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl. 1931, lviii. 388. *OCHNACEAE*.
ramosa *Gleason, l. c.* 389.—Venez.

PENTATHERUM Náběl ek (Gramin.).
hissaricum *Nevski ex Komarov, Fl. URSS*, ii. 197 (1934), in syn.: Calamagrostis hissarica.
Ruprechtii *Nevski ex Komarov, l. c.* 198, in syn.: Calamagrostis Ruprechtii.
trichanthum *Schischk. ex Komarov, l. c.*, in syn.: Calamagrostis trichanthum.

PENTILIUM Rafin. Herb. Rafinesq. 52 (1833), sine descr. *LILIACEAE*?
acuminatum *Rafin. l. c.*—Hab.?

PENTOPETIA Decne. (Asclepiadac.).
dasynema *Choux in Arch. Bot., Caen*, Bull., 1930, iv. 98.—Madag.

PENTZIA Thunb. (Compos.).
hesperidum *Maire & Wilczek in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1935, xxvi. 129.—Marocc.
laxa *Bremek. & Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xvi. 441 (1935).—Bechuanaland Protect.
pilulifera (*L. f.*) *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 87 (1932): Cotula pilulifera.

PEPEROMIA Ruiz & Pav. (Piperac.).
abscondita *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 25 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
alternifolia *Yuncker in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 112, 24 (1933).—Ins. Sandvic.

PEPEROMIA:—
amphioxys *Trelease in Fedde, Repert.* xxix. 24 (1931).—Hispaniola.
Baileyae *Trelease ex Standley in Contrib. Arn. Arb.* No. v. 53 (1933).—Panamá (Ins. Barro Colorado).
Candollei *St. John in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu*, ix. No. 14, 6 (1931).—Ins. Sandvic.
chrysolepida *Trelease in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 57 (1931).—Mexico (Arch. Revillagigedo).
chucanebana *Trelease in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., x. 156 (1931).—Honduras.
collicola *Trelease in Fedde, Repert.* xxix. 24 (1931).—Hispaniola.
contraria *Trelease, l. c.*—Hispaniola.
corozosana *Trelease, l. c.* 25.—Hispaniola.
Cufodontii *Trelease in Archiv. Bot., Forli*, 1934, x. 26.—Costa Rica.
Degeneri *Yuncker in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 112, 25 (1933).—Ins. Sandvic.
duartensis *Trelease in Fedde, Repert.* xxix. 25 (1931).—Hispaniola.
duidana *Trelease in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 354.—Venez.
Forbesii *Yuncker in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 112, 44 (1933).—Ins. Sandvic.
Gollii *Trelease in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., x. 156 (1931).—Honduras; Guatem.
guayabillosana *Trelease in Archiv. Bot., Forli*, 1934, x. 26.—Costa Rica.
kokeana *Yuncker in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 112, 50 (1933).—Ins. Sandvic.
kulensis *Yuncker, l. c.* 88.—Ins. Sandvic.
kusaiensis *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 120.—Ins. Carolin. (Kusai).
ladronica *Hosokawa, l. c.* 268: P. mariannensis *Hosokawa*.
longeacuminata *Trelease in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., x. 157 (1931).—Honduras.
mapulehuana *Yuncker in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 112, 79 (1933); P. Helleri *Léveillé*.
marchionensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 22 (1935).—Ins. Marquesas.
mariannensis *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 120.—Ins. Marian.
medianiana *Trelease in Fedde, Repert.* xxix. 25 (1931).—Hispaniola.
moncionis *Trelease, l. c.* 26.—Hispaniola.
montazosana *Trelease, l. c.*—Hispaniola.
ocoana *Ekman ex Trelease, l. c.*—Hispaniola.
pacifica *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 119.—Ins. Marian. (Saipan).
papulata *Trelease in Fedde, Repert.* xxix. 26 (1931).—Hispaniola.
pilipeduncula *Trelease, l. c.* 27.—Hispaniola.
Porschiana *Trelease in Archiv. Bot., Forli*, 1934, x. 27.—Costa Rica.
puteolifera *Trelease in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., x. 157 (1931).—Honduras.
raiateënsis *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 26 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
rapensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 21 (1935).—Ins. Austral; Ins. Rapa.
rauniensis *Schwartz in Mitt. Inst. Bot. Hamburg*, vii. 233 (1931).—Borneo.
rubripetiola *Trelease in Fedde, Repert.* xxix. 27 (1931).—Hispaniola.
san-juanana *Trelease, l. c.* 28.—Hispaniola.
societatis *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 26 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
socorronis *Trelease in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 58 (1931).—Mexico (Arch. Revillagigedo).
subglabra (*Setchell*) *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 24 (1935): P. Moerenhoutii var. subglabra.
subpetiolata *Yuncker in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 112, p. 116 (1933).—Ins. Sandvic.
tiniannensis *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 121, in syn.: P. Kraemeri.
tradescantiifolia *Schwartz in Mitt. Inst. Bot. Hamburg*, vii. 234 (1931).—Borneo.

PEPEROMIA :—
Treleasei *Yuncker in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 112, 46 (1933).—Ins. Sandvic.
triadophylla *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. Anhang, 1 (1932).—Tanganyika Terr.
Tyleri *Trelease in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 355.—Venez.
waikamoiana *Yuncker in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 112, 69 (1933).—Ins. Sandvic.
yaquena *Trelease in Fedde, Repert.* xxix. 28 (1931). —Hispaniola.

PERAMA Aubl. (Rubiac.).
scaposa *Gleason & Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 475 (1931).—Venez.

PEREBEA Aubl. (Morac.; Urticac., Gen. Pl.).
acanthogyne *Ducke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 579 (1932).—Bras. (Amaz.); Peruv.
australis (*Hemsl.*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 17 (1931): Castilloa australis.
Chimiqua *Macbride, l. c.* 63.—Peruv.
elegans *Macbride, l. c.*—Peruv.

PERESKIA Mill. (Cactac.).
hortensis *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 385 (1894), in syn.: P. Pereskia.
longissima *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in syn.: P. Pereskia.

PERESKIOPSIS Britton & Rose (Cactac.).
Blakeana *G. Ortega, Apuntes Fl. Indig. Sinaloa*, Fam. Cact. A. [No. 1] (1929).—Mexico.
Gatesii *Baxter in Cact. & Succ. Journ. Amer.* iii. 133, 134 (1932).—Calif. infer.

PEREZIA Lag. (Compos.).
aspera *Bacigal. in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcvii. 18 (1931).—Mexico.
dissiticeps *Bacigal. l. c.* 17.—Mexico.
kuhnioides *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 73 (1933–5).—Mexico.
lobulata *Bacigal. in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcvii. 16 (1931).—Mexico.
nervata *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 74 (1933–5).—Mexico.
nitens *M. E. Jones, l. c.* 73.—Mexico.
scapiformis *Bacigal. in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcvii. 15 (1931).—Mexico.

PERGULARIA L. (Asclepiadac.).
Daemia (*Forsk.*) *Blatter & McCann in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxvi. 528 (1933): Asclepias Daemia.

PERICLESIA A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb. xxviii. 357 (1932). *ERICACEAE.*
flexuosa *A. C. Smith, l. c.*—Colomb. vel Peruv.

PERIDERIDIA Reichb. (Umbellif.).
Rusbyi (*Coult. & Rose*) *House in Bull. N. Y. State Mus.* 1920, Nos. 233–4, 68 (1921): Eulophus Parishii var. Rusbyi.

PERILLA L. (Labiat.).
albiflora *Odashima in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1935, vii. 84.—Formosa.
Shimadae *Kudo in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1931, iii. 225.—Formosa.

PERILOBA Rafin. (Nolanac.).
galapagensis *Christoph. in Nyt Mag. Naturvidensk., Oslo*, lxx. 89 (1932).—Ins. Galapag.
insularis *I. M. Johnston in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcv. 32 (1931).—Peruv. (Ins. San Gallan).

PERIPLOCA L. (Asclepiadac.).
floribunda *Tsiang in Sunyatsenia*, ii. 180 (1934).—China (Yunnan).

PERISPERMUM Degener, Fl. Hawaiiensis, Fam. 307 (1932). *CONVOLVULACEAE.*
albiflorum *Degener, l. c.*—Ins. Sandvic. (Oahu).
Menziesii (*A. Gray*) *Degener, l. c.* p. K6: Bonamia Menziesii.

PERISSOLOBUS N. E. Brown; N. E. Brown in Gard. Chron. 1931, Ser. III. lxxxix. 294, descr. ampl. *FICOIDACEAE.*
Bijlii *N. E. Brown, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).

PERISTROPHE Nees (Acanthac.).
pantjarensis *Hochr. in Candollea*, v. 235 (1934).—Java.
purpurea (*L.*) *Hochr. l. c.* 234: Justicia purpurea.

PERISTYLUS Blume (Orchidac.).
brachylobos *Summerhayes in Kew Bull.* 1931, 382. —Congo Belg.
brevicalcar *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 167 (1935).—Borneo.
ciliatus *Carr, l. c.* 169.—Borneo.
Copelandii (*Ames*) *Carr, l. c.* 168, in adnot.: Habenaria Copelandii.
kinabaluensis *Carr, l. c.* 170.—Borneo.
ovariophorus (*Schlechter*) *Carr, l. c.* 168, in adnot.: Habenaria ovariophora.
staminodiatus (*Schlechter*) *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxv. 452 (1933), in obs.: Habenaria staminodiata.
tricallosus *J. J. Smith, l. c.* 451.—Celebes.
xanthochlorus *Blatter & McCann in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxv. 733 (1932).—Ind. or. (Bombay).

PERNETTYA Gaudich. (Ericac.).
densa *Rusby in Phytologia*, i. 70 (1934).—Boliv.
Howellii *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 649 (1935).—Ins. Galapag.
lanceolata (*Hook. f.*) *B. L. Burtt & A. W. Hill in Journ. Linn. Soc., Bot.* xlix. 638 (1935): Gaultheria lanceolata.
leucantha *Linden ex Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 644 (1935), in syn.: P. prostrata var. purpurea *Sleum.*
prostrata (*Cav.*) *Sleum. l. c.* 289: Andromeda prostrata.
schizostigma *Rusby in Phytologia*, i. 70 (1934).—Boliv.
vernalis (*Kunze ex DC.*) *Phil. in An. Univ. Chile*, xviii. No. 1, 65 (1861), in obs.: Gaultheria vernalis.

PEROTIS Ait. (Gramin.).
leptopus *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 804 (1933).—Tanganyika Terr.

PERRALDERIA Coss. (Compos.).
Paui *Font Quer, Iter Marocc.* 1929, No. 437 [1930]. —Marocc.

PERRIEROPHYTUM Hochr. (Malvac.).
Humbertii *Hochr. in Candollea*, v. 14 (1932).—Madag.

PERROTTETIA H. B. & K. (Celastrac.).
Lauterbachiana *Loes. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 36 (1934).—N. Guin.
moluccana (*Blume*) *Loes. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* iii. v. 220 (1892): Caryospermum moluccanum.
Schlechteri *Loes. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 37 (1934).—N. Guin.

PERSEA Gaertn. f. (Laurac.).
Buchtienii *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxxi. 179 (1933).—Boliv.
inaequalis *A. C. Smith in Phytologia*, i. 118 (1935). —Bras. (Amaz.).
negracotensis *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxxi. 180 (1933).—Boliv.
Ruizii *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 18 (1931): P. ferruginea *Mez.*
Trollii *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxxi. 180 (1933).—Boliv.

PERSICA Mill. (Rosac.).
ferganensis *Kostina & Riab. in Bull. Appl. Bot., Leningrad*, Ser. VIII. No. 4, 75 (1935), nomen.—As. centr. (cult.).
kansuensis (*Rehder*) *Kovalev & Kostina, l. c.*: Prunus kansuensis.
mira (*Koehne*) *Kovalev & Kostina, l. c.* 33, in obs.: Prunus mira.
Potanini (*Batalin*) *Kovalev & Kostina, l. c.* 75: Prunus Persica var. Potanini.
tangutica (*Batalin*) *Kovalev & Kostina, l. c.*: Amygdalus communis var. tangutica.

PERSICARIA Mill. (Polygonac.).
alata (*Buch.-Ham.*) *Nakai in Rigakkwai*, xxiv. 298 (1926); cf. *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 113: Polygonum alatum.
auriculata (*Makino*) *Masamune in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* xi., Bot. No. 4, 173 (1934): Polygonum auriculatum.

PERSICARIA :—
bioritsuensis (*Ohki*) *Sasaki, List Pl. Formos.* 168 (1928): Polygonum bioritsuense.
buisanensis (*Ohki*) *Sasaki, l. c.*: Polygonum buisanense.
caespitosa (*Blume*) *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 779: Polygonum caespitosum.
coriaria *Grigorj. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 101 (1933), in syn.: Polygonum coriarium.
densiflora (*Meissn.*) *Moldenke in Torreya*, 1934, xxxiv. 7: Polygonum densiflorum.
dolichopoda (*Ohki*) *Sasaki, List Pl. Formos.* 168 (1928): Polygonum dolichopodum.
Donii (*Meissn.*) *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 114, in obs.: Polygonum Donii.
flaccida (*Meissn.*) *H. Gross in Beih. Bot. Centralbl.* xxxvii. II. 112 (1919): Polygonum flaccidum.
giranensis (*Ohki*) *Sasaki, List Pl. Formos.* 169 (1928): Polygonum giranense.
iowensis *Rydb. in Brittonia*, i. 87 (1931).—U.S.A. (Iowa).
Kawakamii (*Ohki*) *Sasaki, List Pl. Formos.* 169 (1928): Polygonum Kawakamii.
Makinoi *Nakai, Rep. Veg. Ins. Quelpaert.* 41 (1914); cf. *Hara in Journ. Jap. Bot.* ix. 253 (1933).—Japon. (Hondo).
minutula *Nakai in Rigakkwai*, xxix. IV. p. 12 (1926); cf. *Hara in Journ. Jap. Bot.* ix. 253 (1933).—Japon. (Hondo).
mississippiensis (*Stanford*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 456 (1933): Polygonum mississippiense.
nepalensis (*Meissn.*) *Miyabe in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 514 (1934): Polygonum nepalense.
nipponensis (*Makino*) *H. Gross apud Nakai, Rep. Veg. Ins. Quelpaert.* 41 (1914), nomen nudum; *Hara in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 892: Polygonum nipponense.
omerostroma (*Ohki*) *Sasaki, List Pl. Formos.* 170 (1928): Polygonum omerostromum.
paludicola *Small, Man. Southeast. Fl.* 457 (1933). —U.S.A. (Florida).
perfoliata (*L.*) *H. Gross in Beih. Bot. Centralbl.* xxxvii. II. 113 (1919): Polygonum perfoliatum.
Posumbu (*Buch.-Ham. ex D. Don*) *H. Gross, l. c.*: Polygonum Posumbu.
pseudojaponica (*Ohki*) *Sasaki, List Pl. Formos.* 170 (1928): Polygonum pseudojaponicum.
pseudonodosa (*Ohki*) *Sasaki, l. c.*: Polygonum pseudonodosum.
sagittata (*L.*) *H. Gross in Beih. Bot. Centralbl.* xxxvii. II. 113 (1919): Polygonum sagittatum.
senticosa (*Meissn.*) *H. Gross, l. c.*: Chylocalyx senticosus.
stellato-tomentosa (*W. W. Smith & Ramas*) *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 115: Polygonum stellato-tomentosum.
tenuiflora (*Presl*) *Hara in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 893: Polygonum tenuiflorum.
Thunbergii (*Sieb. & Zucc.*) *H. Gross in Beih. Bot. Centralbl.* xxxvii. II. 114 (1919): Polygonum Thunbergii.
tinctoria (*Ait.*) *H. Gross, l.c.*: Polygonum tinctorium.
tomentosa (*Willd.*) *Sasaki, List Pl. Formos.* 170 (1928): Polygonum tomentosum.
triangularis *Nakai in Rigakkwai*, xxix. IV. p. 12 (1926); cf. *Hara in Journ. Jap. Bot.* ix. 254 (1933).—Japon. (Hondo).
trigonocarpa (*Makino*) *Nakai in Rigakkwai*, xxiv. 12 (1926); cf. *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 114, 115: Polygonum minus var. trigonocarpum.
Truellum (*Koidz.*) *Honda in Inui & Honda, List Pl. Itsukushima*, 11; cf. *Miyabe & Kudo in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 515 (1934): Polygonum Truellum.
undulata (*Murr.*) *H. Gross in Beih. Bot. Centralbl.* xxxvii. II. 114 (1919): Polygonum undulatum.
viscofera (*Makino*) *H. Gross, l. c.*: Polygonum viscoferum.

PERTYA Sch. Bip. (Compos.).
cordifolia *Mattf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 103 (1931).—China (Hunan).
Koribana (*Nakai*) *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1253 (1931): Macroclinidium Koribanum.
uniflora (*Maxim.*) *Mattf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 105 (1931): Myripnois uniflora.

PERULARIA Lindl. (Orchidac.).
Iinumae (*Makino*) *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 142: Habenaria Iinumae.
whangshanensis *Chien in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., vi. 75 (1931).—China (Anhwei).

PETAGNIA Rafin. Specchio, i. 157 (1814). *FAM.?*
rosea *Rafin. l. c.* 158.—Hispaniola.

PETAGOMOA Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl. 1934, xxxi. 294, 295. *RUBIACEAE.*
atricapilla *Bremek. l. c.* 296.—Guiana Bat.
hirta (*Miq.*) *Bremek. l. c.* 295: Cephaëlis hirta.
horridula (*Muell.-Arg.*) *Bremek. l. c.*: Psychotria horridula.
iodotricha (*Muell.-Arg.*) *Bremek. l. c.*: Psychotria iodotricha.
nigricans *Bremek. l. c.*—Guiana Bat.
tricholoba (*Muell.-Arg.*) *Bremek. l. c.*: Psychotria tricholoba.
trichophoroides (*Muell.-Arg.*) *Bremek. l. c.*: Psychotria trichophoroides.

PETAMENES Salisb. (Iridac.).
abbreviatus (*Andr.*) *N. E. Brown in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xx. 276 (1932): Gladiolus abbreviatus.
Buckerveldii (*L. Bolus*) *N. E. Brown, l. c.*: Antholyza Buckerveldii.
Degasparisianus (*Buscal. & Muschl.*) *N. E. Brown, l. c.* 277: Antholyza De-Gasparisiana.
Guthriei (*L. Bolus*) *N. E. Brown, l. c.* 276: Antholyza Guthriei.
huillensis (*Welw.*) *N. E. Brown, l. c.*: Antholyza huillensis.
latifolius *N. E. Brown, l. c.* 277: Antholyza abyssinica *Baker in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 375 (1898), non *Brongn.*
Schweinfurthii (*Baker*) *N. E. Brown, l. c.*: Antholyza Schweinfurthii.
zambesiacus (*Baker*) *N. E. Brown, l. c.*: Antholyza zambesiaca.

PETASITES Mill. (Compos.).
formosanus *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 177.—Formosa.
liukiuensis *Kitamura, l. c.* 178.—Ins. Liukiu.

PETASTOMA Miers (Bignoniac.).
caudiculatum *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 141 (1932).—Brit. Honduras.

PETERSIA Welw. (Lecythidac.; Myrtac., Gen. Pl.).
minor *Niedenzu in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* iii. vii. 31 (1892).—Angola.

PETRAEA L. (Verbenac.).
brevicalyx *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 748.—Bras. (Amaz.).
racemosa *Nees in Flora*, 1821, i. 300, in obs.—Bras. (Bahia).

PETROCOPTIS A. Br. (Caryophyllac.).
grandiflora *Rothmaler in Cavanillesia*, vii. 111 (1935).—Hispan.
viscosa *Rothmaler, l. c.*—Hispan.

PETROCOSMEA Oliv. (Gesneriac.).
peltata *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 320 (1935).—China (Hainan).

PETRODOXA Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb. xviii. 203 (1934). *GESNERIACEAE.*
argentea *Anthony, l. c.*—China (Yunnan).
cordifolia *Anthony, l. c.* 204.—Upper Burma.

PETROPHILOIDES [Bowerbank, Foss. Fruits & Seeds London Clay, 43 (1840), gen. foss.] Reid & Chandler, London Clay Fl. 133, 138 (1933). *JUGLANDACEAE.*
strobilacea (*Sieb. & Zucc.*) *Reid & Chandler, l. c.* 138, in obs.: Platycarya strobilacea.

PETROSAVIA Becc. (Liliac.).
Sakuraii (*Makino*) *J. J. Smith ex v. Steenis in Trop. Natuur*, xxiii. 52 (1934): Miyoshia Sakuraii.
Sinii (*K. Krause*) *Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, vi. 802 (1934): Protolirion Sinii.

PETUNGA DC. (Rubiac.).
pentamera *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1932, 181.—Borneo.
Schmidtii (*C. B. Clarke*) *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 125 (1932): Plectronia Schmidtii.

PETUNIA Juss. (Solanac.).
×alba *Hort. ex Ferguson & Ottley in Am. Journ. Bot.* 1932, xix. 395, in obs.—Hort.
argentea *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 735 (1895), in syn.: P. violacea.
Atkinsii *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in syn.: P. violacea.
Parodii *Steere in Papers Mich. Acad. Sc.* 1930, xiii. 213 (1931).—Argent.

PEUCEDANUM L. (Umbellif.).
aberdaricum *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 49 (1935).—Kenya Col.
acronemifolium *H. Wolff in Fedde, Repert.* xxxiii. 246 (1933).—Ind. or. (Sikkim).
angustisectum (*Engl.*) *C. Norman in Journ. Linn. Soc., Bot.* xlix. 509 (1934): Lefeburia angustisecta.
bupleuriforme *H. Wolff in Fedde, Repert.* xxxiii. 245 (1933).—China (Yunnan).
bupleuroides *H. Wolff, l. c.*—China (Yunnan).
caffrum (*Meissn.*) *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxviii. 520 (1932): Seseli caffrum.
calcareum *Alboff; Maleev in Trav. Inst. Bot. Tiflis*, i. 119 (1934), descr. emend.—Transcaucas.
Dielsianum *Fedde ex H. Wolff in Fedde, Repert.* xxxiii. 246 (1933).—China (Hupeh).
dissectum (*C. H. Wright*) *Dawe, Rep. Bot. Miss. Uganda Protect.* 46 (1906): Anthriscus dissectus.
diversifolium *H. Wolff in Fedde, Repert.* xxxiii. 247 (1933).—China occ.
Elliotii *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 825 (1921), in obs.—Afr. trop. or. (Ruwenzori).
eryngiifolium *Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 207 (1932).—Sibir. (Marit. Prov.).
Eylesii *C. Norman in Journ. Bot.* 1932, lxx. 138.—S. Rhodesia.
Fauriei *Fedde ex H. Wolff in Fedde, Repert.* xxxiii. 250 (1933).—Corea (Quelpaert).
geraniifolium *H. Wolff, l. c.*—Japon.
grandifolioides *H. Wolff, l. c.* 244.—Formosa.
graveolens (*L.*) *C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 709 (1879): Anethum graveolens.
Harry-Smithii *Fedde ex H. Wolff in Fedde, Repert.* xxxiii. 247 (1933).—China (Shansi).
Henryi *H. Wolff, l. c.* 248.—China (Hupeh).
heracleifolium *H. Wolff, l. c.* 249.—Baluchistan.
lhasense *C. B. Clarke ex H. Wolff, l. c.*—Tibet.
Linderi *C. Norman in Journ. Linn. Soc., Bot.* xlix. 511 (1934).—Congo Belg.
madense *C. Norman, l. c.* 513.—Nigeria.
Mazurevskii *Kalenicz. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 184 (1932).—Caucas.
Meisnerianum *McOwan ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 827 (1921), in obs.: Seseli caffrum.
natalense (*Sond.*) *Engl. l. c.*, in obs.: Seseli natalense.
piliferum *Hand.-Mazz. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1933, lxxxii. 252.—Manchur.
pubescens *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 728 (1933).—China (Yunnan).
saxicola (*Makino ex Yabe*) *Makino in Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 1, 461 (1925); *et l. c.* ed. 2, 847 (1931): Angelica saxicola.
Schlechteri *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 826 (1921), in obs., sphalm.: P. Schlechterianum *H. Wolff.*
Scottianum *Engl. in Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. 1907–8*, ii. 597 (1913); *C. Norman in Journ. Linn. Soc., Bot.* xlix. 510 (1934), descr. ampl.—Afr. trop. or. (Ruwenzori).
serratum (*H. Wolff*) *C. Norman, l. c.* 509: Lefeburia serrata.
venosum *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxviii. 520 (1932).—Transvaal.
Vogelianum *Emberger & Maire; Emberger & Maire in Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc*, xi. Nos. 4–6, 100 (1931).—Marocc.
Wolffianum *Fedde ex H. Wolff in Fedde, Repert.* xxxiii. 250 (1933).—Sakhalin.

PEYROUSEA DC. (Compos.).
argentea *Compton in Journ. S. Afr. Bot.* 1935, i. 73.—Afr. austr. (Cape Prov.).
umbellata (*L. f.*) *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 87 (1932): Cotula umbellata.

PFAFFIA Mart. (Amaranthac.).
acutifolia (*Moq.*) *Stützer in Fedde, Repert. Beih.* lxxxviii. 22 (1935): Gomphrena tuberosa var. acutifolia.
divergens *Stützer, l. c.* 31.—Argent.
Dunaliana (*Moq.*) *Schinz in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 68 (1934): Gomphrena Dunaliana.
equisetiformis (*R. E. Fries*) *Schinz, l. c.* 81: Gomphrena equisetiformis.
eriocephala *Suesseng. in Fedde, Repert.* xxxv. 329 (1934).—Colomb.
Fiebrigii *Suesseng. l. c.*—Boliv.
fruticulosa *Suesseng. l. c.* 330.—Boliv.
glabratoides *Suesseng. l. c.*—Bras. (Paraná).
glabrescens *Suesseng. l. c.* 331.—Argent.
guianensis (*Klotzsch*) *Suesseng. l. c.* 334: Sertuernera guianensis.
meridensis *Suesseng. l. c.*—Colomb.
Schomburgkii (*Klotzsch*) *Suesseng. l. c.*: Sertuernera Schomburgkii.

PHACELIA Juss. (Hydrophyllac.).
alvordensis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 17, 30 (1930).—U.S.A. (Oregon).
insularis *Munz in Bull. S. Calif. Acad. Sc.* 1932, xxxi. 113.—U.S.A. (Calif.).
minutiflora *J. Voss in Munz, Man. S. Calif. Bot.* 409, 600 (1935).—U.S.A. (Calif.).
Piersoniae *L. Williams in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1932, lix. 429.—U.S.A. (Wyoming).
simplicifolia *Colla, Herb. Pedem.* iv. 217 (1835).—Chile.
vallis-mortae *J. Voss in Bull. S. Calif. Acad. Sc.* 1934, xxxiii. 175 (1935).—U.S.A. (Calif.; Nevada; Utah).

PHACELURUS Griseb. (Gramin.).
latifolius (*Steud.*) *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 59: Rottboellia latifolia.

PHAEDRANASSA Herb. (Amaryllidac.).
dubia (*H. B. & K.*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 12 (1931): Haemanthus dubius.

PHAEOMERIA Lindl. (Zingiberac.; Scitamin., Gen. Pl.).
Heyneana (*Valeton*) *Burkill in Kew Bull.* 1935, 318; *Burkill, Dict. Econ. Prod. Mal. Penins.* ii. 1702 (1935), in obs.: Nicolaia Heyneana.

PHAEONEURON Gilg (Melastomatac.).
libericum *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 762 (1921), in obs.—Liberia.

PHAEOSTEMMA Fourn. (Asclepiadac.).
tigrinum *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1931, xviii. 560.—Colomb.

PHAGNALON Cass. (Compos.).
Carolipaui *Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 654 [1928], nomen.—Marocc.
iminouakense *Emberger in Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc*, 1932, No. XXXIII. 44 (1933).—Marocc.
intermedium (*Lag.*) *Pau in Cavanillesia*, iv. 51 (1931): Conyza intermedia.
spathulatum *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 166 (1932).—Marocc.

PHALACROCARPUM Willk. (Compos.).
anomalum (*Lag.*) *Rothmaler in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.* 1934, xxxiv. 155: Chrysanthemum anomalum.

PHALACROCARPUS (Boiss.) Van Tiegh. in Ann. Sc. Nat. Sér. IX. x. 158 (1909), in obs. *DIPSACACEAE.*
[CEPHALARIA sect. PHALACROCARPUS Boiss.]

PHALAENOPSIS Blume (Orchidac.).
Laycocki *M. R. Henderson in Orch. Rev.* 1935, xliii. 108.—Borneo.
pulcherrima (*Lindl.*) *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxxii. 366 (1933): Doritis pulcherrima.
riteiwanensis *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 213.—Formosa.
serpentilingua *J. J. Smith in Orch. Rev.* 1933, xli. 147.—Borneo.
×singuliflora *J. J. Smith, l. c.* 1932, xl. 173; *et in Fedde, Repert.* xxxi. 80 (1932).—Borneo.

PHALARIS L. (Gramin.).
Mauritii *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 125 [1933], nomen.—Marocc.

PHALERIA W. Jack (Thymelaeac.).
glabra (*Turrill*) *Domke in Biblioth. Bot.* cxi. 55 (1934), in obs.: Leucosmia glabra.
Nisidai *Kanehira, Fl. Microncs.* 248 (1933), japonice; *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 675, latine.—Ins. Palau.
pulchra *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 91, 21 (1932).—Ins. Viti.

PHARNACIUM L. (Ficoidac.).
malabaricum *Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl.* iv. 1404 (1835).—Ind. or. (Malabar).

PHASEOLUS L. (Legumin.).
amoenus *Macfad. in Hook. Bot. Misc.* ii. 113 (1830), in adnot.—Jamaica.
barrancae *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 46 (1933–5).—Mexico.
inaequifolius *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* ii. 242 (1834).—Bras.

PHEBALIUM Vent. (Rutac.).
Euphemiae (*F. Muell.*) *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 70 (1931): Nematolepis Euphemiae.
Maxwellii (*F. Muell.*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 260 (1931): Eriostemon Maxwelli.

PHELIPAEA Desf. (Orobanchac.).
Mauritii *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 87 [1933], nomen.—Marocc.

PHELLODENDRON Rupr. (Rutac.).
nikkomontanum *Makino in Journ. Jap. Bot.* vii. 18 (1931).—Japon. (Hondo).

PHELLOSPERMA Britton & Rose (Cactac.).
pacificum *H. E. Gates in Cact. & Succ. Journ. Amer.* iii. 37 (1931), in obs., nomen provis.—Calif. infer.

PHENAX Wedd. (Urticac.).
bullatus *Rusby in Phytologia*, i. 52 (1934).—Boliv.
flavifolius *Rusby, l. c.* 53.—Boliv.
Weddellianus *Killip in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1934, xxiv. 43.—Peruv.

PHILADELPHUS L. (Saxifragac.).
× Burkwoodii *Hort. ex Gard. Chron.* 1931, Ser. III. lxxxix. 438, in obs.—Hort.
gracilis *Huguen. ex Colla, Herb. Pedem.* ii. 413 (1834).—Ital.?

PHILAGONIA Blume (Rutac.).
sambucifolia *Dode in Bull. Soc. Bot. France*, 1908, lv. 701 (1909), in adnot., sphalm.: P. sambucina *Blume*.

PHILIBERTIA H. B. & K. (Asclepiadac.).
macrantha *Lillo ex Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 4, 33 (1934), in obs., pro syn.: P. splendens.
obtusata *Malme, l. c.* 41, in obs.—Am. austr.
obtusiuscula *Malme, l. c.* xxv. A. No. 7, 16 (1933).—Peruv.
Rahmeri (*R. Phil.*) *Malme, l. c.* xxvi. A. No. 4, 41 (1934), in obs.: Blepharodon Rahmeri.
speciosa *Malme, l. c.* 32, sphalm.: P. splendens.
splendens (sphalm. speciosa) *Lillo*; *Malme, l. c.*, descr. ampl.—Argent.
stipitata *Lillo*; *Malme, l. c.* 40, descr. ampl.—Argent.

PHILIPPIA Klotzsch (Ericac.).
Humberti *Staner in Ann. Soc. Sc. Brux.* liii. Sér. B, 160 (1933).—Uganda.
Lebrunii *Staner in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxii. 243 (1932).—Uganda.
neo-Humbertii *Staner, l. c.* xxiii. 232 (1933): P. Humbertii *Staner*.
quadratiflora *H. Perrier in Arch. Bot., Caen*, Bull., 1930, iv. 31.—Madag.

PHILIPPIAMRA Kuntze (Portulacac.).
fastigiata (*R. Phil.*) *Pax & K. Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 261 (1934): Silvaea fastigiata.

PHILLYREA L. (Oleac.).
× Barrandonis *Sennen in Bull. Soc. Dendr. France*, 1935, 59.—Hispan.

PHILLYREA:—
× Colmeiroana *Sennen in Bull. Soc. Dendr. France*, 1935, 60.—Hispan.
grandifolia *Sennen, l. c.* 54.—Hispan.
× hybrida *Sennen, l. c.* 51.—Hispan.
medianifolia *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 76 [1933]: P. media *L.*, partim.
oblongifolia *Sennen in Bull. Soc. Dendr. France*, 1935, 54, in obs.—Hispan.
paniculata *Roxb. Hort. Beng.* 3 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 100 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 100 (1832).—China.
robusta *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 101; *et l. c.* 101.—Ind. or. (Assam).
subangustifolia *Sennen in Bull. Soc. Dendr. France*, 1935, 47, 51.—Hispan.
× Trabutii *Sennen, l. c.* 60.—Hispan.

PHILODENDRON Schott (Arac.).
acutifolium *K. Krause in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 620 (1932).—Peruv.
basivaginatum *K. Krause, l. c.* 619.—Peruv.
belizense *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 129 (1932).—Brit. Honduras.
divaricatum *K. Krause in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 618 (1932).—Peruv.
elegans *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1177 (1895), in obs.—Hab.?
heteropleurum *K. Krause in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 618 (1932).—Peruv.
Killipii *K. Krause, l. c.* 620.—Peruv.
Krukovii *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 349.—Bras. (Matto Grosso).
macrophyllum *Hort. ex Rodio in Bull. Ort. Bot. Napoli*, xi. 149 (1933), in obs., nomen.—Hab.?
Philipsii *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1177 (1895), in syn.: P. verrucosum.
Tatei *K. Krause in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 321.—Venez.
Tessmannii *K. Krause in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 617 (1932).—Peruv.
violinifolium *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1177 (1895), in syn.: P. panduriforme.

PHILOTRIA Rafin. (Hydrocharitac.).
densa (*Planch.*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 28 (1933): Egeria densa.
granatensis (*Humb. & Bonpl.*) *Marie-Vict. in Contrib. Lab. Bot. Univ. Montréal*, No. 18, 42 (1931): Elodea granatensis.
guyanensis (*L. C. Rich.*) *Marie-Vict. l. c.*: Elodea guyanensis.
orinocensis (*L. C. Rich.*) *Marie-Vict. l. c.*: Elodea orinocensis.

PHILOXERUS R. Br. (Amaranthac.).
litoralis *Suesseng. in Fedde, Repert.* xxxix. 13 (1935).—Colomb.
rigidus (*B. L. Robinson & Greenm.*) *Howell in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xxi. 98 (1933): Alternanthera rigida.

PHILYROPHYLLUM O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. iv. v. 206, in clavi, 208 (1890); Schinz in Bull. Herb. Boiss. i. 78 (1893). *COMPOSITAE.*
alatum (*S. Moore*) *Burtt Davy in Kew Bull.* 1935, 570: Pentatrichia alata.
Schinzii *O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* iv. v. 208 (1890); *Schinz in Bull. Herb. Boiss.* i. 78 (1893).—Kalahari.

PHITOPIS Hook. f. (Rubiac.).
sterculioides *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 341 (1931).—Peruv.

PHLEBOCHITON Wall. (Anacardiac.).
sinensis *Diels in Sunyatsenia*, i. 123 (1933).—China (Kwangtung).

PHLEBOLOBIUM O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xi. 641 (1932); et in Engl. Jahrb. lxvi. 93 (1933). *CRUCIFERAE.*
Maclovianum (*Urv.*) *O. E. Schulz, ll. cc.*: Brassica Macloviana.

PHLEGMATOSPERMUM O. E. Schulz in Engl. Jahrb. lxvi. 93 (1933). *CRUCIFERAE.*
Andraeanum (*F. Muell.*) *O. E. Schulz, l. c.*, in obs.: Capsella Andraeana.

PHLEGMATOSPERMUM:—
cochlearinum (*F. Muell.*) *O. E. Schulz in Engl. Jahrb.* lxvi. 93 (1933), in obs.: Capsella cochlearina.
Drummondii (*Benth.*) *O. E. Schulz, l. c.*, in obs.: Thlaspi Drummondi.
ochranthum (*F. Muell. ex Benth.*) *O. E. Schulz, l. c.*, in obs.: Thlaspi ochranthum.
villosulum (*F. Muell. & Tate*) *O. E. Schulz, l. c.*, in obs.: Capsella villosula.

PHLEUM L. (Gramin.).
crinitum *Roxb. Hort. Beng.* 8 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 316 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 313 (1832).—Ind. or.
Roshevitzi *Pavlov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 744 (1932).—Turkestan.
× Viniklarii *Rohl. in Mém. Soc. Sc. Bohême*, 1933, No. 8, p. 11 (1934).—Dalmat.

PHLOGA Nor. (Palmae).
sambiranensis *Jumelle in Ann. Mus. Col. Marseille*, 1933, Sér. V. i. Fasc. 3, 18.—Madag.

PHLOGACANTHUS Nees (Acanthac.).
abbreviatus (*Craib*) *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iv. 712 (1935): Cystacanthus abbreviatus.
Colaniae *Benoist, l. c.* 710.—Indo-China (Tonkin).
Lambertii *Raizada in Indian Forester*, 1934, lx. 535.—Ind. or. (Kumaon).
Poilanei *Benoist in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 604.—Cambodia.
pyramidalis *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iv. 711 (1935).—Indo-China (Tonkin).

PHLOMIS L. (Labiat.).
brachystegia *Bunge*; *Popov in Bull. Univ. As. Centr.* xiii. 130 (1926), descr. ampl.—Turkestan.
cashmirica *B. Wells in Journ. Roy. Hort. Soc.* 1935, lx. 485.—Kashmir.
jeholensis *Nakai & Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. 1. (*Pl. Nov. Jehol.* 1.) 48 (1934).—Manchur. (Jehol).
malacitana *Pau in Brotéria*, Sér. Bot. 1931, xxv. 143.—Hispan.
nympharum *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxvi. 134 (1934).—As. Min. (Lydia).
puberula *Krylov & Sergievsk. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1933, Nos. 3–4, p. 5.—Sibir.
Vavilovii *Popov in Bull. Univ. As. Centr.* xiii. 129 (1926).—Turkestan.
Wangii *Hu & Tsai in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* 1931, ii. 261.—China (Szechuan).

PHLOX L. (Polemoniac.).
cortezana *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1931, xviii. 434.—U.S.A. (Colorado; Utah).
glabriflora (*A. Brand*) *Whitehouse in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1935, lxii. 384: P. Drummondii subsp. glabriflora.
× hortorum *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 400 (1924).—Hort.
Nelsoni *Nicholson, Ill. Dict. Gard.* iii. 101 (1886).—Hab.?
visenda *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1931, xviii. 434.—U.S.A. (Arizona).
Wherryi *Heath in Nat. Hort. Mag.* ix. 204 (1930), in obs.—U.S.A. (N. Dakota?).

PHOEBE Nees (Laurac.).
grandis (*Nees*) *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. viii. 61 (1934): Alseodaphne grandis.
Henryi (*Hemsl.*) *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xi. 43 (1932); *Chun ex H. Liou, Laurac. Chine et Indochine*, 65 (1932): Machilus Henryi.
kwangsiensis *H. Liou, l. c.* 70.—China (Kwangsi).
pichisensis *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 103.—Peruv.

PHOENICANTHEMUM Blume (Loranthac.).
coccineum (*Jack*) *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 1. 825 (1856): Loranthus coccineus.
ensifolium *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France*, 1894, xli. 503, in obs.—Hab.?
pentapetalum (*Roxb.*) *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 1. 823 (1856): Loranthus pentapetalus.
polystachyum (*Wall.*) *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France*, 1894, xli. 502, in obs.: Loranthus polystachyus.
speciosum (*Wall. ex DC.*) *Van Tiegh. l. c.* 503, in obs.: Loranthus speciosus.

PHOENICANTHEMUM:—
terrestre (*Hook.f.*) *VanTiegh.in Bull.Soc.Bot.France*, 1894, xli. 502, in obs.: Loranthus terrestris.

PHOENICANTHUS Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon, vi. Suppl., 6 (1931). *ANNONACEAE*.
obliquus (*Hook. f. & Thoms.*) *Alston, l. c.* 7: Orophea obliqua.

PHOENIX L. (Palmae).
acaulis *Roxb. Hort. Beng.* 73 (1814), nomen; *Roxb. Cor. Pl.* 69, t. 273 (1819), descr.—Ind. or.; Burma.
atlantica *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1935, Sér. II. vii. 137.—Ins. C. Verde.
Atlantidis *A. Cheval. in Compt. Rend.* 1934, cxcix. 1153, in obs.—Ins. C. Verde.

PHOLIDOTA Lindl. (Orchidac.).
annamensis *Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 145.—Indo-China (Anam).
dentiloba *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 107 (1931).—Borneo.
kouytcheënsis *Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 145.—China (Kweichau; Yunnan).
missionariorum *Gagnep. l. c.* 146.—China (Kweichau).
Schlechteri *Gagnep. l. c.* 147: P. yunnanensis *Schlechter*.
triloba *J. J. Smith in Brittonia*, i. 105 (1931).—Borneo.
vaginata *Carr in Journ. As. Soc. Mal.* xi. 72 (1933).—Sumatra.

PHOLIURUS Trin. (Gramin.).
glabriglumis *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 35 (1934), in clavi; *et in Komarov, Fl. URSS*, ii. 589 (1934).—As. centr.

PHORADENDRON Nutt. (Loranthac.).
auriculatum *Trelease, Phoradendron*, 217 (1916), nomen; *Trelease in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1935, lxii. 338, descr.—Mexico.
duidanum *Trelease in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 358.—Venez.
Tatei *Trelease, l. c.* 359.—Venez.

PHORMIUM J. R. & G. Forst. (Liliac.).
atropurpureum *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1072 (1895), in syn.: P. tenax f. atropurpureum *Hort.*
Cookii *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in syn.: P. Cookianum.

PHOTINIA Lindl. (Rosac.).
Bartlettii *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 155 (1934).—Sumatra.
Chingiana *Hand.-Mazz. in Sinensia*, ii. 125 (1932).—China (Kwangsi).
euphlebia *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 239 (1935).—China (Hainan).
formosana *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 147, in syn.: Pourthiaea formosana.
hirsuta *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 481 (1933).—China (Hunan).
Kudoi *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1933, xxiii. 206.—Formosa.
microcarpa *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 57 (1935).—Brit. Honduras.
stenophylla *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 480 (1933).—China (Kweichau).

PHRAGMITES Trin. (Gramin.).
hirsuta *Kitagawa in Journ. Jap. Bot.* ix. 108, 117 (1933).—Manchur.
Jahandiezi *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 131 [1933], nomen.—Marocc.
serotina *Komarov, Fl. URSS*, ii. 305, 751 (1934).—Ross. asiat. or.

PHREATIA Lindl. (Orchidac.).
asciiformis *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxv. 500 (1933).—Celebes.
deltoides *J. J. Smith, l. c.* lxvi. 209 (1934).—N. Guin.
Evrardii *Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 684.—Indo-China (Anam).
foveata *Carr in Journ. As. Soc. Mal.* xi. 97 (1933).—Sumatra.
taiwaniana *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 441.—Formosa.

PHRYGILANTHUS Eichl. (Loranthac.).
linearis *Killip in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1934, xxiv. 45.—Peruv.
longebracteatus (*Desr.*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 17 (1931): Loranthus longebracteatus.
tumbecensis *Killip in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1934, xxiv. 45.—Peruv.

PHRYNA (Boiss.) Pax & K. Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, xvi c. 351 (1934). *CARYOPHYLLACEAE*.
[GYPSOPHILA sect. PHRYNA Boiss.]
ortegioides (*Fisch. & Mey.*) *Pax & K. Hoffm. l. c.*: Tunica ortegioides.

PHRYNE Bubani (Crucif.).
glaberrima *Rothmaler in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.* 1934, xxxiv. 148.—Hispan.

PHRYNELLA Pax & K. Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, xvi c. 364 (1934), in adnot.: **Phryna** Pax & K. Hoffm. (Caryophyllac.).
ortegioides (*Fisch. & Mey.*) *Pax & K. Hoffm. l. c.*, in adnot.: Tunica ortegioides.

PHRYNIUM Willd. (Marantac.; Scitamin., Gen. Pl.).
dispermum *Gagnep. in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, vi. 134 (1932).—Indo-China (Tonkin; Anam).
imbricatum *Roxb. Hort. Beng.* 1 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 6 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 6 (1832).—Ind. or. (Bengal).
molle *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 305 (1917).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
parviflorum *Roxb. Hort. Beng.* 1 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 7 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 7 (1832).—Ind. or. (Bengal).
spicatum *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 5; *et l. c.* 5.—Burma.
truncatum *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 954 (1895), in syn.: Calathea orbiculata.

PHTHEIROSPERMUM Bunge (Scrophulariac.).
japonicum (*Thunb.*) *Kanitz, Anthoph. Jap.* 12 (1878): Gerardia japonica.

PHTHIRUSA Mart. (Loranthac.).
elongata *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 357.—Venez.
gonioclada *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1932, lix. 515.—Colomb.
gracilis *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 359.—Venez.
monetaria *Sandwith in Kew Bull.* 1932, 227.—Guiana Brit.
paniculata (*H. B. & K.*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 17 (1931): Loranthus paniculatus.
phaneroloma *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 55 (1935).—Brit. Honduras.
punctata *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 359.—Venez.
tortuosa *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1932, lix. 514.—Colomb.
triplinervis *Killip in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 348.—Colomb.

PHYLA Lour. (Verbenac.).
dulcis (*Trev.*) *Moldenke in Torreya*, 1934, xxxiv. 9: Lippia dulcis.

PHYLICA L. (Rhamnac.).
cinerea *Pillans in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 299 (1931), nomen.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Comptonii *Pillans, l. c.*, nomen.—Afr. austr. (Cape Prov.).
grisea *Markötter in Ann. Univ. Stellenb.* 1930, viii. Sect. A, No. 1, 30.—Natal.
lanata *Pillans in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 299 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
madagascariensis *Reissek ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 314 (1921), in obs.—Madag.
Marlothii *Pillans in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 299 (1931), nomen.—Afr. austr. (Cape Prov.).
vulgaris *Pillans, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).
wittebergensis *Pillans, l. c.*, nomen.—Afr. austr. (Cape Prov.).

PHYLLAGATHIS Blume (Melastomatac.).
anisophylla *Diels in Engl. Jahrb.* lxv. 115 (1932).—China (Hunan).
elattandra *Diels, l. c.* 116.—China (Kwangtung).
Johannis-Winkleri *Schwartz in Mitt. Inst. Bot. Hamburg*, vii. 240 (1931).—Borneo.
lanceolata *Schwartz, l. c.* 239.—Borneo.
pallida *Schwartz, l. c.* 240.—Borneo.
Tankahkeei *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* vii. 316 (1931).—China (Kwangtung; Fokien).
tetrandra *Diels in Engl. Jahrb.* lxv. 116 (1932).—China (Yunnan).

PHYLLANTHUS L. (Euphorbiac.).
ankarana *Léandri in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 452.—Madag.
anthopotamicus *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 223 (1931).—China (Kweichau).
Bartlettii *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 68 (1935).—Brit. Honduras.
Bathianus *Léandri in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 371.—Madag.
betsileanus *Léandri, l. c.* 372.—Madag.
Caroli *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 310 (1931).—N. Guin.
choristylus *Diels, l. c.* 309.—N. Guin.
clamboides (*F. Muell.*) *Diels, l. c.*, in clavi: Leichhardtia clamboides.
dealbatus *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 257 (1931).—Zeylan.
deciduiramus *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 167.—N. Caled.
diandrus *Pax in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 29 (1921), in obs.—Cameroons.
duidae *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 382.—Venez.
Dunnianus (*Léveillé*) *Hand.-Mazz. ex Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 230: Phyllanthodendron Dunnianum.
elongatus *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* v. 105 (1836), in obs.—Bras.
eurisladro *Mart. ex Colla, l. c.* 106, in obs.—Bras.
ferax *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 134 (1932).—Brit. Honduras; Guatem.
glabrocapsulus *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* x. 483 (1931).—China (Fokien).
goniocladus *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 260 (1935).—China (Hainan).
Guillauminii *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 167.—N. Caled.
hainanensis *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 20 (1935).—China (Hainan).
isalensis *Léandri in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 450.—Madag.
merinthopodus *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 310 (1931).—N. Guin.
monticola *Léandri in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 450.—Madag.
ouveanus *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 168.—Ins. Loyauté.
pacificus *Muell.-Arg.*; *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, p. 137 (1935), descr. emend.—Ins. Marquesas.
palauensis *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 19.—Ins. Palau.
pelas (*K. Schum.*) *Pax & K. Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix c. 62 (1931): Flueggeopsis pelas.
pergracilis *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 91, 18 (1932).—Ins. Viti.
philippioides *Léandri in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 373.—Madag.
Ringoeti *De Wild. in De Wild. & Staner, Contrib. Fl. Katanga*, Suppl. IV. 43 (1932), in adnot.—Congo Belg.
robustus *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* v. 106 (1836), in obs.—Bras.
rupi-insularis *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 19.—Ins. Palau.
sambiranensis *Léandri in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 451.—Madag.
squamifolius (*Lour.*) *Stokes, Bot. Mat. Med.* iv. 364 (1812): Nymphanthus squamifolius.
trichopodus *Léandri in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 452.—Madag.

PHYLLANTHUS :—
udicola *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* v. 105 (1836). —Bras.
Urbanianus *Mansf. in Fedde, Repert.* xxxii. 86 (1933).—Haiti.
Vanderysti *Hutchinson & De Wild. in De Wild. Pl. Bequaert.* v. 470 (1932).—Congo Belg.
virgultiramus *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 169.—N. Caled.
viridis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 47 (1933–5).—Calif. infer.
Wildemannii *Beille in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 293 (1917).—Guinea Gall.

PHYLLOBOTRYON Muell.-Arg. (Flacourtiac.; Euphorbiac., Gen. Pl.).
breviflorum *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 584 (1921), in obs.—Cameroons.

PHYLLOCACTUS Link (Cactac.).
Gaillardae (*Britton & Rose*) *Vaupel in Monatsschr. Kakteenk.* 1913, xxiii. 87, 88: Epiphyllum Gaillardae.
×hybridus *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 381 (1894), in syn.: Epiphyllum hybridum.

PHYLLOSPADIX Hook. (Potamogetonac.; Naiadac., Gen. Pl.).
iwatensis *Makino in Journ. Jap. Bot.* vii. 15 (1931). —Japon. (Hondo).

PHYLLOSTEGIA Benth. (Labiat.).
bracteata *Sherff in Bot. Gaz.* xcvi. 137 (1934).—Ins. Sandvic.
Helleri *Sherff, l. c.* 138.—Ins. Sandvic.
lantanoides *Sherff, l. c.* 137.—Ins. Sandvic.
Mannii *Sherff, l. c.* 136: Stenogyne parviflora.
Rockii *Sherff, l. c.* 139: P. hispida var. β *Hillebr.*
Wawrana *Sherff, l. c.*—Ins. Sandvic.

PHYMASPERMUM Less. (Compos.).
Schroeteri *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 320 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).

PHYMATIDIUM Lindl. (Orchidac.).
naviculare *A. J. Sampaio, List. Orch. Herv. Mus. Nac. Rio de Janeiro*, 28 (1923), nomen.—Bras. (Rio de Janeiro).

PHYSACANTHUS Benth. (Acanthac.).
batanganus (*J. Braun & K. Schum.*) *Lindau in Schlechter, Westafr. Kautsch.-Exped. 1899–1900*, 315 (1900): Ruellia batangana.

PHYSALIASTRUM Makino (Solanac.).
japonicum (*Franch. & Savat.*) *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 139: Chamaesaracha japonica.

PHYSALIS L. (Solanac.).
erecta *Bellardi ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 279 (1835), in obs.—Ital. ?
glaberrima *Colla, l. c.*—Bras.
gymnocarpa *Bellardi ex Vahl in Colla, l. c.*, in obs. —Ital. ?
heterophylla *Colla, l. c.*—Bras.
mexicana *Mol. ex Colla, l. c.* 278.—Hab. ?
stramoniifolia *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 242 (1824).—Reg. Himal.

PHYSEDRA Hook. f. (Cucurbitac.).
gracilis *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 184 (1927), in syn.: Coccinia cordifolia.

PHYSOCARPUS Maxim. (Rosac.).
alternans (*M. E. Jones*) *Howell in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 130 (1931): Neillia monogyna var. alternans.
pauciflorus (*Nutt.*) *Piper in Piper & Beattie, Fl. Palouse Reg.* 94 (1901): Spiraea pauciflora.
ribesifolius *Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 202 (1932).—Sibir. (Marit. Prov.); Corea.

PHYSOKENTIA Becc. in Webbia, v. 105 (1921); et in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa, Mem., 1934, xliv. 152. *PALMAE.*
Tete (*Becc.*) *Becc. l. c.*; *et l. c.* 153: Cyphosperma Tete.
Thurstonii (*Becc.*) *Becc. in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa*, Mem., 1934, xliv. 154: Cyphosperma Thurstonii.

PHYSOSTEGIA Benth. (Labiat.).
speciosa (*A. Gray*) *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 411 (1924): P. virginiana var. speciosa.

PHYSOTRICHIA Hiern (Umbellif.).
gorungosensis *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 819 (1921), in obs.: P. Swynnertonii.

PHYTEUMA L. (Campanulac.).
begoniifolium *Roxb. Hort. Beng.* 85 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 108 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 505 (1832).—Penins. Mal.
eldivenum *Czecz. in Acta Soc. Bot. Polon.* 1932, ix. 42, in adnot., nomen alternativ.—As. Min. (Galatia).
×eynense *Sennen in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 524.—Pyren.
foliosum *Bellardi ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 33 (1835).—Ital.
linearifolium *Colla, l. c.* 34.—Ital.
monocephalum (*Trautv.*) *Pavlov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1933, n.s. xlii. 127, 131: Campanula monocephala.
occultans *Popov & Vved. in Trans. Sc. Soc. Turk.* ii. 30 (1925).—Turkestan.
×orbiculariforme *Domin in Preslia*, xiii–xv. 223 (1935).—Czechoslovak.

PHYTOLACCA L. (Phytolaccac.).
octogyna (*Donn. Smith*) *Heimerl in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 158 (1934): P. icosandra var. octogyna.

PIAGGIAEA Chiov. Fl. Somala, II. 290 (1932). *APOCYNACEAE.*
Demartiniana (*Chiov.*) *Chiov. l. c.* 291: Wrightia Demartiniana.

PIARANTHUS R. Br. (Asclepiadac.).
fascicularis *Hort. ex Jacobsen, Sukkulent.* 54 (1933), in syn.: Echidnopsis cereiformis.
Mennellii *Luckhoff in S. Afr. Gard.* 1935, xxv. 95, 96.—Afr. austr. (Cape Prov.).
pallidus *Luckhoff, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).

PICCONIA DC. (Oleac.).
azorica (*Tutin*) *Knobl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1028 (1934): Notelaea azorica.

PICEA A. Dietr. (Pinac.; Conif., Gen. Pl.).
americana (*Gaertn.*) *Suringar in Meded. Herb. Leid.* No. 55, 47 (1928), in obs.: Pinus americana.
Clanbrasiliana *Hort. ex Dallimore in Rep. Conif. Conf. R.H.S. 1931* (*Conif. in Cult.*) 25 (1932), in syn.: P. Abies var. Clanbrasiliana *Th. Fries.*
kamtchatkensis *Lacassagne in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse*, 1929, lviii. 637; *et l. c.* 1930, lix. 195.—Kamchatka.
Kosteri *Hort. ex Dallimore in Rep. Conif. Conf. R.H.S. 1931* (*Conif. in Cult.*) 27 (1932), in syn.: P. pungens var. Kosteriana *Mast.*
Moramomi *Hort. ex L. H. Bailey, Cult. Conif. N. Amer.* 114 (1933), in syn.: P. Koyamai.
pungsanensis *Uyeki, Corean Timber Trees*, i. 98, 99 [1926].—Corea.
sikangensis *Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., vi. 33 (1931).—China (Szechuan).
yunnanensis *Hort. ex Dallimore in Rep. Conif. Conf. R.H.S. 1931* (*Conif. in Cult.*) 26 (1932), in syn.: P. likiangensis.

PICRAMNIA Sw. (Simaroubac.).
dictyoneura (*Urb.*) *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 15 (1932): Trichilia dictyoneura.
juniniana *Macbride in Candollea*, v. 374 (1934).—Peruv.
lineata *Macbride, l. c.* 373.—Peruv.
magnifolia *Macbride, l. c.* 376.—Peruv.
Martiniana *Macbride, l. c.* 374.—Peruv.
Schunkei *Macbride, l. c.* 375.—Peruv.
tenuis *Macbride, l. c.*—Peruv.

PICRIS L. (Compos.).
Bompieyrei *Sennen in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xv. Ser. Bot. No. 1, 24 (1931), in obs., nomen.—Hispan.
Chevallieri *Battand. Contrib. Fl. Atlant.* 56 (1919). —Marocc.

PICRIS :—
jessoënsis *Tatewaki in Research Bull. Coll. Exper. Forest Coll. Agric. Hokk. Imp. Univ.* vii. 181–208 (1932); cf. *Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 228, japonice.—Japon.
kaimaënsis *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 45.—Corea.
Ohwiana *Kitamura, l. c.* 1934, iii. 136.—Formosa.
spitzelioides *Coss. ex Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 53, in obs.—Marocc.
tenuis *Caballero in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 28, p. 34 (1935).—Marocc.
Vincentii *Sennen in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xv. Ser. Bot. No. 1, 24 (1931), in obs., nomen.—Hispan.

PICRITA Schumacher, Med. Pl. i. 203 (1825). *SIMAROUBACEAE.*
fraxinea *Schumacher, l. c.*: Quassia excelsa.

PICROCARDIA Radlk. (Simaroubac.).
resinosa *Radlk.*; *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 698, descr. ampl.—N. Caled.

PIERIS D. Don (Ericac.).
chapaënsis *Dop*; *Dop & Y. Troch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 719, descr. ampl.—Indo-China (Tonkin).

PIERREOCARPUS Ridley ex Symington in Gard. Bull. Straits Settlements, viii. 30 (1934), in syn.: **Hopea** Roxb. (Dipterocarpac.).
pachycarpus *Ridley ex Symington, l. c.*, in syn.: Hopea pachycarpa.

PIERREODENDRON A. Cheval. Vég. Ut. Afr. Trop. Franç. ix. 257 (1917); A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France, 1914, lxi. Mém. 8, 262 (1917). *SAPOTACEAE.*
durissimum *A. Cheval. l. c.* 258; *et l. c.*—Gabon.

PIGAFETTA Adans. (Acanthac.).
malabarica (*C. B. Clarke*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 228 (1931): Eranthemum malabaricum.

PILEA Lindl. (Urticac.).
Beguinotii *Cufod. in Archiv. Bot., Forlì*, 1934, x. 29.—Costa Rica.
bisepala *St. John in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 86, 42 (1931).—Ins. Cook (Rarotonga).
cornuto-cucullata *Cufod. in Archiv. Bot., Forlì*, 1934, x. 29.—Costa Rica.
Engleriana *Volk. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 58 (1915), in obs.—Tanganyika Terr.
fontana (*Lunell*) *Rydb. in Brittonia*, i. 87 (1931): Adicea fontana.
kiotensis *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 65.—Japon. (Hondo).
magambensis *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 60 (1915), in obs.—Tanganyika Terr.
microcardia *Hand.-Mazz. in Sinensia*, ii. 2 (1931). —China (Kwangsi).
Mildbraedii *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 60 (1915), in obs.—Tanganyika Terr.
opaca (*Lunell*) *Rydb. in Brittonia*, i. 87 (1931): Adicea opaca.
procumbens *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. 11. Anhang, 3 (1932).—Tanganyika Terr.
quercifolia *Killip in Phytologia*, i. 146 (1935).—Guatem.
rapensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 44 (1935).—Polynes. (Ins. Rapa).
Ulei *Killip in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1934, xxiv. 42.—Bras. (S. Catharina).

PILEOSTEGIA Hook. f. & Thoms. (Saxifragac.).
obtusifolia (*Hu*) *Hu in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 169 (1935): Schizophragma obtusifolium.

PILOCARPUS Vahl (Rutac.).
trachylophus *Holmes in Pharm. Journ.* Ser. III. xxiv. 1065, 1066 (1894).—Bras. (Maranhão).
ypanemensis *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 279 (1931).—Bras. (S. Paulo).

PILOCEREUS Lem. (Cactac.).
arenicola *Werderm. Bras. Säulenkakt.* 109 (1933). —Bras. (Bahia).
aurisetus *Werderm. l. c.* 103.—Bras. (Minas Geraes).
bahamensis (*Britton & Rose*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 329 (1935): Cephalocereus bahamensis.
Bradei *Backeb. & Voll in Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 1, [p. 3].—Bras. (Minas Geraes).
brasiliensis (*Britton & Rose*) *Werderm. Bras. Säulenkakt.* 105 (1933): Cephalocereus brasiliensis.
Brooksianus (*Britton & Rose*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 329 (1935): Cephalocereus Brooksianus.
catingicola (*Gürke*) *Werderm. Bras. Säulenkakt.* 104 (1933): Cereus catingicola.
chrysostele (*Vaupel*) *Werderm. l. c.* 102: Cereus chrysostele.
Collinsii (*Britton & Rose*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 330 (1935): Cephalocereus Collinsii.
cuyabensis *Backeb. in Kakteenfreund,* 1933, No. 11; *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 1, [p. 4]. —Bras. (Minas Geraes).
Deeringii (*Small*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 330 (1935): Cephalocereus Deeringii.
Gaumeri (*Britton & Rose*) *F. M. Knuth, l. c.*: Cephalocereus Gaumeri.
glaucochrous *Werderm. Bras. Säulenkakt.* 106 (1933).—Bras. (Bahia).
Haensleri *Backeb. in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1931, xlvi. 207, in obs., nomen.—Peruv.
hapalacanthus *Werderm. Bras. Säulenkakt.* 110 (1933).—Bras. (Pernambuco).
keyensis (*Britton & Rose*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 331 (1935): Cephalocereus keyensis.
Leninghausii *F. Haage ex K. Schum. in Monatsschr. Kakteenk.* 1895, v. 147, in obs., pro syn.: Echinocactus Leninghausii.
leucostele (*Gürke*) *Werderm. Bras. Säulenkakt.* 112 (1933): Cereus leucostele.
Luetzelburgii (*Vaupel*) *Werderm. l. c.* 111: Cereus Luetzelburgii.
Millspaughii (*Britton*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 332 (1935): Cephalocereus Millspaughii.
minensis (*Werderm.*) *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 1, [p. 2]: Cereus minensis.
monoclonos (*DC.*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 332 (1935): Cereus monoclonos.
oligolepis (*Vaupel*) *Werderm. Bras. Säulenkakt.* 105 (1933): Cereus oligolepis.
Palmeri (*Rose*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 333 (1935): Cephalocereus Palmeri.
perlucens (*K. Schum.*) *Werderm. Bras. Säulenkakt.* 112 (1933): Cereus perlucens.
phaeacanthus (*Gürke*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 333 (1935): Cereus phaeacanthus.
piauhyensis (*Gürke*) *Werderm. Bras. Säulenkakt.* 111 (1933): Cereus piauhyensis.
Purpusii (*Britton & Rose*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 333 (1935): Cephalocereus Purpusii.
rupicola *Werderm. Bras. Säulenkakt.* 109 (1933).—Bras. (Sergipe).
salvadorensis *Werderm. l. c.* 110.—Bras. (Bahia).
sergipensis *Werderm. l. c.* 106.—Bras. (Sergipe).
tuberculatus *Werderm. l. c.* 101.—Bras. (Pernambuco; Bahia).
Tweedyanus (*Britton & Rose*) *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 8, [p. 3], in obs., nomen; *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 334 (1935): Cephalocereus Tweedyanus.
Vollii *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, l. c.* 334, 417.—Bras. (Rio de Janeiro).

PILOSTAXIS Rafin. (Polygalac.).
arenicola (*Small*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 773 (1933): Polygala arenicola.
Baldwinii (*Nutt.*) *Small, l. c.* 774: Polygala Baldwini.
Carteri (*Small*) *Small, l. c.*: Polygala Carteri.

PILOSTAXIS:—
cymosa (*Walt.*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 774 (1933): Polygala cymosa.
lutea (*L.*) *Small, l. c.*: Polygala lutea.
ramosa (*Ell.*) *Small, l. c.*: Polygala ramosa.
Rugelii (*Shuttlew.*) *Small, l. c.*: Polygala Rugelii.

PIMENTA Lindl. (Myrtac.).
racemosa (*Mill.*) *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 102, 33 (1933): Caryophyllus racemosus.

PIMPINELLA Lindl. (Umbellif.).
brachystyla *Hand.-Mazz. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1933, lxxxii. 251.—China (Shansi; Chihli).
confusa *Woronow in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS,* Ser. I. Fasc. 1, 219 (1933).—Caucas.
Gustavohegiana *Koidz. in Mayebara, Fl. Austrohigo.* 84 (1931); *et in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 26.—Japon. (Kiushiu).
imbricata (*Schinz*) *Engl. in Warb. Kunene-Sambesi-Exped.* 324 (1903): Carum imbricatum.
involucrata *Hiern ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 815 (1921), in obs.: Caucalis mossamedensis.
Nakaiana *Kitagawa apud Nakai & Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933,* Sect. IV. 1. (*Pl. Nov. Jehol.* 1) 39 (1934).—Manchur. (Jehol).
niitakayamensis *Hayata, Gen. Ind. Fl. Formos.* 33 (1917); cf. *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 849 (1931).—Japon.
nikoënsis *Yabe ex Makino & Nemoto, l. c.* ed. 1, 46 (1925); *et l. c.* ed. 2, 849 (1931), japonice.—Japon.
nyasica *C. Norman in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 205. —Nyasaland.
quercetorum *Woronow in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS,* Ser. I. Fasc. 1, 219 (1933).—Caucas.
Robynsii *C. Norman in Journ. Bot.* 1932, lxx. 137. —Congo Belg.
rubescens (*Franch.*) *H. Wolff ex Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 715 (1933): Hydrocotyle rubescens.
silvatica *Hand.-Mazz. l. c.* 714.—China (Szechuan).
× supermagna *Hübl in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* 1932, lxxxii. p. (26), in obs.—Eur.
× supersaxifraga *Hübl, l. c.*—Eur.

PINANGA Blume (Palmae).
andamanensis *Becc. in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa,* Mem., 1934, xliv. 121.—Ins. Andaman.
annamensis *Magalon*; *Magalon in Fedde, Repert.* xxix. 24 (1931).—Indo-China (Anam).
banaënsis *Magalon*; *Magalon, l. c.* 23.—Indo-China (Anam).
baramensis *Furtado in Fedde, Repert.* xxxv. 277 (1934).—Borneo.
barramensis *Becc. in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa,* Mem., 1934, xliv. 124, an praec.—Borneo.
Beccariana *Furtado in Fedde, Repert.* xxxv. 278 (1934).—Penins. Mal.
Clemensiae *Furtado, l. c.*—Borneo.
Clemensii *Furtado, l. c.* 279.—Borneo.
dallasensis *Furtado, l. c.* 275.—Borneo.
gracillima *Merrill in Sarawak Mus. Journ.* iii. 518 (1928).—Borneo.
Keahi *Furtado in Fedde, Repert.* xxxv. 280 (1934). —Borneo.
lumuensis *Furtado, l. c.*—Borneo.
minuta *Furtado, l. c.* 281.—Borneo.
nannospadix *Burret in Fedde, Repert.* xxxii. 116 (1933).—Indo-China (Anam).
Ridleyana *Becc. ex Furtado in Fedde, Repert.* xxxv. 282 (1934); *Becc. in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa,* Mem., 1934, xliv. 126.—Borneo.
sessilifolia *Furtado in Fedde, Repert.* xxxv. 283 (1934).—Borneo.
trichoneura *Becc. in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa,* Mem., 1934, xliv. 120.—Borneo.
urdanetana *Becc. ex Martelli in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1934, n. s. xli. 701 (1935), nomen; *et l. c.* 1935, n. s. xlii. 73, in syn.: P. urdanetensis.
Wrayi *Furtado in Fedde, Repert.* xxxv. 276 (1934). —Penins. Mal.

PINELLIA Ten. (Arac.).
peltata *P'ei in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China,* Bot. Ser., x. 1 (1935).—China (Chekiang).

PINGUICULA L. (Lentibulariac.).
Jackii *Barnh. in Addisonia,* 1930, xv. 61 (1931).—Cuba.
nevadensis *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 142 (1932): P. leptoceras *Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp.* ii. 634 (1870), non *Reichb.*
transsilvanica *ex Kraj. in Veröff. Geobot. Inst. Rübel,* x. 136 (1933), in adnot., in syn.: P. vulgaris var. transsilvanica *Kraj.*

PINUS L. (Pinac.; Conif., Gen. Pl.).
brutia *Ten. Fl. Nap.* iv. 136 (1830); *et l. c.* v. 266 (1835–6).—Ital.
densi-Thunbergii *Uyeki, Corean Timber Trees,* i. 65 [1926], japonice.—Corea.
Deodara *Roxb. Hort. Beng.* 69 (1814), nomen; *Lambert, Pinus,* ii. 8 (1824), descr.—Ind. or.
Fenzeliana *Hand.-Mazz. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1931, lxxx. 337.—China (Hainan).
flabellifolia *Ogura in Bot. Mag., Tokyo,* 1932, xlvi. 417, japonice.—Japon.
hakkodensis *Makino in Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 148 (1931), japonice.—Japon.
hamata (*Stev.*) *Fomin in Mém. Acad. Sc. Ukraine, Cl. Sc. Phys. & Math.* xi. 23 (1928): P. sylvestris var. hamata.
× Holfordiana *A. B. Jackson in Gard. Chron.* 1933, Ser. III. xciii. 152.—Hort.
longifolia *Roxb. ex Lambert, Pinus,* t. 21 (1803).—Nepal.
mesogeënsis *Fieschi & Gaussen in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse,* 1932, lxiv. 440.—Reg. Mediterr.
× taihangshanensis *Hu & Yao in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 167 (1935).—China (Honan).
Tokunagai *Nakai in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933,* Sect. IV. II. (*Contrib. Cogn. Fl. Mansh.*) 164 (1935).—Manchur. (Jehol).
Wateriana *Hort. ex L. H. Bailey, Cult. Conif. N. Amer.* 54 (1933), in syn.: P. sylvestris var. Watereri *Beissn.*

PIPER L. (Piperac.).
angustifolium *Roxb. Hort. Beng.* 80 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 163 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 161 (1832).—Arch. Mal.
arborescens *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 161; *et l. c.* 159.—Ins. Molucc.
bejucalanum *Trelease in Fedde, Repert.* xxix. 28 (1931).—Hispaniola.
bikanum *Schwartz in Mitt. Inst. Bot. Hamburg,* vii. 231 (1931).—Borneo.
brasiliense *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* v. 165 (1836).—Bras.
calvescens *Trelease in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., x. 158 (1931).—Honduras.
carolinense *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa,* 1935, xxv. 117.—Ins. Palau.
cobanense *Trelease in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., x. 159 (1931).—Honduras; Guatem.
Cufodontii *Trelease in Archiv. Bot., Forlì,* 1934, x. 25.—Costa Rica.
cyclophyllum *Trelease in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., x. 159 (1931).—Honduras.
deltoideum *Hort. ex Colla, Herb. Pedem.* v. 164 (1836), in obs.—Hab. ?
duidaënse *Trelease in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 355.—Venez.
esmeraldanum *Trelease, l. c.* 353.—Venez.
Frostii *Trelease ex Standley in Contrib. Arn. Arb.* No. v. 54 (1933).—Panamá (Ins. Barro Colorado).
gracillimum *Trelease in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., x. 159 (1931).—Honduras.
Grahami *Trelease in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 477.—Guiana Brit.
jamaoanum *Trelease in Fedde, Repert.* xxix. 29 (1931).—Hispaniola.
Kadsura (*Choisy*) *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 81: Ipomoea Kadsura.
kotoënse *Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan,* 1932, iv. 304.—Formosa.
kusaiense *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa,* 1935, xxv. 118.—Ins. Carolin. (Kusai).
laeteviride *Ekman ex Trelease in Fedde, Repert.* xxix. 29 (1931).—Hispaniola.

PIPER:—
lanatum *Roxb. Hort. Beng.* 80 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 161 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 159 (1832).—Arch. Mal.
lanceolatum *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 162; *et l. c.*—Ins. Molucc.
luteobaccum *Trelease in Fedde, Repert.* xxix. 29 (1931).—Hispaniola.
moraballianum *Trelease in Kew Bull.* 1933, 338.—Guiana Brit.
muluense *Schwartz in Mitt. Inst. Bot. Hamburg*, vii. 231 (1931).—Borneo.
negritosense *Trelease in Archiv. Bot., Forli*, 1934, x. 25.—Costa Rica.
novae-hispaniae *Hort. ex Colla, Herb. Pedem.* v. 164 (1836).—Hab.?
obatense *Schwartz in Mitt. Inst. Bot. Hamburg*, vii. 232 (1931).—Borneo.
ocoanum *Trelease in Fedde, Repert.* xxix. 29 (1931).—Hispaniola.
palauense *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 118.—Ins. Palau.
para-peltobryon *Trelease in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 356.—Venez.
parimanum *Trelease, l. c.* 354.—Venez.
peepuloides *Roxb. Hort. Beng.* 4 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 159 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 157 (1832).—Himal.
perinaequilongum *Trelease in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., x. 160 (1931).—Honduras.
quiriguanum *Trelease, l. c.*—Honduras; Guatem.
rostratum *Roxb. Hort. Beng.* 80 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 162 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 160 (1832).—Ins. Molucc.
sangabrielanum *Trelease in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 354.—Bras. (Rio Negro).
sarmentosum *Roxb. in Asiat. Res.* xi. 565 (1810).—Arch. Mal.
saxatile *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 163 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 161 (1832).—Nepal.
sintenense *Hatusima in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 210.—Formosa.
sylvaticum *Roxb. Hort. Beng.* 4 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 158 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 156 (1832).—Himal.
telanum *Trelease in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., x. 161 (1931).—Honduras.
theobromifolium *Schwartz in Mitt. Inst. Bot. Hamburg*, vii. 232 (1931).—Borneo.
trioicum *Roxb. Hort. Beng.* 4 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 153 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 151 (1832).—Ind. or.
triumphale *Trelease in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., x. 161 (1931).—Honduras.
Wachenheimii *Trelease in Kew Bull.* 1933, 339.—Guiana Gall. et Brit.
Wilsonii *Trelease in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., x. 161 (1931).—Honduras.

PIPTADENIA Benth. (Legumin.).
Aubrevillei *Pellegr. in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 466.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
floribunda *Kleinh. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 168.—Guiana Bat.

PIPTANTHOCEREUS Riccob. (Cactac.).
lepidotus *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 12, [p. 7], in obs., nomen.—Venez.

PIPTANTHUS Sweet (Legumin.).
laburnifolius (*D. Don*) *Stapf in Bot. Mag.* sub t. 9234 (1931): Thermopsis laburnifolia.
leiocarpus *Stapf, l. c.*, in clavi.—Himal. occ.
nanus *Popov in Bull. Applied Bot., Leningrad*, 1931, xxvi. No. 3, 69.—Turkestan. chin.

PIPTATHERUM Beauv. (Gramin.).
verticillatum *Vayreda in Cavanillesia*, iv. 61 (1931), nomen.—Hispan.

PIPTOCARPHA R. Br. (Compos.).
angustifolia *Dusén ex Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 27 (1933).—Bras. (Paraná).
Bakeriana *Glaziou in Bull. Soc. Bot. France*, 1909, lvi. Mém. 3, 377; *Domke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 691 (1935).—Bras. (Rio de Janeiro; S. Paulo).

PIPTOCARPHA:—
canescens *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1932, lix. 373.—Peruv.
insignis *Gleason, l. c.* 371.—Peruv.
longifolia *Gleason, l. c.* 372.—Peruv.
vismiifolia *Gleason, l. c.*—Peruv.

PIPTOCHAETIUM J. Presl (Gramin.).
fimbriatum (*H. B. & K.*) *Hitchcock in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1933, xxiii. 453: Stipa fimbriata.

PIPTOCOMA Cass. (Compos.).
antillana *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 50 (1931).—Santo Domingo.

PIPTOSTIGMA Oliv. (Annonac.).
fugax *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 51, in clavi, 52 (1927).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).

PIPTURUS Wedd. (Urticac.).
Brighamii *Skottsb. in Acta Hort. Gothoburg.* 1931, vii. 3 (1932).—Ins. Sandvic.
eriocarpus *Skottsb. l. c.* 1.—Ins. Sandvic.
Fauriei *Yamamoto*; *Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 51, descr.—Formosa.
Helleri *Skottsb. in Acta Hort. Gothoburg.* 1931, vii. 4 (1932).—Ins. Sandvic.
Henryanus *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 54 (1935).—Ins. Marquesas (Nukuhiva).
Mabesae *Skottsb. in Acta Hort. Gothoburg.* 1933, viii. 117, in obs., pro syn.: Pseudopipturus Mabesae.
micronesicus *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 353.—Ins. Palau.
Nadeaudii *Skottsb. in Acta Hort. Gothoburg.* 1931, vii. 29 (1932).—Ins. Societ. (Tahiti).
oahuensis *Skottsb. l. c.* 3.—Ins. Sandvic.
pachyphyllus *Skottsb. l. c.* 1.—Ins. Sandvic.
palauensis *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 122, in syn.: P. subinteger.
polynesicus *Skottsb. in Acta Hort. Gothoburg.* 1931, vii. 27 (1932).—Ins. Societ. (Tahiti).
Rockii *Skottsb. l. c.* 2.—Ins. Sandvic.
subalpinus *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3221 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
viridis *Christoph. in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 128, 77 (1935).—Samoa.

PIQUERIA Cav. (Compos.).
Standleyi *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 4 (1934).—Am. centr. (Salvador).

PISONIA L. (Nyctaginac.).
albiflora *Heimerl in Kew Bull.* 1932, 219.—Guiana Brit.
glabra *Heimerl, l. c.* 220.—Guiana Brit.
indecora *Heimerl in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 469 (1932).—Boliv.
Rusbyana *Heimerl ex Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 85 (1931), in syn.: Torrubia Rusbyana.

PISTACIA L. (Anacardiac.).
malayana *M. R. Henderson in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 97 (1933).—Penins. Mal.

PISTORINIA DC. (Crassulac.).
atlantica *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 69 (1932), in syn.: Cotyledon attenuata.
attenuata *H. Lindb. l. c.* 68, in syn.: Cotyledon attenuata.

PITCAIRNIA L'Hérit. (Bromeliac.).
Archeri *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 79 (1934).—Colomb.
Calderonii *Standley & L. B. Smith, l. c.* n. s. xcviii. 8 (1932).—Am. centr. (Salvador).
cuzcoënsis *L. B. Smith, l. c.* 9.—Peruv.
dolichopetala *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 530 (1935).—Colomb.
kniphofioides *L. B. Smith in Proc. Am. Acad.* lxx. 153 (1935).—Colomb.
minarum *Mez in Engl. Pflanzenreich, Bromeliac.* 636 (1935): P. Weddelliana *Mez.*
olivacea (*Wittm.*) *Mez, l. c.* 247: Puya olivacea.
pectinata *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcviii. 9 (1932).—Colomb.
truncata *L. B. Smith, l. c.* 10.—Peruv.

PITHECELLOBIUM Mart. (Legumin.).
acuminatum *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 38 (1933–5).—Calif. infer.
arenarium *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 37 (1935).—Bras. (Amaz.).
Barbourianum *Standley in Contrib. Arn. Arb.* No. v. 74 (1933).—Panamá (Ins. Barro Colorado).
costaricense (*Britton & Rose*) *Standley in Tropical Woods*, 1933, No. 34, 40: Cojoba costaricensis.
Donnell-Smithii (*Britton & Rose*) *Standley, l. c.*: Cojoba Donnell-Smithii.
Elmeri *Ridley in Kew Bull.* 1933, 492.—Borneo.
Englesingii (*Standley*) *Standley in Tropical Woods*, 1933, No. 34, 40: Inga Englesingii.
erythrocarpum *Standley, l. c.*: Cojoba Recordii *Britton & Rose*, non Pithecellobium Recordii *Standley*.
glabrum (*Britton & Rose*) *Standley, l. c.*: Cojoba glabra.
glaucum *Urb.*; *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, p. 2 (1932), descr. ampl.—Haiti.
halogenes *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 59 (1935).—Brit. Honduras.
Havilandii *Ridley in Kew Bull.* 1933, 493.—Borneo.
impressum *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, p. 3 (1932).—Haiti.
Merrilli *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 26 (1931): P. multiflorum *Merrill*.
minutissimum *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 38 (1933–5).—Calif. infer.
minutum *M. E. Jones, l. c.*—Calif. infer.
myriophyllum *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 13, 44 (1931).—Bras. (Matto Grosso).
Nelsonii (*Britton & Rose*) *Standley in Tropical Woods*, 1933, No. 34, 40: Havardia Nelsonii.
palauense *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 414, an seq.—Ins. Palau.
palauense *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 733.—Ins. Palau.
pallens (*Benth.*) *Standley in Tropical Woods*, 1933, No. 34, p. 39: Calliandra pallens.
pistaciifolium *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 59 (1935).—Brit. Honduras.
Samaningua (*Pittier*) *Macbride in Candollea*, vi. 4 (1934): Samanea Samaningua.
striolatum *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, p. 3 (1932).—Haiti.
tenellum (*Britton & Rose*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., x. 216 (1931): Cojoba tenella.
Vinhatico *Record in Record & Mell, Timbers Trop. Amer.* 211 (1924).—Bras.

PITHECOCTENIUM Mart. (Bignoniac.).
granulosum (*Bur. & K. Schum.*) *Sprague & Sandwith in Kew Bull.* 1932, 89: Distictis granulosa.

PITTOSPORUM Banks (Pittosporac.).
aneityense *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 225.—N. Hebrides.
anomalum *Laing & Gourlay in Trans. & Proc. Roy. Soc. N. Z.* lxiv. 7 (1934), nomen; *et l. c.* lxv. 55 (1935), descr.—N. Zel.
Beecheyi *Tuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 445.—Ins. Bonin.
bicarpellatum *Nakai & Tuyama, l. c.* 447.—Ins. Bonin.
Billardieri *Bellardi ex Colla, Herb. Pedem.* i. 285 (1833).—Hab.?
chichijimense *Nakai in Rigakkwai*, xxvi. No. 5, p. 5 (1928), nomen; *Tuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 446, descr.—Ins. Bonin.
confertum *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 237 (1935).—China (Hainan).
crassicaule *Laing & Gourlay in Trans. & Proc. Roy. Soc. N. Z.* lxiv. 7 (1934), nomen; *et l. c.* lxv. 50 (1935), descr.—N. Zel.
fragrans *Schlechter ex Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1932, lxxvii. Beibl. 19, 163, in obs.—N. Caled.
kusaiense *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 454, 674.—Ins. Carolin. (Kusai).
Le-Ratii *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 303.—N. Caled.
lineare *Laing & Gourlay in Trans. & Proc. Roy. Soc. N. Z.* lxv. 57 (1935).—N. Zel.

PITTOSPORUM:—
Naruaiao *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 53.—N. Hebrides.
nigricans *Hort. ex McMinn & Maino, Pacific Coast Trees*, 212 (1935), in syn.: P. tenuifolium.
oligodontum *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 83, 9 (1931).—Ins. Viti.
paitense *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 688.—N. Caled.
ponapense *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 281.—Ins. Carolin. (Ponape).
rapense *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 101 (1935).—Polynes. (Ins. Rapa).
samoënse *Christoph. in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 128, 95 (1935).—Samoa.

PITURANTHOS Viv. (Umbellif.).
aphyllus (*Cham. & Schlecht.*) *Schinz in Bull. Herb. Boiss.* ii. 209 (1894): Deverra aphylla.
Burchellii (*Sond.*) *Schinz, l. c.*: Deverra Burchellii.
chloranthus (*Coss. & Durieu*) *Schinz, l. c.*: Deverra chlorantha.
Reboudii (*Coss. & Durieu*) *Schinz, l. c.*: Deverra Reboudii.
scoparius (*Coss. & Durieu*) *Schinz, l. c.*: Deverra scoparia.

PITYOPSIS Nutt. (Compos.).
aspera (*Shuttlew.*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 1341 (1933): Chrysopsis aspera.
flexuosa (*Nash*) *Small, l. c.*: Chrysopsis flexuosa.
microcephala (*Small*) *Small, l. c.*: Chrysopsis microcephala.
oligantha (*Chapm.*) *Small, l. c.*: Chrysopsis oligantha.
Ruthii (*Small*) *Small, l. c.*: Chrysopsis Ruthii.
Tracyi (*Small*) *Small, l. c.*: Chrysopsis Tracyi.

PITYOPUS Small (Pyrolac.).
californicus (*Eastw.*) *H. F. Copeland in Madroña*, iii. 155 (1935): Monotropa californica.

PITYOTHAMNUS Small, Man. Southeast. Fl. 530 (1933). *ANNONACEAE.*
angustifolius (*A. Gray*) *Small, l. c.* 531: Asimina angustifolia.
incanus (*Bartr.*) *Small, l. c.* 530: Annona incana.
obovatus (*Willd.*) *Small, l. c.* 531: Annona obovata.
pygmaeus (*Bartr.*) *Small, l. c.*: Annona pygmaea.
reticulatus (*Chapm.*) *Small, l. c.* 530: Asimina reticulata.
tetramerus (*Small*) *Small, l. c.* 531: Asimina tetramera.

PITYRODIA R. Br. (Verbenac.).
chrysocalyx (*F. Muell.*) *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 112 (1931): Depremesnilia chrysocalyx.

PLACODISCUS Radlk. (Sapindac.).
amaniensis *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 813 (1932).—Tanganyika Terr.
angustifolius *Radlk. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 277 (1921), in obs.; *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 813 (1932).—Cameroons.
cuneatus *Radlk. ex Engl. l. c.*, in obs.; *Radlk. l. c.* 814.—Cameroons.
glandulosus *Radlk. l. c.*, in obs.; *Radlk. l. c.*—Cameroons; Gabon.
opacus *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 814 (1932).—Guinea Hispan.

PLADERA Soland. ex Roxb. Hort. Beng. 10 (1814), nomen; Fl. Ind., ed. Carey & Wall., i. 416 (1820); Fl. Ind., ed. Carey, i. 400 (1832). *GENTIANACEAE.*
decussata *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 418; *et l. c.* 402.—Ind. or.
perfoliata *Roxb. l. c.* 83, nomen; *et l. c.*; *et l. c.*—Ind. or.
pusilla *Roxb. l. c.* 10, nomen; *et l. c.* 419; *et l. c.* 403.—Ind. or.
sessiliflora *Roxb. l. c.* 83, nomen; *et l. c.* 416; *et l. c.* 400.—Ind. or.
virgata *Roxb. l. c.* 10, nomen; *et l. c.* 417; *et l. c.* 401.—Ind. or.

PLAGIOBASIS Schrenk (Compos.).
dshungaricus *Iljin in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 357 (1932).—Turkestan.

PLAGIOBOTHRYS Fisch. & Mey. (Boraginac.).
acanthocarpus (*Piper*) *I. M. Johnston in Contrib. Arn. Arb.* No. III. 33 (1932): Allocarya acanthocarpa.
Austinae (*Greene*) *I. M. Johnston, l. c.* 36: Allocarya Austinae.
bracteatus (*Howell*) *I. M. Johnston, l. c.* 68: Allocarya bracteata.
cognatus (*Greene*) *I. M. Johnston, l. c.* 59: Allocarya cognata.
Cusickii (*Greene*) *I. M. Johnston, l. c.* 63: Allocarya Cusickii.
diffusus (*Greene*) *I. M. Johnston, l. c.* 77: Allocarya diffusa.
distantiflorus (*Piper*) *I. M. Johnston, l. c.* 36: Allocarya distantiflora.
glyptocarpus (*Piper*) *I. M. Johnston, l. c.* 37: Allocarya glyptocarpa.
granulatus (*Piper*) *I. M. Johnston, l. c.* 57: Allocarya granulata.
hirtus (*Greene*) *I. M. Johnston in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 193: Allocarya hirta.
hispidulus (*Greene*) *I. M. Johnston in Contrib. Arn. Arb.* No. III. 71 (1932): Allocarya hispidula.
hystriculus (*Piper*) *I. M. Johnston, l. c.* 32: Allocarya hystricula.
lamprocarpus (*Piper*) *I. M. Johnston, l. c.* 56: Allocarya lamprocarpa.
leptocladus (*Greene*) *I. M. Johnston, l. c.* 38: Allocarya leptoclada.
medius (*Piper*) *I. M. Johnston, l. c.* 58: Allocarya media.
myosotoides (*Lehm.*) *A. Brand in Engl. Pflanzenreich, Borrag.-Borraginoid.-Cryptanth.* 108 (1931): Lithospermum myosotoides.
reticulatus (*Piper*) *I. M. Johnston in Contrib. Arn. Arb.* No. III. 78 (1932): Allocarya reticulata.
scriptus (*Greene*) *I. M. Johnston, l. c.* 27: Allocarya scripta.
tener (*Greene*) *I. M. Johnston, l. c.* 66: Allocarya tenera.
undulatus (*Piper*) *I. M. Johnston, l. c.* 46: Allocarya undulata.

PLAGIOPETALUM Rehder (Melastomatac.).
Esquirolii (*Léveillé*) *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1934, xv. 110: Sonerila Esquirolii.
serratum (*Diels*) *Diels in Engl. Jahrb.* lxv. 100 (1932): Oxyspora serrata.

PLAGIOTHECA Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya, 96 (1935). *ACANTHACEAE.*
fallax *Chiov. l. c.*—Kenya Col.

PLANCHONELLA Pierre (Sapotac.).
chrysophylloides *H. J. Lam in Nova Guinea*, xiv. 566 (1932): Chrysophyllum Ledermannii.
densinervia (*K. Krause*) *H. J. Lam, l. c.* 562: Sideroxylon densinervium.
Garberi *Christoph. in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 128, 170 (1935).—Samoa.
Grayana *St. John in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 120, 38 (1934): Sapota vitiensis.
intermedia (*Baill.*) *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1933, lxxviii. Beibl. 19, 353: Chrysophyllum intermedium.
jacquiniifolia *Pierre ex Dubard in Ann. Mus. Col. Marseille*, 1912, Sér. II. x. 52.—N. Caled.
kaniensis (*K. Krause*) *H. J. Lam in Nova Guinea*, xiv. 565 (1932): Sideroxylon kaniense.
Krausei *H. J. Lam, l. c.* 561: Sideroxylon spathulatum *K. Krause*.
lamprophylla (*K. Krause*) *H. J. Lam, l. c.* 564: Sideroxylon lamprophyllum.
Lauterbachiana *H. J. Lam, l. c.*: Beccariella Schlechteri.
Ledermannii (*K. Krause*) *H. J. Lam, l. c.* 561: Sideroxylon Ledermannii.
leptoclada (*Pierre ex Baill.*) *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1933, lxxviii. Beibl. 19, 354: Trouettia leptoclada.
lifuana *Pierre ex Guillaumin in Candollea*, v. 150 (1932).—N. Caled.
lissophylla (*Pierre ex Baill.*) *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1933, lxxviii. Beibl. 19, 354: Chrysophyllum lissophyllum.
macropoda *H. J. Lam in Nova Guinea*, xiv. 563 (1932).—N. Guin.

PLANCHONELLA:—
monticola (*K. Krause*) *H. J. Lam in Nova Guinea*, xiv. 561 (1932): Sideroxylon monticola.
nebulicola *H. J. Lam, l. c.* 563.—N. Guin.
Peekelii (*K. Krause*) *H. J. Lam, l. c.* 564: Sideroxylon Peekelii.
Pohlmanniana (*Benth. & Hook. f. ex F. Muell.*) *Burkill in Kew Bull.* 1935, 319; *Burkill, Dict. Econ. Prod. Mal. Penins.* ii. 1765 (1935), in obs.: Sideroxylon Pohlmannianum.
pronyensis *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1933, Sér. II. v. 322.—N. Caled.
rigidifolia (*K. Krause*) *H. J. Lam in Nova Guinea*, xiv. 560 (1932): Sideroxylon rigidifolium.
Schlechteri (*K. Krause*) *H. J. Lam, l. c.* 561: Sideroxylon Schlechteri.
subopposititolia *H. J. Lam, l. c.* 565.—N. Guin.
Sussu (*Engl.*) *H. J. Lam, l. c.* 553, 564: Palaquium Sussu.
tenuipes (*K. Krause*) *H. J. Lam, l. c.* 564: Sideroxylon tenuipes.
torricellensis (*K. Schum.*) *H. J. Lam, l. c.* 562: Rapanea torricellensis.

PLANTAGO L. (Plantaginac.).
attenuata *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 422 (1820).—Nepal.
×Beauverdii *Pilger in Fedde, Repert.* xxxiv. 164 (1933), cum descr.: P. decipiens *Beauverd.*
×decipiens *Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1919, Sér. II. xi. 138 (1920), in obs.—Helvet.
Dostalii *Domin in Mém. Soc. Sc. Bohême*, 1932, No. 17, 23 (1933).—Czechoslovak.
eocoronopus *Pilger in Fedde, Repert.* xxxiv. 147 (1933).—Afghan.; Persia.
erosa *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 423 (1820).—Nepal.
fontis-curvae *Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 210 (1932).—Sibir. or.
formosana *Tateishi & Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 192.—Formosa.
hostifolia *Nakai & Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. 1. (*Pl. Nov. Jehol.* 1) 55 (1934).—Manchur. (Jehol).
laciniosa *Domin in Mém. Soc. Sc. Bohême*, 1932, No. 17, 38 (1933).—Czechoslovak.
litoraria *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 96 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
maris-mortii *Eig in Fedde, Repert. Beih.* lxiii. 1. 47 (1931), nomen.—Palaest.
marocana *Battand. & Pitard in Pitard, Contrib. Étude Fl. Maroc*, 34 (1918).—Marocc.
Mauritii *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 98 [1933], nomen.—Marocc.
Maxonnoi *Sennen in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 188, in obs., nomen.—Marocc.
×mixta *Domin in Mém. Soc. Sc. Bohême*, 1932, No. 17, 40 (1933).—Czechoslovak.
Namikawae *Masamune in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 512: P. major var. micrantha *Pilger.*
panormitana *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 143 (1932).—Sicil.
pseudo-ceratophylla *H. Lindb. l. c.*: P. Coronopus var. ceratophylla *Fiori, Fl. Anal. Ital.* iii. 98 (1903–4), non *Hoffmgg. & Link.*
rapensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 281 (1935).—Polynes. (Ins. Rapa).
rhizoxylon *Emberger in Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc*, 1932, No. xxxiii. 42 (1933).—Marocc.
Sawadai (*Yamamoto*) *Yamamoto, Suppl. Ic. Pl. Formos.* Pt. 5, 29 (1932): P. major var. Sawadai.
strigosa *Bellardi ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 566 (1835).—Hab. ?
Togashii *Miyabe & Tatewaki in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.* xiv. 79 (1935).—Japon. (Yezo).
villifera *Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. 11. (*Contrib. Cogn. Fl. Mansh.*: *Pl. Nov. Jehol.* II. ii.) 30 (1935).—Manchur. (Jehol).
yakusimensis *Masamune, Prelim. Rep. Veg. Yakus.* 119 (1929); *Masamune in Bot. Mag., Tokyo*, 1930, xliv. 220; *et in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* xi., Bot. No. 4, 412 (1934).—Ins. Liukiu (Yakushima).

PLASO Adans. (Legumin.).
frondosa (*Roxb.*) *Lyons, Plant Names Scientific & Popular*, ed. 2, 363 (1907): Butea frondosa.

PLATANTHERA L. C. Rich. (Orchidac.).
behringiana (*Rydb.*) *Tatewaki & Kobayashi in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxxvi. 118 (1934): Limnorchis behringiana.
chloranthella *Nakai, Rep. Veg. Exper. For. Kôryô, Chôsen*, 28 (1932); cf. *Maekawa in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 302.—Manchur.; Corea.
cornu-bovis *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, iv. 662, 752 (1935).—As. or. extr.
extremiorientalis *Nevski, l. c.* 657, 753: P. chlorantha *F. Schmidt, Reise Amwl.* 181 (1868), non *Cust. ex Reichb. f.*
×Graebneri (*M. Schulze*) *Domin in Preslia*, xiii–xv. 50 (1935): P. chlorantha × solstitialis f. Graebneri.
hachijoënsis *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 2.—Japon.
iriomotensis *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 279.—Ins. Liukiu (Iriomote).
islandica (*Lindl.*) *Kraenzl. in Fedde, Repert. Beih.* lxv. 53 (1931), in obs.: Peristylus islandicus.
metabifolia *Maekawa in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 303.—Sakhalin; Yezo; Ins. Kuril.
nankotaizanensis (*Masamune*) *Masamune in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 773: Herminium nankotaizanense.
Sigeyosii *Masamune, l. c.*—Formosa.
sigmoidea *Maekawa in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 379.—China (Shansi).
transnokoënsis *Ohwi & Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 297.—Formosa.
yakumontana *Masamune in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* xi., Bot. No. 4, 574 (1934).—Ins. Liukiu.

PLATANUS L. (Platanac.).
intermedia *Hort. ex Chow, Familiar Trees Hopei, Peiping*, 176 (1934), in syn.: P. acerifolia.

PLATEA Blume (Icacinac.; Olacac., Gen. Pl.).
oblonga *Korth. ex Valeton, Crit. Overz. Olac.* 252, in obs., 279 (1886).—Borneo.

PLATOSTOMA Beauv. (Labiat.).
djalonense *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 289 (1931), in syn.: P. africanum.

PLATYCARPUM Humb. & Bonpl. (Rubiac.).
negrense *Ducke in Arquiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, i. 212 (1935).—Bras. (Amaz.).

PLATYCODON A. DC. (Campanulac.).
Mariesii *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 572 (1894), in syn.; *et ex Nobis in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1931, xlvi. 330.—Hort.

PLATYCORYNE Reichb. f. (Orchidac.).
ambigua (*Kraenzl.*) *Summerhayes in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3239 (1934): Habenaria ambigua.
megalorrhyncha *Summerhayes in Kew Bull.* 1933, 250.—S. Nigeria.
montis-elgon (*Schlechter*) *Summerhayes, l. c.* 1932, 508: Habenaria montis-elgon.

PLATYELASMA Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933, Sect. IV. 11. (Contrib. Cogn. Fl. Mansh.: Pl. Nov. Jehol. 11. ii.) 24 (1935). *LABIATAE.*
calycocarpum (*Diels*) *Kitagawa, l. c.* 25: Elsholtzia calycocarpa.
densum (*Benth.*) *Kitagawa, l. c.*: Elsholtzia densa.
eriostachyum (*Benth.*) *Kitagawa, l. c.*: Aphanochilus eriostachyus.
manshuricum *Kitagawa, l. c.* 26.—Manchur. (Jehol).

PLATYLEPIS A. Rich. (Orchidac.).
Engleriana *Kraenzl. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* ii. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 427, fig. 302, F–K (1908).—Hab. ?

PLATYMISCIUM Vog. (Legumin.).
lasiocarpum *Sandwith in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3249 (1934).—Mexico.

PLATYRHODON (Decne.) Hurst in Verh. V. Internat. Kongr. Vererbungswissensch. Berlin, 1927, ii. 902 (1928); et in Rose Annual, 1929, 64. *ROSACEAE.*
[ROSA sect. PLATYRHODON Decne.]
macrophyllum *Hurst in Rose Annual*, 1929, 64: an P. microphyllum.

PLATYRHODON:—
microphyllum (*Roxb.*) *Hurst in Verh. V. Internat. Kongr. Vererbungswissensch. Berlin*, 1927, ii. 902 (1928): Rosa microphylla.

PLATYSEPALUM Welw. ex Baker (Legumin.).
inopinatum *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 510 (1935).—Tanganyika Terr.

PLECTANEIA Thou. (Apocynac.).
Boivini *Jumelle in Ann. Mus. Col. Marseille*, 1934, Sér. V. ii. Fasc. 4, 22.—Madag.
isalensis *Jumelle, l. c.* 40.—Madag.
macrocarpa *Jumelle, l. c.* 46.—Madag.
stenophylla *Jumelle, l. c.* 27.—Madag.

PLECTOGYNE Link (Liliac.).
elatior *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1072 (1895), in syn.: Aspidistra elatior.

PLECTRANTHUS L'Hérit. (Labiat.).
arabicus *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1935, 324: Ocimum villosum *Forsk.*
denudatus *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 288, in clavi, 289 (1931).—Senegal; Sierra Leone.
drogotschiensis *Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 95.—China (Szechuan).
effusus (*Maxim.*) *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 419: P. longitubus var. effusus.
Enanderianus *Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 96.—China (Yunnan).
glabratus (*Benth.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 236 (1931): Coleus glabratus.
koroënsis *Kudo in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1931, iii. 110, in syn.: Isodon koroënsis.
nodosus *Bellardi ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 475 (1835).—Hab. ?
pallidus *Biroli ex Colla, l. c.*—Hab. ?
rupicola *Dinter ex Goossens in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 252 (1933), nomen.—Afr. austr.-occ.
Sawadae *Honda & Kudo ex Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 790, in syn.: Amethystanthus lanceus.
Smithianus *Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 93.—China (Szechuan).
thiothyrsus *Hand.-Mazz. l. c.* 94.—China (Szechuan).
villosus (*Forsk.*) *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1935, 324, in obs.: Ocimum villosum.
Zatarhendi (*Benth.*) *E. A. Bruce, l. c.* 590: Coleus Zatarhendi.

PLECTROCARPA Gill. ex Hook. Bot. Misc. iii. 166 (1832). *ZYGOPHYLLACEAE.*
tetracantha *Gill. ex Hook. l. c.* 167.—Chile.

PLECTRONIA L. (Rubiac.).
amplifolia *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3261 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
attenuata (*R. Br. ex Benth.*) *C. A Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 122 (1931): Canthium attenuatum.
Guidottii *Chiov. Fl. Somala*, II. 246 (1932).—Somal. Ital.
Kohenua *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 297 (1935).—Ins. Marquesas; Ins. Austral; Ins. Rapa.
linearis (*E. Pritz.*) *J. M. Black in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1935, lix. 261: Canthium lineare.
marquesensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 293 (1935).—Ins. Marquesas.
raiateënsis *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 45 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
rapae *Riley*; *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 296 (1935), descr. ampl.—Ins. Tuamotu (Pitcairn; Henderson); Ins. Rapa.
Sennii *Chiov. Fl. Somala*, II. 243 (1932).—Somal. Ital.
temehaniensis *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 45 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).

PLECTRONIELLA Robyns (Rubiac.).
capillaris *Bremek. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 258 (1933).—Transvaal.

PLEIOBLASTUS Nakai (Gramin.).
Akebono (*Makino ex Tsuboi*) *Nakai in Rika Kyô-iku*, xv. No. 6, 69 (1932); cf. *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1933, ix. 236; *et l. c.* 1934, x. 204: Arundinaria variegata var. Akebono.

PLEIOBLASTUS:—
akibensis *Makino & Nakai ex Nakai in Rika Kyô-iku*, xv. No. 6, 69 (1932), nomen; *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1933, ix. 229, descr.—Japon. (Hondo).
angustifolius (*Mitford*) *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 294: Bambusa angustifolia.
argenteostriatus (*Regel*) *Nakai, l. c.* 1933, ix. 236; *et l. c.* 1934, x. 204: Bambusa argenteostriata.
Asanoi *Nakai, l. c.* 1935, xi. 808.—Japon.
distichus (*Mitford*) *Nakai in Rika Kyô-iku*, xv. No. 6, 69 (1932); cf. *Nakai, Fl. Sylvat. Koreana*, xx. 21 (1933), in obs.: Bambusa disticha.
diversus *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 370.—Japon.
elongatus *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 83.—Japon.
episetosus *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 809.—Japon.
flaccidifolius *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 163.—Japon. (Hondo).
Fortunei (*v. Houtte*) *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1933, ix. 232: Bambusa Fortunei.
gozadakensis *Nakai, l. c.* 1935, xi. 4.—Ins. Liukiu.
gracilis (*Makino ex Tsuboi*) *Nakai, l. c.* 1934, x. 282: Arundinaria Chino var. gracilis.
harimensis *Makino in Hyogoken-Hakubutsu-Gakkaishi*, No. 4, p. 11 (1932), nomen; *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 164, descr.—Japon. (Hondo).
Hashimotoi *Makino in Journ. Jap. Bot.* viii. 45 (1933).—Japon.
Hatsusimanus *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 83.—Japon. (Kiushiu).
Hattorianus *Koidz. l. c.* 22.—Japon.
Hindsii (*Munro*) *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1933, ix. 236: Arundinaria Hindsii.
hodensis *Makino in Hyogoken-Hakubutsu-Gakkaishi*, No. 4, p. 11 (1932); *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 68.—Japon.
humilis (*Mitford*) *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 2: Arundinaria humilis *Mitford, Bamboo Garden*, 103 (1896).
igaënsis *Nakai, l. c.* 1933, ix. 229.—Japon. (Hondo).
inversus *Nakai, l. c.* 1935, xi. 5.—Japon.
Koidzumii *Makino ex Tashiro in Fukuokaken-Seibutsu-Mokuroku*, 31 (1933), nomen; *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 16, in syn.: Sasaëlla Koidzumii.
Kurokawai *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 810.—Japon.
lanatus *Nakai in Rika Kyô-iku* xv. No. 6, 69 (1932), nomen; *et in Journ. Jap. Bot.* 1933, ix. 166, 168, descr.—Japon. (Kiushiu).
lasiochlamys *Nakai, l. c.*, nomen; *et l. c.* 164, 166, descr.—Japon. (Hondo).
latichino *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 84.—Japon.
lentigiosus *Koidz. l. c.*—Japon.
leucorhodus *Koidz. l. c.* 1934, iii. 15.—Japon. (Hondo).
longaevus *Koidz. l. c.* 1935, iv. 164.—Japon. (Hondo).
longifolius *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 7.—Japon.
Matsunoi *Nakai*; *Nakai, l. c.* 1934, x. 276, descr.—Japon. (Hondo).
Mayebarae *Nakai, l. c.* 1935, xi. 6.—Japon.
molliculus *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 85.—Japon.
multifolius *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1933, xi. 223.—Japon. (Hondo).
Nabeshimanus *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 15.—Japon. (Kiushiu).
Nagashima (*Hort. ex Mitford*) *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1933, ix. 215: Bambusa Nagashima.
naibunensis (*Hayata*) *Kanehira & Sasaki in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 182: Arundinaria naibunensis.
protrusus *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 165.—Japon. (Hondo).
pseudosimonii *Koidz. l. c.* 85.—Japon.
pubescens *Nakai in Rika Kyô-iku*, xv. No. 6, 70, No. 47 (1932), nomen; *et in Journ. Jap. Bot.* 1933, ix. 219, 221, descr.—Japon.
pumilus (*Mitford*) *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1933, ix. 223: Arundinaria pumila *Mitford, Bamboo Garden*, 98 (1896).

PLEIOBLASTUS:—
purpurascens *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 282.—Japon. (Hondo).
pygmaeus (*Miq.*) *Nakai in Rika Kyô-iku*, xv. No. 6, 70 (1932); cf. *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1933, ix. 234: Bambusa pygmaea.
ramosissimus *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 8.—Japon.
ryokeanus *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 69.—Japon.
sadoënsis *Makino ex Koidz. l. c.* 68.—Japon.
shibuyanus *Makino ex Nakai in Rika Kyô-iku*, xv. No. 6, 70 (1932), nomen; *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 197, descr.—Japon. (Hondo).
Shiwotai *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 85.—Japon.
takiyamensis *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1933, ix. 236, nomen.—Hab.?
tanegasimensis *Makino & Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 15.—Japon. (Kiushiu).
tectus *Koidz. l. c.* 1935, iv. 15, 81.—Japon.
tosaënsis *Koidz. l. c.* 86.—Japon. (Shikoku).
toyokensis *Nakai in Rika Kyô-iku*, xv. No. 6, 70 (1932), nomen; *et in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 213, descr.—Japon. (Hondo).
tsukubensis *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 215.—Japon. (Hondo).
usuiensis *Nakai, l. c.* 1935, xi. 7.—Japon.
uyenoënsis *Nakai, l. c.* 811.—Japon.
vaginatus (*Hackel*) *Nakai, l. c.* 1933, ix. 236: Arundinaria vaginata.
xestophyllus *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 165.—Japon. (Hondo).
xystrophyllus *Koidz. l. c.*—Japon. (Hondo).
yakusimensis *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 199.—Japon. (Kiushiu).
yasuokensis *Nakai, l. c.* 1935, xi. 9.—Japon.
zygomeris *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 166.—Japon. (Hondo).

PLEIOCARDIA Greene (Crucif.).
viminea (*Greene*) *O. E. Schulz in Engl. Jahrb.* lxvi. 98 (1933): Mesoreanthus vimineus.

PLEIOCARPA Benth. (Apocynac.).
Simii (*Stapf*) *Stapf ex Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 37, in clavi, 38 (1931): Polyadoa Simii.

PLEIOGYNIUM Engl. (Anacardiac.).
papuanum *C. T. White in Proc. Roy. Soc. N. S. Wales*, 1933, xlv. 27 (1934).—N. Guin.

PLEIONE D. Don (Orchidac.).
Chunii *Tso in Sunyatsenia*, i. 148 (1933).—China (Kwangtung).
communis *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 25.—Tibet; China (Yunnan).
Fargesii *Gagnep. l. c.* 26.—China (Szechuan; Fokien?).
ganchuenensis *Gagnep. l. c.*—China (Kweichau).
laotica *Kerr in Journ. Siam. Soc., Nat. Hist. Suppl.*, ix. 235 (1933).—Indo-China (Laos).

PLEIOSEPALUM C. E. Moss in Journ. Bot. 1931, lxix. 65. *CARYOPHYLLACEAE.*
mosambicinum *C. E. Moss, l. c.*—Afr. austr. (Delagoa Bay).

PLEIOSPILOS N. E. Brown (Ficoidac.).
Archerii *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 276 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Barbarae *Hort. ex Karrer in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1932, xlvii. 99.—Afr. austr.
borealis *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 288 (1931).—Orange Free State.
brevisepalus *L. Bolus, l. c.* 255.—Afr. austr. (Cape Prov.).
clavatus *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 454 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
dimidiatus *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 257 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
grandiflorus *L. Bolus, l. c.* 255.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Hilmarii *L. Bolus, l. c.* 253.—Afr. austr. (Cape Prov.).
latipetalus *L. Bolus, l. c.* 277.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Leipoldtii *L. Bolus, l. c.* 278.—Afr. austr. (Cape Prov.).

PLEIOSPILOS:—
Loganii *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 453 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
longibracteatus *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 258 (1931).—Hab.?
minor *L. Bolus, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).
Peersii *L. Bolus, l. c.* 278.—Afr. austr. (Cape Prov.).
×Rothii *Hort. ex Jacobsen, Sukkulent.* 171 (1933).—Hort.
willowmorensis *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 256 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).

PLEIOSTACHYOPIPER Trelease in Proc. Am. Phil. Soc. 1934, lxxiii. 328. *PIPERACEAE.*
nudilimbum (*C. DC.*) *Trelease, l. c.* 329: Piper nudilimbum.

PLEOMELE Salisb. (Liliac.).
cochinchinensis *Merrill ex Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 287, in syn.: Dracaena Loureiri.
Forbesii *Degener, Fl. Hawaiiensis*, Fam. 68 (1932).—Ins. Sandvic. (Oahu).

PLEONOTOMA Miers (Bignoniac.).
echitidea *Sprague & Sandwith in Kew Bull.* 1934, 102.—Guiana Brit.
pavettiflora *Sandwith, l. c.* 103.—Bras. (Matto Grosso).

PLETTKEA Mattf. in Schrift. Ver. Naturk. Unterweser, n. s. vii. reimpr. p. 13 (1934); et in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, xvi c. 365 (1934). *CARYOPHYLLACEAE.*
cryptantha *Mattf. l. c.* reimpr. p. 15; *et l. c.*—Peruv.
macrophylla (*Muschl.*) *Mattf. l. c.* reimpr. p. 18; *et l. c.*: Pycnophyllum macrophyllum.
tetrasticha *Mattf. l. c.* reimpr. p. 21; *et l. c.*—Peruv.
Weberbaueri (*Muschl.*) *Mattf. l. c.* reimpr. p. 19; *et l. c.*: Pycnophyllum Weberbaueri.

PLEURISANTHES Baill. (Icacinac.).
flava *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 467.—Guiana Brit.

PLEUROPHRAGMA Rydb. (Crucif.).
lilacinum (*Greene*) *Rydb. in Brittonia*, i. 89 (1931): Thelypodium lilacinum.
rhomboideum (*Greene*) *O. E. Schulz in Engl. Jahrb.* lxvi. 98 (1933): Thelypodium rhomboideum.

PLEUROPTEROPYRUM H. Gross (Polygonac.).
ajanense *Nakai, Rep. Veg. Mt. Daisetsusan*, 46, 63 (1930); *Miyabe & Kudo in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 512 (1934).—Sakhalin; Yezo.
Nakaii *Hara in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 231.—Japon.
sibiricum (*Laxm.*) *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 94: Polygonum sibiricum.

PLEUROPTERUS Turcz. (Polygonac.).
cuspidatus (*Sieb. & Zucc.*) *H. Gross in Beih. Bot. Centralbl.* xxxvii. II. 114 (1919): Polygonum cuspidatum.
hypoleucus *Nakai in Rigakukai*, xxiv. 6; cf. *Kudo & Sasaki in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard.* 1931, i. 26.—Hab.?
sachalinensis (*F. Schmidt*) *Moldenke in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 57 (1932): Polygonum sachalinensis.

PLEUROSPERMUM Hoffm. (Umbellif.).
Handelii *H. Wolff in Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 710 (1933).—China (Yunnan).

PLEUROSTACHYS Brongn. (Cyperac.).
Bradei *R. Gross in Fedde, Repert.* xxix. 245 (1931).—Bras. (Rio de Janeiro).
paludosus *H. Pfeiff. ex Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste Braz.* iii. 130 (1923) [*Insp. Fed. Obras Secc.* Publ. 57], nomen; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 151.—Bras. (Rio de Janeiro).

PLEUROSTYLIA Wight & Arn. (Celastrac.).
opposita (*Wall. ex Carey*) *Alston in Trimen, Handbook Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 48 (1931): Celastrus oppositus.

PLEUROTHALLIS R. Br. (Orchidac.).
albo-rosea (*Kraenzl.*) *C. Porto & Brade in Rodriguesia*, i. No. 2, 47 (1935): Octomeria albo-rosea.
barboselloides *Hoehne in Bol. Agric., S. Paulo*, 1933, xxxiv. 611 (1934).—Bras. (S. Paulo).

PLEUROTHALLIS:—
Bradeorum (*Schlechter*) *Ames, F. T. Hubbard & C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* iii. 39 (1934): Barbosella Bradeorum.
breviscapa *C. Schweinf. l. c.* iii. 79 (1935).—Guiana Brit.
cruciformis *Ames, F. T. Hubbard & C. Schweinf. l. c.* iii. 39 (1934): Restrepia Reichenbachiana.
curitybensis *Schlechter ex Mansf. in Fedde, Repert. Beih.* lviii. 6 (1930): P. ciliolata.
diffusiflora *C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* iii. 80 (1935).—Guiana Brit.
geminiflora *Ames, F. T. Hubbard & C. Schweinf. l. c.* iii. 39 (1934): P. biflora *Schlechter*.
imbeana *Brade in Arch. Mus. Nac. Rio de Janeiro*, 1932, xxxiv. 116.—Bras. (Rio de Janeiro).
integrilabia *Ames, F. T. Hubbard & C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* iii. 39 (1934): P. dryadum *Schlechter* (1923).
Lewisac *Ames in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1931, xliv. 42.—Guatem.; Honduras.
lichenophila *C. Porto & Brade in Arquiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, i. 221 (1935).—Bras. (Rio de Janeiro).
minima *C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* iii. 82 (1935).—Guiana Brit.
modesta *Cogn.*; *Hoehne in Bol. Agric., S. Paulo*, 1933, xxxiv. 607 (1934), descr. emend.—Bras. (Rio de Janeiro).
organensis *A. J. Sampaio, List. Orch. Herv. Mus. Nac., Rio de Janeiro*, 30 (1923), nomen.—Bras. (Rio de Janeiro).
oscitans *Ames in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* ii. 25 (1934).—Honduras.
pertenuis *C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* iii. 83 (1935).—Guiana Brit.
prorepens (*Reichb. f.*) *Ames, F. T. Hubbard & C. Schweinf. l. c.* iii. 39 (1934): Restrepia prorepens.
pygmaea *Hoehne in Bol. Agric., S. Paulo*, 1933, xxxiv. 604 (1934).—Bras. (S. Paulo).
rubrolineata *Hoehne, l. c.* 609.—Bras. (S. Paulo).
stictophylla *Schlechter*; *Hoehne, l. c.* 608, descr. emend.—Bras. (Paraná).
versicolor *Hoehne, l. c.* 606.—Bras. (S. Paulo).
yucatanensis *Ames & C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* i. No. 2, 4 (1932).—Mexico.

PLEUROTHYRIUM Nees (Laurac.).
densiflorum *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 109.—Peruv.
Krukovii *A. C. Smith in Phytologia*, i. 121 (1935).—Bras. (Amaz.).
nobile *A. C. Smith, l. c.* 120.—Bras. (Amaz.).
Williamsii *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxxi. 189 (1933).—Peruv.

PLICOSEPALUS Van Tiegh. (Loranthac.).
Acaciae-detinentis (*Dinter*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 100 (1933): Loranthus Acaciae-detinentis.
kalachariensis (*Schinz*) *Danser, l. c.*: Loranthus kalachariensis.
sagittifolius (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus sagittifolius.

PLINIA L. (Myrtac.).
Baileyi *R. O. Williams ex R. C. Marsh. Trees Trinidad & Tobago*, 60 (1934).—Trinidad; Tobago.
caricensis *Urb.*; *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 20 (1932), descr. ampl.—Haiti.
montecristina *Urb. & Ekman, l. c.* 19.—Santo Domingo.

PLOCA Lour. ex Gomes in Mem. Acad. Sc. Lisb. Cl. Sc. Pol. Mor. Bel.-Let. n. s. iv. (1), 30 (1868); Merrill in Trans. Am. Phil. Soc. n. s. xxiv. II. 18, 204 (1935), in syn.: **Lourea** Necker (Legumin.).
amentacea *Lour. ex Gomes, l. c.* (1), 27; *Merrill, l. c.* 15, nomen, quid?—Cochinch.
humilis *Lour. ex Gomes, l. c.* (1), 30; *Merrill, l. c.* 18, 204, in syn.: Lourea obcordata.

PLOCOGLOTTIS Blume (Orchidac.).
gigantea (*Hook. f.*) *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxxii. 228 (1933): Calanthe gigantea.
lacuum *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 16 (1935).—N. Guin.

PLOTTZIA Arn. (Caryophyllac.).
cymosa *G. Sampaio ex Pereira in An. Fac. Sc. Porto*, xvii. 155 (1932), nomen.—Lusitan.
Paronychia *G. Sampaio ex Pereira, l. c.*, nomen.—Lusitan.

PLUCHEA Cass. (Compos.).
monocephala *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1935, 280.—Tanganyika Terr.
polygonata (*DC.*) *Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 524 (1924): Inula polygonata.
pteroclada *Chiov. Fl. Somala*, II. 261 (1932).—Somal. Ital.
tenuifolia *Small, Man. Southeast. Fl.* 1399 (1933).—U.S.A. (S. E. States).

PLUKENETIA L. (Euphorbiac.).
abutifolia (*Ducke*) *Pax & K. Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix c. 141 (1931): Elaeophora abutifolia.

PLUMBAGO L. (Plumbaginac.).
montis-elgonis *Bullock in Kew Bull.* 1932, 501.—Afr. trop. or. (Elgon).
spinosa *Hao in Fedde, Repert.* xxxvi. 222 (1934); *et in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, iii. 2 (1935).—Tibet.

PLUMERIA L. (Apocynac.).
tarapotensis *K. Schum.*; *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 339 (1932), descr.—Bras. (Amaz.); Peruv.; Boliv.

POA L. (Gramin.).
acuminata *Ovczinn. in Bull. Tadjik. Acad. Sc.* i. 1. 25 (1933); cf. *Komarov, Fl. URSS*, ii. 416 (1934), non seq.—As. centr.
acuminata *Scribn. ex Beal, Grasses N. Amer.* ii. 538 (1896).—U.S.A. (Montana).
angustiglumis *Roshev. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 773 (1932).—Sibir. (Amur; Transbaikal.).
antarctica (*Hook. f.*) *Stapf in Hook. Ic. Pl.* sub t. 2607 (1899), in obs.: Triodia antarctica.
argunensis *Roshev. ex Komarov, Fl. URSS*, ii. 404 (1934).—Sibir. or.
badachschanica *Ovczinn. in Sovietsk. Bot.* 1935, No. 5, 154, in obs.—As. centr.
bakuensis *Litw. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 383, 753 (1934).—Caucas.
Barrosiana *Parodi in Physis*, xi. 134 (1932).—Argent.
bedeliensis *Litw. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 415, 755 (1934).—Turkestan. (Thian Shan).
Bradei *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 689 (1935).—Bras. (Rio de Janeiro; S. Paulo).
Brandegei *Scribn. in Beal, Grasses N. Amer.* ii. 544 (1896).—U.S.A. (Colorado).
× breazensis *Nyár. in Veröff. Geobot. Inst. Rübel*, x. 173 (1933).—Carpath.
cacuminum *Nannf. in Symb. Bot. Upsal.* No. 5 (*Taxonom. & Pl.-Geogr. Stud. Poa laxa Group*) 55 (1935), in syn.: P. flexuosa *Sm.*
calliopsis *Litw. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 414, 755 (1934).—Pamir.
chosenensis *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 59.—Corea.
ciliata *Roxb. Hort. Beng.* 82 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 336 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 334 (1832).—Ind. or.
contracta *Nyár. in Bul. Grăd. & Muz. Bot. Univ. Cluj*, 1931, xi. 39, in obs.—Ruman.
custurae *Nyár. in Veröff. Geobot. Inst. Rübel*, x. 180 (1933).—Carpath.
cylindrica *Roxb. Hort. Beng.* 8 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 335 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 334 (1832).—China.
dalavarica *Biroli ex Colla, Herb. Pedem.* vi. 58 (1836), in obs.—Ital.?
densissima *Roshev. in Bull. Tadjik. Acad. Sc.* i. 1. 26 (1933); cf. *Komarov, Fl. URSS*, ii. 418 (1934).—As. centr.
deschampsioides *Ohwi in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 195.—Corea.
diandra *Roxb. Hort. Beng.* 8 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 337 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 336 (1832).—Ind. or. (Bengal).
dovrensis *Godet ex Nannf. in Symb. Bot. Upsal.* No. 5 (*Taxonom. & Pl.-Geogr. Stud. Poa laxa Group*) 55 (1935), in syn.: P. flexuosa *Sm.*

POA:—
dschungarica *Roshev. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 778 (1932).—As. centr.
dshilgensis *Roshev. ex Komarov, Fl. URSS*, ii. 377 (1934).—Ross. asiat. (Kasakstan).
elegans *Roxb. Hort. Beng.* 82 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 339 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 338 (1832).—Ind. or.
epileuca (*Stapf*) *Stapf in Hook. Ic. Pl.* sub t. 2607 (1899), in obs.: Deyeuxia epileuca.
Fedtschenkoi *Roshev. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 297 (1932).—Turkestan. (Thian Shan).
Fernaldiana *Nannf. in Symb. Bot. Upsal.* No. 5 (*Taxonom. & Pl.-Geogr. Stud. Poa laxa Group*) 50, 55 (1935).—Quebec; Newfoundland; U.S.A. (N. E. States).
flexuosa *Roxb. Hort. Beng.* 82 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 340 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 339 (1832).—Ind. or.
formosae *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 41 (1934).—Formosa.
Ganeschini *Roshev. ex Komarov, Fl. URSS*, ii. 398 (1934).—Ross. bor.
gangetica *Roxb. Hort. Beng.* 8 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 341 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 340 (1832).—Ind. or.
glabriflora *Roshev. ex Komarov, Fl. URSS*, ii. 376 (1934).—Ross. asiat. (Kasakstan).
glacialis *Pall. ex Colla, Herb. Pedem.* vi. 58 (1836).—Ital.?
glauciculmis *Ovczinn. in Bull. Tadjik. Acad. Sc.* i. 1. 19 (1933); cf. *Komarov, Fl. URSS*, ii. 402 (1934).—As. centr.
Gorbunovii *Ovczinn. ex Komarov, l. c.* 417.—Ross. asiat. (Tadjikistan).
haemi *F. Hermann*; *F. Hermann in Fedde, Repert.* xxx. 251 (1932), descr. emend.—Bulgar.
Hartzii *Gandoger*; *Sørensen in Meddel. Grønland*, ci. No. 3, 145 (1933), descr. emend.—Groenlandia.
Hauptiana *Trin. ex Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 485 (1934), in syn.: Atropis Hauptiana.
hissarica *Roshev. ex Komarov, l. c.* 416.—As. centr.
idahoënsis *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 539 (1896): P. filifolia *Vasey*.
insignis *Litw. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 384, 753 (1934).—Caucas.
insolita *Nyár. in Veröff. Geobot. Inst. Rübel*, x. 181 (1933).—Carpath.
interrupta *Lam.*; *Koen. ex Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 336 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 335 (1832).—Ind. or.
Iwateana *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 60.—Japon. (Hondo).
kamtschatica *Fisch. ex Komarov, Fl. URSS*, ii. 397 (1934), in syn.: P. palustris.
karateginensis *Roshev. ex Komarov, l. c.* 416.—As. centr.
kelungensis *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 60.—Formosa.
ketoiensis *Tatewaki & Ohwi, l. c.* 61.—Ins. Kuril.
Kumgansani *Ohwi, l. c.* 62.—Corea.
laevis *Vasey in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. 273 (1893).—Am. bor.-occ.
lanatiflora *Roshev. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 303 (1932).—Sibir. (Yakutsk).
laudanensis *Roshev. ex Komarov, Fl. URSS*, ii. 418 (1934).—As. centr.
lepusnica *Nyár. in Veröff. Geobot. Inst. Rübel*, x. 180 (1933).—Carpath.
Lipskyi *Roshev. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 303 (1932).—Turkestan.
Litwinowiana *Ovczinn. in Bull. Tadjik. Acad. Sc.* i. 1. 22 (1933); cf. *Komarov, Fl. URSS*, ii. 417 (1934).—As. centr.
marginata *Ovczinn. l. c.* 24; cf. *Komarov, l. c.*—As. centr.
Mariae *Reverd. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1933, Nos. 3–4, p. 2.—Mongol.
mataniae *Nyár. in Veröff. Geobot. Inst. Rübel*, x. 181 (1933).—Carpath.
Maydelli *Roshev. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 774 (1932).—Sibir. (Irkutsk).
Meyeri *Trin. ex Roshev. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 383, 753 (1934).—Caucas.

POA:—
multiflora *Roxb. Hort. Beng.* 8 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 340 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 338 (1832).—Ind. or.
naltchikensis *Roshev. ex Komarov, Fl. URSS*, ii. 413 (1934).—Reg. Caucas.
nankoënsis *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 165.—Formosa.
Nevskii *Roshev. ex Komarov, Fl. URSS*, ii. 377 (1934).—As. centr.
Nyaradyana *Nannf. in Symb. Bot. Upsal.* No. 5 (*Taxonom. & Pl.-Geogr. Stud. Poa laxa Group*) 54 (1935): P. pruinosa *Nyár.*
Overi *Rydb. in Brittonia*, i. 84 (1931).—U.S.A. (S. Dakota).
pamirica *Roshev. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 414, 755 (1934).—Pamir.
paniculata *Roxb. Hort. Beng.* 82 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 341 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 340 (1832).—Ind. or.
Paui *Font Quer, Iter Marocc.* 1928, No. 34 [1929].—Marocc.
perligulata *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 779 (1933).—Boliv.
petraea *Trin. ex Komarov, Fl. Kamtsch.* i. 173 (1927).—Kamtchatka.
petschorica *Roshev. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 775 (1932).—Ross. arct.
pinegensis (*Roshev.*) *Roshev. l. c.*: P. pratensis var. pinegensis.
plattensis *Rydb. in Brittonia*, i. 84 (1931).—U.S.A. (Nebraska).
procera *Roxb. Hort. Beng.* 82 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 334 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 332 (1832).—Ind. or.
pruinosa (*Nyár.*) *Nyár. in Bul. Grăd. & Muz. Bot. Univ. Cluj*, 1931, xi. 7: P. laxa subsp. pruinosa.
queenslandica *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 449.—Austral. (Queensland).
relaxa *Ovczinn. in Bull. Tadjik. Acad. Sc.* i. 1. 20 (1933); cf. *Komarov, Fl. URSS*, ii. 402 (1934).—Hab.?
Reverdattoi *Roshev. ex Komarov, Fl. URSS*, ii. 407 (1934).—Sibir. centr.
rhomboidea *Roshev. in Komarov, l. c.* 409, 754.—Caucas.
rigidula *Simonk. ex Nannf. in Symb. Bot. Upsal.* No. 5 (*Taxonom. & Pl.-Geogr. Stud. Poa laxa Group*) 54 (1935), in syn.: P. Nyaradyana.
ruida *Litw. ex Komarov, Fl. URSS*, ii. 417 (1934), in syn.: P. Litwinowiana.
× sabauda *Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1930–1, Sér. II. xxiii. 133 (1931), in obs.—Gallia.
sajanensis *Roshev. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 776 (1932).—Sibir. (Irkutsk).
Schliebenii *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 384 (1935): P. annua var. hypsophila *Pilger*.
seorsa *Litw. ex Komarov, Fl. URSS*, ii. 417 (1934), in syn.: P. Litwinowiana.
shinanoana *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 31.—Japon. (Hondo).
shumushuensis *Ohwi, l. c.* 1935, iv. 62.—Ins. Kuril.
Soczawae *Roshev. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 298 (1932).—Sibir. bor.-or.
stepposa (*Krylov*) *Roshev. in B. Fedtsch. & al., Fl. Turkm.* i. 145 (1932); *et in Komarov, Fl. URSS*, ii. 401, 754 (1934): P. attenuata var. stepposa.
Stuckertii (*Hackel*) *Parodi in Physis*, xi. 137 (1932): P. lanigera var. Stuckertii.
subglabriflora (*Roshev.*) *Roshev. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 777 (1932): P. pratensis var. subglabriflora.
sublanata *Reverd. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1934, Nos. 2–3, p. 1.—Sibir.
Sugawarae *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 63.—Sakhalin.
Suksdorfi *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 574 (1896), in syn.: Atropis Suksdorfi.
taimyrensis *Roshev. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 299 (1932).—Sibir. bor.
takasagomontana *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 41 (1934).—Formosa.
Tanfiljewi *Roshev. ex Komarov, Fl. URSS*, ii. 413 (1934).—Ross. bor.
tenuicula *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 42 (1934).—Formosa.

POA:—
tibetica *Munro ex Stapf in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 339 (1896).—Tibet.
Tolmatchewi *Roshev. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 299 (1932).—Sibir. bor.
tremuloides *Litw. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 421, 756 (1934).—Pamir.
urjanchaica *Roshev. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 777 (1932).—Mongol.
ussuriensis *Roshev. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 394, 754 (1934).—As. or.
Vaseyana *Scribn. ex Beal, Grasses N. Amer.* ii. 532 (1896).—U.S.A. (Colorado).
Woronowii *Roshev. ex Komarov, Fl. URSS*, ii. 387 (1934).—Transcaucas.
yezo-montana *Honda in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 164 (1931).—Japon. (Yezo).
Zaprjagajevi *Ovczinn. in Bull. Tadjik. Acad. Sc.* i. 1. 14 (1933); cf. *Komarov, Fl. URSS*, ii. 377 (1934).—As. centr.

POACYNUM Baill. (Apocynac.).
grandiflorum *Danguy in Lecomte, Not. Syst.* ii. 136 (1911), in obs., pro syn.: Apocynum grandiflorum.

POAEPHYLLUM Ridley (Orchidac.).
selebicum *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxv. 484 (1933).—Celebes.
trilobum *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 35 (1935).—N. Guin.

PODALYRIA Lam. (Legumin.).
chrysantha *Adamson in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 21. —Afr. austr. (Cape Prov.).
Tayloriana *L. Bolus in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 22. —Afr. austr. (Cape Prov.).

PODANTHUM Boiss. (Campanulac.).
Kellererianum *Stefanoff in Stoyanoff & Stefanoff, Fl. Bulg.* ed. 2, 984 (1933), in clavi.—Bulgar.

PODOCARPUS L'Hérit. (Taxac.; Conif., Gen. Pl.).
Buchii *Urb.*; *Florin in Arkiv Bot., Stockh.* xxv. A. No. 5, p. 2 (1933), descr. ampl.—Hispaniola.
dispermus *C. T. White in Contrib. Arn. Arb.* No. iv. 10 (1933).—Austral. (Queensland).
littoralis *Hort. ex Biswas in Journ. & Proc. As. Soc. Beng.* 1932, n. s. xxviii. 374 (1933), nomen.—Hab.?
×Loderi *Cockayne in Rep. Conif. Conf. R.H.S. 1931 (Conif. in Cult.)* 161 (1932), in obs.—N. Zel.
pinetorum *H. H. Bartlett in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 21 (1935), in adnot.—Brit. Honduras.
ulugurensis *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 82 (1934).—Tanganyika Terr.

PODOCHILUS Blume (Orchidac.).
lobatipetalus *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxv. 477 (1933).—Celebes.
mentawaiensis *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 118 (1932).—Ins. Mentawi.
Steinii *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 177 (1934). —N. Guin.
uniflorus *J. J. Smith in Brittonia*, i. 109 (1931).—Borneo.

PODOCOMA Cass. (Compos.).
asperrima *Dusén ex Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 63 (1933).—Bras. (S. Catharina).
foliosa *Malme, l. c.* 64.—Bras. (Paraná).
macrocephala (*Less.*) *Herter, Fl. Urug. Pl. Vasc. (Estud. Bot. Reg. Urug.* iv.) 123 (1931): Asteropsis macrocephala.
Spegazzinii *Cabrera in Not. Prelim. Mus. La Plata*, i. 327 (1931).—Argent.

PODOLEPIS Labill. (Compos.).
angustifolia *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 537 (1894), in syn.: P. gracilis.
jaceoides (*Sims*) *Voss in Vilmorin, l. c.* 536, in obs.: Scalia jaceoides.

PODOLOTUS Royle ex Benth. in Royle, Ill. Bot. Himal. 198 (April 1835). *LEGUMINOSAE.*

PODONEPHELIUM Baill. (Sapindac.).
Balansae *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 337.—N. Caled.

PODOPHYLLUM L. (Berberidac.).
hispidum *Hao in Fedde, Repert.* xxxvi. 223 (1934); *et in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, iii. 2 (1935).—China (Kwangsi).

PODOSPERMA Labill. (Compos.).
pygmaeum (*A. Gray*) *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 134 (1931): Podotheca pygmaea.

PODOSPERMUM DC. (Compos.).
lachnostegium *Woronow in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 223 (1933).—Caucas.
persepolitanum (*Boiss.*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 235 (1934): Scorzonera persepolitana.
suberosum (*C. Koch*) *Lipschitz in Fedde, Repert.* xxxiii. 168 (1933): Scorzonera suberosa.

POECILANTHE Benth. (Legumin.).
amazonica (*Ducke*) *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 734: Cyclolobium amazonicum.
effusa (*Huber*) *Ducke, l. c.* 733: Amphiodon effusus.

POECILOSTACHYS Hackel (Gramin.).
Bakeri (*Schinz*) *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1935, 307: Oplismenus Bakeri.
festucaceus (*Mez*) *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1930, lxxvii. 641 (1931): Oplismenus festucaceus.

POGGEA Gürke (Flacourtiac.).
Klaineana *Pierre ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 563 (1921), in obs.—Gabon.
ovata *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 475 (1935).—Tanganyika Terr.

POGOGYNE Benth. (Labiat.).
Abramsi *Howell in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 119 (1931).—U.S.A. (Calif.).

POGONANTHERA Blume (Melastomatac.).
latifolia *Schwartz in Mitt. Inst. Bot. Hamburg*, vii. 252 (1931).—Borneo.

POGONARTHRIA Stapf (Gramin.).
Brainii *Stent in Kew Bull.* 1932, 325.—S. Rhodesia.
Fleckii (*Hackel*) *Hackel in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, lvii. 532 (1912), in obs.: Diplachne Fleckii.
Menyharthii (*Hackel*) *Hackel, l. c.*, in obs.: Diplachne Menyharthii.

POGONIA Juss. (Orchidac.).
Kungii *Tang & Wang in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, ii. 135 (1934).—Manchur.

POGOSTEMON Desf. (Labiat.).
micangensis *G. Taylor in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl. 2, 166.—Angola.
Mutamba (*Hiern*) *G. Taylor, l. c.*: Geniosporum Mutamba.
Williamsii *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3197 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).

POIKILOSPERMUM Zipp. (Urticac.).
acuminatum (*Tréc.*) *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. viii. 48 (1934): Conocephalus acuminatus.
amethystinum (*H. Winkler*) *Merrill, l. c.*: Conocephalus amethystinus.
amoenum (*King*) *Merrill, l. c.*: Conocephalus amoenus.
annamense (*Gagnep.*) *Merrill, l. c.* 49: Conocephalus annamensis.
azureum (*Teijsm. & Binn.*) *Merrill, l. c.*: Conocephalus azureus.
borneënse (*Miq.*) *Merrill, l. c.*: Conocephalus borneënsis.
cordifolium (*Barg.-Petr.*) *Merrill, l. c.*: Conocephalus cordifolius.
diffusum (*Merrill*) *Merrill, l. c.*: Conocephalus diffusus.
dubium (*Barg.-Petr.*) *Merrill, l. c.*: Conocephalus dubius.
erectum (*Blanco*) *Merrill, l. c.*: Procris erecta.
Forbesii (*S. Moore*) *Merrill, l. c.*: Conocephalus Forbesii.
Gagnepainii *Merrill, l. c.* 50: Conocephalus mollis *Gagnep.*
Gjellerupii (*H. Winkler*) *Merrill, l. c.*: Conocephalus Gjellerupii.
grande (*Wedd.*) *Merrill, l. c.*: Procris grandis.
grandifolium (*Warb.*) *Merrill, l. c.*: Conocephalus grandifolius.

POIKILOSPERMUM:—
hirsutum (*H. Winkler*) *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. viii. 50 (1934): Conocephalus hirsutus.
intermedium (*Barg.-Petr.*) *Merrill, l. c.*: Conocephalus intermedius.
lanceolatum (*Tréc.*) *Merrill, l. c.*: Conocephalus lanceolatus.
micranthum (*Miq.*) *Merrill, l. c.*: Conocephalus micranthus.
microstachys (*Barg.-Petr.*) *Merrill, l. c.*: Conocephalus microstachys.
molle (*Merrill*) *Merrill, l. c.* 51: Conocephalus mollis.
nobile (*Ridley*) *Merrill, l. c.*: Conocephalus nobilis.
oblanceolatum (*Ridley*) *Merrill, l. c.*: Conocephalus oblanceolatus.
oblongifolium (*Barg.-Petr.*) *Merrill, l. c.*: Conocephalus oblongifolius.
Paxianum (*H. Winkler*) *Merrill, l. c.*: Conocephalus Paxianus.
peltatum (*H. Winkler*) *Merrill, l. c.*: Conocephalus peltatus.
Piperi (*Elmer*) *Merrill, l. c.*: Conocephalus Piperi.
scabrinervium (*Barg.-Petr.*) *Merrill, l. c.*: Conocephalus scabrinervius.
Scortechinii (*King*) *Merrill, l. c.*: Conocephalus Scortechinii.
sinense (*C. H. Wright*) *Merrill, l. c.*: Conocephalus sinensis.
singalense (*Barg.-Petr.*) *Merrill, l. c.*: Conocephalus singalensis.
suaveolens (*Blume*) *Merrill, l. c.* 47: Conocephalus suaveolens.
subscaber (*H. Winkler*) *Merrill, l. c.* 52: Conocephalus subscaber.
tonkinense (*Drake*) *Merrill, l. c.*: Balansaephytum tonkinense.
Warburgii (*Elmer*) *Merrill, l. c.*: Conocephalus Warburgii.

POLEMANNIA Eckl. & Zeyh. (Umbellif.).
Marlothii *H. Wolff ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 816 (1921), in obs.—Afr. austr. (Cape Prov.).

POLEMONIUM L. (Polemoniac.).
×Jacobae *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 419 (1924).—Hort.

POLIOPHYTON O. E. Schulz in Engl. Jahrb. lxvi. 93 (1933). *CRUCIFERAE.*
pubens (*A. Gray*) *O. E. Schulz, l. c.* 94, in obs.: Hymenolobus pubens.

POLIUM Stokes, Bot. Mat. Med. i. 476 (1812): **Polia** Lour. (Caryophyllac.).
arenarium (*Lour.*) *Stokes, l. c.* 477: Polia arenaria.

POLLIA Thunb. (Commelinac.).
minor (*Hayata*) *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 2: P. japonica var. minor.

POLLINIDIUM Stapf ex Haines (Gramin.).
binatum (*Retz.*) *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1932, 72: Andropogon binatus.

POLYACHYRUS Lag. (Compos.).
nesites *I. M. Johnston in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcv. 35 (1931).—Peruv. (Ins. San Gallan).

POLYALTHIA Blume (Annonac.).
amygdalina (*A. Gray*) *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 83, 4 (1931): Uvaria amygdalina.
Laui *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 5 (1935).—China (Hainan).
lopadantha *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 81 (1931).—Borneo.
loriformis *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 83, 4 (1931).—Ins. Viti.
Merrillii *Kanehira, Fl. Micrones.* 108 (1933), japonice; *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 669, latine.—Ins. Palau.
oligogyna *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 27 (1934).—China (Hainan).
polyphlebia *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 81 (1931).—Borneo.
sarawakensis *Diels, l. c.* 80.—Borneo.

POLYCARDIA Juss. (Celastrac.).
ilicifolia *Loes. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 33 (1934).—Madag.
oblanceolata *Loes. l. c.* 34.—Madag.
oblonga *Loes. l. c.* 33.—Madag.

POLYCARPAEA Lam. (Caryophyllac.).
akkensis (*Coss.*) *Pax; Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 281; *et l. c.* 1932, xxiii. 171, cum descr.: Spergularia akkensis.

POLYCEPHALIUM Engl. (Icacinac.).
Mildbraedii *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 263 (1921), in obs.—Cameroons.

POLYCERATOCARPUS Engl. & Diels (Annonac.).
Vermoesenii *Robyns & Ghesquière in Ann. Soc. Sc. Brux.* liii. Sér. B, 62 (1933).—Congo Belg.

POLYCHROA Lour. (Urticac.).
javanica (*Wedd.*) *Burkill in Kew Bull.* 1935, 319; *Burkill, Dict. Econ. Prod. Mal. Penins.* ii. 1789 (1935): Pellionia javanica.
platyphylla *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3240 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
radicans (*Wedd.*); cf. *Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 220, japonice: Pellionia radicans.
rostrata (*Reinw. ex Blume*) *v. Steenis in Arch. Hydrobiol.*, Suppl.-Band, xi. 300 (1932): Procris rostrata.
urdanetensis *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3241 (1934).—Ins. Philipp. (Mindanao).

POLYCLINE Oliv. (Compos.).
lobata (*Klatt*) *Chiov. in Atti Primo Congr. Stud. Colon. Firenze* (*Veg. Ut. Med. Indig. Eritrea Somalia*) (1931); cf. *Chiov. Fl. Somala*, II. 263 (1932): Blepharispermum lobatum.

POLYCNEMUM L. (Chenopodiac.).
maroccanum (*Murb.*) *Murb.*; *Pau in Font Quer, Iter Marocc.* 1930, No. 167 [1932]: P. Fontanesii subsp. maroccanum.

POLYCODIUM Rafin. (Ericac.; Vacciniac., Gen. Pl.).
arcuatum *Ashe in Journ. E. Mitchell Sc. Soc.* xlvi. 207 (1931).—U.S.A. (Louisiana; Mississippi).
arenicola *Ashe, l. c.* 212.—U.S.A. (N. Carolina; S. Carolina).
bellum *Ashe, l. c.* 209.—U.S.A. (S. E. States).
concoloratum *Ashe, l. c.* 204.—U.S.A. (Florida).
glandulosum *Ashe, l. c.* 201.—U.S.A. (Florida).
lautum *Ashe, l. c.* 205.—U.S.A. (Florida).
leptosepalum *Small, Man. Southeast. Fl.* 1012 (1933).—U.S.A. (Mississippi).
macilentum *Small in Torreya*, 1928, xxviii. 5, in obs., nomen; *Small, Man. Southeast. Fl.* 1012 (1933), descr.—U.S.A. (Alabama).
multiflorum *Ashe in Journ. E. Mitchell Sc. Soc.* xlvi. 204 (1931).—U.S.A. (Florida).
parvum *Ashe, l. c.* 211.—U.S.A. (Alabama; Georgia).

POLYGALA L. (Polygalac.).
abbreviata *Markötter in Ann. Univ. Stellenb.* 1930, viii. Sect. A, No. 1, 28.—Natal.
ankaratrensis *H. Perrier in Bull. Acad. Malgache*, 1931, n. s. xiv. 6 (1932): P. mucronata *Baker*.
bicornis *H. Perrier, l. c.* 8.—Madag.
brachyptera (*Hayek*) *Domin in Acta Bot. Bohem.* ix. 252 (1930): P. amara subsp. brachyptera.
compressa *H. Perrier in Bull. Acad. Malgache*, 1931, n. s. xiv. 17 (1932).—Madag.
cretacea *Kotov in Bull. Soc. Nat. Voron.* ii. 39 (1927).—Rossia.
Dewevrei *Exell in Journ. Bot.* 1932, lxx. 186.—Congo Belg.
Font-Queri *Pau ex Font Quer in Cavanillesia*, iv. 91 (1931).—Marocc.
Hasskarlii *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 254 (1935): Chamaebuxus paniculata *Hassk.*, non Polygala paniculata *L.*
heterantha *H. Perrier in Bull. Acad. Malgache*, 1931, n. s. xiv. 20 (1932).—Madag.
Hintonii *Blake in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 31.—Mexico.
hispanica *Sennen in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xv. Ser. Bot. No. 1, 10 (1931).—Hispan.
Homblei *Exell in Journ. Bot.* 1932, lxx. 186.—Congo Belg.
Humbertii *H. Perrier in Bull. Acad. Malgache*, 1931, n. s. xiv. 22 (1932).—Madag.
isaloënsis *H. Perrier, l. c.* 7.—Madag.

POLYGALA:—
kasikensis *Exell in De Wild. & Staner, Contrib. Fl. Katanga*, Suppl. iv. 46 (1932), nomen; *et in Journ. Bot.* 1932, lxx. 168, descr.—Congo Belg.
katangensis *Exell in Journ. Bot.* 1932, lxx. 182.—Congo Belg.
Kinii *Courtois in Mém. Hist. Nat. Emp. Chin.* vi. cahier 1 (*Herb. Mus. Zi-Ka-Wei*) 34 (1920); *Belval in Notes Bot. Chin.* (*Mus. Heude*) No. 2 (*Fl. Reg. Mont. Ngan-Hoei*) 11 (1933).—China (Anhwei).
Koi *Merrill in Sunyatsenia*, i. 196 (1934).—China (Kwangtung).
loanzensis *Exell in Journ. Bot.* 1932, lxx. 187.—Congo Belg.
longeracemosa *H. Perrier in Bull. Acad. Malgache*, 1931, n. s. xiv. 9 (1932).—Madag.
multifurcata *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 708 (1935).—Tanganyika Terr.
oleifera *Hort. ex Backer, Schoolfl. Java*, 79 (1911), in syn.: P. butyracea.
persicarioides *Franch. Pl. Delavay*. 78 (1889), sphalm.: P. persicariifolia.
plagioptera *Linden & Planch.*; *Sprague in Kew Bull.* 1926, 38.—Colomb.
Pretzii *Pennell in Bartonia*, 1931, No. 13, p. 12 (1932).—Am. bor.-or.
pteropoda *H. Perrier in Bull. Acad. Malgache*, 1931, n. s. xiv. 24 (1932).—Madag.
pulcherrima *Kuhlm. in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 83 (1935).—Bras. (Espirito Santo).
rimulicola *Steyerm. in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1932, xix. 390.—U.S.A. (Texas).
rupicola *Hochst. & Steud.*; *A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 36 [1847], descr.—Abyss.
Sennenii *Pau in Font Quer, Iter Marocc.* 1929, No. 293 [1930].—Marocc.
Sennii *Chiov. Fl. Somala*, II. 14 (1932).—Somal. Ital.
Simadai *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1931, iii. 114.—Formosa.
subalata *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. 132 (1891).—Mexico.
subaphylla *H. Perrier in Bull. Acad. Malgache*, 1931, n. s. xiv. 11 (1932).—Madag.
subcarnosa *Schinz in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 145.—Hereroland.
subdioica *H. Perrier in Bull. Acad. Malgache*, 1931, n. s. xiv. 18 (1932).—Madag.
submonoica *H. Perrier, l. c.* 21.—Madag.
Vatkeana *Exell in Journ. Bot.* 1932, lxx. 184: P. Schimperi *Vatke*.
wittebergensis *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 298 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Wittei *Exell in De Wild. & Staner, Contrib. Fl. Katanga*, Suppl. iv. 46 (1932), nomen; *et in Journ. Bot.* 1932, lxx. 181, descr.—Congo Belg.
Youngii *Exell in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 227.—Angola.

POLYGONANTHUS Ducke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xi. 345 (1932). *EUPHORBIACEAE*.
amazonicus *Ducke, l. c.* 346.—Bras. (Amaz.).

POLYGONATUM Mill. (Liliac.).
Desoulavyi *Komarov in Komarov & Klob.-Alis. Key Pl. Far East. Reg. USSR*, i. 378 (1931), in clavi; *et in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 199 (1932), descr.—Sibir.
iyoënse *Nakai ex Maekawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 584.—Japon.
Kawakamii *Miyabe & Kudo in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 340 (1932), in syn.: P. hondoënse.
laoticum *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 288.—Indo-China (Laos).
obtusifolium *Misczenko ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 241 (1928).—Caucas.
ovatum *Misczenko ex Grossheim, l. c.*, in syn.; *Knorring in Komarov, Fl. URSS*, iv. 465 (1935).—Caucas.
Polygonatum (*L.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1069 (1895): Convallaria Polygonatum.
pseudopolyanthemum *Misczenko ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 241 (1928).—Caucas.?
tonkinense *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 288.—Indo-China (Tonkin).

POLYGONUM L. (Polygonac.).
arianum *Grigorj. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 104 (1933).—Ross. asiat. centr.
×bogoriense *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 66 (1932).—Hort.
bucharicum *Grigorj. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 102 (1933).—Ross. asiat. centr.
Bussei *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. 11. Anhang, 19 (1932).—Tanganyika Terr.
coriarium *Grigorj. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 101 (1933).—Ross. asiat. centr.
geniculatum *Bellardi ex Colla, Herb. Pedem.* v. 57 (1836).—Ital.?
hachijoënse *Nakai ex Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 1, in syn.: Reynoutria hachidyoënsis.
hololeion *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. 11. Anhang, 19 (1932).—Tanganyika Terr.
holotrichum *Peter, l. c.* 21.—Tanganyika Terr.
hydrophilum *Peter, l. c.* 20.—Tanganyika Terr.
hypoleucum (*Nakai*) *Kudo & Sasaki in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard.* 1931, i. 26: Pleuropterus hypoleucus.
icaricum *K. H. Rechinger in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 8.—Graecia (Ins. Nicaria).
iowense (*Rydb.*) *Cratty in Proc. Iowa Acad. Sc.* 1932, xxxix. 87: Persicaria iowensis.
Janatae *Klokov in Beitr. z. Naturschutz, Charkow*, i. 73 (1928); *et in Fedde, Repert.* xxx. 252 (1932).—Ucrainia.
kurilense *Tatewaki in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxix. 154 (1931), nomen.—Ins. Kuril.
latum *Small ex Rydb. Fl. Prairies & Plains Centr. N. Amer.* 282 (1932).—U.S.A. (Central States).
leptophyllum *Ohki ex Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 115, in syn.: Persicaria trigonocarpa.
leuconeuron *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. 11. Anhang, 20 (1932).—Tanganyika Terr.
litorale (*Mert. & Koch*) *C. Regel in Fedde, Repert. Beih.* lxxxii. 1. 89 (1935): P. aviculare f. litorale.
majus (*Meissn.*) *Piper in Piper & Beattie, Fl. Palouse Reg.* 63 (1901): P. coarctatum var. majus.
minutissimum *L. Williams in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1934, xxi. 343.—U.S.A. (Wyoming).
novum *Biroli ex Colla, Herb. Pedem.* v. 58 (1836).—Ital.
opacum *G. Samuelsson in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 299 (1935).—China (Fokien).
pseudoarenarium *Klokov in Beitr. z. Naturschutz, Charkow*, i. 74 (1928); *et in Fedde, Repert.* xxx. 252 (1932).—Rossia.
rhizoxylon *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 146 [1928].—Marocc.
Robynsi *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 261 (1931).—Congo Belg.
rotundifolium *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 883 (1895), in syn.: Sarcogonum complexum.
×Schroeterianum *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 68 (1932).—Java.
serrulatoides *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 40 (1932): P. salicifolium *Delile, Fl. Aegypt.* 12 (1814), non *Brouss.*
trigonocarpum (*Makino*) *Kudo & Masamune in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard.* 1932, ii. 53: P. minus f. trigonocarpum.
urgellense *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 104.—Hispan.
vernale (*Nakai*) *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 265 (1931): Persicaria vernalis.
verticillatum *Biroli ex Colla, Herb. Pedem.* v. 58 (1836).—Hab.?
Wellensi *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 270 (1931).—Afr. trop.

POLYLEPIS Ruiz & Pav. (Rosac.).
subintegra *Benoist in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 326.—Ecuador.
subsericans *Macbride in Candollea*, v. 367 (1934).—Peruv.

POLYMNIA L. (Compos.).
stenocarpha *Blake in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 487.—Venez.

POLYOSMA Blume (Saxifragac.).
elongata *Geddes*; *Craib, Fl. Siam. Enum.* i. 584 (1931), descr. ampl.—Siam.
Mjoebergii *Merrill in Sarawak Mus. Journ.* iii. 523 (1928).—Borneo.
oligodonta *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 66 (1934).—Sumatra.

POLYPLETHIA Van Tiegh. (Balanophorac.).
Oshimae (*Yamamoto*) *Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1933, v. 354: Balanophora Oshimae.
parvior (*Hayata*) *Yamamoto, l. c.* 406: Balanophora parvior.

POLYPOGON Desf. (Gramin.).
melillensis *Sennen in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 185, in obs., nomen.—Marocc.

POLYPOMPHOLYX Lehm. (Lentibulariac.).
longeciliata (*DC.*) *L. B. Smith in Phytologia*, i. 138 (1935): Utricularia longeciliata.

POLYSCIAS J. R. & G. Forst. (Araliac.).
Albersii *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 779 (1921), in obs., sphalm.: P. Albersiana *Harms*.
ferruginea (*Hiern*) *Harms in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* iii. VIII. 45 (1894): Panax ferrugineus.
fulva (*Hiern*) *Harms, l. c.*: Panax fulvus.
reflexa *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 35 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
subcapitata *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 673.—Ins. Carolin. (Kusai).

POLYSPHAERIA Hook. f. (Rubiac.).
jubensis *Chiov. Fl. Somala*, II. 242 (1932), in obs. —Somal. Ital.

POLYSPORA Hort. ex News Lit. & Fashion, ii. 205 (1825); Sweet, Hort. Brit. ed. 1, 61 (1826). *THEACEAE*.
axillaris (*Roxb.*) *Hort. l. c.*; *Sweet, l. c.*: Camellia axillaris.

POLYSTACHYA Hook. (Orchidac.).
angustifolia *Summerhayes in Kew Bull.* 1931, 388. —Congo Belg.
conocharis *Kraenzl. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* ii. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 409 (1908), in obs.: P. ionocharis *Kraenzl.*?
convallarioidea *Mansf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1061 (1934).—Tanganyika Terr.
erythrocephala *Summerhayes in Kew Bull.* 1931, 386.—N. Rhodesia.
kermesina *Kraenzl.*; *Summerhayes, l. c.* 387, descr. ampl.—Congo Belg.
Kerstingii *Schlechter ex Mansf. in Fedde, Repert. Beih.* lxviii. 10, t. 58, fig. 231 (1932), sine descr. —Afr.
longiscapa *Summerhayes in Kew Bull.* 1934, 211.— Tanganyika Terr.
monolenis *Summerhayes, l. c.* 1935, 198.—Sierra Leone.
retusiloba *Summerhayes, l. c.* 1931, 385.—Congo Belg.
sabulosa *Schlechter ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* ii. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 409 (1908), in obs., nomen.—Hab.?

POLYTOCA R. Br. (Gramin.).
digitata (*L. f.*) *Henrard in Meded. Herb. Leid.* No. 67, 10 (1931): Apluda digitata.
Massii (*Balansa*) *Schenck ex Henrard, l. c.* 9: Chionachne Massii.

POLYTOMA Lour. ex Gomes in Mem. Acad. Sc. Lisb. Cl. Sc. Pol. Mor. Bel.-Let. n. s. iv. (1), 30 (1868); Merrill in Trans. Am. Phil. Soc. n. s. xxiv. II. 18, 123 (1935), in syn.: **Bletilla** Reichb. f. (Orchidac.).
inodora *Lour. ex Gomes, l. c.*; *Merrill, l. c.*, in syn.: Bletilla striata.
odorifera *Lour. ex Gomes, l. c.*; *Merrill, l. c.* 18, 125, in syn.: Aërides odoratum.

POLYTREMA C. B. Clarke (Acanthac.).
annamense *Benoist ex Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iv. 723 (1935).—Indo-China (Laos; Anam).

POLYXENA Kunth (Liliac.).
Maughanii *Barker in Fl. Pl. S. Afr.* 1931, xi. t. 420. —Afr. austr. (Cape Prov.).

POMATOCALPA Breda, Kuhl & Hass. (Orchidac.).
elongata *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 50 (1932).—Penins. Mal.
floresana *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 148 (1932).—Ins. Sunda (Flores).

POPOWIA Endl. (Annonac.).
caulantha *Exell in Journ. Bot.* 1932, lxx. Suppl. 1, 208.—Congo Lusit.
dictyoneura *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 811 (1933).—Tanganyika Terr.
discolor *Diels, l. c.* xi. 398 (1932).—Tanganyika Terr.
Odoardi *Diels, l. c.* xi. 82 (1931).—Borneo.
prehensilis *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 56 (1927), in syn.: P. Whytei.
scamnopetala *Exell in Journ. Bot.* 1932, lxx. Suppl. 1, 207.—Congo Lusit.

POPULUS L. (Salicac.).
acuminata *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1893, xx. 50.—U.S.A. (S. Dakota; Nebraska).
×albo-tremula *Hort. ex C. K. Schneider in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1932, xliv. 26.—Hort.
caroliniana *Hort. ex McMinn & Maino, Pacific Coast Trees*, 146 (1935), in syn.: P. canadensis.
cathayana *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 59. —As. or.
×charkowiensis *R. Schröder in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1902, xvii. 393.—Rossia.
glandulosa (*Uyeki*) *Uyeki, Woody Pl. Chosen*, 4 [1934]: P. tremula var. glandulosa.
×hopeiensis *Hu & Chow in Chow, Familiar Trees Hopei, Peiping*, 56 (1934); *Hu in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* v. 305 (1934).—China (Chihli).
illicitana *Dode ex Görz in Fedde, Repert.* xxxvi. 20 (1934), pro syn.: P. euphratica.

PORANA Burm. f. (Convolvulac.).
grandiflora *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 41 (1824).—Ind. or.
megalantha *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 53 (1935).—China (Hainan).
racemosa *Roxb. Hort. Beng.* 13 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 41 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 466 (1832).—Nepal.

PORARESIA Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl. 1931, lviii. 385. *ICACINACEAE*.
anomala *Gleason, l. c.*—Bras. (Amaz.).

PORCELIA Ruiz & Pav. (Annonac.).
goyazensis *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* x. 33 (1930).—Bras. (Goyaz).
macrocarpa (*Warm.*) *R. E. Fries, l. c.* 31: Uvaria macrocarpa.
Steinbachii (*Diels*) *R. E. Fries, l. c.* 35: Cymbopetalum Steinbachii.

POROPHYLLUM Adans. (Compos.).
curticeps *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 6, 74 (1932).—Bras. (Rio Grande do Sul).
nodosum *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 82 (1933–5).—Calif. infer.
purpureum *M. E. Jones, l. c.* 81.—Mexico.
putidum *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1931, xviii. 440.—U.S.A. (Arizona).
rotundifolium *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 81 (1933–5).—Mexico.

PORPAX Lindl. (Orchidac.).
papillosa *Blatter & McCann in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxv. 268 (1931).—Ind. or. (Bombay).

PORPHYROCOMA Scheidw. (Acanthac.).
longifolia *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 809 (1895), in syn.: Dianthera Pohliana.

PORPHYROSTEMMA Benth. ex Oliv. (Compos.).
Chevalieri (*O. Hoffm.*) *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 158 (1931): P. Grantii var. Chevalieri.

PORTULACA L. (Portulacac.).
amboënsis *Macbride in Candollea*, v. 350 (1934).— Peruv.
calandroides *F. Muell. ex v. Poelln. in Fedde, Repert.* xxxv. 172 (1934), in syn.: Calandrinia spergularina.
Caumii *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 81, 29 (1931).—Ins. Sandvic.

PORTULACA:—
cinerea *v. Poelln. in Fedde, Repert.* xxxiii. 158 (1933).—Venez.
conico-operculata *v. Poelln. l. c.*—Bras. (Minas Geraes).
decipiens *v. Poelln. l. c.* 159, 165.—N. Austral.
denudata *v. Poelln. l. c.* 159.—Venez.
depauperata *v. Poelln. l. c.* 160.—Urug.
Dinteri *Schinz ex v. Poelln. l. c.* xxxvii. 308 (1934), in obs.—Afr. austr.-occ.
diversifolia *v. Poelln. l. c.* xxxiii. 160 (1933).—Bras. (Rio Grande do Sul).
erecta *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, p. 9 (1931).—Santo Domingo.
Haughtii *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 21 (1931).—Peruv.
immerso-stellulata *v. Poelln. in Fedde, Repert.* xxxiii. 161 (1933).—Argent.
insularis *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1932, xxii. 229.—Formosa.
Legrandii *v. Poelln. in Fedde, Repert.* xxxviii. 108 (1935).—Urug.
longiusculo-tuberculata *v. Poelln. l. c.* xxxiii. 161 (1933).—Boliv.
mauritiensis *v. Poelln. l. c.* xxxvii. 311 (1934).— Mauritius.
montevidensis *C. A. Mey. ex v. Poelln. l. c.* 271, in syn.: P. platensis.
Neumannii *Engl. ex v. Poelln. l. c.* xxxiii. 162 (1933).—Afr. or.
oblonga *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. Anhang, 32 (1932).—Tanganyika Terr.
obtusa *v. Poelln. in Fedde, Repert.* xxxiii. 162 (1933).—Argent.
papulosa *Schlecht. in Bot. Zeitung*, 1853, xi. 671, in obs.—Hort.
Poellnitziana *Legrand in Rev. Sudamer. Bot.* 1935, ii. 156.—Urug.
procumbens *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, p. 9 (1931).—Santo Domingo.
remota *v. Poelln. in Fedde, Repert.* xxxvii. 302 (1934).—W. Austral.
samoënsis *v. Poelln. l. c.* xxxiii. 163 (1933).— Samoa; N. Guin.
Smallii *P. Wilson in N. Am. Fl.* xxi. 335 (1932).— U.S.A. (N. Carolina; Georgia).
stellulato-tuberculata *v. Poelln. in Fedde, Repert.* xxxvii. 288 (1934).—Parag.
striata *v. Poelln. l. c.* xxxiii. 163 (1933).—Bras. (S. Catharina).
Stuhlmannii *v. Poelln. l. c.* 164.—Afr. or.
suffruticosa *Wight ex Wall.*; *v. Poelln. l. c.* xxxvii. 313 (1934), descr.—Ind. or.; Zeylan.
tingoënsis *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 21 (1931).—Peruv.
trianthemoides *Bremek. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 239 (1933).—Transvaal.
Werdermannii *v. Poelln. in Fedde, Repert.* xxxiii. 164 (1933).—Bras. (Bahia).
Wightiana *Wall.*; *v. Poelln. l. c.* xxxvii. 314 (1934), descr.—Ind. or. austr.; Zeylan.

POSKEA Vatke (Boraginac.).
socotrana (*I. B. Balf.*) *G. Taylor in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 312: Cockburnia socotrana.

POSOQUERIA Aubl. (Rubiac.).
dumetorum (*Willd.*) *Willd. ex Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 564 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 713 (1832): Gardenia dumetorum.
fasciculata *Roxb. l. c.* 568; *et l. c.* 717.—Ind. or. (Assam).
floribunda *Roxb. l. c.* 569; *et l. c.* 719.—Ind. or.
fragrans *Koen. ex Roxb. l. c.* 567; *et l. c.* 717.— Ind. or.
longiflora *Roxb. l. c.* 568; *et l. c.* 718.—Ind. or.
longispina *Roxb. l. c.* 566; *et l. c.* 716.—Ind. or.
nutans *Roxb. l. c.* 565; *et l. c.* 714.—Ind. or.
rigida *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 570 (1824).—Ind. or.
uliginosa (*Willd.*) *Roxb. l. c.* 563; *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 712 (1832): Gardenia uliginosa.

POTAMOGETON L. (Potamogetonac.; Naiadac., Gen. Pl.).
×apertus *Miki in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 690. —Japon.
×Babingtonii *Arth. Benn. in Journ. Bot.* 1894, xxxii. 205, in obs.—Anglia.

POTAMOGETON:—
bicupulatus *Fernald in Mem. Am. Acad. Arts & Sc.* xvii. 112 (1932).—U.S.A. (Tennessee; Pennsylvania; Vermont).
×bifrons *Hagstr. in Hartm. Handb. Skand. Fl.* ed. *Holmb.*, i. 93 (1922).—Dania.
×biwaënsis *Miki in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 326.—Japon. (Hondo).
clystocarpus *Fernald in Mem. Am. Acad. Arts & Sc.* xvii. 79 (1932).—U.S.A. (Texas).
×Cooperi (*Fryer*) *Fryer in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, i. 497 (1897): P. undulata var. Cooperi.
fibrillosus *Fernald in Mem. Am. Acad. Arts & Sc.* xvii. 51 (1932).—U.S.A. (N. W. States).
Henryi *Fernald, l. c.* 73, in adnot.—China (Hupeh).
indicus *Roxb. Hort. Beng.* 12 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 471 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 452 (1832).—Ind. or.
interior *Rydb. Fl. Colorado*, 13, in clavi, 14 (1906); *Rydb. Fl. Prairies & Plains Centr. N. Amer.* 49 (1932).—Am. bor.
iriomotensis *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 281.—Ins. Liukiu (Iriomote).
×kamogawaënsis *Miki in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 328.—Japon. (Hondo).
leptocephalus *Koidz. in Y. Doi, Fl. Satsum.* ii. 102 (1931).—Japon.
longiligulatus *Fernald in Mem. Am. Acad. Arts & Sc.* xvii. 66 (1932).—Am. bor.
manchuriensis *Arth. Benn. in Journ. Bot.* 1904, xlii. 76, in syn.: P. acutifolius.
Porsildiorum *Fernald in Mem. Am. Acad. Arts & Sc.* xvii. 40 (1932).—Canada.
Porteri *Fernald, l. c.* 73.—U.S.A. (Pennsylvania).
sinicus *Migo in Journ. Shanghai Sc. Inst.* Sect. III. iii. pp. 1–9 (1934); cf. *Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 46, japonice.—China austr.-or.
×steriliformis *Hagstr. in Hartm. Handb. Skand. Fl.* ed. *Holmb.*, i. 97 (1922).—Suecia.
tuberosus *Roxb. Hort. Beng.* 12 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 472 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 452 (1832).—Ind. or. (Bengal).
zosteriformis *Fernald in Mem. Am. Acad. Arts & Sc.* xvii. 36 (1932).—Am. bor.

POTAMOPHILA R. Br. (Gramin.).
Schliebenii *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 652 (1932).—Tanganyika Terr.

POTENTILLA L. (Rosac.).
×adulterina *Domin in Preslia*, xiii–xv. 126 (1935).—Czechoslovak.
albiflora *L. Williams in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1934, lxi. 260.—U.S.A. (Arizona).
apoiensis *Nakai, Veg. Apoi*, 37, 54 (1930); *Hara in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 196.—Japon.
asturica *Rothmaler in Cavanillesia*, vii. 113 (1935).—Hispan.
babiskaënsis *Post & Beauverd in Dinsm. Pl. Post. & Dinsm.* Fasc. 1. 6 (1932); *Dinsm. in Fedde, Repert.* xxxiii. 105 (1933).—Syria.
Borisii-regis *Stoyanoff ex Stefanoff & Jordanoff in Engl. Jahrb.* lxiv. 455 (1931), nomen.—Bulgar.
brutia *Tenore ex Colla, Herb. Pedem.* ii. 326 (1834).—Ital.
caruifolia (*Rydb.*) *Crum in Leafl. West. Bot.* i. 101 (1934): Horkelia caruifolia.
Crantzii (*Crantz*) *C. D. Chase & Cernjavski in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1934, x. 894 (1935): Fragaria Crantzii.
×cultorum *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 429 (1924).—Hort.
daisenensis *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 437.—Japon. (Hondo).
discolor *Bellardi ex Colla, Herb. Pedem.* ii. 325 (1834), in obs.—Hab.?
dumosa (*Franch.*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 515 (1933): P. coriandrifolia var. dumosa.
Fantolii *Biroli ex Colla, Herb. Pedem.* ii. 326 (1834).—Ital.
hyparctica *Malte in Rhodora*, 1934, xxxvi. 177.—Canada (Franklin Distr.).
hypargyrea *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 514 (1933).—China (Yunnan).
×Ibrahimiana *Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc*, ii. 338 (1932).—Marocc.

POTENTILLA:—
indiges *Peck in Torreya*, 1932, xxxii. 150.—U.S.A. (Oregon).
leucocarpa *Rydb. in Britton & Brown, Ill. Fl.* ii. 212 (1897).—U.S.A. (W. States).
Lomakini *Grossheim in Bull. Polytechn. Inst. Tiflis*, ii. 204 (1926), nomen; *et in Journ. Soc. Bot. Russe*, 1929, xiv. 308 (1930), descr.—Reg. Caucas.
Macdougalii *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 39: Drymocallis arizonica *Rydb.*, non Potentilla arizonica *Greene*.
×Matzialekii *Domin in Preslia*, xiii–xv. 125 (1935).—Czechoslovak.
×Murbeckii *Domin, l. c.* 126.—Czechoslovak.
Peirsoni *Munz in Bull. S. Calif. Acad. Sc.* 1932, xxxi. 65: P. cuneifolia *Th. Wolf*.
pinetorum *Wiggins in Contrib. Dudley Herb. Stanford Univ.* i. 169 (1933).—Calif. infer.
regis-Borisii *Stoyanoff in Stoyanoff & Stefanoff, Fl. Bulg.* ed. 2, 524 (1933), in clavi.—Bulgar.
Rockiana *Melch. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 795 (1933).—China (Yunnan).
rubella *Sørensen in Meddel. Grønland*, ci. No. 2, 106 (1934).—Groenlandia.
rubida *L. Williams in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1934, lxi. 261.—Mexico.
spectabilis *Hort. ex Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. Fasc. suppl. 1, p. 11 (1934), nomen.—Hab.?
stromatodes *Melch. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 797 (1933).—China (Yunnan).
sublaevis *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxvi. 89 (1934).—As. Min. (Lydia).
×sulphurascens *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 509 (1933).—China (Yunnan).
tugitakensis *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 77.—Japon.
turfosa *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 518 (1933).—China (Yunnan).
Vilmoriniana *Hort. ex Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1935, l. 364.—Hort.

POTERANTHERA Bong. (Melastomatac.).
duidae *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 415.—Venez.

POTERIUM L. (Rosac.).
Fontqueri *Pau in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, v. Ser. Bot. No. 5, 24 (1924).—Hispan.
maroccanum *Coss. ex Battand. Contrib. Fl. Atlant.* 31 (1919).—Marocc.

POTHOS L. (Arac.).
borneënsis *Furtado in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 148 (1935).—Borneo.
caudatus *Roxb. Hort. Beng.* 83 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 476 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 436 (1832).—Penins. Mal.
decursivus *Roxb. l. c.* 11, nomen; *et l. c.* 456; *et l. c.*—Ind. or. (Assam).
giganteus *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 455; *et l. c.* 434.—Penins. Mal.
gracilis *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 454; *et l. c.* 433.—Ins. Molucc. (Amboina).
heterophyllus *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 457; *et l. c.* 437.—Ind. or. (Bengal).
kinabaluensis *Furtado in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 149 (1935).—Borneo.
Lasia *Roxb. Hort. Beng.* 11 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 458 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 438 (1832).—Ind. or. (Madras).
officinalis *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 452; *et l. c.* 431.—Ind. or. (Bengal).
Peepla *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 454; *et l. c.* 433.—Ind. or. (Assam).
pertusus *Roxb. l. c.* 83, nomen; *et l. c.* 455; *et l. c.* 434.—Ind. or.
pinnatifidus *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 476; *et l. c.* 437.—Sumatra.
Ridleyanus *Furtado in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 150 (1935): P. ellipticus *Ridley*.

POTTSIA Hook. & Arn. (Apocynac.).
inodora *Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1178 (1933).—Indo-China (Anam).
pubescens *Tsiang in Sinensia*, iii. 157 (1932).—China (Kwangsi).

POULSENIA Eggers (Morac.).
armata (*Miq.*) *Standley in Tropical Woods*, 1933, No. 33, 4: Olmedia armata.

POUPARTIA Comm. (Anacardiac.).
axillaris (*Roxb.*) *King & Prain in Ann. Roy. Bot. Gard. Calc.* ix. 1. 20 (1901), in obs.: Spondias axillaris.

POUROUMA Aubl. (Morac.; Urticac., Gen. Pl.).
longipendula *Ducke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 581 (1932).—Bras. (Amaz.).
myrmecophila *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 723.—Bras. (Amaz.).

POURTHIAEA Decne. (Rosac.).
amphidoxa (*C. K. Schneider*) *Stapf in Bot. Mag.* sub t. 9275 (1932): Stranvaesia amphidoxa.
formosana (*Hance*) *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 147: Photinia villosa var. formosana.
longipes (*Nakai*) *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 781: P. villosa var. longipes.

POUTERIA Aubl. (Sapotac.).
cladantha *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 480.—Guiana Brit.
demerarae *Sandwith, l. c.* 477.—Guiana Brit.
egregia *Sandwith, l. c.* 479.—Guiana Brit.
Gutta *Ducke in Ann. Acad. Bras. Sc.* 1934, vi. 208, in adnot., nomen altern.—Bras. (Amaz.; Pará).
Jenmanii (*Pittier*) *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 478: Lucuma Jenmanii.
minutiflora (*Britton*) *Sandwith, l. c.*: Chrysophyllum minutiflorum.
ovata *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1934, lxi. 196.—Bras. (Maranhão).

POUZOLZIA Gaudich. (Urticac.).
cordata *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. ii. Anhang, 2 (1932).—Tanganyika Terr.
Poeppigiana (sphalm. Poeppiana) *Killip in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 347: Margarocarpus Poeppigianus.
sanguinea (*Blume*) *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. viii. 52 (1934): Urtica sanguinea.
scaberrima *Killip in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1934, xxiv. 43.—Colomb.

PRANGOS Lindl. (Umbellif.).
acaulis (*DC.*) *Bornm. in Fedde, Repert.* xxxix. 122 (1935): Cachrys acaulis.
deserti *Post & Beauverd in Dinsm. Pl. Post. & Dinsm.* Fasc. 1. 6 (1932); *Dinsm. in Fedde, Repert.* xxxiii. 105 (1933).—Syria.
Fedtschenkoi (*O. Fedtsch.*) *Korovin in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 16, p. 11 (1934).—Hab.?
scabrifolia *Post & Beauverd in Dinsm. Pl. Post. & Dinsm.* Fasc. 1. 6 (1932); *Dinsm. in Fedde, Repert.* xxxiii. 105 (1933).—Syria.
turbinata (*Bornm. & Gauba*) *Bornm. & Gauba in Fedde, Repert.* xxxix. 122 (1935), in adnot.: Cachrys turbinata.

PRASOPHYLLUM R. Br. (Orchidac.).
densiflorum *Coleman in Vict. Nat.* li. 107 (1934), in obs., nomen provis.—Hab.?
Morrisii *Nicholls in Vict. Nat.* xlviii. 108 (1931).—Austral. (Victoria).
pallidum *Nicholls in Proc. Roy. Soc. Vict.* n. s. xlvi. 33 (1933).—Austral. (Victoria).
pyriforme *Coleman in Vict. Nat.* xlix. 195 (1932).—Austral. (Victoria).

PRATIA Gaudich. (Campanulac.).
calochlamys (*Donn. Smith*) *E. Wimm. in Fedde, Repert.* xxix. 50 (1931): Centropogon calochlamys.
Fangiana *E. Wimm. l. c.* xxxviii. 3 (1935).—China (Szechuan).
guatemalensis (*B. L. Robinson ex Donn. Smith*) *E. Wimm. l. c.* xxix. 50 (1931): Centropogon guatemalensis.
prostrata *E. Wimm. l. c.* xxxviii. 3 (1935).—Austral.
Tatea *E. Wimm. l. c.* xxix. 51 (1931).—Nicarag.

PREMNA L. (Verbenac.).
Dopii *P'ei in Mem. Sc. Soc. China*, i. No. 3 (*Verbenac. China*) 91 (1932): P. yunnanensis *Dop*.
longipila *P'ei, l. c.* 75.—China (Yunnan).

PREMNA:—
macrophylla *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 270, in clavi, 272 (1931).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
parvilimba *P'ei in Mem. Sc. Soc. China*, i. No. 3 (*Verbenac. China*) 62 (1932): Celastrus yunnanensis.
pilosa *P'ei, l. c.* 66.—China (Yunnan).
Schliebenii *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 89 (1934).—Tanganyika Terr.
stenantha *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* vii. 321 (1931).—China (Kwangtung).
suaveolens *Chiov. Fl. Somala*, II. 360 (1932).—Somal. Ital.
sunyiensis *P'ei in Mem. Sc. Soc. China*, i. No. 3 (*Verbenac. China*) 84 (1932).—China (Kwangtung).
szemaoënsis *P'ei, l. c.* 76.—China (Yunnan).
taitensis *Schauer*; *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 248 (1935), descr. emend.—Ins. Societ. (Tahiti); Ins. Marquesas.
Tenii *P'ei in Mem. Sc. Soc. China*, i. No. 3 (*Verbenac. China*) 66 (1932).—China (Yunnan).
umbellata *Schauer ex Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 35 (1935), pro syn.: Callicarpa umbellata.

PRENANTHES L. (Compos.).
diversifolia (*Vaniot*) *Chang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* v. 321 (1934): Lactuca diversifolia.
formosana *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 100.—Formosa.
pontica (*Boiss.*) *Leskov in Trav. Mus. Bot. Acad. Sc. URSS*, xxv. 44 (1932): Mulgedium ponticum.
stenolimba *v. Steenis in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 190 (1934).—Sumatra.
triflora (*Hemsl.*) *Chang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* v. 321 (1934): Lactuca triflora.
Wilsoni *Chang, l. c.* 322.—China occ.

PREPODESMA N. E. Brown; N. E. Brown in Gard. Chron. 1931, Ser. III. lxxxix. 389, descr. ampl. *FICOIDACEAE*.
Orpenii (*N. E. Brown*) *N. E. Brown, l. c.*: Mesembryanthemum Orpenii.
uncipetala *N. E. Brown, l. c.*—Afr. austr. (Griqualand West).

PREPUSA Mart. (Gentianac.).
alata *C. Porto & Brade in Arquiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, i. 222 (1935).—Bras. (Rio de Janeiro).

PRESTONIA R. Br. (Apocynac.).
agglutinata (*Jacq.*) *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1931, xviii. 552: Echites agglutinata.
amazonica (*Benth.*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 34 (1931): Haemadictyon amazonicum.
coalita (*Vell.*) *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1931, xviii. 552: Echites coalita.
Dusenii (*Malme*) *R. E. Woodson, l. c.*: Echites Dusenii.
isthmica *R. E. Woodson, l. c.* 555.—Costa Rica.
Lindleyana *R. E. Woodson in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 392: Haemadictyon calycinum.
megagros (*Vell.*) *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1934, xxi. 623: Echites megagros.
nutans (*A. DC.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 658 (1895): Haemadictyon nutans.
portobellensis (*Beurl.*) *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1931, xviii. 553: Echites portobellensis.
trifida (*Poepp.*) *R. E. Woodson in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 392: Haemadictyon trifidum.
velutina *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1931, xviii. 554.—Colomb.

PRIMULA L. (Primulac.).
adenophora *Blatter in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxvii. 160 (1934).—Ind. or. (Waziristan).
× affinis *Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1906, xii. 92.—Hort.
alpicola *Stapf in Bot. Mag.* t. 9276 (1932).—Tibet.
× aranensis *Cadevall in Cadevall & Font Quer, Fl. Catal.* iv. 59 (1932).—Hispan.
balearica (*Willk.*) *Losina-Losinsk. in Bull. Acad. Sc. URSS*, 1933, Sér. VII. 304: P. vulgaris var. balearica.

PRIMULA:—
× Bergmansiae *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 437 (1924).—Hort.
chlorodryas *W. W. Smith in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 223 (1931).—China (Yunnan).
coelata *Stapf in Bot. Mag.* sub t. 9266 (1932), in obs.—China austr.-occ.
concholoba *Stapf & Sealy, l. c.* t. 9289.—Himal. or.
× cultorum *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 440 (1924).—Hort.
× Deschmannii *Ingwersen in New Fl. & Silv.* iii. 204 (1931).—Eur.
didyma *W. W. Smith in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 228 (1931).—Nepal.
× Elisabethae *Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1906, xii. 92.—Hort.
Emiliae *I. B. Balf. ex Cooper in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 92 (1933), in obs.—Bhutan.
Hidakana *Miyabe & Kudo in Research Bull. Exper. For. Fac. Agric., Hokkaido Imp. Univ.* (1928), nomen, cum ic.; cf. *W. W. Smith in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 229 (1931).—Japon.
Hunnewellii *Fernald in Rhodora*, 1934, xxxvi. 117.—U.S.A. (Arizona).
× Kellereri *Ingwersen in New Fl. & Silv.* iii. 206 (1931).—Eur.
× kewensis *W. Wats. in Gard. Chron.* 1900, Ser. III. xxvii. 130, 195.—Hort.
Komarovi *Losina-Losinsk. in Bull. Acad. Sc. URSS*, 1933, Sér. VII. 301.—Tauria; Caucas.; Transcaucas.
kweichouensis *W. W. Smith*; *W. W. Smith in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 225 (1931), descr.—China (Kweichau).
Laggeri (*Huet*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 632 (1895), in obs.: Androsace Laggeri.
× legionensis *Rothmaler in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.* 1934, xxxiv. 154.—Hispan.
malacoides *Hort. ex Bull. Ort. Bot. Napoli*, x. p. xi. (1930), nomen.—Hort.
Minkwitziae *W. W. Smith in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 181 (1934).—Turkestan.
× moerheimensis *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 437 (1924), in syn.: P. Bergmansiae.
nana *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 23 (1824).—Reg. Himal.
nepalensis *W. W. Smith in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 228 (1931).—Nepal.
Petelotii *W. W. Smith, l. c.* 226.—Indo-China (Tonkin).
petiolaris *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 22 (1824).—Reg. Himal.
× pruhonicensis *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 448 (1924).—Hort.
pusilla *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 22 (1824).—Ind. or.
reticulata *Wall. l. c.* 21.—Ind. or.
rheiniana *Ingwersen in New Fl. & Silv.* iii. 206 (1931), hybr. ?—Eur.
Rockii *W. W. Smith in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 224 (1931).—China (Szechuan).
rotundifolia *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 18 (1824).—Reg. Himal.
sachalinensis *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 61.—Sakhalin.
× Salomonii *Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1906, xii. 92.—Hort.
Sherriffii *Hort. ex Gard. Chron.* 1935, Ser. III. xcviii. 312.—Bhutan.
sorachiana *Miyabe & Tatewaki in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.* xiii. 2 (1933).—Japon.
Stuartii *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 20 (1824).—Ind. or.
× Thomassiana *Ingwersen in New Fl. & Silv.* iii. 207 (1931).—Eur.
× tottenhamensis *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 437 (1924), in syn.: P. Bergmansiae.
Tsiangii *W. W. Smith in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 63 (1933).—China (Kweichau).
× varians *Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1906, xii. 92.—Hort.
vinosa *Stapf in Bot. Mag.* sub t. 9276 (1932), in clavi.—Tibet.
Wigramiana *W. W. Smith in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 182 (1934).—Himal. centr.

PRIMULA:—
Woronovi *Losina-Losinsk. in Bull. Acad. Sc. URSS*, 1933, Sér. VII. 303.—Transcaucas.

PRINCIPINA Uitt. in Rec. Trav. Bot. Néerl. 1935, xxxii. 282. *CYPERACEAE*.
grandis *Uitt. l. c.*—Afr. trop. occ. (Ins. Principe).

PRINSEPIA Royle, Ill. Bot. Himal. t. 38, fig. 1, a–g (Sept. 1834); et l. c. p. 206 (April 1835). *ROSACEAE*.

PRIONACHNE Nees (Gramin.).
pholiuroides (*Stapf*) *Phillips, S. Afr. Grasses* (*S. Afr. Agric. Ser.*, vi.) t. 63 (1931): Prionanthium pholiuroides.

PRIONIUM E. Mey. (Juncac.).
serratum (*Thunb.*) *Drege, Zwei Pflanzengeogr. Docum.* 10 (1843): Juncus serratus.

PRIOTROPIS Wight & Arn. (Legumin.).
inopinata *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1065 (1934).—Tanganyika Terr.

PRISMATOCARPUS L'Hérit. (Campanulac.).
Rogersii *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 83 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
virgatus *Fourc. l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).

PRISMATOMERIS Thwait. (Rubiac.).
filamentosa *Craib in Kew Bull.* 1932, 436.—Siam.
Henryi (*Léveillé*) *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 328: Canthium Henryi.
memecyloides *Craib in Kew Bull.* 1932, 437.—Siam.
mollis *Craib, l. c.*—Siam.
urophylloides *Merrill in Journ. As. Soc. Straits*, Spec. No., 581 (1921), sphalm.: Praravinia urophylloides.

PRISTIGLOTTIS Cretz. & J. J. Smith in Acta Faun. Fl. Univ., Bucureşti, Ser. II. Bot., i. No. 14, 4 (1934): **Cystopus** Blume (Orchidac.).
aneytyumensis (*Schlechter*) *Cretz. & J. J. Smith, l. c.*: Cystopus aneytyumensis.
coerulescens (*Schlechter*) *Cretz. & J. J. Smith, l. c.*: Cystopus coerulescens.
elongata (*Blume*) *Cretz. & J. J. Smith, l. c.*: Cystopus elongatus.
fimbriata (*J. J. Smith apud Valeton*) *Cretz. & J. J. Smith, l. c.*: Cystopus fimbriatus.
Funkii (*Schlechter*) *Cretz. & J. J. Smith, l. c.*: Cystopus Funkii.
Hasseltii (*Blume*) *Cretz. & J. J. Smith, l. c.*: Cystopus Hasseltii.
hatumetensis (*J. J. Smith*) *Cretz. & J. J. Smith, l. c.* 5: Cystopus hatumetensis.
humilis (*Fukuyama*) *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 666: Cystopus humilis.
hydrocephala (*J. J. Smith*) *Cretz. & J. J. Smith in Acta Faun. Fl. Univ., Bucureşti*, Ser. II. *Bot.*, i. No. 14, 5 (1934): Cystopus hydrocephalus.
mindanaënsis (*Ames*) *Cretz. & J. J. Smith, l. c.*: Cystopus mindanaënsis.
montana (*Schlechter*) *Cretz. & J. J. Smith, l. c.*: Anoectochilus montanus.
occulta (*Blume*) *Cretz. & J. J. Smith, l. c.*: Cystopus occultus.
pectinifera (*Schlechter*) *Cretz. & J. J. Smith, l. c.*: Cystopus pectinifer.
philippinensis (*Ames*) *Cretz. & J. J. Smith, l. c.*: Cystopus philippinensis.
puberula (*Ames*) *Cretz. & J. J. Smith, l. c.*: Cystopus puberulus.
pubescens (*Blume*) *Cretz. & J. J. Smith, l. c.*: Anoectochilus pubescens.
serriformis (*J. J. Smith*) *Cretz. & J. J. Smith, l. c.* 6: Cystopus serriformis.
spicata (*Blume*) *Cretz. & J. J. Smith, l. c.*: Cystopus spicatus.
Tashiroi (*Maxim.*) *Cretz. & J. J. Smith, l. c.*: Anoectochilus Tashiroi.
uniflora (*Blume*) *Cretz. & J. J. Smith, l. c.*: Cystopus uniflorus.

PRITCHARDIA Seem. & H. Wendl. (Palmae).
robusta (*H. Wendl.*) *Hort. ex C. Schroeter in Schweiz. Gart.* No. 7, p. 8 (1931), in obs.: Washingtonia filifera var. robusta.

PRIVA Adans. (Verbenac.).
Bellinii *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 98 (1935), in syn.: P. Curtisiae.

PROCRIŞ Comm. (Urticac.).
boninensis *Tuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 371.—Ins. Bonin.

PROSERPINACA L. (Haloragac.).
amblygona (*Fernald*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 954 (1933): P. palustris var. amblygona.

PROSOPIS L. (Legumin.).
Tamarugo *F. Phil. in Verh. Deutsch. Wiss. Ver. Santiago* (*Chile*) i. 159 (1886), in obs.; *R. Phil. in An. Mus. Nac. Chile*, 1891, 21.—Chile.

PROTEA L. (Proteac.).
Bismarckii *Engl.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 154 (1927), in syn.: P. Elliottii.
eximia (*Knight*) *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 97 (1932): Erodendrum eximium.
lorifolia (*Knight*) *Fourc. l. c.*: Erodendrum lorifolium.
maschonica *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 67 (1915), in obs.—Mashonaland.
Rudatisii *Engl. l. c.*, in obs.—Natal.
salicifolia *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 395 (1932).—Tanganyika Terr.
stipitata *Phillips in Kew Bull.* 1934, 104.—Transvaal.
Stolzii *Mildbr. ex Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. 135 (1932), in syn.: P. Heckmanniana.
Wangenheimii *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 68 (1915), in obs.—Tanganyika Terr.

PROTIUM Burm. f. (Burserac.).
costaricense (*Rose*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 414 (1931): Icica costaricensis.
crenatum *Sandwith in Kew Bull.* 1933, 327.—Guiana Brit.
ecuadorense *Benoist in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 324.—Ecuador.
glabrum (*Rose*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 414 (1931): Icica glabra.
glaucum *Macbride in Candollea*, v. 379 (1934).—Peruv.
Klugii *Macbride, l. c.* 378.—Peruv.
Llewelyni *Macbride, l. c.*—Peruv.
lucidum (*Rose*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 414 (1931): Icica lucida.
medianum *Macbride in Candollea*, v. 377 (1934).—Peruv.
Palmeri (*Rose*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 414 (1931): Icica Palmeri.
Pittieri (*Rose*) *Engl. l. c.*: Icica Pittieri.
puncticulatum *Macbride in Candollea*, v. 377 (1934).—Peruv.
titubans *Macbride, l. c.* 379.—Peruv.
tonkinense (*Guillaumin*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 413 (1931): Bursera tonkinensis.

PROTOCYRTANDRA Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 1934, xxiv. 202. *GESNERIACEAE.*
todaiensis (*Kanehira*) *Hosokawa, l. c.*: Cyrtandra todaiensis.

PROTOLIRION Ridley (Liliac.).
Sakuraii (*Makino*) *Dandy in Journ. Bot.* 1931, lxix. 53: Miyoshia Sakuraii.

PROUSTIA Lag. (Compos.).
stenophylla *Urb. & Ekman*; *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 95 (1931), descr. ampl.—Haiti.

PRUNELLA L. (Labiat.).
africana *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 539 [1928].—Marocc.
× Fontqueri *Pau in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, v. Ser. Bot. No. 5, 34 (1924).—Hispan.
Marcailhouana *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1932, xxxi. 17, descr.—Hispan.

PRUNUS L. (Rosac.).
adenodonta *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* vii. 308 (1931).—China (Kwangtung).
Ansu (*Maxim.*) *Komarov in Acta Hort. Petrop.* xxii. 541 (1904): P. Armeniaca var. Ansu.

PRUNUS:—
antilibanotica *Dinsm. in Post, Fl. Syria, Palest. & Sinai*, ed. 2, i. (*Publ. Am. Univ. Beirut*, Nat. Sc. Ser. No. 1) 451 (1932): Cerasus anti-libani.
Botan *Hort. ex Chow, Familiar Trees Hopei, Peiping*, 211 (1934), in syn.: P. salicina.
Catesbaei *H. Belv. ex Colla, Herb. Pedem.* ii. 296 (1834).—Hab.?
detrita *Macbride in Candollea*, v. 365 (1934).—Peruv.
edentata *Hand.-Mazz. in Sinensia*, ii. 126 (1932).—China (Kwangsi).
Fukudana *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 290.—Japon.
Gharbiana *Trab. in Pitard, Contrib. Étude Fl. Maroc*, 15 (1918).—Marocc.
hiberniflora *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 288.—Japon.
× Juddii *E. Anders. in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 358.—Hort.
× Knudsoni *Rosend. & Butters, Trees & Shrubs Minnesota*, 227 (1928).—Hort.
koshiensis *Koidz. in Toyama-ken Tennenk. Chosahohk.* x. 9 (1930); *et in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 14.—Japon. (Hondo).
Masu *Hort. ex Chow, Familiar Trees Hopei, Peiping*, 211 (1934), in syn.: P. salicina.
Matuurai *Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1931, xxi. 150.—Formosa.
Mochidzukiana *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 265.—Hort.
Nikaii (*Honda*) *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 140, in obs., 289: P. yedoënsis var. Nikaii.
× niko-montana *Koidz. l. c.* 291.—Japon.
nitens *Craib, Fl. Siam. Enum.* i. 565 (1931): P. nitida *Koehne.*
nubium *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 530 (1933).—China (Hunan).
nudiflora (*Koehne*) *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 178, in obs.: P. yedoënsis var. nudiflora.
oblonga *Macbride in Candollea*, v. 364 (1934).—Peruv.
ohiraënsis *Miyoshi in Proc. Imp. Acad. Tokyo*, 1934, x. 424.—Japon.
patentipila *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 529 (1933).—China (Yunnan).
rotunda *Macbride in Candollea*, v. 365 (1934).—Peruv.
rufula (*Wooton & Standley*) *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 39: Padus rufula.
rugosa *Rydb. in Brittonia*, i. 90 (1931).—U.S.A. (Kansas).
rugulosa *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 264.—Hort.
Salasii *Standley in Tropical Woods*, 1932, No. 32, 14.—Guatem.
sana *Macbride in Candollea*, v. 363 (1934).—Peruv.
sativa *Delastre, Fl. Dépt. Vienne*, 149 (1842).—Gallia.
Shirataki *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 140, in obs., 290.—Japon.
× Slavinii *Palmer in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 208.—U.S.A. (Central States).
staminata *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 535 (1933).—China (Yunnan).
stipulata *Macbride in Candollea*, v. 363 (1934).—Peruv.
superflua *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 175.—Japon. (Kiushiu).
takasago-montana *Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1931, xxi. 148.—Formosa.
Tobagenzoana *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 119: P. Fukudana var. pendula *Koidz.*
ussuriensis *Kovalev & Kostina in Bull. Applied Bot., Leningrad*, Ser. VIII. No. 4, 75 (1935): P. triflora var. manshurica *Skvorz.*
vana *Macbride in Candollea*, v. 362 (1934).—Peruv.
velutipes *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 263.—Japon. (Hondo).
Williamsii *Macbride in Candollea*, v. 364 (1934).—Peruv.
× zumbra *Rosend. & Butters, Trees & Shrubs Minnesota*, 227 (1928).—U.S.A. (Minnesota).

PSAMMISIA Klotzsch (Ericac.; Vacciniac., Gen. Pl.).
caloneura *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 113.—Colomb.
coarctata (*Ruiz & Pav.*) *A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 401 (1932): Thibaudia coarctata.
elliptica (*Rusby*) *A. C. Smith, l. c.* 395: Macleania elliptica.
ferruginea *A. C. Smith, l. c.* 391.—Colomb.
globosa *A. C. Smith, l. c.* 388.—Peruv.
Killipii *A. C. Smith, l. c.* 395.—Colomb.
pauciflora *Griseb.*; *A. C. Smith, l. c.* 394, descr.—Colomb.; Peruv.; Boliv.
Pennellii *A. C. Smith, l. c.* 386.—Colomb.
Urichiana (*Britton*) *A. C. Smith, l. c.* 393: Cavendishia Urichiana.

PSAMMOGETON Edgew. (Umbellif.).
Caramanicus *Bornm. in Fedde, Repert.* xxxvi. 343 (1934).—Persia.
flabellatus *Bornm. & Gauba, l. c.* 341.—Persia.
kermanensis *Bornm. l. c.* 344, in obs.—Persia.

PSAMMOPHORA Dinter & Schwantes (Ficoidac.).
Herrei *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 305 (1931).—Little Namaq.

PSATHYROSTACHYS Nevski in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS, Ser. I. Fasc. 1, 22, 27 (1933). *GRAMINEAE.*
daghestanicus (*Alexeenko & Woronow*) *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 715 (1934): Hordeum daghestanicum.
fragilis (*Boiss.*) *Nevski, l. c.* 716: Hordeum fragile.
junceus (*Fisch.*) *Nevski, l. c.* 714: Elymus junceus.
Kronenburgii (*Hackel*) *Nevski, l. c.* 713: Hordeum Kronenburgii.
lanuginosus (*Trin.*) *Nevski, l. c.* 714: Elymus lanuginosus.
rupestris (*Alexeenko*) *Nevski, l. c.* 715: Hordeum rupestre.

PSEPHELLUS Cass. (Compos.).
carthalinicus *Sosn. in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 203 (1934).—Caucas.
colchicus *Sosn. l. c.*—Caucas.
daghestanicus *Sosn. l. c.* 202.—Caucas.
karabaghensis *Sosn. l. c.*—Caucas.
pambakensis *Sosn. l. c.* 203.—Caucas.
somcheticus *Sosn. l. c.* 204.—Caucas.
taochius *Sosn. l. c.* 202.—Caucas.
transcaucasicus *Sosn. l. c.* 204.—Caucas.
Troitzkii *Sosn. l. c.* 200.—Caucas.
Vvedenskii *Sosn. l. c.* 201.—Caucas.
Woronowii *Sosn. l. c.* 199.—Caucas.

PSEUDABUTILON R. E. Fries (Malvac.).
Hitchcockii *Ulbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 522 (1932).—Ecuador.

PSEUDAGROSTISTACHYS Pax & K. Hoffm. (Euphorbiac.).
Humbertii *Lebrun in Bull. Soc. Bot. Belg.* lxvii. 99 (1934).—Congo Belg.

PSEUDALEPYRUM Dandy in Journ. Bot. 1932, lxx. 330: **Alepyrum** Hieron. (Centrolepidac.).
ciliatum (*Hook. f.*) *Dandy, l. c.* 331: Gaimardia ciliata.
minimum (*Kirk*) *Dandy, l. c.*: Centrolepis minima.
monogynum (*Hook. f.*) *Dandy, l. c.*: Alepyrum monogynum.
pallidum (*Hook. f.*) *Dandy, l. c.*: Gaimardia pallida.

PSEUDARRHENATHERUM Rouy in Bull. Soc. Bot. France, 1921, lxviii. 401, 402 (1922): **Thorea** Rouy (Gramin.).
longifolium (*Rouy*) *Rouy, l. c.*: Thorea longifolia.

PSEUDERANTHEMUM Radlk. (Acanthac.).
acuminatissimum (*Miq.*) *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iv. 721 (1935): Eranthemum acuminatissimum.
campylosiphon *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1084 (1934).—Tanganyika Terr.
Couderci *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iv. 720 (1935).—Cambodia?
Eberhardti *Benoist, l. c.* 718.—Indo-China (Tonkin).
igneum (*Linden*) *Stapf in Bot. Mag.* sub t. 8244 (1909), in obs.: Eranthemum igneum.

PSEUDERANTHEMUM:—
kewense *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, i. 130 (1923): Eranthemum atropurpureum *Hook. f. in Bot. Mag.* t. 7839 (1902), non *Bull.*
Poilanei *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iv. 722 (1935).—Indo-China (Anam).
subviscosum (*C. B. Clarke*) *Stapf in Bot. Mag.* sub t. 8244 (1909): Eranthemum subviscosum.
sumatrense (*Ridley*) *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 155 (1934): Eranthemum sumatrense.
Teijsmannii (*T. Anders.*) *Stapf in Bot. Mag.* sub t. 8446 (1912), in obs.: Eranthemum Teijsmanni.
tonkinense *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iv. 719 (1935).—Indo-China (Tonkin).

PSEUDERIA Schlechter (Orchidac.).
sympodialis *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 56 (1935).—N. Guin.
vanikorensis *Ames in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 130.—Ins. Santa Cruz.

PSEUDOANASTATICA Grossheim, Fl. Kavkaza, ii. 212 (1930). *CRUCIFERAE.*
[CLYPEOLA sect. PSEUDANASTATICA Boiss.]
dichotoma (*Boiss.*) *Grossheim, l. c.*: Clypeola dichotoma.

PSEUDOBLEPHARIS Baill. (Acanthac.).
insignis *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 718 (1935).—Tanganyika Terr.
obtusisepala (*C. B. Clarke*) *Lindau in Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. 1907–8*, ii. 299 (1911): Sclerochiton obtusisepalus.

PSEUDOCADIA Harms (Legumin.).
zambesiaca (*Baker*) *Harms in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 524 (1915), in obs.: Sophora zambesiaca.

PSEUDOCALYMMA A. Sampaio & Kuhlm. in O. Campo, Rio de Janeiro, iv. (11) 15 (1933); et in Bol. Mus. Nac. Rio de Janeiro, 1934, x. 99, 101; et in Ann. Acad. Bras. Sc. 1935, vii. 123. *BIGNONIACEAE.*
laevigatum (*Bur. & K. Schum.*) *A. Sampaio & Kuhlm. l. c.*; *et l. c.* 101; *et l. c.* 125, in obs.: Adenocalymma laevigatum.

PSEUDOCALYX Radlk. (Acanthac.).
heterochondros *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 409 (1932).—Tanganyika Terr.

PSEUDOCAMELINA N. Busch (Crucif.).
campylopoda *Bornm. & Gauba ex Bornm. in Fedde, Repert.* xxxvi. 339 (1934), in syn.: Cochlearia campylopoda.
Szovitsii (*Boiss.*) *N. Busch ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 159 (1930): Cochlearia Szovitsii.

PSEUDOCARYOPHYLLUS Berg (Myrtac.).
platyphyllus *Burret ex Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste Braz.* iii. 202 (1923) [*Insp. Fed. Obras. Secc.* Publ. 57], nomen; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 151.—Bras. (Bahia).

PSEUDOCENTEMA Chiov. Fl. Somala, II. 378 (1932), in obs. *AMARANTHACEAE.*
angolense (*Hook. f.*) *Chiov. l. c.*, in obs.: Centema angolense.

PSEUDOCIMUM Bremek. in Ann. Transvaal Mus. xv. 251 (1933). *LABIATAE.*
tenuiflorus (*Benth.*) *Bremek. l. c.* 252, in obs.: Orthosiphon tenuiflorus.
trichocalyx *Bremek. l. c.*—Transvaal.

PSEUDODIPHRYLLUM Nevski in Komarov, Fl. URSS, iv. 649, 752 (1935). *ORCHIDACEAE.*
Chorisianum (*Cham.*) *Nevski, l. c.* 650, 752: Habenaria Chorisiana.

PSEUDOËSPOSTOA Backeb. in Cactus Journ. i. 52 (1933), in obs.; Backeb. Blätter Kakteenforsch. 1934, Pt. 10, [p. 1], descr. *CACTACEAE.*
melanostele (*Vaupel*) *Backeb. l. c.*; *Backeb. l. c.* [p. 2]: Cephalocereus melanostele.

PSEUDOEURYA Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan, 1933, v. 351. *THEACEAE.*
crenatifolia *Yamamoto, l. c.*—Formosa.

PSEUDOGALTONIA Kuntze (Liliac.).
clavata (*Mast. ex Baker*) *Phillips in Fl. Pl. S. Afr.* 1935, xv. 580: Galtonia clavata.

PSEUDOLACHNOSTYLIS Pax (Euphorbiac.).
polygyna *Pax & K. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 31 (1921), in obs.—Tanganyika Terr.

PSEUDOLAELIA C. Porto & Brade in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro, ii. 209 (1935). *ORCHIDACEAE.*
corcovadensis *C. Porto & Brade, l. c.*—Bras. (Rio de Janeiro).
vellozicola (*Hoehne*) *C. Porto & Brade, l. c.* 211, in obs.: Schomburgkia vellozicola.

PSEUDOLMEDIA Tréc. (Morac.; Urticac., Gen. Pl.).
Eggersii *Standley in Tropical Woods*, 1935, No. 42, 27.—Ecuador.
Huberi *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 16 (1931): P. obliqua (*Huber*) *Ducke.*
laevis (*Ruiz & Pav.*) *Macbride, l. c.*: Olmedia laevis.
Mildbraedii *Macbride, l. c.* 61.—Peruv.
scabra *Macbride, l. c.* 62.—Peruv.

×**PSEUDOMATRICARIA** Domin in Preslia, xiii–xv. 233 (1935). *COMPOSITAE.*
[CHRYSANTHEMUM × MATRICARIA.]
Rohlenae *Domin, l. c.*—Czechoslovak.

PSEUDONEPHELIUM Radlk. (Sapindac.).
subaequilaterum *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 1004 (1933).—N. Caled.

PSEUDOPAEGMA Urb. (Bignoniac.).
oligoneuron *Sprague & Sandwith in Kew Bull.* 1932, 88.—Guiana Brit.

PSEUDOPIPTURUS Skottsb. in Acta Hort. Gothoburg. 1933, viii. 117. *URTICACEAE.*
discolor (*C. B. Robinson*) *Skottsb. l. c.*: Pipturus discolor.
Mabesae *Skottsb. l. c.*—Hab.?
melastomifolius (*K. Schum.*) *Skottsb. l. c.*: Pipturus melastomatifolius.
repandus (*Blume*) *Skottsb. l. c.*: Urtica repanda.
rotundifolius (*Wedd.*) *Skottsb. l. c.*: Pipturus rotundifolius.
succulentus (*Elmer*) *Skottsb. l. c.*: Pipturus succulentus.

PSEUDOPLANTAGO Suesseng. in Fedde, Repert. xxxv. 334 (1934). *AMARANTHACEAE.*
Friesii *Suesseng. l. c.* 335.—Argent.

PSEUDORHIPSALIS Britton & Rose (Cactac.).
acuminata *Cufod. in Archiv. Bot., Forlì*, 1933, ix. 196.—Costa Rica.

PSEUDORLAYA Murb. (Umbellif.).
pycnacantha *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 112 (1932).—Marocc.

PSEUDOSASA Makino (Gramin.).
Kunishii (*Hayata*) *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1389 (1931): Arundinaria Kunishii.
Nabeshimana (*Koidz.*) *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 151: Pleioblastus Nabeshimana.
naibunensis (*Hayata*) *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1389 (1931): Arundinaria naibunensis.
oiwakensis (*Hayata*) *Makino & Nemoto, l. c.*: Arundinaria oiwakensis.
Usawai (*Hayata*) *Makino & Nemoto, l. c.* 1390: Arundinaria Usawai.

PSEUDOSEDUM A. Berger (Crassulac.).
bucharicum *Boriss. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 111 (1933).—Ross. asiat. centr.
campanuliflorum *Boriss. l. c.* 115.—Ross. asiat. centr.
condensatum *Boriss. l. c.* 110.—Ross. asiat. centr.
Fedtschenkoanum *Boriss. l. c.* 114.—Ross. asiat. centr.
ferganense *Boriss. l. c.* 112.—Turkestan.
longidentatum *Boriss. l. c.* 109.—Turkestan.
multicaule (*Boiss. & Buhse*) *Boriss. l. c.* 112: Umbilicus multicaulis.

PSEUDOSEMPERVIVUM (Boiss.) Grossheim, Fl. Kavkaza, ii. 159 (1930). *CRUCIFERAE.*
[COCHLEARIA sect. PSEUDOSEMPERVIVUM Boiss.]
karsianum (*N. Busch*) *Grossheim, l. c.*: Cochlearia karsiana.

PSEUDOSOPUBIA Engl. (Scrophulariac.).
polemonioides *Chiov. Fl. Somala*, II. 338 (1932).—Somal. Ital.

PSEUDOSTELLARIA Pax in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, xvi c. 318 (1934): **Kraschenikowia** Turcz. ex Bess. (Caryophyllac.).
Borodinii (*Krylov*) *Pax, l. c.*: Kraschenikowia Borodinii.
bulbosa (*Nakai*) *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 34: Kraschenikowia bulbosa.
coreana (*Nakai*) *Ohwi, l. c.*: Kraschenikowia coreana.
Davidi (*Franch.*) *Pax in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 318 (1934): Kraschenikowia Davidi.
heterantha (*Maxim.*) *Pax, l. c.*: Kraschenikowia heterantha.
heterophylla (*Miq.*) *Pax, l. c.*: Kraschenikowia heterophylla.
himalaica (*Franch.*) *Pax, l. c.*: Kraschenikowia himalaica.
japonica (*Korsh.*) *Pax, l. c.*: Kraschenikowia japonica.
Koidzumiana (*Ohwi*) *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 33: Kraschenikowia Koidzumiana.
Maximowicziana (*Franch. & Sav.*) *Pax in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 318 (1934): Kraschenikowia Maximowicziana.
Palibiniana (*Takeda*) *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 32: Kraschenikowia Palibiniana.
raphanorhiza (*Korsh.*) *Pax in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 318 (1934): Kraschenikowia raphanorhiza.
rigida (*Komarov*) *Pax, l. c.*: Kraschenikowia rigida.
rupestris (*Turcz.*) *Pax, l. c.*: Kraschenikowia rupestris.
silvatica (*Maxim.*) *Pax, l. c.*: Kraschenikowia sylvatica.

PSEUDOTSUGA Carr. (Pinac.; Conif., Gen. Pl.).
californica *Flous in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse*, 1934, lxvi. 330.—U.S.A. (Calif.).
Flahaulti *Flous, l. c.* 332.—U.S.A. (Arizona; N. Mexico; Texas); Mexico.
globulosa *Flous, l. c.* 334.—U.S.A. (S. W. States).
Guinieri *Flous, l. c.* 211, 218.—Mexico.
macrolepis *Flous, l. c.* 219, 224.—U.S.A. (S. States); Mexico.
Merrilli *Flous, l. c.* 336.—U.S.A. (N. W. States).
Rehderi *Flous, l. c.* 338.—U.S.A. (S. W. States).
vancouverensis *Flous, l. c.* 340.—Ins. Vancouver.

PSEUDOWINTERA Dandy in Journ. Bot. 1933, lxxi. 121: **Wintera** G. Forst. ex Van Tiegh., non Murr. (Winterac.; Magnoliac., D. T. & H.).
axillaris (*J. R. & G. Forst.*) *Dandy, l. c.*: Drimys axillaris.
colorata (*Raoul*) *Dandy, l. c.*: Drimys colorata.
Traversii (*J. Buch.*) *Dandy, l. c.* 122: Hymenanthera Traversii.

PSIDIOMYRTUS Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 1932, Sér. II. iv. 693, 696. *MYRTACEAE.*
locellata *Guillaumin, l. c.*—N. Caled.

PSIDIUM L. (Myrtac.).
chrysobalanoides *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 319 (1931).—Brit. Honduras.
hypoglaucum *Standley, l. c.* 320.—Brit. Honduras.
rotundifolium *Standley, l. c.* 318.—Brit. Honduras.
Schippii *Standley, l. c.* 319.—Brit. Honduras.
socorrense *I. M. Johnston in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 81 (1931).—Mexico (Arch. Revillagigedo).

PSILANTHUS Hook. f. (Rubiac.).
jasminoides *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 92 (1931).—Gold Coast.

PSILOCAULON N. E. Brown (Ficoidac.).
calvinianum *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 410 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Dejagerae *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 236 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Duthieae *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 331 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).

PSILOCAULON:—
filipetalum *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 491 (1935).—Namaqualand.
imitans *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 429 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Lewisiae *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 492 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
puberulum *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 163 (1931), in obs., nomen.—Afr. austr.-occ.
roscoalbum *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 493 (1935).—Afr. austr. (Griqualand West).
subintegrum *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 429 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Woodii *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 393 (1933).—Afr. austr.-occ.

PSILOCHILUS Barb. Rodr. (Orchidac.).
guatemalensis *Schlechter in Archiv. Bot. Estad. S. Paulo*, i. 180 (1926), nomen.—Guatem.?
Maderoi (*Schlechter*) *Schlechter, l. c.*, in obs.: Pogonia Maderoi.

PSILOËSTHES Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine, iv. 727 (1935), sine descr. *ACANTHACEAE.*
elongata *Benoist, l. c.*—Indo-China (Tonkin).

PSILORHEGMA Britton & Rose (Legumin.).
Gaudichaudi (*Hook. & Arn.*) *Degener, Fl. Hawaiiensis*, Fam. 169 b (1932): Cassia Gaudichaudi.

PSILOTRICHUM Blume (Amaranthac.).
filiforme *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1933, 467.—Tanganyika Terr.
majus *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. Anhang, 27 (1932).—Tanganyika Terr.
ovatum *Peter, l. c.* 28.—Tanganyika Terr.

PSITTACANTHUS Mart. (Loranthac.).
calcaratus *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 89.—Peruv.
dilatatus *A. C. Smith in Phytologia*, i. 20 (1933).—Colomb.
dominicensis *Domin in Acta Bot. Bohem.* ix. 3 (1930).—Ind. occ. (Dominica).
Krausei *Macbride in Candollea*, v. 349 (1934).—Peruv.
leptanthus *A. C. Smith in Phytologia*, i. 113 (1935).—Bras. (Amaz.).
peculiaris *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 90.—Peruv.
verticillatus *A. C. Smith, l. c.* 1932, lix. 514.—Colomb.

PSORALEA L. (Legumin.).
decipiens *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 41 (1933–5).—Mexico.
heterosepala *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 95 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Holubii *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxix. 374 (1932).—Transvaal.
monosperma (*Griseb.*) *Macbride in Candollea*, vi. 10 (1934): Rhynchosia monosperma.
rafaelensis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 41 (1933–5).—U.S.A. (Utah).

PSORALIDIUM Rydb. (Legumin.).
Batesii *Rydb. in Brittonia*, i. 91 (1931).—U.S.A. (Nebraska).

PSOROSPERMUM Spach (Guttif.; Hypericac., Gen. Pl.).
lanceolatum *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxxv. (*Hist. Nat. Pl.* v. Atlas iii.) t. 334 (1896).—Madag.
revolutum *Drake, l. c.* t. 335.—Madag.

PSYCHANTHUS Rafin. Specchio, i. 116 (1814). *POLYGALACEAE.*

PSYCHOTRIA L. (Rubiac.).
adenophylla *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 166 (1824).—Ind. or. (Assam).
aganosmifolia *Craib in Kew Bull.* 1932, 475.—Siam.
alata *Craib, l. c.* 476.—Siam.
albifaux *K. Schum. ex Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 122, in clavi, 125 (1931).—Nigeria; Cameroons.
aneityensis *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 9.—N. Hebrides.
ardisioides *Craib in Kew Bull.* 1932, 476.—Siam.

PSYCHOTRIA:—
aurantiaca *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 165 (1824).—Penins. Mal.
avakubiensis *De Wild. Pl. Bequaert.* vi. 74 (1932).—Congo Belg.
boliviana *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 302 (1931).—Boliv.
brunnescens *Craib in Kew Bull.* 1932, 477.—Siam.
Buchtieni (*H. Winkl.*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 303 (1931): Uragoga Buchtieni.
cacuminis *Standley, l. c.* 436.—Venez.
Caldwelli *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 91, 30 (1932).—Ins. Viti.
campylopoda *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 437 (1931).—Venez.
Cardenasii *Standley, l. c.* 303.—Boliv.
ceratantha *Standley, l. c.* 439.—Venez.
chartacea *Craib in Kew Bull.* 1932, 477.—Siam.
chimboracensis *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 223 (1931).—Ecuador.
chondroloma *Standley, l. c.* 440.—Venez.
connata *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 163 (1824).—Ind. or.
costata (*Rusby*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 305 (1931): Mapouria costata.
coussareoides *Standley, l. c.* 441.—Venez.
cuneata *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3261 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
curviflora *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 167 (1824).—Penins. Mal.
Dalzielii *Hutchinson in Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 122, in clavi, 125 (1931).—Nigeria.
denticulata *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 166 (1824).—Nepal.
dichotoma (*Rudge*) *Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 301: Cephaëlis dichotoma.
diospyrifolia *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 355.—Ins. Palau.
dubia (*Wight*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 152 (1931): Lasianthus dubius.
duidana *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 443 (1931).—Venez.
durifolia *Standley, l. c.* 444.—Venez.
Dusenii *Standley, l. c.* viii. 378 (1931).—Bras. (Paraná).
ellipsoidea *Craib in Kew Bull.* 1932, 478.—Siam.
Elmerana *Hochr. in Candollea*, v. 270 (1934): P. epiphytica *Elmer.*
esulcata *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 315 (1935).—Ins. Marquesas (Uapou).
Farmari *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 120, in clavi, 123 (1931).—Gold Coast.
fimbriata *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, l. c.*—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
fluctuans *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 446 (1931): Coffea subsessilis *Benth.*, non Psychotria subsessilis *Benth. ex Oerst.*
Fraseri *Ridley in Kew Bull.* 1934, 120.—Borneo.
fuscescens *Craib in Kew Bull.* 1932, 478.—Siam.
Gaudichaudii *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 926.—Ins. Marian. (Rota).
Hayatae *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 379 (1931): P. macrophylla *Hayata.*
hedyotifolia *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 160 (1934).—Sumatra.
hemisphaerica *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 91, 32 (1932).—Ins. Viti.
Hendersoniana *Craib in Kew Bull.* 1932, 479.—Siam.
huallagae *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 376 (1931).—Peruv.
induta *Craib in Kew Bull.* 1932, 479.—Siam.
irosinensis *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3262 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
justiciifolia *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 224 (1931).—Ecuador; Colomb.
Kaessneri *Bremek. in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 278.—Kenya Col.
Kitsonii *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 120, in clavi, 124 (1931).—Gold Coast.

PSYCHOTRIA:—
Klossii *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 191 (1934): P. auriculata *Ridley.*
Klugii *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 377 (1931).—Peruv.
kratensis *Craib in Kew Bull.* 1932, 480.—Siam.
Krauseana *Hochr. in Candollea*, v. 270 (1934): P. inundata *K. Krause.*
ladronica *Hosokawa in Journ. Soc. Trop. Agric. Taiwan*, vi. 669 (1934), nomen; *et in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 38, descr.—Ins. Marian. (Rota).
leptothyrsoides *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 355.—Ins. Carolin. (Truk).
levuensis *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 91, 32 (1932).—Ins. Viti.
lineolata *Craib in Kew Bull.* 1932, 480.—Siam.
lutescens *Craib, l. c.* 481.—Siam.
madida *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 226 (1931).—Ecuador.
mapirensis *Standley, l. c.* 308.—Boliv.
Marcgraviella *Standley, l. c.* viii. 375 (1931).—Peruv.
marginata *Bremek. in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 279.—Tanganyika Terr.
Martii *Colla, Herb. Pedem.* iii. 141 (1834).—Bras.
Merrillii *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 674.—Ins. Carolin. (Ponape).
Mumfordiana *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 311 (1935).—Ins. Marquesas.
Nacdado *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 9.—N. Hebrides.
nairobiensis *Bremek. in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 278.—Kenya Col.; Tanganyika Terr.
nanarautensis *Kanehira*; cf. *Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 400, japonice.—Hab.?
neurocalyx *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 91, 34 (1932).—Ins. Viti.
nigra (*Gaertn.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 152 (1931): Grumilea nigra.
nudiceps *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 378 (1931).—Peruv.
ophioxyloides *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 168 (1824).—Ind. or. (Assam).
Ottonis *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 310 (1931).—Boliv.
palauensis *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 38: P. rotensis *Hosokawa, l. c.* 1934, xxiv. 204, non *Kanehira.*
pallescens (*Rusby*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 310 (1931): Mapouria pallescens.
Pearcei *Standley, l. c.* 311.—Boliv.?
pervicax *Standley, l. c.*—Boliv.
phaneroneura *Standley, l. c.* 455.—Venez.
pilifera *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 120, in clavi, 123 (1931): Cephaëlis Talbotii.
plana *Craib in Kew Bull.* 1932, 481.—Siam.
polita *Craib, l. c.* 482.—Siam.
Pullei *Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 301.—Guiana Bat.
pusilliflora *S. Moore in Journ. Bot.* 1931, lxix. 133.—Jamaica.
pycnantha *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 379 (1931): Mapouria brachypoda *Muell.-Arg.*, non Psychotria brachypoda *St. Lag.*
raiateënsis *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 45 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
rapensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 309 (1935).—Polynes. (Ins. Rapa).
Reevesii *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 164 (1824).—China.
rhombocarpa *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 493.—Ins. Carolin. (Kusai).
Rimbachii *Standley in Tropical Woods*, 1935, No. 42, p. 32.—Ecuador.
rotensis *Kanehira, Fl. Micrones.* 373 (1933), japonice; *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 679, latine.—Ins. Marian. (Rota).
Rowlandii *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 121, in clavi, 124 (1931).—Nigeria.
rubropilosa *De Wild. Pl. Bequaert.* vi. 73 (1932).—Gabon.
Rudgei *Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 297, in obs., 301: Cephaëlis justiciifolia.

PSYCHOTRIA:—
rufopilis *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 120, in clavi, 124 (1931).—Guinea Gall.; Sierra Leone; Liberia.
Ruizii *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., vii. 313 (1931).—Boliv.; Peruv.
rutila *Craib in Kew Bull.* 1932, 482.—Siam.
sancti-caroli *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., vii. 458 (1931).—Venez.
Setchelli *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 91, 35 (1932).—Ins. Viti.
Smithiae *Geddes in Kew Bull.* 1932, 483.—Siam.
sorsogonensis *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3264 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
sphaerocarpa (*Hiern*) *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 122, in clavi, 125 (1931), non seq.: Grumilea sphaerocarpa.
sphaerocarpa *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 161 (1824).—Ind. or. (Assam).
Steinbachii *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., vii. 314 (1931).—Boliv.
stipulacea *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 164 (1824).—Penins. Mal.
surinamensis *Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 302.—Guiana Bat.
Swynnertonii *Bremek. in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 277.—Tanganyika Terr.; Rhodesia.
tarambassica *Bremek. l. c.* 280.—Kenya Col.
tarapotensis *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., viii. 377 (1931).—Peruv.
Tatei *Standley, l. c.* vii. 460 (1931).—Venez.
Taupotinii *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 130, 313 (1935).—Ins. Marquesas (Nukuhiva).
temehaniensis *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 102, 46 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
tipuanensis *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., vii. 315 (1931).—Boliv.
toviana *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 130, 311 (1935).—Ins. Marquesas (Nukuhiva).
truncata *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 162 (1824).—Ind. or.
umbraticola *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 91, 36 (1932).—Ins. Viti.
Valetonii *Hochr. in Candollea,* v. 266 (1934): P. aurantiaca *Blume, Bijdr.* 962 (1826); *Valeton in Ic. Bogor.* t. 283 (1909), non *Wall.*
vasivensis (*Muell.-Arg.*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., vii. 461 (1931): Mapouria vasivensis.
vernicifolia *Standley, l. c.* 462.—Venez.
viburnifolia *Craib in Kew Bull.* 1932, 483.—Siam.
vomensis *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 91, 37 (1932).—Ins. Viti.
vulcanica *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3265 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
warongloaënsis *Hochr. in Candollea,* v. 263 (1934).—Java.
Welwitschii (*Hiern*) *Bremek. in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 278: Grumilea Welwitschii.
Williamsii *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 121, in clavi, 124 (1931).—Gold Coast.
Winitii *Craib in Kew Bull.* 1932, 484.—Siam.

PTARMICA Mill. (Compos.).
Alexandri-Regis *Bornm. & Rudsky in Fedde, Repert.* xxxviii. 390 (1935), in syn.: Achillea Alexandri-Regis.

PTELEOCARPA Oliv. (Boraginac.).
lamponga (*Miq.*) *Bakh. ex K. Heyne, Nutt. Pl. Ned. Ind.*, ed. 2, ii. 1309 (1927): Dodonaea lamponga.

PTELEOPSIS Engl. (Combretac.).
Kerstingii *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 717 (1921), in obs.—Guinea (Togo).
Ledermannii *Engl. & Gilg, l. c.*, in obs.—Congo Belg.

PTELIDIUM Thou. (Celastrac.).
integrifolium *J. St.-Hil. Expos. Fam. Nat.* ii. 345 (1805).—Madag.

PTERALYXIA K. Schum. (Apocynac.).
Caumiana *Degener, Fl. Hawaiiensis,* Fam. 305 (1933).—Ins. Sandvic. (Oahu).
kauaiensis *Caum in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu,* x. No. 8, p. 8 (1933).—Ins. Sandvic.

PTERANDRA A. Juss. (Malpighiac.).
arborea *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1932, Sér. II. iv. 736.—Bras. (Amaz.).

PTERISANTHES Blume (Vitac.; Ampelidac., Gen. Pl.).
grandis *Ridley in Kew Bull.* 1931, 496.—Borneo.
heterotricha *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 167 (1934).—Sumatra.
hirtiflora *Ridley in Kew Bull.* 1931, 497.—Borneo.

PTERNANDRA Jack (Melastomatac.).
azurea (*DC.*) *Burkill in Kew Bull.* 1935, 319; *Burkill, Dict. Econ. Prod. Mal. Penins.* ii. 1825 (1935), in obs.: Kibessia azurea.

PTERNOPETALUM Franch. (Umbellif.).
asplenioides (*Boissieu*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 718 (1933): Cryptotaeniopsis asplenioides.
botrychioides (*Dunn*) *Hand.-Mazz. l. c.*: Cryptotaeniopsis botrychioides.
cardiocarpum (*Franch.*) *Hand.-Mazz. l. c.*: Carum cardiocarpum.
cuneifolium (*H. Wolff*) *Hand.-Mazz. l. c.*: Cryptotaeniopsis cuneifolia.
Delavayi (*Franch.*) *Hand.-Mazz. l. c.*: Carum Delavayi.
delicatulum (*H. Wolff*) *Hand.-Mazz. l. c.*: Carum delicatulum.
filicinum (*Franch.*) *Hand.-Mazz. l. c.*: Carum filicinum.
gracillimum (*H. Wolff*) *Hand.-Mazz. l. c.* 719: Cryptotaeniopsis gracillima.
kiangsiense (*H. Wolff*) *Hand.-Mazz. l. c.*: Cryptotaeniopsis kiangsiensis.
leptophyllum (*Dunn*) *Hand.-Mazz. l. c.*: Cryptotaeniopsis leptophylla.
Mairii (*Diels*) *Hand.-Mazz. l. c.*: Cryptotaeniopsis Mairii.
molle (*Franch.*) *Hand.-Mazz. l. c.* 718: Carum molle.
nudicaule (*Boissieu*) *Hand.-Mazz. l. c.*: Cryptotaeniopsis nudicaulis.
Rosthornii (*Diels*) *Hand.-Mazz. l. c.* 719: Pimpinella Rosthornii.
sinense (*Franch.*) *Hand.-Mazz. l. c.*: Carum sinense.
subalpinum *Hand.-Mazz. l. c.* 718.—China (Yunnan).
Tanakae (*Franch. & Sav.*) *Hand.-Mazz. l. c.* 719: Chamaele Tanakae.
trichomanifolium (*Franch.*) *Hand.-Mazz. l. c.*: Carum trichomanifolium.
viride (*C. Norman*) *Hand.-Mazz. l. c.*: Cryptotaeniopsis viridis.
vulgare (*Dunn*) *Hand.-Mazz. l. c.*: Cryptotaeniopsis vulgaris.
Wolffianum (*Fedde*) *Hand.-Mazz. l. c.*: Cryptotaeniopsis Wolffiana.

PTEROCARPUS L. (Legumin.).
carolinensis *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo,* 1935, xlix. 352.—Ins. Palau; Ins. Carolin. (Yap).
Martinii *Dunkley in Kew Bull.* 1935, 260.—Rhodesia.
saxatilis *Hort. ex Backer, Schoolfl., Java,* 388 (1911), in syn.: P. indica.
Stevensonii *Burtt Davy in Kew Bull.* 1932, 262.—Rhodesia; Afr. Lusit. Or.

PTEROCAULON Ell. (Compos.).
undulatum (*Walt.*) *Mohr in Contrib. U. S. Nat. Herb.* vi. 120, 790 (1901): Gnaphalium undulatum.

PTEROCEPHALUS Adans. (Dipsacac.).
Hookeri (*C. B. Clarke*) *Airy-Shaw & M. L. Green in Hand-List Rock Gard. Pl. Roy. Bot. Gard. Kew,* ed. 4, 109 (1934): Scabiosa Hookeri.
Shepardi *Post & Beauverd in Dinsm. Pl. Post. & Dinsm.* Fasc. I. 7 (1932); *Dinsm. in Fedde, Repert.* xxxiii. 106 (1933).—Syria.

PTEROCHROSIA Baill. (Apocynac.).
vexillaria *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich,* 1933, lxxviii. Beibl. 19, 388.—N. Caled.

PTEROCYCLUS Klotzsch (Umbellif.).
rivulorum (*Diels*) *H. Wolff in Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 717 (1933): Angelica rivulorum.

PTERODISCUS Hook. (Pedaliac.).
coeruleus *Chiov. Fl. Somala,* II. 341 (1932).—Somal. Ital.

PTEROLEPIS Miq. (Melastomatac.).
stenophylla *Gleason in Papers Mich. Acad. Sc.* 1932, xvii. 146 (1933).—Brit. Honduras.

PTERONIA L. (Compos.).
adhaerens *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 313 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
arcuata *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 182 (1932).—Great Namaq.
cancellata *Dinter, l. c.* 184, in obs., pro syn.: P. villosa.
chlorolepis *Dinter, l. c.* 181.—Great Namaq.
Hutchinsoniana *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 314 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
madagascariensis *Humbert in Mém. Soc. Biogéogr.* II. (*Contrib. Étude Peupl. Haut. Mont.*) 209 (1928).—Madag.
quadrifaria *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 182 (1932).—Great Namaq.
quinquecostata *Dinter, l. c.* 183.—Great Namaq.
Smutsii *Hutchinson in Kew Bull.* 1931, 250.—N. Rhodesia.
teretifolia (*Thunb.*) *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 87 (1932): Osteospermum teretifolium.
villosa *L. f.*; *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 184 (1932), descr. emend.—Great Namaq.

PTEROPHYTON Cass. (Compos.).
aristatum (*Ell.*) *Alexander in Small, Man. Southeast. Fl.* 1444 (1933): Helianthus aristatus.
helianthoides (*Michx.*) *Alexander, l. c.*: Verbesina helianthoides.
heterophyllum (*Chapm.*) *Alexander, l. c.*: Actinomeris heterophylla.
pauciflorum (*Nutt.*) *Alexander, l. c.*: Actinomeris pauciflora.

PTEROSPERMUM Schreb. (Sterculiac.).
semisagittatum *Buch.-Ham. ex Roxb.*; *DC. in Mém. Mus. Hist. Nat. Paris,* x. 113, t. 9 (1823), descr.—Ind. or.
Stapfianum *Ridley in Kew Bull.* 1933, 489.—Borneo.

PTEROSTYLIS R. Br. (Orchidac.).
Hamiltonii *Nicholls in Vict. Nat.* l. 89 (1933).—W. Austral.
pulchella *Messmer in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales,* 1933, lviii. 429.—Austral. (N. S. Wales).

PTEROSTYRAX Sieb. & Zucc. (Styracac.).
Leveillei (*Fedde ex Léveillé*) *Chun in Hook. Ic. Pl.* xxxii. t. 3161 (1932): Styrax Leveillei.

PTERYGOTA Schott & Endl. (Sterculiac.).
Aubrevillei *Pellegr. in Bull. Soc. Bot. France,* 1931, lxxviii. 441.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
Schoorkopfii *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 469 (1921), in obs.—Cameroons.
Schumanniana *Engl. l. c.*, in obs.: P. alata.
Schweinfurthii *Engl. l. c.*, in obs.—Afr. trop.
Thwaitesii (*Mast.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon,* vi. Suppl., 31 (1931): Sterculia Thwaitesii.

PTILAGROSTIS Griseb. (Gramin.).
concinna (*Hook.*) *Roshev. in Komarov, Fl. URSS,* ii. 75 (1934): Stipa concinna.
purpurea (*Griseb.*) *Roshev. l. c.* 76: Stipa purpurea.
subsessiliflora (*Rupr.*) *Roshev. l. c.* 74: Lasiagrostis subsessiliflora.

PTILOTUS R. Br. (Amaranthac.).
chortophytus (*Diels*) *Schinz in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 57 (1934): Trichinium chortophytum.

PTYCHANDRA Scheff. (Palmae).
glabra *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 713 (1933).—N. Guin.
montana *Burret, l. c.* xii. 324 (1935).—N. Guin.

PTYCHOCOCCUS Becc. (Palmae).
Albertisianus *Becc. ex Martelli in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1934, n. s. xli. 708 (1935), nomen; *et l. c.* 1935, n. s. xlii. 74, 78: Ptychosperma paradoxum *Becc. Malesia*, i. 60, 255 (1877), non *Scheff.*

PTYCHOLOBIUM Harms in Engl. Pflanzenw. Afr. iii. 1. (Engl. & Drude, Veg. der Erde, ix.) 591 (1915). *LEGUMINOSAE.*
plicatum (*Oliv.*) *Harms, l. c.*, in obs.: Tephrosia plicata.

PTYCHOMERIA Benth. (Burmanniac.).
mattogrossensis *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 9, 21 (1935).—Bras. (Matto Grosso).

PTYCHOPETALUM Benth. (Olacac.).
acuminatissimum *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 283 (1899).—Cameroons.
uncinatum *Anselmino in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 624 (1932).—Bras. (Amaz.).

PTYCHOSPERMA Labill. (Palmae).
advenum *Becc. in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa*, Mem., 1934, xliv. 141.—N. Guin.?
ambiguum (*Becc.*) *Becc. ex Martelli in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1934, n. s. xli. 709 (1935), nomen; *et l. c.* 1935, n. s. xlii. 75: Actinophloeus ambiguus.
cuneatum (*Burret*) *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 595 (1935): Actinophloeus cuneatus.
furcatum (*Becc.*) *Becc. ex Martelli in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1934, n. s. xli. 710 (1935), nomen; *et l. c.* 1935, n. s. xlii. 77: Actinophloeus furcatus.
hospitum (*Burret*) *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 596 (1935): Actinophloeus hospitus.
Julianetti *Becc. in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa*, Mem., 1934, xliv. 143.—N. Guin.
keyense (*Becc.*) *Becc. ex Martelli in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1934, n. s. xli. 710 (1935), nomen; *et l. c.* 1935, n. s. xlii. 77: Drymophloeus propinquus var. keyensis.
lineare (*Burret*) *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 596 (1935): Actinophloeus linearis.
macrocerum *Becc. in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa*, Mem., 1934, xliv. 142.—N. Guin.
macrospadix (*Burret*) *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 596 (1935): Actinophloeus macrospadix.
mambare (*Bailey*) *Becc. ex Martelli in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1934, n. s. xli. 709 (1935), nomen; *et l. c.* 1935, n. s. xlii. 78: Drymophloeus mambare.
microcarpum (*Burret*) *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 596 (1935): Actinophloeus microcarpus.
montanum (*Lauterb. & K. Schum.*) *Burret, l. c.* 595: Drymophloeus montanus.
praemorsum *Becc. in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa*, Mem., 1934, xliv. 145.—N. Guin.
propinquum (*Becc.*) *Becc. ex Martelli in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1934, n. s. xli. 710 (1935), nomen; *et l. c.* 1935, n. s. xlii. 79: Actinophloeus propinquus.
punctulatum (*Becc.*) *Becc. ex Martelli, l. c.* 709, nomen; *et l. c.*: Actinophloeus punctulatus.
salomonense *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 45 (1934).—Ins. Solomon.
Schefferii *Becc. ex Martelli in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1934, n. s. xli. 709 (1935), nomen.—N. Guin.
tenue *Becc. in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa*, Mem., 1934, xliv. 147.—N. Guin.

PTYSSIGLOTTIS T. Anders. (Acanthac.).
anguina *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iv. 754 (1935).—Indo-China (Laos).
laxa (*Lindau*) *Benoist, l. c.* 755: Ophiorrhiziphyllon laxum.
tonkinensis *Benoist, l. c.* 754.—Indo-China (Tonkin).

PUBILARIA Rafin. (Liliac.).
planifolia *G. Sampaio ex Pereira in An. Fac. Sc. Porto*, xvii. 145 (1932), nomen.—Lusitan.

PUCCINELLIA Parl. (Gramin.).
adpressa *Ohwi in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 380.—Corea.
alticola *Litw. ex Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 484 (1934), in syn.: Atropis alticola.
anisoclada *Krecz. l. c.* 487, in syn.: Atropis anisoclada.

PUCCINELLIA:—
bulbosa *Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 114 (1928).—Caucas.
chilochloa *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 487 (1934), in syn.: Atropis chilochloa.
chinampoënsis *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 31.—Manchur.; Corea.
choresmica *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 479 (1934), in syn.: Atropis choresmica.
convoluta (*Hornem.*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 115 (1928): Poa convoluta.
diffusa *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 490 (1934), in syn.: Atropis diffusa.
dolicholepis *Krecz. l. c.* 488, in syn.: Atropis dolicholepis.
Embergeri *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 22 (1932).—Marocc.
geniculata *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 471 (1934), in syn.: Atropis geniculata.
Grossheimiana *Krecz. l. c.* 477, in syn.: Atropis Grossheimiana.
Hackeliana *Krecz. l. c.* 484, in syn.: Atropis Hackeliana.
Hauptiana *Krecz. l. c.* 485, in syn.: Atropis Hauptiana.
Holmbergii *Jansen & Wachter in Ned. Kruidk. Arch., Versl.* 1935, xlv. 20.—Am. centr.?
humilis *Litw. ex Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 473 (1934), in syn.: Atropis humilis.
iliensis *Krecz. l. c.* 485, in syn.: Atropis iliensis.
jenisseiensis *Krecz. l. c.* 471, in syn.: Atropis jenisseiensis.
Kobayashii *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 31.—Manchur.
Korshinskyana *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 489 (1934), in syn.: Atropis tenuissima.
laeviuscula *Krecz. l. c.* 483, in syn.: Atropis laeviuscula.
macranthera *Krecz. l. c.* 471, in syn.: Atropis macranthera.
macropus *Krecz. l. c.* 489, in syn.: Atropis macropus.
manchuriensis *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 31.—Manchur.
nipponica *Ohwi in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 379.—Japon.
palustris (*Seenus*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 115 (1928): Festuca palustris.
pamirica *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 474 (1934), in syn.: Atropis pamirica.
pauciramea *Krecz. l. c.* 477, in syn.: Atropis pauciramea.
poecilantha *Krecz. l. c.* 472, in syn.: Atropis poecilantha.
pseudo-distans (*Crép.*) *Jansen & Wachter in Ned. Kruidk. Arch., Versl.* 1935, xlv. 10: Glyceria pseudo-distans.
pulvinata *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 478 (1934), in syn.: Atropis pulvinata.
pumila (*Vasey*) *Hitchcock in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 129: Glyceria pumila.
Roshevitsiana *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 493 (1934), in syn.: Atropis Roshevitsiana.
sachalinensis *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 32.—Sakhalin.
sclerodes *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 488 (1934), in syn.: Atropis sclerodes.
sevangensis *Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 114 (1928).—Caucas.
stricta *Keng in Sinensia*, iv. 321 (1934).—China (Kiangsu).
subspicata *Krecz. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 474 (1934), in syn.: Atropis subspicata.
tenuissima *Litw. ex Krecz. l. c.* 489, in syn.: Atropis tenuissima.
Teyberi *Hayek in Fedde, Repert. Beih.* xxx. iii. 274 (1932): Atropis rupestris *Teyb.*, non Puccinellia rupestris *Fernald & Weatherby*.
Vahliana (*Liebm.*) *A. Tolmatch. in Trav. Mus. Bot. Acad. Sc. URSS*, xxiv. 283 (1932): Poa Vahliana.

PUERARIA DC. (Legumin.).
montana (*Lour.*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. ii. 10, 210 (1935): Dolichos montanus.

PUGIONIUM Gaertn. (Crucif.).
calcaratum *Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 718 (1932).—Mongol.

PUGIONIUM:—
cristatum *Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 719 (1932).—Mongol.
pterocarpum *Komarov, l. c.* 720.—Mongol.

PULEGIUM Mill. (Labiat.).
parviflorum (*Req.*) *G. Sampaio in An. Fac. Sc. Porto*, xvii. 50 (1931): Thymus parviflorus.

PULICARIA Gaertn. (Compos.).
attentuata *Hutchinson & B. L. Burtt in Kew Bull.* 1933, 149.—Sudan. (Darfur).
glandulosa *Caballero in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 28, 20 (1935).—Marocc.
hesperia *Maire, Weiller & Wilczek in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1935, xxvi. 121, 210.—Marocc.
Lhotei *Maire, l. c.* 209.—Sahara.
Lozanoi *Caballero in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 28, 19 (1935), in obs., nomen alternativ.—Marocc.
Pomeliana *Faure & Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1933, xxiv. 216.—Alger.
zimbabwensis *S. Moore in Journ. Bot.* 1932, lxx. 133.—S. Rhodesia.

PULSATILLA Mill. (Ranunculac.).
andina (*Rupr.*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 107 (1930): P. albana var. andina.
devinensis *Domin in Preslia*, xiii–xv. 82 (1935), in syn.: P. mixta.
× Holubyana *Domin, l. c.*—Czechoslovak.
hungarica *Soó in Journ. Ecol.* 1929, xvii. 337, in obs.; *et in Bot. Közl.* 1932, xxix. 122, 131.—Hungar.
integrifolia *Tatewaki & Ohwi ex Miyabe & Tatewaki in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.* xiv. 2 (1935), in syn.: Miyakea integrifolia.
nipponica (*Takeda*) *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 36, in adnot.: Anemone Taraoi var. nipponica.
Regeliana (*Maxim.*) *Krylov, Fl. Sibir. Occ.* v. 1167 (1931): Anemone Regeliana.
Sugawarai *Miyabe & Tatewaki in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.* xiv. 4 (1935).—Sakhalin.
Taraoi (*Makino*) *Takeda ex Zamels & Paegle in Acta Hort. Bot. Univ. Latv.* 1927, ii. 140, in obs.; *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 36: Anemone patens subvar. Taraoi.
Turczaninovii *Krylov & Sergievsk. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1930, Nos. 5–6, p. 1.—Sibir.

PULTENAEA Sm. (Legumin.).
quadricolor *J. M. Black in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1931, lv. 139.—S. Austral.

PUNICA L. (Punicac.; Lythrac., Gen. Pl.).
multiflora *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 324 (1894), in syn.: P. Granatum.

PUPALIA Juss. (Amaranthac.).
grandiflora *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. ii. Anhang, 22 (1932).—Tanganyika Terr.
tomentosa *Peter, l. c.* 23.—Tanganyika Terr.

PURDIAEA Planch. (Cyrillac.).
Weberbaueri (*Gilg*) *Mattick in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 393, 398 (1935): Alloiosepalum Weberbaueri.

PURPUSIA T. S. Brandegee (Rosac.).
Osterhoutii *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 574.—U.S.A. (Arizona).

PUTORIA Pers. (Rubiac.).
calabrica (*L.*) *DC. Prodr.* iv. 577 (1830): Asperula calabrica.
foetida (*Lam.*) *A. Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Paris*, v. 160 (1834): Sherardia foetida.

PUYA Molina (Bromeliac.).
depauperata *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcviii. 10 (1932).—Peruv.
gracilis *L. B. Smith, l. c.* 11.—Peruv.
Harmsii (*Castellanos*) *Castellanos in An. Mus. Argent. Cienc. Nat. Buenos Aires*, xxxvii. 497 (1933): P. spathacea var. Harmsii.
lasiopoda *L. B. Smith in Proc. Am. Acad.* lxx. 153 (1935).—Boliv.
llatensis *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcviii. 11 (1932).—Peruv.
Macbridei *L. B. Smith, l. c.* 12.—Peruv.

PUYA:—
pectinata *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcviii. 12 (1932).—Peruv.
penduliflora *L. B. Smith, l. c.*—Boliv.
ramosa *J. St.-Hil. Expos. Fam. Nat.* i. 123 (1805). —Chile.
sanctae-crucis (*Baker*) *L. B. Smith in Proc. Am. Acad.* lxx. 154 (1935): Pitcairnia sanctae-crucis.
stipitata *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcviii. 13 (1932).—Peruv.

PYCNOCOMA Benth. (Euphorbiac.).
Beillei *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 307 (1928), in syn.: P. angustifolia.
Hutchinsonii *Beille in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8,295(1917).—Afr.trop.(Côte d'Ivoire).
sassandrae *Beille, l. c.* 296.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).

PYCNOCYCLA Lindl. in Royle, Ill. Bot. Himal. t. 51, fig. 1, a–h (Jan. 1835); et l. c. p. 232 (Aug. 1835). *UMBELLIFERAE.*

PYCNOPHYLLOPSIS Skottsb. (Caryophyllac.).
keraiopetala *Mattf. in Schrift. Ver. Naturk. Unterweser*, n. s. vii. reimpr. p. 22 (1934).—Boliv.

PYCNOPHYLLUM Remy (Caryophyllac.).
kobalanthum *Mattf. in Fedde, Repert.* xxxvi. 274 (1934).—Boliv.

PYCNOSTACHYS Hook. (Labiat.).
angolensis *G. Taylor in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl. 2, 164.—Angola.
clinodon *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 405 (1932).—Tanganyika Terr.
gracilis *Good in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl. 2, 164.—Angola.
Schliebenii *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 405 (1932).—Tanganyika Terr.

PYCNOSTELMA Bunge (Asclepiadac.).
leucanthum *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 105.—Manchur.

PYCREUS Beauv. (Cyperac.).
acuticarinatus (*Kükenth.*) *Cherm. in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 262: Cyperus acuticarinatus.
ater (*C. B. Clarke*) *Cherm. in Arch. Bot., Caen*, iv. Mém. No. 7, 11 (1931): Juncellus ater.
badius (*Desf.*) *Hayek in Fedde, Repert. Beih.* xxx. III. 147 (1932): Cyperus badius.
colchicus (*K. Koch*) *Schischk. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 152 (1928): Cyperus colchicus.
congestus (*Vahl*) *Hayek in Fedde, Repert. Beih.* xxx. III. 146 (1932): Cyperus congestus.
dentifer *Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 198 (1932), nomen alternativ. —Sibir.
diloloënsis *Kükenth. ex Cherm. in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiv. 296 (1934), in adnot.: P. fibrillosus *Cherm.*, non Cyperus fibrillosus *Kükenth.*
esculentus (*L.*) *Hayek in Fedde, Repert. Beih.* xxx. III. 147 (1932): Cyperus esculentus.
fibrillosus (*Kükenth.*) *Cherm. in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxii. 63 (1932): Cyperus fibrillosus.
glaber (*L.*) *Hayek in Fedde, Repert. Beih.* xxx. III. 146 (1932): Cyperus glaber.
glomeratus (*L.*) *Hayek, l. c.* 145: Cyperus glomeratus.
gratissimus *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 222.—Manchur.
katangensis *Cherm. in De Wild. & Staner, Contrib. Fl. Katanga*, Suppl. v. 11 (1933), nomen; *et in Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. 279 (1935), in syn.: P. Scaettae var. katangensis *Cherm.*
limosus (*Maxim.*) *Schischk. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 8 (1935): Cyperus limosus.
longus (*L.*) *Hayek in Fedde, Repert. Beih.* xxx. III. 146 (1932): Cyperus longus.
nilagiricus (*Hochst. ex Steud.*) *Schischk. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 6 (1935): Cyperus nilagiricus.
patens (*Vahl*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 306 (1931): Cyperus patens.
pratorum (*Korotkji*) *Schischk. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 8 (1935): Cyperus pratorum.
rotundus (*L.*) *Hayek in Fedde, Repert. Beih.* xxx. III. 147 (1932): Cyperus rotundus.
Scaettae *Cherm. in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiv. 295 (1934); *et in Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. 278 (1935).—Congo Belg.
serotinus (*Rottb.*) *Hayek in Fedde, Repert. Beih.* xxx. III. 145 (1932): Cyperus serotinus.

PYCREUS:—
setiformis (*Korsh.*) *Schischk. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 5 (1935): Cyperus setiformis.
strictus (*Lam.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 307 (1931): Cyperus strictus.
Testui *Cherm. in Arch. Bot., Caen*, iv. Mém. No. 7, 13 (1931).—Afr. Gall. Centr.
Vanderysti *Cherm. in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiv. 296 (1934); *et in Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. 279 (1935).—Congo Belg.

PYGEUM Gaertn. (Rosac.).
myriandrum *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 155 (1934).—Sumatra.
odoratum *M. R. Henderson in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 101 (1933).—Penins. Mal.
sterrophyllum *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 156 (1934).—Sumatra.

PYGMAEOTHAMNUS Robyns (Rubiac.).
concrescens *Bullock in Kew Bull.* 1933, 471.—Tanganyika Terr.

PYRACANTHA M. Roem. (Rosac.).
crenato-serrata (*Hance*) *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 72: Photinia crenato-serrata.
Loureiri (*Kostel*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 178 (1935): Mespilus Loureiri.
Pyracantha (*L.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 269 (1894): Mespilus Pyracantha.
Rogersiana *Hort. ex L. H. Bailey, Standard Cycl. Hort.* v. 2864 (1916), in syn.: P. crenulata.

PYRENACANTHA Wight (Icacinac.; Olacac., Gen. Pl.).
Staudtii *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 262 (1921), in obs.—Afr. trop.
Taylori *Engl. l. c.*, in obs.—Kenya Col.
undulata *Engl. l. c.*, in obs.—Guinea (Togo).

PYRENARIA Blume (Theac.; Ternstroemiac., Gen. Pl.).
parviflora *Ridley in Kew Bull.* 1933, 487.—Borneo.

PYRENOGLYPHIS Karst. (Palmae).
aristata (*Mart.*) *Burret in Fedde, Repert.* xxxiv. 242 (1934): Bactris aristata.
bicuspidata (*Spruce*) *Burret, l. c.* 253: Bactris bicuspidata.
bifida (*Mart.*) *Burret, l. c.* xxxiv. 183 (1933), in obs.; *et l. c.* xxxiv. 242 (1934): Bactris bifida.
Brongniartii (*Mart.*) *Burret, l. c.* xxxiv. 251 (1934): Bactris Brongniartii.
chaetorhachis (*Mart.*) *Burret, l. c.* 245: Bactris chaetorhachis.
chapadensis (*Barb. Rodr.*) *Burret, l. c.* 248: Bactris chapadensis.
concinna (*Mart.*) *Burret, l. c.* 242: Bactris concinna.
curuena (*Trail*) *Burret, l. c.* 248: Bactris curuena.
exaltata (*Barb. Rodr.*) *Burret, l. c.* 246: Bactris exaltata.
Gastoniana (*Barb. Rodr.*) *Burret, l. c.* 242: Bactris Gastoniana.
gaviona (*Trail*) *Burret, l. c.* 246: Bactris gaviona.
Hoppii *Burret, l. c.*—Cult.
infesta (*Mart.*) *Burret, l. c.* 248: Bactris infesta.
leucacantha (*Linden & H. Wendl.*) *Burret, l. c.* 249: Bactris leucacantha.
Maraja (*Mart.*) *Burret, l. c.* 252: Bactris Maraja.
mattogrossensis (*Barb. Rodr.*) *Burret, l. c.* 248: Bactris mattogrossensis.
microcarpa *Burret, l. c.* 250.—Guiana Brit.
nemorosa (*Barb. Rodr.*) *Burret, l. c.* 247: Bactris nemorosa.
oligocarpa (*Barb. Rodr.*) *Burret, l. c.* 242: Bactris oligocarpa.
Ottostapfiana (*Barb. Rodr.*) *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 158 (1934): Bactris Ottostapfiana.
pallidispina (*Mart.*) *Burret in Fedde, Repert.* xxxiv. 249 (1934): Bactris pallidispina.
piscatorum (*Wedd. ex Drude*) *Burret, l. c.* 251: Bactris piscatorum.
rivularis (*Barb. Rodr.*) *Burret, l. c.*: Bactris rivularis.
socialis (*Mart.*) *Burret, l. c.* 246: Bactris socialis.
superior (*L. H. Bailey*) *Burret, l. c.*: Bactris superior.
tenera (*Karst.*) *Burret, l. c.* 250: Guilielma tenera.
turbinocarpa (*Barb. Rodr.*) *Burret, l. c.* 248: Bactris turbinocarpa.

PYRETHRUM Zinn, Cat. Pl. Gott. 414 (1757); cf. Sprague in Kew Bull. 1934, 219: **Chrysanthemum** L. (Compos.), partim.
aragonense *Pau ex G. Sampaio in Ann. Acad. Polyt. Porto*, xiv. 162 (1921), in syn.: Leucanthemum aragonense.
Baranovii *Kraschen. & Poljak. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 175 (1933).—Altai.
Buschianum *Sosn. ex N. Busch*; *Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 137 (1934), descr. ross.—Caucas.
demnatense (*Murb.*) *Pau in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 672 [1928]: Chrysanthemum demnatense.
eximium *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 509 (1894), in syn.: Chrysanthemum Parthenium.
Galae *Popov in Trans. Sc. Soc. Turk.* i. 40 (1923).—Bokhara.
Gaubae *Bornm. in Fedde, Repert.* xxxvi. 349 (1934), in syn.: Chrysanthemum Gaubae.
kubense *Grossheim in Trud. Azerb. Otdyel. Zakavk. Fil. Akad. Nauk SSSR*, Sect. Bot. i. 58 (1933). —Transcaucas.
Meyerianum *Sosn. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 135 (1934).—Caucas.
oltense *Sosn. ex Grossheim, l. c.* 131.—Caucas.
oxystegium *Sosn. ex Grossheim, l. c.*—Caucas.
praeteritum (*Horwood*) *Bean, Trees & Shrubs Brit. Isles*, iii. 319 (1933): Chrysanthemum praeteritum.
punctatum (*Desr.*) *Sosn. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 134 (1934): Matricaria punctata.
Roopianum *Bordz. ex Grossheim, l. c.* 136.—Caucas.
santoanum *Kraschen. Popov & Vved. in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 3, 102 (1928). —Pamir.
sevanense *Sosn. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 137 (1934).—Caucas.
Sosnowskyanum *Grossheim, l. c.* 132.—Caucas.
tadshikorum *Kudrj. in Bull. Univ. As. Centr.* xix. 163 (1934), in syn.: Tanacetum tadshikorum.
tamrutense *Sosn. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 131 (1934).—Caucas.
tianschanicum *Kraschen. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 176 (1933).—Turkestan. (Thian Shan).
transcaucasicum *Sosn. in Trud. Azerb. Otdyel. Zakavk. Fil. Akad. Nauk SSSR*, Sect. Bot. i. 46 (1933).—Transcaucas.

PYROLA L. (Pyrolac.; Ericac., Gen. Pl.).
macrocalyx *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 80.—Corea.

PYROSTRIA Roxb., non Comm. (Rubiac.).
hexasperma *Roxb. Hort. Beng.* 83 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 403 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 388 (1832).—Ins. Molucc. (Honimoa).

PYRRHOCACTUS A. Berger (Cactac.).
catamarcensis (*Weber*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 262 (1935): Echinopsis catamarcensis.
dubius *Backeb. l. c.* 263, 415.—Argent.
Froehlichianus (*K. Schum.*) *Backeb. l. c.* 262: Echinocactus Froehlichianus.
horridus (*Colla*) *Backeb. l. c.* 264: Cactus horridus.
mammillarioides (*Hook.*) *Backeb. l. c.* 263: Echinocactus mammillarioides.
Umadeave (*Werderm.*) *Backeb. l. c.* 264: Echinocactus Umadeave.

PYRUS L. (Rosac.).
Arakiana *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 40.—Japon. (Hondo).
argyrophylla *Diap. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 884 (1933); *et in Fedde, Repert.* xxxiv. 39 (1933). —Transcaucas.
Arnoldiana (*Sarg.*) *Bean, Trees & Shrubs Brit. Isles*, iii. 320 (1933): Malus Arnoldiana.
Babauttiagi *Koidz. in Mayebara, Fl. Austrohig.* 25 (1931); *et in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 12.—Japon. (Kiushiu).
corymbifera *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 345.—Manchur.
glomerulata (*Koehne*) *Bean, Trees & Shrubs Brit. Isles*, iii. 322 (1933): Sorbus glomerulata.

PYRUS:—
hakunensis *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 346.—Corea.
higoënsis *Koidz. in Mayebara, Fl. Austrohig.* 26 (1931); *et in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 13.—Japon. (Kiushiu).
hupehensis (*C. K. Schneider*) *Bean, Trees & Shrubs Brit. Isles*, iii. 323 (1933): Sorbus hupehensis.
Kunoriana *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 39.—Japon. (Hondo).
magdeburgensis (*Schoch*) *Bean, Trees & Shrubs Brit. Isles*, iii. 319 (1933): Malus magdeburgensis.
Mayebarana *Koidz. in Mayebara, Fl. Austrohig.* 26 (1931); *et in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 13.—Japon. (Kiushiu).
megalocarpa (*Rehder*) *Bean, Trees & Shrubs Brit. Isles*, iii. 325 (1933): Sorbus megalocarpa.
meliosmifolia (*Rehder*) *Bean, l. c.* 326: Sorbus meliosmifolia.
nankaiensis *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 346.—Corea.
rufa *Nakai, l. c.* 347.—Corea.
Sargentiana (*Koehne*) *Bean, Trees & Shrubs Brit. Isles*, iii. 327 (1933): Sorbus Sargentiana.
scalaris (*Koehne*) *Bean, l. c.* 328: Sorbus scalaris.
seoulensis *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 348.—Corea.
shansiensis *Nakai, l. c.*—China (Shansi).
sitchensis (*Roem.*) *Piper in Piper & Beattie, Fl. Palouse Reg.* 99 (1901): Sorbus sitchensis.
Yukinourana *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 158.—Japon. (Hondo).

Q

QUALEA Aubl. (Vochysiac.).
calantha *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 297 (1931).—Peruv.
cyanea *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 54 (1935).—Bras. (Amaz.).
esmeraldae *Standley in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 380.—Venez.
gracilior *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 296 (1931).—Peruv.
impexa *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 67 (1931).—Peruv.
lancifolia *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 53 (1935).—Bras. (Amaz.).
suprema *Ducke, l. c.*—Bras. (Amaz.).

QUAPOYA Aubl. (Guttif.).
bracteolata *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 177: Rengifa acuminata.

QUEENSLANDIELLA Domin (Cyperac.).
hyalina (*Vahl*) *Ballard in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3208 (1933): Cyperus hyalinus.

QUERCUS L. (Fagac.; Cupulif., Gen. Pl.).
acutangula *Trelease in Fedde, Repert.* xxxiii. 318 (1934).—Mexico.
alienoides *Uyeki in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 253.—Corea.
ambivenulosa *Trelease in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1933, xxiii. 62.—Guatem.
anatolica *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxiii. 336 (1934), in syn.: Q. pubescens.
araxina (*Trautv.*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 23 (1930): Q. Robur var. araxina.
argyrotricha *A. Camus in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 689.—China (Kweichau).
aristigera *Trelease in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1933, xxiii. 63.—Guatem.
atrescentirhachis *Trelease in Fedde, Repert.* xxxiii. 317 (1934).—Mexico.
× Bebbiana *C. K. Schneider, Ill. Handb. Laubholzk.* i. 201 (1904).—Hab. ?
× Beguinotii *Gavioli in Archiv. Bot., Forlì*, 1935, n. s. i. 124.—Ital.
Bornmuelleriana *O. Schwarz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 464 (1935).—As. Min. (Galatia).
brevistyla *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 353; *A. Camus, Les Chênes, Monogr. Gen. Quercus* (*Encycl. Écon. Sylv.* vi.) Atlas, i. tt. 17, x. (1934).—Penins. Mal.
bulgurluensis *A. Camus, Les Chênes, Monogr. Gen. Quercus*, (*Encycl. Écon. Sylv.* vi.) Atlas, i. tt. 51, xxiv. (1934); *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 814 (1935).—As. Min.

QUERCUS:—
× catalaunica *Sennen & Pau in Cadevall & Font Quer, Fl. Catal.* v. 172 (1933), in obs.—Hispan.
caudatilimba *Merrill in Sunyatsenia*, ii. 212 (1935).—China (Hainan).
cerridolepis *O. Schwarz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 468 (1935).—Alger.
chichavacana *Trelease in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1933, xxiii. 62.—Guatem.
chimaltenangana *Trelease, l. c.*—Guatem.
Chingii *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* x. 482 (1931).—China (Fokien; Chekiang).
Chungii *Metcalf, l. c.* 481.—China (Fokien).
coccinata *Trelease in Fedde, Repert.* xxxiii. 317 (1934).—Mexico.
colchica *Czecz. in Acta Soc. Bot. Polon.* 1932, ix. 43.—As. Min. (Bithynia; Paphlagonia).
crassilamellata (*Gamble*) *A. Camus in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 689: Q. turbinata var. crassilamellata.
crassivenosa *Trelease in Fedde, Repert.* xxxiii. 316 (1934).—Mexico.
crispuloides *Uyeki, Notes Woody Pl. Chosen*, 2 [1934].—Corea.
daichangensis (doichangensis) *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 355; *A. Camus, Les Chênes, Monogr. Gen. Quercus* (*Encycl. Écon. Sylv.* vi.) Atlas, i. t. 34 (1934).—Siam.
dolichostyla *A. Camus, Les Chênes, Monogr. Gen. Quercus* (*Encycl. Écon. Sylv.* vi.) Atlas, i. t. 34, Expl. Pl. p. 28 (1934), in adnot.—China (Kweichau).
erubescens *Trelease in Fedde, Repert.* xxxiii. 315 (1934).—Mexico.
esculiformis *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxiii. 331 (1934); *et in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 465 (1935).—Thracia.
estremadurensis *O. Schwarz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 463 (1935).—Lusitan.
Fenzeliana (*A. Camus*) *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 56 (1934): Lithocarpus Fenzelianus.
× Ferreirae *A. Camus in Riv. Scient.* 1934, xxi. 44.—Lusitan.
fructiseptata *A. Camus, Les Chênes, Monogr. Gen. Quercus* (*Encycl. Écon. Sylv.* vi.) Atlas, i. Expl. Pl. p. 22 (1934), in adnot.—Indo-China (Anam).
Gambleana *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 354; *A. Camus, Les Chênes, Monogr. Gen. Quercus* (*Encycl. Écon. Sylv.* vi.) Atlas, i. t. 11 (1934).—Ind. or. (Bengal).
Gomeziana *A. Camus in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 338: Q. velutina *Lindl.*
graciliformis *C. H. Muell. in Torreya*, 1934, xxxiv. 120.—U.S.A. (Texas).
Handeliana *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 355: Q. parvifolia *Hand.-Mazz.*
Hendersoniana *A. Camus in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 123.—Penins. Mal.
Hilldebrandii *A. Camus, Les Chênes, Monogr. Gen. Quercus* (*Encycl. Écon. Sylv.* vi.) Atlas, i. t. 9, Expl. Pl. p. 11 (1934).—Burma.
hypoleucoides *A. Camus in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 124: Q. hypoleuca *Engelm.*
× inaequalis *Palmer & Steyerm. in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1935, xxii. 521.—U.S.A. (Missouri; Arkansas; Louisiana).
Jenseniana *Hand.-Mazz. in Sinensia*, ii. 123 (1932).—China (Kwangsi).
kontumensis *A. Camus, Les Chênes, Monogr. Gen. Quercus* (*Encycl. Écon. Sylv.* vi.) Atlas, i. Expl. Pl. p. 24 (1934).—Indo-China (Anam).
Kotschyana *O. Schwarz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 466 (1935).—Libanus.
Kozlowskyi *Woronow ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 24 (1930).—Caucas.
lampadaria (*Gamble*) *Burkill in Kew Bull.* 1935, 318; *Burkill, Dict. Econ. Prod. Mal. Penins.* ii. 1857 (1935): Pasania lampadaria.
Lobbii (*Wenzig*) *A. Camus in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 337, cum descr. ampl.: Q. lineata var. Lobbii.
lodicosa *E. F. Warb. in Journ. Roy. Hort. Soc.* 1933, lviii. 182, 188; *et in Kew Bull.* 1933, 188.—S. E. Tibet; Upper Burma.
longispica *A. Camus, Les Chênes, Monogr. Gen. Quercus* (*Encycl. Écon. Sylv.* vi.) Atlas, i. t. 37, Expl. Pl. p. 30 (1934).—China (Yunnan).

QUERCUS:—
× lucana *Gavioli in Archiv. Bot., Forlì*, 1935, n. s. i. 124.—Ital.
Lyautey *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 110 [1933], nomen.—Marocc.
Maingayi (*Schott.*) *Burkill in Kew Bull.* 1935, 318; *Burkill, Dict. Econ. Prod. Mal. Penins.* ii. 1854 (1935), in obs.: Pasania Maingayi.
malacotricha *A. Camus in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1933, Sér. II. v. 88.—China (Yunnan).
malinaltepecana *Trelease in Fedde, Repert.* xxxiii. 318 (1934).—Mexico.
mandanensis *Rydb. in Brittonia*, i. 86 (1931).—U.S.A. (S. Dakota; Minnesota).
mississippiensis *Ashe in Torreya*, 1931, xxxi. 39.—U.S.A. (Arkansas; Louisiana).
× Molleri *A. Camus in Riv. Scient.* 1934, xxi. 44.—Lusitan.
× mutabilis *Palmer & Steyerm. in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1935, xxii. 521.—U.S.A. (Missouri).
neoglandulosa *Nakai in Uyeki, Notes Woody Pl. Chosen*, 2 [1934].—Corea.
nigirhachis *Trelease in Fedde, Repert.* xxxiii. 314 (1934).—Mexico.
obscurirhachis *Trelease, l. c.* 315.—Mexico.
obtusanthera *Trelease, l. c.* 318.—Mexico.
patkoiensis *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 353; *A. Camus, Les Chênes, Monogr. Gen. Quercus* (*Encycl. Écon. Sylv.* vi.) Atlas, i. t. 18 (1934).—Ind. or. (Assam).
paucilepis *Uyeki in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 254.—Corea.
pinatubensis *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3188 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
pinnatipartita *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxiii. 334 (1934), in syn.: Q. brutia.
pongtungensis *Uyeki in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 254.—Corea.
porriginosa *Trelease in Fedde, Repert.* xxxiii. 316 (1934).—Mexico.
pseudodentata *Uyeki in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 254.—Corea.
pseudorigida *Kotschy ex A. Camus, Les Chênes, Monogr. Gen. Quercus* (*Encycl. Écon. Sylv.* vi.) Atlas, i. t. 51 (1934); *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 814 (1935).—As. Min.
pseudosemicarpifolia *A. Camus, Les Chênes, Monogr. Gen. Quercus* (*Encycl. Écon. Sylv.* vi.) Atlas, i. Expl. Pl. p. 31 (1934): Q. semicarpifolia subsp. glabra *Hand.-Mazz.*, non Q. glabra *Thunb.*
puberula *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxiii. 337 (1934), in syn.: Q. infectoria.
robusta *C. H. Muell. in Torreya*, 1934, xxxiv. 119.—U.S.A. (Texas).
rubescens *Trelease in Fedde, Repert.* xxxiii. 316 (1934).—Mexico.
rubramenta *Trelease, l. c.* 318.—Mexico.
Salzmanniana (*Webb*) *Coutinho in Bol. Soc. Brot.* Sér. II. x. 76 (1935), in clavi: Q. lusitanica var. Salzmanniana.
saravanensis *A. Camus, Les Chênes, Monogr. Gen. Quercus* (*Encycl. Écon. Sylv.* vi.) Atlas, i. Expl. Pl. p. 19 (1934), in adnot.—Indo-China (Laos).
Schippii *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 53 (1935).—Brit. Honduras.
Schultzei *Trelease in Fedde, Repert.* xxxiii. 316 (1934).—Mexico.
serratoides *Uyeki in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 253.—Corea.
× Shirlingii *Bush apud Palmer & Steyerm. in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1935, xxii. 521.—U.S.A. (Missouri).
Sintenisiana *O. Schwarz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 468 (1935).—Persia.
Skutchii *Trelease in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1933, xxiii. 61.—Guatem.
spathulistipula *Trelease in Fedde, Repert.* xxxiii. 319 (1934).—Mexico.
Stewardiana *A. Camus, Les Chênes, Monogr. Gen. Quercus* (*Encycl. Écon. Sylv.* vi.) Atlas, i. Expl. Pl. p. 12 (1934), in adnot.—China (Kweichau).
× stranjensis *Turrill in Bull. Soc. Bot. Bulgar.* ii. 62 (1928).—Bulgar.
subobtusifolia *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 816 (1935): Q. obtusifolia *Rydb.*
subsericea *A. Camus, l. c.* 1933, lxxx. 354: Q. sericea *Scheff.*

QUERCUS:—
suchiensis *E. F. Warb. in Journ. Roy. Hort. Soc.* 1933, lviii. 186, 187; *et in Kew Bull.* 1933, 188. —Mexico.
taliensis *A. Camus in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 122.—China (Yunnan).
texquitzinae *Trelease in Fedde, Repert.* xxxiii. 315 (1934).—Mexico.
tinfanensis *A. Camus in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 337.—China (Kweichau).
Treleaseana *A. Camus, l. c.* 1932, Sér. II. iv. 124: Q. major *Trelease*.
tukhtensis *Czecz. in Acta Soc. Bot. Polon.* 1932, ix. 44.—As. Min. (Paphlagonia).
×vaga *Palmer & Steyerm. in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1935, xxii. 521.—U.S.A. (Missouri).
verrucosirama *Trelease in Fedde, Repert.* xxxiii. 319 (1934).—Mexico.

QUESNELIA Gaudich. (Bromeliac.).
Hoehnei *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcv. 43 (1931).—Bras. (S. Paulo).
Morreniana (*Baker*) *Mez in Engl. Pflanzenreich, Bromeliac.* 176 (1935): Billbergia Morreniana.

QUIABENTIA Britton & Rose (Cactac.).
chacoënsis *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 100, 410 (1935).—Argent.

QUIINA Aubl. (Quiinac.; Guttif., Gen. Pl.).
grandifolia *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 299 (1931).—Peruv.
indigofera *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 178.—Guiana Brit.
Klugii *Macbride in Candollea*, v. 387 (1934).—Peruv.
nitens *Macbride, l. c.* 388.—Peruv.
Tessmannii *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 298 (1931).—Peruv.

QUINCHAMALIUM Juss. (Santalac.).
peruvianum *J. St.-Hil. Expos. Fam. Nat.* i. 175 (1805).—Peruv.

QUISQUALIS L. (Combretac.).
conferta (*Jack*) *Exell in Journ. Bot.* 1931, lxix. 122: Sphalanthus confertus.
exannulata (*O. Hoffm.*) *Exell, l. c.* 120, in obs., 121: Cacoucia exannulata.
Hensii (*Engl. & Diels*) *Exell, l. c.* 120: Combretum Hensii.
latialata (*Engl. ex Engl. & Diels*) *Exell, l. c.* 121: Combretum latialatum.
littorea (*Engl.*) *Exell, l. c.*: Cacoucia littorea.
mussaendiflora (*Engl. & Diels*) *Exell, l. c.*: Combretum mussaendiflorum.
parvifolia (*Ridley*) *Exell, l. c.* 123: Q. densiflora var. parvifolia.
Pellegriniana (*Exell*) *Exell, l. c.* 121: Combretum Pellegrinianum.
Thorelii *Exell, l. c.* 122.—Indo-China (Laos).

R

RABIEA N. E. Brown; N. E. Brown in Gard. Chron. 1931, Ser. III. lxxxix. 53, descr. ampl. *FICOIDACEAE*.
albinota (*Haw.*) *N. E. Brown, l. c.*: Mesembryanthemum albinotum.
albipuncta (*Haw.*) *N. E. Brown, l. c.* 54: Mesembryanthemum albipunctum.
carolinensis (*L. Bolus*) *N. E. Brown, l. c.* 53: Mesembryanthemum carolinense.
cibdela (*N. E. Brown*) *N. E. Brown, l. c.* 54: Mesembryanthemum cibdelum.
Lesliei *N. E. Brown, l. c.*—Orange Free State.
tersa *N. E. Brown, l. c.*—Afr. austr. (Griqualand West).

RACEMARIA Rafin. Atlant. Journ. 151 (1832), in obs., in syn.: **Maianthemum** ('Mayanthus') (Liliac.).

RADERMACHERA Zoll. & Mor. (Bignoniac.).
ramiflora *v. Steenis in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 5.—Borneo.

RADICULA Hill (Crucif.).
globosa (*Turcz.*) *Hu ex P'ei in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., ix. 44 (1933): Nasturtium globosum.

RADICULA:—
microsperma (*DC.*) *Hu ex P'ei in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., ix. 45 (1933): Nasturtium microspermum.
montana (*Wall.*) *Hu ex P'ei, l. c.*: Nasturtium montanum.

RADINOSIPHON N. E. Brown in Trans. Roy. Soc. S. Afr. xx. 262 (1932). *IRIDACEAE*.
Cameronii *N. E. Brown, l. c.* 263, in clavi.—Nyasaland.
holostachya (*Baker*) *N. E. Brown, l. c.*, in clavi: Lapeyrousia holostachya.
leptosiphon (*F. Bolus*) *N. E. Brown, l. c.*, in clavi: Gladiolus leptosiphon.
leptostachya (*Baker*) *N. E. Brown, l. c.*, in clavi: Lapeyrousia leptostachya.
lomatensis (*N. E. Brown*) *N. E. Brown, l. c.*, in clavi: Acidanthera lomatensis.

RAFFENALDIA Godr. (Crucif.).
platycarpa (*Coss.*) *Stapf in Bot. Mag.* sub t. 9267 (1932): Cossonia platycarpa.

RAILLIARDIA Gaudich. (Compos.).
coriacea *Sherff in Bot. Gaz.* xcv. 80 (1933).—Ins. Sandvic.
demissifolia *Sherff, l. c.* 78.—Ins. Sandvic.
×dolosa *Degener & Sherff, l. c.* xcvi. 152 (1934).—Ins. Sandvic.
lonchophylla *Sherff in Am. Journ. Bot.* 1933, xx. 619.—Ins. Sandvic.
reticulata *Sherff in Bot. Gaz.* xcv. 78 (1933).—Ins. Sandvic.
Rocki *Sherff, l. c.* 79.—Ins. Sandvic.
ternifolia *Sherff in Am. Journ. Bot.* 1933, xx. 618. —Ins. Sandvic.
thyrsiflora *Sherff, l. c.*—Ins. Sandvic.
×vafra *Degener & Sherff in Bot. Gaz.* xcvi. 153 (1934).—Ins. Sandvic.

×**RAILLIAUTIA** Sherff in Bull. Bishop Mus., Honolulu, No. 135, p. 136 (1935), in obs. *COMPOSITAE*.
[DUBAUTIA × RAILLIARDIA.]
fallax (*Sherff*) *Sherff, l. c.*, in obs.: Dubautia fallax.
fucosa (*Sherff*) *Sherff, l. c.*, in obs.: Dubautia fucosa.

RAIMONDIA Safford (Annonac.).
cherimolioides (*Triana & Planch.*) *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* x. 82 (1930): Annona cherimolioides.
tenuiflora (*Mart.*) *R. E. Fries, l. c.* 85: Annona tenuiflora.

RAJANIA L. (Dioscoreac.).
marginata *Knuth in Fedde, Repert.* xxxviii. 121 (1935).—Haiti.
Wilsoniana *Morton in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1933, xlvi. 85.—Cuba.

RAMATUELA H. B. & K. (Combretac.).
crispialata *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 65 (1935).—Bras. (Amaz.).

RANDIA L. (Rubiac.).
alveolata *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3266 (1934). —Ins. Philipp. (Luzon).
amaralioides *K. Schum. ex Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 77, in clavi, 79 (1931).—Gold Coast; Nigeria.
asperifolia (*Sandwith*) *Sandwith in Kew Bull.* 1933, 333: Basanacantha asperifolia.
bispinosa (*Griff.*) *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 99 (1932): Stylocoryna bispinosa.
celastroidea *Craib, l. c.*; *Craib in Kew Bull.* 1932, 282, descr. ampl.—Siam.
cochinchinensis (*Lour.*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 365 (1935): Aidia cochinchinensis.
Cookii *Standley in N. Am. Fl.* xxxii. 176 (1934).—Guatem.
coriacea *K. Schum. ex Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 77, in clavi, 78 (1931).—Nigeria; Congo Lusit.
crassispina *Geddes in Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 100 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 283, descr. ampl.—Siam.
Ehrenbergii *Standley in N. Am. Fl.* xxxii. 167 (1934).—Mexico.
elliptica *Geddes in Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 100 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 283, descr. ampl.—Siam.

RANDIA:—
esculenta (*Lour.*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 366 (1935): Genipa esculenta.
Fiorii (*Chiov.*) *Chiov. Fl. Somala*, II. 234 (1932): Gardenia Fiorii.
Forrestii *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 204 (1934).—China (Yunnan).
fusca *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 102 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 284, descr. ampl.—Siam.
hainanensis *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xi. 58 (1932).—China (Hainan).
hispida *Ducke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 477 (1932).—Bras. (Amaz.).
inermis (*Ducke*) *Ducke, l. c.* 478: Basanacantha inermis.
Keithii *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1932, 180.—Borneo.
Lane-Poolei *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 77, in clavi, 78 (1931).—Sierra Leone; Liberia.
leptactinioides *K. Schum. ex Hutchinson & Dalziel, l. c.*—Nigeria; Cameroons.
ligustrifolia *Geddes in Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 102 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 284, descr. ampl.—Siam.
martinicensis (*Urb.*) *Standley in N. Am. Fl.* xxxii. 169 (1934): Basanacantha martinicensis.
Merrillii *Chun in Sunyatsenia*, ii. 46 (1934): R. caudatifolia *Merrill*.
murina *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 104 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 285, descr. ampl.—Siam.
mussaendoides *Craib, l. c.*; *Craib, l. c.* 286, descr. ampl.—Siam.
oaxacana *Standley in N. Am. Fl.* xxxii. 165 (1934). —Mexico.
pilosa *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 110 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 286, descr. ampl.—Siam.
plumbea *Craib, l. c.* 111; *Craib, l. c.* 287, descr. ampl.—Siam.
polysperma *Roxb. Hort. Beng.* 15 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 146 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 527 (1832).—Ind. or. (Bengal).
purpuricarpa *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3267 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
racemosa *Roxb. Hort. Beng.* 15 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 144 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 525 (1832).—Ind. or. (Bengal).
Ravae *Chiov. Fl. Somala*, II. 237 (1932).—Somal. Ital.
rectispina *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 60 (1935).—China (Hainan).
scabra *Chiov. Fl. Somala*, II. 236 (1932).—Somal. Ital.
shweliensis *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 205 (1934).—China (Yunnan).
stricta (*Roxb. ex Roem. & Schult.*) *Roxb. Hort. Beng.* 15 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 145 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 526 (1832): Macrocnemum strictum.
Thomasii *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 77, in clavi, 78 (1931).—Sierra Leone; Nigeria.
tinianensis *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 494.—Ins. Marian. (Tinian).

RANGIUM Juss. (Oleac.).
japonicum (*Lindl.*) *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 140: Forsythia japonica.
koreanum (*Nakai*) *Ohwi, l. c.*: Forsythia koreana.
ovatum (*Nakai*) *Ohwi, l. c.*: Forsythia ovata.
suspensum (*Thunb.*) *Ohwi, l. c.*: Ligustrum suspensum.
viridissimum (*Lindl.*) *Ohwi, l. c.*: Forsythia viridissima.

RANUNCULUS L. (Ranunculac.).
africanus *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 17 (1894), in syn.: R. asiaticus.
Allemannii *Braun-Blanquet*; *W. Koch in Ber. Schweiz. Bot. Ges.* xlii. 747 (1933), descr.—Alpes.
auricomus *L.*; *W. Koch, l. c.* 743, descr. emend.—Helvet.
baldschuanicus *Regel ex Komarov in Trav. Soc. Nat. Pétersb.* Sect. Bot. xxvi. 67 (1896), in clavi; *Popov in Bull. Univ. As. Centr.* xi. Suppl., 7 (1925), descr. emend.—Turkestan.
biformis *W. Koch in Ber. Schweiz. Bot. Ges.* xlii. 745 (1933).—Helvet.

RANUNCULUS:—
bipinnatus *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 209 [1928].—Marocc.
cabrerensis *Rothmaler in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.* 1934, xxxiv. 148.—Hispan.
Christii *W. Koch in Ber Schweiz. Bot. Ges.* xliii. 126 (1934), in obs.: R. pseudocassubicus *H. Christ ex W. Koch.*
crassifolius (*Rupr.*) *Grossheim, Fl. Kavkaza,* ii. 119 (1930): R. oreophilus var. crassifolius.
Dyris (*Maire*) *H. Lindb. Itin. Mediterr. (Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 54 (1932): R. geraniifolius subsp. Dyris.
eradicatus (*Laest. ex Nyman*) *F. Johansen in Canadian Field-Nat.* 1934, xlviii. 127: Batrachium eradicatum.
formosa-montanus *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 154.—Formosa.
glaber (*Léveillé*) *Makino in Journ. Jap. Bot.* vii. 31 (1931): R. ternatus var. glaber.
glareosus *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 307 (1931).—China (Yunnan).
Hegetschweileri *W. Koch in Ber. Schweiz. Bot. Ges.* xlii. 748 (1933).—Helvet.
×intercedens *Domin in Preslia,* xiii–xv. 83 (1935).—Czechoslovak.
junipericola *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 154.—Formosa.
Matsudai *Hayata ex Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa,* 1932, xxii. 232: R. japonicus var. yakushimensis *Yamamoto.*
megacarpus *W. Koch in Ber. Schweiz. Bot. Ges.* xliii. 126 (1934): R. Hegetschweileri *W. Koch.*
microphyllus *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 299 (1931): R. flaccidus *Hook. f. & Thoms.*
mirissimus *Hisauchi in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 584, et 654 (Errata).—Japon.
nankotaizanus *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 155.—Formosa.
paucifolius *T. Kirk, Students' Fl. N. Zeal.* 11 (1899).—N. Zel.
Polii *Franch.; Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 299 (1931), descr. ampl.—China (Hunan).
polycephalus *Makino in Journ. Jap. Bot.* vii. 31 (1931): R. Vernyi *Franch. & Sav.* pro parte.
pseudocassubicus (*H. Christ*) *H. Christ ex W. Koch in Ber. Schweiz. Bot. Ges.* xlii. 750 (1933), cum descr.: R. auricomus var. pseudocassubicus.
puberulus *W. Koch, l. c.* 744.—Helvet.; German.
Raeae *Exell in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 262.—Nyasaland; Tanganyika Terr.
Regelianus *Ovczinn. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n. s. xliv. 269.—Turkestan.
×Rohlenae *Domin in Preslia,* xiii–xv. 83 (1935).—Czechoslovak.
subhomophyllus (*Halácsy*) *Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1935, lxxxiv. 131: R. chaerophyllos var. subhomophyllus.
taizanensis *Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan,* 1932, iv. 188: R. biternatus *Yamamoto, Suppl. Ic. Pl. Formos.* iii. 29 (1927), non *Sm.*
taliensis *Franch. ex Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 305 (1931), in syn.: R. Felixii.
trigonus *Hand.-Mazz. l. c.* 304.—China (Szechuan; Yunnan).
vaginatus *Hand.-Mazz. l. c.* 303.—China (Szechuan).

RAPANEA Aubl. (Myrsinac.).
brevis *Macbride in Candollea,* v. 396 (1934).—Peruv.
chartacea *Macbride, l. c.*—Peruv.
denticulata *Rusby in Phytologia,* i. 72 (1934).—Boliv.
duidae *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 447.—Venez.
fasciculata *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 102, 36 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
fusca *J. W. Moore, l. c.* 37.—Ins. Societ. (Raiatea).
gracilior *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xii. 88 (1934).—Tanganyika Terr.
kwangsiensis *Walker in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 479.—China (Kwangsi).
obovata *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 102, 37 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
pallens *Macbride in Candollea,* v. 397 (1934).—Peruv.

RAPANEA:—
Schliebenii *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xii. 87 (1934).—Tanganyika Terr.
viridis *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 102, 38 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).

RAPATEA Aubl. (Rapateac.).
elongata *G. K. Schulze in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xii. 230 (1934).—Bras. (Matto Grosso).
undulata *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro,* ii. 28 (1935).—Bras. (Amaz.).
Wettsteinii *Suesseng. in Fedde, Repert.* xxx. 275 (1932).—Bras. (Amaz.).

RAPHANUS L. (Crucif.).
indicus *Sinsk. in Bull. Applied Bot., Leningrad,* 1931, xxvi. No. 2, 36, 58.—Japon.
Raphanellus *Schr. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 128 (1833).—Ital. ?
stenocarpus *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo,* 1934, xlviii. 96.—Manchur.

RAPHIA Beauv. (Palmae).
bandamensis *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1932, xii. 205.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
gigantea *A. Cheval.*; *A. Cheval. l. c.* 198, descr.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
Gossweileri *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xii. 305 (1935).—Congo Lusit.
humilis *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1932, xii. 204.—Dahomey.
rostrata *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xii. 307 (1935).—Congo Lusit.
sassandrensis *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1932, xii. 199.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).

RAPHIDOPHORA Hassk. (Arac.).
[Vide RHAPHIDOPHORA.]

RAPHIOLEPIS Lindl. (Rosac.).
crassifolia *Hort. ex Voll & Brade in Rodriguesia,* i. No. 3, 61 (1935), nomen.—Hort.
kwangsiensis *Hu in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 335.—China (Kwangsi).
lanceolata *Hu, l. c.*—China (Kwangsi).

RAPHIONACME Harv. (Asclepiadac.).
caerulea *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1935, 279.—Sierra Leone.
sudanica *A. Cheval. Expl. Bot. Afr. Occ. Franç.* 430 (1920), nomen; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 53 (1931), in clavi.—Sudan. Gall.

RAPHIOSTYLES Benth. & Hook. f. (Olacac.).
[Vide RHAPHIOSTYLIS.]

×**RAPISTROSYMBRIUM** P. Fourn. ex Madiot in Le Monde des Plantes, 1932, xxxiii. 43. *CRUCIFERAE.*
[RAPISTRUM × SISYMBRIUM.]
Cabanesi *Madiot, l. c.*—Gallia.

RAPISTRUM Crantz (Crucif.).
nemausense (*Roux ex Cabanès*) *P. Fourn. & Cabanès in Le Monde des Plantes,* 1933, xxxiv. 44: R. rugosum var. nemausense.
×ramosissimum (*Pomel*) *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord,* 1933, xxiv. 200: Rapistrella ramosissima.

RASPAILIA J. Presl (Gramin.).
rupestris *Turcz. ex Komarov, Fl. URSS,* ii. 297 (1934), in syn.: Pappophorum boreale.

RATIBIDA Rafin. (Compos.).
mexicana (*S. Wats.*) *Sharp in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1935, xxii. 76: Lepachys mexicana.

RAUIA Nees & Mart. (Rutac.).
spicata *Haye in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 182.—Guiana Bat.

RAUWOLFIA L. (Apocynac.).
cambodiana *Pierre ex Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine,* iii. 1117 (1933).—Indo-China.
chaudocensis *Pierre ex Pitard, l. c.* 1114.—Indo-China (Cochinch.).
langbianensis *A. Cheval. ex Pitard, l. c.* 1117, in syn.: R. cambodiana.
lauretiana *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1931, xviii. 541.—Peruv.
laxiflora *Kanehira, Fl. Micrones.* 332 (1933), japonice; *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo,* 1933, xlvii. 678, latine.—Ins. Palau.

RAUWOLFIA:—
littoralis *Pierre ex Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine,* iii. 1115 (1933).—Siam; Indo-China (Laos; Cambodia).
mangiferoides *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo,* 1931, xlv. 345.—Ins. Palau.
sanctorum *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1931, xviii. 542.—Colomb.

RAVENEA H. Wendl. (Palmae).
xerophila *Jumelle in Ann. Mus. Col. Marseille,* 1933, Sér. V. i. Fasc. 1, 28.—Madag.

RAVENIA Vell. (Rutac.).
biramosa *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro,* ii. 48 (1935).—Bras. (Amaz.).
linearis *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 375.—Venez.
pseudalterna *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro,* ii. 49 (1935).—Bras. (Amaz.).
Tatei *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 376.—Venez.

RAWSONIA Harv. & Sond. (Flacourtiac.; Bixac., Gen. Pl.).
transjubensis *Chiov. Fl. Somala,* II. 12 (1932).—Somal. Ital.
uluguruensis *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 1077 (1934).—Tanganyika Terr.

RAZUMOVIA Spreng. (Scrophulariac.).
indica (*L.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon,* vi. Suppl., 217 (1931): Rhinanthus indicus.
lepidota (*Roth*) *Alston, l. c.*: Torenia lepidota.

REBULOBIVIA Frič & Schelle ex Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC, 243 (1935), in syn.: **Lobivia** Britton & Rose (Cactac.).
Haagei *Frič & Schelle, l. c.*, in syn.: Lobivia neohaageana.

REBUTIA K. Schum. (Cactac.).
aureiflora *Backeb. in Kakteenfreund,* i. 124 (1932); cf. *Gray Herb. Card Cat.,* Issue 142.—Argent.
chrysacantha *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 276, 416 (1935).—Argent.
citricarpa *Frič ex Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1932, xlvii. 421, in obs.; *et ex Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 279 (1935), in syn.: R. xanthocarpa var. citricarpa *Backeb.*
costata *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xii. 225 (1934).—Boliv.; Argent.
dasyphrissa *Werderm. in Fedde, Repert. Sonder-Beih.* C. t. 103 (1935).—Argent.
Einsteinii *Frič in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1931, xlvi. 267, in obs.—Chile.
grandiflora *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 277, 416 (1935).—Argent.
Haagei *Frič & Schelle in Kaktusář,* Číslo 11, Ročník 1 (1930); cf. *Werderm. in Backeb. Neue Kakteen,* 86 (1931).—Argent.
Karrerii *Frič in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1932, xlvii. 421, in obs., nomen.—Hab. ?
Knuthiana *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 277, 416 (1935).—Argent.
Kupperiana *Bödeker in Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges.* 1932, iv. 276.—Boliv.
Nicolaii *Frič in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1932, xlvii. 422, in obs., nomen.—Hab. ?
oculata *Werderm. in Fedde, Repert. Sonder-Beih.* C. t. 99 (1935).—Argent.
pseudodeminuta *Backeb. in Kakteenfreund,* ii. No. 1 (1933); *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 8, [p. 2].—Argent.
salmonea *Frič ex Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 279 (1935), in syn.: R. xanthocarpa var. salmonea *Backeb.*
senilis *Backeb. in Kakteenfreund,* i. 124 (1932); *Werderm. in Fedde, Repert. Sonder-Beih.* C. t. 103 (1935); *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 277, 416 (1935).—Argent.
Spegazziniana *Backeb. in Kakteenfreund,* ii. No. 1, (1933); *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 2, [p. 8].—Argent.
spinosissima *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 5, [p. 5], in obs.; *et l. c.* Pt. 8, [p. 7].—Argent.
Steinbachii *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 268 (1931).—Boliv.
Steineckei *Frič in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1932, xlvii. 422, in obs., nomen.—Hab. ?

REBUTIA:—
violaciflora *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 8, [p. 8].—Argent.
xanthocarpa *Backeb. in Kakteenfreund*, i. 131 (1932); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 143; *et in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 278, 416 (1935).—Argent.

RECHSTEINERIA Regel (Gesneriac.).
macropoda (*Sprague*) *C. H. Curtis in Gard. Chron.* 1931, Ser. III. xc. 410; *Sprague in Gard. Chron.* 1932, Ser. III. xci. 18: Corytholoma macropodum.

RECORDIA Moldenke in Phytologia, i. 99 (1934). *VERBENACEAE.*
boliviana *Moldenke, l. c.*—Boliv.

RECORDOXYLON Ducke in Tropical Woods, 1934, No. 39, 16. *LEGUMINOSAE.*
amazonicum (*Ducke*) *Ducke, l. c.* 17: Melanoxylon amazonicum.

RECTANTHERA Degener, Fl. Hawaiiensis, Fam. 62 (1932): **Spironema** Lindl. (Commelinac.).
fragrans (*Lindl.*) *Degener, l. c.*: Spironema fragrans.

REEVESIA Lindl. (Sterculiac.).
longipetiolata *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 40 (1934).—China (Hainan).
rotundifolia *Chun, l. c.* i. 269 (1934).—China (Kwangtung).

REHDERA Moldenke in Fedde, Repert. xxxix. 48 (1935). *VERBENACEAE.*
mollicella *Standley & Moldenke, l. c.* 51.—Guatem.
penninervia *Standley & Moldenke, l. c.* 50.—Guatem.
trinervis (*Blake*) *Moldenke, l. c.* 52: Citharexylum trinerve.

REHDERODENDRON Hu in Sinensia, ii. 109 (1932); et in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. 1932, iii. 320; Chun & F. Chun in Sunyatsenia, iii. 29 (1935). *STYRACACEAE.*
Hui *Chun, l. c.* i. 291 (1934); *Chun & F. Chun, l. c.* iii. 29 (1935), descr. ampl.—China (Kwangtung).
kwangtungense *Chun, l. c.* i. 290 (1934); *Chun & F. Chun, l. c.* iii. 31 (1935), descr. ampl.—China (Kwangtung).
kweichowense *Hu in Sinensia*, ii. 109 (1932); *et in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* 1932, iii. 320.—China (Kweichau).
macrocarpum *Hu in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* 1932, iii. 78, 321; *et l. c.* vi. 175 (1935), descr. ampl.—China (Szechuan).
mapienense *Hu, l. c.* 1932, iii. 79.—China (Szechuan).
praeteritum *Sleum. in Fedde, Repert.* xxxviii. 208 (1935).—China (Kwangtung).
Tsiangi *Hu & Cheng in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* v. 313 (1934).—China (Yunnan).
yunnanense *Hu, l. c.* vi. 176 (1935).—China (Yunnan).

REHMANNIA Libosch. ex Fisch. & Mey. (Scrophulariac.).
×kewensis *W. Watson in Gard. Chron.* 1912, Ser. III. li. 218.—Hort.

REICHARDIA Roth (Compos.).
intermedia (*Jan ex DC.*) *Dinsm. in Fedde, Repert.* xxxiii. 109 (1933): Sonchus intermedius.
sarmentosa *Backer ex Booberg in Engl. Jahrb.* lxvi. 31 (1933), in syn.: Microrhynchus sarmentosus.
tingitana (*L.*) *Pau in Cavanillesia*, iv. 51 (1931): Scorzonera tingitana.

REICHEËLLA Pax in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam., Nachtr. II. 21 (1900). *CARYOPHYLLACEAE.*
andicola (*R. Phil.*) *Pax, l. c.*: Lyallia andicola.

REICHENBACHANTHUS Barb. Rodr. (Orchidac.).
reflexus (*Lindl.*) *C. Porto & Brade in Rodriguesia*, i. No. 2, 55 (1935): Scaphyglottis reflexa.

REIDIA Wight (Euphorbiac.).
affinis (*Muell.-Arg.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 258 (1931): Phyllanthus affinis.
cinerea (*Muell.-Arg.*) *Alston, l. c.*: Phyllanthus cinereus.

REIDIA:—
cordifolia (*Baill.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 258 (1931): Epistylium cordifolium.
hakgalensis (*Thwait. ex Trimen*) *Alston, l. c.*: Phyllanthus hakgalensis.
montana (*Thwait.*) *Alston, l. c.*: Epistylium montanum.

REINHARDTIA Liebm. (Palmae).
gracilior *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 555 (1932).—Brit. Honduras.
gracilis (*H. Wendl.*) *Burret, l. c.* 554: Malortiea gracilis.
Koschnyana (*H. Wendl. & Dammer*) *Burret, l. c.*: Malortiea Koschnyana.
latisecta (*H. Wendl.*) *Burret, l. c.*: Malortiea latisecta.
rostrata *Burret in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, xlvi. 228 (1932).—Costa Rica.
simplex (*H. Wendl.*) *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 554 (1932): Malortiea simplex.

REJOUA Gaudich. (Apocynac.).
novo-guineënsis (*Scheff.*) *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 546 (1935): Tabernaemontana novo-guineënsis.
pacifica (*Seem.*) *Markgraf, l. c.*: Tabernaemontana pacifica.

RELBUNIUM Hook. f. (Rubiac.).
Malmei *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 396 (1931).—Bras. (Rio Grande do Sul); Urug.
Ostenianum *Standley in Ostenia*, 120 (1933).—Urug.
paulense *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 397 (1931).—Bras. (S. Paulo).

REMIJIA DC. (Rubiac.).
laevifolia *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 359 (1931).—Venez.
longifolia *Benth. ex Standley, l. c.* viii. 335 (1931).—Bras.
pacimonica *Standley, l. c.* vii. 360 (1931).—Venez.

REMUSATIA Schott (Arac.).
bulbifera *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1163 (1895), in syn.: R. vivipara.

RENDLIA Chiov. (Gramin.).
altera (*Rendle*) *Chiov. in Ann. Bot., Roma*, xiii. 54 (1914), in clavi: Harpechloa altera.
mutica (*Hackel*) *Chiov. l. c.*, in clavi: Enteropogon muticus.
Nelsonii (*Stapf*) *Chiov. l. c.*, in clavi: Microchloa altera var. Nelsonii.

RENEALMIA L. f. (Zingiberac.; Scitamin., Gen. Pl.).
cernua (*Sw. ex Roem. & Schult.*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 14 (1931): Costus cernuus.
ivorensis *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 305 (1917).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
lativagina *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 50 (1931).—Peruv.

RENSCHIA Vatke (Labiat.).
mirabilis *Bullock in Kew Bull.* 1931, 457.—Tanganyika Terr.

RESEDA L. (Resedac.).
Biaui *Pitard, Contrib. Étude Fl. Maroc*, 4 (1918).—Marocc.
Dutoiti *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 147 [1933], nomen.—Marocc.
subattenuata *Sennen in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1932, xxiii. 258, in obs., nomen.—Marocc.

RETINIPHYLLUM Humb. & Bonpl. (Rubiac.).
adinanthum *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 355 (1931).—Peruv.
erythranthum *Standley, l. c.* vii. 399 (1931).—Venez.
Kuhlmannii *Standley, l. c.* viii. 356 (1931).—Bras. (Matto Grosso).

RETINISPORA Sieb. & Zucc. (Pinac.; Conif., Gen. Pl.).
gracilis *Hort. ex Dallimore in Rep. Conif. Conf. R.H.S. 1931* (*Conif. in Cult.*) 33 (1932), in syn.: Cupressus obtusa var. gracilis *Nash.*

REYNOLDSIA A. Gray (Araliac.).
Grayana *Christoph. in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 128, 161 (1935), in obs.—Samoa.
marchionensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 209 (1935).—Ins. Marquesas.

REYNOUTRIA Houtt. (Polygonac.).
hachidyoënsis (*Makino*) *Nakai apud Jotâni in Kwagaku-no-Nôgyô*, xiv. 5, p. 81 (1933); *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 1: Polygonum hachidyoënse.
hachidyonsis *Nakai apud Jôtani, l. c.* 6, p. 41; *Okuyama in Shizenkwagaku to Hakubutsukwan*, 59, p. 21 (1934); *Honda, l. c.* 2, in syn.: R. hachidyoënsis.
hachijoënsis *Nakai ex Jôtani, l. c.* xiii. 5, p. 24 (1932); *et l. c.* xiv. 1, p. 17 (1933); *et l. c.* xiv. 3, p. 14 (1933); *Honda, l. c.* 1, in syn.: R. hachidyoënsis.
Henryi *Nakai in Rigakkai*, xxiv. 294 (1926), japonice; *Migo in Journ. Shanghai Sc. Inst.*, Sect. III. iii. 92 (1935), latine.—China.
uzenensis (*Honda*) *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 791: R. japonica var. uzenensis.
Yabeana *Honda, l. c.* 1932, xlvi. 675.—Japon.

RHABDIA Mart. (Boraginac.).
Pohlii *Kuhlm. in Arquiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, i. 113 (1934).—Bras. (Pará).

RHACOMA L. (Celastrac.).
eucymosa (*Loes. & Pittier*) *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 69 (1935): Myginda eucymosa.

RHADAMANTHUS Salisb. (Liliac.).
urantherus *R. A. Dyer in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3247 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).

RHAGADIOLUS Zinn, Cat. Pl. Gott. 436 (1757); cf. Sprague in Kew Bull. 1934, 219. *COMPOSITAE.*
leiocarpus (*DC.*) *Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* vi. 62 [1923]: R. stellatus var. leiocarpus.

RHAMMATOPHYLLUM O. E. Schulz in Fedde, Repert. xxxiii. 190 (1933): **Mitophyllum** O. E. Schulz (Crucif.).
pachyrrhizum (*Kar. & Kir.*) *O. E. Schulz, l. c.*: Arabis pachyrhiza.

RHAMNELLA Miq. (Rhamnac.).
caudata *Merrill in Sunyatsenia*, ii. 11 (1934).—China (Kwangtung).
rubrinervis (*Léveillé*) *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1934, xv. 12: Embelia rubrinervis.

RHAMNUS L. (Rhamnac.).
acuminata *Colebr. ex Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 374 (1824), in syn.; *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 615 (1832): Ceanothus asiaticus.
amasiensis *Bornm. in Fedde, Repert.* xxix. 34 (1931).—As. Min. (Anatolia).
bithynica *Bornm. l. c.* 36.—As. Min. (Bithynia).
Blinii (*Léveillé*) *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1934, xv. 15: Maesa Blinii.
borneënsis *v. Steenis in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 6.—Borneo.
chekiangensis *Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., ix. 200 (1934).—China (Chekiang).
coriophylla *Hand.-Mazz. in Sinensia*, iii. 192 (1933).—China (Kwangsi).
dolichophylla *Gontsch. in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 93 (1934).—Bokhara.
hainanensis *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 273 (1935).—China (Hainan).
horridissima *Bornm. in Engl. Jahrb.* lxvi. 223 (1934).—Ind. or. (N. W. Frontier Prov.).
incana *Roxb. Hort. Beng.* 17 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 350 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 603 (1832).—Ins. Molucc.
lancifolia *v. Steenis in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 7, in obs., et in adnot.—Sumatra.
legionensis *Rothmaler in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.* 1934, xxxiv. 152.—Hispan.
liukiuensis (*E. H. Wilson*) *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 118: R. davurica var. liukiuensis.
longipes *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 272 (1935).—China (Hainan).

RHAMNUS :—
lucida *Roxb. Hort. Beng.* 86 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 353 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 605 (1832).—Mauritius.
macedonica *Diapulis in Fedde, Repert.* xxxiii. 338 (1934).—Macedon.
Pichleri *C. K. Schneider & Bornm. ex Bornm. in Fedde, Repert.* xxix. 36 (1931), in adnot.—As. Min. (Lycia).
serpyllifolia *Emberger & Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1933, xxiv. 207, non seq.—Marocc.
serpyllifolia *Léveillé*; *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1934, xv. 16, descr. ampl.—China (Yunnan).
thymifolia *Bornm. in Fedde, Repert.* xxix. 33 (1931).—As. Min. (Bithynia).
tripolitana *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 311 (1921), in obs.—Libya.
virgata *Roxb. Hort. Beng.* 17 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 351 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 604 (1832).—Nepal.

RHAMPHICARPA Benth. (Scrophulariac.).
filicalyx *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1933, 475.—Tanganyika Terr.

RHAPHIDOPHORA Hassk. (Arac.).
celebica *K. Krause in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 331 (1932).—Celebes.
Engleri *Kanehira, Fl. Microncs.* 409 (1933): R. palauensis *Engl. & K. Krause.*
kinabaluensis *Furtado in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 152 (1935).—Borneo.
Koidzumii *Kanehira, Fl. Microncs.* 409 (1933): Epipremnum palauense.
Rosenburghii *Furtado in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 155 (1935): Epipremnum crassifolium.

RHAPHIDOSPORA Nees (Acanthac.).
anisophylla *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 520 (1935).—Tanganyika Terr.

RHAPHIOLEPIS Poir. (Rosac.).
[Vide RAPHIOLEPIS.]

RHAPHIONACME Walp. (Asclepiadac.).
[Vide RAPHIONACME.]

RHAPHIOSTYLIS Planch. (Icacinac.; Olacac., Gen. Pl.).
ovatifolia *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 256 (1921), in obs.—Cameroons.

RHAPONTICA Hill (Compos.).
[RHAPONTICUM Adans.]
Rhapontica *Hill, Hort. Kew.* 69 (1768).—Hort.

RHAPONTICUM Adans. (Compos.).
aulieatense *Iljin in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 205 (1933).—Ross. asiat. centr.
carthamoides (*Willd.*) *Iljin, l. c.* 204: Cnicus carthamoides.
lyratum *C. Winkler ex O. & B. Fedtsch.*; *Iljin, l. c.*, descr.—Turkestan.
namanganicum *Iljin, l. c.* 206.—Ross. asiat. centr.
Rhaponticum (*L.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 554 (1894): Centaurea Rhaponticum.

RHEEDIA L. (Guttif.).
Kappleri *Eyma, Polygonac. Guttif. & Lecythidac. Surinam*, 33 (1932).—Guiana Bat. et Gall.

RHEUM L. (Polygonac.).
cantoniense *Lour. ex Gomes in Mem. Acad. Sc. Lisb. Cl. Sc. Pol. Mor. Bel.-Let.* n. s. iv. (1), 29 (1868); *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 16, 143 (1935), in syn.: Rumex sp.
cordatum *Losina-Losinsk. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 381 (1932).—Turkestan.
lucidum *Losina-Losinsk. l. c.* 378.—As. centr.
macrocarpum *Losina-Losinsk. l. c.* 379.—Turkestan.
Maximowiczi *Losina-Losinsk. l. c.* 382.—As. centr. (Thian Shan; Pamir).
megalocarpon *Maxim. ex B. Fedtsch. Rastit. Turkest.* 314 (1915); *Losina-Losinsk. l. c.*, in syn.: R. Maximowiczi.
plicatum *Losina-Losinsk. l. c.* 380.—Turkestan.

RHEXIA L. (Melastomatac.).
ventricosa *Fernald & Griscom in Rhodora*, 1935, xxxvii. 172.—U.S.A. (Virginia; N. Carolina).

RHINACANTHUS Nees (Acanthac.).
pulcher *Milne-Redhead in Kew Bull.* 1935, 283.—Kenya Col.

RHINANTHUS L. (Scrophulariac.).
contrinensis (*Semler*) *Fiori, Nuov. Fl. Anal. Ital.* ii. 371 (1926): Alectorolophus contrinensis.
elatus (*Sterneck*) *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxviii. 46 (1935), in obs.: Alectorolophus elatus.
hercynicus *O. Schwarz, l. c.* 47, in obs., et in adnot.—Bohem.
longibracteatus (*Kociejovsk.*) *Domin in Preslia*, xiii–xv. 190 (1935), in adnot.: Alectorolophus longibracteatus.
lorinensis (*Behrends.*) *Fiori, Nuov. Fl. Anal. Ital.* ii. 371 (1926): Alectorolophus lorinensis.
paludosus *O. Schwarz in Verh. Bot. Ver. Brand.* 1931, lxxiii. 117.—German.
secundus *Bréb. in Mém. Soc. Linn. Normand.* i. p. liii. (1824), in adnot.—Gallia.
Sterneckii (*Wettst.*) *E. Perrier, Cat. Pl. Vasc. Savoie*, ii. (*Mém. Acad. Sc. Savoie*, Sér. V. v.) 165 (1928): Alectorolophus Sterneckii.
Vollmanni (*Poeverl.*) *Becherer in Ber. Schweiz. Bot. Ges.* xliii. 70 (1934): Alectorolophus Vollmanni.

RHINEPHYLLUM N. E. Br. (Ficoidac.).
inaequale *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 430 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
parvifolium *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 377 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
willowmorense *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 348 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).

RHINOPETALUM Fisch. (Liliac.).
arianum *Losina-Losinsk. & Vved. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 298, 738 (1935).—As. centr.
bucharicum (*Regel*) *Losina-Losinsk. l. c.* 298: Fritillaria bucharica.
gibbosum (*Boiss.*) *Losina-Losinsk. & Vved. l. c.* 297: Fritillaria gibbosa.

RHIPSALIS Gaertn. (Cactac.).
Bauchienii *Hort. ex Guillaumin & Poupion in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 1024, nomen.—Hort.
cereoides *Backeb. & Voll in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 411 (1935), in syn.: Lepismium cereoides.
epiphyllanthoides *Backeb. in Kakteenfreund*, Feb. 1935; cf. *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 10, [p. 8].—Bras. austr.
pendula (*Sw.*) *Link & Otto in Verh. Gart. Preuss.* iii. in indice p. 432 (1827): Cactus pendulus.
villigera (*K. Schum.*) *Orcutt in W. Am. Scient.* xiii. 63 (1902): Hariota villigera.
Vollii *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 411 (1935), in syn.: Lepismium Vollii.

RHIZANOTA Lour. ex Gomes in Mem. Acad. Sc. Lisb. Cl. Sc. Pol. Mor. Bel.-Let. n. s. iv. (1), 29 (1868); Merrill in Trans. Am. Phil. Soc. n. s. xxiv. II. 17, 257 (1935), in syn.: **Corchorus** L. (Tiliac.).
cannabina *Lour. ex Gomes, l. c.*; *Merrill, l. c.*, in syn.: Corchorus capsularis.

RHIZANTHES Dumort. Anal. Fam. 14 (1829); Harms in Fedde, Repert. xxxvi. 286 (1934): **Brugmansia** Blume (Rafflesiac.), non **Brugmansia** Pers.
Lowii (*Becc.*) *Harms, l. c.* 287: Brugmansia Lowii.
Zippelii (*Blume*) *Spach, Hist. Nat. Veg. Phan.* x. 554 (1841); *Harms, l. c.*: Brugmansia Zippelii.

RHIZOCEPHALUS Boiss. (Gramin.).
turkestanicus (*Litw.*) *Roshev. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 127 (1934): Heleochloa turkestanica.

RHIZOMONANTHES Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk. Sect. II. xxix. No. 6, 100 (1933). *LORANTHACEAE.*
curvifolia (*K. Krause*) *Danser, l. c.*: Loranthus curvifolius.
hastifolia (*Ridley*) *Danser, l. c.* 101: Loranthus hastifolius.
heterochroma (*K. Krause*) *Danser, l. c.*: Loranthus heterochroma.

RHODOCACTUS (A. Berger) F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC, 48, 96 (1935). *CACTACEAE.*
[PERESKIA subgen. RHODOCACTUS A. Berger.]

RHODOCACTUS :—
autumnalis (*Eichl.*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 96 (1935): Pereskiopsis autumnalis.
Bleo (*H. B. & K.*) *F. M. Knuth, l. c.* 97: Cactus Bleo.
colombianus (*Britton & Rose*) *F. M. Knuth, l. c.*: Pereskia colombiana.
cubensis (*Britton & Rose*) *F. M. Knuth, l. c.* 96: Pereskia cubensis.
grandifolius (*Haw.*) *F. M. Knuth, l. c.* 97: Pereskia grandifolia.
Guamacho (*Weber*) *F. M. Knuth, l. c.*: Pereskia Guamacho.
horridus (*H. B. & K.*) *F. M. Knuth, l. c.*: Cactus horridus.
lychnidiflorus (*DC.*) *F. M. Knuth, l. c.*: Pereskia lychnidiflora.
nicoyanus (*Weber*) *F. M. Knuth, l. c.*: Pereskia nicoyana.
portulacifolius (*L.*) *F. M. Knuth, l. c.* 96: Cactus portulacifolius.
zinniiflorus (*DC.*) *F. M. Knuth, l. c.*: Pereskia zinniiflora.

RHODODENDRON L. (Ericac.).
aequabile *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 451 (1935).—Sumatra.
amagianum *Makino in Journ. Jap. Bot.* vii. 21 (1931), in syn.: Azalea amagiana.
Ashleyi *Coker in Journ. E. Mitchell Sc. Soc.* li. 189 (1935).—U.S.A. (N. Carolina).
asperulum *Hutchinson & F. K. Ward*; *Hutchinson in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 182 (1931), latine.—Upper Burma.
auritum *Tagg in Rhododendron Soc. Notes*, 1929–31, iii. No. 5, 278 [1932]; *et in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 218 (1934), latine.—S. E. Tibet.
Bainbridgeanum *Tagg & Forrest*; *Tagg in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 186 (1931), latine.—S. E. Tibet.
basirotundatum *J. J. Smith in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 124 (1934).—Sumatra.
Bulu *Hutchinson in Rhododendron Soc. Notes*, 1929–31, iii. No. 5, 280 [1932].—Ind. or. (Assam).
buruense *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxx. 168 (1932).—Ins. Molucc. (Buru).
caesium *Hutchinson in Gard. Chron.* 1933, Ser. III. xciv. 102.—China (Yunnan).
calciphilum *Hutchinson & F. K. Ward*; *Hutchinson in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 179 (1931), latine.—Upper Burma.
cardiobasis *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 484 (1935).—China (Kwangsi).
cerasiflorum *F. K. Ward in Gard. Chron.* 1933, Ser. III. xciii. 277, in obs.—Upper Burma.
cerasinum *Tagg*; *Tagg in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 188 (1931), latine.—Upper Burma.
Chaffanjonii *Léveillé ex Hutchinson in Spec. Rhododendron*, 623 (1930), in syn.: R. stamineum.
chlorops *Hort. ex Stair in Rhododendron Soc. Notes*, 1929–31, iii. No. 5, 308 [1932], in obs.—Hab. ?
chrysodoron *Tagg ex Hutchinson in Gard. Chron.* 1934, Ser. III. xcv. 276: R. chrysodorum.
chrysodorum *W. W. Smith ex Stair in Rhododendron Soc. Notes*, 1929–31, iii. No. 5, 307 [1932], in obs.—China (Yunnan).
chrysolepis *Hutchinson & F. K. Ward*; *Hutchinson in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 172 (1931), latine.—Upper Burma.
ciliipes *Hutchinson*; *Hutchinson, l. c.* 177, latine.—China (Yunnan).
compactum *Hutchinson in Gard. Chron.* 1932, Ser. III. xci. 326.—China (Yunnan ?).
concatenans *Hutchinson, l. c.* 1935, Ser. III. xcvii. 376.—Tibet.
concinnoides *Hutchinson & F. K. Ward*; *Hutchinson in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 180 (1931), latine.—Ind. or. (Assam).
crebreflorum *Hutchinson & F. K. Ward*; *Hutchinson, l. c.* 173, latine.—Ind. or. (Assam).
curvistylum *Hutchinson & F. K. Ward in F. K. Ward, Pl. Hunting Edge of World*, 375 (1930), nomen.—Tibet.
decandrum (*Makino*) *Makino in Journ. Jap. Bot.* i. 21 (1917): R. dilatatum var. decandrum.
deleiense *Hutchinson & F. K. Ward*; *Hutchinson in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 172 (1931), latine.—Ind. or. (Assam).

RHODODENDRON:—
dumicola *Tagg & Forrest*; *Tagg in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 190 (1931), latine.—China (Yunnan).
eurysiphon *Tagg & Forrest*; *Tagg, l. c.* 191, latine.—S. E. Tibet.
exasperatum *Tagg*; *Tagg, l. c.* 192, latine.—S. E. Tibet; Assam; Upper Burma.
exquisitum *Hutchinson in Gard. Chron.* 1932, Ser. III. xcii. 98.—China (Szechuan).
Faithae *Chun in Sunyatsenia*, ii. 78 (1934).—China (Kwangtung).
fimbriatum *Hutchinson in Gard. Chron.* 1932, Ser. III. xci. 438.—China (Yunnan ?).
flavantherum *Hutchinson & F. K. Ward*; *Hutchinson in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 181 (1931), latine.—S. Tibet.
fragariiflorum *F. K. Ward*; *Hutchinson, l. c.* 179, latine.—S. Tibet.
Frey-Wysslingii *J. J. Smith in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 123 (1934).—Sumatra.
galioides *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 445 (1935).—Borneo.
glischroides *Tagg & Forrest*; *Tagg in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 194 (1931), latine.—Upper Burma.
glomerulatum *Hutchinson in Gard. Chron.* 1932, Ser. III. xci. 438.—China.
Hardingii *Forrest ex Tagg*; *Tagg in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 196 (1931), latine.—China (Yunnan).
hirtipes *Tagg*; *Tagg, l. c.* 197, latine.—S. E. Tibet.
humicola *I. B. Balf. ex Notes Bot. Gard. Edinb.* xvii. 390, 395 (1930).—S. E. Tibet.
imperator *Hutchinson & F. K. Ward*; *Hutchinson in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 176 (1931), latine.—Upper Burma.
impressopunctatum *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxx. 164 (1932).—Ins. Molucc. (Buru).
insculptum *Hutchinson & F. K. Ward*; *Hutchinson in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 182 (1931), latine.—Upper Burma.
kasoënse *Hutchinson & F. K. Ward in Spec. Rhododendron*, 787 (1930); *Hutchinson in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 181 (1931), latine.—Ind. or. (Assam).
kemulense *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 448 (1935).—Borneo.
kiyosumense (*Makino*) *Makino in Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 880 (1931): Azalea kiyosumensis.
lanigerum *Tagg*; *Tagg in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 199 (1931), latine.—Ind. or. (Assam).
Leachianum *L. F. Henderson in Rhodora*, 1931, xxxiii. 205.—U.S.A. (Oregon).
Levinei *Merrill*; *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 522 (1934), descr. ampl.—China (Kwangtung).
litangense *I. B. Balf. ex Notes Bot. Gard. Edinb.* xvii. 27 (1929); *Hutchinson in Spec. Rhododendron*, 411 (1930).—China (Szechuan).
lophogynum *I. B. Balf. l. c.* xvii. 151 (1930), nomen; *I. B. Balf. & Forrest ex Hutchinson, l. c.* 750, descr.—China (Yunnan).
loranthiflorum *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 485 (1935).—Ins. Solomon. (Bougainville).
luraluense *Sleum. l. c.*—Ins. Solomon (Bougainville).
lysolepis *Hutchinson in Spec. Rhododendron*, 412 (1930); *et in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 175 (1931), latine.—Cult.
macrogemmum (*Nakai*) *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 128: R. Kaempferi var. macrogemmum.
magnificum *F. K. Ward in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 247.—Burma-Tibet Frontier.
Makinoi *Tagg*; *Tagg in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 201 (1931), cum descr. latina: R. stenophyllum *Makino*.
malvaticum *Hort. ex Späth-Buch*, 1720–1930, 276 (1930).—Hort.
Mayebarae *Nakai & Hara in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 825.—Japon.
Meliphagidum *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxx. 162 (1932).—Ins. Molucc. (Buru; Ceram).
microleucum *Hutchinson in Gard. Chron.* 1933, Ser. III. xciii. 334.—China.
micromeres *Tagg in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 211 (1931).—S. E. Tibet; Assam; Upper Burma; Yunnan.
minutiflorum *Hu in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 155.—China (Kwangsi).
mirabile *F. K. Ward in Gard. Chron.* 1932, Ser. III. xcii. 465, in obs.—Upper Burma.
mishmiense *Hutchinson & F. K. Ward*; *Hutchinson in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 173 (1931), latine.—Ind. or. (Assam).
Miyazawae *Nakai & Hara in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 823.—Japon.
Mjoebergii *Merrill in Sarawak Mus. Journ.* iii. 542 (1928).—Borneo.
murudense *Merrill, l. c.*; *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 449 (1935).—Borneo.
naamkwanense *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 42 (1934).—China (Kwangtung).
nepalense *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 583 (1894), in syn.: R. arboreum.
Noriakianum *T. Suzuki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 40.—Formosa.
notatum *Hutchinson*; *Hutchinson in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 177 (1931), latine.—Upper Burma.
oranum *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxx. 167 (1932).—Ins. Molucc. (Ceram).
ovatosepalum *Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1933, v. 405.—Formosa.
pallescens *Hutchinson in Gard. Chron.* 1933, Ser. III. xciii. 418.—China.
paludosum *Hutchinson & F. K. Ward*; *Hutchinson in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 175 (1931), latine.—S. Tibet.
Parryae *Hutchinson in Gard. Chron.* 1933, Ser. III. xciii. 387.—Ind. or. (Assam).
partitum *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 453 (1935).—Borneo.
peramabile *Hutchinson in Gard. Chron.* 1932, Ser. III. xci. 366.—China (Yunnan ?).
peregrinum *Tagg*; *Tagg in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 202 (1931), latine.—China (Szechuan).
platypodum *Diels*; *Tagg, l. c.* 204, descr. ampl.—China (Szechuan).
pruniflorum *Hutchinson & F. K. Ward*; *Hutchinson in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 174 (1931), latine.—Upper Burma; Assam.
pubigermen *J. J. Smith in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 122 (1934).—Sumatra.
rarilepidotum *J. J. Smith, l. c.* 126.—Sumatra.
recurvoides *Tagg & F. K. Ward in Year Book Rhododendron Assoc.* 1931, 245, nomen; *et in Rhododendron Soc. Notes*, 1929–31, iii. No. 5, 284 [1932], descr.; *Tagg in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 218 (1934), latine.—Upper Burma.
riparium *F. K. Ward in Spec. Rhododendron*, 598 (1930); *Hutchinson in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 180 (1931), latine.—S. E. Tibet; Upper Burma; Assam.
rubrantherum *F. K. Ward in Gard. Chron.* 1933, Ser. III. xciv. 363, in obs.—Upper Burma.
rude *Tagg & Forrest*; *Tagg in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 207 (1931), latine.—China (Yunnan).
Ruttenii *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxx. 170 (1932).—Ins. Molucc. (Ceram).
saisiuense *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 587.—Corea (Quelpaert).
sanctum *Nakai, l. c.* 1932, xlvi. 630.—Japon.
scopulorum *Hutchinson*; *Hutchinson in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 178 (1931), latine.—E. Tibet.
Seimundii *J. J. Smith in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 262 (1935).—Penins. Mal.
seinghkuense *F. K. Ward in Spec. Rhododendron*, 234 (1930); *Hutchinson in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 174 (1931), latine.—Upper Burma.
seranicum *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxx. 165 (1932).—Ins. Molucc. (Buru; Ceram).
sericocalyx *I. B. Balf. ex Notes Bot. Gard. Edinb.* xvii. 200 (1930).—China (Szechuan).
sessilifolium *J. J. Smith in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 125 (1934).—Sumatra.
× Sesterianum *Nicholson, Illustr. Dict. Gard.* iv. 598 (1888).—Hort.
Shimidzuanum *Honda ex Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 890 (1931), japonice.—Japon.
sordidum *Hutchinson in Rhododendron Soc. Notes*, 1929–31, iii. No. 5, 286 [1932].—Ind. or. (Assam).
spilanthum *Hutchinson in Rhododendron Soc. Notes*, 1929–31, iii. No. 5, 287 [1932].—China (Szechuan).
squarrosum *I. B. Balf. ex Notes Bot. Gard. Edinb.* xvii. 266 (1930), nomen; *Hutchinson in Spec. Rhododendron*, 322 (1930), in syn.: R. desquamatum.
stenophyllum *Hook. f. ex Beccari, Malesia*, i. 203 (1878), in obs.; *Stapf in Trans. Linn. Soc., Bot.* Ser. II. iv. 196 (1894).—Borneo.
Stresemannii *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxx. 166 (1932).—Ins. Molucc. (Ceram).
subnikomontanum *Sutô & T. Suzuki in Nôgaku-kenkyûkwai-kwaisi* (*Utunomiya*), No. 6, 31 (1930), nomen; cf. *T. Suzuki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1932, xxii. 23, in syn.: R. Keiskei var. hypoglaucum *Sutô & T. Suzuki*.
sumatranum *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 182 (1934); *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 450 (1935).—Sumatra.
Taggianum *Hutchinson*; *Hutchinson in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 178 (1931), latine.—Upper Burma.
Tamurai (*Makino*) *Masamune, Prelim. Rep. Veg. Yakus.* 106 (1929); *Masamune in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* xi., Bot. No. 4, 349 (1934): R. indicum var. Tamurai.
taronense *Hutchinson*; *Hutchinson in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 178 (1931), latine.—China (Yunnan).
Toxopei *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxx. 168 (1932).—Ins. Molucc. (Buru).
tsangpoënse *Hutchinson & F. K. Ward*; *Hutchinson in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 175 (1931), latine.—Tibet.
Tsoi *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 42 (1934).—China (Kwangtung).
uniflorum *Hutchinson & F. K. Ward*; *Hutchinson in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 176 (1931), latine.—S. Tibet.
vellereum *Hutchinson ex Tagg*; *Tagg in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 209 (1931), latine.—S. E. Tibet.
venator *Tagg in Rhododendron Assoc. Year Book*, Suppl., 102 (1933); *et in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 219 (1934), latine.—S. E. Tibet.
vesiculiferum *Tagg*; *Tagg in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 208 (1931), latine.—Upper Burma.
vestitum *Tagg & Forrest*; *Tagg, l. c.* 210, latine.—S. E. Tibet.
viridescens *Hutchinson in Gard. Chron.* 1933, Ser. III. xciv. 116.—Tibet.
viscistylum *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 498.—Japon. (Kiushiu).
xanthocodon *Hutchinson in Gard. Chron.* 1934, Ser. III. xcv. 409.—Tibet.
yakumontanum *Masamune, Prelim. Rep. Veg. Yakus.* 106 (1929); *Masamune in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* xi., Bot. No. 4, 348 (1934), in syn.: R. nagasakianum.

RHODOLAENA Thou. (Chlaenac.).
echinata *H. Perrier in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 61.—Madag.

RHODOLEIA Champ. (Hamamelidac.).
Forrestii *Chun ex Exell in Sunyatsenia*, i. 97 (1933).—China (Yunnan); Upper Burma.
subcordata *Exell, l. c.* 101.—Penins. Mal.

RHODOMYRTUS Reichb. (Myrtac.).
parviflora *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 111 (1931): R. tomentosa *Wight*, partim, non Myrtus tomentosa *Ait.*

RHODOSPATHA Poepp. & Endl. (Arac.).
amomifolia (*Poepp.*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 7 (1931): Monstera amomifolia.
crassifolia (*Engl.*) *Macbride, l. c.*: Stenospermatium crassifolium.
flavescens (*Engl.*) *Macbride, l. c.*: Stenospermatium flavescens.
Mathewsii (*Schott*) *Macbride, l. c.*: Stenospermatium Mathewsii.
popayanensis (*Schott*) *Macbride, l. c.*: Stenospermatium popayanense.
Spruceana (*Schott*) *Macbride, l. c.*: Stenospermatium Spruceanum.

RHODOSPATHA:—
Weberbaueri (*Engl.*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 7 (1931): Stenospermatium Weberbaueri.

RHOICISSUS Planch. (Vitac.).
grosseserratus *Gilg ex Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. 473 (1932), in syn.: R. erythrodes.
napaeus *C. A. Smith in Burtt Davy, l. c.* p. xxix. 473.—Swaziland.

RHOIPTELEA Diels & Hand.-Mazz. in Fedde, Repert. xxx. 77 (1932). *RHOIPTELEACEAE.*
chiliantha *Diels & Hand.-Mazz. l. c.*—Tonkin; Kwangsi; Kweichau.

RHOPALA Schreb. (Proteac.).
[Vide ROUPALA.]

RHOPALOBLASTE Scheff. (Palmae).
arfakiana *Becc. ex Martelli in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1934, n. s. xli. 706 (1935), nomen.—N. Guin.
Elmerii (*Becc.*) *Becc. in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa*, Mem., 1934, xliv. 138: Ptychoraphis Elmerii.
intermedia (*Becc.*) *Becc. l. c.* 137: Ptychoraphis intermedia.
Macgregorii *Becc. l. c.* 134.—N. Guin.
microcarpa (*Becc.*) *Becc. l. c.* 136: Ptychoraphis microcarpa.

RHOPALOBRACHIUM Schlechter & K. Krause (Rubiac.).
megacarpum (*Kanehira*) *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 674: Timonius megacarpus.

RHOPALOPILIA Pierre (Opiliac.).
altescandens *Mildbr.*; *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 65 (1934), descr.—Cameroons.
Verdicki *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 475 (1932).—Congo Belg.

RHOPALOTA N. E. Brown in Cact. & Succ. Journ. Amer. iii. 7 (1931); et in Hook. Ic. Pl. xxxii. t. 3171 (1932). *CRASSULACEAE.*
aphylla (*Schonl. & Baker*) *N. E. Brown, ll. cc.*: Crassula aphylla.

RHUS L. (Anacardiac.).
Buettneri *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 213 (1921), in obs.—Guinea (Togo).
Conrathii *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxix. 508 (1932).—Transvaal.
florita *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, p. 22 (1933–5).—U.S.A. (N. Mexico).
fulvescens *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 211 (1921), in obs.—Transvaal.
Galpinii *Engl. l. c.* 208, in obs.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Gossweileri *Engl. l. c.* 212, in obs.—Angola.
Nortonii (*Greene*) *Rydb. in Brittonia*, i. 93 (1931): Schmaltzia Nortonii.
Rangeana *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 205 (1921), in obs.—Afr. trop. occ.
ruzizensis *Engl. l. c.* 211, in obs.—Congo Belg.
sinensis *Houttuyn, Handleid. Plant-en Kruidkunde*, ii. 212 (1774), in adnot.; *Swingle in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1916, vi. 492, 495, pro syn.: Ailanthus altissima.
Steudneri *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 211 (1921), in obs.—Abyss.
Stolzii *Engl. l. c.* 212, in obs.—Nyasaland; Tanganyika Terr.
Teniana *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 637 (1933).—China (Yunnan).
Wellmannii *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 213 (1921), in obs.—Angola.

RHYNCHANTHERA DC. (Melastomatac.).
Hassleriana *Kraenzl. in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 147.—Parag.
paludicola (*Donn. Smith*) *Gleason in Phytologia*, i. 136 (1935): Tibouchina paludicola.
Williamsi *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 216.—Peruv.

RHYNCHELYTRUM Nees (Gramin.).
Bequaertii *Robyns in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 193 (1932).—Congo Belg.
repens (*Willd.*) *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 110: Saccharum repens.

RHYNCHOCARPA Becc. (Palmae).
pilosa *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 712 (1933).—N. Guin.

RHYNCHODIA Benth. (Apocynac.).
pauciflora *Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1243 (1933).—Indo-China (Anam).

RHYNCHOPHORUM (Miq.) Small, Man. Southeast. Fl. 401 (1933). *PIPERACEAE.*
[PEPEROMIA subgen. RHYNCHOPHORUM Miq.]
floridanum (*Small*) *Small, l. c.*: Peperomia floridana.
obtusifolium (*L.*) *Small, l. c.*: Piper obtusifolium.
spathulifolium (*Small*) *Small in Addisonia*, 1933, xviii. 9: Peperomia spathulifolia.

RHYNCHOSIA Lour. (Legumin.).
albiflora (*Sims*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 85 (1931): Cylista albiflora.
albomarginata *Chiov. Fl. Somala*, II. 170 (1932).—Somal. Ital.
americana (*Mill.*) *M. C. Metz. in Contrib. Biol. Lab. Catholic Univ. Amer.* xvi. 126 (1934); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 145: Lathyrus americanus.
caliensis *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 783 (1933).—Colomb.
Castroi *E. G. Baker in Bol. Soc. Brot.* Sér. II. viii. 108 (1933).—Angola.
Cooperi (*E. G. Baker*) *Harv. ex Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxix. 409 (1932): R. adenodes var. Cooperi.
foliosa *Markötter in Ann. Univ. Stellenb.* 1930, viii. Sect. A, No. 1, 25.—Natal.
genistoides *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxix. 408 (1932).—Transvaal.
ischnoclada *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 513 (1935).—Tanganyika Terr.
lukafuensis *E. G. Baker in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxi. 304 (1932).—Congo Belg.
mollis *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxix. 411 (1932).—Transvaal.
picta (*E. Mey.*) *Burtt Davy, l. c.* p. xxx. 410: R. gibba var. picta.
rhodesica *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 295.—N. Rhodesia.
Schliebenii *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 400 (1932).—Tanganyika Terr.
Thorncroftii (*E. G. Baker*) *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxx. 410 (1932): R. caribaea var. Thorncroftii.
transjubensis *Chiov. Fl. Somala*, II. 169 (1932).—Somal. Ital.
villosula *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxx. 410 (1932).—Transvaal.

RHYNCHOSPORA Vahl [corr. Willd. Enum. Pl. Hort. Berol. 71: 1809] Enum. ii. fol. 2, verso, n. 113, 229. *CYPERACEAE.*
[Nomen conservandum.]
africana *Cherm. in Arch. Bot., Caen*, iv. Mém. No. 7, 44 (1931).—Afr. Gall. Centr.
blepharophora (*J. & C. Presl*) *H. Pfeiff. in Fedde, Repert.* xxxviii. 94 (1935): Dichromena blepharophora.
boninensis *Nakai in Rigakkwai*, xxvi. iv. p. 10 et v. p. 4 (1928), nomen; *Tuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 511, descr.—Ins. Bonin.
breviuscula *H. Pfeiff. in Fedde, Repert.* xxxviii. 95 (1935): Dichromena gracilis *C. B. Clarke.*
canescens (*Maury*) *H. Pfeiff. l. c.* 96: Dichromena canescens.
colorata (*Hitchcock*) *H. Pfeiff. l. c.* 89, in adnot.: Dichromena colorata.
confusa *Ballard in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3250 (1934).—Bras. (Goyaz; Bahia).
Edisoniana *Britton ex Small, Man. Southeast. Fl.* 184 (1933).—U.S.A. (Florida).
fluminensis *L. B. Smith in Phytologia*, i. 81 (1934): Nemochloa Beyrichii *Nees*, non Rhynchospora Beyrichii *Steud.*
foliosa (*Kunth*) *L. B. Smith, l. c.*: Pleurostachys foliosus.

RHYNCHOSPORA:—
Gaudichaudii (*Brongn.*) *L. B. Smith in Phytologia*, i. 81 (1934): Pleurostachys Gaudichaudii.
globularis (*Chapm.*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 184 (1933): R. cymosa var. globularis.
graminea *Uitt. in Pulle, Fl. Surinam*, i. (*Meded. K. Ver. Kol. Inst. Amst.* xxx.) 105 (1934); *et in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1935, xxxii. 229.—Guiana Bat.
graminifolia (*Brongn.*) *L. B. Smith in Phytologia*, i. 81 (1934): Pleurostachys graminifolius.
graminosa *H. Pfeiff. in Fedde, Repert.* xxxviii. 95 (1935): Dichromena minarum *C. B. Clarke*, non Rhynchospora minarum *Steud.*
Harperi *Small, Man. Southeast. Fl.* 182 (1933).—U.S.A. (Georgia).
Killipii *R. Gross in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 40 (1931).—Peruv.
leptocarpa (*Chapm.*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 181 (1933): R. glomerata var. leptocarpa.
longa (*Lindm.*) *H. Pfeiff. in Fedde, Repert.* xxxviii. 94 (1935): Dichromena longa.
marquisensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 84, 108 (1931).—Ins. Marquesas.
Martiana (*Nees*) *L. B. Smith in Phytologia*, i. 81 (1934): Nemochloa Martiana.
montana (*Uitt.*) *H. Pfeiff. in Fedde, Repert.* xxxviii. 91 (1935): Dichromena montana.
Orbigniana (*Brongn.*) *L. B. Smith in Phytologia*, i. 81 (1934): Pleurostachys Orbignianus.
pinetorum *Britton & Small in Small, Man. Southeast. Fl.* 183 (1933).—U.S.A. (Florida).
polystachys (*Turrill*) *H. Pfeiff. in Fedde, Repert.* xxxviii. 93 (1935): Dichromena polystachys.
ponapensis *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 263.—Ins. Carolin. (Ponape).
puberula (*Boeckl.*) *L. B. Smith in Phytologia*, i. 82 (1934): Pleurostachys puberulus.
puncticulata *Kükenth. in An. Mus. Montevid.* Ser. II. iii. Entr. 2, 210, 214 (1931).—Urug.
radicans (*Schlecht. & Cham.*) *H. Pfeiff. in Fedde, Repert.* xxxviii. 93 (1935): Dichromena radicans.
Rappiana *Small, Man. Southeast. Fl.* 179 (1933).—U.S.A. (Florida).
Sampaioana *R. Gross in Fedde, Repert.* xxix. 244 (1931).—Bras. (Rio de Janeiro).
saxicola *Small, Man. Southeast. Fl.* 185 (1933).—U.S.A. (Georgia).
scalaris *L. B. Smith in Phytologia*, i. 82 (1934): Pleurostachys Urvillii *Brongn.*, non Rhynchospora Urvillei *Steud.*
sparsiflora (*Kunth*) *L. B. Smith, l. c.*: Pleurostachys sparsiflorus.
Standleyana *H. Pfeiff. in Fedde, Repert.* xxxviii. 92 (1935): Dichromena Pittieri.
Stokesii *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 84, 109 (1931).—Polynes. (Ins. Rapa).
tenuiflora (*Brongn.*) *L. B. Smith in Phytologia*, i. 82 (1934): Pleurostachys tenuiflorus.
Testui *Cherm. in Arch. Bot., Caen*, iv. Mém. No. 7, 42 (1931).—Afr. Gall. Centr.
yakusimensis (*Masamune*) *Masamune in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* xi., Bot. No. 4, 522 (1934): R. Umemurae var. yakusimensis.

RHYTACHNE Desv. (Gramin.).
pilosa *Ballard & C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 108.—N. Rhodesia.

RIBES L. (Saxifragac.).
columbianum *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 26, p. 21 (1933).—Colomb.
glaciale *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 513 (1824).—Reg. Himal.
×Gondouini *Pavlova in Bull. Applied Bot., Leningrad*, Ser. VIII. No. 2, 100 (1934), in obs.—Cult.?
×gothoburgense *Blom in Acta Hort. Gothoburg.* 1930, vi. 89 (1931).—Hort.
×Houghtonianum *Pavlova in Bull. Applied Bot., Leningrad*, Ser. VIII. No. 2, 100 (1934), in obs.—Cult.?
tolimense *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 26, p. 21 (1933).—Colomb.
villosum *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 514 (1824).—Kashmir.
×Warscewiczii *Pavlova in Bull. Applied Bot., Leningrad*, Ser. VIII. No. 2, 100 (1934), in obs.—Cult.?

RICHARDIA L. (Rubiac.).
lomensis (*K. Krause*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 386 (1931): Richardsonia lomensis.
pedicellata (*K. Schum.*) *Standley*, *l. c.*: Richardsonia pedicellata.
rigidifolia (*K. Krause*) *Standley*, *l. c.*: Richardsonia rigidifolia.
tricocca (*Torr. & Gray*) *Standley*, *l. c.*: Diodia tricocca.

RICHELLA A. Gray (Annonac.).
obtusata *Baill. ex Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 689, nomen.—N. Caled.

RICHERIELLA Pax & K. Hoffm. (Euphorbiac.).
malayana *M. R. Henderson in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 122 (1933).—Penins. Mal.

RICINODENDRON Muell.-Arg. (Euphorbiac.).
gracilius *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 516 (1935).—Tanganyika Terr.
Schliebenii *Mildbr. l. c.*—Tanganyika Terr.
tomentellum *Hutchinson & E. A. Bruce in Kew Bull.* 1931, 270.—Kenya Col.
viticoides *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 517 (1935).—Tanganyika Terr.

RIDAN Adans. (Compos.).
paniculata (*Walt.*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 1445 (1933): Athanasia paniculata.

RIGIOLEPIS Hook. f. (Ericac.; Vacciniac., Gen. Pl.).
bigibba (*J. J. Smith*) *J. J. Smith in Blumea*, i. 336 (1935): Vaccinium bigibbum.
caudatifolia (*Merrill*) *J. J. Smith*, *l. c.* 340: Vaccinium caudatifolium.
Endertii *J. J. Smith*, *l. c.* 339.—Borneo.
filiformis *J. J. Smith*, *l. c.* 340.—Borneo.
Korthalsii *J. J. Smith*, *l. c.* 334.—Borneo.
lanceolata (*Blume*) *J. J. Smith*, *l. c.* 330: Gaylussacia lanceolata.
leptantha (*Miq.*) *J. J. Smith*, *l. c.* 338: Vaccinium leptanthum.
macrophylla *J. J. Smith*, *l. c.* 335.—Borneo.
Moultonii (*Merrill*) *J. J. Smith*, *l. c.* 336: Vaccinium Moultonii.
poiana *J. J. Smith*, *l. c.* 327.—Borneo.
salicifolia *J. J. Smith*, *l. c.* 336.—Borneo.
sulcata (*Ridley*) *J. J. Smith*, *l. c.*: Vaccinium sulcatum.
uniflora (*J. J. Smith*) *J. J. Smith*, *l. c.* 330: Vaccinium uniflorum.

RIMARIA N. E. Brown (Ficoidac.).
Comptonii *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 369 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Luckhoffii (*L. Bolus*) *L. Bolus*, *l. c.* 368; *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 331, in obs.: Gibbaeum Luckhoffii.
Primosii *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 411 (1933).—Bushmanland.

RINOREA Aubl. (Violac.).
albidiflora *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 547 (1921), in obs.—Cameroons.
amaniensis *Engl. l. c.* 553, in obs.—Tanganyika Terr.
angolensis *Exell in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. Suppl., 12.—Angola.
australasica *C. T. White in Contrib. Arn. Arb.* No. IV. 73 (1933).—Austral. (Queensland).
Cafassi *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 6 (1935).—Kenya Col.
campoënsis *Brandt ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 552 (1921), in obs.—Cameroons.
carolinensis *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 921.—Ins. Palau.
celebica *Melch. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 205 (1934).—Celebes.
condensa (*King*) *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 173 (1934): Alsodeia condensa.
convallarioides (*E. G. Baker*) *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 548 (1921), in obs.: Alsodeia convallarioides.
Dawei (*Sprague*) *Brandt ex Engl. l. c.* 553, in obs.: Alsodeia Dawei.

RINOREA:—
djalonensis *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 93, in clavi, 95 (1927); *Hutchinson & Dalziel in Kew Bull.* 1928, 26, descr.—Guinea Gall.
endotricha *Sandwith in Kew Bull.* 1933, 324.—Guiana Brit.
floribunda (*King*) *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 171 (1934): Alsodeia floribunda.
gazana (*E. G. Baker*) *Brandt ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 552 (1921), in obs.: Alsodeia gazensis.
Hamelii *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 171 (1934).—Sumatra.
Hookeriana (*King*) *Burkill in Kew Bull.* 1935, 319; *Burkill, Dict. Econ. Prod. Mal. Penins.* ii. 1913 (1935): Alsodeia Hookeriana.
jaundensis *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 553 (1921), in obs.—Cameroons.
Johnstonei (*Stapf*) *Brandt ex Engl. l. c.* 551, in obs.: Alsodeia Johnstonei.
oppositifolia *Exell in Journ. Bot.* 1932, lxx. Suppl. 1, 216.—Congo Lusit.
pubiflora (*Benth.*) *Sprague & Sandwith in Kew Bull.* 1931, 171: Alsodeia pubiflora.
sumatrana *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 172 (1934).—Sumatra.
Woermanniana (*Buettn.*) *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 549 (1921), in obs.: Alsodeia Woermanniana.
Yatesii *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 173 (1934).—Sumatra.

RITCHIEA R. Br. (Capparidac.).
Balbi *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 5 (1935).—Kenya Col.
platyphylla *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. I. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 232 (1915), in obs.—Tanganyika Terr.
Tessmannii *Gilg ex Engl. l. c.* 231, in obs.—Cameroons.
Youngii *Exell in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 227.—Angola.

ROBIQUETIA Gaudich. (Orchidac.).
Endertii *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 153 (1931).—Borneo.

ROBYNSIA Hutchinson in Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr. ii. 108 (1931). *RUBIACEAE.*
glabrata *Hutchinson*, *l. c.*—Nigeria.

ROCCARDIA Neck. (Compos.).
albicans (*A. Cunn.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 532 (1894): Helichrysum albicans.
anthemoides (*DC.*) *Voss*, *l. c.* 531, in obs.: Helipterum anthemoides.
chlorocephala (*Benth.*) *Voss*, *l. c.* 530, in obs.: Helipterum chlorocephalum.
corymbiflora (*Schlecht.*) *Voss*, *l. c.* 532: Helipterum corymbiflorum.
Cotula (*DC.*) *Voss*, *l. c.* 535, in obs.: Helipterum Cotula.
floribunda (*DC.*) *Voss*, *l. c.* 531, in obs.: Helipterum floribundum.
Humboldtiana (*DC.*) *Voss*, *l. c.* 532: Helipterum Humboldtianum.
Manglesii (*F. Muell.*) *Voss*, *l. c.* 531: Helipterum Manglesii.
rosea (*Benth.*) *Voss*, *l. c.*: Helipterum roseum.
rubella (*Benth.*) *Voss*, *l. c.* 530, in obs.: Helipterum rubellum.

ROCHELIA Reichb. (Boraginac.).
disperma (*L.*) *Wettst. in Denkschr. Akad. Wiss. Wien*, I. Abth. 2, 31 (1885): Lithospermum dispermum.

RODRIGUEZIA Ruiz & Pav. (Orchidac.).
Limae *Brade in Arch. Mus. Nac. Rio de Janeiro*, 1932, xxxiv. 117.—Bras. (Rio de Janeiro).

ROEGNERIA K. Koch (Gramin.).
Abolinii (*Drob.*) *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 68 (1934), in clavi: Agropyron Abolinii.
amurensis (*Drob.*) *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 606 (1934): Agropyron amurense.

ROEGNERIA:—
angustiglumis (*Nevski*) *Nevski in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 14, 25 (1933), in obs.; *et in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 70 (1934), in clavi: Agropyron angustiglume.
borealis (*Turcz.*) *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 624 (1934): Triticum boreale.
brachypodioides *Nevski*, *l. c.* 617.—Sibir.
Buschiana (*Roshev.*) *Nevski*, *l. c.* 620: Agropyron Buschianum.
canina (*L.*) *Nevski in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 24 (1933), in obs.; *et in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 71 (1934), in clavi: Triticum caninum.
ciliaris (*Trin.*) *Nevski in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 14 (1933), in obs.; *et in Komarov, Fl. URSS*, ii. 607 (1934): Triticum ciliare.
confusa (*Roshev.*) *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 605 (1934): Agropyron confusum.
curvata (*Nevski*) *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 67 (1934): Agropyron curvatum.
curvatiformis (*Nevski*) *Nevski*, *l. c.* 69, in obs.: Agropyron curvatiforme.
czimganica (*Drob.*) *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 604 (1934): Agropyron czimganicum.
dentata (*Hook.*) *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 69 (1934), in obs.: Agropyron dentatum.
Drobovii (*Nevski*) *Nevski*, *l. c.* 71, in clavi: Agropyron Drobovii.
fibrosa (*Schrenk*) *Nevski*, *l. c.* 70, in clavi: Triticum fibrosum.
himalayana *Nevski*, *l. c.* 68, in clavi.—Turkestan.
interrupta *Nevski*, *l. c.*, in clavi; *et in Komarov, Fl. URSS*, ii. 611 (1934): Agropyron interruptum.
jacutensis (*Drob.*) *Nevski in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 24 (1933), in obs.; *et in Komarov, Fl. URSS*, ii. 625 (1934): Agropyron jacutense.
kamczadalorum *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 619 (1934).—Sibir.; Kamchatka.
Komarovii (*Nevski*) *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 71 (1934), in clavi: Agropyron Komarovii.
leptoura *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 623 (1934).—Transcaucas.; As. centr.
macrochaeta *Nevski*, *l. c.* 612.—As. centr.
macroura (*Turcz.*) *Nevski*, *l. c.* 627: Triticum macrourum.
oschensis *Nevski*, *l. c.* 619.—As. centr.
panormitana (*Bertol.*) *Nevski*, *l. c.* 612: Triticum panormitanum.
pendulina *Nevski*, *l. c.* 616.—Sibir. or. extr.
praecaespitosa (*Nevski*) *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 70 (1934), in clavi: Agropyron praecaespitosum.
pubescens (*Trin.*) *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 626 (1934): Triticum pubescens.
sajanensis *Nevski*, *l. c.* 624.—Sibir.
scandica *Nevski*, *l. c.*—Scandinav. bor.; Penins. Kola.
Schrenkiana (*Fisch. & Mey.*) *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 68 (1934), in clavi: Triticum Schrenkianum.
schugnanica (*Nevski*) *Nevski*, *l. c.* 66, in obs., 68, in clavi: Agropyron schugnanicum.
sclerophylla *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 614 (1934).—As. centr.
striata (*Steud.*) *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 71 (1934), in clavi: Triticum striatum.
taigae *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 616 (1934).—Sibir.
tenera *Nevski in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 24 (1933), in obs.—Hab.?
tianschanica (*Drob.*) *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 71 (1934), in clavi: Agropyron tianschanicum.
trachycaulon (*Link*) *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 599 (1934), in obs.: Triticum trachycaulon.
transbaicalensis (*Nevski*) *Nevski in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 14 (1933), in obs.; *et in Komarov, Fl. URSS*, ii. 619 (1934): Agropyron transbaicalense.

ROEGNERIA:—
transhyrcana *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 70 (1934), in clavi.—Transcasp.
troctolepis *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 623 (1934).—Caucas.
tschimganica (*Drob.*) *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 68 (1934), in clavi: Agropyron tschimganicum.
Turczaninovii (*Drob.*) *Nevski, l. c.*, in clavi: Agropyron Turczaninovii.
turuchanensis (*Reverd.*) *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 626 (1934): Agropyron turuchanense.
ugamica (*Drob.*) *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 69 (1934): Agropyron ugamicum.
uralensis (*Nevski*) *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 614 (1934): Agropyrum uralense.
viridiglumis *Nevski, l. c.* 616.—Reg. Ural.

ROEMERIA Medik. (Papaverac.).
procumbens *Aaronsohn & Oppenheimer in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1930, Sér. II. xxii. 305 (1931).—Palaest.

ROENTGENIA Urb. (Bignoniac.).
sordida (*Bureau & K. Schum.*) *Sprague & Sandwith in Kew Bull.* 1932, 91, cum descr. ampl.: Arrabidaea sordida.

ROETTLERA Vahl (Gesneriac.).
Morreniana *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 795 (1895), in obs.—Hab.?

ROEZLIA Hort. (Amaryllidac.).
[Furcraea Vent.]
bulbifera *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1038 (1895), in syn.: Furcraea Bedinghausii.

ROLLANDIA Gaudich. (Campanulac.).
St.-Johnii *Hosaka in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu*, xi. No. 13, p. 15 (1935).—Ins. Sandvic.
sessilifolia *Degener, Fl. Hawaiiensis*, Fam. 339 (1932).—Ins. Sandvic. (Oahu).

ROLLINIA A. St.-Hil. (Annonac.).
brevipes *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* xii. 147 (1934).—Bras. (Amaz.).
Broadwayi *R. E. Fries, l. c.* 145.—Trinidad; Venez.
centrantha *R. E. Fries, l. c.* 181.—Peruv.
cherimolioides *R. E. Fries, l. c.* 133.—Colomb.
curvipetala *R. E. Fries, l. c.* 178.—Bras. (Amaz.).
elliptica *R. E. Fries, l. c.* 160.—Guiana Bat.
Fendleri *R. E. Fries, l. c.* 152.—Venez.
Gardneri *R. E. Fries, l. c.* 157.—Bras. (Piauhy; Minas Geraes).
Glaziovii *R. E. Fries, l. c.* 166.—Bras. (Minas Geraes).
Herzogii *R. E. Fries, l. c.* 177.—Boliv.
insignis *R. E. Fries, l. c.* 161.—Peruv.
microcarpa (*Ruiz & Pav.*) *R. E. Fries, l. c.* 187: Annona microcarpa.
minensis *R. E. Fries, l. c.* 151.—Bras. (Minas Geraes).
neglecta *R. E. Fries, l. c.* 124.—Peruv.; Bras. (Rio de Janeiro).
occidentalis *R. E. Fries, l. c.* 165.—Peruv.; Argent.
Pickelii *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 783 (1933).—Bras. (Pernambuco).
rigidiflora *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* xii. 154 (1934).—Peruv.
sericea (*R. E. Fries*) *R. E. Fries, l. c.* 152: R. dolabripetala var. sericea.
sphaerantha *R. E. Fries, l. c.* 184.—Peruv.
Standleyi *R. E. Fries, l. c.* 128.—Costa Rica.
surinamensis *R. E. Fries, l. c.* 147.—Guiana Bat.
uniflora *R. E. Fries, l. c.* 182.—Peruv.
viridis *Bertoni in Agronomia*, v. Nos. 5–6, 191 (1913); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 142.—Parag.?
Williamsii *Rusby*; *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* xii. 186 (1934), descr.—Boliv.
xylopifolia (*A. St.-Hil. & Tul.*) *R. E. Fries, l. c.* x. 315 (1931), in obs.: Annona xylopifolia.

ROLLINIOPSIS Safford (Annonac.).
ferruginea *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* xii. 196 (1934).—Bras. (Rio de Janeiro).

ROMANSCHULZIA O. E. Schulz in Engl. Pflanzenreich, Crucif.-Sisymbr. 144 (1924); et in Engl. Jahrb. lxvi. 99 (1933). *CRUCIFERAE.*
Loeseneri *O. E. Schulz, l. c.* 156; *et l. c.* 101.—Guatem.
orizabae (*Schlecht. & Cham.*) *O. E. Schulz in Engl. Jahrb.* lxvi. 102 (1933): Nasturtium orizabae.
resediflora (*H. B. & K.*) *O. E. Schulz in Engl. Pflanzenreich, Crucif.-Sisymbr.* 144 (1924): Arabis resediflora.
turritoides (*Loes.*) *O. E. Schulz, l. c.* 156: Sisymbrium turritoides.

ROMULEA Maratti (Iridac.).
antiatlantica *Maire, Contrib. Étude Fl. Afr. Nord*, Fasc. 21, reimpr. p. 2 (1933); *Maire in Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc*, 1933, xiii. 273 (1934).—Marocc.
atrandra *Lewis in Fl. Pl. S. Afr.* 1934, xiv. t. 544.—Afr. austr. (Cape Prov.).
autumnalis *L. Bolus in Journ. Bot.* 1931, lxix. 12.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Daveauana *Emberger & Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 316.—Marocc.
Framesii *L. Bolus in Journ. Bot.* 1931, lxix. 13.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Malenconiana *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1933, xxiv. 228.—Marocc.
Muirii *N. E. Brown in Gard. Chron.* 1932, Ser. III. xcii. 467.—Afr. austr. (Cape Prov.).
setifolia *N. E. Brown, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).

RONDELETIA L. (Rubiac.).
appendiculata *Wall. ex Cowan in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 255 (1932), in syn.: Wendlandia appendiculata.
aurantiaca *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 39 (1932).—Haiti.
belizensis *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 91 (1935).—Guatem.; Brit. Honduras.
cana *Wall. ex Cowan in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 250 (1932), in syn.: Wendlandia exserta.
chimboracensis *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 203 (1931).—Ecuador.
cinerea *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 141 (1824).—Reg. Himal.
conferta *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 38 (1932).—Santo Domingo.
coriacea *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 142 (1824).—Nepal.
Edwardsii *Standley in Tropical Woods*, 1934, No. 37, p. 31.—Honduras.
exserta *Roxb. Hort. Beng.* 14 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 135 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 523 (1832).—Nepal; Bengal.
gracilispica *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 342 (1931).—Mexico.
hincheana *Urb. & Ekman*; *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 38 (1932), descr. ampl.—Santo Domingo.
longifolia *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 137 (1824).—Reg. Himal.
microcarpa *Urb. & Ekman*; *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 39 (1932).—Haiti.
nebulosa *Standley in Tropical Woods*, 1934, No. 37, p. 32.—Honduras.
paniculata *Roxb. Hort. Beng.* 15 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 133 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 521 (1832).—Arch. Mal.; Ins. Molucc. (Amboina).
pendula *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 140 (1824).—Ind. or.
peruviana *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 342 (1931).—Peruv.
scandens *Roxb. Hort. Beng.* 85 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 137 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 524 (1832).—Mauritius.
spicata *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 139 (1824).—Penins. Mal.
tetrandra *Roxb. Hort. Beng.* 85 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 136 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 524 (1832).—Penins. Mal.
tinctoria *Roxb. l. c.* 15, nomen; *et l. c.* 134; *et l. c.* 522.—Ind. or. (Bengal).
trichotoma *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 204 (1931).—Ecuador.

RONDONANTHUS Herzog in Fedde, Repert. xxix. 210 (1931). *ERIOCAULACEAE.*
roraimae (*Oliv.*) *Herzog, l. c.*: Paepalanthus roraimae.

RONNBERGIA E. Morr. & André (Bromeliac.).
marantoides *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcv. 43 (1931).—Bras. (Bahia).

RORAIMANTHUS Gleason in Phytologia, i. 39 (1933). *OCHNACEAE.*
Imthurnianus (*Oliv.*) *Gleason, l. c.* 40: Leitgebia Imthurniana.

RORIPPA Scop. (Crucif.).
anceps (*DC.*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 183 (1930): Nasturtium anceps.
aquatica (*Eaton*) *Palmer & Steyerm. in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1935, xxii. 550: Cochlearia aquatica.
elata (*Hook. f. & Thoms.*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 357 (1931): Barbarea elata.
microsperma (*DC.*) *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, i. 25 (1920): Nasturtium microspermum.
sublyrata (*Miq.*) *Hara in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 623: Cardamine sublyrata.

ROSA L. (Rosac.).
×aberrans *Wolley-Dod in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl., 92.—Anglia.
accumbens *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 279 (1935).—Suecia.
accurtaticeps *Matsson, l. c.* 36.—Suecia.
acmenodon *Matsson, l. c.* 42.—Suecia.
acmenophylla *Matsson*; *Matsson, l. c.* 180, descr. latine.—Suecia.
acrotoma *Matsson, l. c.* 112, in obs.—Suecia.
acutalis *Matsson, l. c.* 336, in obs., pro syn.: R. curtistricta.
acutantula *Matsson, l. c.* 119.—Suecia.
aemoniana *Puget ex R. Keller, Syn. Ros. Eur. Med.* (*Denkschr. Schweiz. Nat. Ges.* lxv.) 556 (1931), in syn.: R. dumetorum var. aemoniana *Kmet'*.
affectata *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 214 (1935).—Suecia.
allodon *Matsson, l. c.* 20.—Suecia.
altata *Matsson, l. c.*—Suecia.
alticola *Boulenger in Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. 171, in clavi, 220 (1935).—Turkestan.
amotella *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 224 (1935).—Suecia.
ancylodon *Matsson, l. c.* 43.—Suecia.
anfracta *Matsson, l. c.* 151.—Suecia.
apertella *Matsson, l. c.* 350, in obs.—Suecia.
arcuata *Matsson, l. c.* 108.—Suecia.
×arvensi-canina *Gremli ex Christ, Ros. Schweiz*, 197 (1873).—Helvet.
atona (*Matsson*) *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 348 (1935): R. mollis f. atona.
attenellidens *Matsson, l. c.* 24.—Suecia.
attenuipes *Matsson, l. c.* 101.—Suecia.
×aurosica *Charbon. in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 541.—Gallia.
Barbeyi *Boulenger in Ann. Soc. Sc. Brux.* liii. Sér. B, 142 (1933), in clavi; *et in Verh. Nat. Ges. Basel*, xliv. 281 (1933); *et in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 220 (1933).—Arab.
bathyphylla (*Matsson*) *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 64 (1935), in obs.: R. glauca f. bathyphylla.
Bernarditae *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 147 [1933], nomen.—Marocc.
×bickertonensis *Wolley-Dod in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl., 74.—Anglia.
biformis *Gremli ex R. Keller, Syn. Ros. Eur. Med.* (*Denkschr. Schweiz. Nat. Ges.* lxv.) 179 (1931), pro syn.: R. Jundzillii.
×Bishopi *Wolley-Dod in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl., 99.—Anglia.
Blomii *Lindstr. in Bot. Notiser*, 1931, 304.—Suecia.
Bottaiana *Boulenger in Ann. Soc. Sc. Brux.* liii. Sér. B, 142 (1933), in clavi; *et in Verh. Nat. Ges. Basel*, xliv. 280 (1933); *et in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 218 (1933).—Arab.
bounophila *Rip. ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. II. 72 (1892), in obs.—Eur.
brunneata (*Matsson*) *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 347 (1935): R. mollis f. brunneata.

ROSA:—
caecaticolor *Matsson in Svensk. Vet-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 320 (1935).—Suecia.
calva (*Franch. & Sav.*) *Boulenger in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 268 (1933): R. multiflora var. calva.
Cardoti *Boulenger in Ann. Soc. Sc. Brux.* liii. Sér. B, 143 (1933), in clavi; *et in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 254 (1933), descr. ampl.—China (Yunnan).
Cardotii *Masamune in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard.* ii. 135 (1932): R. Luciae var. formosana *Cardot.*
caryophyllacea *Besser*; *R. Keller, Syn. Ros. Eur. Med.* (*Denkschr. Schweiz. Nat. Ges.* lxv.) 408 (1931), descr. emend.—Eur. centr.
×Chasei *Druce, Brit. Pl. List*, ed. 2, 38 (1928).—Hibern.
chrysoderma *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 275 (1935).—Suecia.
cineracea *Crép. ex R. Keller, Syn. Ros. Eur. Med.* (*Denkschr. Schweiz. Nat. Ges.* lxv.) 264 (1931), in syn.: R. tomentosa f. cineracea *Borb.*
×clujensis *Prodan ex R. Keller, l. c.* 567, corrig., 767: R. canina × R. gallica.
Collinderi (*Matsson*) *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 114 (1935): R. Afzeliana var. Collinderi.
comparatidens *Matsson, l. c.* 266.—Suecia.
compensata *Matsson, l. c.* 134.—Suecia.
compescens *Matsson, l. c.* 40.—Suecia.
×concinnoides *Wolley-Dod in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl., 73.—Anglia.
concisa *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 158 (1935).—Suecia.
concolorans *Matsson, l. c.* 26, in obs.—Suecia.
concrescens *Matsson, l. c.* 278.—Suecia.
concumbens *Matsson, l. c.* 223.—Suecia.
×condaminea *Burnat ex R. Keller, Syn. Ros. Eur. Med.* (*Denkschr. Schweiz. Nat Ges.* lxv.) 577 (1931), in obs.: R. agrestis × R. Pouzini.
conferta (*Matsson*) *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 193 (1935), in obs.: R. glauca f. conferta.
continens *Matsson, l. c.* 231.—Suecia.
contracta (*Matsson*) *Matsson*; *Matsson, l. c.* 196, cum descr. latine: R. glauca var. contracta.
convinciens (*Matsson*) *Matsson, l. c.* 24: R. dumetorum var. convinciens.
convirescens (*Matsson*) *Matsson, l. c.* 271: R. Afzeliana f. convirescens.
coronifera *Matsson, l. c.* 355.—Suecia.
coronopsis *Matsson, l. c.* 59.—Suecia.
curtistricta *Matsson, l. c.* 335.—Suecia.
×curvispina *Wolley-Dod in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl., 105.—Anglia.
cyptodon *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 210 (1935).—Suecia.
danubialis *Borb. ex R. Keller, Syn. Ros. Eur. Med.* (*Denkschr. Schweiz. Nat. Ges.* lxv.) 386 (1931), in syn.: R. agrestis var. danubialis *R. Keller.*
decurtata (*Matsson*) *Matsson*; *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 194 (1935), cum descr. latine: R. glauca var. decurtata.
delicatula (*Matsson*) *Matsson, l. c.* 344: R. mollis f. delicatula.
deligatipes *Matsson, l. c.* 24.—Suecia.
dilutella *Matsson, l. c.* 346.—Suecia.
dinota *Matsson in Collinder, Medelpads Fl.* 1909, 129; *et in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 68 (1935).—Suecia.
dinotella *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 206 (1935).—Suecia.
dinotoides *Matsson, l. c.* 53.—Suecia.
dinotoma *Matsson, l. c.* 204.—Suecia.
×dubia *Wolley-Dod in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl., 99.—Anglia.
dubitabilis *Lindstr. in Bot. Notiser*, 1931, 300.—Suecia.
×Dufforti *Charbon. in Le Monde des Plantes*, 1933, xxxiv. 19, in obs.—Gallia.
elatophylla (*Matsson*) *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 62 (1935): R. Afzeliana var. elatophylla.
enelliptica *Matsson, l. c.* 117.—Suecia.
eustola *Matsson, l. c.* 104.—Suecia.
evoluta *Matsson, l. c.* 213.—Suecia.
excurrens *Matsson, l. c.* 315, in obs., pro syn.: R. fusicolor.

ROSA:—
expallescens (*Matsson*) *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 349 (1935): R. mollis f. expallescens.
exporrigens *Matsson, l. c.* 296.—Suecia.
falciculata *Matsson, l. c.* 160.—Suecia.
Fargesi *Boulenger in Ann. Soc. Sc. Brux.* liii. Sér. B, 143 (1933), in clavi; *et in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 253 (1933), descr. ampl.—China (Szechuan).
farinulosa *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 200 (1935).—Suecia.
Farreri *Stapf ex Cox, Pl. Introd. R. Farrer*, 49 (1930); *Stearn in Journ. Bot.* 1932, lxx. Suppl., 18, descr.; *et in Gard. Chron.* 1933, Ser. III. xciv. 238, in adnot., descr. ampl.—China (Kansu).
flavidicolor *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 19 (1935).—Suecia.
×Fontqueriana *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xii. 320 (1929).—Hispan.
×formosa *Kupčok in Bul. Grád. & Muz. Bot. Univ. Cluj*, 1926, vi. 12.—Czechoslovak.
×Franzonii *R. Keller, Syn. Ros. Eur. Med.* (*Denkschr. Schweiz. Nat. Ges.* lxv.) 221 (1931), in obs., non olim.—Eur. centr.
fricans *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 199 (1935), in obs.—Suecia.
fricatrix *Matsson, l. c.* 198.—Suecia.
fusicolor *Matsson, l. c.* 312.—Suecia.
×Gabrielis *Charbon. in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 541.—Gallia.
×Gandogeriana *Charbon. in Le Monde des Plantes*, 1932, xxxiii. 19.—Hab.?
gibberula *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 315 (1935).—Suecia.
×giennensis *Pau in Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xii. 319 (1929).—Hispan.
glaucellicolor *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 278 (1935).—Suecia.
glycyderma *Matsson, l. c.* 31.—Suecia.
Grisebachi *Boulenger in Ann. Soc. Sc. Brux.* liii. Sér. B, 142 (1933), in clavi; *et in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 213 (1933), descr. ampl.—As. Min.
grossella (*Matsson*) *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 341 (1935): R. mollis f. grossella.
grypotacta *Matsson, l. c.* 238.—Suecia.
haeggdangerensis *Matsson, l. c.* 103.—Suecia.
Hassei *Schalow in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1932, xliv. 64, in obs.—Eur.
hedyopsis *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 353 (1935).—Suecia.
Hegetschweileri *Bruegg. ex R. Keller, Syn. Ros. Eur. Med.* (*Denkschr. Schweiz. Nat. Ges.* lxv.) 267 (1931), pro syn.: R. tomentosa.
helsingica *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 287 (1935).—Suecia.
Henryi *Boulenger in Ann. Soc. Sc. Brux.* liii. Sér. B, 143 (1933), in clavi; *et in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 231 (1933), descr. ampl.—China (Szechuan).
hesslensis (*Matsson*) *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 339 (1935): R. mollis f. hesslensis.
Hinkei *Degen in Magyar Bot. Lap.* 1933, xxxii. 69.—Macedon.
hispidissima *Wolf ex R. Keller, Syn. Ros. Eur. Med.* (*Denkschr. Schweiz. Nat. Ges.* lxv.) 711 (1931), pro syn.: R. montana.
Holmii (*Matsson*) *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 277 (1935): R. Afzeliana var. Holmii.
holodonta *Stapf in Bot. Mag.* t. 9248 (1931).—China (Szechuan).
ichangensis *Boulenger in Ann. Soc. Sc. Brux.* liii. Sér. B, 143 (1933), in clavi; *et in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 243 (1933), descr. ampl.—China (Hupeh).
illizans *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 44 (1935).—Suecia.
ingressa *Matsson, l. c.* 22.—Suecia.
innocua *Rip. ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg.* viii. 239 (1869).—Eur.
inspiciens *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 33 (1935).—Suecia.
intermedia *Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* iv. 7 [1920].—Pyren. or.
introspectans *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 176 (1935).—Suecia.

ROSA:—
Jessleri *Godet ex R. Keller, Syn. Ros. Eur. Med.* (*Denkschr. Schweiz. Nat. Ges.* lxv.) 98 (1931), in obs.: R. spinosissima.
×Kabathi *Ansorge ex R. Keller, l. c.* 441, in obs.—Eur. centr.
Korschinskiana *Boulenger in Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. 170, in clavi, 213 (1935).—Turkestan.; Bokhara.
kyushiana *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 160.—Japon. (Kiushiu).
labrosa *Matsson in Almq. Sveriges Rosae*, 41 (1919); *et in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 149 (1935), in obs.—Suecia.
labrosula *Matsson*; *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 120 (1935), descr. latine.—Suecia.
latellispina *Matsson, l. c.* 144.—Suecia.
Lecomtei *Boulenger in Ann. Soc. Sc. Brux.* liii. Sér. B, 143 (1933), in clavi; *et in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 256 (1933), descr. ampl.—Indo-China (Tonkin).
lepidina *Matsson*; *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 254 (1935), descr. latine.—Suecia.
limitata *Matsson, l. c.* 49.—Suecia.
Lindbergiana *Lindstr. in Mem. Soc. Faun. Fl. Fenn.* 1933–4, No. 10, 436 (1935).—Suecia; Fennia.
litophylla *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 102 (1935).—Suecia.
macrifolia (*Matsson*) *Matsson, l. c.* 351: R. mollis f. macrifolia.
maginae *Cuatrec. in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1926, xxvi. 164.—Hispan.
Mairei *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 40 [1933], nomen.—Marocc.
mariascheinensis *J. B. Keller & Wiesb. ex R. Keller, Syn. Ros. Eur. Med.* (*Denkschr. Schweiz. Nat. Ges.* lxv.) 318 (1931), in syn.: R. tomentosa f. mariascheinensis *Wiesb.*
Marshalli *Wolley-Dod in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl., 20: R. scotica *Wolley-Dod.*
medelpadica (*Matsson*) *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 251 (1935): R. Afzeliana var. medelpadica.
mesatlantica *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 75 (1932).—Marocc.
mesostata *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 242 (1935).—Suecia.
microtacta *Matsson, l. c.* 324.—Suecia.
mixticolor *Matsson, l. c.* 308.—Suecia.
modificella *Matsson, l. c.* 324.—Suecia.
Morawskii *Blőcki ex R. Keller, Syn. Ros. Eur. Med.* (*Denkschr. Schweiz. Nat. Ges.* lxv.) 279 (1931), in syn.: R. tomentosa var. Morawskii *R. Keller.*
nanothamnus *Boulenger in Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. 170, in clavi, 206 (1935).—As. centr. et or.
obollata *Chaboisse & Faure ex R. Keller, Syn. Ros. Eur. Med.* (*Denkschr. Schweiz. Nat. Ges.* lxv.) 266 (1931), in syn.: R. tomentosa var. obollata *R. Keller.*
obtusata *Almq. & Matsson*; *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 256 (1935), descr.—Suecia.
oedensis *Matsson, l. c.* 241.—Suecia.
oelandica *Lindstr. in Bot. Notiser*, 1931, 305.—Suecia.
opaciformis *Matsson*; *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 200 (1935), descr. latine.—Suecia.
orthogramma *Matsson, l. c.* 304, pro syn.: R. solanifolia.
ovalis *Puget ex R. Keller, Syn. Ros. Eur. Med.* (*Denkschr. Schweiz. Nat. Ges.* lxv.) 440 (1931), in syn.: R. obtusifolia var. ovalis *R. Keller.*
oxyodonta *Kerner ex R. Keller, l. c.* 459, in syn.: R. canina f. oxyodonta *R. Keller.*
pallidula *Matsson*; *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 282 (1935), descr. emend.—Suecia.
×Paui *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xii. 321 (1929).—Hispan.
planispina *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 233 (1935).—Suecia.
pleosoma *Matsson, l. c.* 147, pro syn.: R. latellispina.

ROSA:—
Praegeri *Wolley-Dod in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl., 44: R. Chasei.
prodactidens *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 330 (1935).—Suecia.
prostacta *Matsson, l. c.* 104.—Suecia.
prostata (*Matsson*) *Matsson, l. c.* 261: R. Afzeliana var. prostata.
pseudo-adjecta *Kerner ex R. Keller, Syn. Ros. Eur. Med.* (*Denkschr. Schweiz. Nat. Ges.* lxv.) 79, corrig., 752 (1931), pro syn.: R. pendulina.
×pseudoglauca *Pinkw. in Deutsche Bot. Monatsschr.* 1899, xvii. 24.—German.
pseudo-scabrata *Błocki ex R. Keller, Syn. Ros. Eur. Med.* (*Denkschr. Schweiz. Nat. Ges.* lxv.) 498 (1931), in syn.: R. canina f. pseudo-scabrata *R. Keller.*
pseudoscabriuscula *R. Keller, l. c.* 57, in clavi, 276. —Eur. centr.
radiolofera *Lindstr. in Bot. Notiser,* 1931, 304.—Suecia.
rhombea *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 240 (1935).—Suecia.
×Rogersii *Wolley-Dod in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl., 92; *et in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles,* 1931, ix. 827 (1932).—Anglia.
Rosomena *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss,* i. 255 (1894), in syn.: R. gallica.
rotundatifrons *Lindstr. in Svensk Bot. Tidskr.* 1931, xxv. 430.—Suecia.
salsa *Lindstr. in Bot. Notiser,* 1931, 302.—Suecia.
Samuelssonii *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 141 (1935).—Suecia.
×sanguisorbella *De la Soie ex R. Keller, Syn. Ros. Eur. Med.* (*Denkschr. Schweiz. Nat. Ges.* lxv.) 719 (1931), in syn.: R. eglanteria × R. montana.
sarmentosa *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 188 (1935).—Suecia.
scaura *Matsson, l. c.* 335, in obs.—Suecia.
Schweinfurthi *Boulenger in Ann. Soc. Sc. Brux.* liii. Sér. B, 142 (1933), in clavi; *et in Verh. Nat. Ges. Basel,* xliv. 283 (1933); *et in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 221 (1933).—Arab.
×Schwertschlageri *Schalow in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1932, xliv. 65, in obs.—Siles.
sciochroma *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 75 (1935).—Suecia.
sembrancheriana *De la Soie ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1. 127 (1891), in obs.—Gallia.
silesiaca *Schalow in Jahresb. Schles. Gesellsch. Vaterl. Kultur,* 1928; cf. *Schalow in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1932, xliv. 62, in obs.—Siles.
simillima *Lindstr. in Bot. Notiser,* 1931, 302.—Suecia.
Soederblomii *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 235 (1935).—Suecia.
solanifolia (*Matsson*) *Matsson, l. c.* 298: R. Afzeliana var. solanifolia.
spinosella *Matsson, l. c.* 209.—Suecia.
×Standeni *Wolley-Dod in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl., 44.—Anglia.
Sternbergii *Gandoger ex R. Keller, Syn. Ros. Eur. Med.* (*Denkschr. Schweiz. Nat. Ges.* lxv.) 73 (1931), in syn.: R. pendulina var. Sternbergii *Braun.*
stiptophylla *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 81 (1935).—Suecia.
stratidens *Matsson, l. c.* 21.—Suecia.
strengnensis *Lindstr. in Bot. Notiser,* 1931, 301.—Suecia.
strictidens (*Matsson*) *Almq. in Acta Phytogeogr. Suec.* i. 558 (1929): R. coriifolia var. strictidens.
strictispina *Matsson in Svensk Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 148 (1935).—Suecia.
strobiloides *Matsson, l. c.* 84.—Suecia.
subcanescens *Braun ex R. Keller, Syn. Ros. Eur. Med.* (*Denkschr. Schweiz. Nat. Ges.* lxv.) 277 (1931), in syn.: R. tomentosa f. subcanescens *R. Keller.*
subcanina (*Hayek*) *R. Keller, l. c.* 59, in clavi, 622: R. glauca subsp. subcanina.
suberectiformis *Wolley-Dod in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl., 85.—Anglia.
×surreyana *Wolley-Dod, l. c.* 103.—Anglia.
Taeckholmiana *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 131 (1935).—Suecia.
tephrizans *Matsson, l. c.* 282.—Suecia.
textilis *Matsson, l. c.* 41.—Suecia.

ROSA:—
thermalis *Cornaz ex R. Keller, Syn. Ros. Eur. Med.* (*Denkschr. Schweiz. Nat. Ges.* lxv.) 705 (1931), in syn.: R. rhaetica var. thermalis *R. Keller.*
×Toddii *Wolley-Dod in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl., 106.—Anglia.
×tredecim-arborum *Buser ex R. Keller, Syn. Ros. Eur. Med.* (*Denkschr. Schweiz. Nat. Ges.* lxv.) 254 (1931), pro syn.: R. omissa × R. pendulina.
tschimganica *Raikova ex Baranov in Journ. Turkest. Branch Russ. Geogr. Soc.* 1924, xvii. 13, 33 (1925), nomen.—Turkestan. (Thian Shan).
ursina *Matsson in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xiv. No. 3, 38 (1935).—Suecia.
valentipes *Matsson, l. c.* 33.—Suecia.
Wahlenbergii *Matsson*; *Matsson, l. c.* 189, descr. latine.—Suecia.
yunnanensis (*Crép.*) *Boulenger in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 235 (1933): R. moschata var. yunnanensis.

ROSCOEA Sm. (Zingiberac.; Scitamin., Gen. Pl.).
flava *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 21 (1934).—China (Kwangtung).

ROSENIA Thunb. (Compos.).
angustifolia *Compton in Journ. Bot.* 1932, lxx. 337.—Afr. austr. (Cape Prov.).
nestleroides *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 318 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).

ROSMARINUS L. (Labiat.).
×Noeanus *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord,* 1932, xxiii. 206, in obs.—Afr. bor.

ROTANTHA Small, Man. Southeast. Fl. 1289 (1933). *CAMPANULACEAE.*
floridana (*S. Wats.*) *Small, l. c.*: Campanula floridana.
Robinsiae (*Small*) *Small, l. c.*: Campanula Robinsiae.

ROTTBOELLIA L. f. (Gramin.).
biflora *Roxb. Hort. Beng.* 82 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 357 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 357 (1832).—Ind. or.
glabra *Roxb. l. c.* 8, nomen; *et l. c.* 353; *et l. c.* 353. —Ind. or. (Bengal).
laevispica *Keng in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 157.—China (Anhwei; Kiangsu).

ROUCHERIA Planch. (Linac.).
angulata *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 373.—Venez.
parviflora (*Ducke*) *Ducke in Arquiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro,* i. 207 (1935); *et in Tropical Woods,* 1935, No. 43, 21: Hebepetalum parviflorum.
punctata (*Ducke*) *Ducke, ll. cc.*: Hebepetalum punctatum.

ROULINIA Decne. (Asclepiadac.).
cordata (*Vell.*) *Macbride in Candollea,* v. 401 (1934): Asclepias cordata.

ROUPALA Aubl. (Proteac.).
Dielsii *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., xi. 65 (1931).—Peruv.
excelsa *Roxb. Hort. Beng.* 83 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 365 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 362 (1832).—Ind. or. (Bengal).
Francii *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1933, Sér. II. v. 325.—N. Caled.
Pullei *Mennega in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 179.—Guiana Bat.
Raimondii *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., xi. 65 (1931).—Peruv.
robusta *Roxb. Hort. Beng.* 83 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 366 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 363 (1832).—Ind. or. (Assam).

ROUREA Aubl. (Connarac.).
Blanchetiana (*Progel*) *Kuhlm. in Arquiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro,* i. 40 (1934): Eichleria Blanchetiana.
ivorensis *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 516 (1928), in syn.: Jaundea pinnata.
minor (*Gaertn.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon,* vi. Suppl., 67 (1931): Aegiceras minus.
Progeliana *Kuhlm. in Arquiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro,* i. 40 (1934): Eichleria lucida.
rectinervia *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 353.—Bras. (Matto Grosso).

ROUREA:—
Schippii *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 58 (1935).—Brit. Honduras.

ROXBURGHIA Koen. ex Roxb. (Olacac.).
baccata *Koen. ex Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 168 (1820), in syn.; *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 163 (1832): Olax scandens.

ROYENA L. (Ebenac.).
amnicola *B. L. Burtt in Kew Bull.* 1935, 290.—Tanganyika Terr.
heterotricha (*Welw. ex Hiern*) *B. L. Burtt, l. c.* 289: Diospyros Loureiriana var. heterotricha.
media *Huguen. ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 106 (1835).—Hab. ?
zombensis *B. L. Burtt in Kew Bull.* 1935, 289.—Nyasaland.

ROYSTONEA O. F. Cook (Palmae).
jamaicana *L. H. Bailey, Gentes Herbarum,* iii. 384 (1935).—Jamaica.

RUAGEA Karst. (Meliac.).
Raimondii *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 385 (1932).—Peruv.

RUBIA L. (Rubiac.).
alata *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 384 (1820).—Nepal.
Garrettii *Craib in Kew Bull.* 1933, 29.—Siam.
haematantha *Airy-Shaw in Kew Bull.* 1931, 450.—China (Szechuan; Yunnan).
linearifolia *Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* v. 32 [1921].—Gallia.
longipetiolata *Bullock in Kew Bull.* 1932, 497.—Uganda; Kenya Col.
Munjista *Roxb. Hort. Beng.* 10 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 383 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 374 (1832).—Reg. Himal.
philippinensis *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3214 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).

RUBUS L. (Rosac.).
abactus *L. H. Bailey, Gentes Herbarum,* ii. 452 (1932).—U.S.A. (N. E. States).
abundiflorus *L. H. Bailey, l. c.* iii. 141 (1933).—U.S.A. (S. E. States).
acanthoides *Evers ex Hruby in Fedde, Repert.* xxxviii. 177 (1935), in obs., pro syn.: R. ancanthoides.
acanthophyllus (*Kupčok*) *Domin in Preslia,* xiii–xv. 121 (1935): R. serpens var. acanthophyllus.
×aciphylloides *Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen,* Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 224 (1932). —Gallia.
adenocomus (*Focke*) *Gustafsson in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 7, 27 (1934): R. dictyophyllus var. adenocomus.
adenolobus *W. C. R. Watson in London Nat.* 1934, 61 (1935): R. Koehleri var. cognatus *Rogers.*
adenophloeus (*Focke*) *Gustafsson in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 7, 28 (1934): R. ulugurensis var. adenophloeus.
agilis *L. H. Bailey, Gentes Herbarum,* iii. 134 (1933).—U.S.A. (Florida).
×albicans *Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen,* Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 210 (1932).—Gallia.
×aldenoënsis *Evers ex Hruby in Fedde, Repert.* xxxvi. 352 (1934).—S. Tirol.
altiarcuatus *W. Barton & Riddelsdell in Proc. Cottesw. Field Cl.* 1931–2, xxiv. Pts. 2–3, 198 (1933).—Brit.
ancanthoides *Evers ex Hruby in Fedde, Repert.* xxxviii. 177 (1935).—Istria.
anomaloides *Hruby, l. c.* xxxvi. 357 (1934).—Czechoslovak.
×asperidentiformis *Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen,* Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 219 (1932). —Gallia.
×asperidentifrons *Gustafsson & Toussaint, l. c.* 222. —Gallia.
atrocoeruleus *Gustafsson in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 7, 54 (1934).—Kenya Col.
audax *L. H. Bailey, Gentes Herbarum,* ii. 367 (1932). —U.S.A. (Florida).
Bakeranus *W. Barton & Riddelsdell in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 128.—Anglia.
Banghamii *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. viii. 68 (1934).—Sumatra.
Bartonianus *Peck in Rhodora,* 1934, xxxvi. 267.—U.S.A. (Oregon).

RUBUS :—

beirensis (*G. Sampaio*) *G. Sampaio*; *G. Sampaio in Bol. Soc. Brot.* Sér. II. x. 111 (1935), in adnot.: R. villicaulis var. beirensis.

Bigelovianus *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, iii. 255 (1934).—U.S.A. (N. York; Massachusetts).

bonus *L. H. Bailey, l. c.* iii. 133 (1933).—U.S.A. (Mississippi; Alabama; Georgia).

× brevithyrsoideus *Gustafsson & Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 234 (1932).—Gallia.

Brittonii *W. Barton & Riddelsdell in Journ. Bot.* 1931, lxix. 191.—Anglia.

Bushii *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, ii. 403 (1932).—U.S.A. (Missouri).

× callichranthoides *Ade & A. Schumacher in Fedde, Repert.* xxx. 232 (1932).—German.

× calvituriosus *Kükenth. in Mitt. Thüring. Bot. Ver.* n. f. xl. 12 (1931).—German.

× cardiophyllopsis *Gustafsson in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 182 (1932).—Gallia.

caucasigena (*Sudre*) *Juzepczuk in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 295 (1934).—Caucas.

centralis *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, ii. 330 (1932).—U.S.A. (Indiana; Virginia; Maryland).

× Chevalieri *Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 173 (1932).—Gallia.

Chingianus *Hand.-Mazz. in Sinensia*, ii. 124 (1932).—China (Kwangsi).

Chiovendae *Gustafsson in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 7, 50 (1934).—Erythraea.

× chloophylloides *Gustafsson & Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 150 (1932).—Gallia.

cinerosus *W. M. Rogers ex Riddelsdell in Journ. Bot.* 1906, xliv. 95.—Cambria.

cissburiensis *W. Barton & Riddelsdell, l. c.* 1931, lxix. 238.—Anglia.

× coarctatifrons *Gustafsson & Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 191 (1932).—Gallia.

coarctatus *Hruby in Fedde, Repert.* xxxviii. 175 (1935).—Hungar.

complex *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, ii. 336 (1932).—U.S.A. (Michigan).

confertiflorus *W. C. R. Watson in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 194.—Anglia.

× confusiformis *Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 180 (1932).—Gallia.

conjungens (*Bab.*) *W. C. R. Watson in London Nat.* 1934, 66 (1935): R. corylifolius var. conjungens.

conspersus *W. C. R. Watson in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 255.—Anglia.

× conspicuifrons *Gustafsson & Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 243 (1932).—Gallia.

× constrictifrons *Gustafsson & Toussaint, l. c.* 192.—Gallia.

× Corbiereanus *Toussaint & Gustafsson, l. c.* 216.—Gallia.

crudelis *W. C. R. Watson in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1931, ix. 543, in obs., 645 (1932); *et in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 228.—Anglia.

× cuneatifrons *Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 173 (1932).—Gallia.

× cuneatoides *Gustafsson & Toussaint, l. c.* 175.—Gallia.

curvispinis *W. C. R. Watson in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1930, ix. 261 (1931).—Anglia.

curvispinus *W. C. R. Watson, l. c.*; *et l. c.* 1932, x. 141 (1933): R. curvispinis *W. C. R. Watson.*

× cuspidiformis *Toussaint & Didier in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 184 (1932).—Gallia.

× darnetalis *Toussaint, l. c.* 154.—Gallia.

dasycoccus *W. C. R. Watson in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1932, x. 21 (1933): R. lasiocarpus *W. C. R. Watson.*

dasyphyllus (*W. M. Rogers*) *Vachell in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1933, x. 702 (1934): R. Koehleri subsp. dasyphyllus.

Deamii *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, ii. 463 (1932).—U.S.A. (Indiana; Tennessee).

× Debrayi *Toussaint & Gustafsson in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 245 (1932).—Gallia.

RUBUS :—

Delabathiensis *Gustafsson in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 7, 38 (1934).—Madag.

dentatifolius (*Briggs*) *Druce in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1930, ix. 349 (1931): R. Borreri var. dentatifolius.

× discerptifrons *Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 244 (1932).—Gallia.

diversiarmatus *W. C. R. Watson in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1930, ix. 262, 429 (1931).—Anglia.

diversus *W. C. R. Watson, l. c.* 262, nomen.—Anglia.

dolichophyllus *Hand.-Mazz. in Sinensia*, iii. 186 (1933): R. Chingianus.

doyonensis *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 487 (1933).—China (Yunnan).

efferatus *Craib, Fl. Siam. Enum.* i. 570 (1931): R. ferox *Wall.*

elgonensis *Bullock ex Burtt Davy, Check Lists For. Trees & Shrubs Brit. Emp.* No. 1, *Uganda*, 95 (1935).—Uganda.

× elongatus *Brainerd & Peiters. in Bull. Univ. Verm. & State Agric. Coll.* No. 217, 71 (1920).—U.S.A. (N. York).

euoplus *W. C. R. Watson in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1932, x. 21 (1933): R. perarmatus *W. C. R. Watson.*

Eversii *Hruby in Fedde, Repert.* xxxviii. 172 (1935).—S. Tirol.

× exigeios (*Evers*) *Hruby, l. c.* xxxvi. 369 (1934): R. Bellardii var. exigeios.

facetus *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, ii. 449 (1932).—U.S.A. (Connecticut).

× falsiacuticuspis *Gustafsson & Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 181 (1932).—Gallia.

× falsicongestus *Toussaint, l. c.* 197.—Gallia.

× falsicontractifolius *Toussaint, l. c.* 204.—Gallia.

× falsicuneatiformis *Toussaint, l. c.* 200.—Gallia.

× falsicuneatus *Gustafsson & Toussaint, l. c.* 198.—Gallia.

× falsidiscerptus *Toussaint, l. c.* 214.—Gallia.

× falsiferox *Gustafsson & Toussaint, l. c.* 185.—Gallia.

× falsilepidus *Toussaint, l. c.* 186.—Gallia.

× falsi-Menkei *Toussaint, l. c.* 227.—Gallia.

× falsimultifidus *Gustafsson & Toussaint, l. c.* 228.—Gallia.

× falsipallidus *Toussaint & Gustafsson, l. c.* 221.—Gallia.

× falsivestitus *Gustafsson & Toussaint, l. c.* 186.—Gallia.

× falsi-Winteri *Gustafsson & Toussaint, l. c.* 184.—Gallia.

× flexuosifrons *Toussaint & Gustafsson, l. c.* 232.—Gallia.

× flexuosoides *Toussaint, l. c.* 219.—Gallia.

Forrestianus *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 490 (1933).—China (Yunnan).

× fraternus *Brainerd & Peiters. in Bull. Univ. Verm. & State Agric. Coll.* No. 217, 59 (1920).—U.S.A. (Vermont; N. Hampshire).

Friesiorum *Gustafsson in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 7, p. 13 (1934).—Kenya Col.

furnarius *W. Barton & Riddelsdell in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 129.—Anglia.

gelatinosus *Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1931, xxi. 250.—Formosa.

× givernyensis *Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 184 (1932).—Gallia.

glanduliger *W. C. R. Watson in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1934, x. 794 (1935).—Anglia.

× goniophyllomorphus *Gustafsson & Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 242 (1932).—Gallia.

Grimesii *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, ii. 331 (1932).—U.S.A. (Virginia).

griseoviridis *W. Barton & Riddelsdell in Proc. Cottesw. Field Cl.* 1931–2, xxiv. Pts. 2–3, 204 (1933).—Brit.

Gustafssoni *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 41 (1935).—Kenya Col.

× Gustafssonii *Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 187 (1932).—Gallia.

Hatsushimai *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 17.—Japon. (Kiushiu).

RUBUS :—

Hayatai *Nemoto in Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 514 (1931): R. hirsutus *Hayata.*

× hedycarpiformis *Hruby in Fedde, Repert.* xxxviii. 180 (1935).—S. Tirol.

× hemiaciphyllus *Toussaint & Gustafsson in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 154 (1932).—Gallia.

× hemianisodon *Toussaint & Didier in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 197 (1932).—Gallia.

× hemichloophyllus *Gustafsson in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 203 (1932).—Gallia.

× hemigoniophyllus *Gustafsson & Toussaint, l. c.* 194.—Gallia.

× hemilasiocladus *Gustafsson & Toussaint, l. c.* 198.—Gallia.

× hemimacrophylloides *Gustafsson, l. c.* 155.—Gallia.

× hemimelanocaulon *Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 199 (1932).—Gallia.

× hemimicroanchus *Gustafsson in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 217 (1932).—Gallia.

× hemiphyllostachys *Toussaint & Gustafsson, l. c.* 189.—Gallia.

× hemistereobelus *Toussaint, l. c.* 162.—Gallia.

× hemithyrsanthus *Gustafsson & Toussaint, l. c.* 205.—Gallia.

hemithyrsus *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 488 (1933).—China (Yunnan).

herminicus (*G. Sampaio*) *G. Sampaio*; *G. Sampaio in Bol. Soc. Brot.* Sér. II. x. 117 (1935), in adnot.: R. Radula var. herminicus.

hirtior *W. C. R. Watson in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1931, ix. 764 (1932).—Anglia.

Hisautsii (*Koidz.*) *Koidz. ex Hisauchi in Journ. Jap. Bot.* ix. 307 (1933): R. palmatus var. Hisautsii.

honorus *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, iii. 257 (1934).—U.S.A. (N. York; Pennsylvania; Connecticut).

× Hoschedei *Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 190 (1932).—Gallia.

huillensis *Welw. ex Oliv. Fl. Trop. Afr.* ii. 375 (1871), in obs., pro syn.: R. rigidus.

hunanensis *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 497 (1933).—China (Hunan).

× hylophiloides *Gustafsson & Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 193 (1932).—Gallia.

× hypoleucanthemus *Toussaint, l. c.* 200.—Gallia.

× hypomacrophyllus *Toussaint, l. c.* 232.—Gallia.

hyrcanus *Juzepczuk in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 295 (1934).—Caucas.

immerens (*Kupčok*) *Domin in Preslia*, xiii–xv. 122 (1935): R. erythroxanthus var. immerens.

immixtus *Gustafsson in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 7, p. 14 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).

impar *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, iii. 269 (1934).—U.S.A. (Indiana).

impos *L. H. Bailey, l. c.* ii. 455 (1932).—U.S.A. (Indiana).

impressinervius *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* xi. 12 (1932).—China (Chekiang).

× insignitifrons *Gustafsson & Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 173 (1932).—Gallia.

insons *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, ii. 394 (1932).—U.S.A. (N. York; Massachusetts; Connecticut).

intercurrens *Gustafsson in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 7, 61 (1934).—Transvaal.

interjungens *Gustafsson, l. c.* 32.—Tanganyika Terr.

ipecensis *K. H. Rechinger in Fedde, Repert.* xxxviii. 327 (1935).—Albania.

× isandrogynus (*Borb.*) *Domin in Preslia*, xiii–xv. 118 (1935): R. Schleicheri var. isandrogynus.

isensis *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 406.—Japon. (Hondo).

Janssonii *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, ii. 462 (1932).—U.S.A. (Massachusetts; Connecticut).

Kennedyanus *Fernald in Rhodora*, 1931, xxxiii. 208.—Newfoundland.

Koidzumii *Hisauchi in Journ. Jap. Bot.* ix. 307 (1933): R. laudabilis var. glaber *Koidz.*

RUBUS :—

kollundicola *Gustafsson in Svensk Bot. Tidskr.* 1935, xxix. 407.—Dania.
largificus *W. C. R. Watson*; *W. C. R. Watson in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1931, ix. 766 (1932), latine.—Anglia.
lasiocarpus *W. C. R. Watson, l. c.* 1930, ix. 262, 435 (1931): R. amplificatus *Sudre, Rubi Europ.* 47 (1909), non *Lees.*
laudatus *A. Berger in Hedrick, Small Fruits N. York*, 77 (1925).—U.S.A. (Centr. States).
× lebelianifrons *Gustafsson & Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 198 (1932).—Gallia.
lepidulus (*Sudre*) *Juzepczuk in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 296 (1934).—Caucas.
× leucanthemimorphus *Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 232 (1932).—Gallia.
× leucanthemopsis *Toussaint, l. c.* 234.—Gallia.
liburnicus *Evers ex Hruby in Fedde, Repert.* xxxiii. 389 (1934), pro syn.: R. ulmifolius var. peduncularis *Timb. Lag.*
lloënsis *Benoist in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 325.—Ecuador.
longifolius *W. C. R. Watson in London Nat.* 1934, 62, 63 (1935).—Anglia.
louisianus *A. Berger in Hedrick, Small Fruits N. York*, 78 (1925).—U.S.A. (Louisiana; S. Carolina).
macrobothrys *Evers ex Hruby in Fedde, Repert.* xxxiii. 390 (1934), pro syn.: R. ulmifolius f. mucronifolius *P. J. Müller.*
× macrophyllopsis *Gustafsson & Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 204 (1932).—Gallia.
madagascarius *Gustafsson in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 7, 50 (1934).—Madag.
magniflorus *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, iii. 137 (1933).—U.S.A. (Mississippi; Florida).
× manazurensis *Hisauchi in Journ. Jap. Bot.* ix. 299, 306 (1933).—Japon. (Hondo).
michiganensis (*Card*) *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, ii. 334 (1932): R. villosus var. michiganensis.
missouricus *L. H. Bailey, l. c.* 459.—U.S.A. (Missouri).
monensis *W. Barton & Riddelsdell in Journ. Bot.* 1932, lxx. 108.—Cambria.
× montaniformis *Gustafsson & Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 154 (1932).—Gallia.
× montaurensis *Toussaint & Gustafsson, l. c.* 233.—Gallia.
montensis *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, ii. 378 (1932).—U.S.A. (Pennsylvania).
morganwgensis *W. Barton & Riddelsdell in Proc. Cottesw. Field Cl.* 1931–2, xxiv. Pts. 2–3, 218 (1933).—Brit.
Moylei *W. Barton & Riddelsdell, l. c.* 210.—Anglia.
× multifidiformis *Gustafsson & Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 245 (1932).—Gallia.
× multifidifrons *Toussaint & Didier in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 225 (1932).—Gallia.
neo-ebudicus *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 249.—N. Hebrides.
nitidioides *W. C. R. Watson in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1928, viii. 786 (1929); *et l. c.* 1931, ix. 765 (1932).—Anglia.
novanglicus *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, ii. 353 (1932).—U.S.A. (Massachusetts; Connecticut).
nuticeps *W. Barton & Riddelsdell in Proc. Cottesw. Field Cl.* 1931–2, xxiv. Pts. 2–3, 217 (1933): R. fuscus var. nutans *W. M. Rogers.*
Ohlseni *Hruby in Fedde, Repert.* xxxiii. 384 (1934).—Scandinav.
Ohmineanus *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 17.—Japon. (Hondo).
oklahomus *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, ii. 418 (1932).—U.S.A. (Oklahoma).
× orbiculatiformis *Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 184 (1932).—Gallia.
oriens *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, ii. 333 (1932).—Canada (Quebec).

RUBUS :—

panduratus *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 490 (1933).—China (Kweichau).
par *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, iii. 144 (1933).—U.S.A. (N. Carolina).
parciflorus *Focke in Biblioth. Bot.* lxxii. 174 (1911), in syn.: R. pauciflorus *Baker.*
parvipetalus *Odashima in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1935, vii. 81.—Formosa.
pauxillus *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, ii. 415 (1932).—U.S.A. (Virginia; Georgia).
pendulus *Rusby in Torreya*, 1933, xxxiii. 41.—Colomb.
penetrans *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, iii. 147 (1933).—U.S.A. (Florida).
× peraffinis *Domin in Preslia*, xiii–xv. 119 (1935).—Czechoslovak.
perarmatus *W. C. R. Watson in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1930, ix. 260, 424 (1931), cum descr. ampl.: R. Salteri *Sudre, Rubi Europ.* 25 (1908), non *Bab.*
peruncinatus *Juzepczuk in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 297 (1934).—Caucas.
petalabigens *Gustafsson in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 7, 31 (1934).—Erythraea.
pinnatiformis *Gustafsson in Bot. Notiser*, 1932, 17.—Rhodesia.
pistoris *W. Barton & Riddelsdell in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 127.—Brit.
platysepalus *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 493 (1933).—China (Hunan).
× plicatifrons *Toussaint & Gustafsson in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 157 (1932).—Gallia.
polyodontus *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 484 (1933).—China (Yunnan).
pontalto *Evers ex Hruby in Fedde, Repert.* xxxiii. 389 (1934), pro syn.: R. ulmifolius var. peduncularis *Timb. Lag.*
× procerifrons *Gustafsson & Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 180 (1932).—Gallia.
× proceroides *Toussaint, l. c.* 187.—Gallia.
× propinquifrons *Toussaint & Gustafsson, l. c.* 252: R. hemiphyllostachys *Toussaint & Gustafsson.*
× propinquoides *Toussaint, l. c.* 180.—Gallia.
× pseudoacuticuspis *Gustafsson & Toussaint, l. c.* 177.—Gallia.
× pseudoalterniflorus *Gustafsson & Toussaint, l. c.* 162.—Gallia.
× pseudo-andegavensis *Gustafsson & Toussaint, l. c.* 181.—Gallia.
× pseudoanisodon *Gustafsson & Toussaint, l. c.* 184.—Gallia.
pseudoapetalus *Gustafsson in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 7, 41 (1934).—Madag.
× pseudo-Bloxamii *Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 222 (1932).—Gallia.
× pseudo-Boulayi *Toussaint, l. c.* 239.—Gallia.
× pseudobrachyadenes *Toussaint, l. c.* 228.—Gallia.
× pseudobscurus *Gustafsson & Toussaint, l. c.* 199.—Gallia.
pseudo-Buergeri *Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1931, xxi. 249.—Formosa.
× pseudocondensatus *Gustafsson in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 209 (1932).—Gallia.
× pseudoconfusus *Toussaint & Gustafsson, l. c.* 179.—Gallia.
× pseudocongestus *Toussaint, l. c.* 175.—Gallia.
× pseudocontractifolius *Toussaint, l. c.* 173.—Gallia.
× pseudocryptadenes *Gustafsson & Toussaint, l. c.* 251.—Gallia.
× pseudocuneatiformis *Toussaint, l. c.* 176.—Gallia.
× pseudoderasifolius *Gustafsson & Toussaint, l. c.* 246.—Gallia.
× pseudodilatatifolius *Toussaint, l. c.* 196.—Gallia.
× pseudoericetorum *Toussaint, l. c.* 212.—Gallia.
× pseudo-flexuosus *Toussaint, l. c.* 218.—Gallia.
× pseudoglaucinellus *Domin in Preslia*, xiii–xv. 121 (1935): R. amblyphyllus *Kupčok.*
× pseudo-hamulosus *Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 149 (1932).—Gallia.
× pseudo-hebecaulis *Gustafsson & Toussaint, l. c.* 162.—Gallia.

RUBUS :—

pseudohedycarpus *Hruby in Fedde, Repert.* xxxviii. 179 (1935).—Austria.
× pseudoinsignitus *Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 197 (1932).—Gallia.
× pseudo-Lebelianus *Toussaint, l. c.* 210.—Gallia.
× pseudo-lepidus *Toussaint, l. c.* 158.—Gallia.
× pseudo-Menkei *Toussaint & Gustafsson, l. c.* 233.—Gallia.
× pseudomucronifolius *Toussaint, l. c.* 204.—Gallia.
× pseudo-Muelleri *Toussaint & Gustafsson, l. c.* 181.—Gallia.
× pseudophyllostachys *Toussaint & Gustafsson, l. c.* 188.—Gallia.
× pseudoplicatus *Toussaint & Gustafsson, l. c.* 191.—Gallia.
× pseudoprolongatus *Toussaint & Gustafsson, l. c.* 160.—Gallia.
× pseudostereacanthoides *Gustafsson & Toussaint, l. c.* 251.—Gallia.
× pseudo-Subertii *Toussaint, l. c.* 194.—Gallia.
× pseudosubhispidulus *Gustafsson & Toussaint, l. c.* 242.—Gallia.
× pseudovulgatus *Toussaint & Gustafsson, l. c.* 179.—Gallia.
× pseudovulnerificus *Toussaint, l. c.* 180.—Gallia.
purbeckensis *W. Barton & Riddelsdell in Journ. Bot.* 1932, lxx. 190.—Anglia.
× pyramidalifrons *Gustafsson & Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 158 (1932).—Gallia.
× questierifrons *Gustafsson & Toussaint, l. c.* 192.—Gallia.
rhodanthus *W. C. R. Watson in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 224: R. carpinifolius var. roseus *Weihe & Nees.*
× rigidiusculus *Domin in Preslia*, xiii–xv. 112 (1935).—Czechoslovak.
Rilstonei *W. Barton & Riddelsdell in Proc. Cottesw. Field Cl.* 1931–2, xxiv. Pts. 2–3, 213 (1933).—Anglia.
ritozanensis *Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1931, xxi. 250.—Formosa.
Rohlenae *Hruby ex Rohlena in Mém. Soc. Sc. Bohême*, 1933, No. 8, p. 13 (1934); *Hruby in Fedde, Repert.* xxxvi. 358 (1934).—Montenegro.
rubribracteatus *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* xi. 10 (1932).—China (Kwangsi).
rubro-angustifolius *Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1931, xxi. 221.—Formosa.
× rudifrons *Gustafsson & Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 160 (1932).—Gallia.
St.-Giorgii *Evers ex Hruby in Fedde, Repert.* xxxiii. 390 (1934), pro syn.: R. amplifoliatus f. vulgaris *Sudre.*
salwinensis *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 491 (1933).—China (Yunnan).
× semiadornatiformis *Toussaint & Gustafsson in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 244 (1932).—Gallia.
× semiaggericola *Toussaint, l. c.* 199.—Gallia.
× semiangustifractus *Gustafsson & Toussaint, l. c.* 174.—Gallia.
× semi-Bloxamii *Toussaint & Gustafsson, l. c.* 245.—Gallia.
× semibrevithyrsus *Toussaint, l. c.* 246.—Gallia.
× semicitriodorus *Gustafsson & Toussaint, l. c.* 174.—Gallia.
× semicondensatus *Gustafsson & Toussaint, l. c.* 210.—Gallia.
× semicongestus *Toussaint & Gustafsson, l. c.* 179.—Gallia.
× semiconspicuus *Ade & A. Schumacher in Nachrichtenbl. Oberberg. Arb. Gem. naturw. Heimatforsch. Waldbröl*, 14 (1930); *et in Fedde, Repert.* xxx. 234 (1932).—German.
× semicontractifolius *Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 197 (1932).—Gallia.
× semicuneatiformis *Toussaint, l. c.* 204.—Gallia.
× semicurtiglandulosus *Toussaint, l. c.* 247.—Gallia.
× semicuspidifer *Gustafsson & Toussaint, l. c.* 183.—Gallia.
× semiderasifolius *Toussaint, l. c.* 236.—Gallia.
× semidilatatifolius *Toussaint, l. c.* 173.—Gallia.

RUBUS :—
×semihebecarpus *Kükenth. in Mitt. Thüring. Bot. Ver.* n. f. xl. 13 (1931).—German.
×semilacertosus *Gustafsson & Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 158 (1932).—Gallia.
×semi-Lebelianus *Toussaint, l. c.* 211.—Gallia.
×semileptobelus *Kükenth. in Mitt. Thüring. Bot. Ver.* n. f. xl. 5 (1931).—German.
×semimagnificus *Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 201 (1932).—Gallia.
×semi-Menkei *Toussaint, l. c.* 225.—Gallia.
×semi-Muelleri *Ade & A. Schumacher in Fedde, Repert.* xxx. 235 (1932).—German.
×semi-Muelleri *Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 207 (1932), non praec.—Gallia.
×semimultifidus *Toussaint, l. c.* 222.—Gallia.
×semiopulentus *Gustafsson & Toussaint, l. c.* 225.—Gallia.
×semipeduncularis *Toussaint, l. c.* 179.—Gallia.
×semiprolongatus *Gustafsson & Toussaint, l. c.* 161.—Gallia.
×semipurpurascens *Toussaint, l. c.* 226.—Gallia.
×semi-Ripartii *Toussaint & Gustafsson, l. c.* 195.—Gallia.
×semirubrans *Ade & A. Schumacher in Fedde, Repert.* xxx. 233 (1932).—German.
×semisaxicola *Gustafsson & Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 222 (1932).—Gallia.
×semi-Schlechtendalii *Gustafsson & Toussaint, l. c.* 196.—Gallia.
×semitruncifolius *Gustafsson & Toussaint, l. c.* 207.—Gallia.
×semivulgatus *Toussaint, l. c.* 197.—Gallia.
×semi-Winteri *Gustafsson & Toussaint, l. c.* 178.—Gallia.
×Senayi *Gustafsson, l. c.* 215.—Gallia.
severus *Brainerd ex Fernald in Rhodora*, 1931, xxxiii. 102.—U.S.A. (N. Hampshire).
×silvaticiformis *Gustafsson & Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 159 (1932).—Gallia.
×similicontractifolius *Toussaint, l. c.* 175.—Gallia.
×similicuneatus *Toussaint, l. c.* 174.—Gallia.
×similivulnerificus *Toussaint, l. c.* 185.—Gallia.
Smithii *Backer, Schoolfl. Java*, 456 (1911).—Java.
sohayakiensis *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 16.—Japon. (Shikoku).
sons *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, ii. 312 (1932).—U.S.A. (Louisiana; Mississippi ?).
stanneus *W. Barton & Riddelsdell in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 231.—Anglia.
×stenobothrys *Evers ex Hruby in Fedde, Repert.* xxxvi. 354 (1934), pro syn.: R. substerilis f. stenobothrys *Hruby*.
subcarpinifolius (*W. M. Rogers & Riddelsdell*) *Riddelsdell in Journ. Bot.* 1931, lxix. 241: R. incurvatus var. subcarpinifolius.
×subcuspidifer *Gustafsson & Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 200 (1932).—Gallia.
subintegribasis *Druce, Brit. Pl. List*, 30 (1928): R. integribasis *W. M. Rogers, Handb. Brit. Rubi*, 24 (1900), non *P. J. Muell.*
×submultifidus *Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 234 (1932).—Gallia.
×subspinulifer *Toussaint & Didier, l. c.* 246.—Gallia.
subtomentosiformis *Hruby in Fedde, Repert.* xxxvi. 382 (1934).—Austria.
×subtruncatiformis *Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 179 (1932).—Gallia.
×subtruncatoides *Toussaint, l. c.* 172.—Gallia.
subulatus *Welw. ex Focke in Biblioth. Bot.* lxxii. 177 (1911), in syn.: R. pinnatus *Willd.*
surrejanus *W. Barton & Riddelsdell in Journ. Bot.* 1932, lxx. 189.—Anglia.
tardus *W. C. R. Watson in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1934, x. 794 (1935).—Anglia.
tennesseanus *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, iii. 270 (1934).—U.S.A. (Tennessee).
×thyrsanthiopsis *Toussaint & Gustafsson in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 188 (1932).—Gallia.

RUBUS :—
×thyrsanthoides *Gustafsson & Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 191 (1932).—Gallia.
tiponensis *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1933, xxiii. 93.—Formosa.
tomentocaulis *Evers ex Hruby in Fedde, Repert.* xxxiii. 390 (1934), pro syn.: R. mostarensis.
transvaliensis *Gustafsson in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 7, 55 (1934).—Transvaal.
Tsangii *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 28 (1934).—China (Kwangtung).
tsangorum *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 485 (1933).—China (Chekiang; Fokien; Kwangtung).
turkestanicus (*Regel*) *Pavlov in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 19, p. 17 (1935): R. caesius var. turkestanicus.
×Urbanianus *A. Berger in Hedrick, Small Fruits N. York*, 68 (1925).—U.S.A. (N. York).
variesectilis *Gustafsson in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 7, 57 (1934).—Angola.
vasanskyensis *Evers ex Hruby in Fedde, Repert.* xxxiii. 390 (1934), pro syn.: R. amplifoliatus f. vasauskaënsis *Hruby*.
vedrariensis *Hort. ex Bull. Soc. Dendr. France*, 1933, 82.—Hab. ?
×vulgatifrons *Toussaint in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 204 (1932).—Gallia.
×vulnericiformis *Toussaint, l. c.* 241.—Gallia.
×vulnerificoides *Toussaint & Gustafsson, l. c.*—Gallia.
Wedgwoodiae *W. Barton & Riddelsdell in Proc. Cottesw. Field Cl.* 1931–2, xxiv. Pts. 2–3, 212 (1933).—Anglia.
Wheeleri (*L. H. Bailey*) *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, ii. 457 (1932): R. semisetosus var. Wheeleri.
×winterifrons *Toussaint & Gustafsson in Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen*, Sér. VII. 1930–1, lxvi–lxvii. 177 (1932).—Gallia.
wisconsinensis *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, ii. 414 (1932).—U.S.A. (Wisconsin).
yakumontanus *Masamune in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* xi., Bot. No. 4, 233 (1934).—Ins. Liukiu (Yakushima).
yakusimensis *Masamune, l. c.* 234.—Ins. Liukiu (Yakushima).
Yushuni (*Suzuki & Yamamoto*) *Suzuki & Yamamoto in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 130: R. fraxinifolius var. Yushuni.

RUDGEA Salisb. (Rubiac.).
acuminata (*Ruiz & Pav.*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 327 (1931): Coffea acuminata.
Buchtienii *Standley, l. c.* 328.—Boliv.
cornifolia (*Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.*) *Standley, l. c.* 432: Psychotria cornifolia.
cornigera *Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 304.—Guiana Bat.
guyanensis (*A. Rich.*) *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 475: Strempelia guyanensis.
Karstenii *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 433 (1931).—Venez.
microcarpa (*Ruiz & Pav.*) *Standley, l. c.* viii. 382 (1931): Coffea microcarpa.
obscura *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 474.—Guiana Brit.
tanaosepala *Sandwith, l. c.* 1933, 334.—Guiana Brit.
villiflora *Schum. ex Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 383 (1931).—Bras. (Paraná; S. Catharina).

RUELLIA L. (Acanthac.).
ardeicollis *Benoist in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 278 (1917).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
barbillana *Cufod. in Archiv. Bot., Forlì*, 1934, x. 47.—Costa Rica.
Gooddingiana *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1931, xviii. 437.—Mexico.
malabarica *Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl.* iii. 925 (1834), in obs.—Ind. or.
megacantha *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 66 (1933–5).—Mexico.
pereducta *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 89 (1935).—Mexico.

RUELLIA :—
villanovensis *Colla, Herb. Pedem.* iv. 507 (1835).—Bras.

RUFACER Small, Man. Southeast. Fl. 825 (1933). *ACERACEAE.*
carolinianum (*Walt.*) *Small, l. c.* 826: Acer carolinianum.
Drummondii (*Hook. & Arn.*) *Small, l. c.*: Acer Drummondii.
rubrum (*L.*) *Small, l. c.*: Acer rubrum.

RULINGIA R. Br. (Sterculiac.).
cygnorum (*Steud.*) *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 80 (1931): Commersonia cygnorum.

RUMEX L. (Polygonac.).
×advenigena *Danser & Kloos in Ned. Kruidk. Arch., Versl.* 1934, xliv. 115.—Hollandia.
aeginensis *Heldr. ex K. H. Rechinger in Beih. Bot. Centralbl.* xlix. II. 35 (1932), in syn.: R. pulcher subsp. divaricatus *Murb.*
aeroplaniformis *Eig in Fedde, Repert. Beih.* lxiii. 1. 111 (1931), nomen.—Palaest.
andinus *K. H. Rechinger in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 3, 29 (1934).—Ecuador.
aquaticiformis *K. H. Rechinger, l. c.* 10.—Patag.
argentinus *K. H. Rechinger, l. c.* 24.—Argent.
atlanticus *Coss. ex Battand. Contrib. Fl. Atlant.* 79 (1919), nomen subnudum; *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1935, xxvi. 227, descr.—Marocc.
balcanicus *K. H. Rechinger in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 5; *et in Fedde, Repert.* xxxviii. 371 (1935), descr. ampl.—Albania.
callosus (*F. Schmidt*) *K. H. Rechinger in Fedde, Repert.* xxxi. 257 (1933): R. Patientia var. callosus.
camptodon *K. H. Rechinger in Beih. Bot. Centralbl.* xlix. II. 76 (1932).—Afr. trop.
caucasicus *K. H. Rechinger in Fedde, Repert.* xxxi. 258 (1933).—Caucas.
×De-Vriesii *Bihari ex K. H. Rechinger in Beih. Bot. Centralbl.* xlix. II. 90 (1932), in syn.: R. confertoides × R. obtusifolius.
Drobovii *Korovin in Vved. & al., Key Fl. Tashkent*, 84 (1924).—Turkestan.
dumosiformis *K. H. Rechinger in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1935, lxxxiv. 43.—Austral.; Tasman.
ecuadoriensis *H. Gross ex K. H. Rechinger in Beih. Bot. Centralbl.* xlix. II. 46 (1932), in syn.: R. obtusifolius subsp. agrestis *Danser*.
ecuadoriensis *K. H. Rechinger in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 3, 41 (1934), hybr.?—Ecuador.
Fauriei *K. H. Rechinger in Fedde, Repert.* xxxiii. 358 (1934).—Sakhalin.
flexuosiformis *K. H. Rechinger in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1935, lxxxiv. 46.—W. Austral.
foliosus *K. H. Rechinger in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 3, 42 (1934).—Argent.
Gayeri *K. H. Rechinger in Fedde, Repert.* xxxi. 268 (1933), in syn.: R. crispus × R. Kerneri.
hastatus *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. Anhang, 18 (1932).—Tanganyika Terr.
interruptus *K. H. Rechinger in Fedde, Repert.* xxxiii. 359 (1934).—China (Kansu; Shansi; Hupeh).
×Kerneri *Borb. Temes. Megye Veget.* 34 (1884); *K. H. Rechinger in Fedde, Repert.* xxxi. 240 (1933), descr. emend.—Eur. austr.-or.
Komarovii *Schischk. & Sergievsk. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1929, No. 3, p. 3.—Ross. asiat. (Semipalatinsk).
×Lycheanus *Blom in K. Norske Vid. Selsk. Forh.* 1931, iv. No. 4, 13 (1932).—Norveg.
×mirabilis *K. H. Rechinger in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 3, 49 (1934).—Boliv.; Argent.
nevadensis *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 41 (1932).—Hispan.
occultans *G. Samuelsson in Ber. Schweiz. Bot. Ges.* xlii. 776 (1933).—Palaest.; Syria.
pamiricus *K. H. Rechinger in Fedde, Repert.* xxxi. 259 (1933).—As. centr. et or.
patagonicus *K. H. Rechinger in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 3, 27 (1934).—Patag.
Paulsenianus *K. H. Rechinger in Fedde, Repert.* xxix. 246 (1931).—Turkestan.; Pamir.

RUMEX:—
peruanus *K. H. Rechinger in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 3, p. 6 (1934).—Peruv.
ponticus *E. H. L. Krause in Beih. Bot. Centralbl.* xxiv. II. 15 (1908); *K. H. Rechinger in Fedde, Repert.* xxxi. 235 (1933), descr. emend.—Kurdistan.; Armen.
protractus *K. H. Rechinger in Fedde, Repert.* xxxiii. 356 (1934).—Sibir. austr.; Mongol. bor.
pycnanthus *K. H. Rechinger, l. c.* xxxviii. 372 (1935), in obs.: R. subalpinus *M. E. Jones.*
rectinervius *K. H. Rechinger, l. c.* xxxiii. 355 (1934).—Turkestan.
Salomonis *Ehrenb. ex K. H. Rechinger in Beih. Bot. Centralbl.* xlix. II. 70 (1932), in syn.: R. nepalensis.
Schlagintweitii *K. H. Rechinger in Fedde, Repert.* xxxi. 277 (1933), in syn.: R. nepalensis × R. tibeticus.
Senneni *K. H. Rechinger in Beih. Bot. Centralbl.* xlix. II. 102 (1932), in syn.: R. domesticus × R. obtusifolius subsp. agrestis *Danser.*
subalpinus (*Schur*) *Simonk. Enum. Fl. Transsilv.* 472 (1886): R. obtusifolius var. subalpinus.
tenax *K. H. Rechinger in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1935, lxxxiv. 40.—Austral. (N. S. Wales; Victoria).
tianschanicus *Losina-Losinsk. ex Pavlov in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 19, 11 (1935).—Turkestan. (Thian Shan).
tibeticus *K. H. Rechinger in Fedde, Repert.* xxxi. 262 (1933).—Himal. occ.; Tibet.
trisetifer *Stokes, Bot. Mat. Med.* ii. 305 (1812): R. crispus *Lour.*
usambarensis *Dammer ex Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. 199 (1932), in syn.: R. nervosus var. usambarensis *Engl.*
×Wildtianus *Domin in Preslia,* xiii–xv. 61 (1935).—Czechoslovak.
yezoënsis *Hara in Bot. Mag., Tokyo,* 1934, xlviii. 896.—Japon. (Yezo).

RUMICASTRUM Ulbr. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, xvi c. 519 (1934). *CHENOPODIACEAE.*
chamaecladum (*Diels*) *Ulbr. l. c.*: Atriplex chamaecladum.

RUNGIA Nees (Acanthac.).
Evrardi *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine,* iv. 759 (1935).—Indo-China (Anam).
Pobeguinii *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 266, in clavi, 267 (1931).—Guinea Gall.
Schliebenii *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 1087 (1934).—Tanganyika Terr.
silvatica *Hochr. in Candollea,* v. 236 (1934).—Java.
tonkinensis *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine,* iv. 759 (1935).—Indo-China (Tonkin; Anam).

RUPICAPNOS Pomel (Papaverac.).
argentea *Pugsley in Journ. Linn. Soc., Bot.* xlix. 526 (1934).—Marocc.
elegans *Pugsley, l. c.* 527.—Marocc.
Faurei *Pugsley, l. c.* xlix. 109 (1932).—Marocc.
rifana *Pugsley, l. c.* 110.—Marocc.

RUPPIA L. (Potamogetonac.; Naiadac., Gen. Pl.).
truncatifolia *Miki in Bot. Mag., Tokyo,* 1935, xlix. 687.—Corea; Japon.

RUPRECHTIA C. A. Mey. (Polygonac.).
marowynensis *Eyma in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1935, xxxii. 224.—Guiana Bat.

RUSCHIA Schwantes (Ficoidac.).
abbreviata *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 493 (1935).—Namaqualand.
addita *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 284 (1931).—Little Namaq.
alata *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 350 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
alborubra *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 494 (1935).—Namaqualand.
arenosa *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 411 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
aristata *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 369 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
beaufortensis *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 430 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
bina *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 282 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).

RUSCHIA:—
bipapillata *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 412 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
breekpoortensis *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 284 (1931).—Little Namaq.
brevicyma *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 370 (1932).—Hab.?
Burtoniae *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 279 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
calcarea *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 495 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
callifera *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 335 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
cedarbergensis *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 496 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
complanata *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 376 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
conjuncta *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 239 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
constricta *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 496 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
crassisepala *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 334 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
cyathiformis *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 240 (1931).—Little Namaq.
depressa *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 336 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
dichotoma *L. Bolus, l. c.* 350.—Namaqualand.
dilatata *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 240 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
disarticulata *L. Bolus, l. c.* 286.—Afr. austr. (Cape Prov.).
diutina *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 356 (1932).—Namaqualand.
Duplessiae *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 431 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
elevata *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 305 (1931).—Little Namaq.
exsurgens *L. Bolus, l. c.* 280.—Afr. austr. (Cape Prov.).
fenestrata *L. Bolus, l. c.* 281.—Afr. austr. (Cape Prov.).
ferox *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 371 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
floribunda *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 497 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
gibbosa *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 285 (1931).—Little Namaq.
globularis *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 413 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
karrachabensis *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 287 (1931).—Little Namaq.
karroidea *L. Bolus, l. c.* 306.—Afr. austr. (Cape Prov.).
kenhardtensis *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 498 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
langebaanensis *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 372 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
laxiflora *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 237 (1931).—Little Namaq.
Leightoniae *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 499 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
leptocalyx *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 306 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
leptophylla *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 333 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
longifolia *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 500 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Luckhoffii *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 283 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
macrophylla *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 351 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
marginata *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 500 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
mesklipensis *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 281 (1931).—Little Namaq.
montaguensis *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 432 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Neilii *L. Bolus, l. c.* 433.—Afr. austr. (Cape Prov.).
nonimpressa *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 373 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Orsmondiae *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 433 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
oviformis *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 261 (1931).—Little Namaq.
parkhuisensis *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 414 (1933).—Afr. austr (Cape Prov.).

RUSCHIA:—
pauciflora *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 352 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
persistens *L. Bolus, l. c.* 334.—Afr. austr. (Cape Prov.).
polita *L. Bolus, l. c.* 332.—Afr. austr. (Cape Prov.).
pulvinaris *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 241 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
puniens *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 502 (1935).—Afr. austr. (Griqualand West).
rariflora *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 414 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
rigens *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 259 (1931).—Orange Free State.
rupicola *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 415 (1933), non olim.—Afr. austr. (Cape Prov.).
sabulicola *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 190 (1932).—Great Namaq.
Salteri *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 371 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
simulans *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 260 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
suaveolens *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 352 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
subpaniculata *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 503 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
subteres *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 434 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
tardissima *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 353 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
tecta *L. Bolus, l. c.* 332.—Afr. austr. (Cape Prov.).
testacea *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 435 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
tetrasepala *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 373 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
tribracteata *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 238 (1931).—Little Namaq.
Vanderbergii *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 503 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Vanniekerkiae *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 335 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Villetii *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 501 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
vulnerans *L. Bolus, l. c.* 504.—Afr. austr. (Cape Prov.).

RUSTIA Klotzsch (Rubiac.).
haitiensis *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 36 (1932).—Haiti.
pauciflora *Solereder in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 1890, viii, Generalversamml.-Heft, p. (99), in obs., nomen.—Ind. occ. (Tobago).

RUTA L. (Rutac.).
Broussonetiana (*Coss.*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 244 (1931): Aplophyllum Broussonetianum.

RUTIDEA DC. (Rubiac.).
atrata *Mildbr. ex Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 87 (1931), in syn.: Ixora atrata.
breviflora *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 430 (1932).—Congo Belg.
syringoides (*Webb*) *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 206 (1934): Pavetta syringoides.
zombana (*K. Schum.*) *Bremek. l. c.* 208: Pavetta zombana.

RUYSCHIA Jacq. (Marcgraviac.; Ternstroemiac., Gen. Pl.).
phylladenia *Sandwith*; *Sandwith in Kew Bull.* 1932, 299, descr. ampl.—Costa Rica.

RYANIA Vahl (Flacourtiac.; Bixac., Gen. Pl.).
pyrifera (*L. C. Rich.*) *Uitt. & Sleum. in Pulle, Fl. Surinam,* iii. (*Meded. K. Ver. Kol. Inst. Amst.* xxx.) 286 (1935): Patrisia pyrifera.
sauricida *Gleason in Phytologia,* i. 106 (1934).—Bras. (Amaz.).
stipularis *Linden & Planch.*; *Sprague in Kew Bull.* 1926, 38.—Venez.

RYNCHOSPORA Vahl (Cyperac.).
[Vide RHYNCHOSPORA.]

RYSSOPTERYS Blume (Malpighiac.).
gymnopoda *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France,* 1932, lxxix. 516.—N. Caled.

RYTIGYNIA Blume (Rubiac.).
amaniensis (*K. Krause*) *Bullock in Kew Bull.* 1932, 389: Plectronia amaniensis.

RYTIGYNIA:—
Eickii (*K. Schum. & K. Krause*) *Bullock in Kew Bull.* 1932, 389: Plectronia Eickii.
Gossweileri *Robyns in Journ. Bot.* 1931, lxix. 188. —Congo Lusit.
Kidaria (*K. Schum. & K. Krause*) *Bullock in Kew Bull.* 1932, 389: Plectronia Kidaria.
mayumbensis *Robyns in Journ. Bot.* 1931, lxix. 187. —Congo Lusit.
phyllanthoidea (*Baill.*) *Bullock in Kew Bull.* 1932, 389: Canthium phyllanthoideum.

S

SABAL Adans. (Palmae).
acaulis *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1146 (1895), in syn.: S. Adansonii.
bermudana *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, iii. 326 (1934): S. Blackburniana *Hemsl. in Rep. Sc. Results Voy. H.M.S. Challenger*, Bot., i. Pt. 1, *Rep. Bot. Bermud.*, 70 (1885), non *Glazebr.*
Dugesii *S. Wats. ex L. H. Bailey, l. c.* 335.—Mexico.
floribunda *Katzenstein Cat.* 1934; cf. *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, iii. 336 (1934).—U.S.A. (Texas).
Japa *C. Wright ex H. H. Bartlett in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 36 (1935).—Cuba.
louisiana (*Darby*) *Bomhard in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 44, in obs.: Chamaerops louisiana.
maritima (*H. B. & K.*) *Burret in Fedde, Repert.* xxxii. 101 (1933): Corypha maritima.
Mayarum *H. H. Bartlett in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 35 (1935).—Mexico; Brit. Honduras.
Mocinii *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1146 (1895), in syn.: S. Palmetto.
Morrisiana *H. H. Bartlett in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 17, tt. 3, 6 (1935).—Am. centr.
Pumos (*H. B. & K.*) *Burret in Fedde, Repert.* xxxii. 101 (1933): Corypha Pumos.

SABIA Colebr. (Sabiac.).
campanulata *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 311 (1824).—Nepal.
parviflora *Wall. l. c.* 310.—Nepal.
polyantha *Hand.-Mazz. in Sinensia*, iii. 190 (1933). —China (Kwangsi).

SABICEA Aubl. (Rubiac.).
arachnoidea *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 106, in clavi, 107 (1931).—Sierra Leone.
calophylla *Asplund in Svensk Bot. Tidskr.* 1932, xxvi. 195.—Bras. (Amaz.).
cordata *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 105, in clavi, 106 (1931).—Gold Coast.
domingensis *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 45 (1932).—Santo Domingo.
globifera *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 105, in clavi, 106 (1931).—Sierra Leone.
rosea *Hoyle in Kew Bull.* 1935, 264.—Gold Coast.

SABINA Mill. (Pinac.; Conif., Gen. Pl.).
multiova *Goodwin in Am. Botanist*, 1931, xxxvii. 151.—U.S.A. (Montana; Wyoming).

SABULARIA Small, Man. Southeast. Fl. 1504 (1933), sphalm.: **Sabulina** Reichb. (Caryophyllac.).
brevifolia *Small, l. c.*, sphalm.: Sabulina brevifolia.
caroliniana *Small, l. c.*, sphalm.: Sabulina caroliniana.
glabra *Small, l. c.*, sphalm.: Sabulina glabra.
groenlandica *Small, l. c.*, sphalm.: Sabulina groenlandica.
uniflora *Small, l. c.*, sphalm.: Sabulina uniflora.

SABULINA Reichb. (Caryophyllac.).
brevifolia (*Nutt.*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 499 (1933): Arenaria brevifolia.
caroliniana (*Walt.*) *Small, l. c.*: Arenaria caroliniana.
dawsonensis (*Britton*) *Rydb. in Brittonia*, i. 88 (1931): Arenaria dawsonensis.
glabra (*Michx.*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 499 (1933): Arenaria glabra.
groenlandica (*Retz.*) *Small, l. c.*: Stellaria groenlandica.
litorea (*Fernald*) *Rydb. in Brittonia*, i. 88 (1931): Arenaria litorea.

SABULINA:—
patula (*Michx.*) *Small ex Rydb. Fl. Prairies & Plains Centr. N. Amer.* 321 (1932): Arenaria patula.
propinqua (*Richardson*) *Rydb. in Brittonia*, i. 88 (1931): Arenaria propinqua.
stricta (*Michx.*) *Small ex Rydb. Fl. Prairies & Plains Centr. N. Amer.* 320 (1932): Arenaria stricta.
texana (*B. L. Robinson*) *Rydb. in Brittonia*, i. 88 (1931): Arenaria stricta var. texana.
uniflora (*Walt.*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 498 (1933): Stellaria uniflora.

SACCELLIUM Humb. & Bonpl. (Boraginac.).
brasiliense *I. M. Johnston in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 181.—Bras. (Matto Grosso).

SACCHARODENDRON Nieuwl. (Acerac.).
nigrum (*Michx. f.*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 824 (1933): Acer nigrum.

SACCHARUM L. (Gramin.).
canaliculatum *Roxb. Hort. Beng.* 6 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 251 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 246 (1832).—Ind. or. (Bengal).
exaltatum *Roxb. l. c.* 81, nomen; *et l. c.* 249; *et l. c.* 245.—Ind. or.
fuscum *Roxb. l. c.* 6, nomen; *et l. c.* 241; *et l. c.* 236. —Ind. or. (Bengal).
Munja *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 250; *et l. c.* 246. —Ind. or.
procerum *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 248; *et l. c.* 243.—Ind. or. (Bengal).
Sara *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 249; *et l. c.* 244.— Ind. or. (Bengal).
semidecumbens *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 241; *et l. c.* 236.—Ind. or. (Bengal).
sinense *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 244 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 239 (1832).—China.

SACCIOLEPIS Nash (Gramin.).
cinereo-vestita (*Pilger*) *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 110: Panicum cinereo-vestitum.
gracilis *Stent & Rattray in Proc. Rhodes. Scientif. Assoc.* xxxii. (*Stent & Rattray, Grasses S. Rhodes.*) 31 (1933).—S. Rhodesia.
kimpasaënsis *Vanderyst*; *Robyns in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 186 (1932), descr. ampl.—Congo Belg. et Congo Lusit.
Lebrunii *Robyns, l. c.* 185.—Congo Belg.
polystachys *Mez ex Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste Braz.* iii. 161 (1923) [*Insp. Fed. Obras Secc.* Publ. 57], nomen; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 151. —Bras.
rigens (*Mez*) *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1934, xiv. 29: Panicum rigens.
spicata (*L.*) *Honda ex Masamune, Prelim. Rep. Veg. Yakus.* 46 (1929); *Honda in Journ. Fac. Sc. Tokyo*, Sect. III. Bot., iii. 261 (1930); *Masamune in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* xi., Bot. No. 4, 488 (1934): Aira spicata.
squamigera (*Pilger*) *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 110: Panicum squamigerum.
strictula *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 651 (1932).—Angola.
Trollii *Pilger, l. c.* xii. 381 (1935).—Tanganyika Terr.
Wittei *Robyns in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 188 (1932).—Congo Belg.

SACCOLABIOPSIS J. J. Smith (Orchidac.).
alata *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 75 (1935). —N. Guin.
microphyton (*Schlechter*) *J. J. Smith, l. c.*: Malleola microphyton.
pallida (*Schlechter*) *J. J. Smith, l. c.*: Malleola pallida.
papuana *J. J. Smith, l. c.* 74.—N. Guin.
rara (*Schlechter*) *J. J. Smith, l. c.* 75: Malleola rara.

SACCOLABIUM Blume (Orchidac.).
acutilabrum *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 36.—Indo-China (Anam).
chrysanthum *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 277 (1931): S. filiforme *Trimen, l. c.* iv. 196 (1898), non *Lindl.*
decipiens (*Lindl.*) *Alston, l. c.* 278: Cleisostoma decipiens.
flabelliforme *Blatter & McCann in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxv. 722 (1932).—Ind. or. (Bombay).

SACCOLABIUM:—
Kajewskii *Ames in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 110, 141.—N. Hebrides.
maculosum (*Lindl.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 278 (1931): Cleisostoma maculosum.
Matsudai (*Hayata*) *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1674 (1931): Gastrochilus Matsudai.
odoratum (*Kudo*) *Makino & Nemoto, l. c.* 1675: Haraëlla odorata.
peninsulare (*Dalz.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 278 (1931): Sarcanthus peninsularis.

SACCOLENA Gleason (Melastomatac.).
dimorpha *Gleason*; *Gleason in Phytologia*, i. 37 (1933), descr. emend.—Colomb.

SACOGLOTTIS Mart. (Humiriac.).
reticulata *Ducke in Arquiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, i. 206 (1935).—Bras. (Amaz.).

SAGERAEA Dalz. (Annonac.).
laurifolia (*Graham*) *Blatter in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxiv. 294 (1930): Guatteria laurifolia.

SAGERETIA Brongn. (Rhamnac.).
latifolia *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 673 (1933).—China (Yunnan).
laxiflora *Hand.-Mazz. in Sinensia*, iii. 191 (1933). —China (Kwangsi).
lucida *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* vii. 314 (1931). —China (Kwangtung).
Melliana *Hand.-Mazz. in Beih. Bot. Centralbl.* Iii. Abt. B. 168 (1934).—China (Kwangtung).

SAGINA L. (Caryophyllac.).
laxa *Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* ii. 49 [1913].—Eur.

SAGITTARIA L. (Alismatac.).
cordifolia *Suesseng. & Beyerle in Fedde, Repert.* xxxix. 17 (1935).—Bras. (Bahia).
leucopetala (*Miq.*) *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 479 (1924): S. sagittifolia var. leucopetala.
ornithorhyncha *Small, Man. Southeast. Fl.* 25 (1933).—U.S.A. (N. Carolina).
potamogetifolia *Merrill in Sunyatsenia*, i. 189 (1934).—China (Kwangtung).
Weatherbiana *Fernald in Rhodora*, 1935, xxxvii. 387.—U.S.A. (Virginia; N. & S. Carolina).

SAINTPAULIA Wendl. (Gesneriac.).
alba *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1933, 475.—Tanganyika Terr.

SAINTPAULIOPSIS Staner in Bull. Jard. Bot. Brux. xiii. 8 (1934). *GESNERIACEAE.*
Lebruni *Staner, l. c.*—Congo Belg.

SAINTPIERREA Germain de Saint Pierre in Journ. des Roses, 1878, 39, in obs. *ROSACEAE.*
microphylla (*Roxb.*) *Germain de Saint Pierre, l. c.*, in obs.: Rosa microphylla.

SAIPANIA Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 1935, xxv. 28. *EUPHORBIACEAE.*
glandulosa *Hosokawa, l. c.*—Ins. Marian. (Saipan).

SAKAKIA Nakai (Theac.).
Hayatai *Masamune & Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1933, v. 350.—Formosa.
longicarpa *Yamamoto, l. c.*—Formosa.
Matsudai (*Hayata*) *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 192: Eurya Matsudai.

SAKERSIA Hook. f. (Melastomatac.).
calodendron *Gilg & Lederm. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 759 (1921), in obs.—Cameroons.

SALACIA L. (Hippocratiac.; Celastrac., Gen. Pl.).
aneityensis *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 55.—N. Hebrides.
Colasi *Benoist in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 335.—Peruv.
confertiflora *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 27 (1935).—China (Hainan).
mauritioides *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 364.—Bras. (Matto Grosso).
owabiensis *Hoyle in Kew Bull.* 1934, 186.—Gold Coast.
podostemma *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 187.— Guiana Brit.

SALACIA:—
somalensis *Chiov. Fl. Somala,* II. 137 (1932).—Somal. Ital.

SALAXIS Salisb. (Ericac.).
triflora *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 303 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).

SALICORNIA L. (Chenopodiac.).
Blackeana *Ulbr. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 552 (1934): S. pachystachya *J. M. Black.*
brachiata *Roxb. Hort. Beng.* 79 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 82 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 84 (1832).—Reg. Himal.
deserticola *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1934, xiv. 804.—Alger.
longispicata *A. Cheval. l. c.* 805.—Alger.

SALIX L. (Salicac.).
adenophylloides *Floderus in Geogr. Ann., Stockh.* 1935, 310.—Ind. or. (Punjab).
Alfredi *Görz in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 403.—China (Kansu).
aliena *Floderus in Arkiv Bot., Stockh.* xxvii. A. No. 2, p. 1 (1935): S. Setchelliana.
alifera *Görz in Grossheim, Fl. Kavkaza,* ii. 8 (1930).—Caucas.
anadyrensis *Floderus in Arkiv Bot., Stockh.* xxv. A. No. 10, p. 9 (1933).—Sibir. (Anadyr).
ancorifera *Fernald in Rhodora,* 1933, xxxv. 245.—Newfoundland.
aquilonia *Kimura in Journ. Fac. Agric., Sapporo,* xxvi. 405 (1934).—Ins. Kuril.; Kamchatka?
Arakiana *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 176.—Japon. (Hondo).
argyrophylla *Lacksch. ex Görz in Grossheim, Fl. Kavkaza,* ii. 8 (1930).—Caucas.
Baileyi *C. K. Schneider in L. H. Bailey, Gentes Herbarum,* i. 16 (1920).—China (Hupeh; Honan).
Blakii *Görz in Fedde, Repert.* xxxvi. 31 (1934).—Turkestan.
×Bouchardi *Chassagne & Görz in Bull. Soc. Dendr. France,* 1931, 78.—Gallia.
capreastrum *Koidz. in Y. Doi, Fl. Satsum.* ii. 103 (1931).—Japon.
cereifolia *Görz in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 393.—China (Kansu).
Chapmanii *Small, Man. Southeast. Fl.* 414 (1933).—U.S.A. (Georgia; Florida).
×Charrieri *Chassagne, Pl. Hybr. France,* 1927–8, 113; *Chassagne & Görz in Bull. Soc. Dendr. France,* 1931, 71.—Gallia.
chekiangensis *Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China,* Bot. Ser., ix. 62 (1933).—China (Chekiang).
Chienii *Cheng, l. c.* 59.—China (Chekiang).
cistoides *Pourr. ex Guétrot in Bull. Soc. Bot. France,* 1931, lxxviii. 437, in obs.—Hab.?
daghestanica *Görz in Grossheim, Fl. Kavkaza,* ii. 6 (1930); *et in Fedde, Repert.* xxxvi. 236 (1934), latine.—Caucas.
Dinsmorei *Enander ex Dinsm. in Post, Fl. Syria, Palest. & Sinai,* ed. 2, ii. (*Publ. Am. Univ. Beirut,* Nat. Sc. Ser. No. 1) 529 (1933), hybr.?—Palaest.
dischgensis *Görz in Fedde, Repert.* xxxv. 284 (1934), hybr.?—Persia.
Doiana *Koidz. in Y. Doi, Fl. Satsum.* ii. 103 (1931).—Japon.
dolichostachya *Floderus in Geogr. Ann., Stockh.* 1935, 311.—Reg. Himal.
fallax *Raup in Contrib. Arn. Arb.* No. VI. 149 (1934).—Canada bor.-occ.
Fedtschenkoi *Görz, Salicac. Asiat.* Fasc. I. 21 (1931); *Görz in Fedde, Repert.* xxxii. 121 (1933).—Ross. asiat. centr.
finalis *Kimura in Journ. Fac. Agric., Sapporo,* xxvi. 451 (1934).—Sakhalin.
×Fraserii *Druce in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles,* 1930, ix. 369 (1931).—Scotia.
fuscata *Görz in Grossheim, Fl. Kavkaza,* ii. 7 (1930).—Caucas.
×Goerziana *Font Quer ex Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 109 [1933], non seq.—Marocc.
×Goerziana *Soó in Veröff. Geobot. Inst. Rübel,* vi. 253 (1930).—Carpath.
×Guinieri *Chassagne & Görz in Bull. Soc. Dendr. France,* 1931, 70.—Gallia.

SALIX:—
hidaka-montana *Hara in Journ. Jap. Bot.* ix. 512 (1933).—Japon. (Yezo).
himalayensis *Floderus in Geogr. Ann., Stockh.* 1935, 306.—Afghan.; Reg. Himal.
Huiana *Görz in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 13 (1935).—China (Szechuan).
iranica *Bornm. ex Görz in Fedde, Repert.* xxxv. 286 (1934), in obs., pro syn.: S. oxycarpa.
juparica *Görz in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 391.—Tibet.
×ketoiensis *Kimura in Journ. Fac. Agric., Sapporo,* xxvi. 410 (1934).—Ins. Kuril.
Kobayashii *Kimura, l. c.* xxxvi. 28 (1934).—Ins. Aleut.
×Koidzumii *Kimura, l. c.* xxvi. 440 (1934).—Sakhalin.
Koriyanagi *Kimura ex Görz, Salicac. Asiat.* Fasc. I. 17 (1931); *Görz in Fedde, Repert.* xxxii. 119 (1933): S. purpurea var. japonica *Nakai.*
×Kudoi *Kimura in Journ. Fac. Agric., Sapporo,* xxvi. 441 (1934).—Sakhalin; Kamchatka?
Kusnetzowii *Lacksch. ex Görz in Grossheim, Fl. Kavkaza,* ii. 9 (1930); *et in Fedde, Repert.* xxxvi. 231 (1934), latine.—Caucas.
laurentina *Pourr. ex Guétrot in Bull. Soc. Bot. France,* 1931, lxxviii. 437, in obs.—Hab.?
×Mairei *Görz & Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 109 [1933].—Marocc.
melanostachys (*Makino*) *Makino in Bot. Mag., Tokyo,* 1904, xviii. 141, in syn.; *Görz, Salicac. Asiat.* Fasc. I. 21 (1931); *Görz in Fedde, Repert.* xxxii. 121, 388 (1933): S. Thunbergiana subsp. melanostachys.
×moschata *Hort. ex Linton in Journ. Bot.* 1896, xxxiv. 466, in obs.—Cult.
muliensis *Görz in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 389.—China (Szechuan).
muscina *Dode ex Floderus in Arkiv Bot., Stockh.* xxv. A. No. 11, 26 (1933).—Hort.
neodaviesii *Bornm. & Görz in Fedde, Repert.* xxxv. 283 (1934), hybr.?—Persia.
neo-reticulata *Nakai, Rep. Veg. Daisetsusan Mts.* 45, 62 (1930), japonice; *Kimura in Journ. Fac. Agric., Sapporo,* xxvi. 408 (1934), latine.—Japon. (Yezo).
Niedzwieckii *Görz, Salicac. Asiat.* Fasc. I. 18, 19 (1931); *Görz in Fedde, Repert.* xxxii. 120 (1933).—Turkestan. (Thian Shan).
nudescens *Rydb. in Brittonia,* i. 86 (1931): S. glaucops var. glabrescens *Anderss.*
nyiwensis *Kimura in Journ. Fac. Agric., Sapporo,* xxvi. 442 (1934).—Sakhalin.
×ochetophylla *Görz in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 7 (1935).—China (Szechuan).
orotchonorum *Kimura in Journ. Fac. Agric., Sapporo,* xxvi. 444 (1934).—Sakhalin.
pantosericea *Görz in Fedde, Repert.* xxxvi. 229 (1934): S. argyrophylla *Lacksch. ex Görz.*
paramushirensis *Kudo; Kimura in Journ. Fac. Agric., Sapporo,* xxvi. 433 (1934), descr. emend.—Ins. Kuril.; Kamchatka?
Parksiana *Ball in Univ. Calif. Publ. Bot.* xvii. 400 (1934).—U.S.A. (Calif.).
pauciflora *Koidz.; Kimura in Journ. Fac. Agric., Sapporo,* xxvi. 411 (1934), descr. ampl.—Japon. (Yezo).
Paulinae *ex Journ. Roy. Hort. Soc.* 1935, lx. Proc. p. xxi.—Suecia; Helvet.; Tirol.
phanerodictya *Kimura in Journ. Fac. Agric., Sapporo,* xxvi. 449 (1934).—Ins. Kuril.
phaneroides *Görz in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 9 (1935).—China (Szechuan).
polyadenia *Hand.-Mazz. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1932, lxxxi. 306.—Manchur.
poronaica *Kimura in Journ. Fac. Agric., Sapporo,* xxvi. 426 (1934).—Sakhalin.
pseudo-Ernesti *Görz in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 5 (1935).—China (Szechuan).
×pseudo-paludicola *Kimura in Journ. Fac. Agric., Sapporo,* xxvi. 445 (1934).—Japon. (Yezo).
pseudospissa *Görz in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 395.—China (Kansu).
pseudo-Wallichiana *Görz, l. c.* 397.—Tibet.
pseudoyoshinoi *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 40.—Japon.

SALIX:—
pulchroides *Kimura in Journ. Fac. Agric., Sapporo,* xxvi. 446 (1934).—Ins. Kuril.
rashuwensis *Kimura, l. c.* 450.—Ins. Kuril.
Rockii *Görz in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 393.—Tibet.
russica *Nasarov in Sovietsk. Bot.* 1934, No. 4, 127, in obs., nomen.—Caucas.
Safsaf *Forsk.*; *Forsk. ex Trautv. Salicetum,* 6 (1836), descr.—Aegypt.
×septemgena *Nilsson in Lunds Univ. Årsskrift,* n. f. xxvii. No. 4, 27 (1930).—Hab.?
sericophylla *Nasarov in Sovietsk. Bot.* 1934, No. 4, 128, 129, in obs., nomen.—Caucas.
Setchelliana *Ball in Univ. Calif. Publ. Bot.* xvii. 410 (1934).—Alaska; Yukon.
shikotanica *Kimura in Journ. Fac. Agric., Sapporo,* xxvi. 447 (1934).—Ins. Kuril.
×Solheimii *Kelso in Rhodora,* 1934, xxxvi. 196.—U.S.A. (Montana).
sphaeronymphe *Görz in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 4 (1935).—China (Szechuan).
stoloniferoides *Kimura in Journ. Fac. Agric., Sapporo,* xxvi. 448 (1934).—Sakhalin.
stomatophora *Floderus in Geogr. Ann., Stockh.* 1935, 315.—Bhutan.
subreniformis *Kimura in Journ. Fac. Agric., Sapporo,* xxvi. 409 (1934).—Ins. Kuril.
Sugawarana *Koidz. ex Kimura, l. c.* 417.—Sakhalin.
×taoënsis *Görz in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 401.—Tibet; China (Kansu).
taraikensis *Kimura in Journ. Fac. Agric., Sapporo,* xxvi. 419 (1934).—Sakhalin; Japon. (Yezo).
Tatewakii *Kimura, l. c.* 422.—Sakhalin.
tibetica *Görz in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 391.—Tibet.
Tracyi *Ball in Univ. Calif. Publ. Bot.* xvii. 403 (1934).—U.S.A. (Calif.; Oregon).
Tsoongii *Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China,* Bot. Ser., x. 68 (1935).—China (Chekiang).
veroviminalis *Nasarov in Sovietsk. Bot.* 1934, No. 4, 127, in obs., nomen.—Caucas.
Wangii *Görz in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 11 (1935).—China (Szechuan).
wenchuanica *Görz, l. c.* 19, hybr.?—China (Szechuan).
Wheeleri (*Rowlee*) *Rydb. in Britton & Brown, Ill. Fl.* ed. 2, i. 595 (1913): S. interior var. Wheeleri.
Wiegandii *Fernald in Rhodora,* 1933, xxxv. 243.—Newfoundland.
yezoënsis (*C. K. Schneider*) *Kimura in Bot. Mag., Tokyo,* 1931, xlv. 28: S. viminalis var. yezoënsis.

SALOMONIA Heist. ex Fabr. (Liliac.).
cobrensis *Wooton & Standley in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xvi. 113 (1913).—U.S.A. (N. Mexico).

SALOMONIA Lour. (Polygalac.).
aphylla *Griff. in Proc. Linn. Soc.* i. 221 (1844); *et in Trans. Linn. Soc.* xix. 342 (1845), in adnot.—Penins. Mal.

SALPIANTHUS Humb. & Bonpl. (Nyctaginac.).
pyriformis (*H. B. & K.*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., xi. 95 (1931): Cryptocarpus pyriformis.

SALPINCTES R. E. Woodson in Bull. Torr. Bot. Cl. 1931, lviii. 453. *APOCYNACEAE.*
duidae *R. E. Woodson, l. c.* 454.—Venez.
kalmiifolius *R. E. Woodson, l. c.* 453.—Venez.

SALPINGOSTYLIS Small in Journ. N. Y. Bot. Gard. 1931, xxxii. 161, in adnot. *IRIDACEAE.*
coelestina (*Bartram*) *Small, l. c.*, in obs.: Ixia coelestina.

SALSOLA L. (Chenopodiac.).
Abolinii *Korovin in Bull. Univ. As. Centr.* xx. 191 (1935), in obs.—Ross. asiat. (Kasakstan).
aptera *Hand.-Mazz. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1931, lxxx. 339.—Mongol.
arborea *C. A. Smith ex Ulbr. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 566 (1934), nomen.—Afr. austr.-occ.
armata *C. A. Smith ex Ulbr. l. c.*, nomen.—Afr. austr.-occ.
auriculata *C. A. Smith ex Ulbr. l. c.*, nomen.—Afr. austr.-occ.

SALSOLA:—
beticolor *Iljin in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 747 (1932).—Mongol.
daghestanica *Czern. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 77 (1930).—Caucas.
decussata *C. A. Smith ex Ulbr. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 566 (1934), nomen.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Deschaseauxiana *Litard. & Maire*; *Litard. & Maire in Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc*, No. xxvi. 34 (1930).—Marocc.
dichracantha *Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. II. (*Contrib. Cogn. Fl. Mansh.*) 124 (1935).—Manchur.
Drummondii *Ulbr. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 565 (1934).—Ind. or. (Punjab).
Engleri *Ulbr. l. c.* 566, in syn.: S. minutiflora.
eriosepala *C. A. Smith ex Ulbr. l. c.*, nomen.—Afr. austr.-occ.
flexuosa *C. A. Smith ex Ulbr. l. c.*, nomen.—Angola.
fuliginosa *C. A. Smith ex Ulbr. l. c.*, nomen.—Afr. austr.-occ.
gaetula *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1933, xxiv. 227.—Marocc.
Ikonnikovi *Iljin in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 748 (1932).—Mongol.
lanigera *Post ex Dinsm. in Post, Fl. Syria, Palest. & Sinai*, ed. 2, ii. (*Publ. Am. Univ. Beirut*, Nat. Sc. Ser. No. 1) 446 (1933), in syn.: Seidlitzia lanigera.
laricifolia *Litw. ex Drobov in Bull. Univ. As. Centr.* xvi. 210 (1927).—As. centr.
longestylosa *Iljin in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 747 (1932).—Turkestan.
minutiflora *C. A. Smith ex Ulbr. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 566 (1934), nomen.—Namaqualand.
Regelii (*Bunge*) *Litw. ex Popov in Trav. Turkest. State Univ.* No. 4, 25 (1922): Haloxylon Regelii.
subsericea *C. A. Smith ex Ulbr. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 566 (1934), nomen.—Afr. austr.-occ.
vermiformis *C. A. Smith ex Ulbr. l. c.*, nomen.—Afr. austr.-occ.

SALVADORA L. (Salvadorac.).
cyclophylla *Chiov. Fl. Somala*, II. 282 (1932).—Somal. Ital.

SALVIA L. (Labiat.).
ampelophylla *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 76 (1935).—Colomb.
Anselmi *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1932, xxxi. 9.—Hispan.
armenorum *Bornm. in Fedde, Repert.* xxxviii. 158 (1935).—Armen.
articulata *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 49 (1935), in clavi.—Bras. (Minas Geraes; S. Paulo).
atrocalyx *Epling, l. c.* 65.—Peruv.
atrocyanea *Epling, l. c.* 44, in clavi.—Boliv.
axilliflora *Epling, l. c.* 33, in clavi.—Venez.
Basilii *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1932, xxxi. 11.—Hispan.
bengalensis *Koenig ex Roxb. Hort. Beng.* 4 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 146 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 145 (1832).—Ind. or. (Bengal).
brachiata *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.*; *et l. c.*—Ind. or.
brachyloma *Stibal in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 124.—China (Yunnan).
Brandegei *Munz in Bull. S. Calif. Acad. Sc.* 1932, xxxi. 69: Audibertia stachyoides var. revoluta *Brandegee*.
×Brozekii *Hrubý in Stud. Pl. Physiol. Lab. Charles Univ. Prague*, v. 26 (1935).—Cult.
bucharica *Popov in Trans. Sc. Soc. Turk.* i. 40 (1923).—Turkestan.; Bokhara.
calolophos *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 57 (1935).—Argent.
capituliflora *Colla, Herb. Pedem.* iv. 396 (1835).—Hab.?
Chia *Hort. ex Colla, l. c.* 397.—Hab.?
chorianthos *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 57 (1935).—Boliv.
codonantha *Stibal in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 127.—China (Yunnan); Upper Burma.

SALVIA:—
Coeli *Hort. ex Gard. Chron.* 1931, Ser. III. xc. 19; *Airy-Shaw in Bot. Mag.* sub t. 9346 (1934), in syn.: S. ringens var. romanica *Prodan*.
colombiana *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 34 (1935), in clavi.—Colomb.
compar (*Wissj.*) *Trautv. ex Sosn. in Monit. Jard. Bot. Tiflis*, n. s. i. 79 (1923), in syn.; *Trautv. & Sosn. in Trud. Azerb. Otdyel. Zakavk. Fil. Akad. Nauk SSSR*, Sect. Bot., i. 45 (1933): S. sahendica subsp. compar.
congestiflora *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 54 (1935).—Bras. (Santa Catharina).
consimilis *Epling, l. c.* 75.—Bras. (Paraná?).
costata *Epling, l. c.* 35, in clavi.—Colomb.
curta *Epling, l. c.* 53.—Bras. (Paraná).
cyanocephala *Epling, l. c.* 34, in clavi.—Colomb.
cyanotropha *Epling, l. c.* 78.—Colomb.
cyclostegia *Stibal in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 118.—China (Yunnan; Szechuan).
cylindriflora *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 41 (1935), in clavi.—Peruv.
debilis *Epling, l. c.* 89.—Colomb.
decurrens *Epling, l. c.* 96.—Bras. (Minas Geraes).
depressa *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1932, xxxi. 13.—Hispan.
discolor *Sennen, l. c.* 14.—Hispan.
dolichantha *Stibal in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 113.—China (Szechuan).
×Dominiana *Hrubý in Stud. Pl. Physiol. Lab. Charles Univ. Prague*, v. 15 (1935).—Cult.
durifolia *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 85 (1935).—Parag.; Argent.
Eigii *Zohary in Beih. Bot. Centralbl.* xlviii. II. 543 (1931).—Palaest.
electa *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1932, xxxi. 10, descr.—Hispan.
emaciata *Epling in M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 52 (1933–5).—Mexico.
eriocaulis *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1932, xxxi. 6, descr.—Hispan.
erythrostoma *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 35 (1935), in clavi.—Colomb.
Evansiana *Hand.-Mazz.*; *Stibal in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 120, descr. ampl.—China (Yunnan; Szechuan).
filicifolia *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 47 (1934).—China (Kwangtung).
floriana *Howell in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xxi. 332 (1935).—Ins. Galapag.
gracilis *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1932, xxxi. 8.—Hispan.
grandifolia *W. W. Smith*; *Stibal in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 144, descr. ampl.—China (Yunnan).
griseifolia *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 78 (1935).—Peruv.
Grossheimii *Sosn. in Trud. Azerb. Otdyel. Zakavk. Fil. Akad. Nauk SSSR*, Sect. Bot., i. 45 (1933).—Transcaucas.
Handelii *Stibal in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 129.—China (Szechuan).
hapalophylla *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 40 (1935), in clavi.—Peruv.
hastifolia *Epling, l. c.* 63.—Peruv.
Herrerae *Epling, l. c.* 93.—Peruv.
heterochroa *Stibal in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 132.—China (Yunnan).
heterophylla *Hort. ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 398 (1835).—Hab.?
hevanda *Mart. ex Colla, l. c.*—Bras.
himalayaca *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 835 (1895), in syn.: S. hians.
Himmelbaurii *Stibal in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 117.—China (Szechuan).
hupehensis *Stibal, l. c.* 130.—China (Hupeh).
inaequilatera *Cufod. in Archiv. Bot., Forlì*, 1933, ix. 201.—Costa Rica.
insularum *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 66 (1935).—Ins. Galapag.
intonsa *Epling, l. c.* 74.—Colomb.
intricata *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1932, xxxi. 8.—Hispan.
Jurisicii *Košanin ex Jurišić in Spom. Srpsk. Kral. Akad.* lx. x. 34 (1923), nomen; *et in Glas. Srpsk. Kral. Akad.* cxix. liv. 26, t. 4 (1926); cf. *Turrill in Bot. Mag.* t. 9250 (1931).—Penins. Balcan.

SALVIA:—
Killipiana *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 90 (1935).—Venez.; Colomb.
Kuznetzovii *Sosn. in Trud. Azerb. Otdyel. Zakavk. Fil. Akad. Nauk SSSR*, Sect. Bot., i. 45 (1933): S. pratensis var. caucasica *Kuznetzov*.
lachnostoma *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 41 (1935), in clavi.—Peruv.
lanata *Roxb. Hort. Beng.* 80 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 147 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 146 (1832).—Reg. Himal.
latibracteata *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 34 (1931).—Santo Domingo.
laurifolia *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 35 (1935), in clavi.—Colomb.
laxispicata *Epling, l. c.* 69.—Venez.
lepida *Epling, l. c.* 88.—Bras. (S. Paulo).
liguliloba *Sun in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., x. 29 (1935).—China (Chekiang).
Lobbii *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 38 (1935), in clavi.—Ecuador. vel Peruv.
lutescens (*Koidz.*) *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 151: S. japonica var. lutescens.
Mairei *Léveillé* (1913); *Stibal in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 125, descr. ampl.—China (Yunnan).
Marci *Epling in M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 52 (1933–5).—Calif. infer.
Mariae *Maire & Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 90 [1933], nomen.—Marocc.
marocana *Battand. & Pitard in Pitard, Contrib. Étude Fl. Maroc*, 30 (1918).—Marocc.
Matsudae *Kudo in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1931, iii. 226.—Formosa.
Mayebarae *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 138.—Japon.
mediterranea *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1932, xxxi. 14.—Hispan.
mekongensis *Stibal in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 136.—China (Yunnan).
Melaleuca *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 35 (1935), in clavi.—Colomb.
membranicalyx *Epling, l. c.* 71.—Ecuador.
Molineri *Colla, Herb. Pedem.* iv. 396 (1835).—Hab.?
montecristina *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 35 (1931).—Santo Domingo.
Moureti *Battand. & Pitard in Pitard, Contrib. Étude Fl. Maroc*, 29 (1918).—Marocc.
mucidistachys *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 41 (1935), in clavi.—Peruv.
Munzii *Epling in Madroña*, iii. 169 (1935).—Calif. super. et infer.
×Nemecii *Hrubý in Stud. Pl. Physiol. Lab. Charles Univ. Prague*, v. 37 (1935).—Cult.
nemoralis *Dusén ex Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 75 (1935).—Bras. (Rio de Janeiro).
obvallata *Epling, l. c.* 72.—Colomb.
occlusa *Epling, l. c.* 95.—Bras. (Minas Geraes; S. Paulo; Rio de Janeiro).
occultiflora *Epling, l. c.* 61.—Venez.
ocimifolia *Epling, l. c.* 69.—Ecuador.
omeiana *Stibal in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 119.—China (Szechuan).
oroana *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 32 (1931).—Santo Domingo.
orthostachys *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 36 (1935), in clavi.—Colomb.
pachyphylla *Epling in Munz, Man. S. Calif. Bot.* 445, 600 (1935): S. compacta *Munz*.
palmae *Epling in M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 52 (1933–5).—Mexico.
pauciflora *Stibal in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 122.—China (Yunnan).
Paui *Maire*; *Emberger & Maire in Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc*, xi. Nos. 4–6, 106 (1931).—Marocc.
penduliflora *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 70 (1935).—Peruv.
perlucida *Epling, l. c.* 72.—Peruv.
personata *Epling, l. c.* 73.—Boliv.; Argent.
pinetorum *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 33 (1931).—Santo Domingo.
platystoma *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 81 (1935).—Boliv.
praeclara *Epling, l. c.* 41, in clavi.—Boliv.
pseudo-bicolor *Battand. & Pitard in Pitard, Contrib. Étude Fl. Maroc*, 30 (1918).—Marocc.

SALVIA:—
pseudolantana *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 35 (1935), in clavi.—Colomb.
pseudoserotina *Epling, l. c.* 67.—Ins. Galapag.
psilantha *Epling, l. c.* 41, in clavi.—Peruv.
psilostachya *Epling, l. c.* 65.—Peruv.
Radozitskii *Fisch. & Schikhovsky ex Radozhitsky in Zhurn. Sadov.* 1842, No. 5, 24–8, nomen; *et l. c.* 1843, No. 3, 47, nomen subnudum; cf. *Lipsky in Trav. Jard. Bot. Tiflis*, iv. 79, 80, 565 (1899), in syn.: S. ringens.
Radula *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 60 (1935).—Peruv.
rufa *Epling, l. c.* 94.—Bras. (Rio de Janeiro).
sarmentosa *Epling, l. c.* 79.—Peruv.
scandens *Epling, l. c.* 41, in clavi.—Peruv.
schizocalyx *Stibal in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 123.—Upper Burma.
schizochila *Stibal, l. c.* 126.—China (Yunnan).
Senneni *Font Quer ex Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 90 [1933], nomen.—Marocc.
silvarum *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 91 (1935).—Peruv.
Sintenisii *Hausskn. ex Bornm. in Fedde, Repert.* xxxviii. 159 (1935).—Armen. Turc.
Smithii *Stibal in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 131.—China (Szechuan).
stepposa *Desiat.-Shost. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 670 (1932).—Rossia (Ukraine); Sibir. occ.
subalpina *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 32 (1931).—Santo Domingo.
subpalmatinervis *Stibal in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 135.—China (Yunnan).
subscaposa *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1932, xxxi. 11.—Hispan.
substolonifera *Stibal in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 138.—China (Fokien; Hunan).
summa *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1931, xviii. 436.—U.S.A. (N. Mexico).
tenuiflora *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 48 (1935), in clavi.—Bras. (S. Catharina).
tibestiensis *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 322.—Sahara.
trachyphylla *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 38 (1935), in clavi.—Ecuador.
tubulosa *Epling, l. c.* 41, in clavi.—Peruv.
×Uittienii *Hrubý in Stud. Pl. Physiol. Lab. Charles Univ. Prague*, v. 38 (1935).—Cult.
umbratica *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 91 (1935).—Peruv.
venulosa *Epling, l. c.* 35, in clavi.—Colomb.
verecunda *Epling in M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 53 (1933–5).—Mexico.
Weberbaueri *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 42 (1935), in clavi.—Peruv.

SALWEENIA E. G. Baker in Journ. Bot. 1935, lxxiii. 134. *LEGUMINOSAE.*
Wardii *E. G. Baker, l. c.* 135.—Tibet.

SAMADERA Gaertn. (Simaroubac.).
nanopetala *Scheffer ex Backer in Meded. Dep. Landbouw*, iv. (*Fl. Batav.*) 259 (1907), in syn.: S. indica var. brevipetala *Backer*.

SAMANEA Merrill (Legumin.).
pistaciifolia (*Willd.*) *Dugand in Tropical Woods*, 1934, No. 40, 10: Mimosa pistaciifolia.

SAMARA L. (Myrsinac.).
paniculata *Roxb. Hort. Beng.* 83 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 435 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 414 (1832).—Ind. or. (Madras).
polygama *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.*; *et l. c.*—Ins. Molucc.

SAMBUCUS L. (Caprifoliac.).
foetidissima *Nakai apud Nakai & Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. 1. (*Pl. Nov. Jehol.* 1.) 12 (1934).—Manchur. (Jehol).
longipes *Nakai, Kamik.-Tennenk.-Chōsahōk.* 40 (1928); cf. *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1143 (1931), japonice.—Japon.
microsperma *Nakai, l. c.*; cf. *Makino & Nemoto, l. c.*, japonice.—Japon.
Miquelii (*Nakai*) *Komarov in Komarov & Klob.-Alis. Key Pl. Far East. Reg. USSR*, ii. 962 (1932): S. Buergeriana var. Miquelii.

SANCHEZIA Ruiz & Pav. (Acanthac.).
conferta *Leonard in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1932, xxii. 131.—Peruv.
flava *Leonard, l. c.* 134.—Peruv.
Killipii *Leonard, l. c.* 137.—Peruv.
pulchra *Leonard, l. c.* 135.—Peruv.
rosea *Leonard, l. c.* 129.—Peruv.
rubriflora *Leonard, l. c.* 135.—Peruv.
sylvestris *Leonard, l. c.* 128.—Peruv.
tigrina *Leonard, l. c.* 130.—Peruv.
Williamsii *Leonard, l. c.* 127.—Peruv.

SANDWITHIA Lanj. in Kew Bull. 1932, 184. *EUPHORBIACEAE.*
guyanensis *Lanj. l. c.* 185.—Guiana Brit.

SANGUISORBA L. (Rosac.).
argutidens *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 249.—Corea.
chlorantha *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 234.—Japon. (Yezo).
filiformis (*Hook. f.*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 524 (1933): Poterium filiforme.
guestphalica (*Boenn.*) *Durand & Pittier in Bull. Soc. Bot. Belg.* xx. 133 (1881): Poterium guestphalicum.
Kishinamii *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 433.—Japon. (Hondo).

SANICULA L. (Umbellif.).
kaiensis *Makino & Hisauchi in Journ. Jap. Bot.* v. p. (366) (1928), japonice; *et l. c.* 1934, x. 755, latine.—Japon.
kauaiensis *St. John in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu*, xi. No. 13, 8 (1935).—Ins. Sandvic.
purpurea *St. John & Hosaka, l. c.* 6.—Ins. Sandvic.

SANSEVIERIA Thunb. (Liliac.; Haemodorac., Gen. Pl.).
elliptica *Chiov. Fl. Somala*, II. 421 (1932), in syn.; *Chiov. ex Guidotti in Agric. Colon., Ital.* 1932, xxvi. 549.—Somal. Ital.
erythraeae *Mattei in Boll. Stud. Inform. Giard. Colon. Palermo*, iv. 170 (1918).—Erythraea.
Gentilis *Mattei, l. c.* 171, nomen illegit.: S. chinensis *Gentil*.
livingstoniae *Rendle in Journ. Bot.* 1932, lxx. 89.—Rhodesia.
polyrchitis *Guidotti in Agric. Colon., Ital.* 1932, xxvi. 549.—Somal. Ital.
Quarrei *De Wild. in De Wild. & Staner, Contrib. Fl. Katanga*, Suppl. iv. 4 (1932).—Congo Belg.
scabrifolia *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 85 (1932).—Hereroland.
Thunbergii *Mattei in Boll. Stud. Inform. Giard. Colon. Palermo*, iv. 173 (1918), nomen illegit.: S. aethiopica *Thunb.*

SANTALUM L. (Santalac.).
hendersonense *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 66 (1935).—Ins. Tuamotu (Henderson).
Margaretae *Forest Brown, l. c.* 62.—Polynes. (Ins. Rapa).
multiflorum *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 27 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
myrtifolium (*L.*) *Roxb. Hort. Beng.* 83 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 464 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 444 (1832): Sirium myrtifolium.
raiateënse *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 27 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
salicifolium (*A. Cunn.*) *C. A. Gardner in For. Dep. Bull., W. Austral.* No. 44, 9 [1928]: Mida salicifolia.

SANTIRIA Blume (Burserac.).
Ebo (*Pierre*) *H. J. Lam in Ann. Jard. Bot. Buitenz.* xlii. 204 (1932): Santiriopsis Ebo.
glaberrima (*Engl.*) *H. J. Lam, l. c.*: Santiriopsis glaberrima.
kamerunensis (*Engl.*) *H. J. Lam, l. c.*: Santiriopsis kamerunensis.
Lauterbachii *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 454 (1931): S. caudata *Lauterb.*
nana *H. J. Lam in Ann. Jard. Bot. Buitenz.* xlii. 207 (1932).—Sumatra.
nervosa *H. J. Lam, l. c.* 206.—Sumatra; Ins. Sunda (Banca); Borneo.

SANTIRIA:—
obovata (*Pierre*) *H. J. Lam in Ann. Jard. Bot. Buitenz.* xlii. 204 (1932): Santiriopsis obovata.
Ridleyi *H. J. Lam, l. c.* 205.—Penins. Mal.
Tessmannii (*K. Krause*) *H. J. Lam, l. c.* 204: Santiriopsis Tessmannii.
violacea *H. J. Lam, l. c.* 205.—Borneo.

SANTIRIOPSIS Engl. (Burserac.).
trimera (*Oliv.*) *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 783 (1915), in obs.: Sorindeia trimera.

SANTOLINA L. (Compos.).
Ascensionis *Sennen, Pl. d'Esp.* No. 8821; *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1935, xxvi. 211.—Marocc.
insularis *Genn. ex A. Terracc. in Mem. Accad. Sc. Torino*, Ser. II. lxvii. No. 1, 67 (1933), in syn.: S. Chamaecyparissus subsp. pectinata *A. Terracc.*
subclausa *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 167 (1932).—Marocc.

SANVITALIA Lam. (Compos.).
longepedunculata *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 78 (1933–5).—Mexico.

SAPHESIA N. E. Brown in Gard. Chron. 1932, Ser. III. xci. 205. *FICOIDACEAE.*
flaccida (*L. Bolus*) *N. E. Brown, l. c.*: Mesembryanthemum flaccidum.

SAPINDUS L. (Sapindac.).
boninensis *Tuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 449.—Ins. Bonin.
oligophyllus *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 271 (1935).—China (Hainan).
papuanus *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 634, in clavi, 661 (1932).—N. Guin.

SAPIUM P. Br. (Euphorbiac.).
Acetosella *Milne-Redhead in Hook. Ic. Pl.* xxxii. t. 3199 (1933).—N. Rhodesia.
atrobadiomaculatum *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* x. 490 (1931).—China (Kiangsi; Fokien).
Aubrevillei *Léandri in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 449.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
integrifolium *Splitg. ex Lanj. Euphorbiac. Surinam*, 176 (1931); *et in Pulle, Fl. Surinam*, ii. (*Meded. K. Ver. Kol. Inst. Amst.* xxx.) 90 (1932), pro syn.: S. Hippomane.
Leitera *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 364.—Bras. (Matto Grosso).
microdentatum *Lanj. Euphorbiac. Surinam*, 46 (1931).—Guiana Bat.
montanum *Lanj. l. c.* 47.—Guiana Bat.
oblongifolium (*Muell.-Arg.*) *Pax in Engl. Jahrb.* xix. 114 (1894), in obs.: Excoecaria oblongifolia.

SAPONARIA L. (Caryophyllac.).
Boissieriana (*Hausskn. & Bornm.*) *Preobr. ex Popov in Trav. Turkest. State Univ.* No. 4, 24 (1922), in obs.: Gypsophila Boissieriana.
bucharica (*B. Fedtsch.*) *Preobr. ex Popov, l. c.*, in obs.: Gypsophila bucharica.

SAPRANTHUS Seem. (Annonac.).
borealis *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* x. 11 (1930).—Mexico.
longepedunculatus *R. E. Fries, l. c.* 7.—Mexico.
Palanga *R. E. Fries, l. c.* 12.—Nicarag.; Costa Rica.

SAPROSMA Blume (Rubiac.).
brunnea *Craib in Kew Bull.* 1932, 484.—Siam.
distans *Craib, l. c.* 485.—Siam.
latifolia *Craib, l. c.*—Siam.
longicalyx *Craib, l. c.*—Siam.
parvifolia *Craib, l. c.* 486.—Siam.
urophylla *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 162 (1934).—Sumatra.

SAPUCAYA Knuth in Fedde, Repert. xxxviii. 113, 114 (1935). *LECYTHIDACEAE.*
Schwackei *Knuth, l. c.* 113.—Bras. (Minas Geraes).

SARACA L. (Legumin.).
confusa (*Hassk.*) *Backer, Voorl. Schoolfl. Java*, 103 (1908): Jonesia confusa.
crassifolia *Ridley in Kew Bull.* 1933, 491.—Borneo.
Elmeri *Ridley, l. c.* 492.—Borneo.

SARANA Fisch. (Liliac.).
camtschatica *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1107 (1895), in syn.: Fritillaria camschatcensis.

SARCANTHUS Lindl. (Orchidac.).
minutiflorus *Ames & C. Schweinf. in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 39 (1934).—Sumatra.
pityophyllus (*Ridley*) *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxxii. 377 (1933): Saccolabium pityophyllum.
Smithianus *Kerr in Journ. Siam Soc., Nat. Hist. Suppl.*, ix. 239 (1933).—Indo-China (Laos).

SARCOCAPNOS DC. (Papaverac.).
integrifolia (*Boiss.*) *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xii. 286 (1929): Aplectrocapnos integrifolia.
saxatilis (*Clem. ex Lange*) *Ceballos & Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 382: Fumaria saxatilis.

SARCOCAULON Sweet (Geraniac.).
crassicaule *Rehm in Engl. Jahrb.* lxvii. 271 (1935).—Little Namaq.
Ernii *Dinter ex Range in Fedde, Repert.* xxxvi. 244 (1934), nomen.—Afr. austr.-occ.
flavescens *Rehm in Engl. Jahrb.* lxvii. 271 (1935).—Great Namaq.
Herrei *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 109, 110.—Namaqualand.
inerme *Rehm in Engl. Jahrb.* lxvii. 269 (1935).—Great Namaq.
Vanderietiae *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 109, 110; *et in Kew Bull.* 1932, 443.—Afr. austr. (Cape Prov.).

SARCOCEPHALUS Afzel. (Rubiac.).
nervosus *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 100 (1931).—Nigeria; Cameroons.
Richardi *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxxvi. (*Hist. Nat. Pl.* vi. Atlas iv.) t. 457 (1897).—Madag.

SARCOCHILUS R. Br. (Orchidac.).
benguetensis *Ames & Quisumb. in Philipp. Journ. Sc.* 1932, xlix. 493.—Ins. Philipp. (Luzon).
indusiatus (*Reichb. f.*) *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 121 (1935): Thrixspermum indusiatum.
membranifer *Carr, l. c.*—Borneo.
Segawai *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 212.—Formosa.
societatis *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 24 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
spathipetalus *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 151 (1931).—Borneo.
uniflorus *Gagnep. in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, vi. 468 (1933).—Indo-China (Anam).

SARCOGLOTTIS Presl (Orchidac.).
Thelymitra (*Reichb. f.*) *Ames in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* ii. 84 (1934), in obs.: Spiranthes Thelymitra.

SARCOGONUM G. Don (Polygonac.).
platycladum (*F. Muell.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 883 (1895), in obs.: Polygonum platycladum.

SARCOPODIUM Lindl. (Orchidac.).
speculum (*J. J. Smith*) *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 109 (1935): Dendrobium speculum.
Wichersii (*Schlechter*) *Carr in Journ. As. Soc. Mal.* xi. 87 (1933), in obs.: Dendrobium Wichersii.

SARCOPYGME Setchell & Christoph. in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu, xi. No. 5, p. 4 (1935). *RUBIACEAE.*
Mayorii (*Setchell*) *Setchell & Christoph. l. c.* p. 5: Breonia Mayorii.
pacifica (*Reinecke*) *Setchell & Christoph. l. c.* p. 4: Sarcocephalus pacificus.
ramosa (*Lauterb.*) *Setchell & Christoph. l. c.*: Sarcocephalus ramosus.

SARCOPYRAMIS Wall. (Melastomatac.).
gracilis *Schwartz in Mitt. Inst. Bot. Hamburg*, vii. 241 (1931).—Borneo.

SARCOSPERMA Hook. f. (Sapotac.).
kachinense *Cowan in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 222 (1931), non seq.—Upper Burma.

SARCOSPERMA:—
kachinense (*King & Prain*) *Exell in Journ. Bot.* 1931, lxix. 100: Combretum kachinense.

SARCOSTIGMA Wight & Arn. (Icacinac.; Olacac., Gen. Pl.).
brevipes *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 260 (1921), in obs.—Cameroons.

SARCOTHECA Blume (Oxalidac.; Linac., Gen. Pl.).
ferruginea *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 160 (1934).—Sumatra.

SARCOYUCCA (Trelease) Lindinger in Beih. Bot. Centralbl. l. 1. 446 (1933), in clavi. *LILIACEAE.* [YUCCA sect. SARCOYUCCA Trelease.]
aloifolia (*L.*) *Lindinger, l. c.*, in obs.: Yucca aloifolia.
australis (*Trelease*) *Lindinger, l. c.*, in obs.: Yucca australis.
baccata (*Torr.*) *Lindinger, l. c.*, in obs.: Yucca baccata.
brevifolia (*Schott*) *Lindinger, l. c.*, in obs.: Yucca brevifolia.
decipiens (*Trelease*) *Lindinger, l. c.*, in obs.: Yucca decipiens.
elephantipes (*Hort. ex Regel*) *Lindinger, l. c.*, in obs.: Yucca elephantipes.
Endlichiana (*Trelease*) *Lindinger, l. c.*, in obs.: Yucca Endlichiana.
macrocarpa (*Torr.*) *Lindinger, l. c.*, in obs.: Yucca baccata var. macrocarpa.
mohavensis (*Sarg.*) *Lindinger, l. c.*, in obs.: Yucca mohavensis.
periculosa (*Baker*) *Lindinger, l. c.*, in obs: Yucca periculosa.
Schotti (*Engelm.*) *Lindinger, l. c.*, in obs.: Yucca Schottii.
Treculiana (*Carr.*) *Lindinger, l. c.*, in obs.: Yucca Treculiana.
valida (*T. S. Brandegee*) *Lindinger, l. c.*, in obs.: Yucca valida.

SARCOZONA J. M. Black in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral. 1934, lviii. 176. *FICOIDACEAE.*
Pulleinei (*J. M. Black*) *J. M. Black, l. c.*: Carpobrotus Pulleinei.

SAROTHAMNUS Wimm. (Legumin.).
Andreanus (*Puiss.*) *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 487 (1924): Genista Andreana.
macranthus (*Ball*) *Pau in Font Quer, Iter Marocc.* 1930, No. 308 [1932]: Cytisus baeticus var. macranthus.
megalanthus *Pau & Font Quer in Font Quer, l. c.* 1927, No. 288 [1928].—Marocc.
multiflorus (*Ait.*) *G. Sampaio in An. Fac. Sc. Porto*, xix. 87 (1934); *et in Bol. Soc. Brot.* Sér. II. x. 227 (1935): Spartium multiflorum.
striatus (*Hill*) *G. Sampaio, l. c.*; *et l. c.* 226: Genista striata.

SARRACENIA L. (Sarraceniac.).
laciniata *Kerner, Pflanzenleben*, ed. 1, i. 118 (1887); *Moldenke in Torreya*, 1935, xxxv. 19.—U.S.A. (S. E. States).
oreophila *Wherry in Bartonia*, 1933, No. 15, 8.—U.S.A. (Alabama; Georgia).

SASA Makino & Shibata (Gramin.).
akitensis *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 374.—Japon.
amabilis *Makino & Nakai ex Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 37, in syn.: Sasamorpha amabilis.
amagiensis *Makino in Journ. Jap. Bot.* vii. 22 (1931).—Japon. (Hondo).
amphitricha *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 18.—Japon. (Yezo).
amplissima *Koidz. l. c.* 90.—Japon.
apoiensis *Nakai, Veg. Mt. Apoi Prov. Hidaka*, 24 (1930), japonice; *Nakai in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 185 (1931), latine.—Japon. (Yezo).
Arakii *Makino ex Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 17.—Japon. (Hondo).
argillacea *Koidz. l. c.* 26.—Japon. (Hondo).
Arikai *Miyabe & Tatewaki in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.* xiii. 110 (1934).—Japon. (Yezo).

SASA:—
Asahinae *Makino & Nakai ex Nakai in Rika Kyôiku*, xv. vi. 71 (1932), nomen; cf. *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 548, descr.—Japon. (Hondo).
asoënsis *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 371.—Japon.
atagoënsis *Makino ex Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 22.—Japon. (Hondo).
brachyphylla *Nakai in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 195 (1931), in obs.; *et in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 554.—Japon. (Hondo).
capillaris *Nakai in Rika Kyôiku*, xv. vi. 71 (1932), nomen; *et in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 555, descr.—Japon. (Hondo).
chitosensis *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 93, japonice; *et in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 549, latine.—Japon. (Yezo).
chiyomurensis *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 76.—Japon.
chokaiensis *Makino ex Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 24.—Japon. (Hondo).
cochlearispatha *Koidz. l. c.* 17.—Japon. (Hondo).
confusa *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 818.—Japon.
debilis *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 93, japonice; *et in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 550, latine.—Japon. (Yezo).
depauperata (*Takeda*) *Nakai in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 185 (1931): S. nipponica var. depauperata.
dewaënsis *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 86.—Japon.
diabolica *Koidz. l. c.* 166.—Japon. (Hondo).
dilacerata *Koidz. l. c.* 18.—Ins. Kuril.
dissitiflora *Nakai in Rika Kyôiku*, xv. vi. 71 (1932), nomen; *et in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 556, descr.—Japon. (Hondo).
Doiyoshiwoana *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 16.—Japon.
elegans *Makino in Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 1, 1495 (1925); *et l. c.* ed. 2, 1394 (1931), japonice.—Japon.
elegantissima *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 86.—Japon.
encaustiomarginata *Koidz. l. c.* 166.—Japon. (Hondo).
fugeshiensis *Koidz. l. c.* 167.—Japon. (Hondo).
fukuchiyamensis *Makino ex Koidz. l. c.* 1934, iii. 20.—Japon. (Hondo).
futadensis *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 375.—Japon.
geniculata *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 17.—Japon.
glaucissima *Koidz. l. c.* 87.—Japon.
gracillima *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 47.—Japon.
grandifolia *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 18.—Japon.
Harai *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 557.—Japon. (Hondo).
Hashimotoi *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 17.—Japon.
hatchoënsis *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 93, japonice; *et in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 564, latine.—Japon. (Hondo).
Hattoriana *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 167.—Japon. (Hondo).
hayachinecola *Makino ex Koidz. l. c.* 1934, iii. 154.—Japon.
heterotricha *Koidz. l. c.* 1935, iv. 168.—Japon. (Hondo).
higoënsis *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 371.—Japon.
hikosanensis *Makino & Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 22.—Japon. (Kiushiu).
hirtella *Nakai in Rika Kyôiku*, xv. vi. 72 (1932), nomen; *et in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 567, descr.—Japon. (Shikoku).
hizaoriensis *Makino ex Nakai in Miyabe & Kudo, Fl. Hokkaido & Saghalien*, ii. 184 (1930); cf. *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 52, in syn.: S. septentrionalis.
horribilis *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 19.—Japon.
Hosidaikitiana *Koidz. l. c.* 168.—Japon. (Hondo).

SASA :—
hozuensis *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 77. —Japon.
igaënsis *Nakai, l. c.* 1934, x. 552.—Japon. (Hondo).
Ikegamii *Nakai, l. c.* 1935, xi. 372.—Japon.
inequilateralis *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 169.—Japon. (Hondo).
ishizuchiana *Makino ex Koidz. l. c.* 1934, iii. 26.—Japon. (Shikoku).
iwakiana *Makino & Koidz. l. c.* 18.—Japon. (Hondo).
iyoënsis *Nakai ex Ohki in Bot. Mag., Tokyo*, 1928, xlii. 393, japonice; *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 47.—Japon.
kanayamensis *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 81.—Japon.
kariyosensis *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 93, japonice; *et in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 565, latine.—Japon. (Hondo).
kashidensis *Makino & Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 23; *et l. c.* 1935, iv. 169.—Japon. (Hondo).
kasidensis *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 601, japonice.—Japon.
kasimontana *Nakai, l. c.* 812, cum descr. latina: S. kasidensis *Nakai*.
kassiana *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 87.—Japon.
kassizanensis *Koidz. l. c.* 88.—Japon.
kinkiensis *Koidz. l. c.* 1934, iii. 21.—Japon. (Hondo).
kitamiana *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 93, japonice; *et in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 550, latine.—Japon. (Yezo).
kiyozumiana *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 49.—Japon.
kogasensis *Nakai, l. c.* 46.—Japon.
kogensis *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 813. —Japon.
Koidzumii *Makino ex Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 18.—Japon.
Kozasa *Nakai in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 186 (1931).—Japon. (Yezo).
kumaënsis *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 169.—Japon. (Kiushiu).
kumasoana *Koidz. l. c.* 170.—Japon. (Kiushiu).
kurehaënsis (*Koidz.*) *Koidz. l. c.*: S. parontakensis var. kurehaënsis.
Kurokawana *Makino in Journ. Jap. Bot.* vii. 27 (1931).—Japon. (Hondo).
kusirensis *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 553. —Japon. (Yezo).
laetevirens *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 24.—Japon. (Hondo).
lancifolia *Koidz. l. c.* 1935, iv. 88.—Japon.
lasioclada *Makino & Nakai in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 187 (1931).—Japon. (Yezo).
linearifolia *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 88.—Japon.
macra *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 814.—Japon.
maculata *Nakai, l. c.*—Japon.
Makinoana *Hayata ex Ohki in Journ. Fac. Sc. Tokyo*, Sect. III. Bot., iv. 44 (1932), descr. anat. —Japon. (Hondo).
Makinoi *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 557.—Japon. (Hondo).
Matsudae *Nakai, l. c.* 1935, xi. 376.—Japon.
maxima *Nakai, l. c.* 1934, x. 558.—Japon. (Hondo).
Mayebarae *Nakai, l. c.* 1935, xi. 373.—Japon.
meakensis *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 93, japonice; *et in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 551, latine.—Japon. (Yezo).
megalogluma *Nakai in Rika Kyôiku*, xv. vi. 72 (1932), nomen; *et in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 559, descr.—Japon. (Hondo).
mikawana *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 70.—Japon.
Miyabei *Nakai in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 188 (1931).—Japon. (Yezo).
Miyazawai *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 373. —Japon.
mogamensis (sphalm. nogamensis) *Nakai, l. c.* 1934, x. 560, in syn.: S. nobilis var. mogamensis *Nakai*.
mollis *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 46. —Japon.

SASA :—
mollissima *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 171.—Japon. (Hondo).
Momosei *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 85.—Japon.
naigoënsis *Nakai, l. c.* 377.—Japon.
nankoënsis *Makino & Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 19.—Japon. (Hondo).
nebulosa (*Makino & Shibata*) *Koidz. l. c.* 25: S. paniculata f. nebulosa.
neochartacea *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 815.—Japon.
Niijimai *Tatewaki ex Nakai in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 188 (1931).—Japon. (Yezo).
nishigoënsis *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 81. —Japon.
nobilis (*Makino & Uchida*) *Nakai, l. c.* 1934, x. 559: S. paniculata var. nobilis.
notoënsis *Nakai, l. c.* 560.—Japon. (Hondo).
notopeninsulae *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 171.—Japon. (Hondo).
obtecta *Koidz. l. c.* 1934, iii. 25.—Japon.
ohmiana *Koidz. l. c.* 154.—Japon.
ohminensis *Makino & Koidz. l. c.* 19.—Japon. (Hondo).
omokoënsis *Makino ex Koidz. l. c.* 26.—Japon. (Shikoku).
Oseana (*Makino*) *Makino in Journ. Jap. Bot.* vii. 32 (1931), nomen; *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 82, cum descr.: S. paniculata var. Oseana.
osoreyamensis *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 93, japonice; *et in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 551, latine.—Japon. (Hondo).
Otayana *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 172.—Japon. (Hondo).
ovalifolia *Koidz. l. c.* 173.—Japon. (Hondo).
palmata (*Bean*) *Nakai in Rika Kyôiku*, xv. vi. 73 (1932); *et in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 561: Arundinaria palmata.
paniculata (*Schmidt*) *Makino & Shibata*; *Nakai in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 193 (1931), cum descr.: Arundinaria kurilensis var. paniculata.
pankensis *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 553. —Japon. (Yezo).
para-elegans *Nakai, l. c.* 1935, xi. 816.—Japon.
parontakensis *Nakai, l. c.* 1934, x. 561.—Japon. (Hondo).
phyllophorrhachis *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 15.—Japon.
pilosa *Nakai in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 189 (1931).—Sakhalin; Yezo.
plexipes *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 22.—Japon.
pseudobrachyphylla *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 816.—Japon.
pseudokurilensis *Nakai, l. c.* 1934, x. 563.—Japon. (Hondo).
pseudonipponica *Tatewaki ex Nakai in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 184 (1931).—Sakhalin.
pubens *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 83.—Japon.
pubescens *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 22.—Japon.
pulcherrima *Koidz. l. c.* 1934, iii. 155.—Japon.
pycnotricha *Koidz. l. c.* 24.—Japon. (Hondo).
quelpaertensis *Nakai in Rika Kyôiku*, xv. vi. 73 (1932), nomen; cf. *Nakai, Fl. Sylvat. Koreana*, xx. 40 (1933), cum descr.—Corea (Quelpaert).
recticlada *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 93, japonice; *et in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 565, latine.—Japon. (Hondo).
rivularis *Nakai in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 191 (1931).—Sakhalin; Yezo.
robusta *Nakai, Kamik.-Tennenk.-Chôsahôk.* 41 (1928); cf. *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1397 (1931), japonice.—Japon.
sachalinensis *Makino & Nakai in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 190 (1931).—Sakhalin; Hokkaido.
Sadaoi *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 84.—Japon.
Saitoana *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 89.—Japon.
samaniana *Nakai, Veg. Mt. Apoi Prov. Hidaka*, 31 (1930), japonice; *Miyabe & Kudo in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 184 (1931), latine.—Japon. (Yezo).

SASA :—
scaberula *Makino & Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 23.—Japon.
scytophylla *Koidz. l. c.* 26.—Japon.
shikotanensis *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 554.—Ins. Kuril.
Shiwotana *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 89.—Japon.
siroyamensis *Makino ex Koidz. l. c.* 1934, iii. 152. —Japon.
soyensis *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 817.—Japon.
spectabilis *Makino & Nakai in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 192 (1931).—Japon. (Yezo).
subverticillata *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 77.—Japon.
Sugawarae *Nakai, l. c.* 601, japonice, 812, latine. —Sakhalin.
Sugimotoi *Nakai, l. c.* 86.—Japon.
surugensis *Nakai, l. c.* 78.—Japon.
Suzukii *Nakai, l. c.*—Japon.
tambaënsis *Makino & Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 18.—Japon. (Hondo).
tangoana *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 84, in syn.: S. Uii.
tangoënsis *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 21.—Japon. (Hondo).
tangoyosaënsis *Koidz. l. c.* 1935, iv. 172.—Japon. (Hondo).
tectoria *Makino ex Koidz. l. c.* 1934, iii. 20.—Japon.
tenuifolia *Nakai in Rika Kyôiku*, xv. vi. 74 (1932), nomen; *et in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 552, descr. —Japon. (Hondo).
tenuissima *Makino & Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 46.—Japon.
tesioënsis *Tatewaki in Research Bull. Coll. Exper. Forest Coll. Agric. Hokk. Imp. Univ.* vii. 181–208 (1932); cf. *Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 228, japonice.—Japon.
tobishimensis *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 79.—Japon.
tomodensis *Nakai, l. c.* 374.—Japon.
tonensis *Nakai, l. c.* 1934, x. 563.—Japon. (Hondo).
tsukubensis *Nakai, l. c.* 1935, xi. 86.—Japon.
Uii *Nakai, l. c.* 84.—Japon.
Uinuizoana *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 90.—Japon.
uyetsuensis *Koidz. l. c.* 91.—Japon.
villosa *Makino & Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 52.—Japon.
Yagiana *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 154.—Japon. (Shikoku).
yamatensis *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 50.—Japon.
Yokotai *Nakai, l. c.* 93, japonice; *et in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 566, latine.—Japon. (Hondo).
Yoshikawana *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 172.—Japon. (Hondo).
Yoshinoi *Koidz. l. c.* 1934, iii. 69.—Japon.
zephyrina *Koidz. l. c.* 1935, iv. 173.—Japon. (Hondo).
Zigzag *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 80.—Japon.

SASAËLLA Makino (Gramin.).
atamiana *Makino ex Nakai in Rika Kyôiku*, xv. vi. 75 (1932); *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 573, in syn.: Arundinaria atamiana.
atropurpurea *Makino & Nakai ex Nakai, l. c.* 76; *et l. c.* 574, in syn.: Arundinaria atropurpurea.
benten *Makino & Nakai ex Nakai, l. c.* 75; *et l. c.* 571, in syn.: Arundinaria ramosa var. latifolia *Nakai*.
epitricha *Nakai, l. c.*; *et l. c.* 574, in syn.: Arundinaria epitricha.
hebechlamys *Nakai, l. c.*; *et l. c.* 575, in syn.: Arundinaria hebechlamys.
Ikegamii *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 576, in syn.: Arundinaria Ikegamii.
Inuii *Makino ex Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 68.—Japon.
Koidzumii *Makino ex Koidz. l. c.* 16.—Japon.
maxima *Nakai in Rika Kyôiku*, xv. vi. 75 (1932); *et in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 558, in syn.: Sasa maxima.
Minaguchii *Makino & Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 16.—Japon.

SASAËLLA :—
musashiensis *Makino & Nakai ex Nakai in Rika Kyôiku*, xv. vi. 75 (1932); *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 578, in syn.: Arundinaria musashiensis.
nikkoënsis *Makino & Nakai ex Nakai, l. c.* 76; *et l. c.*, in syn.: Arundinaria nikkoënsis.
phalerata *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 16, in syn.: Arundinaria phalerata.
sadoënsis *Makino ex Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 572, in syn.: Arundinaria ramosa var. sadoënsis *Nakai*.
siroyamensis *Makino ex Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 19, in syn.: Arundinaria siroyamensis.
tangoënsis (*Koidz.*) *Koidz. l. c.* 1934, iii. 68: Sasa tangoënsis.
velutina *Makino & Nakai ex Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 580, in syn.: Arundinaria velutina.

SASAMORPHA Nakai in Journ. Fac. Agric., Sapporo, xxvi. 180 (1931). *GRAMINEAE.*
amabilis *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 37. —Japon.
Asagishiana (*Makino & Uchida*) *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 16: Sasa Asagishiana.
borealis (*Hackel*) *Nakai in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 181 (1931): Bambusa borealis.
chiisanensis *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 37.—Corea.
gracilis *Nakai, l. c.* 38.—Corea; Japon.
igaënsis *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 581.— Japon. (Hondo).
mollis *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 39. —Japon.
oshidensis (*Makino & Uchida*) *Nakai, l. c.*: Sasa oshidensis.
purpurascens (*Hackel*) *Nakai in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 181 (1931), in obs.: Arundinaria purpurascens.

SATANOCRATER Schweinf. (Acanthac.).
coccineus (*S. Moore*) *Lindau ex Chiov. Fl. Somala*, 245 (1929): Haemacanthus coccineus.

SATUREJA L. (Labiat.).
×acinifolia *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1933, xxxii. 32 (1934), in syn.: Calamintha acinifolia.
×Alboi *Sennen, l. c.* 59, in syn.: Calamintha Alboi.
×amoena *Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1906, xii. 92.—Hort.
amplifoliata *Pau in Font Quer, Iter Marocc.* 1929, No. 394 [1930].—Marocc.
balcanica (*Vel.*) *Stoyanoff & Stefanoff, Fl. Bulg.* ed. 2, 878, 880 (1933): Micromeria balcanica.
×Barolesii *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1933, xxxii. 61 (1934), in syn.: Calamintha Barolesii.
Bellardi *Colla, Herb. Pedem.* iv. 421 (1835).— Dalmat.
Bianoris *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1933, xxxii. 54 (1934), in syn.: Calamintha Bianoris.
Bonanovae *Sennen, l. c.* 49, in syn.: Calamintha Bonanovae.
Bourlieri (*Maire & Lièvre*) *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 60: Micromeria Bourlieri.
brevisepala *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1933, xxxii. 51 (1934), in syn.: Calamintha brevisepala.
Briquetii *Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc*, iii. 646 (1934): S. debilis *Briq.* (1904), non (1897).
bzybica *Woronow in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 222 (1933).—Caucas.
Caballeroi *Sennen & Pau in Bol. Soc. Ibér.* 1933, xxxii. 55 (1934), in syn.: Calamintha Caballeroi.
cacuminiglabra *Sennen, l. c.* 52, in syn.: Calamintha cacuminiglabra.
cantabrica *Sennen & Elias, l. c.* 26, in syn.: Calamintha cantabrica.
catalaunica *Sennen, l. c.* 28, in syn.: Calamintha catalaunica.
Dolzii *Sennen, l. c.* 64, in obs.—Hispan.
×Dufourii *Sennen, l. c.* 59, in syn.: Calamintha Dufouri.
Enriquei *Sennen, l. c.* 54, in syn.: Calamintha Enriquei.
eriocaulis *Sennen, l. c.* 50, in syn.: Calamintha eriocaulis.

SATUREJA :—
Ferreri *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1933, xxxii. 27 (1934), in syn. : Calamintha Ferreri
Fontii *Sennen, l. c.* 55, in syn.: Calamintha Fontii.
Gillesii *Sennen, l. c.* 58, in syn.: Calamintha Gillesii.
gunibica *Woronow in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 222 (1933).—Caucas.
heterotricha *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 89 [1933], in syn.: Calamintha heterotricha.
Hieronymi *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1933, xxxii. 63 (1934).—Hispan.
Josephi *Sennen, l. c.* 30, in syn.: Calamintha Josephi.
×Knochei *Sennen & Bianor, l. c.* 63, in syn.: Micromeria Knochei.
Kochii *Popov ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 330 (1932), in syn.: Micromeria elliptica.
Kudoi *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1932, xxii. 225.—Formosa.
Litardierei *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1933, xxxii. 56 (1934), in syn.: Calamintha Litardierei.
longeracemosa *Sennen, l. c.* 53, in syn.: Calamintha longeracemosa.
macrosiphon (*Coss.*) *Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc*, iii. 647 (1934): Micromeria macrosiphon.
Mairei *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1933, xxxii. 53 (1934), in syn.: Calamintha Mairei.
mollis (*Jord. ex Lamotte*) *E. Perrier, Cat. Pl. Vasc. Savoie*, ii. (*Mém. Acad. Sc. Savoie*, Sér. V. v.) 201 (1928): Calamintha mollis.
penniciliata *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1933, xxxii. 31 (1934), in syn.: Calamintha peniciliata.
Secondaireana *Sennen, l. c.* 54, in syn.: Calamintha Secondaireana.
suavis *Sennen, l. c.* 57, in syn.: Calamintha suavis.

SATYRIA Klotzsch (Ericac.; Vacciniac., Gen. Pl.).
carnosiflora *Lanj. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 165.—Guiana Bat.
cerander (*Dun.*) *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 120: Thibaudia cerander.
elongata *A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 521 (1932).—Mexico; Guatem.; Costa Rica.
latifolia *A. C. Smith, l. c.* 527.—Colomb.
minutiflora *A. C. Smith, l. c.* 529.—Colomb.
neglecta *A. C. Smith, l. c.* 520.—Boliv.
nitida *A. C. Smith, l. c.* 528.—Venez.
ovata *A. C. Smith, l. c.* 524.—Am. centr.
pilosa *A. C. Smith, l. c.*—Colomb.
polyantha *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 119.—Peruv.
Toroi *A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 530 (1932).—Colomb.
triloba *A. C. Smith, l. c.* 523.—Costa Rica.

SATYRIUM L. (Orchidac.).
acutirostrum *Summerhayes in Kew Bull.* 1931, 384. —Congo Belg.
dizygoceras *Summerhayes, l. c.* 1932, 508.—Afr. trop. or. (Elgon).
fimbriatum *Summerhayes, l. c.* 343.—Kenya Col.

SAURAUIA Willd. (Actinidiac.; Ternstroemiac., Gen. Pl.).
Arnoldi *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 143 (1934).—Colomb.
floribunda *Linden & Planch.*; *Sprague in Kew Bull.* 1926, 43.—Venez.
formosa *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 144 (1934).—Peruv.
hypomalla *Benoist in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 334.—Am. austr.
mojandensis *Benoist, l. c.*—Am. austr.
natalicia *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 144 (1934).—Peruv.
pyramidata *Sleum. l. c.* 145.—Boliv.
Raimondiana *Sleum. l. c.*—Peruv.
rhodosma *Sleum. l. c.* 147.—Colomb.
solitaria *Sleum. l. c.*—Peruv.
Trolliana *Sleum. l. c.* 148.—Boliv.

SAUROPUS Blume (Euphorbiac.).
calcareus *M. R. Henderson in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 121 (1933).—Penins. Mal.
chorisepalus *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 10 (1934).—China (Szechuan; Kwangsi; Kwangtung).

SAUROPUS :—
longipedicellatus *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 34 (1934).—China (Hainan).
villosus (*Blanco*) *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 86 (1934): Kirganelia villosa.

SAUSSUREA DC. (Compos.).
alpicola *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 46: S. eriophylla var. alpina *Nakai*.
amabilis *Kitamura, l. c.* 47: S. obvallata *Nakai*.
calcicola *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 513. —Corea.
chrysanthemumoides *Chen in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 97 (1935).—China (Yunnan).
crinita (*Franch.*) *Franch. ex Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 519: S. Tanakae var. crinita.
daisetsuensis *Nakai, Rep. Veg. Daisetsusan Mts.* 57, 72 (1930), japonice; cf. *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 521, in syn.: S. yesoënsis var. daisetsuensis *Nakai*.
depsangensis *Pampan. in Sped. Ital. De Filippi Himal. etc. 1913–14*, Ser. II. xi. (*Agg. Fl. Carac.*) 176 (1934).—Mont. Karakoram.
dumetorum *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 206 (1934).—China (Yunnan).
fistulosa *Anthony, l. c.*—China (Yunnan).
Georgei *Anthony, l. c.* 207.—China (Szechuan; Yunnan).
glandulosa *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 137.—Formosa.
globosa *Chen in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 96 (1935).—China (Szechuan).
Hisauchii *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 518.—Japon.
hsiaowutaishanensis *Chen in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* v. 85 (1934).—China (Chihli).
incisa *Chen, l. c.* vi. 96 (1935).—China or.
insularis *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 75.—Japon.
kai-alpina *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 515.—Japon.
×karuizawensis *Hara in Journ. Jap. Bot.* ix. 128 (1933).—Japon. (Hondo).
kinbuensis *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 516.—Japon.
kirigaminensis *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 101.—Japon.
Koidzumiana *Kitamura, l. c.* 1935, iv. 9, japonice, 75, latine.—Corea.
Kudoana *Tatewaki & Kitamura, l. c.* 7, japonice, 76, latine.—Japon. (Hokkaido).
kurilensis *Tatewaki in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxix. 153 (1931), nomen; *et l. c.* xxix. 214 (1933), descr.—Ins. Kuril.
Kurosawae *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 137.—Japon. (Hondo).
Leveillei *Chen in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 93 (1935): S. Vanioti *Léveillé* (1915), non (1910).
macrolepis (*Nakai*) *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 180: S. grandifolia var. macrolepis.
×mirabilis *Kitamura, l. c.* 1935, iv. 12, japonice.— Japon.
modesta *Kitamura, l. c.* 1933, ii. 46.—Japon. (Hondo).
montana *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 208 (1934).—China (Szechuan; Yunnan).
Muramatsui *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 179.—Japon. (Hondo).
Nakaiana *Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 220 (1932).—Sibir. (Marit. Prov.).
nana (*Pampan.*) *Pampan. in Sped. Ital. De Filippi Himal. etc. 1913–14*, Ser. II. xi. (*Agg. Fl. Carac.*) 176 (1934): S. Schultzii var. nana.
neo-serrata *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 519.—Amur; Corea; Manchur.
Nomurae *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 77.—Corea.
oblongifolia *Chen in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 99 (1935).—China (Yunnan).
obvallata *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 519. —Japon.
peipingensis *Chen in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* v. 87 (1934).—China (Chihli).
polylepis *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 522.—Corea.

SAUSSUREA :—
polypodioides *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 209 (1934).—China (Yunnan).
pratensis *Anthony, l. c.* 210.—China (Yunnan).
pseudo-Leontodon *Chen in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 99 (1935).—S. E. Tibet.
pseudo-sagitta *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 3.—Japon.
pulchella *Fisch. ex Cotla, Herb. Pedem.* iii. 234 (1834).—Sibir. (Transbaikal.).
rara *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 9, japonice, 77, latine.—Japon. (Hondo).
rectinervis *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 618.—Corea.
Rockii *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 211 (1934).—China (Yunnan).
rotundifolia *Chen in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 98 (1935).—China (Szechuan).
salwinensis *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 211 (1934).—Tibet; Yunnan.
Sawadae *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 109, japonice; *et l. c.* 1935, iv. 78, latine.—Japon. (Hondo).
sclerolepis *Nakai & Kitagawa in Rep. 1st. Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. 1. (*Pl. Nov. Jehol.* 1.) 64 (1934).—Manchur. (Jehol).
sessiliflora (*Koidz.*) *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 181: S. Tanakae var. sessiliflora.
sovietica *Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 220 (1932).—Sibir. (Marit. Prov.).
subcordata *Chen in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 98 (1935).—China (Szechuan).
superba *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 212 (1934).—China (Yunnan).
tienmoshanensis *Chen in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 100 (1935).—China (Chekiang).
Tobitae *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 138.—Japon. (Hondo).
Tokubuchii *Kudo ex Kitamura, l. c.* 1935, iv. 76, in syn.: S. Kudoana.
tsarongensis *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 214 (1934).—Tibet.
tsukubensis *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 422.—Japon. (Hondo).
tunglingensis *Chen in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* v. 85 (1934).—China (Chihli).
venosa *Kerr in Kew Bull.* 1935, 331.—Siam.
violacea *Pampan. in Sped. Ital. De Filippi Himal. etc. 1913–14*, Ser. II. xi. (*Agg. Fl. Carac.*) 177 (1934).—Mont. Karakoram.
vittifolia *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 215 (1934).—China (Yunnan).
Wardii *Anthony, l. c.* 216.—China (Szechuan; Yunnan).
yamatensis *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 3.—Japon.
Yoshinagae *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 102.—Japon.

SAVASTANA Schrank (Gramin.).
macrophylla (*Thurb. ex Boland.*) *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 187 (1896): Hierochloë macrophylla.
mexicana (*Benth.*) *Beal, l. c.*: Hierochloë mexicana.

SAVIA Willd. (Euphorbiac.).
andringitrana *Léandri in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 587.—Madag.
bemarensis *Léandri, l. c.* 588.—Madag.
Decaryi *Léandri, l. c.* 589.—Madag.
Maroando *Danguy in Lecomte, Not. Syst.* v. 1 (1935).—Madag.

SAXIFRAGA L. (Saxifragac.).
Allenii (*Small*) *A. M. Johnson in Res. Publ. Univ. Minnesota, Stud. Biol. Sc.* No. 4 (*Minnesota Stud. Pl. Sc.* 1.) 22 (1923): Micranthes Allenii.
asarifolia *Sternb. Rev. Saxifrag.* Suppl. 2, 33, t. 24 (1831).—Nepal.
astrosanguinea *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 27 (1933).—China (Szechuan; Yunnan).
× Bertolonii *Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1906, xii. 93.—Hort.
× Borisii *Kellerer ex Sünderm. l. c.*—Hort.
calcicola *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 32 (1933).—China (Yunnan).
Candollei *Salzm. ex Pouz. in Mém. Soc. Linn. Paris*, iv. 561 (1826), nomen.—Corsica.

SAXIFRAGA :—
Candollii *Tausch in Syll. Ratisb.* ii. 242 (1828); *Sternb. Rev. Saxifrag.* Suppl. 2, 84, t. 19, fig. 1 (1831).—Pyren.
carnosula *Mattf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 305 (1931).—China (Szechuan).
carpatica *Sternb. Rev. Saxifrag.* Suppl. 2, 32 (1831).—Carpath.
chelanensis *A. M. Johnson in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 109.—U.S.A. (Washington).
Clarioni *Sternb. Rev. Saxifrag.* Suppl. 2, 72 (1831).—Alpes Marit.
culcitosa *Mattf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 303 (1931).—China (Szechuan).
Decandollii *Tausch ex Sternb. Rev. Saxifrag.* Suppl. 2, 84 (1831), in syn.: S. Candollii.
decussata *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 33 (1933).—China (Yunnan).
× Degeniana *Hand.-Mazz. & J. Wagner in Fedde, Repert.* xxxviii. 284 (1935).—Thessal.
× Elisabethae *Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1906, xii. 93.—Hort.
Embergeri *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 292.—Marocc.
× Eudoxiana *Kellerer ex Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1906, xii. 93.—Hort.
filifolia *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 29 (1933).—Tibet; Upper Burma; Yunnan.
flexuosa *Sternb. Rev. Saxifrag.* Suppl. 2, 38 (1831).—Canada (Quebec).
× Fritschiana *L. Keller in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1899, xlix. 373.—Carinth.
Georgei *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 33 (1933).—China (Szechuan).
× Gyoerffyana *J. Wagner in Fedde, Repert.* xxxviii. 284 (1935).—Thessal.
hastigera *Léveillé*; *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 25 (1933), descr. emend.—China (Yunnan).
hemisphaerica *Hook. f. & Thoms.*; *Anthony, l. c.* 32, descr. ampl.—Tibet.
incompta *Peck in Rhodora*, 1934, xxxvi. 267.—U.S.A. (Oregon).
insolens *Irmsch. in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 269 (1935).—China (Yunnan).
Jotanii *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 436.—Japon. (Hondo).
Kikubuki *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 50, in adnot., in syn.: S. fusca var. Kikubuki *Ohwi*.
× Kyrilli *Kellerer ex Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1906, xii. 93.—Hort.
loripes *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 31 (1933).—China (Szechuan).
Losae *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 113.—Hispan.
Losana *Sennen, l. c.*, in syn.: S. Losae.
Luizetiana *Emberger & Maire*; *Emberger & Maire in Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc*, xi. Nos. 4–6, 99 (1931).—Marocc.
minutifolia *Pau in Font Quer, Iter Marocc.* 1930, No. 277 [1932].—Marocc.
Moorcroftiana (*Ser.*) *Wall.*; *Sternb. in Rev. Saxifrag.* Suppl. 2, 28 (1831): S. diversifolia var. Moorcroftiana.
numidica *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 291.—Afr. bor.
× Obristii *Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1906, xii. 92.—Hort.
Ohwii *Tatewaki in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxix. 199 (1933): S. purpurascens *Komarov*.
oresbia *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 28 (1933).—China (Szechuan).
ovatocordata *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 425 (1931).—China (Szechuan).
paludosa *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 24 (1933).—China (Yunnan).
pardanthina *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 418 (1931).—China (Szechuan).
× Paulinae *Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1906, xii. 92.—Hort.
peraristulata *Mattf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 304 (1931).—China (Szechuan).
× Petraschii *Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1906, xii. 92.—Hort.
Prostii *Sternb. Rev. Saxifrag.* Suppl. 2, 84 (1831).—Gallia.

SAXIFRAGA :—
× pseudo-Forsteri *Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr* 1906, xii. 93.—Hort.
× pseudo-Kotschyi *Sünderm. l. c.*—Hort.
quadricallosa *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 419 (1931).—China (Yunnan).
Redowskyana *Sternb. Rev. Saxifrag.* Suppl. 2, 44 (1831).—Kamchatka.
reniformis *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 25.—Sakhalin; Ins. Kuril.; Yezo.
× rigescens *Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1906, xii. 94.—Hort.
Rockii *Irmsch. in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 267 (1935), non seq.—China (Yunnan).
Rockii *Mattf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 302 (1931).—China (Szechuan).
rupinarum *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 28 (1933).—China (Szechuan).
× Salomonii *Sünderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1906, xii. 92.—Hort.
Smithiana *Irmsch. in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 268 (1935).—Upper Burma.
subaequifoliata *Irmsch. l. c.* 270.—Upper Burma.
subrhombifolia *Irmsch. l. c.* 272.—China (Yunnan).
sulphurascens *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 417 (1931).—China (Szechuan).
tricrenata *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1928, No. 156 [1929]; *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 45, descr. ampl.—Marocc.
tsarongensis *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 29 (1933).—Tibet; China (Yunnan).
unalaschcensis *Sternb. Rev. Saxifrag.* Suppl. 2, 9 (1831).—Ins. Aleut.
uninervia *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 31 (1933).—China (Yunnan).
Werneri *Font Quer & Pau in Cavanillesia*, iv. 29 (1931).—Marocc.

SAXO-FRIDERICIA Rob. Schomb. (Rapateac.).
australis *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 350.—Bras. (Pará).

SCABIOSA L. (Dipsacac.).
albanensis *R. A. Dyer in Kew Bull.* 1934, 267.—Afr. austr. (Cape Prov.).
glanduligera *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxvi. 141 (1934).—As. Min. (Lydia).
Gordiani *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 55 [1933], nomen.—Marocc.
lachnophylla *Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. II. (*Contrib. Cogn. Fl. Mansh.*: *Pl. Nov. Jehol.* II. ii.) 33 (1935).—Manchur. (Jehol).
letschchumensis *Kemul.-Nat. in Monit. Jard. Bot. Tiflis*, 1928–30, n. s. Pt. 5, 13 (1931).—Caucas.
Polykratis *K. H. Rechinger in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 12.—Graecia (Ins. Samos).
schaorica *Kemul.-Nat. in Monit. Jard. Bot. Tiflis*, 1928–30, n. s. Pt. 5, 15 (1931).—Caucas.
siamensis *Craib in Kew Bull.* 1933, 30.—Siam.
Weyleri *Pau in Font Quer, Iter Marocc.* 1930, No. 634 [1932].—Marocc.

SCABIOSELLA Van Tiegh. in Ann. Sc. Nat. Sér. IX. x. 163 (1909), in obs. *DIPSACACEAE*.

SCAEVOLA L. (Goodeniac.).
kahanae *Degener, Fl. Hawaiiensis*, Fam. 340 (1933).—Ins. Sandvic. (Oahu).
kilaueae *Degener, Ferns & Fl. Pl. Hawaii Nat. Park*, 294 (1930), in obs.; *Degener, Fl. Hawaiiensis*, Fam. 340 (1933), descr.—Ins. Sandvic. (Hawaii).
marquesensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, p. 330 (1935).—Ins. Marquesas (Hivaoa).
oppositifolia *Roxb. Hort. Beng.* 85 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 148 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 528 (1832).—Ins. Molucc.
Skottsbergii *St. John in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu*, x. No. 4, p. 6 (1933).—Ins. Sandvic.
subcapitata *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, p. 328 (1935).—Ins. Marquesas.
Taccada (*Gaertn.*) *Roxb. Hort. Beng.* 15 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 146 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 527 (1832): Lobelia Taccada.

SCALIGERIA DC. (Umbellif.).
alaica (*Lipsky*) *Korovin in Bull. Univ. As. Centr.* vii. 20 (1924), in obs.; *et in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 2, 39 (1928): Carum alaicum.
hirtula (*Regel & Schmalh.*) *Lipsky ex Korovin in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 2, 52 (1928): Conopodium hirtulum.
Knorringiana *Korovin, l. c.* 35.—As. centr.
Lipskii *Korovin, l. c.* 34.—Transcasp.
samarkandica *Korovin, l. c.* 44.—As. centr.
transcaspica *Korovin, l. c.* 60.—Transcasp.
tschimganica *Korovin, l. c.* 62.—As. centr.

SCANDICIUM Thellung (Umbellif.).
Aucheri *Bornm. ex Bornm. & Gauba in Fedde, Repert.* xxxix. 121 (1935), in syn.: Scandix Aucheri.

SCANDIX L. (Umbellif.).
Borziana *Béguinot in Boll. Stud. Inform. Giard. Colon. Palermo*, iii. 83 (1916).—Alger.
laevigata (*Aznav.*) *Stoyanoff & Stefanoff, Fl. Bulg.* ed. 2, 749 (1933): S. Pecten-veneris var. laevigata.
Manjurkiana *Tamamsch. in Bot. Archiv.* xxxiv. 524 (1932).—Armen.
stellulata *Tamamsch. in Fedde, Repert.* xxxviii. 169 (1935): Scandicium stellulatum.

SCAPHOPETALUM Mast. (Sterculiac.).
amoenum *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 255 (1917).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).

SCAPHULA R. N. Parker in Fedde, Repert. xxx. 326 (1932). *DIPTEROCARPACEAE.*
glabra (*Kurz*) *R. N. Parker, l. c.*: Anisoptera glabra.

SCAPHYGLOTTIS Poepp. & Endl. (Orchidac.).
corallorrhiza (*Ames*) *Ames, F. T. Hubbard & C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* iii. 40 (1934): Pachystele corallorrhiza.
grandiflora *Ames & C. Schweinf. in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 349.—Venez.

SCASSELLATIA Chiov. Fl. Somala, II. 151 (1932). *ANACARDIACEAE.*
heterophylla *Chiov. l. c.* 152.—Somal. Ital.

SCELETIUM N. E. Brown (Ficoidac.).
albanense *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 396 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
boreale *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 375 (1932).—Afr. austr. (Bushmanland).
compactum *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 393 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).
gracile *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 375 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Joubertii *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 435 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
namaquense *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 374 (1932).—Namaqualand.
Tugwelliae *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 394 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).

SCHAENOMORPHUS Thorel ex Gagnep. (Orchidac.).
[Vide SCHOENOMORPHUS.]

SCHEELEA Karst. (Palmae).
Dryanderae *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1049 (1934).—Colomb.
Lundellii *H. H. Bartlett in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 46 (1935).—Guatem.
Wallisii (*Huber*) *Burret*; *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1047 (1934), descr. ampl.—Bras. (Rio Acre).
zonensis *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, iii. 36 (1933).—Panamá.

SCHEFFLERA J. R. & G. Forst. (Araliac.).
Bangii *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 285 (1931).—Boliv.
Bartlettii *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 177 (1934).—Sumatra.
Buchtienii *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 286 (1931).—Boliv.
capitulifera *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 117 (1934).—Sumatra.
Clarkeana *Craib, Fl. Siam. Enum.* i. 797 (1931): Heptapleurum venulosum var. macrophyllum *C. B. Clarke.*

SCHEFFLERA :—
dananensis (*A. Cheval.*) *Harms ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 778 (1921), in obs.: Heptapleurum dananense.
Delavayi (*Franch.*) *Harms in Engl. Jahrb.* xxix. 486 (1900), in obs.: Heptapleurum Delavayi.
Dielsii *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 693 (1935).—Ecuador.
discolor *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* vii. 318 (1931).—China (Kwangtung).
farinosa (*Blume*) *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 118 (1934): Actinophyllum farinosum.
hainanensis *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 295 (1935).—China (Hainan).
Henriquesiana *Harms ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 778 (1921), in obs.—Afr. trop. occ. (S. Thomé).
Humblotiana *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxxv. (*Hist. Nat. Pl.* v. Atlas iii.) t. 404 (1896).—Madag.
Klugii *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 484 (1932).—Peruv.
Mjoebergii *Merrill in Sarawak Mus. Journ.* iii. 538 (1928).—Borneo.
multifoliolata *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 178 (1934).—Sumatra.
musangensis *M. R. Henderson in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 105 (1933).—Penins. Mal.
myriantha *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxxv. (*Hist. Nat. Pl.* v. Atlas iii.) t. 403 (1896).—Madag.
nephelophila *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 286 (1931).—Boliv.
nodosa *F. M. Muller in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 163.—Hab.?
pachyclada *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 670.—Ins. Carolin. (Truk).
peruviana *Asplund in Svensk Bot. Tidskr.* 1932, xxvi. 193.—Peruv.
phanerophlebia *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 118 (1934).—Sumatra.
remotiserrata *Merrill in Sarawak Mus. Journ.* iii. 537 (1928).—Borneo.
rhynchocarpa *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 119 (1934).—Sumatra.
sibayakensis *Merrill, l. c.* 120.—Sumatra.
sycidiifolia *Lebrun in Bull. Agric. Congo Belge*, 1934, xxv. 436, nomen; *et in Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. 19 (1934), descr.—Congo Belg.
tipuanica *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 287 (1931).—Boliv.
Trollii *Harms, l. c.*—Boliv.
Yatesii *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 178 (1934).—Sumatra.

SCHIEDEA Cham. & Schlecht. (Caryophyllac.).
trinervia (*H. Mann*) *Pax & K. Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 326 (1934): Alsinidendron trinerve.
verticillata *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 81, 29 (1931).—Ins. Sandvic.

SCHIMA Reinw. (Theac.; Ternstroemiac., Gen. Pl.).
bambusifolia *Hu*; *Hu in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* v. 310 (1934), descr. ampl.—China (Yunnan; Kwangsi).
hypochra *Pierre, Fl. For. Cochinch.* ii. sub t. 121 (1887), in obs., sphalm.?: S. hypoglauca.
Lobbii (*Hook. f.*) *Pierre, l. c.*, in obs.: Gordonia Lobbii.
Lowii *Pierre, l. c.*, in obs.—Hab.?

SCHIPPIA Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xi. 867 (1933). *PALMAE.*
concolor *Burret, l. c.* 868.—Brit. Honduras.

SCHISANDRA Michx. (Magnoliac.).
bicolor *Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., viii. 137 (1932).—China (Chekiang).
discolor *Nakai, Fl. Sylvat. Koreana*, xx. 103 (1933).—Japon.

SCHISCHKINIA Iljin in Fedde, Repert. xxxviii. 73 (1935). *COMPOSITAE.*
albispina (*Bunge*) *Iljin, l. c.*: Microlonchus albispinus.

SCHISMATOGLOTTIS Zoll. & Mor. (Arac.).
retinervia *Furtado in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 157 (1935).—Borneo.
Robelinii *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1171 (1895), in syn.: Aglaonema Robelinii.

SCHISMUS Beauv. (Gramin.).
perennis *Ducell. & Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1932, xxiii. 220.—Afr. bor.

SCHISTOCARPHA Less. (Compos.).
Sinforosi *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 27, Cuadro 12 (1934), nomen; *et l. c.* No. 29, p. 43 (1935), descr.—Colomb.

SCHISTOGYNE Hook. & Arn. (Asclepiadac.).
Fiebrigii *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxv. A. No. 14, p. 14 (1934).—Boliv.
longipedunculata *Malme, l. c.* 11.—Argent.
Mandonii *Malme, l. c.* 12.—Boliv.
pubescens *Malme, l. c.* 10.—Argent.

SCHIZACHNE Hackel (Gramin.).
callosa (*Turcz. ex Griseb.*) *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 279: Avena callosa.
Komarovii *Roshev. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 544 (1934): Avena striata subsp. capillipes *Komarov.*

SCHIZACHYRIUM Nees (Gramin.).
sanguineum (*Retz.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 334 (1931): Rottboellia sanguinea.

SCHIZANDRA DC. (Magnoliac.).
[Vide SCHISANDRA Michx.]

SCHIZANTHUS Ruiz & Pav. (Solanac.).
alpestris *Poepp. in Froriep, Notiz. Gebiet Natur-u. Heilk.* Ser. I. xxiii. 291 (1829), in adnot.—Chile.
papilionaceus *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 773 (1895), in syn.: S. pinnatus f. papilionaceus *Voss.*
venustus *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in syn.: S. pinnatus.

SCHIZOBASIS Baker (Liliac.).
buchubergensis *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 168 (1931), in obs., nomen; *et l. c.* xxx. 80 (1932), descr.—Great Namaq.

SCHIZOCARDIA A. C. Smith & Standley in Tropical Woods, 1932, No. 32, 9. *CLETHRACEAE.*
belizensis *A. C. Smith & Standley, l. c.*—Brit. Honduras.

SCHIZOCOCCUS Eastw. in Leafl. West. Bot. i. 98 (1934). *ERICACEAE.*
myrtifolius (*Parry*) *Eastw. l. c.* 99: Arctostaphylos myrtifolius.
Nummularia (*A. Gray*) *Eastw. l. c.*: Arctostaphylos Nummularia.

SCHIZOGLOSSUM E. Mey. (Asclepiadac.).
gigantoglossum *Weimarck in Bot. Notiser*, 1935, 393.—S. Rhodesia.
Glanvillei *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 58 (1931).—Sierra Leone.
gracile *Weimarck in Bot. Notiser*, 1935, 384.—S. Rhodesia.
lanatum *Weimarck, l. c.* 392.—S. Rhodesia.
leptoglossum *Weimarck, l. c.* 387.—S. Rhodesia.
rhodesicum *Weimarck, l. c.* 390.—S. Rhodesia.

SCHIZOMERIA D. Don (Cunoniac.; Saxifragac., Gen. Pl.).
ilicina (*Ridley*) *Schlechter in Engl. Jahrb.* lv. 194 (1918), in obs.: Cremnobates ilicina.

SCHIZOPHRAGMA Sieb. & Zucc. (Saxifragac.).
obtusifolium *Hu in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* v. 309 (1934).—China (Szechuan).
tomentellum (*Hand.-Mazz.*) *Stapf in Bot. Mag.* sub t. 9262 (1932): Pileostegia tomentella.
viburnoides (*Hook. f. & Thoms.*) *Stapf, l. c.* t. 9262: Pileostegia viburnoides.

SCHIZOSTACHYUM Nees (Gramin.).
Funghomii *McClure in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 585 (1935).—China (Kwangtung; Kwangsi).
hainanense *Merrill ex McClure in Porterf. Govt. Bur. Econ. Inf.*, Booklet Ser., No. 2, 74 [1926], sine descr.; cf. *McClure in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 591 (1935), cum descr.—China (Hainan).

SCHIZOSTACHYUM:—
stenocladum *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 759 (1935).—Ins. Solomon.
tessellatum *A. Camus, l. c.* 758.—Ins. Solomon.

SCHLAGINTWEITIELLA Ulbr. (Ranunculac.).
glareosa (*Hand.-Mazz.*) *Ulbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 355 (1935): Thalictrum glareosum.

SCHLIEBENIA Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xii. 99 (1934). *ACANTHACEAE.*
salviiflora *Mildbr. l. c.*—Tanganyika Terr.
secunda *Mildbr. l. c.* xii. 521 (1935).—Tanganyika Terr.

SCHMIDELIA L. (Sapindac.).
trichodesma *Boj. ex Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 543 (1932), in syn.: Allophylus trichodesmus.

SCHMIDTIA Steud. (Gramin.).
kalahariensis *Stent in Bothalia*, ii. 421, 423 (1928).—Afr. austr. (Cape Prov.).

SCHNELLA Raddi (Legumin.).
trinitensis *Britton ex R. O. Williams in Fl. Trinidad & Tobago*, i. 278 (1931), in syn.: Bauhinia cumanensis.

SCHOENOBIBLUS Mart. (Thymelaeac.).
coriaceus *Domke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 355 (1932).—Colomb.

SCHOENOMORPHUS Thorel ex Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France, 1933, lxxx. 351, 352, in obs. *ORCHIDACEAE.*
capitatus *Thorel ex Gagnep. l. c.* 351.—Indo-China (Laos).

SCHOENOPLECTUS Palla (Cyperac.).
cernuus (*Vahl*) *Hayek in Fedde, Repert. Beih.* xxx. III. 153 (1932): Scirpus cernuus.
melanospermus (*C. A. Mey.*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 146 (1928): Scirpus melanospermus.

SCHOENUS L. (Cyperac.).
articulatus *Roxb. Hort. Beng.* 81 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 189 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 184 (1832).—Ind. or. (Madras).
mariannae *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 263.—Ins. Marian. (Alamagan).
xyridioides *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1932, lxxvii. Beibl. 19, 81.—N. Caled.

SCHOEPFIA Schreb. (Olacac.).
fragrans *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 188 (1824).—Nepal.

SCHOLTZIA Schau. (Myrtac.).
Eatoniana (*Ewart & J. White*) *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 95 (1931): Baeckea Eatoniana.

SCHOMBURGKIA Lindl. (Orchidac.).
vellozicola *Hoehne in Bol. Agric., S. Paulo*, 1933, xxxiv. 622 (1934).—Bras. (S. Paulo).

SCHOTIA Jacq. (Legumin.).
Fischeri (*Taub.*) *Harms in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 453 (1915), in obs.: Theodora Fischeri.
Rogersii *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxx. 326 (1932).—Transvaal.
suaheliensis (*Taub.*) *Harms in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 454 (1915), in obs.: Theodora suaheliensis.

SCHOUTENIA Korth. (Tiliac.).
glomerata *King in Journ. As. Soc. Beng.* lx. II. 107 (1891).—Penins. Mal.
Kunstleri *King, l. c.*—Penins. Mal.
Mastersii *King, l. c.* 106.—Penins. Mal.

SCHRADERA Vahl (Rubiac.).
marginalis *Standley in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1934, xxiv. 403.—Colomb.

SCHREBERA Roxb. (Oleac.).
Chevalieri *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 26 (1931).—Senegal.

SCHRENKIA Fisch. & Mey. (Umbellif.).
ugamica *Korovin ex Baranov in Journ. Turkest. Branch. Russ. Geogr. Soc.* 1924, xvii. 13, 33 (1925), nomen.—Turkestan. (Thian Shan).

SCHWANTESIA L. Bolus (Ficoidac.).
Herrei *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 287 (1931).—Little Namaq.
Marlothii *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 354 (1932).—Namaqualand.

SCIADOPITYS Sieb. & Zucc. (Pinac.; Conif., Gen. Pl.).
cretacea *Ogura in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 417, japonice.—Japon.

SCIAPHILA Blume (Triuridac.).
guianensis *Sandwith in Kew Bull.* 1932, 228.—Guiana Brit.

SCILLA L. (Liliac.).
Achteni *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 468 (1932).—Congo Belg.
albanica *Turrill in Kew Bull.* 1932, 197.—Albania.
angustifolia *R. Phil. in Verh. Deutsch. Wiss. Ver. Santiago (Chile)* ii. 108 (1890), nomen.—Chile.
atropatana *Grossheim in Komarov, Fl. URSS*, iv. 372, 740 (1935).—Transcaucas.
beirana *G. Sampaio in Bol. Soc. Brot.* Sér. II. vii. 125 (1931).—Lusitan.
bella *Markötter in Ann. Univ. Stellenb.* 1930, viii. Sect. A, No. 1, 13.—Natal.
bucharica *Desiat. in B. Fedtsch. Rast. Turkest.* 248 (1915); *Komarov, Fl. URSS*, iv. 379 (1935).—As. centr.
katendensis *De Wild. in De Wild. & Staner, Contrib. Fl. Katanga*, Suppl. IV. 5 (1932).—Congo Belg.
nossibeënsis *H. Perrier in Lecomte, Not. Syst.* v. 67 (1935).—Madag.
violacea *Hutchinson in Kew Bull.* 1932, 511.—Afr. austr. (Cape Prov.).

SCINDAPSUS Schott (Arac.).
tonkinensis *K. Krause in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 331 (1932).—Indo-China (Tonkin).

SCIRPUS L. (Cyperac.).
abactus *Ohwi in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 186.—Japon.
acutangulus *Roxb. Hort. Beng.* 81 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 216 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 213 (1832).—Ind. or.
amphibius (*Durieu*) *Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* xi. 80 [1930–1]: Eleocharis amphibia.
bispicatus *Koen. ex Roxb. Hort. Beng.* 6 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 223 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 220 (1832).—Ind. or.
brevifolius *Roxb. l. c.* 81, nomen; *et l. c.* 229; *et l. c.* 226.—Ind. or.
bucharicus *Roshev. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 55, 579 (1935).—As. centr.
comosus *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 234 (1820).—Nepal.
densus *Wall. l. c.* 231.—Nepal.
dubius *Roxb. Hort. Beng.* 81 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 218 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 215 (1832).—Ind. or.
germanicus (*Palla*) *W. Christiansen in Schrift. Nat. Ver. Schleswig-Holst.* xxi. 23 (1935): Trichophorum germanicum.
Hattorianus *Makino in Journ. Jap. Bot.* viii. 44 (1933).—Japon. (Hondo).
hondoënsis *Ohwi in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 189.—Japon.
Hotarui *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 44 (1934).—Japon. (Hondo).
incurvatus *Roxb. Hort. Beng.* 6 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 216 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 214 (1832).—Ind. or. (Bengal).
Jacobi *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1931, 103.—Ind. or.
juncoides *Roxb. Hort. Beng.* 81 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 218 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 216 (1832).—Ind. or.
kiushuensis *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 44 (1934).—Japon. (Kiushiu).
Komarovii *Roshev. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 54, 579 (1935).—Sibir. (Amur).
Kysoor *Roxb. Hort. Beng.* 6 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 235 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 230 (1832).—Ind. or. (Bengal).
lupulinus (*Nees*) *Roshev. in Komarov, Fl. URSS*, iii. 53 (1935): Isolepis lupulina.
maximus *Roxb. Hort. Beng.* 81 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 237 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 231 (1832).—Ind. or.
medius *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 216 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 213 (1832).—Ind. or.
minimus *Roxb. Hort. Beng.* 81 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 221 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 219 (1832).—Ind. or.
mollis *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 227 (1820).—Nepal.
monostachyos *Koen. ex Roxb. Hort. Beng.* 6 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 221 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 219 (1832).—Ind. or.
muriculatus *Kükenth. in Bot. Notiser*, 1934, 75.—Rhodesia.
Okuyamae *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 64.—Japon.
orientalis *Ohwi, l. c.* 1932, i. 76.—Sakhalin; Corea; Japon.
pallescens *Roxb. Hort. Beng.* 81 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 233 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 229 (1832).—Ind. or.
pectinatus *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 220; *et l. c.* 218.—Ind. or.
pentagonus *Roxb. l. c.* 6, nomen; *et l. c.* 221; *et l. c.*—Ind. or.
Perrieri *Cherm. in Arch. Bot., Caen*, Bull. 1929, iii. 194 (1931).—Madag.
Pitardi *Trab. ex Pitard*; *Trab. in Pitard, Contrib. Étude Fl. Maroc*, 37 (1918), descr.—Marocc.
scaber *Roxb. Hort. Beng.* 81 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 222 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 220 (1832).—Ind. or.
striatus (*Nees*) *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 76 (1932): Eleogiton striatus.
strictus *Roxb. Hort. Beng.* 81 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 229 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 226 (1832).—Ind. or.
strobilinus *Roxb. l. c.* 6, nomen; *et l. c.* 222; *et l. c.* 219.—Ind. or.
subarticulatus *Roxb. l. c.* 81, nomen; *et l. c.* 217; *et l. c.* 215.—Ind. or.
subquadrangularis *Makino in Journ. Jap. Bot.* vii. 8 (1931).—Japon. (Hondo).
tenellus *Roxb. Hort. Beng.* 81 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 227 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 224 (1832).—Ind. or.
triangulatus *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 219; *et l. c.* 217.—Ind. or. (Bengal).
tridentatus *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 228; *et l. c.* 225.—Ind. or.
tumidus *Roxb. l. c.* 6, nomen; *et l. c.* 215; *et l. c.* 212.—Ind. or.

SCLERANDRIUM Stapf & C. E. Hubbard in Hook. Ic. Pl. xxxiii. t. 3262 (1935). *GRAMINEAE.*
intermedium (*A. Camus*) *C. E. Hubbard, l. c.* sub t. 3262, p. 2, in adnot.: Lophopogon intermedius.
truncatiglume (*F. Muell. ex Benth.*) *Stapf & C. E. Hubbard, l. c.* t. 3262: Ischaemum truncatiglume.

SCLERIA Berg. (Cyperac.).
alpina *Core in Brittonia*, i. 241 (1934).—Bras. (Espirito Santo).
aromatica *Core, l. c.* 239.—Bras. (Minas Geraes).
bambariensis *Cherm. in Arch. Bot., Caen*, iv. Mém. No. 7, 48 (1931).—Afr. Gall. Centr.
Brittonii *Core ex Small, Man. Southeast. Fl.* 190 (1933); *Core in Brittonia*, i. 243 (1934): S. glabra *Britton.*
castanea *Core in Brittonia*, i. 239 (1934).—Peruv.
centralis *Cherm. in Arch. Bot., Caen*, iv. Mém. No. 7, 50 (1931): S. macrantha *Boeck.* (1879), non (1858).
colorata *Core in Brittonia*, i. 242 (1934).—Bras. (Paraná).
Fauriei *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 78.—Formosa.
georgiana *Core in Brittonia*, i. 243 (1934): S. gracilis *Ell.*
Killipiana *Britton in Brittonia*, i. 240 (1934).—Colomb.
laxiflora *R. Gross in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 658 (1932).—Tanganyika Terr.

SCLERIA :—
Macbrideana *R. Gross in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 40 (1931).—Peruv.
macrolomioides *H. Pfeiff. in Fedde, Repert.* xxxiii. 214 (1933).—Mexico.
obtusa *Core in Brittonia*, i. 240 (1934).—Boliv.
Schliebenii *R. Gross in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 657 (1932).—Tanganyika Terr.
Splitgerberiana *Henrard ex Uitt. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 190.—Guiana Bat.
Staheliana *Uitt. l. c.* 189.—Guiana Bat.
stenophylla *Core in Brittonia*, i. 242 (1934).—Colomb.
stipitata *Uitt. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 189, 190.—Guiana Bat.
Tisseranti *Cherm. in Arch. Bot., Caen*, iv. Mém. No. 7, 50 (1931).—Afr. Gall. Centr.
Williamsii *R. Gross in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 39 (1931).—Peruv.

SCLEROBASSIA Ulbr. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, xvi c. 539 (1934). *CHENOPODIACEAE.*
litoralis (*Diels*) *Ulbr. l. c.* 540: Bassia litoralis.

SCLEROBLITUM Ulbr. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, xvi c. 495 (1934). *CHENOPODIACEAE.*
atriplicinum (*F. Muell.*) *Ulbr. l. c.* 496: Blitum atriplicinum.

SCLEROCARPUS Jacq. (Compos.).
triunfonis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 77 (1933–5).—Calif. infer.

SCLEROCARYOPSIS A. Brand in Engl. Pflanzenreich, Borrag.-Borraginoid.-Cryptanth. 98 (1931). *BORAGINACEAE.*
spinicarpos (*Forsk.*) *A. Brand, l. c.*: Anchusa spinicarpos.

SCLEROCYATHIUM Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med. (Trans. Rubber & Guttap. Inst., USSR.) 14, in clavi, 30 (1933). *EUPHORBIACEAE.*
Popovii *Prokh. l. c.* 30: Euphorbia sclerocyathium.

SCLERODACTYLON Stapf (Gramin.).
macrostachyum (*Benth.*) *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 38: Eleusine macrostachya.

SCLEROLAENA R. Br. (Chenopodiac.).
eriacantha (*F. Muell.*) *Ulbr. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 534 (1934): Bassia eriacantha.
limbata (*J. M. Black*) *Ulbr. l. c.*: Bassia limbata.
obliquicuspis (*R. H. Anders.*) *Ulbr. l. c.* 533: Bassia obliquicuspis.
patenticuspis (*R. H. Anders.*) *Ulbr. l. c.* 534: Bassia patenticuspis.
tricuspis (*F. Muell.*) *Ulbr. l. c.*: Bassia tricuspis.

SCLEROLOBIUM Vog. (Legumin.).
amplifolium *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 43 (1935).—Bras. (Amaz.).
eriopetalum *Ducke, l. c.* 41.—Bras. (Amaz.).
macropetalum *Ducke, l. c.*—Bras. (Amaz.).
melanocarpum *Ducke, l. c.* 43.—Bras. (Amaz.; Pará).
setiferum *Ducke, l. c.* 42.—Bras. (Amaz.).
subbullatum *Ducke, l. c.*—Bras. (Amaz.).

SCLEROSPERMA G. Mann & H. Wendl. (Palmae).
dubium *Becc. in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa*, Mem., 1934, xliv. 176.—Guinea Hispan.
Walkeri *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1931, xi. 237.—Gabon.

SCLEROTHAMNUS (sphalm. Selerothamnus) Harms in Fedde, Repert. xvii. 325, indice p. 467 (1921). *LEGUMINOSAE.*
Ehrenbergii *Harms, l. c.* 326, indice p. 467.—Mexico.
pentaphyllus *Harms, l. c.* 325, indice p. 467.—Mexico.
Purpusii *Harms, l. c.* 326, indice p. 467.—Mexico.

SCLEROTHECA DC.; Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu, No. 130, 325 (1935), descr. emend. *CAMPANULACEAE.*
longistigmata *Forest Brown, l. c.* 327.—Ins. Marquesas.
Margaretae *Forest Brown, l. c.* 326.—Polynes. (Ins. Rapa).

SCOLOPIA Schreb. (Flacourtiac.; Bixac., Gen. Pl.).
Gossweileri *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 141 (1934).—Angola.
Kermodei *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1935, 574.—Burma; Ins. Andaman.
Ledermannii *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 577 (1921), in obs.; *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 142 (1934), descr.—Cameroons; Angola.
minutiflora *Sleum. l. c.* xii. 716 (1935).—Tanganyika Terr.
mutiensis *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 577 (1921), in obs.—Cameroons.
riparia *Mildbr. & Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1077 (1934).—Nyasaland; Tanganyika Terr.
Stolzii *Gilg*; *Sleum. l. c.* xii. 142 (1934), descr.—Tanganyika Terr.

SCOPOLA Jacq. (Solanac.).
parviflora (*Dunn*) *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 263: S. japonica var. parviflora.

SCORODOSMA Bunge (Umbellif.).
soongorica *Korovin in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 24, 11 (1935), in syn., in obs.: Ferula Dubjanskyi.

SCORZONELLA Nutt. (Compos.).
Leachiana *Peck in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1934, xlvii. 188.—U.S.A. (Oregon).

SCORZONERA L. (Compos.).
baldschuanica *Lipschitz in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1933, n. s. xlii. 154.—Turkestan. (Baldschuan).
Bungei *Krasch. & Lipschitz, l. c.* 1934, n. s. xliii. 144.—Ross. asiat.
cilicia *Boiss. ex Lipschitz, Fragm. Monogr. Gen. Scorzon.* (*Trans. Rubber & Guttap. Inst., Moscow*) 156 (1935), in syn.: S. cilicica.
circumflexa *Krasch. & Lipschitz in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1934, n. s. xliii. 148.—Turkestan.
colorata *Krasch. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 179 (1933).—Caucas.
concatenata *Szow. ex Lipschitz, Fragm. Monogr. Gen. Scorzon.* (*Trans. Rubber & Guttap. Inst., Moscow*) 78 (1935), in syn.: S. Szowitzii.
crassifolia *Krasch. & Lipschitz in Lipschitz, l. c.* 60.—Turkestan.
crassinervia *Fisch. ex Krasch. & Lipschitz in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1934, n. s. xliii. 146, in syn.: S. Fischeriana.
dependens *K. H. Rechinger in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 18.—Creta.
Drarii *V. Täckh. in Svensk Bot. Tidskr.* 1932, xxvi. 375.—Aegypt.
dzhawakhetica *Sosn. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 236 (1934).—Caucas.
eximia *K. H. Rechinger in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 17.—Graecia (Ins. Amorgos).
ferganica *Krasch. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 180 (1933).—Ross. asiat. centr.
Fischeriana *Krasch. & Lipschitz in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1934, n. s. xliii. 146.—Ross. asiat.
Franchetii *Lipschitz, l. c.* 1933, n. s. xlii. 154.—Turkestan.
Ikonnikovii *Lipschitz & Krasch. in Lipschitz, Fragm. Monogr. Gen. Scorzon.* (*Trans. Rubber & Guttap. Inst., Moscow*) 109 (1935).—Mongol.
iliensis *Krasch. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 178 (1933).—Ross. asiat. (Kasakstan).
incana *Fisch. ex Lipschitz, Fragm. Monogr. Gen. Scorzon.* (*Trans. Rubber & Guttap. Inst., Moscow*) 36, 153 (1935), in syn.: Scorzonera spp.
inconspicua *Lipschitz in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1933, n. s. xlii. 128, 139.—Turkestan.
Inula *Lipschitz, Syst. Notiz. Asiat. Scorzon.* 19 (1932); *Lipschitz in Fedde, Repert.* xxxiii. 166 (1933).—Bokhara.
judaica *Eig in Fedde, Repert. Beih.* lxiii. 1. 78 (1931), nomen.—Palaest.
Karjagini *Grossheim in Bot. Sborn. AzGNII*, i. 52 (1932), rossice; *et in Trud. Azerb. Otdyel. Zakavk. Fil. Akad. Nauk SSSR*, Sect. Bot., i. 62 (1933), latine; *Lipschitz, Fragm. Monogr. Gen. Scorzon.* (*Trans. Rubber & Guttap. Inst., Moscow*) 102 (1935).—Transcaucas.

SCORZONERA :—
Ketzkhowelii *Sosn. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 240 (1934).—Caucas.
Korschinskyi *Lipschitz, Syst. Notiz. Asiat. Scorzon.* 18 (1932); *Lipschitz in Fedde, Repert.* xxxiii. 165 (1933).—Turkestan. Ross.
Kozlowskyi *Sosn. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 241 (1934).—Caucas.
Kultiassovi *Lipschitz in Sovietsk. Bot.* 1934, No. 1, 29, in obs., nomen.—Turkestan.
lamellata *Krasch. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 180 (1933).—Caucas.
leptophylla (*DC.*) *Krasch. & Lipschitz in Lipschitz, Fragm. Monogr. Gen. Scorzon.* (*Trans. Rubber & Guttap. Inst., Moscow*) 78 (1935): S. mollis var. leptophylla.
Litwinowi *Krasch. & Lipschitz in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1934, n. s. xliii. 153.—Transcasp.
muriculata *Chang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* v. 319 (1934).—China (Szechuan).
Nikitini *Lipschitz, Syst. Notiz. Asiat. Scorzon.* 20 (1932); *Lipschitz in Fedde, Repert.* xxxiii. 166 (1933).—Turkestan.
nutans *Czecz. in Acta Soc. Bot. Polon.* 1932, ix. 41.—As. Min. (Paphlagonia).
Petrovii *Lipschitz, Syst. Notiz. Asiat. Scorzon.* 20 (1932); *Lipschitz in Fedde, Repert.* xxxiii. 167 (1933).—Ross. asiat. (Kasakstan).
pontica *Hausskn. & Bornm. ex Lipschitz, Fragm. Monogr. Gen. Scorzon.* (*Trans. Rubber & Guttap. Inst., Moscow*) 156 (1935), in syn.: S. amasiana.
Popovii *Lipschitz, l. c.* 23.—Turkestan.
praetuberosa *Krasch. & Lipschitz in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1934, n. s. xliii. 157.—Hab. ?
pseudodivaricata *Lipschitz, l. c.* 1933, n. s. xlii. 158.—Mongol.
pseudolanata *Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 235 (1934).—Caucas.
pseudopygmaea *Lipschitz, Fragm. Monogr. Gen. Scorzon.* (*Trans. Rubber & Guttap. Inst., Moscow*) 40 (1935).—Marocc.
pseudotomentosa *Lipschitz, l. c.* 150, nomen provis.—Armen. Turc.
radiata *Fisch. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 558 (1834).—Sibir. (Transbaikal.).
rebunensis *Tatewaki & Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 139: S. radiata f. humilis *Koidz.*
rugulosa *Chang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* v. 320 (1934).—Turkestan. (Thian Shan).
Ruprechtiana *Lipschitz & Krasch. ex Lipschitz, Fragm. Monogr. Gen. Scorzon.* (*Trans. Rubber & Guttap. Inst., Moscow*) 121 (1935), in syn.: S. austriaca subsp. glabra *Lipschitz & Krasch.*
Safievi *Grossheim in Bot. Sborn. AzGNII*, i. 51 (1932), rossice; *et in Trud. Azerb. Otdyel. Zakavk. Fil. Akad. Nauk SSSR*, Sect. Bot., i. 62 (1933), latine; *Lipschitz, Fragm. Monogr. Gen. Scorzon.* (*Trans. Rubber & Guttap. Inst., Moscow*) 138 (1935).—Armen.
sericeo-lanata (*Bunge*) *Krasch. & Lipschitz in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1934, n. s. xliii. 141: S. tuberosa var. sericeo-lanata.
sinensis *Lipschitz & Krasch. in Lipschitz, Fragm. Monogr. Gen. Scorzon.* (*Trans. Rubber & Guttap. Inst., Moscow*) 120 (1935), in syn.: S. austriaca subsp. sinensis *Lipschitz & Krasch.*
Sosnovskyi *Lipschitz, l. c.* 142.—Caucas.
stenophylla *Boiss. & Hausskn. ex Lipschitz, l. c.* 80, in syn.: S. turcomanica.
subacaulis (*Regel*) *Lipschitz in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1933, n. s. xlii. 160, cum descr. ampl.; *et in Fedde, Repert.* xxxiii. 168 (1933): S. austriaca var. subacaulis.
tadshikorum *Krasch. & Lipschitz in Lipschitz, Fragm. Monogr. Gen. Scorzon.* (*Trans. Rubber & Guttap. Inst., Moscow*) 49 (1935), nomen provis.—Ross. asiat. centr.
tau-saghyz *Lipschitz & Bosse in Trans. Rubber & Guttap. Inst.* No. 1 (*Sc. Res. Inst. U.S.S.R.* No. 465) 7 (1931).—Ross. asiat. (Kasakstan).
turcomanica *Krasch. & Lipschitz in Lipschitz, Fragm. Monogr. Gen. Scorzon.* (*Trans. Rubber & Guttap. Inst., Moscow*) 80 (1935).—Transcasp.
Turkeviczi *Krasch. & Lipschitz, l. c.* 83.—Armen. Turc.

SCORZONERA:—
Woronowii *Krasch. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 178 (1933).—Caucas.

SCOTTELLIA Oliv. (Flacourtiac.; Bixac., Gen. Pl.).
coriacea *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 159, in clavi, 160 (1927); *Hutchinson & Dalziel in Kew Bull.* 1928, 31, descr.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
Gossweileri *Exell in Journ. Bot.* 1932, lxx. Suppl. 1, 217.—Congo Lusit.
montana *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 561 (1921), in obs.—Cameroons.
polyantha *Gilg ex Engl. l. c.*, in obs.—Cameroons.
thyrsiflora *Gilg ex Engl. l. c.*, in obs.—Cameroons.

SCROPHULARIA L. (Scrophulariac.).
Bianoris *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 85 [1933], nomen.—Marocc.
densifolia *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 38 (1931).—Santo Domingo.
latisepala *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 230.—Manchur.
modesta *Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. 11. (*Contrib. Cogn. Fl. Mansh.*: *Pl. Nov. Jehol.* 11. ii.) 28 (1935).—Manchur. (Jehol).
Olgae *Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 375 (1932), rossice; *Grossheim in Trud. Azerb. Otdyel. Zakavk. Fil. Akad. Nauk SSSR*, Sect. Bot., i. 55 (1933), latine.—Armen.
Pennelli *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 102.—Hispan.
pluriflora *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 37 (1931).—Santo Domingo.
Tuerckheimii *Urb. l. c.* 38, in obs.: Tuerckheimocharis domingensis.

SCURRULA L. (Loranthac.).
montana *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 441 (1931).—Sumatra; Java; Ins. Sunda.

SCUTELLARIA L. (Labiat.).
alabamensis *Alexander in Small, Man. Southeast. Fl.* 1151 (1933).—U.S.A. (Alabama).
Boissieri *Sosn. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 286 (1932).—Caucas.
Cuthbertii *Alexander in Small, Man. Southeast. Fl.* 1151 (1933).—U.S.A. (Alabama; Georgia).
euboea *K. H. Rechinger in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 10.—Graecia (Ins. Euboea).
icarica *K. H. Rechinger, l. c.* 11.—Graecia (Ins. Nicaria).
inghokensis *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* xii. 593 (1933).—China (Fokien).
kansuensis *Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 76.—China (Kansu).
laeteviolacea *Koidz. in Mayebara, Fl. Austrohig.* 50 (1931); *et in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 23: S. japonica *Koidz. in Bot. Mag., Tokyo*, 1924, xxxviii. 99, non *Morr. & Decne.*
microflora *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 136 (1934).—China (Kwangtung).
orthocalyx *Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 75.—China (Yunnan; Szechuan).
planipes *Nakai & Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. 1. (*Pl. Nov. Jehol.* 1.) 50 (1934).—Manchur. (Jehol).
procumbens *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 52 (1934).—Formosa.
sevanensis *Sosn. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 286 (1932).—Caucas.
sibirica *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 854 (1895), in syn.: S. alpina.
striatella *Gontsch. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 171 (1933).—Ross. asiat. centr.
subcaespitosa *Pavlov in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 19, 33 (1935).—Turkestan. (Mont. Karatau).
Suzukiana *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 298.—Japon.
wulingshanensis *Nakai & Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. 1. (*Pl. Nov. Jehol.* 1.) 53 (1934).—Manchur. (Jehol).

SCYPHOGYNE Brongn. (Ericac.).
Brownii *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 304 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).

SEBAEA Soland. (Gentianac.).
cleistantha *R. A. Dyer in Kew Bull.* 1933, 461.—Afr. austr. (Cape Prov.).

SEBASTIANIA Spreng. (Euphorbiac.).
alpina (*Fawcett & Rendle*) *Pax & K. Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix c. 193 (1931): Dendrocousinia alpina.
longicuspis *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 134 (1932).—Brit. Honduras; Guatem.
sarmentosa *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 49 (1933–5).—Calif. infer.

SEBERTIA Pierre ex Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam., Nachtr. iv. 1. 280 (1897). *SAPOTACEAE.*
acuminata *Pierre ex Engl. & Prantl, l. c.*, nomen.—N. Caled.
calomeris *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1933, lxxviii. Beibl. 19, 359: Chrysophyllum dubium *Panch. & Sebert.*

SEBESTENA Gaertn. (Boraginac.).
Dillenii (*Spreng.*) *Friesen in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1931–2, Sér. II. xxiv. 138 (1933), in obs.: Cordia Dillenii.
linearis (*Hook. f.*) *Friesen, l. c.* 182: Cordia linearis.
revoluta (*Hook. f.*) *Friesen, l. c.* 183: Cordia revoluta.

SEBIPIRA Mart. (Legumin.).
virgilioides (*H. B. & K.*) *Lyons, Plant Names Scientific & Popular*, ed. 2, 105 (1907): Bowdichia virgilioides.

SECALE L. (Gramin.).
ancestrale *Zhuk. Turq. Agric.* (*Part. Asiat.*: *Anatolie*) 274 (1933).—As. Min. (Anatolia).
Kuprijanovi *Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 136 (1928).—Caucas.
turkestanicum *Bensin in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 156.—Turkestan.

SECAMONE R. Br. (Asclepiadac.).
betamponensis *Choux in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 61, 62, in adnot.—Madag.
Humberti *Choux in Arch. Bot., Caen*, Bull. 1930, iv. 107.—Madag.

SECONDATIA A. DC. (Apocynac.).
Duckei *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 338 (1932).—Bras. (Rio Negro).
Macnabii (*Urb.*) *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1932, xix. 385: Orthechites Macnabii.

SECURIDACA L. (Polygalac.).
cristata *A. C. Smith in Phytologia*, i. 20 (1933).—Colomb.
densiflora *Linden & Planch.*; *Sprague in Kew Bull.* 1926, 39.—Colomb.
densiflora *Oort in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 175, non praec.—Guiana Bat.
ecristata *Kassau, Beitr. Syst. Polygal. Gatt. Berück. Vork. Saponin*, 37 (1931); *et in Fedde, Repert.* xxxv. 160 (1934).—N. Guin.
purpurea *Linden & Planch.*; *Sprague in Kew Bull.* 1926, 39.—Venez.
pyramidalis *Sprague, l. c.* 1931, 173.—Guiana Brit.
uniflora *Oort in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 177.—Guiana Bat.

SECURINEGA Comm. (Euphorbiac.).
Guaraiuva *Kuhlm. in Arquiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, i. 241 (1935).—Bras. (S. Paulo).
suffruticosa (*Pall.*) *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 338: Pharnaceum suffruticosum.

SEDDERA Hochst. (Convolvulac.).
gracilis *Chiov. Fl. Somala*, II. 323 (1932).—Somal. Ital.

SEDUM L. (Crassulac.).
acuminatum *R. Hamet in Candollea*, iv. 21 (1929), in obs.—Hab. ?
adenocalyx *Blatter in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxvii. 152 (1934).—Ind. or. (Waziristan).
angustipetalum *Fröderstr. in Acta Hort. Gothoburg.* 1931, vii. App., 116 (1932).—China (Kansu).
austro-manshuricum *Nakai & Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. 1. (*Pl. Nov. Jehol.* 1.) 26 (1934).—Manchur. (Jehol).
barrancae *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 37 (1933–5).—Mexico.

SEDUM:—
×Battandieri *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 48.—Cult.
Boisserianum *Hausskn. ex Fröderstr. in Acta Hort. Gothoburg.* 1931, vii. App., 75 (1932), in syn.: S. rubens.
Bonapartei *R. Hamet ex Fröderstr. l. c.* 1930, vi. App., 52 (1931), in syn.: S. Celiae.
Brandtianum *v. Poelln. in Fedde, Repert.* xxxiii. 241 (1933).—Mexico.
bulbiferum *Makino, Ill. Fl. Jap.* i. No. 10, p. 2 (1891).—Japon.
celatum *Fröderstr. in Acta Hort. Gothoburg.* 1931, vii. App., 114 (1932).—China (Kansu).
concarpum *Fröderstr. in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 122.—China (Yunnan).
correptum *Fröderstr. in Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 409 (1931).—China (Szechuan).
cryptomerioides *H. H. Bartlett & Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 485.—Formosa.
droserifolium *Bellardi ex Colla, Herb. Pedem.* ii. 498 (1834).—Ital.
Duthiei *Fröderstr. in Acta Hort. Gothoburg.* 1930, vi. App., 57 (1931).—Ind. or. (Kumaon).
eupatorioides *Komarov in Komarov & Klob.-Alis. Key Pl. Far East. Reg. USSR*, i. 601 (1931).—Ross. asiat. or.
euryphyllum *Fröderstr. in Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 406 (1931).—China (Yunnan).
formosae *A. Gray ex Fröderstr. in Acta Hort. Gothoburg.* 1930, vi. App., 94 (1931), in syn.: S. Alfredi.
gemmiferum *Woronow ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 227 (1930), in syn.: S. obtusifolium.
Gertrudianum *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 147 (1931).—U.S.A. (Calif.).
guadarramicum *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 97.—Hispan.
hyperaïzoön *Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 201 (1932).—Sibir. (Marit. Prov.).
Jacquemontii *Fröderstr. in Acta Hort. Gothoburg.* 1931, vii. App., 12 (1932).—Himal. occ.
juparense *Fröderstr. in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 123.—E. Tibet.
kiwuense *Herb. ex R. Hamet in Candollea*, iv. 46 (1929), pro syn.: S. ruwenzoriense.
Krajinae *Domin in Preslia*, xiii–xv. 105 (1935), nomen.—Czechoslovak.
leptophyllum *Fröderstr. in Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 412 (1931).—China (Anhwei).
likiangense *Fröderstr. in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 123.—China (Yunnan).
litorale *Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 201 (1932).—Sibir. (Marit. Prov.).
Louisii (*Thiéb. & Gomb.*) *Gomb. in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 595: S. rubrum var. Louisii.
Maireanum *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 43 [1933], nomen.—Marocc.
megalanthum *Fröderstr. in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 124.—China (Szechuan; Yunnan).
Mucizonia (*Ortega*) *Rothmaler in Cavanillesia*, vii. 113 (1935), in obs.: Cotyledon Mucizonia.
Muleyanum *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 147 [1933]: S. album var. purpureum *Maire.*
odontophyllum *Fröderstr. in Acta Hort. Gothoburg.* 1931, vii. App., 117 (1932).—China (Szechuan).
onychopetalum *Fröderstr. in Sinensia*, iii. 199 (1933).—China (Kiangsu).
Paui *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 43 [1933].—Marocc.
Raymondi *Fröderstr. in Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 411 (1931).—China (Yunnan).
rupicola *G. N. Jones in Research Stud. State Coll. Wash.* 1930, ii. 125 (1931).—U.S.A. (Washington).
schizolepis *Fröderstr. in Svensk Bot. Tidskr.* 1935, xxix. 385.—Syria.
Schlagintweitii *Fröderstr. in Acta Hort. Gothoburg.* 1930, vi. App., 28 (1931).—Tibet.
Schrenkii *Fröderstr. l. c.* 1931, vii. App., 22 (1932): Umbilicus affinis.
sedoides (*DC.*) *Rothmaler in Cavanillesia*, vii. 113 (1935): Cotyledon sedoides.

SEDUM:—
semiglabrum *Boiss. & Huet ex Fröderstr. in Acta Hort. Gothoburg.* 1931, vii. App., 82 (1932), in syn.: S. hispanicum var. semiglabrum *Fröderstr.*
stenostachyum *Fröderstr. l. c.* 113.—China (Kansu).
sublineare *Fröderstr. l. c.* 36, in obs.: S. lineare *Pau.*
tetractinum *Fröderstr. l. c.* 1930, vi. App., 103 (1931); *et ex Hand.-Mazz. in Beih. Bot. Centralbl.* xlviii. II. 311 (1931).—China (Kwangtung).
timidum *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 43 [1933], nomen.—Marocc.
Tsiangii *Fröderstr. in Sinensia*, iii. 199 (1933).—China (Kweichau).
tuberiferum *Stoyanoff & Stefanoff in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1013 (1934).—Bulgar.
vermiculifolium *P. Fourn. in Le Monde des Plantes*, 1935, xxxvi. 11.—Gallia.
vigilimontis *Small, Man. Southeast. Fl.* 587 (1933). —U.S.A. (Georgia).
Viguieri *R. Hamet ex Fröderstr. in Acta Hort. Gothoburg.* 1930, vi. App., 27 (1931).—Baluchistan; Kashmir.
vogesiacum *Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* iv. 54 [1920].—Gallia.
yezoënse *Miyabe & Tatewaki in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.* xiii. 379 (1934).—Japon. (Yezo).
Yvesianum *R. Hamet in Fedde, Repert.* viii. 28 (1910), in obs.—China (Szechuan).
Zollikoferi *F. Hermann & Stefanoff in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 563 (1935).—Bulgar.

SEEMANNARALIA R. Viguier; R. A. Dyer in Kew Bull. 1932, 447, descr. ampl. *ARALIACEAE.*
Gerrardii (*Seem.*) *R. Viguier*; *R. A. Dyer, l. c.* 448, cum descr. ampl.: Cussonia Gerrardii.

SEGETELLA Desv. Journ. de Bot. iii. [No. 5] 225 [1816]. *CARYOPHYLLACEAE.*
vulgaris *Desv. l. c.*: Alsine segetalis.

SELAGO L. (Scrophulariac.; Selaginac., Gen. Pl.).
innata *Markötter in Ann. Univ. Stellenb.* 1930, viii. Sect. A, No. 1, 39 (1930).—Orange Free State.

SELENIA Nutt. (Crucif.).
Jonesii *Cory in Rhodora*, 1931, xxxiii. 142.—U.S.A. (Texas).

SELENICEREUS Britton & Rose (Cactac.).
Grusonianus (*Weing.*) *A. Berger, Kakteen*, 116, 346 (1929): Cereus Grusonianus.
pseudo-spinulosus *Weing. in Monatsschr. Deutsch. Kakt.-Ges.* 1931, iii. 255, in obs.: S. spinulosus *Britton & Rose, Cactac.* ii. 207 (1920), non *Britton & Rose* (1909).
Rothii (*Weing.*) *A. Berger, Kakteen*, 116, 346 (1929): Cereus Rothii.

SELINUM L. (Umbellif.).
Bellardi *Balb. Hort. Acad. Taur. Stirp. Ic. & Descr.* 24 (1810), in adnot.—Hort.
striatum (*Wall.*) *Benth. ex C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 699 (1879): Laserpitium striatum.

SEMECARPUS L. f. (Anacardiac.).
intermedius *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 62 (1931).—Zeylan.
Kraemeri *Lauterb. in Engl. Jahrb.* lvi. 521 (1921), in obs.; *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 485, descr. ampl.—Ins. Carolin. (Truk).
lanceolatus *Ridley in Kew Bull.* 1933, 199, 491.—Borneo.
ochraceus *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 62 (1931).—Zeylan.
rufo-velutinus *Ridley in Kew Bull.* 1933, 199.—Borneo.
tannaënsis *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 242.—N. Hebrides.
thyrsoideus *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3179 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
trukkensis *Kanehira in Tropical Woods*, 1932, No. 29, 5, in obs., nomen.—Ins. Carolin. (Truk).

SEMEIOCARDIUM Zoll.; Backer in Gard. Bull. Straits Settlements, ix. 71 (1935), descr. emend. *BALSAMINACEAE.*
Arriensii *Zoll.*; *Backer, l. c.* 72, descr. emend.—Ins. Sunda (Madura).

SEMIAQUILEGIA Makino (Ranunculac.).
Rockii (*Ulbr.*) *Hutchinson in Bot. Mag.* sub t. 9382 (1935), in obs.: Urophysa Rockii.

SEMIARUNDINARIA Makino (Gramin.).
elegantissima *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 21.—Japon.
Okuboi *Makino in Journ. Jap. Bot.* viii. 45 (1933). —Japon.

SEMIPHAJUS Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 1932, Sér. II. iv. 598. *ORCHIDACEAE.*
Chevalieri *Gagnep. l. c.*—Indo-China (Anam).
Evrardi *Gagnep. l. c.* 599.—Indo-China (Anam).

SEMIRAMISIA Klotzsch (Ericac.; Vacciniac., Gen. Pl.).
fragilis *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 112.—Ecuador.

SEMPERVIVUM L. (Crassulac.).
Allobrogorum *Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1930, Sér. II. xxii. 448 (1931).—Gallia.
Ballii *Hort. ex Praeger, Sempervivum*, 55 (1932), in syn.: S. erythraeum.
cantabricum *Hort. ex Praeger, l. c.* 255, nomen; *J. A. Huber in Fedde, Repert.* xxxiii. 364 (1934), descr.—Hispan.
disciforme *DC. ex Praeger, Sempervivum*, 147 (1932), pro syn., in adnot.: Aeonium tabuliforme.
hispidulum *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 299 (1894), in syn.: S. montanum *L.*
juratum *Nicholson, Ill. Dict. Gard.* iii. 418 (1886), nomen.—Hab. ?
×lineatum *A. Berger ex Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.* xxxviii. Sect. B, 10 (1928).—Hort.
×lineatum *N. E. Brown ex Praeger, l. c.*, an praec. —Hort.
×Michaelis-Borsii *Domkokos in Bull. Roy. Hungar. Hort. Coll.* i. 28 (1935).—Transylv.
Preissianum *Domin in Bull. Internat. Acad. Sc., Prague*, 1932, xxxiii. 126.—Czechoslovak.
propinquum *Praeger, Sempervivum*, 136 (1932), in adnot.: S. Christii *Praeger.*
tatrense *Domin in Bull. Internat. Acad. Sc., Prague*, 1932, xxxiii. 127.—Carpath.

SENAEA Taub. (Gentianac.).
janeirensis *Brade in Arch. Mus. Nac. Rio de Janeiro*, 1932, xxxiv. 118.—Bras. (Rio de Janeiro).

SENECIO L. (Compos.).
achalensis *Cabrera in Not. Mus. La Plata*, Bot., i. 92 (1935).—Argent.
addoënsis *Compton in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 48.—Afr. austr. (Cape Prov.).
adenocalyx *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 96 (1932). —Great Namaq.
alboranicus *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1933, xxiv. 29, in obs., 218.—Mediterr. (Ins. Alboran).
Almagroi *Cuatrec. in An. Univ. Madrid*, iv. Fasc. 2, 238 (1935).—Ecuador.
amblyphyllus (amblyophyllus) *Cotton in Kew Bull.* 1932, 473; *Bullock in Kew Bull.* 1933, 86, in adnot.—Afr. trop. or. (Elgon).
andohahelensis *Humbert in Bull. Soc. Bot. France*, 1930, lxxvii. 690 (1931).—Madag.
angustatus (*T. Kirk*) *Cockayne & Sledge in Journ. Linn. Soc., Bot.* xlix. 128 (1932): S. bellidioides var. angustatus.
angustifolius *Hayata in Gen. Ind. Fl. Formos.* 40 (1917); cf. *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1262 (1931), japonice.—Japon.
Antaisaka *Humbert in Bull. Soc. Bot. France*, 1930, lxxvii. 690 (1931).—Madag.
Antambolorum *Humbert, l. c.* 691.—Madag.
Arnottii *Hook. f. Fl. Antarct.* 314 (1847): S. limbardioides *Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. 347 (1841), non *Hook. & Arn. l. c.* 333.
baoulensis *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 260 (1917).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
barahonensis *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 91 (1931).—Santo Domingo.
bellioides *Chiov. Fl. Somala*, II. 272 (1932).—Somal. Ital.
Burkartii *Cabrera in Not. Prelim. Mus. La Plata*, iii. 111 (1934).—Argent.
Buschianus *Sosn. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 150 (1934).—Caucas.
calceiflorus *Cabrera in Not. Prelim. Mus. La Plata*, iii. 114 (1934): S. albiflorus *R. Phil.*

SENECIO:—
calocephalus *Chang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 48 (1935).—Upper Burma; Yunnan.
carnifolius *Cabrera in Not. Prelim. Mus. La Plata*, iii. 114 (1934): S. Schultzii *Wedd.*
carnosulifolius *S. Moore in Journ. Bot.* 1932, lxx. 74.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Caroli-Tertii *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 27, Cuadro 13 (1934), nomen; *et l. c.* No. 29, p. 38 (1935), descr.—Colomb.
cernuiflorus *Cabrera in Not. Prelim. Mus. La Plata*, iii. 114 (1934): S. cernuus *R. Phil.*
chanaralensis *R. Phil. in Verh. Deutsch. Wiss. Ver. Santiago (Chile)*, ii. 107 (1890), nomen; *et in An. Univ. Chile*, lxxxviii. 265 (1894), descr.—Chile.
chrysanthemoides *R. Phil. l. c.*, nomen; *et l. c.* 269, descr.—Chile.
citrinus (*DC.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 522 (1894): Emilia citrina.
conchocladus *Hort. ex Cactus Journ.* ii. 51 (1934), in obs., nomen.—Hab. ?
coriaceisquamus *Chang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 50 (1935).—China (Yunnan).
cremeiflorus *Mattf. in Ostenia*, 323 (1933), in clavi. —Argent.
densiserratus *Chang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 56 (1935).—China (Szechuan).
deserticola *Cabrera in Not. Prelim. Mus. La Plata*, iii. 115 (1934): S. eremophilus *R. Phil.*
Diaguita *Cabrera in Not. Mus. La Plata*, Bot., i. 94 (1935).—Argent.
disparifolius *Cabrera in Not. Prelim. Mus. La Plata*, iii. 116 (1934): S. diversifolius *R. Phil.*
dissidens *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 87 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
dumosus *Fourc. l. c.* 88.—Afr. austr. (Cape Prov.).
erioneuron *Cotton in Kew Bull.* 1932, 438.—Afr. trop. or. (Ruwenzori).
famatinensis *Cabrera in Not. Mus. La Plata*, Bot., i. 97 (1935).—Argent.
formosanus *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 140.—Formosa.
Friesii *Cabrera in Not. Mus. La Plata*, Bot., i. 19 (1935).—Argent.
Gardneri *Cotton in Kew Bull.* 1932, 471.—Afr. trop. or. (Elgon).
grossidens *Dusén ex Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 101 (1933).—Bras. (Paraná).
Gruenerii *Cabrera in Not. Prelim. Mus. La Plata*, iii. 116 (1934).—Argent.
Hemmendorffii *Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 106 (1933).—Bras. (Paraná).
Herreianus *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 180 (1932).—Great Namaq.
hesperidum *Jahandiez, Maire & Weiller in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 297.—Afr. bor.
heteromorphus *Hutchinson & B. L. Burtt in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiii. 42 (1932).—Congo Belg.
hirtus *Cabrera in Not. Prelim. Mus. La Plata*, iii. 119 (1934): S. crispus *R. Phil.*
Hollermayerii *Cabrera, l. c.*: S. vulcanicus *R. Phil.*
hotteanus *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 93 (1931).—Haiti.
indicus *Backer ex K. Heyne, Nutt. Pl. Ned.-Ind.* iv. 250 (1917): Notonia grandiflora.
Isernii *Cuatrec. in An. Univ. Madrid*, iv. Fasc. 2, 240 (1935).—Peruv.
joppensis *Dinsm. in Post, Fl. Syria, Palest. & Sinai*, ed. 2, ii. (*Publ. Am. Univ. Beirut*, Nat. Sc. Ser. No. 1) 69 (1933); *et in Fedde, Repert.* xxxiii. 109 (1933): S. vernalis var. carnosus *Post.*
Juergensii *Mattf. in Ostenia*, 322 (1933), in clavi. —Bras. (Rio Grande do Sul).
kahuzicus *Humbert in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 842 (1935).—Congo Belg.
karataviensis *Lipschitz in Sovietsk. Bot.* 1934, No. 1, 29, in obs.—Turkestan.
kebdanicus *Maire & Sennen in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1935, xxvi. 213.—Marocc.
klinghardtianus *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 95 (1932): Othonna pusilla.
kryophilus *Woronow ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 146 (1934), in syn.: S. glacialis.

SENECIO:—
kubensis *Grossheim in Trud. Azerb. Otdyel. Zakavk. Fil. Akad. Nauk SSSR*, Sect. Bot., i. 59 (1933). —Transcaucas.
Kuekenthalii *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 92 (1931).—Haiti.
Langei *Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 102 (1933).—Bras. (Paraná).
lanosissimus *Cabrera in Not. Mus. La Plata*, Bot., i. 102 (1935).—Argent.
leucanthothamnus *Humbert in Bull. Soc. Bot. France*, 1930, lxxvii. 691 (1931).—Madag.
lichtensteinensis *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 92 (1932).—Hereroland.
limosus *Dusén ex Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 103 (1933).—Bras. (Paraná).
litorosus *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 88 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
lombokensis *Koster in Fedde, Repert.* xxxiv. 27 (1933).—Ins. Sunda (Lombok).
longipedunculatus *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 167 (1931), in obs., nomen; *et l. c.* xxx. 93 (1932). —Great Namaq.
Lugardae *Bullock in Kew Bull.* 1932, 499.—Afr. trop. or. (Elgon).
mandrarensis *Humbert in Bull. Soc. Bot. France*, 1930, lxxvii. 692 (1931).—Madag.
marcianus *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 93 (1931).—Haiti.
melanocalyx *Cuatrec. in An. Univ. Madrid*, iv. Fasc. 2, 242 (1935).—Peruv.
mesembrynus *Cabrera in Not. Prelim. Mus. La Plata*, iii. 119 (1934): S. Bakeri *Reiche*.
Mimetes *Hutchinson & R. A. Dyer in Kew Bull.* 1934, 266.—Afr. austr. (Cape Prov.).
missionum *Cabrera in Not. Mus. La Plata*, Bot., i. 24 (1935).—Argent.
multilobus *Chang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 53 (1935).—China (Yunnan).
Mutisii *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 27, Cuadro 12 (1934), nomen; *et l. c.* No. 29, p. 40 (1935), descr.—Colomb.
Niederleinii *Cabrera in Not. Mus. La Plata*, Bot., i. 104 (1935).—Argent.
nodiflorus *Chang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 54 (1935).—China (Yunnan).
oreinus *Cabrera in Not. Prelim. Mus. La Plata*, iii. 119 (1934): S. andicola *R. Phil.*
Ostenii *Mattf. in Ostenia*, 325 (1933).—Urug.
othonniformis *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 89 (1932): S. paucifolius *DC.*
paraguariensis *Mattf. in Ostenia*, 322 (1933), in clavi.—Parag.; Argent.
paramensis *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 27, Cuadro 22 (1934), nomen.—Colomb.
paranensis *Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 105 (1933).—Bras. (Paraná).
Parodii *Cabrera in Not. Mus. La Plata*, Bot., i. 28 (1935).—Argent.
Pavlovii *Lipschitz in Fedde, Repert.* xxix. 162 (1931).—Turkestan. Ross.
peculiaris *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 94 (1932). —Great Namaq.
petiolatus *Cotton ex Hauman in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxviii. 54 (1935).—Uganda.
phanerandrus *Cufod. in Archiv. Bot., Forlì*, 1933, ix. 103.—Costa Rica.
phonolithicus *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 94 (1932).—Great Namaq.
pluricephalus *Cabrera in Not. Prelim. Mus. La Plata*, iii. 119 (1934): S. myriocephalus *Baker.*
psammoecus *Cabrera, l. c.*: S. psammophilus *R. Phil.*
pseudo-alatus *Chang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 57 (1935).—Upper Burma.
pseudoracemosus *Grossheim in Trud. Azerb. Otdyel. Zakavk. Fil. Akad. Nauk SSSR*, Sect. Bot., i. 60 (1933).—Caucas.
pusillus *Dinter ex Range in Fedde, Repert.* xxxix. 58 (1935).—Namaqualand.
rapae *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 361 (1935).—Polynes. (Ins. Rapa).
riojanus *Cabrera in Not. Mus. La Plata*, Bot., i. 106 (1935).—Argent.

SENECIO:—
rosuliferus *Chang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 58 (1935).—China (Szechuan).
saxosus *Klatt in Ann. Naturhist. Hofmus., Wien*, 1894, ix. 366, in obs.: S. petraeus *Klatt.*
septilobus *Chang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 59 (1935).—China (Szechuan).
Shelkovnikovi *Grossheim in Trud. Azerb. Otdyel. Zakavk. Fil. Akad. Nauk SSSR*, Sect. Bot., i. 60 (1933), in syn.: S. thyrsophorus.
simulans *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 70 (1935).—Kenya Col.
Sinforosii *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 27, Cuadro 5 (1934), nomen.—Colomb.
Solanderi *Allan in Trans. & Proc. Roy. Soc. N. Z.* lxv. 229 (1935): S. latifolius *Banks & Soland. ex Hook. f.*
Stanleyi *Hauman in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxviii. 52 (1935).—Uganda.
Stokesii *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 363 (1935).—Polynes. (Ins. Rapa).
stolonifer *Cufod. in Fedde, Repert. Beih.* lxx. 100 (1933).—China (Szechuan; Yunnan).
subcanescens (*DC.*) *Compton in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 49: S. variifolius var. subcanescens.
subdentatus (*Bunge*) *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1837, x. No. 7, 154; *Cufod. in Fedde, Repert. Beih.* lxx. 78 (1933), cum descr. ampl.: Cineraria subdentata.
Takedanus *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 47: S. flammeus var. alpinus *Takeda.*
trinervius *Chang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 60 (1935).—China (Yunnan).
ventanensis *Cabrera in Not. Prelim. Mus. La Plata*, iii. 120 (1934).—Argent.
Versteegii *Mattf. in Nova Guinea*, xiv. 529 (1932). —N. Guin.
Vidali *R. Phil. in Verh. Deutsch. Wiss. Ver. Santiago (Chile)*, ii. 107 (1890), nomen; *et in An. Univ. Chile*, lxxxviii. 18 (1894), descr.—Chile.
viminalis *Bremek. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 263 (1933).—Transvaal.
Weddellii *Cabrera in Not. Prelim. Mus. La Plata*, iii. 122 (1934): S. erosus *Wedd.*

SENEGALIA Rafin. (Legumin.).
podadenia *Britton & Killip in Phytologia*, i. 24 (1933).—Colomb.

SENISETUM Honda in Bot. Mag., Tokyo, 1932, xlvi. 371. *GRAMINEAE.*
Hideoi (*Ohwi*) *Honda, l. c.*: Agrostis Hideoi.

SENNIA Chiov. Fl. Somala, II. 145 (1932). *SAPINDACEAE.*
Sciap-sciaple *Chiov. l. c.* 146.—Somal. Ital.

SERAPHYTA Fisch. & Mey. (Orchidac.).
diffusa (*Sw.*) *Pfitz. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ii. VI. 142 (1889); *Fawcett & Rendle, Fl. Jamaica*, i. 81 (1910): Epidendrum diffusum.

SERAPIAS L. (Orchidac.).
Basilei *Sennen in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xv. Ser. Bot. No. 1, 35 (1931), in obs., nomen. —Hispan.
×fallax *Soó in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 99 (1931).—Graecia.
×Halacsyana *Soó, l. c.* 97.—Graecia.
×Hildae-Margaritae *G. Keller in Fedde, Repert. Sonderbeih.* A. ii. 97 (1931).—Ital.
×sitiae *Renz in Fedde, Repert.* xxx. 112 (1932).—Creta.

SERICOCARPUS Nees (Compos.).
Sipei *L. F. Henderson in Madroña*, ii. 105 (1933). —U.S.A. (Oregon).

SERICOLEA Schlechter (Tiliac.).
calophylla (*Ridley*) *Schlechter in Engl. Jahrb.* lv. 194 (1918), in obs.: Pyrsonota calophylla.
papuana (*F. Muell.*) *v. Steenis in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 203 (1934): Aristotelia papuana.

SERICOSTOMA Stocks (Boraginac.).
arenarium (*Vatke*) *I. M. Johnston in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcii. 92 (1930): Heliotropium arenarium.
calcareum (*Vatke*) *I. M. Johnston, l. c.*: Heliotropium calcareum.

SERIOLA L. (Compos.).
scapigera *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 70 [1933], nomen.—Marocc.

SERIS Less. (Compos.).
rupestris *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 8, 55 (1932).—Bras. (Matto Grosso).

SERJANIA Mill. (Sapindac.).
australis (*A. St.-Hil.*) *Herter, Fl. Urug. Pl. Vasc.* (*Estud. Bot. Reg. Urug.* iv.) 83 (1931): Paullinia australis.
elongata *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 28 (1931).—Peruv.
lyrata *Rusby in Phytologia*, i. 64 (1934).—Boliv.
papilio *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 64 (1933–5).—Mexico.
pterarthra *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 70 (1935).—Mexico.
tridentata *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 89 (1931), in obs.—Hab. ?

SERPICULA L. (Haloragac.).
numidica *Durieu ex Schindler in Engl. Pflanzenreich, Halorrhagac.* 74 (1905), in syn.: Laurembergia tetrandra.

SERRAEA Spreng. (Malvac.).
arabica (*Hochst. & Steud.*) *Mattei in Boll. Ort. Bot. Palermo*, n. s. ii. 67 (1917): Dumreichera arabica.
nubica (*Webb*) *Mattei, l. c.* 66: Senra nubica.
Zoeae (*Volkens & Schweinf.*) *Mattei, l. c.* 68: Senra Zoës.

SERRATULA L. (Compos.).
algida *Iljin in Fedde, Repert.* xxxv. 357 (1934).— Ross. asiat.
alpina (*Gren. & Godr.*) *Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* vi. 49 [1923]: S. tinctoria var. alpina.
aphyllopoda *Iljin in Fedde, Repert.* xxxv. 359 (1934).—Turkestan. (Thian Shan).
bulgarica *Achtaroff & Stoyanoff in Bull. Soc. Bot. Bulgar.* v. 111 (1932).—Bulgar.
cupuliformis *Nakai & Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. 1. (*Pl. Nov. Jehol.* 1.) 66 (1934).—Manchur. (Jehol).
diabolica *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 151.—Manchur.; Japon.
dshungarica *Iljin in Fedde, Repert.* xxxv. 357 (1934).—Ross. asiat.
hastifolia *Korovin & Kult. ex Iljin, l. c.* 360.— Turkestan. (Thian Shan).
hsinganensis *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 910.—Manchur.
Ibrahimi *Iljin in Fedde, Repert.* xxxv. 355 (1934). —Marocc.
kirghisorum *Iljin, l. c.* 358.—Ross. asiat.
Mairei *Iljin, l. c.* 354.—Alger.
manshurica *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 229.—Manchur.
mongolicola *Kitagawa, l. c.* 1934, xlviii. 913.— Manchur.
neglecta *Iljin in Fedde, Repert.* xxxv. 353 (1934).— Hispan.
Nishimurana *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 912.—Manchur.
ortholepis *Kitagawa, l. c.* 914.—Manchur.; Shantung.
palmatopinnatifida (*Makino*) *Kitamura, Compos. Nov. Jap.* 28 (1931): S. deltoidea var. palmatopinnatifida.
Paueana *Iljin in Fedde, Repert.* xxxv. 354 (1934).— Hispan.
transcaucasica (*Bornm.*) *Sosn. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 194 (1934).—Caucas.
Yamatsutana *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 911.—Manchur.

SERRURIA Salisb. (Proteac.).
rosea *Phillips in Fl. Pl. S. Afr.* 1933, xiii. t. 482. —Afr. austr. (Cape Prov.).

SERSALISIA R. Br. (Sapotac.).
djalonensis (*A. Cheval.*) *Aubrév. & Pellegr. in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 798 (1935): Bakerisideroxylon djalonense.
jacquiniifolia *Baill. ex Dubard in Ann. Mus. Col. Marseille*, 1912, Sér. II. x. 52, in syn.: Planchonella jacquiniifolia.

SERSALISIA:—
micrantha (*A. Cheval.*) *Aubrév. & Pellegr. in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 798 (1935): Mimusops micrantha.

SERTUERNERA Mart. (Amaranthac.).
meridensis *Klotzsch ex Suesseng. in Fedde, Repert.* xxxv. 334 (1934), in syn.: Pfaffia meridensis.

SESAMOTHAMNUS Welw. (Pedaliac.).
Seineri *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* ii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 586 (1910), in obs. —Kalahari.

SESAMUM L. (Pedaliac.).
gibbosum *Bremek. & Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xvi. 434 (1935).—Bechuanaland Protect.
somalense *Chiov. Fl. Somala*, II. 343 (1932).—Somal. Ital.

SESBANIA Scop. (Legumin.).
arborescens *Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl.* iv. 1276 (1835).—Ind. or.
marchionica *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 109 (1935).—Ins. Marquesas.
Martii *Colla, Herb. Pedem.* ii. 160 (1834).—Bras.
rostrata *Bremek. & Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xvi. 419 (1935).—Bechuanaland Protect.
speciosa (*Soland. ex Seem.*) *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 110 (1935): Aeschynomene speciosa.

SESELI L. (Umbellif.).
Chabraei *Pourr. ex Guétrot in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 437, in obs.—Pyren.
leptocladum *Woronow in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 219 (1933).—Armen. Ross.
Peixoteanum *G. Sampaio in Ann. Sc. Nat. Porto*, x. 36 (1906).—Lusitan.
ugoënse *Koidz. in Muramatsu, Fl. Akit.* 5 (1932); *et in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 25.—Japon. (Hondo).
Vayredanum *Font Quer in Rev. d'Olot*, i. No. 11, p. 3 (1926); cf. *Sched. Fl. Iber. Select.* Cent. I. No. 62 (1934).—Hispan.

SESLERIA Scop. (Gramin.).
orbelica (*Velen.*) *Hayek in Fedde, Repert. Beih.* xxx. III. 237 (1932): S. phleoides var. orbelica.
×tatrorum *Domin in Preslia*, xiii–xv. 38 (1935).—Czechoslovak.

SESSEA Ruiz & Pav. (Solanac.).
acuminata *Francey in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 988 (1934).—Colomb.
andina *Francey, l. c.* 987.—Ecuador.
colombiana *Francey, l. c.* 989.—Colomb.
confertiflora *Francey, l. c.* xi. 880 (1933).—Peruv.
dependens *Ruiz & Pav.*; *Francey, l. c.* 879, descr. ampl.—Peruv.; Boliv.
discolor *Francey, l. c.* xi. 985 (1934).—Peruv.
elliptica *Francey, l. c.* 983.—Colomb.
farinosa (*Urb. & Ekman*) *Francey, l. c.* xi. 882 (1933): Cestrum farinosum.
macrophylla *Francey, l. c.* 881.—Ecuador.
multinervia *Francey, l. c.* xi. 986 (1934).—Ecuador.
pedicellata *Francey, l. c.* xi. 882 (1933).—Peruv.
suaveolens (*Rusby*) *Francey, l. c.* xi. 984 (1934): Cestrum suaveolens.

SETARIA Beauv. (Gramin.).
Bequaertii *Robyns in Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. 190 (1932).—Congo Belg.
bongaënsis (*Pilger*) *Mez in Wiss. Ergebn. Deutsch.-Zentr.-Afr. Exped. 1910–11*, ii. 20 (1922), in obs.: Panicum bongaënse.
Braunii *Mez ex Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. 1. 235 (1931), nomen.—Tanganyika Terr.
depressa *Honda in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. II. (*Contrib. Cogn. Fl. Mansh.: Pl. Nov. Jehol.* II. i.) 11 (1935).—Manchur. (Jehol).
Matsumurae *Herrm. ex Keng in Nat. Centr. Univ. Sc. Rep., Nanking*, Ser. B, Biol. Sc., i. No. 2, 65 (1930), in syn.: Chaetochloa Matsumurae.
Nakaiana (*Honda*) *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 32: Panicum Nakaianum.
pennata *Mez ex Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. 1. 235 (1931), nomen.—Tanganyika Terr.
sulcata (*Aubl.*) *Desv. in Mém. Soc. Agric. Angers*, i. 184 (1831): Panicum sulcatum.

SETARIOPSIS Scribn. (Gramin.).
glauca (*L.*) *G. Sampaio, Herb. Portug., Seg. Apênd. List. Espéc.* 4 (1914): Panicum glaucum.
italica (*L.*) *G. Sampaio in An. Fac. Sc. Porto*, xix. 69 (1934), in obs.: Panicum italicum.
verticillata (*L.*) *G. Sampaio, Herb. Portug., Seg. Apênd. List. Espéc.* 4 (1914): Panicum verticillatum.
viridis (*L.*) *G. Sampaio, l. c.*: Panicum viride.

SEYMERIA Pursh (Scrophulariac.).
Havardii (*Pennell*) *Pennell in Acad. Nat. Sc. Philad.* Monogr. 1, *Scroph.* 408 (1935): Afzelia Havardii.
texana (*A. Gray*) *Pennell, l. c.* 409: S. bipinnatisecta var. texana.

SHERARDIA L. (Rubiac.).
foetida *Lam. Tabl. Encycl. & Méth.*, Bot. i. 267 (1791).—Ital.; Reg. Mediterr. or.

SHIBATAEA Makino (Gramin.).
chinensis *Nakai in Journ. Jap. Bot.* ix. 81, 85 (1933).—China (Kiangsu).
Kumasaca (*Zoll. ex Steud.*) *Nakai, l. c.* 78, 83: Bambusa Kumasaca.

SHIIA Makino (Fagac.).
Carlesii (*Hemsl.*) *Kudo in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1931, iii. 17: Quercus Carlesii.
fissa (*Champ.*) *Kudo, l. c.*: Quercus fissa.

SHOREA Roxb. (Dipterocarpac.).
albida *Symington ex A. V. Thomas in Mal. For.* 1934, iii. 147, in obs., nomen; *Symington in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 283 (1935), descr. —Borneo.
angustiloba *Foxworthy in Malayan Forest Records*, No. 10, 168 (1932).—Penins. Mal.
astrosticta *Scortech. ex Foxworthy, l. c.* 220, in syn.: S. leprosula.
auriculata *Scortech. ex Foxworthy, l. c.* 195, in syn.: S. macroptera.
bentongensis *Foxworthy, l. c.* 169.—Penins. Mal.
blumutensis *Foxworthy, l. c.* 236.—Penins. Mal.
dasyphylla *Foxworthy, l. c.* 224.—Penins. Mal.
dasyrrhachis *v. Slooten ex Endert in Tectona*, 1935, xxviii. 295.—Borneo.
dealbata *Foxworthy in Malayan Forest Records*, No. 10, 192 (1932).—Penins. Mal.
foveolata *Scortech. ex Foxworthy, l. c.* 183, in syn.: S. bracteolata.
Foxworthyi *Symington in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 272 (1935).—Penins. Mal.
gentilis *Parijs in Fedde, Repert.* xxxiii. 244 (1933). —Borneo.
Hemsleyana *King ex Foxworthy in Malayan Forest Records*, No. 10, 167 (1932).—Penins. Mal.
hopeifolia (*Heim*) *Symington in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 150 (1933), cum descr. ampl.: Cotylelobium hopeifolium.
inaequilateralis *Symington, l. c.* viii. 281 (1935).— Borneo.
johorensis *Foxworthy in Malayan Forest Records*, No. 10, 236 (1932).—Penins. Mal.
laevifolia (*Parijs*) *Endert in Tectona*, 1935, xxviii. 292: Hopea laevifolia.
lamellata *Foxworthy in Malayan Forest Records*, No. 10, 278 (1932).—Penins. Mal.
longipetala *Foxworthy, l. c.* 174.—Penins. Mal.
macrantha *Brandis*; *Symington in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 131 (1933), descr. ampl. —Penins. Mal.; Borneo.
Maxwelliana *King*; *Symington, l. c.* 146, descr. ampl.—Penins. Mal.; Borneo.
megistocarpa *Foxworthy in Malayan Forest Records*, No. 10, 216 (1932).—Penins. Mal.
ochracea *Symington in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 285 (1935).—Borneo.
ochrophloia *Strugnell ex Desch in Mal. For.* 1935, iv. 28, in obs., nomen; *Symington in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 268 (1935), descr.— Penins. Mal.
pahangensis *Foxworthy in Malayan Forest Records*, No. 10, 193 (1932).—Penins. Mal.
paludosa *Foxworthy, l. c.* 277.—Penins. Mal.
platyclados *v. Slooten ex Endert, Midd.-Oost-Borneo Exped. 1925*, 261, 267 (1927); *Foxworthy in Malayan Forest Records*, No. 10, 214 (1932). —Penins. Mal.; Sumatra; Borneo.
resina-nigra *Foxworthy, l. c.* 205.—Penins. Mal.

SHOREA:—
resinosa *Foxworthy in Malayan Forest Records*, No. 10, 234 (1932).—Penins. Mal.
scabrida *Symington in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 287 (1935).—Borneo.
uliginosa *Foxworthy in Malayan Forest Records*, No. 10, 210, 277 (1932).—Penins. Mal.
Vandekoppeli *Parijs in Fedde, Repert.* xxxiii. 244 (1933).—Sumatra.
virescens *Parijs, l. c.*—Borneo.

SHORTIA Torr. & Gray (Diapensiac.).
Davidi *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., Paris*, Sér. II. x. t. 13, fig. B (1887–8), sphalm.: S. thibetica.
magna (*Makino*) *Makino in Journ. Jap. Bot.* viii. 44 (1933): S. soldanelloides var. magna.
thibetica (*Decne.*) *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., Paris*, Sér. II. x. 54 (1887–8): Berneuxia thibetica.
yakusimensis *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 193.—Japon.

SHUTERIA Wight & Arn. (Legumin.).
anomala *Pampan. in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* n. s. xvii. 29 (1910).—China (Yunnan).
Pampaniniana *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 579 (1933): S. vestita var. villosa *Pampan.*

SIBBALDIA L. (Rosac.).
melinotricha *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 521 (1933).—China (Yunnan).
perpusilloides (*W. W. Smith*) *Hand.-Mazz. l. c.* 520: Potentilla perpusilloides.

SIBIRAEA Maxim. (Rosac.).
angustata (*Rehder*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 454 (1933): S. laevigata var. angustata.

SIBTHORPIA L. (Scrophulariac.).
australis *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 221 (1931).—Cameroons; Fernando Po.
triandra *Suesseng. in Fedde, Repert.* xxxix. 18 (1935).—Costa Rica.

SICKINGIA Willd. (Rubiac.).
catappifolia *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., vii. 279 (1931).—Boliv.
fragrans (*Rusby*) *Standley, l. c.*: Flexanthera fragrans.
paraguayensis *Standley, l. c.* viii. 340 (1931).— Parag.
Sampaioana *Standley in Tropical Woods*, 1931, No. 27, 12.—Bras. (Rio de Janeiro).
Williamsii *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 340 (1931).—Peruv.

SICYOS L. (Cucurbitac.).
Hillebrandii *St. John in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu*, x. No. 12, 7 (1934): S. laciniatus *Hillebr.*
urolobus *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 775 (1933).—Peruv.

SIDA L. (Malvac.).
capituliflora *Colla, Herb. Pedem.* i. 417 (1833).— Bras.
Leopoldii *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 134 (1894), in syn.: Abutilon megapotamicum.
mexicana *Colla, Herb. Pedem.* i. 418 (1833).—Hab.?
mutica *Delile, Descr. Égypte, Hist. Nat.* ii. (*Fl. Égypt. Illustr.*) 68 (1812).—Nubia.
nemorensis *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 416 (1833).—Bras.
nesogena *I. M. Johnston in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 76 (1931).—Mexico (Arch. Revillagigedo).
obsita *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 416 (1833), in obs.—Bras.
pilosella *Arwidsson in Bot. Notiser*, 1934, 94.— Rhodesia.
Pritzelii *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 78 (1931): S. cardiophylla *E. Pritz.*
rajoides *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 58, 59 (1933–5).—Calif. infer.
setosa *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 416 (1833), in obs.—Bras.
stenopetala *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 58 (1933–5).—Mexico.
subsessilis *Colla, Herb. Pedem.* i. 417 (1833).—Bras.

SIDA:—
subspicata *Colla, Herb. Pedem.* i. 417 (1833).—Hab.?
tomentosa *Mart. ex Colla, l. c.* 416, in obs.—Bras.
Tulla *Ulbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 534 (1932).—Peruv.
Woronowii *Ulbr. l. c.* 536.—Mexico.

SIDALCEA A. Gray (Malvac.).
robusta *A. A. Heller in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1931, xviii. 205.—U.S.A. (Calif.).

SIDERITIS L. (Labiat.).
aculeata (*Bubani*) *Font Quer in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1924, xxiv. 31, in obs.: Frascatora aculeata.
amasiaca *Bornm. in Magyar Bot. Lap.* 1932, xxxi. 137.—As. Min. (Galatia).
× Arasae *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1932, xxxi. 113 (1934), in obs.—Hispan.
armeniaca *Bornm. in Magyar Bot. Lap.* 1932, xxxi. 136.—Armen.
× biscaina *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1932, xxxi. 58, in obs.—Hispan.
brevispica *Sennen & Elias, l. c.* 1932, xxxi. 115 (1934).—Hispan.
× Cadevallii *Font Quer in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, v. Ser. Bot. No. 3, 218 (1920).—Hispan.
cantabrica *Sennen & Elias in Bol. Soc. Ibér.* 1932, xxxi. 114 (1934).—Hispan.
castellana (*Sennen*) *Sennen & Elias, l. c.* 116: S. hyssopifolia var. castellana.
× Costae *Font Quer in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, v. Ser. Bot., No. 3, 217 (1920).—Hispan.
Debeauxi *Font Quer in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1925, xxv. 198.—Alger.
× Embergeri *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 92 [1933].—Marocc.
eynensis *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1932, xxxi. 119 (1934), descr.—Hispan.
Fontii *Sennen, l. c.* 1932, xxxi. 60.—Hispan.
Foucauldiana *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 147 [1933], nomen.—Marocc.
galatica *Bornm. in Magyar Bot. Lap.* 1932, xxxi. 135.—As. Min. (Galatia).
× Garrigae *Font Quer in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1924, xxiv. 44.—Hort.
germanicopolitana *Bornm. in Magyar Bot. Lap.* 1932, xxxi. 131.—As. Min. (Paphlagonia).
Grantii *Battand. Contrib. Fl. Atlant.* 67 (1919).—Marocc.
× Grosii *Font Quer in Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, v. Ser. Bot. No. 6, 18 (1924).—Hispan.
ilorcitana *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 103.—Hispan.
imbricata *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 132 (1932).—Marocc.
× incanoides *Font Quer & Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 92 [1933].—Marocc.
Jahandiezii *Font Quer in Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, v. Ser. Bot. No. 6, 25 (1924).—Marocc.
kurdica *Bornm. in Magyar Bot. Lap.* 1932, xxxi. 138.—As. Min. (Cappadocia); Kurdistan; Mesopotam.
× Laurentii *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1932, xxxi. 127 (1934), in obs.—Hispan.
× Llenasii *Font Quer in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, v. Ser. Bot. No. 3, 219 (1920).—Hispan.
longifolia (*Sennen*) *Sennen in Bull. Soc. Bot. France*, 1926, lxxiii. 664 (1927); *et in Bol. Soc. Ibér.* 1932, xxxi. 118 (1934): S. Endressi var. longifolia.
luteola *Font Quer in Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, v. Ser. Bot. No. 6, 32 (1924).—Hispan.
Maireana *Font Quer & Pau in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 533 [1928].—Marocc.
Mariae *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1932, xxxi. 120 (1934), descr.—Pyren.
× Masferreri *Font Quer in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1924, xxiv. 45.—Hort.
matris-filiae *Emberger & Maire*; *Emberger & Maire in Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc*, Nos. xxi–xxii. 45 (1930).—Marocc.
× Mauritii *Maire & Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 92 [1933]; *Font Quer & Sennen ex Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc*, iii. 630 (1934).—Marocc.
× Navasii *Font Quer in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1924, xxiv. 33.—Hort.

SIDERITIS:—
× Paui *Font Quer, Excurs. Bot. Sierra Ministra*, 6 (*Restaur. Farm.* Jul. 1922); cf. *Font Quer in Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, v. Ser. Bot. No. 6, 26 (1924).—Hispan.
× Philothei *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 92 [1933].—Marocc.
phrygia *Bornm. in Magyar Bot. Lap.* 1932, xxxi. 133.—As. Min. (Phrygia).
× Puiggariana *Font Quer in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1924, xxiv. 45.—Hort.
× Sanmiguelii *Font Quer in Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, v. Ser. Bot. No. 6, 28 (1924).—Hispan.
× segobricensis *Pau ex Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1932, xxxi. 59, in obs.—Hispan.
× Sennenii *Font Quer in Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, v. Ser. Bot. No. 6, 29 (1924).—Hispan.
trojana *Bornm. in Magyar Bot. Lap.* 1932, xxxi. 141.—As. Min.
Vicentii *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 92 [1933], nomen.—Marocc.
Woronowii *Schischk. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 290 (1932).—Caucas.
× Xavieri *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1932, xxxi. 58, in obs.—Hispan.
Yvesiana *Font Quer & Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 92 [1933].—Marocc.

SIDEROXYLON L. (Sapotac.).
altissimum (*A. Cheval.*) *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 12 (1931): Hormogyne altissima.
amygdalinum (*Standley*) *Standley in Tropical Woods*, 1932, No. 31, 45: Lucuma amygdalina.
aneityense *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 13.—N. Hebrides.
Aubrevillei *Pellegr. in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 682 (1932).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
buxifolium *Hutchinson in Kew Bull.* 1931, 413.—Somaliland.
embeliifolium *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 45 (1935).—China (Hainan).
grandifolium *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 348 (1824).—Ind. or. (Assam).
longispinosum *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 66 (1934).—China (Hainan).
Lundellii *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 79 (1935).—Guatem.
Meyeri *Standley in Tropical Woods*, 1932, No. 31, 45.—Mexico; Guatem.; Brit. Honduras.
micronesicum *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 671.—Ins. Carolin. (Kusai).
resiniferum *Ducke*; *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 742, latine.—Bras. (Amaz.).
rufotomentosum *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 79 (1935).—Brit. Honduras.
tannaënse *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 14.—N. Hebrides.

SIDOPSIS Rydb. Fl. Prairies & Plains Centr. N. Amer. 541 (1932). *MALVACEAE.*
hispida (*Pursh*) *Rydb. l. c.*: Sida hispida.

SIEBERA J. Gay (Compos.).
pungens (*Lam.*) *DC. Prodr.* vi. 531 (1837): Xeranthemum pungens.

SIEGFRIEDIA C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ. 76 (1931), nomen; C. A. Gardner in Journ. Roy. Soc. W. Austral. 1932–3, xix. 85 (1934), descr. *RHAMNACEAE.*
darwinioides *C. A. Gardner, l. c.*, nomen; *et l. c.*, descr.—W. Austral.

SIEGLINGIA Bernh. (Gramin.).
americana (*Beauv.*) *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 466 (1896): Triplasis americana.
grandiflora (*Vasey*) *Beal, l. c.* 471: Triodia grandiflora.

SIEVEKINGIA Reichb. (Orchidac.).
Trollii *Mansf. in Fedde, Repert.* xxxvi. 61 (1934).—Boliv.

SIEVERSIA Willd. (Rosac.).
pusilla (*Gaertn.*) *Bolle in Fedde, Repert. Beih.* lxxii. 22 (1933): Anemone pusilla.

SIGESBECKIA L. (Compos.).
glabrescens (*Makino*) *Makino in Journ. Jap. Bot.* i. 25 (1917): S. orientalis f. glabrescens.
pubescens (*Makino*) *Makino, l. c.* 24: S. orientalis f. pubescens.

SIGMATOGYNE Pfitz. (Orchidac.).
bia *Kerr in Journ. Siam Soc., Nat. Hist. Suppl.*, ix. 236 (1933).—Indo-China (Laos).

SIGMATOSTALIX Reichb. f. (Orchidac.).
Huebneri *Mansf. in Fedde, Repert.* xxxvi. 62 (1934).—Bras. (Amaz.).

SILENE L. (Caryophyllac.).
Aelleni *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 18 [1933], nomen.—Marocc.
aleppica *Colla, Herb. Pedem.* i. 332 (1833).—Hab.?
Bocinoi *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 147 [1933], nomen.—Marocc.
brachytricha *Sennen & Mauricio, l. c.* 18, nomen.—Marocc.
cabulica *Bornm. in Engl. Jahrb.* lxvi. 221 (1934).—Afghan.
cephalantha *Boiss.*; *Schischk. in Bull. Mus. Géorgie*, 1920–2, i. 12 (1922), descr. emend.—Oriens.
clavicarpa *Hornm. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 331 (1833).—Hab.?
coronata *Bonj. ex Colla, l. c.*—Ital.?
Cuatrecasasii *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 190 [1928]; *et in Cavanillesia*, iv. 63 (1931), descr. ampl.—Marocc.
duriensis *G. Sampaio in Ann. Acad. Polyt. Porto*, xiv. 151 (1921).—Lusitan.
euxina *Rupr.*; *Schischk. in Bull. Mus. Géorgie*, 1920–2, i. 8 (1922), descr. emend.—Oriens.
filipetala *Litard. & Maire*; *Litard. & Maire in Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc*, No. xxvi. 8 (1931).—Marocc.
filisecta *Peck in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1934, xlvii. 186.—U.S.A. (Oregon).
furcata *Rafin. Autikon Botanikon*, 28 (1840); cf. *Fernald in Rhodora*, 1932, xxxiv. 22, 25.—Canada (Hudson Bay); Labrador.
Gaubae *Bornm. & Gauba in Fedde, Repert.* xxxix. 91 (1935).—Persia.
Gavrilovii (*Krasnov*) *Popov in Bull. Univ. As. Centr.* ix. Suppl., 38 (1925), in obs.: S. holopetala var. Gavrilovii.
ghiarensis *Battand. Contrib. Fl. Atlant.* 17 (1919).—Marocc.
glaberrima *Faure & Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 37.—Alger.
Grosiana *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1928, No. 91 [1929].—Marocc.
guedirensis *Pau, l. c.* 1930, No. 193 [1932].—Marocc.
Harai *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 53.—Japon.
iberica *M. Bieb.*; *Schischk. in Bull. Mus. Géorgie*, 1920–2, i. 5 (1922), descr. emend.—Oriens.
Kawashimai *Miyabe & Tatewaki in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.* xiv. 83 (1935).—Sakhalin.
kiiruuinsularis (sphalm. kiiruninsulatis) *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1934, vi. 570, et errata.—Formosa.
laminiensis *Gonz.-Albo in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.* 1935, xxxv. 186.—Hispan.
longidens *Schischk. in Bull. Mus. Géorgie*, 1920–2, i. 16 (1922).—Reg. Caucas.
lutens *Molin. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 330 (1833).—Ital.?
Marcowiczii *Schischk. in Bull. Mus. Géorgie*, 1920–2, i. 11 (1922).—Reg. Caucas.
maurisca *Pau in Bol. Soc. Ibér.* 1932, xxxi. 96 (1934).—Marocc.
Mauritii *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 147 [1933], nomen.—Marocc.
maurorum *Battand. & Pitard in Pitard, Contrib. Étude Fl. Maroc*, 6 (1918).—Marocc.
moabitica *Eig in Fedde, Repert. Beih.* lxiii. 1. 74 (1931), nomen.—Palaest.
Modesti *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 18 [1933], nomen.—Marocc.
oraria *Peck in Torreya*, 1932, xxxii. 148.—U.S.A. (Oregon).
ovalifolia (*Regel & Schmalh.*) *Popov in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 3, 99 (1928): Melandrium ovalifolium.

SILENE:—
paphlagonica *Bornm. in Magyar Bot. Lap.* 1931, xxx. 60.—As. Min. (Paphlagonia).
praemixta *Popov in Vved. & al., Key Fl. Tashkent*, 110 (1924): S. turkestanica *Regel & Schmalh.* (1882), non *Regel* (1873).
pulverulenta *Peck in Torreya*, 1932, xxxii. 148.—U.S.A. (Oregon).
purpurea *Herb. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 330 (1833).—Eur. austr.; Afr. bor.
rhiphaena *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1929, No. 144 [1930].—Marocc.
Seelyi *Morton & J. W. Thompson in Torreya*, 1933, xxxiii. 70.—U.S.A. (Washington).
sipylea *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxvi. 80 (1934).—As. Min. (Lydia).
talyschensis *Schischk. in Bull. Mus. Géorgie*, 1920–2, i. 7 (1922).—Caucas.
tinctoria *Birol. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 330 (1833).—Ital.?
turkestanica *Regel & Schmalh. in O. Fedtsch. Descr. Pl. Nov. Turkest. (Bull. Soc. Nat. Hist. Anthrop. & Ethnol.* xxxiv. II.) 13 (1882).—Turkestan.
ugoënsis *Makino in Journ. Jap. Bot.* viii. 44 (1933), nomen.—Japon. (Hondo).
Vidaliana *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 181 [1928].—Marocc.
Wilczeki *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 147 [1933], nomen.—Marocc.

SILERIANA Urb. & Loes. in Meded. Dep. Landb. No. 17 (Greshoff, Beschr. Gift. Pl. Vischr. iii. Suppl.) 125 (1913), nomen, sphalm.: **Jacquinia** (Theophrastac.).
Jacquinia *Urb. & Loes. l. c.*, nomen, sphalm.: Jacquinia Seleriana.

SILIQUASTRUM [Tourn.] All. Stirp. Nic. 186 (1757). *LEGUMINOSAE.*

SILPHIUM L. (Compos.).
compressum *Hort. ex Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. Fasc. suppl. 1, p. 11 (1931), nomen.—Hab.?
confertiflorum *Small, Man. Southeast. Fl.* 1509 (1933), sphalm.: S. confertifolium.
lapsuum *Small, l. c.* 1411.—U.S.A. (Georgia; S. Carolina).
nodum *Small, l. c.* 1413.—U.S.A. (S. Carolina).
orae *Small, l. c.* 1411.—U.S.A. (N. & S. Carolina).

SILVIA Allem. (Laurac.).
decurrens *Ducke in Tropical Woods*, 1935, No. 42, 19.—Bras. (Amaz.).

SINAPIDENDRON Lowe (Crucif.).
decumbens *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1935, Sér. II. vii. 142.—Ins. C. Verde.
hirtum *A. Cheval. l. c.* 141.—Ins. C. Verde.

SINAPIS L. (Crucif.).
Mairei *H. Lindb. Itin. Mediterr. (Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 65 (1932).—Marocc.

SINARUNDINARIA Nakai in Journ. Jap. Bot. 1935, xi. 1. *GRAMINEAE.*
Murielae (*Gamble*) *Nakai, l. c.*: Arundinaria Murielae.
nitida (*Mitford*) *Nakai, l. c.*: Arundinaria nitida.

SINDECHITES Oliv. (Apocynac.).
Esquirolii (*Léveillé*) *R. E. Woodson in Journ. Arn. Arb.* 1934, xv. 316: Parameria Esquirolii.

SINDROA Jumelle in Ann. Mus. Col. Marseille, 1933, Sér. V. i. Fasc. 1, 11. *PALMAE.*
longisquama *Jumelle, l. c.*—Madag.

SINNINGIA Nees (Gesneriac.).
atro-purpurea *Hort. ex Bellair & St.-Léger, Pl. Serre*, 1483 (1900), in syn.: S. purpureo-rubra *Hort. ex Bellair & St.-Léger.*
×hybrida *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 789 (1895), in obs.—Hort.
purpureo-rubra *Hort. ex Bellair & St.-Léger, Pl. Serre*, 1483 (1900).—Bras.?

SINOMALUS Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot. 1932, i. 11. *ROSACEAE.*
honanensis (*Rehder*) *Koidz. l. c.* 1934, iii. 196: Malus honanensis.
Komarovii (*Sarg.*) *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 297: Crataegus Komarovii.
tenuifolia (*Komarov*) *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 12: Crataegus tenuifolia.

SINOMALUS:—
toringoides (*Rehder*) *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 11: Malus transitoria var. toringoides.
transitoria (*C. K. Schneider*) *Koidz. l. c.* 1934, iii. 196: Malus transitoria.

SIOLMATRA Baill. (Cucurbitac.).
simplicifolia *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 769 (1933).—Peruv.

SIPANEA Aubl. (Rubiac.).
coppenamensis *Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 258.—Guiana Bat.
ovalifolia *Bremek. l. c.* 259.—Guiana Bat.
Staheli *Bremek. l. c.* 258.—Guiana Bat.

SIPARUNA Aubl. (Monimiac.).
Archeri *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1932, lix. 517.—Colomb.
asterotricha *A. C. Smith, l. c.* 520.—Colomb.
calignosa *Macbride in Candollea*, v. 353 (1934).—Peruv.
ecuadorica *Heilb. in Svensk Bot. Tidskr.* 1931, xxv. 203.—Ecuador.
elliptica *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1932, lix. 521.—Colomb.
episciifolia *A. C. Smith in Phytologia*, i. 127 (1935).—Colomb.
fuchsiifolia *Standley in Tropical Woods*, 1935, No. 42, 29.—Ecuador.
galbina *Macbride in Candollea*, v. 354 (1934).—Peruv.
hemisphaerica *A. C. Smith in Phytologia*, i. 126 (1935).—Colomb.
huilensis *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1932, lix. 521.—Colomb.
Krukovii *A. C. Smith, l. c.* 1933, lx. 352.—Bras. (Matto Grosso).
metensis *A. C. Smith in Phytologia*, i. 128 (1935).—Colomb.
obstipa *Macbride in Candollea*, v. 354 (1934).—Peruv.
olivaceo-velutina *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 67 (1934).—Ecuador.
pectinata *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1932, lix. 522.—Colomb.
phaneroneura *Standley in Tropical Woods*, 1935, No. 42, 28.—Ecuador.
piloso-lepidota *Heilb. in Svensk Bot. Tidskr.* 1931, xxv. 207.—Ecuador.
plana *Macbride in Candollea*, v. 355 (1934).—Peruv.
quadrangularis *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1932, lix. 524.—Ecuador.
Rimbachii *Standley in Tropical Woods*, 1935, No. 42, 27.—Ecuador.
sinuata *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1932, lix. 518.—Colomb.
subscandens *A. C. Smith, l. c.* 523.—Colomb.
surinamensis *Lanj. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1935, xxxii. 240.—Guiana Bat.
tapatana *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1932, lix. 519.—Colomb.
Valenzuelae *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 27, Cuadro 11 (1934), nomen; *et l. c.* No. 29, 7 (1935), descr.—Colomb.
Williamsii *Macbride in Candollea*, v. 353 (1934).—Peruv.

SIPHANTHERA Pohl (Melastomatac.).
capitata *Gleason in Brittonia*, i. 137 (1932).—Guiana Brit.
Jenmani *Gleason, l. c.*—Guiana Brit.

SIPHOCAMPYLUS Pohl (Campanulac.).
antioquianus *E. Wimm. in Fedde, Repert.* xxix. 80 (1931).—Colomb.
avicularis *E. Wimm. l. c.* xxxviii. 20 (1935).—Colomb.
brevidens *E. Wimm. l. c.* xxix. 89 (1931).—Peruv.
brevipedicellatus *E. Wimm. l. c.* xxxviii. 22 (1935).—Colomb.
Buesii *E. Wimm. l. c.* 17.—Peruv.
calodontus *E. Wimm. l. c.* xxix. 87 (1931).—Peruv.
chloroleucus *E. Wimm. l. c.* xxxviii. 17 (1935).—Peruv.
citrinus *E. Wimm. l. c.* 75.—Peruv.
clarus *E. Wimm. l. c.* xxix. 81 (1931).—Colomb.
Coltinya *E. Wimm. l. c.* 84.—Peruv.

SIPHOCAMPYLUS:—
cuspidatus *E. Wimm. in Fedde, Repert.* xxxviii. 20 (1935).—Argent.
densidentatus *E. Wimm. l. c.* xxix. 79 (1931).—Bras. (S. Catharina).
Elfriedi *E. Wimm. l. c.* xxxviii. 75 (1935).—Peruv.
Elsworthii *E. Wimm. l. c.* 17.—Colomb.
funiculosus *E. Wimm. l. c.* xxix. 81 (1931).—Colomb.
furax *E. Wimm. l. c.* 86.—Colomb.
Goebelii *E. Wimm. l. c.* xxxviii. 76 (1935).—Peruv.
Hitchcockii (*Gleason*) *E. Wimm. l. c.* xxix. 78 (1931): Centropogon Hitchcockii.
hypopogon *E. Wimm. in Rev. Sudamer. Bot.* 1935, ii. 91.—Argent.
Lorentzii *E. Wimm. in Fedde, Repert.* xxix. 85 (1931).—Boliv.; Argent.
mirabilis *E. Wimm. l. c.* 80.—Colomb.
nematosepalus (*Donn. Smith*) *E. Wimm. l. c.* xxxviii. 22 (1935): Centropogon nematosepalus.
neurotrichus *E. Wimm. l. c.* 24.—Boliv.
nummularius *E. Wimm. l. c.* 18.—Boliv.
obovatus (*G. Don*) *E. Wimm. l. c.* 19, cum descr. ampl.: Tupa obovata.
ovatus (*G. Don*) *E. Wimm. l. c.* 18, cum descr. ampl.: Tupa ovata.
parvilobus *E. Wimm. l. c.* 21: S. brevidens *E. Wimm.*
Pavonis *E. Wimm. l. c.* xxix. 89 (1931).—Peruv.
peritornus *E. Wimm. l. c.* 82.—Colomb.
phaeton *E. Wimm. l. c.* 83.—Peruv.
pozuzensis *E. Wimm. l. c.* 87.—Peruv.
queluzensis *E. Wimm. in Rev. Sudamer. Bot.* 1935, ii. 91.—Bras. (Minas Geraes).
quetamensis *E. Wimm. in Fedde, Repert.* xxix. 90 (1931).—Colomb.
soraticus *E. Wimm. l. c.* xxxviii. 23 (1935).—Boliv.
stenolobus *E. Wimm. l. c.* 24.—Peruv.
tolimanus *E. Wimm. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 26, p. 28 (1933).—Colomb.
Weirianus *E. Wimm. in Fedde, Repert.* xxix. 79 (1931).—Bras. (S. Paulo).
Werdermannii *E. Wimm. l. c.* xxxviii. 76 (1935).—Boliv.

SIPHONANDRA Klotzsch (Ericac.; Vacciniac., Gen. Pl.).
magnifica *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 132 (1934).—Boliv.
pilosa *A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 355 (1932).—Peruv.; Boliv.

SIPHONANTHUS L. (Verbenac.).
yakusimensis *Nakai, Trees & Shrubs Jap.* i. 346 (1922); cf. *Nakai & Koidz. Trees & Shrubs Japan Proper*, ed. 2, 469 (1927).—Japon.

SIPHONERANTHEMUM Kuntze (Acanthac.).
Beyrichii *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 806 (1895), in obs.—Hab.?
leuconeurum (*Hort. ex Schlecht.*) *Voss, l. c.*: Eranthemum leuconeurum.
longifolium (*Regel*) *Voss, l. c.*: Eranthemum longifolium.
marmoratum (*Hort. ex Regel*) *Voss, l. c.*, in obs.: Eranthemum marmoratum.

SIPHONOSMANTHUS Stapf (Oleac.).
venosus (*Pampan.*) *Knobl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1031 (1934): Osmanthus venosus.

SIRAITIA Merrill in Papers Mich. Acad. Sc. 1933, xix. 200 (1934). *CUCURBITACEAE.*
silomaradjae *Merrill, l. c.*—Sumatra.

SISARUM Mill. (Umbellif.).
sisaroideum (*DC.*) *Schischk. in Krylov, Fl. Sibir. Occ.* viii. 2077 (1935): Sium sisaroideum.

SISYMBRIUM L. (Crucif.).
Castellanosii *O. E. Schulz in Fedde, Repert.* xxxiii. 190 (1933).—Patag.
heterophyllum *Popov in Trans. Sc. Soc. Turk.* i. 35 (1923).—Bokhara.
karataviense *Pavlov in Sovietsk. Bot.* 1934, No. 1, 23, in obs.—Turkestan.
lanatum (*Walp.*) *O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 642 (1932): Arabis lanata.
longisiliquosum *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 9 [1933], nomen.—Marocc.

SISYMBRIUM:—
macrorrhizum (*Muschl.*) *Macbride in Candollea*, v. 355 (1934): Thelypodium macrorrhizum.
Ragoneseanum *O. E. Schulz in Fedde, Repert.* xxxviii. 32 (1935).—Argent.

SISYRANTHUS E. Mey. (Asclepiadac.).
rhodesicus *Weimarck in Bot. Notiser*, 1935, 402.—S. Rhodesia.

SISYRINCHIUM L. (Iridac.).
Brownei *Small in Small & Alexander, Bot. Interpr. Iridac. Pl. Gulf States (Contrib. N. Y. Bot. Gard.* No. 327) 330 (1931).—U.S.A. (Louisiana).
grandiflorum *Poepp. in Froriep, Notiz. Gebiet Natur-u. Heilk.* Ser. I. xxiii. 277 (1829), in adnot.—Chile.
inflatum (*Suksdorf*) *St. John in Rep. Prov. Mus. Nat. Hist. Brit. Columb.* 1930, C 12 (1931): Olsynium inflatum.
megapotamicum *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 9, 16 (1935), in obs.: S. gracile *Klotzsch ex Baker*.
Metae *Herter, Fl. Urug. Pl. Vasc. (Estud. Bot. Reg. Urug.* iv.) 50 (1931), nomen.—Urug.
Noccae *Hort. ex Colla, Herb. Pedem.* v. 439 (1836), in obs.—Hab.?
scirpoideum *Poepp. in Froriep, Notiz. Gebiet Natur-u. Heilk.* Ser. I. xxiii. 277 (1829), in adnot.—Chile.
sessiliflorum *Poepp. l. c.*, in adnot.—Chile.
vesiculatum *Colla, Herb. Pedem.* v. 439 (1836).—Hab.?
xiphioides *Kuntze ex Poepp. in Froriep, Notiz. Gebiet Natur-u. Heilk.* Ser. I. xxiii. 277 (1829), in syn.: S. grandiflorum *Poepp.*

SIUM L. (Umbellff.).
floridanum *Small, Man. Southeast. Fl.* 976 (1933).—U.S.A. (Florida).
frigidum *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 719 (1933).—China (Yunnan).
podolicum *Hort. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 24 (1834).—Hab.?

SKIMMIA Thunb. (Rutac.).
euphlebia *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 32 (1934).—China (Kwangtung).

SKOTTSBERGIELLA Epling in Fedde, Repert. Beih. lxxxv. 1 (1935): **Cuminia** Colla (Labiat.).
fernandezia (*Colla*) *Epling, l. c.*: Cuminia fernandezia.

SLOANEA L. (Elaeocarpac.; Tiliac., Gen. Pl.).
austro-sinica *Hu ex Tang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* 1932, iii. 308.—China (Kweichau).
bracteosa *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 168 (1935).—Bras. (Amaz.).
chengfengensis *Hu in Sinensia*, iii. 85 (1932).—China (Kweichau).
elegans *Chun in Hook. Ic. Pl.* xxxii. t. 3159 (1932).—China (Kwangtung).
erismoides *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 164 (1935).—Bras. (Pará).
excelsa *Ducke, l. c.* 161.—Bras. (Amaz.).
grandis *Ducke, l. c.* 163.—Bras. (Pará).
Kuhlmannii *Ducke, l. c.* 160.—Bras. (Amaz.).
kweichowensis *Hu in Sinensia*, iii. 84 (1932).—China (Kweichau).
leptocarpa *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 214 (1931).—China (Kwangtung).
longipes *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 166 (1935).—Bras. (Amaz.; Pará).
macrantha *Ducke, l. c.* 162.—Bras. (Amaz.).
obidensis *Ducke, l. c.* 160.—Bras. (Pará).
polyantha *Ducke, l. c.* 162.—Bras. (Amaz.).
porphyrocarpa *Ducke, l. c.* 167.—Bras. (Amaz.; Pará).
pseudo-dentata *Ducke, l. c.* 159.—Bras. (Amaz.; Pará).
eticulata *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1934, xi. 194.—Bras. (Maranhão).
Schippii *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 70 (1935).—Brit. Honduras.
Tsiangiana *Hu in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* v. 310 (1934).—China (Kweichau).
verrucosa *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 165 (1935).—Bras. (Amaz.).

SMALLANTHUS Mackenzie in Small, Man. Southeast. Fl. 1406 (1933). *COMPOSITAE.*
Uvedalia (*L.*) *Mackenzie, l. c.*: Polymnia Uvedalia.

SMELOWSKIA C. A. Mey. (Crucif.).
inopinata *Komarov in Komarov & Klob.-Alis. Key Pl. Far East. Reg. USSR*, i. 589 (1931).—Ross. asiat. or.

SMILACINA Desf. (Liliac.).
hondoënsis *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 126, in adnot.—Japon. (Hondo).
lichiangensis (*W. W. Smith*) *ex Notes Bot. Gard. Edinb.* xvii. 120 (1929): Tovaria lichiangensis.
robusta *Makino & Honda in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 569.—Japon.
trinervis *Miyabe & Kudo in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 332 (1932).—Japon.
viridiflora *Nakai, Rep. Veg. Kamikochi, Shinano*, 42 (1928), nomen seminudum; *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1565 (1931), japonice; cf. *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 125, in syn.: S. yezoënsis.

SMILAX L. (Liliac.).
aberrans *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 71.—Indo-China (Tonkin).
adhaerens *Gagnep. l. c.*—Indo-China (Tonkin).
amaurophlebia *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xi. 39 (1932).—China (Hainan).
austrosinensis *Wang & Tang in Sinensia*, v. 423 (1934).—China (Szechuan; Kweichau).
Balansaeana *Baill. ex Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, vi. 760 (1934).—Tonkin; Laos; Cambodia; Cochinch.
barbillana *Cufod. in Archiv. Bot., Forli*, 1933, ix. 186.—Costa Rica.
bella *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 47 (1931).—Peruv.
Bonii *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 72.—Indo-China (Tonkin).
cambodiana *Gagnep. l. c.*—Cambodia; Cochinch.
chapaënsis *Gagnep. l. c.*—Indo-China (Tonkin).
Chingii *Wang & Tang in Sinensia*, v. 426 (1934).—China (Kwangsi).
colubrina *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 45 (1931).—Peruv.
elegantissima *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 619.—Indo-China (Tonkin).
fokiensis *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* x. 415 (1931).—China (Kweichau; Hunan; Fokien).
gilva *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 44 (1931).—Peruv.
impressinervia *Wang & Tang in Sinensia*, v. 425 (1934).—China (Kwangsi).
iriomotensis *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 253.—Ins. Liukiu (Iriomote).
kwangsiensis *Wang & Tang in Sinensia*, v. 425 (1934).—China (Kwangsi).
longipedunculata *Merrill in Sunyatsenia*, i. 190 (1934).—China (Kwangtung).
magnifolia *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 46 (1931).—Peruv.
nana *Wang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* v. 116 (1934).—China (Yunnan).
oblonga (*C. H. Wright*) *Norton in L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, i. 15 (1920): S. herbacea var. oblonga.
phyllantha *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 73.—Indo-China (Cochinch.).
Poilanei *Gagnep. l. c.*—Indo-China (Anam).
sempervirens *Wang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* v. 116 (1934).—China (Anhwei).
synandra *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 73.—Indo-China (Tonkin; Anam).
tetraptera *Gagnep. l. c.* 74.—Indo-China (Anam).
Tsaii *Wang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* v. 117 (1934).—China (Yunnan; Kweichau).
tsinchengshanensis *Wang, l. c.* 119.—China (Szechuan).
vaga *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 46 (1931).—Peruv.
verticalis *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 74.—Indo-China (Anam).
Williamsi *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 46 (1931).—Peruv.
Yui *Wang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* v. 118 (1934).—China (Szechuan).

SMITHIA Ait. (Legumin.).
Burttii *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 78.—Tanganyika Terr.

SMITHIA:—
oligantha *Blatter in Journ. & Proc. As. Soc. Beng.* 1930, n. s. xxvi. 342 (1931).—Ind. or. (Bombay).
oubanguiensis *Tisserant in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 336.—Afr. Gall. Centr.
parvifolia *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxxi. 427 (1932).—Transvaal.
Perrieri *R. Viguier ex Basse in Ann. Sc. Nat.* 1934, Sér. X. xvi. 162, nomen.—Madag.
uniflora *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1933, Sér. II. v. 479.—Guinea Gall.

SMITHIANTHA Kuntze (Gesneriac.).
fulgida (*Ortg.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 791 (1895): Naegelia fulgida.
×hybrida *Voss, l. c.*, in obs.—Hort.

SMYRNIUM L. (Umbellif.).
galaticum *Czecz. in Acta Soc. Bot. Polon.* 1932, ix. 38.—As. Min. (Galatia).

SOARESIA Allem. (Morac.; Urticac., Gen. Pl.).
ilicifolia *Glaziou ex Benth. & Hook. f. Gen. Pl.* iii. 377 (1880), in obs.—Bras.

SOBRALIA Ruiz & Pav. (Orchidac.).
Edwardsii *Ames in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* i. No. 10, 1 (1933).—Honduras.

SOCRATEA Karst. (Palmae).
Hoppii *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 232 (1931).—Ecuador.

SOGERIANTHE Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk. Sect. II. xxix. No. 6, 106 (1933). *LORANTHACEAE.*
sessiliflora (*Danser*) *Danser, l. c.*: Amyema sessiliflora.
sogerensis (*S. Moore*) *Danser, l. c.*: Elytranthe sogerensis.
versicolor *Danser in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 207.—Ins. Solomon.

SOLANUM L. (Solanac.).
ajanhuiri *Juzepczuk & Bukasov in Bull. Applied Bot., Leningrad*, Suppl. 47, pp. 35, 474 (1930), in obs.—Peruv.; Boliv.
ajuscoënse *Bukasov, l. c.* pp. 60, 217, 480.—Mexico.
andigena *Juzepczuk & Bukasov, l. c.* pp. 35, 202, 474.—Peruv.
Antipoviczii *Bukasov, l. c.* pp. 60, 216, 480.—Mexico.
Aracc-papa *Juzepczuk ex Rybin in Bull. Applied Bot., Leningrad*, Ser. II. No. 2, 31 (1933); *et ex Bukasov in Bull. Applied Bot., Leningrad*, Suppl. 58, pp. 111, 185 (1933), in obs.—Andes.
arborescens *Clokey in Bull. S. Calif. Acad. Sc.* 1931, xxx. 60.—U.S.A. (Calif.).
Balboanum *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 87 (1935).—Kenya Col.
bifurcatum *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* ii. 98 (1851).—Abyss.
bifurcum *Hochst.*; *Dunal in DC. Prodr.* xiii. 1. 77 (1852), descr.—Abyss.; Arab.
boyacense *Juzepczuk & Bukasov in Bull. Applied Bot., Leningrad*, Suppl. 47, pp. 35, 214, 474 (1930).—Colomb.
Bukasovii *Juzepczuk ex Rybin in Bull. Applied Bot., Leningrad*, Ser. II. No. 2, 31 (1933); *et ex Bukasov in Bull. Applied Bot., Leningrad*, Suppl. 58, pp. 111, 185 (1933), in obs.—Andes.
callicarpoides *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 258 (1824).—Sumatra.
candelarium *Bukasov in Bull. Applied Bot., Leningrad*, Suppl. 47, pp. 60, 218 (1930).—Mexico.
centrale *J. M. Black in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1934, lviii. 180.—Austral. centr.
Chaucha *Juzepczuk & Bukasov in Bull. Applied Bot., Leningrad*, Suppl. 47, pp. 35, 474 (1930), in obs.—Peruv.; Boliv.
Chocclo *Bukasov & Lechn. l. c.* Suppl. 58, pp. 118, 186 (1933).—Chile.
chrysasteroides *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 374 (1935).—Ecuador.
clerodendroides *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 205, in clavi, 206 (1931).—Nigeria.
Clokeyi *Munz in Bull. S. Calif. Acad. Sc.* 1932, xxxi. 69: S. arborescens *Clokey*.
coyoacanum *Bukasov in Bull. Applied Bot., Leningrad*, Suppl. 47, pp. 60, 219, 480 (1930).—Mexico.

SOLANUM:—
crassipetalum *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 256 (1824).—Nepal.
cremastanthemum *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 378 (1935).—Ecuador.
curtilobum *Juzepczuk & Bukasov in Bull. Applied Bot., Leningrad*, Suppl. 47, pp. 35, 474 (1930), in obs.—Peruv.; Boliv.
cynanchoides *Chiov. Fl. Somala*, II. 333 (1932).—Somal. Ital.
decemdentatum *Roxb. Hort. Beng.* 16 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 247 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 565 (1832).—China.
deltoideum *Colla, Herb. Pedem.* iv. 273 (1835).—Chile.
dendroicum *O. E. Schulz & Ekman in Fedde, Repert.* xxxii. 91 (1933).—Santo Domingo.
diffusum *Roxb. Hort. Beng.* 17 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 250 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 568 (1832).—Ind. or.
Edwardsii *Standley in Tropical Woods*, 1934, No. 37, p. 31.—Honduras.
farinosum *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 255 (1824).—Ind. or.
formonense *O. E. Schulz in Fedde, Repert.* xxxii. 92 (1933).—Haiti.
goniocalyx *Juzepczuk & Bukasov in Bull. Applied Bot., Leningrad*, Suppl. 47, pp. 35, 202, 474 (1930).—Peruv.
haematocarpum *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 719 (1895), in syn.: S. pyracanthum.
hamulosum *C. T. White in Contrib. Arn. Arb.* No. IV. 95 (1933).—Austral. (Queensland).
Hendersonii *Hort. ex W. F. Wight in L. H. Bailey, Standard Cycl. Hort.* vi. 3183 (1917); *et ex Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1935, l. 20, 152, hybr. ?—Hort.
Henryi *Bukasov & Lechn. in Rev. Argent. Agron.* 1935, ii. 182.—Urug.
hirsuticaule *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 91 (1934).—Tanganyika Terr.
hirsutum *Roxb. Hort. Beng.* 17 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 253 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 571 (1832).—Ind. or. (Bengal).
holosericeum *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 377 (1935).—Ecuador.
hyemale *Biroli ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 275 (1835), in obs.—Hab. ?
inaequiradians *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 90 (1934).—Tanganyika Terr.
Juzepczukii *Bukasov in Bull. Applied Bot., Leningrad*, Suppl. 47, pp. 35, 474 (1930), in obs.—Peruv.; Boliv.
leptostigma *Juzepczuk ex Bukasov, l. c.* Suppl. 58, pp. 110, 185 (1933), in obs.—Chile.
lignosum *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 93 (1934).—Tanganyika Terr.
limitaneum *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 85 (1935).—Brit. Honduras.
longum *Roxb. Hort. Beng.* 16 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 248 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 567 (1832).—Ind. or.
Looserii *Juzepczuk ex Bukasov in Bull. Applied Bot., Leningrad*, Suppl. 58, pp. 115, 186 (1933), in obs.—Chile.
lycollonum *Bellardi ex Pasch. in Colla, Herb. Pedem.* iv. 274 (1835).—Hab. ?
ysimachioides *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 257 (1824).—Reg. Himal.
MacOwani *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 101 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
macrocarpum (*Maxim.*) *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 23: S. Dulcamara var. macrocarpum.
mamilliferum *Juzepczuk & Bukasov in Bull. Applied Bot., Leningrad*, Suppl. 47, pp. 35, 474 (1930), in obs.—Peruv.; Boliv.
mariannense *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 126.—Ins. Marian. (Rota).
Maximowiczii *Koidz. in Mayebara, Fl. Austrohigo.* 50, 85 (1931); *et in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 24.—China; Japon.; Ins. Liukiu.
megacarpum *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 159: S. macrocarpum *Koidz.*
Millanii *Bukasov & Lechn. in Rev. Argent. Agron.* 1935, ii. 180.—Argent.

SOLANUM:—
Murphyi *I. M. Johnston in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcv. 34 (1931).—Peruv. (Ins. Viejas).
neo-Antipoviczii *Bukasov in Bull. Applied Bot., Leningrad*, Suppl. 47, pp. 60, 217 (1930).—Mexico.
Nienkui *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 318 (1935).—China (Hainan).
obispoënse *Eastw. in Leafl. West. Bot.* i. 104 (1934).—U.S.A. (Calif.).
palustre *Poepp. in Froriep, Notiz. Gebiet Natur- u. Heilk.* Ser. I. xxiii. 276 (1829), in adnot.—Chile.
papillare *Bellardi ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 275 (1835).—Hab. ?
paucispinum *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 376 (1935).—Ecuador.
perplexum *Small, Man. Southeast. Fl.* 1115 (1933).—U.S.A. (Georgia; Florida).
phaeophyllum *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 375 (1935).—Ecuador.
phureja *Juzepczuk & Bukasov in Bull. Applied Bot., Leningrad*, Suppl. 47, pp. 35, 474 (1930), in obs.—Peruv.; Boliv.
placitum *Morton in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 394.—Bras. (Matto Grosso).
quaesitum *Morton, l. c.* 393.—Bras. (Matto Grosso).
racemigerum *Hort. ex Florist*, 1869, 73, in obs.—Hort.
Rybinii *Juzepczuk & Bukasov in Bull. Applied Bot., Leningrad*, Suppl. 47, pp. 35, 213, 474 (1930).—Colomb.
Schiffnerianum *Witasek in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1931, lxxx. 163.—Sumatra.
Schippii *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 85 (1935).—Brit. Honduras.
Schliebenii *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 92 (1934).—Tanganyika Terr.
semidemissum *Juzepczuk ex Bukasov in Bull. Applied Bot., Leningrad*, Suppl. 47, pp. 60, 480 (1930), in obs.—Mexico.
sendigena *Juzepczuk & Bukasov, l. c.* Ser. A. No. 2, 72 (1932), in obs.—Hab. ?
Sennii *Chiov. Fl. Somala*, II. 334 (1932).—Somal. Ital.
spirale *Roxb. Hort. Beng.* 16 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 247 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 566 (1832).—Ind. or. (Assam).
stenotomum *Juzepczuk & Bukasov in Bull. Applied Bot., Leningrad*, Suppl. 47, pp. 35, 474 (1930), in obs.—Peruv.; Boliv.
tenuifilamentum *Juzepczuk & Bukasov, l. c.*, in obs.—Peruv.; Boliv.
tenuispinum *Rusby in Phytologia*, i. 75 (1934).—Boliv.
vallis-mexici *Juzepczuk ex Bukasov in Bull. Applied Bot., Leningrad*, Suppl. 47, pp. 60, 480 (1930), in obs.—Mexico.
vansittartense *C. A. Gardner in For. Dep. Bull., W. Austral.* No. 32, 89 (1923).—W. Austral.
Vidali *R. Phil. in Verh. Deutsch. Wiss. Ver. Santiago (Chile)*, ii. 108 (1890), nomen.—Chile.
yolense *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 205, in clavi, 206 (1931).—Nigeria.

SOLEA Spreng. (Violac.).
Martii *Colla, Herb. Pedem.* i. 269 (1833).—Bras.

SOLENANTHUS Ledeb. (Boraginac.).
atlanticus *Pitard, Contrib. Étude Fl. Maroc*, 26 (1918).—Marocc.

SOLENOGYNE Cass. (Compos.).
japonensis *Masamune, Prelim. Rep. Veg. Yakus.* 129 (1929); *Masamune in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* xi., Bot. No. 4, 441 (1934), in syn.: Myriactis japonensis.

SOLENOPHORA Benth. (Gesneriac.).
Pirana *Morton in Phytologia*, i. 149 (1935).—Guatem.

SOLENOSTEMON Thonn. (Labiat.).
Chevalieri *Briq. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 286 (1917).—Afr. Gall. Centr.

SOLIDAGO L. (Compos.).
auriculata *Shuttlew. in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 326: S. amplexicaulis *Torr. & Gray.*
Edisoniana *Mackenzie in Small, Man. Southeast. Fl.* 1358 (1933).—U.S.A. (Florida).

SOLIDAGO:—
galetorum (*Greene*) *Friesner in Butler Univ. Bot. Stud.* iii. No. 1, 58 (1933); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 139: Euthamia galetorum.
graminea (*Wooton & Standley*) *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 326: Petradoria graminea.
Hapemaniana *Rydb. in Brittonia*, i. 101 (1931).—U.S.A. (Nebraska).
Harperi *Mackenzie in Small, Man. Southeast. Fl.* 1352 (1933).—U.S.A. (S.E. States).
insularis *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 141.—Ins. Liukiu.
japonica *Kitamura, l. c.* 1932, i. 286, in obs.—Japon. (Hondo).
Lunellii *Rydb. in Brittonia*, i. 101 (1931).—Canada (Saskatchewan); U.S.A. (N. Dakota).
maxima *Burd. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 394 (1834).—Ital. ?
Milleriana *Mackenzie in Small, Man. Southeast. Fl.* 1350 (1933).—U.S.A. (S. E. States).
minutissima (*Makino*) *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 141: S. Virgaurea var. minutissima.
mirabilis *Kitamura, l. c.* 140, non seq.—Japon. (Hondo).
mirabilis *Small, Man. Southeast. Fl.* 1359 (1933).—U.S.A. (Florida).
notabilis *Mackenzie in Small, l. c.* 1353.—U.S.A. (S.E. States).
ovata *Friesner in Butler Univ. Bot. Stud.* iii. No. 1, 40 (1933); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 139.—U.S.A. (Indiana).
perglabra *Friesner, l. c.* 61; *et l. c.*—U.S.A. (E. States).
pulchra *Small, Man. Southeast. Fl.* 1356 (1933).—U.S.A. (N. Carolina).
remota (*Greene*) *Friesner in Butler Univ. Bot. Stud.* iii. No. 1, 62 (1933); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 139: Euthamia remota.
senanensis *Nakai, Kamik.-Tennenk.-Chōsahōk.* 41 (1928); cf. *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 1268 (1931), japonice.—Japon.
Somesii *Rydb. in Brittonia*, i. 101 (1931).—U.S.A. (Iowa).
tarda *Mackenzie in Small, Man. Southeast. Fl.* 1355 (1933).—U.S.A. (Georgia).
turfosa *Woronow ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 91 (1934).—Caucas.
yakusimensis (*Nakai*) *Masamune in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* xi., Bot. No. 4, 439 (1934): S. Virgaurea var. yakusimensis.

×**SOLIDASTER** Wehrhahn in Bondstedt, Pareys Blumengärtn. ii. 525 (1932). *COMPOSITAE.* [ASTER × SOLIDAGO.]
hybridus *Wehrhahn, l. c.*—Hort.

SOLMS-LAUBACHIA Muschl. (Crucif.).
xerophyta (*W. W. Smith*) *Comber in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 249 (1934): Parrya xerophyta.

SOMPHOXYLON Eichl. (Menispermac.).
Klugii *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 92.—Peruv.

SONCHUS L. (Compos.).
angustissimus *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 169 (1932).—Marocc.
australis *Hort. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 531 (1834), in obs.—Hab. ?
Bequaerti *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 461 (1932).—Congo Belg.
Charmeli *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 72 [1933], nomen.—Marocc.
Engleri *Muschl. in Koorders, Excursionsfl. Java*, iii. 347, 348 (1912).—Java.
eryngiifolius *Sosn. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 254 (1934).—Caucas.
gracilis *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 72 [1933], nomen.—Marocc.
kabarensis *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 463 (1932).—Congo Belg.
lanifer *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 91 (1932).—Hereroland.
longifolius *Colla, Herb. Pedem.* iii. 530 (1834), in obs.—Hab. ?
maculigerus *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 169 (1932).—Marocc.

SONCHUS:—
Masguindalii *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 732 [1928].—Marocc.
otaviensis *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 90 (1932). —Hereroland.
pensylvanicus *Molin. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 530 (1834).—Hab.?
perennis (*Lange*) *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 170 (1932): S. tenerrimus var. perennis.
spinulifolius *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 72 [1933], nomen.—Marocc.

SONERILA Roxb. Hort. Beng. 5 (1814), nomen; Fl. Ind., ed. Carey & Wall., i. 180 (1820); Fl. Ind., ed. Carey, i. 176 (1832). *MELASTOMATACEAE.*
angustifolia *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 182; *et l. c.* 178.—Reg. Himal.
collina *R. N. Parker in Kew Bull.* 1931, 42.—Burma.
emaculata *Roxb. Hort. Beng.* 5 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 181 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 178 (1832).—Reg. Himal.
Gibbsiae *Ridley in Kew Bull.* 1933, 494.—Borneo.
Helferi *C. B. Clarke*; *Craib, Fl. Siam. Enum.* i. 691 (1931), descr. ampl.—Burma.
Henryi *Kraenzl. in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 152.—China (Yunnan).
hybrida *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 318 (1894), in obs.—Hab.?
khasiana *C. B. Clarke*; *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1932, 199, descr. ampl.—Ind. or. (Assam).
macrantha *Merrill in Sarawak Mus. Journ.* iii. 540 (1928).—Borneo.
maculata *Roxb. Hort. Beng.* 5 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 180 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 177 (1832).—Reg. Himal.
moluccana *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 182 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 178 (1832).—Ins. Molucc.
nemakadensis *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1935, 157.—Ind. or. (Travancore).
obovata *Schwartz in Mitt. Inst. Bot. Hamburg*, vii. 244 (1931).—Borneo.
pedunculata *Schwartz, l. c.* 245.—Borneo.
plagiocardia *Diels in Engl. Jahrb.* lxv. 117 (1932). —China (Yunnan).
rubro-villosa *Schwartz in Mitt. Inst. Bot. Hamburg*, vii. 246 (1931).—Borneo.
Ruttneri *Ridley in Arch. Hydrobiol.*, Suppl.-Band, xi. 312 (1932).—Sumatra.
squarrosa *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 182 (1820).—Ind. or. (Khasia).
tinnevelliensis *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1934, 165.—Ind. or. (Travancore; Tinnevelly).
villosa *C. E. C. Fischer, l. c.* 1932, 199.—Ind. or. (Assam).
virgata *Schwartz in Mitt. Inst. Bot. Hamburg*, vii. 247 (1931).—Borneo.

SOPHIA Adans. (Crucif.).
diffusa (*A. Gray*) *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 39: Sisymbrium diffusum.
Richardsoniana (*Sweet*) *Rydb. in Brittonia*, i. 89 (1931): Sisymbrium Richardsonianum.

SOPHORA L. (Legumin.).
Prodanii *E. Anders. in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 76.—Ruman.
somalensis *Chiov. Fl. Somala*, II. 171 (1932).—Somal. Ital.

SOPUBIA Buch.-Ham. (Scrophulariac.).
angustifolia (*Engl.*) *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 91 (1935): S. lanata var. angustifolia.
cephalostachya *Mildbr. in Sitzb. Akad. Wiss. Berlin*, xxxix. 999 (1909), in obs., nomen.—Afr. centr.
Scaettae *Staner in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiv. 221 (1933).—Congo Belg.

SORANTHUS Ledeb. (Umbellif.).
peucedanifolius *Woronow in Fl. Yugo-Vost.* v. 823 (1931); cf. *Krylov, Fl. Sibir. Occ.* viii. 1997 (1935).—Sibir.

SORBUS L. (Rosac.).
astateria (*Cardot*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 466 (1933), in obs.: Pyrus astateria.
canescens *Rouy ex Issler in Bull. Soc. Dendr. France*, 1933, 71, in syn.: S. tomentosa.

SORBUS:—
diabolica *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 15.—Japon. (Kiushiu).
× fennosuecica *Markl. ex Eklund in Mem. Soc. Faun. Fl. Fenn.* 1933–4, No. 10, 41, 42 (1934).—Fennia.
filipes *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 472 (1933). —China (Yunnan).
glabrescens (*Cardot*) *Hand.-Mazz. l. c.* 469: Pyrus glabrescens.
hypoglauca (*Cardot*) *Hand.-Mazz. l. c.* 468: Pyrus hypoglauca.
oligodonta (*Cardot*) *Hand.-Mazz. l. c.* 469: Pyrus oligodonta.
pachyphylla *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 15.—Japon. (Hondo).
pteridophylla *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 470 (1933).—China (Yunnan).
× Roopiana *Bordz. in Bull. Jard. Bot. Kieff*, xii–xiii. 131 (1931).—Armen.
tangoënsis *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 52, japonice.—Hab.?
thibetica (*Cardot*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 467 (1933): Pyrus thibetica.
trilocularis (*Hayata*) *Masamune in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard.* ii. 125 (1932): Pyrus Aucuparia var. trilocularis.
uzenensis *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 52, japonice.—Hab.?
yesoënsis *Nakai, Veg. Apoi*, 21, 54 (April, 1930), nomen subnudum; cf. *Hara in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 121, in syn.: S. commixta var. sachalinensis *Koidz.*

SORGHUM Moench. (Gramin.).
basiplicatum *Chiov. in Monogr. e Rapp. Colon.* No. 19 (*Col. Cereal. Colon. Eritrea*) 23, in obs., 37 (1912).—Erythraea.
basutorum *Snowden in Kew Bull.* 1935, 232.—Basutoland.
centroplicatum *Chiov. in Monogr. e Rapp. Colon.* No. 19 (*Col. Cereal. Colon. Eritrea*) 31 (1912). —Erythraea.
conspicuum *Snowden in Kew Bull.* 1935, 226.—Tanganyika Terr.
coriaceum *Snowden, l. c.* 240.—N. Rhodesia.
Dochna (*Forsk.*) *Snowden, l. c.* 234: Holcus Dochna.
dulcicaule *Snowden, l. c.* 247.—Congo Belg.
Durra (*Forsk.*) *Battand. & Trab. Fl. Algér.*, Monocot. 128 (1895), in clavi: Holcus Durra.
elegans (*Koern.*) *Snowden in Kew Bull.* 1935, 238: Andropogon Sorghum var. elegans.
eplicatum *Chiov. in Monogr. e Rapp. Colon.* No. 19 (*Col. Cereal. Colon. Eritrea*) 23, in obs., 28 (1912).—Erythraea.
exsertum *Snowden in Kew Bull.* 1935, 230.—N. Nigeria.
Friesii (*Pilger*) *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 109: Andropogon Friesii.
gambicum *Snowden in Kew Bull.* 1935, 229.—Gambia.
japonicum (*Hackel*) *Roshev. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 20, 739 (1934): Andropogon Sorghum subvar. japonicus.
leiocladum (*Hackel*) *C. E. Hubbard ex Vickery in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, 1935, lx. 357: Andropogon australis var. leiocladus.
medioplicatum *Chiov. in Monogr. e Rapp. Colon.* No. 19 (*Col. Cereal. Colon. Eritrea*) 23 (1912), in obs.—Erythraea.
mellitum *Snowden in Kew Bull.* 1935, 225.—N. Nigeria.
membranaceum *Chiov. in Monogr. e Rapp. Colon.* No. 19 (*Col. Cereal. Colon. Eritrea*) 23 (1912), in obs.—Erythraea.
miliiforme (*Hackel*) *Snowden in Kew Bull.* 1935, 237: Andropogon Sorghum var. miliiformis.
nervosum *Chiov. in Monogr. e Rapp. Colon.* No. 19 (*Col. Cereal. Colon. Eritrea*) 47 (1912).—Erythraea.
nigricans (*Ruiz & Pav.*) *Snowden in Kew Bull.* 1935, 244: Milium nigricans.
nitens (*Busse & Pilger*) *Snowden, l. c.* 224: Andropogon Sorghum var. nitens.
notabile *Snowden, l. c.* 239.—N. Nigeria.
propinquum (*Kunth*) *Hitchcock in Lingnan Sc. Journ.* vii. 249 (1931): Andropogon propinquus.

SORGHUM:—
rigidum *Snowden in Kew Bull.* 1935, 248.—Sudan. Brit.
Rollii *Chiov. in Monogr. e Rapp. Colon.* No. 19 (*Col. Cereal. Colon. Eritrea*) 26 (1912), in obs.—Afr.
sativum (*Hackel*) *Battand. & Trab. Fl. Algér.*, Monocot. 128 (1895): Andropogon Sorghum subsp. sativus.
simulans *Snowden in Kew Bull.* 1935, 237.—Nyasaland.
splendidum (*Hackel*) *Snowden, l. c.* 233: Andropogon Sorghum var. splendidus.
Stapfii (*Hook. f.*) *C. E. C. Fischer in Gamble, Fl. Madras*, 1735 (1934): Andropogon Stapfii.
technicum (*Koern.*) *Battand. & Trab. Fl. Algér.*, Monocot. 128 (1895), in clavi: Andropogon Sorghum var. technicus.

SORINDEIA Thou. (Anacardiac.).
calantha *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 85 (1934).—Tanganyika Terr.
deliciosa *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 507 (1928), in clavi; *Hutchinson & Dalziel in Kew Bull.* 1929, 27, descr.—Côte d'Ivoire; Nigeria.
Gossweileri *Exell in Journ. Bot.* 1932, lxx. Suppl. 1, 227.—Angola.
nitida *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 189 (1921), in obs. —Cameroons.

SOROCEA A. St.-Hil. (Morac.; Urticac., Gen. Pl.).
Briquetii *Macbride in Candollea*, iv. 311 (1931).—Peruv.
opima *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 64 (1931).—Peruv.
Sprucei (*Baill.*) *Macbride, l. c.* 16: Pseudosorocea Sprucei.
stenophylla *Standley in Tropical Woods*, 1935, No. 43, 18.—Bras. (Pará).
uaupensis (*Baill.*) *Macbride in Candollea*, v. 349 (1934): Pseudosorocea uaupensis.

SOYAUXIA Oliv. (Flacourtiac.; Passiflorac., Gen. Pl.).
bipindensis *Gilg ex E. G. Baker*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 170 (1927), in clavi. —Nigeria; Cameroons.

SPACHELODES Kimura in Journ. Jap. Bot. 1935, xi. 832: **Elodes** Spach in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. 171 (1836), non Adans. (Guttif.).
Elodes (*Huds.*) *Kimura, l. c.*: Hypericum Elodes.

SPARATTANTHELIUM Mart. (Hernandiac.; Combretac., Gen. Pl.).
guianense *Sandwith in Kew Bull.* 1932, 225.—Guiana Brit.
septentrionale *Sandwith, l. c.* 226.—Mexico.

SPARAXIS Ker-Gawl. (Iridac.).
Herbertii *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 990 (1895), in syn.: Freesia refracta.
Pillansii *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1932, xxii. 57, 59.—Afr. austr. (Cape Prov.).

SPARGANIUM L. (Sparganiac.; Typhac., Gen. Pl.).
nipponicum *Makino*; *Makino in Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 1, 523 (1925); *et l. c.* ed. 2, 1279 (1931), japonice.—Japon.

SPARMANNIA L. f. (Tiliac.).
Wittei *Staner in De Wild. & Staner, Contrib. Fl. Katanga*, Suppl. iv. 55 (1932).—Congo Belg.

SPARTINA Schreb. (Gramin.).
intermedia *Bosc ex St.-Yves in Candollea*, v. 50 (1932), pro syn.: S. maritima.
× longispica *Hauman & Parodi ex St.-Yves, l. c.* 27, 92.—Argent.; Urug.
platensis *Mez ex St.-Yves, l. c.* 86, in obs., nomen. —Argent.

SPATHANTHUS Desv. (Rapateac.).
bicolor *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 28 (1935).—Bras. (Amaz.).

SPATHICHLAMYS R. N. Parker in Kew Bull. 1931, 42. *RUBIACEAE.*
oblonga *R. N. Parker, l. c.* 43.—Burma.

SPATHIGER Small (Orchidac.).
strobilifer (*Reichb. f.*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 390 (1933): Epidendrum strobiliferum.

SPATHIPHYLLUM Schott (Arac.).
juninense *K. Krause in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 615 (1932).—Peruv.

SPATHOGLOTTIS Blume (Orchidac.).
confusa *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 122 (1932).—Borneo.
Doctersii *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 18 (1935).—N. Guin.
eburnea *Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 685.—Cambodia.
patentibractea *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 180 (1934).—N. Guin.

SPECULARIA A. DC. (Campanulac.).
Juliani *Battand. in Battand. & Trabut, Fl. Algér.*, Dicot., App. II. p. xiv. (1890), nomen provis.—Alger.
melillensis *Sennen in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 192, in obs., nomen.—Marocc.

SPEEA Loes. (Liliac.).
humilis (*R. Phil.*) *Loes. ex K. Krause in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xv a. 326 (1930): Geanthus humilis.

SPEGAZZINIA Backeb. in Kakteenfreund, ii. Nos. 9 & 10 (1933); cf. Backeb. Blätter Kakteenforsch. 1934, Pt. 4, [p. 3]. *CACTACEAE.*
Cumingii (*Hopffer*) *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 12, [p. 3]: Echinocactus Cumingii.
Fidaiana *Backeb. in Kakteenfreund*, ii. Nos. 9 & 10 (1933); cf. *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 4, [pp. 3, 4].—Boliv.
Neumanniana *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 4, [p. 3], in obs.; *et l. c.* 1935, Pt. 12, [p. 4]; *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 299, 417 (1935).—Boliv.; Argent.

SPERGULA L. (Caryophyllac.).
Lebeliana (*Rouy*) *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1935, xxvi. 191, in obs.: Spergularia Lebeliana.
pycnorrhiza (*Fouc. ex Battand.*) *Maire, l. c.* 190, cum descr. ampl.: Spergularia pycnorrhiza.
rosea *Blatter in Journ. & Proc. As. Soc. Beng.* 1930, n. s. xxvi. 341 (1931).—Ind. or. (Bombay).
seminulifera (*Hy*) *Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc*, ii. 211 (1932): Spergularia seminulifera.
tenuifolia (*Pomel*) *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1935, xxvi. 191: Spergularia tenuifolia.

SPERGULARIA J. & C. Presl (Caryophyllac.).
Caballeroi *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 22 [1933], nomen.—Marocc.
Foucaudiana *Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1932–3, Sér. II. xxv. 336 (1934), in obs.—Gallia.
pycnorrhiza *Fouc. ex Battand. Fl. Algér.*, Suppl. Phan. 29 (1910), nomen subnudum.—Alger.
Rodrigoi *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 22 [1933], nomen.—Marocc.
sanaryensis *Beauverd & Goutaland ex Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1932–3, Sér. II. xxv. 335 (1934), in obs.—Gallia.
Valeriani *Sennen in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 193, in obs., nomen.—Marocc.

SPERMACOCE L. (Rubiac.).
costata *Roxb. Hort. Beng.* 10 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 376 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 370 (1832).—Ins. Molucc.
exserta *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 374; *et l. c.* 368.—Ind. or. (Madras).
glabra *Roxb. l. c.* 83, nomen; *et l. c.*; *et l. c.*—Penins. Mal.
jaliscensis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 67 (1933–5).—Mexico.
laevis *Roxb. Hort. Beng.* 10 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 374 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 368 (1832).—Ind. or. (Bengal).
lineata *Roxb. l. c.* 83, nomen; *et l. c.* 375; *et l. c.* 369.—Ins. Molucc.
Martiana *Colla, Herb. Pedem.* iii. 146 (1834).—Bras.
nana *Roxb. Hort. Beng.* 83 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 375 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 369 (1832).—Ins. Molucc. (Honimoa).
nervata *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 145 (1834).—Bras.
pusilla *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 379 (1820).—Nepal.

SPERMACOCE:—
semierecta *Roxb. Hort. Beng.* 10 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 377 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 371 (1832).—Sumatra.
teres *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 373; *et l. c.* 367.—Ind. or. (Coorg).

SPHAERALCEA A. St.-Hil. (Malvac.).
americana (*L.*) *M. C. Metz in Contrib. Biol. Lab. Catholic Univ. Amer.* xvi. 142 (1934); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 145: Malva americana.
Schenckii *Ulbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 523 (1932).—Mexico.
scoparia (*L'Hérit.*) *Tidestr. in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1935, xlviii. 41: Malva scoparia.

SPHAERANTHUS L. (Compos.).
kalahariensis *Bremek. & Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xvi. 439 (1935).—Bechuanaland Protect.

SPHAEROCARYA Wall. in Roxb. Fl. Ind., ed. Carey & Wall., ii. 371 (1824). *SANTALACEAE.*
edulis *Wall. l. c.*—Nepal.

SPHAEROMARISCUS E. G. Camus in Lecomte, Not. Syst. i. 239 (1910); et in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine, vii. 79 (1912). *CYPERACEAE.*
microcephalus (*J. & C. Presl*) *E. G. Camus in Lecomte, Not. Syst.* i. 239 (1910), in obs.: Mariscus microcephalus.

SPHAEROSTYLIS Baill. (Euphorbiac.).
cordata (*Merrill*) *Pax & K. Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix c. 148 (1931): Megistostigma cordatum.

SPHAEROTHYLAX Bisch. (Podostemac.).
linearifolius *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 275 (1915), in obs.—Cameroons.

SPHALMANTHUS N. E. Brown (Ficoidac.).
Herberti *N. E. Brown in Cactus Journ.* ii. 70 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).

SPHENODESME Jack (Verbenac.).
amethystina *Dop in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse*, 1932, lxiv. 573.—Indo-China (Anam).
annamitica *Dop, l. c.*—Indo-China (Anam).

SPHENOGYNE R. Br. (Compos.).
calendulacea *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 541 (1894), in syn.: Ursinia calenduliflora.

SPHENOPHOLIS Scribn. (Gramin.).
longiflora (*Vasey*) *Hitchcock in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1933, xxiii. 453: Eatonia pennsylvanica var. longiflora.

SPHENOSTYLIS E. Mey. (Legumin.).
calantha *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 818 (1933).—Tanganyika Terr.
congensis *A. Cheval.*; *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 257 (1917), latine.—Congo Gall.

SPHYRANTHERA Hook. f. (Euphorbiac.).
lutescens (*Kurz*) *Pax & K. Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix c. 231 (1931): Codiaeum lutescens.

SPHYRARHYNCHUS Mansf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xii. 706 (1935). *ORCHIDACEAE.*
Schliebenii *Mansf. l. c.*—Tanganyika Terr.

SPHYROSPERMUM Poepp. & Endl. (Ericac.; Vacciniac., Gen. Pl.).
grandifolium (*Hoerold*) *A. C. Smith in Brittonia*, i. 211 (1933): Sophoclesia grandifolia.
Klotzschianum (*Mansf.*) *A. C. Smith, l. c.* 212: Sophoclesia Klotzschiana.
microphyllum *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 133 (1934).—Ecuador.
muscicola (*Hook.*) *A. C. Smith in Brittonia*, i. 215 (1933): Vaccinium muscicola.
Sodiroi (*Hoerold*) *A. C. Smith, l. c.* 211: Sophoclesia Sodiroi.
Spruceanum *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 133 (1934).—Ecuador.
Standleyi *A. C. Smith in Brittonia*, i. 210 (1933).—Costa Rica.
Weberbaueri (*Hoerold*) *A. C. Smith, l. c.* 212: Sophoclesia Weberbaueri.

SPIGELIA L. (Loganiac.).
Gilgii *Macbride in Candollea*, vi. 18 (1934): S. nervosa *Gilg.*

SPILOXENE Salisb. (Amaryllidac.).
alba (*L. f.*) *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 76 (1932): Hypoxis alba.
aquatica (*L. f.*) *Fourc. l. c.*: Hypoxis aquatica.
minuta (*L. f.*) *Fourc. l. c.*: Hypoxis minuta.
trifurcillata (*Nel*) *Fourc. l. c.*: Ianthe trifurcillata.

SPIRAEA L. (Rosac.).
amabilis *Koidz. in Y. Doi, Fl. Satsum.* ii. 102 (1931).—Japon.
assurgens (*Vilmorin*) *Bean, Trees & Shrubs Brit. Isles*, iii. 462 (1933): Sorbaria assurgens.
compsophylla *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 450 (1933).—China (Yunnan).
grandifolia (*Tatewaki*) *Nakai, Veg. Apoi*, 29, 53 (1930), nomen subnudum; *Hara in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 118: S. betulifolia var. grandifolia.
hypoglauca *Koidz. in Y. Doi, Fl. Satsum.* ii. 102 (1931).—Japon.
Miyajimensis *Makino in Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 1, 838 (1925); *et l. c.* ed. 2, 536 (1931), japonice.—Japon.
Nishimurae *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 610.—Manchur.
pruniflora *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 469.—Japon.
purpurea *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 453 (1933).—China (Yunnan).
robusta *Hand.-Mazz. l. c.*: S. callosa *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 324 (1878), non *Thunb.*
siccanea (*W. W. Smith*) *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 205: S. yunnanensis var. siccanea.
sikokualpina *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 150.—Japon. (Shikoku).
sinensis *Lour. ex Gomes in Mem. Acad. Sc. Lisb. Cl. Sc. Pol. Mor. Bel.-Let.* n. s. iv. (1), 29 (1868); *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 17, 177 (1935), in syn.: S. cantoniensis.
sublobata *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 451 (1933).—China (Szechuan).

SPIRAEANTHEMUM A. Gray (Cunoniac.; Saxifragac., Gen. Pl.).
Parksii *Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 83, 10 (1931).—Ins. Viti.
serratum *Gillespie, l. c.* 11.—Ins. Viti.

SPIRANTHES L. C. Rich. (Orchidac.).
durangensis *Ames & C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* iii. 128 (1935): S. saltensis *Ames.*
ochroleuca (*Rydb.*) *Rydb. Fl. Prairies & Plains Centr. N. Amer.* 241 (1932): Gyrostachys ochroleucus.

SPIRODELA Schleiden (Lemnac.).
biperforata *W. Koch in Ber. Schweiz. Bot. Ges.* xlii. 188 (1933).—Guiana Bat.
intermedia *W. Koch, l. c.* xli. 114 (1932).—Urug.

SPIRORHYNCHUS Kar. & Kir. (Crucif.).
Bulleri (*Burkill*) *O. E. Schulz in Engl. Jahrb.* lxvi. 98 (1933): Anguillicarpus Bulleri.

SPITZELIA Sch. Bip. (Compos.).
Faurei *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 147 [1933], nomen.—Marocc.

SPODIOPOGON Trin. (Gramin.).
involutus (*Steud.*) *W. Watson in Atkinson, Gaz. N.W. Ind.* 392 (1882): Andropogon involutus.
tenuis *Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. II. (*Contrib. Cogn. Fl. Mansh.*) 122 (1935).—Manchur.

SPONDIAS L. (Anacardiac.).
chinensis (*Merrill*) *Metcalf in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 270: Poupartia chinensis.
venosa *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* ii. 37 (1834).—Bras.

SPOROBOLUS R. Br. (Gramin.).
albomarginatus *Stent & Rattray in Proc. Rhodes. Scientif. Assoc.* xxxii. (*Stent & Rattray, Grasses S. Rhodes.*) 51 (1933).—S. Rhodesia.
angustus *Mez ex Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. 1. 282 (1931), in clavi.—Tanganyika Terr.

SPOROBOLUS:—
bechuanicus *Goossens in Kew Bull.* 1934, 197.—Bechuanaland Protect.
complanatus *Scribn. ex Beal, Grasses N. Amer.* ii. 310 (1896), in syn.: Epicampes Bourgaei.
confinis (*Steud.*) *Chiov. in Annuar. Ist. Bot. Roma,* viii. 341 (1908): Vilfa confinis.
Conrathii *Chiov. in Ann. Bot., Roma,* xiii. 49 (1914): S. micranthus *Conrath & Hackel.*
Eylesii *Stent & Rattray in Proc. Rhodes. Scientif. Assoc.* xxxii. (*Stent & Rattray, Grasses S. Rhodes.*) 52 (1933).—S. Rhodesia.
farinosus *Hosokawa in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan,* 1935, vii. 321.—Ins. Marian.
filipes *Stapf ex C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1933, 105, in obs.—Afr. trop. or. (Elgon).
kenyensis *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya,* 133 (1935).—Kenya Col.
macranthela *Chiov. Fl. Somala,* II. 452 (1932).—Somal. Ital.
macrospermus *Scribn. ex Beal, Grasses N. Amer.* ii. 302 (1896).—Mexico.
microspermus (*Lag.*) *Hitchcock in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1933, xxiii. 453: Milium microspermum.
modestus *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. 1. 288 (1931), sphalm.: S. flagellifer.
ovatus *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 300 (1896): S. minor *Vasey.*
ozarkanus *Fernald in Rhodora,* 1933, xxxv. 109.—U.S.A. (Missouri).
Poiretii (*Roem. & Schult.*) *Hitchcock in Bartonia,* 1932, No. 14, 32: Axonopus Poiretii.
praecox *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1934, xiv. 113.—Guinea Gall.
psammophilus *Stent & Rattray in Proc. Rhodes. Scientif. Assoc.* xxxii. (*Stent & Rattray, Grasses S. Rhodes.*) 51 (1933).—S. Rhodesia.
rhodesiensis *Stent & Rattray, l. c.* 50.—S. Rhodesia.
Schlechteri *Schweickerdt in Kew Bull.* 1935, 208.—Transvaal; Orange Free State.
Schliebenii *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 656 (1932).—Tanganyika Terr.
uniglumis *Stent & Rattray in Proc. Rhodes. Scientif. Assoc.* xxxii. (*Stent & Rattray, Grasses S. Rhodes.*) 52 (1933).—Rhodesia.
virgatus *Mez ex Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. 1. 292 (1931), nomen.—Tanganyika Terr.

SPRAGUEA Torr. (Portulacac.).
caespitosa *Rydb. in N. Am. Fl.* xxi. 318 (1932).—U.S.A. (Calif.).
Hallii *Rydb. l. c.*—U.S.A. (Calif.).
irregularis *Rydb. l. c.*—U.S.A. (Calif.).
monosperma (*Greene*) *Rydb. l. c.* 319: Calyptridium monospermum.

SPRYGINIA Popov in Trav. Turkest. Univ., Tashkent, No. 4 (Vég. Monts Sary-Taou, etc.) 35 (1922), in obs.; et in Trans. Sc. Soc. Turk. i. 35 (1923), descr. *CRUCIFERAE.*
Winkleri (*Regel*) *Popov, l. c.,* in obs.; *et l. c.*: Moricandia Winkleri.

SPURIODAUCUS C. Norman (Umbellif.).
asper *C. Norman in Journ. Bot.* 1932, lxx. 137.—Congo Belg.

SQUAMARIA Zinn, Cat. Pl. Gott. 277 (1757); cf. Sprague in Kew Bull. 1934, 219: **Lathraea** L. (Orobanchac.).

STACHIOPSIS Popov & Vved. ex Ikonnik.-Galitzky (Labiat.).
[Vide STACHYOPSIS.]

STACHYANTHUS Engl. (Icacinac.; Olacac., Gen. Pl.).
cuneatus *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 263 (1921), in obs.—Cameroons.

STACHYCARPITES Ogura in Bot. Mag., Tokyo, 1932, xlvi. 417, japonice. *PINACEAE.*
projectus *Ogura, l. c.,* japonice.—Japon.

STACHYOPSIS Popov & Vved. in Trans. Sc. Soc. Turk. i. 120 (1923). *LABIATAE.*
lamiiflora (*Rupr.*) *Popov & Vved. l. c.* 122: Stachys lamiiflora.
oblongata (*Schrenk*) *Popov & Vved. l. c.* 121: Phlomis oblongata.

STACHYS L. (Labiat.).
aperta *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxx. 37 (1934); *et l. c.* lxxxv. 10 (1935).—Peruv.
arguta *Rydb. Fl. Prairies & Plains Centr. N. Amer.* 690 (1932).—U.S.A. (Minnesota).
astracanica *Bellardi ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 448 (1835).—Hab.?
borealis *Rydb. in Brittonia,* i. 95 (1931).—Canada (Mackenzie Distr.); U.S.A. (Minnesota).
brevidens *Rydb. l. c.*—U.S.A. (Minnesota).
× Caballeroi *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 147 [1933].—Marocc.
carlittensis *Sennen; Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1932, xxxi. 54, descr.—Hispan.
divaricatidens *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 133 (1932).—Marocc.
elegans *Bellardi ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 448 (1835).—Ital.?
eremicola *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxx. 30 (1934); *et l. c.* lxxxv. 10 (1935): S. crenata *R. Phil.*
exilis *Epling, l. c.* lxxx. 25 (1934).—Mexico.
Fomini *Sosn. ex Grossheim, Fl. Kavkaza,* iii. 313 (1932), rossice; *Sosn. in Trud. Azerb. Otdyel. Zakavk. Fil. Akad. Nauk SSSR,* Sect. Bot., i. 43 (1933), latine.—Transcaucas.
Foucauldiana *Maire & Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 93 [1933], nomen.—Marocc.
globosa *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxx. 25 (1934).—Mexico.
Gossweileri *G. Taylor in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl. 2, 167.—Angola.
Grayana *House in Bull. N. Y. State Mus.* 1920, Nos. 233–4, 60 (1921): S. ambigua *Britton.*
guatemalensis *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxx. 34 (1934).—Guatem.
hamata *Epling, l. c.* 49.—Colomb.
hebens *Epling, l. c.* 35.—Colomb.
Herrerae *Epling, l. c.* 18; *et l. c.* lxxxv. 8 (1935).—Peruv.
homotricha (*Fernald*) *Rydb. in Brittonia,* i. 95 (1931): S. palustris var. homotricha.
inclusa *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxx. 12 (1934).—Mexico.
Moureti *Battand. & Pitard in Pitard, Contrib. Étude Fl. Maroc,* 32 (1918).—Marocc.
nubilorum *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxx. 48 (1934).—Guatem.
platyodon *Coss. ex Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc,* iii. 638 (1934), in syn.: S. saxicola subsp. platyodon *Maire.*
pseudoarenaria *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 93 [1933], nomen.—Marocc.
puberula (*Jennings*) *Rydb. in Brittonia,* i. 96 (1931): S. palustris var. puberula.
pustulosa *Rydb. l. c.* 95.—U.S.A. (Wisconsin; Minnesota; Iowa; Kansas).
radicans *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxx. 24 (1934); *et l. c.* lxxxv. 9 (1935).—Mexico; Colomb.
remota *Epling, l. c.* lxxxv. 10 (1935).—Colomb.
Riddellii *House in Bull. N. Y. State Mus.* 1920, Nos. 233–4, 60 (1921): S. cordata *Riddell.*
Schtschegleevii *Sosn. ex Grossheim, Fl. Kavkaza,* iii. 314 (1932), in syn.: S. inflata var. caucasica *Schtschegleev.*
Schweinitzii *Rydb. in Brittonia,* i. 95 (1931): S. velutina *Schweinitz.*
tenerrima *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxx. 32 (1934).—Calif. infer.
Tenoreana *Bornm. in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 81.—Ital. (Ins. Capri).
urticoides *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxxv. 12 (1935).—Colomb.
veronicifolia *Davy ex Jepson, Man. Fl. Pl. Calif.* 878 (1925).—U.S.A. (Calif.).
Vincentii *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 93 [1933], nomen.—Marocc.
vulcanica *Epling in Fedde, Repert. Beih.* lxxx. 33 (1934).—Mexico.
zappanioides *Woronow in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS,* Ser. I. Fasc. 1, 221 (1933).—Caucas.

STACHYTARPHETA Vahl (Verbenac.).
brasiliensis *Moldenke in Fedde, Repert.* xxxvii. 239 (1934).—Bras. (Minas Geraes).
dichotoma (*Baill.*) *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1935, xv. 1075, 1076, in obs., cum descr.: Ubochea dichotoma.

STACHYTARPHETA:—
miniacea *Moldenke in Phytologia,* i. 170 (1935).—Brit. Honduras.

STADMANNIA Lam. (Sapindac.).
depressa *Fr. Allem. ex Peckolt in Ber. Deutsch. Pharm. Ges.* xii. 109 (1902); cf. *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 1060, 1064 (1933).—Bras. (Amaz.).

STAELIA Cham. & Schlecht. (Rubiac.).
Hassleri *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., viii. 386 (1931): S. filifolia *Chod. & Hassl.*
scabra (*C. Presl*) *Standley, l. c.* 385: Diphragmus scaber.

STAHLIA Bello (Legumin.).
monosperma (*Tul.*) *Urb. Symb. Antill.* ii. 285 (1900), in obs.: Caesalpinia monosperma.

STANDLEYA Brade in Arch. Mus. Nac. Rio de Janeiro, 1932, xxxiv. 119. *RUBIACEAE.*
erecta *Brade, l. c.* 121.—Bras. (Rio de Janeiro).
Limae *Brade, l. c.*—Bras. (Rio de Janeiro).
prostrata (*K. Schum.*) *Brade, l. c.* 120: Lipostoma prostratum.

STANGERIA T. Moore (Cycadac.).
eriopus (*Kunze*) *Nash in Journ. N. Y. Bot. Gard.* 1909, x. 164, in obs.: Lomaria eriopus.
Sanderiana *Hort. ex Schuster in Engl. Pflanzenreich, Cycadac.* 105 (1932), in syn.: S. paradoxa.

STANLEYA Nutt. (Crucif.).
annua *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 17, 25 (1930).—U.S.A. (Oregon).

STAPELIA L. (Asclepiadac.).
arenosa *Luckhoff in S. Afr. Gard.* 1935, xxv. 96.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Beukmanii *Luckhoff, l. c.* 1934, xxiv. 101, 106, in adnot.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Beukmanii *Luckhoff, l. c.* 1935, xxv. 96, non praec.—Afr. austr. (Cape Prov.).
× cantabrigensis *A. Berger, Stapel. u. Klein.* 293 (1910).—Hort.
clavicorona *Verdoorn in Fl. Pl. S. Afr.* 1931, xi. t. 407.—Transvaal.
× comparabilis *A. White & Sloane, Stapel.* 111 (1933).—Hort.
cruciformis (sphalm. eruciformis) *Hort. ex N. E. Brown in Gard. Chron.* 1875, iii. 136, pro syn.: S. olivacea.
cylista *Luckhoff in S. Afr. Gard.* 1933, xxiii. 139, 140.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Decaisneana (*Lemaire*) *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1934, xiv. 262: Boucerosia Decaisneana.
forcipis *Phillips & Letty in Fl. Pl. S. Afr.* 1932, xii. t. 460.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Herrei *Nel in Kakteenk.* 1933, 69.—Little Namaq.
Longii *Luckhoff in S. Afr. Gard.* 1935, xxv. 95, 96.—Afr. austr. (Cape Prov.).
longipes *Luckhoff, l. c.* 1934, xxiv. 243, 245.—Afr. austr.-occ.
Maccabeana *A. White & Sloane, Stapel.* 166 (1933).—Afr. austr.
Margarita *Sloane in A. White & Sloane, l. c.* 165.—Afr. austr.
marientalensis *Nel in Kakteenk.* 1935, 118.—Afr. austr.-occ.
× Milleri *Hort. ex A. White & Sloane, Stapel.* 198 (1933): S. mutabilis forma.
panifolia *Hort. ex Rüst in Monatsschr. Kakteenk.* 1896, vi. 38, in clavi.—Hort.
polita *Hort. ex N. E. Brown in Gard. Chron.* 1876, vi. 130, pro syn.: Duvalia polita.
semota *N. E. Brown in Cact. & Succ. Journ. Amer.* iv. 393 (1933).—Tanganyika Terr.
tigrina *Nel in Kakteenk.* 1933, 133.—Little Namaq.
tomentosa *Hort. ex A. White & Sloane, Stapel.* 200 (1933), in syn.: S. tsomoënsis.
Wilmaniae *Luckhoff in S. Afr. Gard.* 1933, xxiii. 139, 140.—Transvaal.
Youngii *N. E. Brown in Kew Bull.* 1931, 43.—S. Rhodesia.

STAPELIANTHUS Choux in Ann. Mus. Col. Marseille, 1934, Sér. V. ii. Fasc. 3, p. 6, in obs., et in adnot.: **Stapeliopsis** Choux (Asclepiadac.).
Decaryi *Choux, l. c.* p. 7.—Madag.
madagascariensis (*Choux*) *Choux, l. c.* p. 6, in obs.: Stapeliopsis madagascariensis.

STAPELIOPSIS Choux in Compt. Rend. 1931, cxciii. 1444, 1446. *ASCLEPIADACEAE.*
madagascariensis *Choux, l. c.* 1444; *et in Ann. Mus. Col. Marseille,* 1932, Sér. IV. x. Fasc. 2, pp. 6, 9.—Madag.

STAPELIOPSIS Phillips in Fl. Pl. S. Afr. 1932, xii. t. 445, non praec. *ASCLEPIADACEAE*
Cooperi (*N. E. Brown*) *Phillips, l. c.*: Stapelia Cooperi.

STAPFIELLA Gilg (Flacourtiac.).
ulugurica *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 943 (1933).—Tanganyika Terr.

STAPHYLEA L. (Staphyleac.; Sapindac., Gen. Pl.).
Hessei *Hort. ex Pollanetz in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1933, xlviii. 253, 254, in obs.—Hort.

STATICE L., pro parte (Plumbaginac.).
[ARMERIA Willd.]
alpinifolia (*Pau & Font Quer*) *Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc,* iii. 566 (1934): Armeria alpinifolia.
amplifoliata (*Pau*) *Maire, l. c.* 565: Armeria amplifoliata.
ancarensis (*Merino*) *Rothmaler in Cavanillesia,* vii. 118 (1935): Armeria ancarensis.
Apollinaris *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 143 [1933], in syn.: Armeria Apollinaris.
asturiana *Rothmaler in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.* 1934, xxxiv. 154: Armeria Duriaei.
caput-alba *Rothmaler in Cavanillesia,* vii. 118 (1935).—Hispan.
castellana *Rothmaler in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.* 1934, xxxiv. 154.—Hispan.
ciliata (*Lange*) *Rothmaler, l. c.*: S. Duriaei subsp. ciliata.
dianthodes *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss,* i. 618 (1895), in syn.: Armeria plantaginea.
ebracteata (*Pomel*) *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord,* 1931, xxii. 56: Armeria ebracteata.
filicaulis (*Boiss.*) *Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc,* iii. 566 (1934): Armeria filicaulis.
gaditana (*Boiss.*) *Jahandiez & Maire, l. c.* 565: Armeria gaditana.
hirta (*Willd.*) *Rothmaler in Cavanillesia,* vii. 117 (1935): Armeria hirta.
lachnolepis (*Pomel*) *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord,* 1931, xxii. 304, in obs.: Armeria lachnolepis.
Langei (Boiss.) *Rothmaler in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.* 1934, xxxiv. 153: Armeria Langei.
longiaristata (*Boiss. & Reut.*) *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord,* 1931, xxii. 304: Armeria longiaristata.
Quichiotis *Gonz.-Albo in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.* 1934, xxxiv. 163.—Hispan.
villosa (*Girard*) *Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc,* iii. 567 (1934): Armeria villosa.
Welwitschii (*Boiss.*) *G. Sampaio, Herb. Portug.* 100 (1913): Armeria Welwitschii.

STATICE L., pro parte (Plumbaginac.).
[LIMONIUM Mill.]
akkensis *Coss. ex Battand. Contrib. Fl. Atlant.* 77 (1919).—Marocc.
Diegoi *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 110.—Hispan.
ebusitana *Font Quer in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1925, xxv. 100.—Ins. Balear. (Ibiza).
Fausti *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 97 [1933], nomen.—Marocc.
flexuosa *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 104.—Hispan.
florida *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo,* 1934, xlviii. 107.—Manchur.
Gabrieli *Bornm. in Fedde, Repert.* xxxvi. 170 (1934). —Persia.
Gavilae *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 97 [1933].—Marocc.
glauca (*Boiss.*) *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona,* xii. 383 (1929): S. globulariifolia var. glauca.
Gomezi-Jordanae *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 97 [1933], nomen, hybr. ?—Marocc.
ifniensis *Caballero in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid,* Ser. Bot., No. 28, 11 (1935).—Marocc.

STATICE:—
laxiflora (*Boiss.*) *Novopokr. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS,* 1931, xxx. 239 (1932), in obs.: S. Gmelini var. laxiflora.
Molesi *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 97 [1933], nomen.—Marocc.
Moureti *Pitard, Contrib. Étude Fl. Maroc,* 33 (1918).—Marocc.
Reinwardtii *Hort. ex Lanza in Lav. Ist. Bot. Palermo,* 1932, iii. 51, in obs.—Hort.
Ruizii *Font Quer in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1933, xxxiii. 111.—Hispan.
sanjurjensis *Sennen in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord,* 1932, xxiii. 275, in obs., nomen.—Marocc.
sanjurjoi *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 97 [1933], nomen.—Marocc.
sogdiana *Popov in Trav. Turkest. Univ., Tashkent,* No. 4 (*Vég. Monts Sary-Taou, etc.*) 35 (1922), in obs.—Turkestan.
urgellensis *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 104, in adnot.: S. flexuosa *Sennen.*

STAUNTONIA DC. (Lardizabalac.; Berberidac., Gen. Pl.).
alata *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 23 (1934). —China (Kwangtung).
maculata *Merrill, l. c.* 24.—China (Kwangtung).
trinervia *Merrill, l. c.*—China (Kwangtung).

STAURACANTHUS Link (Legumin.).
genistoides (*Brot.*) *G. Sampaio in Ann. Acad. Polyt. Porto,* vii. 53 (1912): Ulex genistoides.

STAURANTHERA Benth. (Gesneriac.).
Tsiangiana *Hand.-Mazz. in Sinensia,* v. 19 (1934). —China (Kweichau).

STAUROGLOTTIS Schau. (Orchidac.).
riteiwanensis *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa,* 1934, xxiv. 213, in syn.: Phalaenopsis riteiwanensis.

STAUROGYNE Wall. (Acanthac.).
amoena *Benoist in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1933, Sér. II. v. 173.—Indo-China (Anam).
Balansae *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine,* iv. 634 (1935).—Indo-China (Tonkin).
brachystachya *Benoist in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1933, Sér. II. v. 174.—Indo-China (Tonkin).
brevicaulis *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine,* iv. 625 (1935).—Indo-China (Laos; Cochinch.).
capitata *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1935, 284.—Liberia; Gold Coast.
chapaënsis *Benoist in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1933, Sér. II. v. 172.—Indo-China (Tonkin).
kamerunensis (*Engl.*) *Benoist in Lecomte, Not. Syst.* ii. 290 (1913): Zenkerina kamerunensis.
major *Benoist in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1933, Sér. II. v. 171.—Indo-China (Tonkin; Anam).
Petelotii *Benoist in Arch. Bot., Caen,* Bull. 1930, iv. 75.—Indo-China (Tonkin).
stenophylla *Merrill & Chun in Sunyatsenia,* ii. 322 (1935).—China (Hainan).
subcordata *Benoist in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1933, Sér. II. v. 173.—Indo-China (Tonkin; Anam).
tenera *Benoist, l. c.* 174.—Indo-China (Anam).
vicina *Benoist, l. c.* 171.—Indo-China (Tonkin).

STAUROPSIS Reichb. f. (Orchidac.).
Wenzelii (*Ames*) *Ames & Quisumb. in Philipp. Journ. Sc.* 1933, lii. 467 (1934): Trichoglottis Wenzelii.

STEGANOTAENIA Hochst. (Umbellif.).
Hockii (*C. Norman*) *C. Norman in Journ. Linn. Soc., Bot.* xlix. 515 (1934): Peucedanum Hockii.

STEGANTHUS Knobl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xii. 116 (1934). *OLEACEAE.*
lanceus (*Lam.*) *Knobl. l. c.*: Olea lancea.
urophyllus (*Gilg*) *Knobl. l. c.*: Linociera urophylla.
Welwitschii (*Knobl.*) *Knobl. l. c.*: Mayepea Welwitschii.

STEGASTRUM Van Tiegh. (Loranthac.).
bahajense (*Korth.*) *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France,* 1895, xlii. 447, in obs.: Loranthus bahajensis.

STEGOLEPIS Klotzsch (Rapateac.).
linearis *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 335.—Venez.
pauciflora *Gleason, l. c.*—Venez.
pungens *Gleason, l. c.* 336.—Venez.

STEIRACTINIA Blake (Compos.).
penninervis *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 314.—Colomb.

STEIROTIS Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. vi. 79 (1820). *LORANTHACEAE.*

STELIS Sw. (Orchidac.).
crystallina *Ames in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* iii. 45 (1935).—Costa Rica.
gymnopoda *Schlechter ex Mansf. in Fedde, Repert. Beih.* lviii. t. 20, fig. 79 (1930), sine descr.—Am. austr.
latipetala *Ames in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* iii. 53 (1935).—Costa Rica.
Liebmannii *Reichb. f. ex Hemsl.*; *Ames, l. c.* ii. 1 (1934), descr.—Mexico.
pendulispica *Ames, l. c.* 85.—Costa Rica.
perparva *C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* iii. 77 (1935).—Guiana Brit.
persimilis *Ames in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* ii. 14 (1934).—Costa Rica.
Storkii *Ames, l. c.* iii. 54 (1935).—Costa Rica.
transversalis *Ames, l. c.* ii. 91 (1934).—Costa Rica.

STELLARIA L. (Caryophyllac.).
Bertolae *Colla, Herb. Pedem.* i. 346 (1833).—Ital. ?
Blatteri *Mattf. in Fedde, Repert.* xxxi. 334 (1933). —Ind. or. (Waziristan).
depressa *Schmid in Fedde, Repert.* xxxi. 41 (1932). —Kashmir; Tibet.
Fischeri *Pax in Engl. Jahrb.* xvii. 587 (1893).—Afr. or.
lagunensis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 65 (1933–5).—Calif. infer.
media *Vill. Hist. Pl. Dauph.* iii. 11. 615 (1789).—Reg. temp.
nipponica *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 83: S. florida var. angustifolia *Maxim.*
pallida (*Dumort.*) *Piré in Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.* ii. 48 (1863): Alsine pallida.
pterosperma *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 83.—Japon.
pusilla *Schmid in Fedde, Repert.* xxxi. 41 (1932).—Tibet.
tenella *Bellardi ex Colla, Herb. Pedem.* i. 349 (1833). —Ital. ?
tomentella *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 84: S. tomentosa *Maxim.*
turkestanica *Schischk. in Trav. Mus. Bot. Acad. Sc. URSS,* xxiv. 31 (1932).—Turkestan.
wutaica *Hand.-Mazz. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1931, lxxx. 340.—China (Shansi).

STELLARIA Zinn, Cat. Pl. Gott. 55 (1757); cf. Sprague in Kew Bull. 1934, 219: **Callitriche** L. (Haloragac.).

STEMMADENIA Benth. (Apocynac.).
rugosa *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 67 (1933–5).—Mexico.

STEMMATOPHYLLUM Van Tiegh. (Loranthac.).
grandifolium *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France,* 1894, xli. 547, in obs.—Ins. Societ. (Tahiti).

STEMODIA L. (Scrophulariac.).
macrotricha *Colla, Herb. Pedem.* iv. 327 (1835).—Bras.
verticillata (*Mill.*) *Boldingh, Zakfl. Landbouwstr. Java,* 165 (1916); *Sprague in Kew Bull.* 1921, 211: Erinus verticillatus.

STEMODIOPSIS Engl. (Scrophulariac.).
Scaettae *Staner in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiv. 220 (1933).—Congo Belg.

STEMONA Lour. (Stemonac.; Roxburghiac., Gen. Pl.).
cochinchinensis *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France,* 1934, lxxxi. 146.—Indo-China (Cochinch.).
ovata *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 296.—China.
phyllantha *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France,* 1934, lxxxi. 147.—Siam.
Pierrei *Gagnep. l. c.*—Indo-China (Laos; Cochinch.).

STEMONA:—
saxorum *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 148.—Indo-China (Tonkin).
squamigera *Gagnep. l. c.*—Indo-China (Laos).

STEMONOPORUS Thwait. (Dipterocarpac.).
cordifolius (*Thwâit.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 27 (1931): Monoporandra cordifolia.
elegans (*Thwait.*) *Alston, l. c.*: Monoporandra elegans.
zeylanicus (*Wight*) *Alston, l. c.* 26: Vateria ceylanica.

STEMONURUS Blume (Icacinac.; Olacac., Gen. Pl.).
Chingianus *Hand.-Mazz. in Sinensia*, ii. 3 (1931).—China (Kwangsi).
scorpiurus *Merrill in Journ. As. Soc. Straits*, Special No. p. 356 (1921), sphalm.: S. scorpioides.
tetrandrus (*Wall. ex Roxb.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 48 (1931): Lasianthera tetrandra.

STENACTIS Cass. (Compos.).
ramosa (*Walt.*) *Domin in Preslia*, xiii–xv. 226 (1935): Doronicum ramosum.

STENANTHERA Engl. & Diels (Annonac.).
bakuana *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 56 (1927), in clavi.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).

STENOCACTUS (K. Schum.) A. Berger (Cactac.). [Echinocactus subgen. Stenocactus K. Schum.]
albatus (*A. Dietr.*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 354 (1935): Echinocactus albatus.
confusus (*Britton & Rose*) *F. M. Knuth, l. c.*: Echinofossulocactus confusus.
dichroacanthus (*Mart. ex Pfeiff.*) *A. Berger ex Backeb. & F. M. Knuth, l. c.*: Echinocactus dichroacanthus.
gladiatus (*Link & Otto*) *A. Berger ex Backeb. & F. M. Knuth, l. c.*: Echinocactus gladiatus.
grandicornis (*Lem.*) *A. Berger ex Backeb. & F. M. Knuth, l. c.*: Echinocactus grandicornis.
lancifer (*A. Dietr.*) *A. Berger ex Backeb. & F. M. Knuth, l. c.*: Echinocactus lancifer.
Ochoterenanus *Tiegel in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1933, xlviii. 397.—Mexico.
tricuspidatus (*Scheidw.*) *A. Berger ex Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 355 (1935): Echinocactus tricuspidatus.
Vaupelianus (*Werderm.*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, l. c.*: Echinocactus Vaupelianus.

STENOCARPUS R. Br. (Proteac.).
acaciifolius *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1935, lxxxii. 279.—N. Caled.
Balansae *Guillaumin, l. c.* 280.—N. Caled.
dumbeënsis *Guillaumin, l. c.*—N. Caled.

STENODRABA O. E. Schulz (Crucif.).
colchaguensis (*Barnéoud*) *O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 644 (1932): Cardamine colchaguensis.

STENOGYNE Benth. (Labiat.).
calycosa *Sherff in Bot. Gaz.* xcvi. 142 (1934): S. sessilis var. 'γ' *Hillebr.*
glabrata (*Hillebr.*) *Sherff in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 701: S. rotundifolia var. glabrata.
scandens *Sherff in Bot. Gaz.* xcvi. 143 (1934).—Ins. Sandvic.
sororia *Sherff, l. c.* 142.—Ins. Sandvic.

STENOMESSON Herb. (Amaryllidac.).
Elwesii (*Baker*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 10 (1931): Callithauma viridiflorum var. Elwesii.
Macleanicum (*Herb.*) *Macbride, l. c.*: Clitanthes Macleanica.
variegatum (*Ruiz & Pav.*) *Macbride, l. c.* 11: Pancratium variegatum.

STENOPADUS Blake in Bull. Torr. Bot. Cl. 1931, lviii. 489. *COMPOSITAE.*
Connellii (*N. E. Brown*) *Blake, l. c.* 490, in obs.: Stifftia Connellii.
crassifolius *Blake, l. c.* 493.—Venez.
eurylepis *Blake, l. c.* 492.—Venez.
talaumifolius *Blake, l. c.* 491.—Venez.

STENOPHYLLUS Rafin. (Cyperac.).
argentinus (*Palla*) *Killip in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 347: Bulbostylis argentina.
craspedotus *Chiov. Fl. Somala*, II. 437 (1932), in syn.: Bulbostylis craspedota.
lanatus (*H. B. & K.*) *Britton in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 318: Isolepis lanata.

STENOSIPHON Spach (Onagrac.).
bracteatus *Jones ex Johansen in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1930, lvii. 315 (1931).—U.S.A. (Texas).

STENOSIPHONIUM Nees (Acanthac.).
cordifolium (*Vahl*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 226 (1931): Ruellia cordifolia.

STENOSPERMATION Schott (Arac.).
Archeri *K. Krause in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 614 (1932).—Colomb.

STENOSTOMUM Gaertn. f. (Rubiac.).
rotundatum *Griseb. Cat. Pl. Cub.* 132 (1866).—Cuba.

STENOTAPHRUM Trin. (Gramin.).
diplotaphrum *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 702 (1935).—Tanganyika Terr.

STEPHANACHNE Keng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China, Bot. Ser., ix. 134 (Aug. 1934). *GRAMINEAE.*
nigrescens *Keng, l. c.* 135.—China (Szechuan).
pappophorea (*Hackel*) *Keng, l. c.* 136, in obs.: Calamagrostis pappophorea.

STEPHANIA Lour. (Menispermac.).
disciflora *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 261 (1931).—China (Kweichau; Kwangsi).

STEPHANOGASTRA Karst. & Triana in Triana, Nuev. Jen. i Esp. Fl. Neo-Granad. 16 (1854); Karst. in Linnaea, xxviii. 425 (1857); Sprague in Kew Bull. 1934, 395. *MELASTOMATACEAE.*
purpurea *Karst. & Triana, l. c.*; *Karst. l. c.* 426; *Sprague, l. c.*—Colomb.

STEPHANOMERIA Nutt. (Compos.).
Mexiae *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 83 (1933–5).—Mexico.
minima *M. E. Jones, l. c.* No. 17, 31 (1930).—U.S.A. (Arizona).

STEPHANOTELLA Fourn. (Asclepiadac.).
Killipii *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1931, xviii. 558.—Peruv.

STEPTORHAMPHUS Bunge (Compos.).
petraeus (*Fisch. & Mey.*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 258 (1934): Lactuca petraea.
tuberosus (*L.*) *Grossheim, l. c.*: Sonchus tuberosus.

STERCULIA L. (Sterculiac.).
africana (*Lour.*) *Fiori in Agric. Colon., Ital.* 1911, v. Suppl., 37 (1912): Triphaca africana.
banksiana *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 229.—N. Hebrides.
Burbidgei *Stapf ex Ridley in Kew Bull.* 1933, 488.—Borneo.
cauliflora *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 168 (1934).—Sumatra.
Clemensiae *Ridley in Kew Bull.* 1933, 488.—Borneo.
hainanensis *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 281 (1935).—China (Hainan).
khasiana *Debbarm. in U. N. & P. C. Kanj. & Das, Fl. Assam*, i. Pt. 1, 154 (1934); *Debbarm. ex Biswas in Assam Forest Rec.*, Bot. i. 5 (1934).—Ind. or. (Assam).
megalocarpa *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 379.—Bras. (Matto Grosso).
Mhosya *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 455 (1921), in obs.—Tanganyika Terr.
palauensis *Kanehira, Fl. Micrones.* 230 (1933), japonice; *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 674, latine.—Ins. Palau.
patentinervia *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 169 (1934).—Sumatra.
Recordiana *Standley in Tropical Woods*, 1935, No. 44, 25.—Panamá.
rigidifolia *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 57 (1935).—Bras. (Amaz.).
roseiflora *Ducke, l. c.* 58.—Bras. (Amaz.).

STERCULIA:—
Schliebenii *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 519 (1935).—Tanganyika Terr.
solitudinis *Mildbr. l. c.* xi. 138 (1931).—Peruv.
tannaënsis *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 230.—N. Hebrides.
urophylla *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 170 (1934).—Sumatra.
Zastrowiana *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 452 (1921), in obs.—Afr. austr.-occ.; Cape Prov.

STERNBERGIA Waldst. & Kit. (Amaryllidac.).
aurantiaca *Dinsm. in Post, Fl. Syria, Palest. & Sinai*, ed. 2, ii. (*Publ. Am. Univ. Beirut*, Nat. Sc. Ser. No. 1) 607 (1933).—Libanus; Palaest.

STEVENORCHIS Wankow & Kraenzl. in Fedde, Repert. Beih. lxv. 45 (1931). *ORCHIDACEAE.*
satyrioides (*Stev.*) *Wankow & Kraenzl. l. c.*: Orchis satyrioides.

STEVENSIA Poit. (Rubiac.).
ebracteata *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 4, 42 (1932).—Santo Domingo.
Ekmaniana *Urb. l. c.* 41.—Haiti.
hotteana *Urb. & Ekman, l. c.* 40.—Haiti.

STEVIA Cav. (Compos.).
andina *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcvi. 3 (1931).—Ecuador; Peruv.
Batesii *B. L. Robinson, l. c.* n. s. civ. 6 (1934).—Mexico.
Bertholdii *B. L. Robinson, l. c.* n. s. xcvi. 4 (1931).—Ecuador.
bisecta *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 70 (1933–5).—Mexico.
Burkartii *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcvi. 4 (1931).—Argent.
clivicola *B. L. Robinson, l. c.* n. s., c. 4 (1932).—Boliv.
discolor *B. L. Robinson, l. c.* 5.—Boliv.
dubia *B. L. Robinson, l. c.* n. s. civ. 7 (1934).—Bras. (Rio de Janeiro).
eclipes *B. L. Robinson, l. c.* n. s. xcvi. 5 (1931).—Boliv.
Herrerae *B. L. Robinson, l. c.* n. s., c. 5 (1932).—Peruv.
Hilarii *B. L. Robinson, l. c.* n. s. xcvi. 7 (1931).—Bras. (Minas Geraes).
Hoppii *B. L. Robinson, l. c.* n. s., c. 6 (1932).—Peruv.
kuhnioides *Rusby ex B. L. Robinson, l. c.* n. s. xcvi. 7 (1931).—Boliv.
leucosticta *B. L. Robinson, l. c.* 8.—Peruv.
Macbridei *B. L. Robinson, l. c.* 9.—Peruv.
ophiomaches *B. L. Robinson, l. c.* 10.—Colomb.
ophryodonta *B. L. Robinson, l. c.* n. s. civ. 7 (1934).—Urug.
Pearcei *B. L. Robinson, l. c.* n. s., c. 7 (1932).—Peruv.
Pennellii *B. L. Robinson, l. c.*—Peruv.
punensis *B. L. Robinson, l. c.* 8.—Peruv.
Purdiei *B. L. Robinson, l. c.* n. s. xcvi. 13 (1931).—Colomb.
sabulonis *B. L. Robinson, l. c.* 14.—Urug.
samaipatensis *B. L. Robinson, l. c.* 15.—Boliv.
sarensis *B. L. Robinson, l. c.* n. s., c. 9 (1932).—Boliv.
setifera *Rusby ex B. L. Robinson, l. c.* 10.—Boliv.
totorensis *B. L. Robinson, l. c.* n. s. xcvi. 16 (1931).—Boliv.
Weberbaueri *B. L. Robinson, l. c.*—Peruv.

STEWARTIA L. (Theac.).
[Vide Stuartia.]

STIFFTIA Mikan (Compos.).
uniflora *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 72 (1935).—Bras. (Amaz.).

STIGMAPHYLLON A. Juss. (Malpighiac.).
digitatum *Niedenzu in Fedde, Repert.* xxxiii. 70 (1933).—Bras. (Rio de Janeiro).

STILOPUS Hook. Ic. Pl. iii. t. 286 (1840), sphalm.: **Stylypus** Rafin. (Rosac.).
vernus *Hook. l. c.*, sphalm.: Stylypus vernus.

STILPNOPAPPUS Mart. (Compos.).
Pittieri *Gleason in Am. Journ. Bot.* 1932, xix. 752.—Venez.

STIPA L. (Gramin.).
aktauensis *Roshev. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 302 (1932).—Turkestan.
anomala *P. Smirnow ex Roshev. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 96, 740 (1934).—Ross. asiat. (Uralsk).
armeniaca *P. Smirnow ex Roshev. l. c.* 92, 740.—Armen.
attenuata *P. Smirnow ex Roshev. l. c.* 110, in syn.: S. baicalensis.
canescens *P. Smirnow ex Roshev. l. c.* 101, 741.—Armen.
coreana *Honda ex Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 74, japonice.—Hab. ?
curvifolia *Swallen in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1933, xxiii. 456.—U.S.A. (N. Mexico).
deserti *Popov ex Komarov, Fl. URSS*, ii. 85 (1934), in syn.: S. aktauensis.
grandifolia *Keng in Sinensia*, iv. 322 (1934).—China (Anhwei); Japon.
Iljinii *Roshev. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 294 (1932).—Ross. asiat. (Semipalatinsk).
Krascheninnikowii *Roshev. in Mat. Komiss. Eksped. Issl. Akad. Nauk, Ser. Kazakst.* v. 253 (1928); cf. *Komarov, Fl. URSS*, ii. 98 (1934).—Transcasp.
latiglumis *Swallen in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1933, xxiii. 198.—U.S.A. (Calif.).
lithophila *P. Smirnow*; *P. Smirnow ex Roshev. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 98, 741 (1934), descr.—Crimea.
Litwinowiana *P. Smirnow ex Pavlov & Lipschitz in Sovietsk. Bot.* 1934, 19, in obs.; *P. Smirnow in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1935, n. s. xliv. 43, descr.—Turkestan.
lobata *Swallen in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1933, xxiii. 199.—U.S.A. (N. Mexico).
longiplumosa *Roshev. ex Komarov, Fl. URSS*, ii. 87 (1934).—Hab. ?
multinodis *Scribn. ex Beal, Grasses N. Amer.* ii. 222 (1896).—Mexico.
Ovczinnikovii *Roshev. ex Komarov, Fl. URSS*, ii. 87 (1934).—Hab. ?
paradoxa (*Junge*) *P. Smirnow, Key Determ. Feathergrass*, 7 (1927); cf. *Krylov, Fl. Sibir. Occ.* ii. 177 (1928): S. pulcherrima var. paradoxa.
Perrieri *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 593.—Madag.
praecapillata *Alech. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1933, n. s. xlii. 100, in obs.—Rossia.
schisensis *Roshev. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 65 (1928), in syn.: S. paradoxa.
Schmidtii *Woronow ex Grossheim, l. c.* 68.—Caucas.
Spiridonovi *Roshev. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 302 (1932).—Transcasp.
Trollii *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 777 (1933).—Boliv.
villifolia *Simk. ex Komarov, Fl. URSS*, ii. 100 (1934), in syn.: S. dasyphylla.
Zaljeskyi *Wilensky ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 67 (1928).—Caucas.

STOEBE L. (Compos.).
Ensori *Compton in Kew Bull.* 1934, 259.—Afr. austr. (Cape Prov.).

STOLZIA Schlechter (Orchidac.).
angustifolia *Mansf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1062 (1934).—Tanganyika Terr.
atrorubra *Mansf. l. c.* 1063.—Tanganyika Terr.
oligantha *Mansf. l. c.* 1062.—Tanganyika Terr.

STOMATIUM Schwantes (Ficoidac.).
alboroseum *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 242 (1931).—Afr. austr. (Bushmanland).
angustifolium *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 505 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Braunsii *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 309 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Bryantii *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 507 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
deficiens *L. Bolus, l. c.* 508, hybr. ?—Afr. austr. (Cape Prov.).
difforme *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 263 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Duthieae *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 309 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).

STOMATIUM:—
Geoffreyi *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 436 (1934).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Gerstneri *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 505 (1935).—Afr. austr. (Cape Prov.).
grandidens *L. Bolus, l. c.* 506.—Afr. austr.
Jamesii *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 308 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
latifolium *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 310 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Meyeri *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 262 (1931).—Little Namaq.
middelburgense *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 309 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
murinum (*Haw.*) *Schwantes ex Jacobsen, Sukkulent.* 180 (1933): Mesembryanthemum murinum.
niveum *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 263 (1931).—Afr. austr. (Bushmanland).
paucidens *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 507 (1935).—Afr. austr.
Ronaldii *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 310 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
suricatinum *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 242 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
trifarium *L. Bolus*; *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 437 (1934), descr. ampl.—Afr. austr. (Cape Prov.).

STRANVAESIA Lindl. (Rosac.).
impressivena (*Hayata*) *Masamune in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard.* 1932, ii. 127: Photinia impressivena.
scandens (*Stapf*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 483 (1933): Photinia scandens.

STREBLACANTHUS Kuntze (Acanthac.).
longiflorus *Cufod. in Archiv. Bot., Forli*, 1934, x. 48.—Costa Rica.

STREBLOCHAETE Hochst. ex A. Rich.; Pilger in Engl. Jahrb. xxxvii. Beibl. 85, 61 (1906), in obs., descr. *GRAMINEAE*.

STREBLUS Lour. (Morac.; Urticac., Gen. Pl.).
laevifolius *Diels in Engl. Jahrb.* lxvii. 171 (1935).—N. Guin.
urophyllus *Diels, l. c.* 172.—N. Guin.

STRELITZIA [Banks] Ait. (Musac.; Scitamin., Gen. Pl.).
citrina *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 959 (1895), in syn.: S. reginae.
coccinea *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in obs., nomen.—Hort.
maxima *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in obs., nomen.—Hort.

STREMPELIA A. Rich. (Rubiac.).
articulicymosa (*Wernham*) *Bremek. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 303: Psychotria articulicymosa.
ceratopetala (*Donn. Smith*) *Bremek. l. c.*: Psychotria ceratopetala.
fimbriata (*Benth.*) *Bremek. l. c.*, in obs.: Psychotria fimbriata.
indulgens (*Rusby*) *Bremek. l. c.* 304: Psychotria indulgens.

STREPTANTHUS Nutt. (Crucif.).
Coombsae *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xx. 145 (1931).—U.S.A. (Oregon).
Dudleyi *Eastw. l. c.*—U.S.A. (Calif.).
sanhedrensis *Eastw. l. c.* 146.—U.S.A. (Calif.).

STREPTOCALYX Beer (Bromeliac.).
Curranii *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcv. 44 (1931).—Bras. (Bahia).
geminiflorus *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 527 (1935).—Ecuador.
Hoppii *Harms, l. c.* 526.—Ecuador.
lanatus *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcv. 45 (1931).—Bras. (Bahia).
Williamsii *L. B. Smith, l. c.* n. s. xcviii. 14 (1932).—Peruv.

STREPTOCARPUS Lindl. (Gesneriac.).
bullatus *Mansf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 96 (1934).—Tanganyika Terr.
euanthus *Mansf. l. c.*—Tanganyika Terr.
hirsutissimus *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1933, 476.—Tanganyika Terr.
× hybridus *Hort. ex Kaven in Gartenflora*, 1934, lxxxiii. 66, in obs.—Hort.

STREPTOCARPUS:—
insularis *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 236, in clavi, 237 (1931): S. denticulatus *Engl.*
Lujai *De Wild. Pl. Bequaert.* v. 472 (1932).—Congo Belg.
minutiflorus *Mansf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 97 (1934).—Tanganyika Terr.
Schliebenii *Mansf. l. c.* 95.—Tanganyika Terr.
solenanthus *Mansf. l. c.* 97.—Tanganyika Terr.
× Veitchii *Hort. ex Ind. Sem. Jard. Bot. Rome*, 1905, 10; cf. *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 128, in adnot.—Hort.
× Veitchii *Hort. ex Kaven in Gartenflora*, 1934, lxxxiii. 66, in obs., an praec.—Hort.
Wittei *De Wild. in De Wild. & Staner, Contrib. Fl. Katanga*, Suppl. IV. 90 (1932).—Congo Belg.

STREPTOCAULON Wight & Arn. (Asclepiadac.).
juventas (*Lour.*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 315 (1935): Apocynum juventas.

STREPTOPETALUM Hochst. (Turnerac.).
Wittei *Staner in De Wild. & Staner, Contrib. Fl. Katanga*, Suppl. IV. 68 (1932).—Congo Belg.

STREPTOPUS L. C. Rich. (Liliac.).
japonicus (*Maxim.*) *Ohwi in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 189: S. ajanensis var. japonicus.
koreanus (*Komarov*) *Ohwi, l. c.*: S. ajanensis var. koreanus.
obtusatus *Fassett in Rhodora*, 1935, xxxvii. 102.—China (Szechuan).

STREPTOSIPHON Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xii. 719 (1935). *ACANTHACEAE*.
hirsutus *Mildbr. l. c.*—Tanganyika Terr.

STRIGA Lour. (Scrophulariac.).
aequinoctialis *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 226, in clavi, 227 (1931).—Guinea Gall.
Dalzielii *Hutchinson in Hutchinson & Dalziel, l. c.* 225, in clavi, 226.—Nigeria.
gracillima *Melch. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 681 (1932).—Tanganyika Terr.

STROBILANTHES Blume (Acanthac.).
apoesensis *Hochr. in Candollea*, v. 228 (1934).—Java.
Dalzielii (*W. W. Smith*) *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iv. 679 (1935): Acanthopale Dalzielii.
diandrus (*Nees*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 227 (1931): Stenosiphonium diandrum.
Evrardi *Benoist in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 731 (1934).—Indo-China (Anam).
furcatus *Biswas in Assam Forest Rec.*, Bot. i. 23 (1934).—Ind. or. (Assam).
Hallbergii *Blatter in Journ. & Proc. As. Soc. Beng.* 1930, n. s. xxvi. 345 (1931).—Ind. or. (Rajputana).
jugorum *Benoist in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 601.—Indo-China (Tonkin).
microcephalus *Benoist, l. c.* 1933, lxxx. 730 (1934).—Indo-China (Laos).
multangulus *Benoist in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine*, iv. 669 (1935).—Indo-China (Tonkin).
obesus *Benoist in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 601.—Indo-China (Tonkin).
patulus *Benoist, l. c.*—Indo-China (Tonkin).
Petelotii *Benoist, l. c.* 1933, lxxx. 731 (1934).—Indo-China (Tonkin).
Pierrei *Benoist, l. c.* 730.—Siam.
Ridleyi *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 155 (1934): S. anceps *Ridley*.
spathulatus *R. N. Parker in Fedde, Repert.* xxix. 105 (1931).—Burma (Tenasserim).
sulfureus *Benoist in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 732 (1934).—Indo-China (Anam).
trichophorus *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1932, 202.—Ind. or. (Assam).

STROBILANTHOPSIS S. Moore (Acanthac.).
linifolia (*T. Anders. ex C. B. Clarke*) *Milne-Redhead in Kew Bull.* 1932, 346: Calophanes linifolius.
prostrata *Milne-Redhead, l. c.* 347.—N. Rhodesia.

STROBILOPANAX R. Viguier (Araliac.).
neo-ebudicus *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 263.—N. Hebrides.

STROGANOWIA Kar. & Kir. (Crucif.).
cardiophylla *Pavlov in Sovietsk. Bot.* 1934, No. 1, 23, in obs.—Turkestan.
gracilis *Pavlov, l. c.*, in obs.—Turkestan.
robusta *Pavlov, l. c.*, in obs.—Turkestan.

STROMBOCACTUS Britton & Rose (Cactac.).
lophophoroides (*Werderm.*) *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 6, [p. 3], in obs., nomen; *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 356 (1935): Thelocactus lophophoroides.
macrochele (*Werderm.*) *Backeb. l. c.* 1935, Pt. 9, [p. 1], in obs., nomen; *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, l. c.*: Echinocactus macrochele.
pseudomacrochele *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 6, [p. 4].—Mexico.

STROMBOSIOPSIS Engl. (Olacac.).
Klainei *Pierre ex Sleum. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi b. 19 (1935), in syn.: S. Zenkeri.

STROPHANTHUS DC. (Apocynac.).
Bequaertii *Staner & Michotte in Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. 53 (1934).—Congo Belg.
katangensis *Staner in Ann. Soc. Sc. Brux.* lii. Sér. B, 94 (1932).—Congo Belg.
robustus (*Pierre*) *Pierre ex Planch. Produits Apocyn.* 297 (1894), nomen; *Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1198 (1933), descr.: S. Wallichii var. robustus.
Vanderijstii *Staner in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxi. 329 (1932).—Congo Belg.
Wittei *Staner in Ann. Soc. Sc. Brux.* lii. Sér. B, 90 (1932).—Congo Belg.

STROPHOCAULOS Small, Man. Southeast. Fl. 1090 (1933). *CONVOLVULACEAE.*
arvensis (*L.*) *Small, l. c.* 1091: Convolvulus arvensis.

STRUTHANTHUS Mart. (Loranthac.).
calophyllus *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1932, lix. 516.—Colomb.
Hunnewellii *I. M. Johnston in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcv. 53 (1931).—Mexico.
loniceroides (*Pav. ex Van Tiegh.*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi b. 173 (1935): Loxania loniceroides.
Woodsonii *Cufod. in Archiv. Bot., Forlì*, 1934, x. 31.—Costa Rica.

STRUTHIOLA L. (Thymelaeac.).
Fourcadei *Compton in Kew Bull.* 1934, 261.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Scaettae *Staner in Bull. Jard. Bot. Brux.* xiii. 368 (1935).—Congo Belg.

STRYCHNOS L. (Loganiac.).
barbata *Chiov. Fl. Somala*, II. 305 (1932).—Somal. Ital.
bicirrifera *Dunkley in Kew Bull.* 1935, 263.—Kenya Col.
camptoneura *Gilg ex Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 22, in clavi, 24 (1931).—Nigeria; Cameroons.
cathayensis *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 44 (1934).—China (Kwangtung).
cinnabarina *Gilg ex Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 22, in clavi, 24 (1931).—Nigeria.
confertiflora *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 305 (1935).—China (Hainan).
Cooperi *Hutchinson & M. B. Moss in Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 22, in clavi, 24 (1931).—Liberia.
diaboli *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 486.—Guiana Brit.
divaricans *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 746.—Bras. (Pará).
hainanensis *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 306 (1935).—China (Hainan).
Henryi *Merrill & Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1935, vii. 145.—Formosa.
Johnsonii *Hutchinson & M. B. Moss in Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 22, in clavi, 24 (1931).—Sierra Leone; Togo.
Lecomtei *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, l. c.* 21, in clavi.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
littoralis *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, l. c.* 21, in clavi, 22.—Côte d'Ivoire; Nigeria; Cameroons.

STRYCHNOS:—
McKenii *Gerrard ex Wood & Evans, Natal Pl.* i. 16 (1898), pro syn.: S. Gerrardi.
Melinoniana *Baill.*; *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 487, descr. ampl.—Guiana Brit.
Meughe *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 83 (1935).—Kenya Col.
placida *Macbride in Candollea*, v. 400 (1934).—Peruv.
ramentifera *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 745.—Bras. (Pará).
reticulata *Burtt Davy & Honoré in Kew Bull.* 1932, 270.—Kenya Col.
soubrensis *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 21, in clavi, 22 (1931).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
tricalysioides *Hutchinson & M. B. Moss in Hutchinson & Dalziel, l. c.* 21, in clavi, 24.—Nigeria.
trichostyla *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 746.—Bras. (Pará).
venulosa *Hutchinson & M. B. Moss in Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 22, in clavi, 24 (1931).—Sierra Leone; Liberia.

STRYPHNODENDRON Mart. (Legumin.).
adstringens (*Mart.*) *Coville in Cent. Dict. & Cycl.* x. 111, sub barbatimao (1910): Acacia adstringens.

STUARTIA L. corr. L'Hérit. (Theac.; Ternstroemiac., Gen. Pl.).
gemmata *Chien & Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., vi. 66 (1931).—China.
pteropetiolata *Cheng, l. c.* ix. 202 (1934): Hartia sinensis.
villosa *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* vii. 315 (1931).—China (Kwangtung).

STUEBELIA Pax (Capparidac.).
nemorosa (*Jacq.*) *Dugand in Tropical Woods*, 1935, No. 43, 15: Capparis nemorosa.

STULTITIA Phillips in Fl. Pl. S. Afr. 1933, xiii. t. 520: **Stapeliopsis** Phillips (Asclepiadac.).
Cooperi (*N. E. Brown*) *Phillips, l. c.* sub t. 520: Stapelia Cooperi.
Tapscottii (*Verdoorn*) *Phillips, l. c.* t. 520: Stapelia Tapscottii.

STYLIDIUM Lour. (Cornac.).
Bauthas *Lour. ex Gomes in Mem. Acad. Sc. Lisb. Cl. Sc. Pol. Mor. Bel.-Let.* n. s. iv. (1), 28 (1868); *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 16, 296 (1935), in syn.: Alangium chinense.

STYLOCORYNA Cav. (Rubiac.).
mollis (*Hook. f.*) *Wall. ex King & Gamble in Journ. As. Soc. Beng.* 1903, lxxii. II. 202 (1904): Webera mollis.

STYLODON Rafin. (Verbenac.).
carolinensis (*Walt.*) *Small, Man. Southeast. Fl.* 1135 (1933): Phryma carolinensis.

STYLOGYNE A. DC. (Myrsinac.).
amplifolia *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 33 (1931).—Peruv.

STYLOPUS Hook. Ic. Pl. iii. t. 286 (1840), sphalm.: **Stylypus** Rafin. (Rosac.).
vernus *Hook. l. c.*, sphalm.: Stylypus vernus.

STYLOSANTHES Sw. (Legumin.).
calcicola *Small, Man. Southeast. Fl.* 730 (1933).—U.S.A. (Florida).
fruticosa (*Retz.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 77 (1931): Arachis fruticosa.
virgata *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* ii. 192 (1834).—Bras.

STYLURUS Salisb. (Proteac.).
Banksii (*R. Br.*) *Degener, Fl. Hawaiiensis*, Fam. 98 (1932): Grevillea Banksii.
robustus (*A. Cunn.*) *Degener, l. c.*: Grevillea robusta.

STYPHELIA Sm. (Epacridac.).
brevistyla *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 36 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
Pomarae (*A. Gray*) *J. W. Moore, l. c.*, in adnot.: Cyathodes Pomarae.

STYRACINIA Zoll. Syst. Verz. Ind. Arch. ii. 136 (1854). *STYRACACEAE.*

STYRAX L. (Styracac.).
funkikensis *Mori in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 416.—Formosa.
oliganthes *v. Steenis in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 223, in clavi, 241 (1932).—Sumatra.
pachyphyllus *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 302 (1935).—China (Hainan).
philippinensis *Merrill & Quisumb. in Philipp. Journ. Sc.* 1935, lvi. 313.—Ins. Philipp. (Batan).
socialis *Macbride in Candollea*, v. 398 (1934).—Peruv.
subcrenatus *Hand.-Mazz. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1931, lxxx. 342.—China (Hainan).
Supaii *Chun & F. Chun in Sunyatsenia*, iii. 34 (1935).—China (Kwangtung).
Suzukii *Mori in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 417.—Formosa.

SUAEDA Forsk. (Chenopodiac.).
arbuscula (*Kar. & Kir.*) *Ulbr. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 558 (1934): Schanginia arbuscula.
bifacialis *Solms ex Ulbr. l. c.* 556, nomen.—Alger.
Cavanillesiana (*Lázaro*) *Coutinho in Bol. Soc. Brot.* Sér. II. x. 82 (1935): S. maritima var. Cavanillesiana.
nesophila *I. M. Johnston in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 444: S. divaricata var. microphylla *F. Phil.*, non S. microphylla *Pall.*
ramosissima (*Standley*) *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 34 (1933–5): Dondia ramosissima.
Schimperi (*Moq.*) *Ulbr. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi c. 558 (1934): Sevada Schimperi.

SUTERA Roth (Scrophulariac.).
albiflora *Verdoorn in Fl. Pl. S. Afr.* 1933, xiii. t. 485.—Orange Free State.
Archeri *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 307 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
atrocaerulea *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 100 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
bicolor *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 186 (1932).—Great Namaq.
dioritica *Dinter, l. c.* 187.—Great Namaq.
gariusana *Dinter, l. c.* 186.—Great Namaq.
hirta *N. E. Brown in Kew Bull.* 1931, 450.—Afr. austr. (Cape Prov.).
lilacina *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 185 (1932).—Great Namaq.

SUTHERLANDIA R. Br. (Legumin.).
humilis *Phillips & R. A. Dyer in Rev. Sudamer. Bot.* i. 79 (1934).—Orange Free State; Cape Prov.
montana *Phillips & R. A. Dyer, l. c.* 78.—Afr. austr.
speciosa *Phillips & R. A. Dyer, l. c.* 75.—Little Namaq.

SUZUKIA Kudo (Labiat.).
luchuensis *Kudo in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1931, iii. 226.—Ins. Liukiu.

SVIDA Opiz (Cornac.).
Baileyi (*Coult. & Evans*) *Rydb. in Brittonia*, i. 94 (1931): Cornus Baileyi.
foemina (*Mill.*) *Rydb. l. c.*: Cornus foemina.
rugosa (*Lam.*) *Rydb. Fl. Prairies & Plains Centr. N. Amer.* 605 (1932): Cornus rugosa.
stolonifera (*Michx.*) *Rydb. in Brittonia*, i. 94 (1931): Cornus stolonifera.

SWAINSONA Salisb. (Legumin.).
uniflora *J. M. Black in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1933, lvii. 152.—Austral. centr.

SWARTZIA Schreb. (Legumin.).
cubensis (*Britton & P. Wilson*) *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 61 (1935), in obs.: Tounatea cubensis.
discocarpa *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 43 (1935).—Bras. (Pará).
guianensis (*Aubl.*) *Urb. Symb. Antill.* v. 365 (1908), in obs.; *Sandwith in Kew Bull.* 1934, 366, cum descr. ampl.: Tounatea guianensis.
ingifolia *Ducke in Tropical Woods*, 1932, No. 31, 17.—Bras. (Amaz.).
Jenmani *Sandwith in Kew Bull.* 1934, 361.—Guiana Brit.
lamellata *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 731.—Bras. (Amaz.).

SWARTZIA:—
Lundellii *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 61 (1935).—Guatem.
nicaraguensis (*Britton & Rose*) *Standley, l. c.*, in obs.: Tounatea nicaraguensis.
oblanceolata *Sandwith in Kew Bull.* 1934, 363.—Guiana Brit.
reticulata *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 732.—Bras. (Amaz.).
roraimae *Sandwith in Kew Bull.* 1934, 362.—Guiana Brit.
Standleyi (*Britton & Rose*) *Standley in Tropical Woods*, 1933, No. 34, 40: Tounatea Standleyi.
viridiflora *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 44 (1935).—Bras. (Amaz.).
xanthopetala *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 359.—Guiana Brit.

SWERTIA L. (Gentianac.).
erosula *Gontsch. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 162 (1933).—Turkestan. (Thian Shan).
graciliflora *Gontsch. l. c.* 161.—Ross. asiat. centr.
Lugardae *Bullock in Kew Bull.* 1932, 500.—Kenya Col.
pusilla *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 215 (1931).—China (Kansu).
Schliebenii *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 402 (1932).—Tanganyika Terr.

SYAGRUS Mart. (Palmae).
meiocladа *Burret in Fedde, Repert.* xxxii. 111 (1933), in obs., sphalm.: S. pleioclada.
microphylla *Burret, l. c.*—Bras. (Bahia).
pleioclada *Burret, l. c.* 110.—Bras. (Minas Geraes).
purusana (*Huber*) *Burret, l. c.* 109, in obs.: Cocos purusana.
stenopetala *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 322 (1932).—Venez.
Tessmannii *Burret in Fedde, Repert.* xxxii. 106 (1933).—Peruv.
Werdermannii *Burret, l. c.* 109.—Bras. (Bahia).

SYCOPSIS Oliv. (Hamamelidac.).
Chungii *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* x. 414 (1931).—China (Fokien).

SYMPHYANDRA A. DC. (Campanulac.).
daralaghezica *Grossheim in Trud. Azerb. Otdyel. Zakavk. Fil. Akad. Nauk SSSR*, Sect. Bot., i. 57 (1933).—Armen.

SYMPHYLLANTHUS Vahl (Dichapetalac.; Chailletiac., Gen. Pl.).
plicatus *Gleason in Phytologia*, i. 26 (1933).—Colomb.

SYMPHYOPAPPUS Turcz. (Compos.).
Casarettoi *B. L. Robinson in Candollea*, v. 170 (1934).—Bras. (Ins. Santa Catharina).
leptophlebius *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcvi. 18 (1931).—Bras. (Minas Geraes).
Lymansmithii *B. L. Robinson, l. c.* 19.—Bras. (S. Paulo).
tetrastichus *B. L. Robinson, l. c.* n. s. civ. 8 (1934).—Bras. (Goyaz).

SYMPHYTUM L. (Boraginac.).
commune *Faegri in Bergens Mus. Årbok*, 1931, Naturvidensk. Rekke, No. 4, 30 (1932).—Scandinav.
Leonhardtianum *Pugsley in Journ. Bot.* 1931, lxix. 95.—Eur. centr.

SYMPLOCARPUS Salisb. in Trans. Hort. Soc. Lond. i. 267 (1812); Salisb. ex Nutt. Gen. Amer. i. 105 (1818). *ARACEAE.*
foetidus (*L.*) *Salisb. l. c.*; *Salisb. ex Nutt. l. c.*: Dracontium foetidum.

SYMPLOCOS Jacq. (Symplocac.; Styracac., Gen. Pl.).
banaënsis *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 169.—Indo-China (Anam).
chapaënsis *Guillaumin, l. c.* 170.—Indo-China (Tonkin).
Chevalieri *Guillaumin, l. c.*—Indo-China (Anam).
Clemensorum *Guillaumin, l. c.*—Indo-China (Anam).
compacta *Macbride in Candollea*, v. 399 (1934).—Peruv.
crassilimba *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 47 (1935).—China (Hainan).

SYMPLOCOS:—
crenatifolia (*Yamamoto*) *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 919 (1931): Bobua crenatifolia.
disepala *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 171.—Indo-China (Anam).
dolichantha *Merrill in Sarawak Mus. Journ.* iii. 545 (1928).—Borneo.
dolichotricha *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* vii. 320 (1931).—China (Kwangtung).
Evrardii *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 171.—Indo-China (Anam).
Hayatae *Guillaumin, l. c.* 172.—Indo-China (Anam).
Hayatae *Mori in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 193: S. theifolia *Hayata*.
hydrophila *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 172.—Indo-China (Anam).
irazuensis *Cufod. in Archiv. Bot., Forlì*, 1933, ix. 200.—Costa Rica.
Kudoi *Mori in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 193.—Formosa.
langbianensis *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 172.—Indo-China (Anam).
loquihoënsis *Guillaumin, l. c.* 173.—Indo-China (Tonkin).
Mjoebergii *Merrill in Sarawak Mus. Journ.* iii. 546 (1928).—Borneo.
nokoënsis (*Hayata*) *Kanehira, Anat. Charact. Ident. Formos. Woods*, 151 (1921); *Suzuki in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard.* 1931, i. 167: Ilex nokoënsis.
nubium *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 173.—Indo-China (Anam).
oreades *Guillaumin, l. c.* 174.—Indo-China (Tonkin).
Pealii *King ex Das in Assam Forest Rec.*, Bot. i. 19 (1934).—Ind. or. (Assam); Burma.
puncto-marginata *A. Cheval. ex Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 174.—Indo-China (Anam).
singuliflora *Guillaumin, l. c.* 175.—Indo-China (Tonkin).
sordida *Guillaumin, l. c.* 176.—Indo-China (Anam).
subolivacea *Price in Kew Bull.* 1933, 187.—China (Fokien).
trisepala *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 176.—Indo-China (Anam).

SYNADENIUM Boiss. (Euphorbiac.).
pereskiifolium (sphalm. perekiifolium) (*Houll. ex Baill.*) *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1935, Sér. II. vii. 135, in obs.: Euphorbia pereskiifolia.

SYNAEDRYS Lindl. (Fagac.; Cupulif., Gen. Pl.).
Elizabethae (*Tutcher*) *Kudo in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1931, iii. 387: Quercus Elizabethae.
Fordiana (*Chun*) *Kudo, l. c.*: Lithocarpus Fordianus.
impressivena (*Hayata*) *Masamune in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard.* 1932, ii. 14: Quercus impressivena.
kodaihoënsis (*Hayata*) *Kudo in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1931, iii. 388: Quercus kodaihoënsis.
Matsudai (*Hayata*) *Kudo, l. c.*: Lithocarpus Matsudai.
Nakaii (*Hayata*) *Kudo, l. c.*: Lithocarpus Nakaii.
Nariakii (*Hayata*) *Kudo, l. c.*: Quercus Nariakii.
rhombocarpa (*Hayata*) *Kudo, l. c.*: Quercus rhombocarpa.
shinsuiensis (*Hayata & Kanehira*) *Kudo, l. c.* 389: Lithocarpus shinsuiensis.

SYNANDROPUS A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl. 1931, lviii. 93. *MENISPERMACEAE.*
membranaceus *A. C. Smith, l. c.* 94.—Bras. (Pará).

SYNAPTOLEPIS Oliv. (Thymelaeac.).
djalonensis *A. Cheval. ex Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 149 (1927), in obs.—Guinea Gall.

SYNCLISIA Benth. (Menispermac.).
villosa *Exell in Journ. Bot.* 1932, lxx. Suppl. 1, 214.—Congo Lusit.

SYNCOLOSTEMON E. Mey. (Labiat.).
macranthus (*Gürke*) *Ashby in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 357: Orthosiphon macranthus.

SYNDESMIS Wall. in Roxb. Fl. Ind., ed. Carey & Wall., ii. 314 (1824). *ANACARDIACEAE.*
elegans *Wall. l. c.* 315.—Penins. Mal.

SYNEILESIS Maxim. (Compos.).
Hayatae *Kitamura in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 702: Senecio intermedius *Hayata*.
subglabrata (*Kitamura*) *Kitamura, l. c.*: Cacalia subglabrata.
Tagawae *Kitamura, l. c.* 701, in syn.: S. aconitifolia var. Tagawae *Kitamura*.

SYNGONANTHUS Ruhl. (Eriocaulac.).
angustifolius *Alv. Silv. Fl. Mont.* 370 (1928).—Bras. (Minas Geraes).
arthrotrichus *Alv. Silv. l. c.* 364.—Bras. (Minas Geraes).
aurifibratus *Alv. Silv. l. c.* 360.—Bras. (Minas Geraes).
auripes *Alv. Silv. l. c.* 343.—Bras. (Goyaz).
barbatus *Alv. Silv. l. c.* 382.—Bras. (Minas Geraes).
bicolor *Alv. Silv. l. c.* 337.—Bras. (Minas Geraes).
breviracemosus *Diogo in Bol. Mus. Nac. Rio de Janeiro*, i. 28 (1923).—Bras. (S. Catharina).
cabralensis *Alv. Silv. Fl. Mont.* 340 (1928).—Bras. (Minas Geraes).
canaliculatus *Alv. Silv. l. c.* 327.—Bras. (Minas Geraes).
canastrensis *Alv. Silv. l. c.* 368.—Bras. (Minas Geraes).
candidus *Alv. Silv. l. c.* 359.—Bras. (Minas Geraes).
capillaceus *Alv. Silv. l. c.* 352.—Bras. (Minas Geraes).
caracensis *Alv. Silv. l. c.* 392.—Bras. (Minas Geraes).
chapadensis *Alv. Silv. l. c.* 330.—Bras. (Minas Geraes).
chrysolepis *Alv. Silv. l. c.* 390.—Bras. (Minas Geraes).
ciliatus *Alv. Silv. l. c.* 391.—Bras. (Minas Geraes).
comosus *Alv. Silv. l. c.* 372.—Bras. (Minas Geraes).
crassinervius *Alv. Silv. l. c.* 345.—Bras. (Minas Geraes).
dealbatus *Alv. Silv. l. c.* 385.—Bras. (Minas Geraes).
densifolius *Alv. Silv. l. c.* 319.—Bras. (Minas Geraes).
diamantinensis *Alv. Silv. l. c.* 315.—Bras. (Minas Geraes).
ensifolius *Alv. Silv. l. c.* 383.—Bras. (Minas Geraes).
erectifolius *Alv. Silv. l. c.* 365.—Bras. (Minas Geraes).
eriopus *Alv. Silv. l. c.* 362.—Bras. (Minas Geraes).
ferrensis *Alv. Silv. l. c.* 355.—Bras. (Minas Geraes).
filipes *Alv. Silv. l. c.* 323.—Bras. (Minas Geraes).
flaviceps *Alv. Silv. l. c.* 328.—Bras. (Minas Geraes).
flexuosus *Alv. Silv. l. c.* 393.—Bras. (Minas Geraes).
garimpensis *Alv. Silv. l. c.* 317.—Bras. (Minas Geraes).
glaber *Alv. Silv. l. c.* 388.—Bras. (Minas Geraes).
glandulifer *Alv. Silv. l. c.* 321.—Bras. (Minas Geraes).
glaucus *Alv. Silv. l. c.* 373.—Bras. (Minas Geraes).
grao-mogolensis *Alv. Silv. l. c.* 342.—Bras. (Minas Geraes).
heteropeploides *Herzog in Fedde, Repert.* xxix. 211 (1931).—Bras. (Amaz.).
heterophyllus *Alv. Silv. Fl. Mont.* 369 (1928).—Bras. (Minas Geraes).
itambeënsis *Alv. Silv. l. c.* 334.—Bras. (Minas Geraes).
lanceolatus *Alv. Silv. l. c.* 386.—Bras. (Minas Geraes).
marginatus *Alv. Silv. l. c.* 336.—Bras. (Minas Geraes).
microcephalus *Alv. Silv. l. c.* 378.—Bras. (Minas Geraes).
micropus *Alv. Silv. l. c.* 314.—Bras. (S. Paulo).
minutifolius *Alv. Silv. l. c.* 351.—Bras. (Minas Geraes).
multicaulis *Alv. Silv. l. c.* 380.—Bras. (Minas Geraes).
multipes *Alv. Silv. l. c.* 324.—Bras. (Minas Geraes).
niger *Alv. Silv. l. c.* 331.—Bras. (Minas Geraes).
nigro-albus *Alv. Silv. l. c.* 350.—Bras. (Minas Geraes).

SYNGONANTHUS:—
niveo-aureus *Alv. Silv. Fl. Mont.* 375 (1928).—Bras. (Minas Geraes).
paepalophyllus *Alv. Silv. l. c.* 377.—Bras. (Minas Geraes).
pallens *Alv. Silv. l. c.* 349.—Bras. (Minas Geraes).
pauciflorus *Alv. Silv. l. c.* 356.—Bras. (Minas Geraes).
plumosus *Alv. Silv. l. c.* 339.—Bras. (Minas Geraes).
prolifer *Alv. Silv. l. c.* 374.—Bras. (Minas Geraes).
pterophyllus *Alv. Silv. l. c.* 379.—Bras. (Minas Geraes).
quadrangularis *Alv. Silv. l. c.* 333.—Bras. (Minas Geraes).
reflexus *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 327.—Venez.
retrorso-ciliatus *Alv. Silv. Fl. Mont.* 347 (1928).—Bras. (Minas Geraes).
retrorsus *Alv. Silv. l. c.* 344.—Bras. (Minas Geraes).
tenuipes *Alv. Silv. l. c.* 326.—Bras. (Minas Geraes).
venustus *Alv. Silv. l. c.* 366.—Bras. (Minas Geraes).
xantholepis *Alv. Silv. l. c.* 395.—Bras. (Minas Geraes).

SYNNEMA Benth. (Acanthac.).
balsamicum (*L. f.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon,* vi. Suppl., 224 (1931): Ruellia balsamica.

SYNTHERISMA Walt. (Gramin.).
corymbosa (*Roxb.*) *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa,* 1934, xxiv. 199; *et in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan,* 1934, vi. 664: Panicum corymbosum.
mariannensis (*Merrill*) *Hosokawa, l. c.* 198; *et l. c.*: Digitaria mariannensis.
Mezii *Hosokawa, ll. cc.*: Digitaria mariannensis *Mez.*
pelagica *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu,* No. 84, 73 (1931).—Ins. Tuamotu.
Robinsonii (*Merrill*) *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa,* 1934, xxiv. 198; *et in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan,* 1934, vi. 664: Digitaria Robinsonii.
stenotaphrodes (*Nees ex Steud.*) *Hosokawa in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan,* 1935, vii. 315: Panicum stenotaphrodes.
stricta (*Gaudich.*) *Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa,* 1934, xxiv. 198; *et in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan,* 1934, vi. 664: Digitaria stricta.
tenuispica (*Rendle*) *Keng in Nat. Centr. Univ. Sc. Rep., Nanking,* Ser. B, Biol. Sc., i. No. 2, 54 (1930): Digitaria tenuispica.

SYNTHYRIS Benth. (Scrophulariac.).
borealis *Pennell in Proc. Acad. Sc. Philad.* 1933, lxxxv. 88.—Alaska; Yukon.
Canbyi *Pennell, l. c.* 93.—U.S.A. (Montana).
cymopteroides *Pennell, l. c.* 95.—U.S.A. (Montana; Idaho).
Hendersoni *Pennell, l. c.* 94.—U.S.A. (Idaho).
lanuginosa (*Piper*) *Pennell & Thompson, l. c.* 93: S. pinnatifida var. lanuginosa.
missurica (*Rafin.*) *Pennell, l. c.* 89: Veronica missurica.
Paysoni *Pennell & L. Williams, l. c.* 96.—U.S.A. (Idaho; Wyoming).
ranunculina *Pennell, l. c.* 92.—U.S.A. (Nevada).
stellata *Pennell, l. c.* 89.—U.S.A. (Washington; Oregon).

SYNURUS Iljin (Compos.).
diabolicus (*Kitamura*) *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 47: Serratula diabolica.
excelsus (*Makino*) *Kitamura, l. c.* 48: Serratula excelsa.
Hondae *Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933,* Sect. IV. ii. (*Contrib. Cogn. Fl. Mansh.: Pl. Nov. Jehol.* ii. ii.) 40 (1935).—Manchur. (Jehol).
palmatopinnatifidus (*Makino*) *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 48: Serratula deltoides var. palmatopinnatifida.
pungens (*Franch. & Sav.*) *Kitamura, l. c.*: Rhaponticum pungens.

SYREITSCHIKOVIA Pavlov in Fedde, Repert. xxxi. 192 (1933). *COMPOSITAE.*
spinulosa (*Franch.*) *Pavlov, l. c.*: Serratula spinulosa.
tenuifolia (*Bong.*) *Pavlov, l. c.*: Serratula tenuifolia.

SYRENIA Andrz. ex DC. (Crucif.).
cana (*Piller & Mitterp.*) *Simonk. Enum. Fl. Transsilv.* 87 (1886): Cheiranthus canus.

SYRINGA L. (Oleac.).
× diversifolia *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 362.—Hort.
Mairei (*Léveillé*) *Rehder, l. c.* 1934, xv. 302: Ligustrum Mairei.
Steencruyssii *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss,* i. 654 (1895), in syn.: S. persica.

SYRINGODEA Hook. f. (Iridac.).
Leipoldtii *L. Bolus in Journ. Bot.* 1931, lxix. 12.—Afr. austr. (Cape Prov.).

SYZYGIUM Gaertn. (Myrtac.).
aneityense *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 256.—N. Hebrides.
benguellense (*Welw. ex Hiern*) *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 737 (1921), in obs.: Eugenia benguellensis.
caryophyllatum *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon,* vi. Suppl., 116 (1931): Myrtus caryophyllata *L.*, non Eugenia caryophyllata *Thunb.*
cyclophyllum (*Thwait. ex Duthie*) *Alston, l. c.* 117: Eugenia cyclophylla.
cylindricum (*Wight*) *Alston, l. c.* 115: Eugenia cylindrica.
hemisphericum (*Walp.*) *Alston, l. c.*: Jambosa hemispherica.
Jambos (*L.*) *Alston, l. c.*: Eugenia Jambos.
Kajewskii *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 256.—N. Hebrides.
koghiense *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France,* 1934, lxxxi. 17.—N. Caled.
Lewisii *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon,* vi. Suppl., 117 (1931).—Zeylan.
lifuanum *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich,* 1933, lxxviii. Beibl. 19, 302.—Ins. Loyauté.
Neepau *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 257.—N. Hebrides.
Nidie *Guillaumin, l. c.*—N. Hebrides.
Nomoa *Guillaumin, l. c.* 258.—N. Hebrides.
pseudopinnatum *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich,* 1933, lxxviii. Beibl. 19, 304.—Ins. Loyauté.
spissum *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon,* vi. Suppl., 117 (1931): Myrtus androsaemoides.
turbinatum *Alston, l. c.* 114.—Zeylan.
verrucosum *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich,* 1933, lxxviii. Beibl. 19, 305.—Ins. Loyauté.

T

TABEBUIA Gomez (Bignoniac.).
aquatilis (*E. Mey.*) *Sprague & Sandwith in Kew Bull.* 1932, 21: Bignonia aquatilis.
Billbergii (*Bur. & K. Schum.*) *Standley in Tropical Woods,* 1933, No. 36, 20: Tecoma Billbergii.
Coralibe *Standley, l. c.* 18.—Colomb.
Dugandii *Standley, l. c.* 17.—Colomb.
dura (*Bur. & K. Schum.*) *Sprague & Sandwith in Kew Bull.* 1932, 21: Tecoma dura.
floccosa (*Klotzsch ex Bur. & K. Schum.*) *Sprague & Sandwith, l. c.* 27: Tecoma floccosa.
hypolepra *Sprague & Sandwith, l. c.* 25.—Guiana Brit. et Gall.
Ipe (*Mart.*) *Standley in Tropical Woods,* 1933, No. 36, 20, in obs.: Tecoma Ipe.
punctatissima (*Kraenzl.*) *Standley, l. c.* 18: Tecoma punctatissima.
subtilis *Sprague & Sandwith in Kew Bull.* 1932, 23.—Guiana Brit.

TABERNAEMONTANA L. (Apocynac.).
Balansae *Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine,* iii. 1148 (1933).—Indo-China (Tonkin).
baviensis *Pitard, l. c.* 1156.—Indo-China (Tonkin).
Bonii *Pitard, l. c.* 1151.—Indo-China (Tonkin).

TABERNAEMONTANA:—
cylindrocarpa (*King & Gamble*) *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1934, xx. 107 (1935): Ervatamia cylindrocarpa.
dinhensis *Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine,* iii. 1151 (1933).—Indo-China (Cochinch.).
Evrardi *Pitard, l. c.* 1157.—Indo-China (Anam; Cochinch.).
garciniifolia *Pierre ex Pitard, l. c.* 1144.—Indo-China (Cochinch.).
granulosa *Pitard, l. c.*—Indo-China (Anam).
Harmandiana *Pierre ex Pitard, l. c.* 1152.—Indo-China (Cochinch.).
jasminiflora *Pitard, l. c.* 1145.—Indo-China (Anam).
Killipii *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1931, xviii. 541.—Peruv.
laotica *Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine,* iii. 1148 (1933).—Indo-China (Laos).
luensis *Pierre ex Pitard, l. c.* 1147.—Anam; Cambodia; Cochinch.
microphylla *Pitard, l. c.* 1150.—Anam; Laos; Cochinch.
nemoralis *Pitard, l. c.* 1155.—Indo-China (Tonkin; Anam).
pallida *Pierre ex Pitard, l. c.* 1146.—Indo-China (Cochinch.).
palustris *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xii. 297 (1935).—Bras. (Amaz.).
Pitardii *Gagnep. in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine,* iii. 1143 (1933).—Indo-China (Laos).
repoëvensis *Pierre ex Pitard in Lecomte & Humbert, l. c.* 1149.—Cambodia; Cochinch.
siamensis *Warb. ex Pitard, l. c.* 1158.—Siam.
sralensis *Pierre ex Pitard, l. c.* 1156.—Anam; Cambodia; Cochinch.
sumatrana *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. viii. 139 (1934).—Sumatra.
tonkinensis *Pierre ex Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine,* iii. 1154 (1933).—Indo-China (Tonkin; Anam).

TACAZZEA Decne. (Asclepiadac.).
viridis *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 52 (1931), in clavi.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).

TACCA J. R. & G. Forst. (Taccac.).
Wilsonii *W. Limpricht in Fedde, Repert.* xxxviii. 218 (1935).—Indo-China (Tonkin).

TACHIGALIA Aubl. (Legumin.).
carinata *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 354.—Bras. (Matto Grosso).
longiflora *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro,* ii. 38 (1935).—Bras. (Amaz.).

TACINGA Britton & Rose (Cactac.).
atropurpurea *Werderm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xii. 223 (1934).—Bras. (Bahia).
Luetzelburgii *Kupper ex Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste Braz.* iii. 111 (1923) [*Insp. Fed. Obras Secc.* Publ. 57], nomen; cf. *Gray Herb. Card Cat.,* Issue 151.—Bras. (Bahia).
Zehntneri *Backeb. & Voll in Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 3, [p. 4]; *et in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 101, 410 (1935).—Bras. (Bahia).

TAENIANTHERA Burret (Palmae).
oligosticha *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 201 (1931).—Peruv.

TAENIATHERUM Nevski in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS, Ser. I. Fasc. 1, 21, 27 (1933), sine descr.; et in Acta Univ. As. Med. Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 38 (1934), descr. *GRAMINEAE.*
asperum (*Simonk.*) *Nevski, l. c.* 22, in obs.; *et l. c.* 39, in clavi: Cuviera caput-Medusae var. aspera.
caput-Medusae (*L.*) *Nevski, l. c.*, in obs.; *et l. c.* 38, in clavi: Elymus caput-Medusae.
crinitum (*Schreb.*) *Nevski, l. c.*, in obs.; *et l. c.*, in clavi: Elymus crinitus.

TAENIOPHYLLUM Blume (Orchidac.).
annuliferum *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements,* vii. 79 (1932).—Penins. Mal.
apiculatum *J. J. Smith in Nova Guinea,* xviii. 80 (1935).—N. Guin.

TAENIOPHYLLUM:—
calceolus *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 76 (1932).—Penins. Mal.
campanulatum *Carr, l. c.* 68.—Penins. Mal.
capillare *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxv. 504 (1933).—Celebes.
complanatum *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 443.—Formosa.
dentilobum *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 81 (1935).—N. Guin.
esetiferum *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 157 (1931).—Borneo.
intermedium *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 71 (1932).—Penins. Mal.
kapahense *Carr, l. c.* viii. 125 (1935).—Borneo.
longisetigerum *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxv. 504 (1933).—Celebes.
micranthum *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 75 (1932).—Penins. Mal.
montanum *Carr, l. c.* 74.—Penins. Mal.
pahangense *Carr, l. c.* 65.—Penins. Mal.
pallidiflorum *Carr, l. c.* 78.—Penins. Mal.
rostratum *Carr, l. c.* 81.—Penins. Mal.
rugulosum *Carr, l. c.* 72.—Penins. Mal.
Stella *Carr, l. c.* 69.—Penins. Mal.
tjibodasanum *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxix. 251 (1931).—Java.
viride *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 67 (1932).—Penins. Mal.

TAFALLA D. Don (Compos.).
colombiana *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 27, Cuadro 22 (1934), nomen.—Colomb.

TAGETES L. (Compos.).
Perretii *Colla, Herb. Pedem.* iii. 418 (1834).—Hab.?
sinuata *Hirmer in Planta*, 1931, xiv. 179, in obs., nomen.—Hab.?

TAINIA Blume (Orchidac.).
Balansae *Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 706.—Indo-China (Tonkin).
Beccarii (*Schlechter*) *Gagnep. l. c.*: Nephelaphyllum Beccarii.
borneënsis (*Schlechter*) *Gagnep. l. c.*: Nephelaphyllum borneënse.
chapaënsis *Gagnep. l. c.* 707.—Indo-China (Tonkin).
chinensis (*Rolfe*) *Gagnep. l. c.* 706: Nephelaphyllum chinense.
cordifolia (*Lindl.*) *Gagnep. l. c.*: Nephelaphyllum cordifolium.
cristata (*Rolfe*) *Gagnep. l. c.* 706, 708: Nephelaphyllum cristatum.
Delavayi *Gagnep. l. c.* 708.—China (Yunnan).
elliptica *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 293.—Formosa.
Evrardii *Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 709.—Indo-China (Anam).
flabellata (*Ames & C. Schweinf.*) *Gagnep. l. c.* 706: Nephelaphyllum flabellatum.
flabellilobata *Tso in Sunyatsenia*, i. 144 (1933).—China (Kwangtung).
gracilis (*Schlechter*) *Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 706: Nephelaphyllum gracile.
gracilis *Tso in Sunyatsenia*, i. 145 (1933).—China (Kwangtung).
grandiflora (*Hook. f.*) *Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 706: Nephelaphyllum grandiflorum.
latilabris (*Ridley*) *Gagnep. l. c.*: Nephelaphyllum latilabre.
malayana *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxxi. 76 (1932).—Arch. Mal.
mindorensis (*Ames*) *Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 706: Nephelaphyllum mindorense.
papuana (*Schlechter*) *Gagnep. l. c.*: Nephelaphyllum papuanum.
parvifolia *Tso in Sunyatsenia*, i. 146 (1933).—China (Kwangtung).
piyananensis *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 294.—Formosa.
pulchra (*Blume*) *Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 706: Nephelaphyllum pulchrum.

TAINIA:—
purpureifolia *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 199 (1935).—Borneo.
quadriloba *Summerhayes in Kew Bull.* 1933, 189.—China (Kwangtung).
tenuiflora (*Blume*) *Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 706: Nephelaphyllum tenuiflorum.

TAKEIKADZUCHIA Kitagawa & Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot. 1934, iii. 102. *COMPOSITAE.*
Lomonossowii (*Trautv.*) *Kitagawa & Kitamura, l. c.* 103: Carduus Lomonossowii.

TALAUMA Juss. (Magnoliac.).
splendens (*Urb.*) *McLaughl. in Tropical Woods*, 1933, No. 34, p. 36: Magnolia splendens.

TALINARIA T. S. Brandegee (Portulacac.).
coahuilensis (*S. Wats.*) *P. Wilson in N. Am. Fl.* xxi. 290 (1932): Talinum coahuilense.

TALINUM Adans. (Portulacac.).
carinatum *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. Anhang, 32 (1932).—Tanganyika Terr.
denticulatum *v. Poelln. in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 1933, li. 113.—U.S.A. (Oregon).
Dinteri *v. Poelln. in Fedde, Repert.* xxxv. 32 (1934), in obs.—Afr. austr.-occ.
eximium *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1931, xviii. 431.—U.S.A. (N. Mexico).
fallax *v. Poelln. in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 1933, li. 113.—U.S.A. (N. Mexico).
genense *Klotzsch ex v. Poelln. l. c.* 121, in syn.: T. cuneifolium.
Gooddingii *P. Wilson in N. Am. Fl.* xxi. 287 (1932).—U.S.A. (Arizona).
lissospermum *C. A. Smith ex v. Poelln. in Fedde, Repert.* xxxv. 32 (1934), in obs.—Afr. austr.-occ.
oblongifolium *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. Anhang, 31 (1932).—Tanganyika Terr.
okanoganense *C. S. English in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1934, xlvii. 191.—U.S.A. (Washington).
pilosiusculum (*DC.*) *Colla, Herb. Pedem.* ii. 460 (1834): Calandrinia pilosiuscula.
Rosei *P. Wilson in N. Am. Fl.* xxi. 287 (1932): T. gracile *Rose & Standley*.
sediforme *v. Poelln. in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 1933, li. 113.—Brit. Columb.
taitense *Pax ex Vatke in Engl. Jahrb.* xvii. 585 (1893).—Kenya Col.
transvaalense *v. Poelln. in Fedde, Repert.* xxxv. 34 (1934).—Transvaal.
tuberosum (*Benth.*) *P. Wilson in N. Am. Fl.* xxi. 284 (1932): Calandrinia tuberosa.
Wayae *Eastw. in Leafl. West. Bot.* i. 139 (1934).—Brit. Columb.
Youngae *C. H. Muell. in Torreya*, 1933, xxxiii. 148, 149.—U.S.A. (Texas).

TALISIA Aubl. (Sapindac.).
Floresii *Standley in Tropical Woods*, 1931, No. 26, 14.—Mexico.
furfuracea *Sandwith in Kew Bull.* 1935, 121.—Guiana Brit.
Svensonii *Standley in Contrib. Arn. Arb.* No. v. 98 (1933).—Panamá (Ins. Barro Colorado).

TAMARIX L. (Tamaricac.).
Allorgei *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 147 [1933], nomen.—Marocc.
amurensis *Hort. ex Chow, Familiar Trees Hopei, Peiping*, 329 (1934), in syn.: T. pentandra.
angolensis *Niedenzu ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 531, 850 (1921), in obs.—Angola.
atlantis *Trab. ex Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc*, ii. 489 (1932), in syn.: T. africana var. Faurei *Maire*.
brachylepis *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 90.—Hispan.
Font-Queri *Maire & Trab.*; *Emberger & Maire in Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc*, xi. Nos. 4–6, 92 (1931).—Marocc.
leucocharis *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 34.—Sahara.
ludibunda *Maire, Contrib. Étude Fl. Afr. Nord*, Fasc. 21, reimpr. p. 1 (1933); *Maire in Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc*, 1933, xiii. 265 (1934).—Marocc.

TAMARIX:—
Malenconiana *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1935, xxvi. 194.—Marocc.
Mauritii *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 147 [1933], nomen.—Marocc.
muluyana *Sennen & Mauricio, l. c.* 42, nomen.—Marocc.
Murbecki *Sennen in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 193, in obs., nomen.—Marocc.
oxysepala *Trab. ex Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 36, in syn.: T. Balansae.
pulchella *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 43 [1933], nomen.—Marocc.
Sireti *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 110.—Hispan.
tenuifolia *Maire & Trab. in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1934, xxv. 296.—Alger.
Trabutii *Maire, l. c.* 1931, xxii. 35.—Afr. bor.
valdesquamigera *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 42 [1933], nomen.—Marocc.

TAMONEA Aubl. (Melastomatac.).
magnifica (*Denis*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 320 (1894): Cyanophyllum magnificum.

TAMPOA Aubl.; H. Hallier in Meded. Herb. Leid. No. 35, 24 (1918): **Salacia** L. (Hippocrateac.).

TAMUS L. (Dioscoreac.).
orientalis *J. Thiéb. in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 119.—Syria.

TANACETUM L. (Compos.).
alashanense *Ling in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, ii. 502 (1934).—Mongol.
brachanthemoides (*C. Winkler*) *Kraschen. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 175 (1933), in obs.: Artemisia brachanthemoides.
kaschgaricum *Kraschen. l. c.*—Turkestan.
macrocephalum *Pampan. in Sped. Ital. De Filippi Himal. etc. 1913–14*, Ser. II. xi. (*Agg. Fl. Carac.*) 173 (1934).—Mont. Karakoram.
pallidum (*Mill.*) *Maire*; *Emberger & Maire in Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc*, xi. Nos. 4–6, 101 (1931): Chrysanthemum pallidum.
parviflorum (*Grüning*) *Kung in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, ii. 404 (1934): Chrysanthemum parviflorum.
petiolosum *Pampan. in Sped. Ital. De Filippi Himal. etc. 1913–14*, Ser. II. xi. (*Agg. Fl. Carac.*) 173 (1934).—Mont. Karakoram.
Rockii *Mattf. in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 406.—China (Kansu).
salicifolium *Mattf. l. c.* 407.—China (Kansu; Szechuan).
tadshikorum *Kudrj. in Bull. Univ. As. Centr.* xix. 163 (1934).—As. centr.
Winkleri *Komarov ex Kraschen. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 175 (1933), in obs., et in syn.: T. brachanthemoides.

TANAECIUM Sw. (Bignoniac.).
Duckei *A. Sampaio in Ann. Acad. Bras. Sc.* 1935, vii. 125.—Bras. (Pará).
Zetekii *Standley in Contrib. Arn. Arb.* No. v. 140 (1933).—Panamá (Ins. Barro Colorado).

TANAOSOLEN N. E. Brown in Trans. Roy. Soc. S. Afr. xx. 262 (1932). *IRIDACEAE.*
nudus *N. E. Brown, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).

TAPEINOSPERMA Hook. f. (Myrsinac.).
Kajewskii *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 12.—N. Hebrides.
koghiense *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 457.—N. Caled.
Netor *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 13.—N. Hebrides.

TAPINANTHUS Blume (Loranthac.).
acacietorum (*Bullock*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 107 (1933): Loranthus acacietorum.
Adolfi-Friderici (*Engl. & K. Krause*) *Danser, l. c.*: Loranthus Adolfi-Friderici.
alatus (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus alatus.
Albizziae (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Albizziae.
albo-annulatus (*Engl. & K. Krause*) *Danser, l. c.*: Loranthus albo-annulatus.

TAPINANTHUS:—

angiensis (*De Wild.*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 107 (1933): Loranthus angiensis.
angolensis (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus angolensis.
annulatus (*Engl. & K. Krause*) *Danser, l. c.*: Loranthus annulatus.
apodanthus (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus apodanthus.
aurantiacus (*Engl.*) *Danser, l. c.* 108: Loranthus aurantiacus.
Bagshawei (*Rendle*) *Danser, l. c.*: Loranthus Bagshawei.
bangwensis (*Engl. & K. Krause*) *Danser, l. c.*: Loranthus bangwensis.
batangae (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus batangae.
Batesii (*S. Moore & Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus Batesii.
Baumii (*Engl. & Gilg*) *Danser, l. c.*: Loranthus Baumii.
Belvisii (*DC.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Belvisii.
bemarivensis (*Lecomte*) *Danser, l. c.*: Loranthus bemarivensis.
Bequaerti (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Bequaerti.
berliniicola (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus berliniicola.
blantyreanus (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus blantyreanus.
bogoroënsis (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus bogoroënsis.
Bolusii (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus Bolusii.
Boonei (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Boonei.
brachyanthus (*Peter*) *Danser in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 223: Loranthus brachyanthus.
brachyphyllus (*Peter*) *Danser, l. c.*: Loranthus brachyphyllus.
brazzavillensis (*De Wild.*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 108 (1933): Loranthus brazzavillensis.
brevilobus (*Engl. & K. Krause*) *Danser, l. c.*: Loranthus brevilobus.
Brieyi (*De Wild.*) *Danser, l. c.* 109: Loranthus Brieyi.
brunneus (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus brunneus.
Buchneri (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Buchneri.
bulawayensis (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus bulawayensis.
Buntingii (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus Buntingii.
Bussei (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus Bussei.
butaguensis (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus butaguensis.
buvumae (*Rendle*) *Danser, l. c.*: Loranthus buvumae.
campestris (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus campestris.
capitatus (*Spreng.*) *Danser, l. c.*: Exostemma capitatum.
Carsonii (*Baker & Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus Carsonii.
Cecilae (*N. E. Brown*) *Danser, l. c.* 110: Loranthus Cecilae.
celtidifolius (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus celtidifolius.
chunguensis (*R. E. Fries*) *Danser, l. c.*: Loranthus chunguensis.
cinereus (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus cinereus.
cistoides (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus cistoides.
constrictiflorus (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus constrictiflorus.
Copaiferae (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus Copaiferae.
Cornetii (*Dewèvre*) *Danser, l. c.*: Loranthus Cornetii.
coronatus (*Van Tiegh.*) *Danser, l. c.*: Loranthus coronatus.
crassicaulis (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus crassicaulis.
Crataevae (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus Crataevae.
crispatulus (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus crispatulus.
Dekindtianus (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Dekindtianus.

TAPINANTHUS:—

deltae (*Baker & Sprague*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 110 (1933): Loranthus deltae.
Demeusii (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Demeusii.
dependens (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus dependens.
dichrous (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus dichrous.
discolor (*Schinz*) *Danser, l. c.*: Loranthus discolor.
djurensis (*Engl.*) *Danser, l. c.* 111: Loranthus djurensis.
dodoneifolius (*DC.*) *Danser, l. c.*: Loranthus dodoneifolius.
Dombeyae (*K. Krause & Dinter*) *Danser, l. c.*: Loranthus Dombeyae.
dschallensis (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus dschallensis.
Ehlersii (*Schweinf.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Ehlersii.
elegantissimus (*Schinz*) *Danser, l. c.*: Loranthus elegantissimus.
elegantulus (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus elegantulus.
Emini (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Emini.
Engleri (*Hiern*) *Danser, l. c.*: Loranthus Engleri.
Englerianus (*K. Krause & Dinter*) *Danser, l. c.*: Loranthus Englerianus.
entebbensis (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus entebbensis.
erianthus (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus erianthus.
erythraeus (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus erythraeus.
erythrotrichus (*K. Krause*) *Danser, l. c.*: Loranthus erythrotrichus.
eucalyptoides (*Peter*) *Danser in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 223: Loranthus eucalyptoides.
Eylesii (*Sprague*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 111 (1933): Loranthus Eylesii.
falcifolius (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus falcifolius.
Farmari (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus Farmari.
findens (*Sprague*) *Danser, l. c.* 112: Loranthus findens.
Fischeri (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Fischeri.
Flamignii (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Flamignii.
fragilis (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus fragilis.
Friesiorum (*K. Krause*) *Danser, l. c.*: Loranthus Friesiorum.
Fuellebornii (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Fuellebornii.
gabonensis (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus gabonensis.
Ghikae (*Volk. & Schweinf.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Ghikae.
Gilgii (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Gilgii.
glabratus (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus glabratus.
glaucescens (*Engl. & K. Krause*) *Danser, l. c.*: Loranthus glaucescens.
glaucocarpus (*Peyr.*) *Danser, l. c.*: Loranthus glaucocarpus.
glaucophyllus (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus glaucophyllus.
glaucoviridis (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus glaucoviridis.
glomeratus (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus glomeratus.
Goetzei (*Sprague*) *Danser, l. c.* 113: Loranthus Goetzei.
Guerichii (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Guerichii.
guttatus (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus guttatus.
Heckmannianus (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Heckmannianus.
Henriquesii (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Henriquesii.
heteromorphus (*A. Rich.*) *Danser, l. c.*: Loranthus heteromorphus.
hexasepalus (*Van Tiegh.*) *Danser, l. c.*: Thelecarpus hexasepalus.
Hildebrandtii (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Hildebrandtii.
Holstii (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Holstii.
Holtzii (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Holtzii.

TAPINANTHUS:—

Homblei (*De Wild.*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 113 (1933): Loranthus Homblei.
igneus (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus igneus.
inaequilaterus (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus inaequilaterus.
irangensis (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus irangensis.
irebuensis (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus irebuensis.
ituriensis (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus ituriensis.
kagehensis (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus kagehensis.
kamerunensis (*Engl.*) *Danser, l. c.* 114: Loranthus kamerunensis.
Kayseri (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Kayseri.
Keilii (*Engl. & K. Krause*) *Danser, l. c.*: Loranthus Keilii.
Kelleri (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Kelleri.
keniae (*K. Krause*) *Danser, l. c.*: Loranthus keniae.
Keudelii (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Keudelii.
kihuirensis (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus kihuirensis.
kilimandscharicus (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus kilimandscharicus.
Kimuenzae (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Kimuenzae.
Kisaguka (*Engl. & K. Krause*) *Danser, l. c.*: Loranthus Kisaguka.
kisantuensis (*De Wild & Th. Dur.*) *Danser, l. c.*: Loranthus kisantuensis.
Krausei (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Krausei.
kwaiensis (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus kwaiensis.
laciniatus (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus laciniatus.
Lamborayi (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Lamborayi.
landanaënsis (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus landanaënsis.
lapathifolius (*Engl. & K. Krause*) *Danser, l. c.*: Loranthus lapathifolius.
lateritio-striatus (*Engl. & K. Krause*) *Danser, l. c.* 115: Loranthus lateritio-striatus.
latibracteatus (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus latibracteatus.
Lecardii (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Lecardii.
Lecomtei (*Van Tiegh.*) *Danser, l. c.*: Stephaniscus Lecomtei.
lenticellatus (*De Wild. & Th. Dur.*) *Danser, l. c.*: Viscum lenticellatum.
leonensis (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus leonensis.
loandensis (*Engl. & K. Krause*) *Danser, l. c.*: Loranthus loandensis.
longifolius (*Peter*) *Danser in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 224: Loranthus longifolius.
longipes (*Baker & Sprague*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 115 (1933): Loranthus longipes.
Lugardii (*N. E. Brown*) *Danser, l. c.*: Loranthus Lugardii.
Lujaei (*De Wild. & Th. Dur.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Lujaei.
lukwangulensis (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus lukwangulensis.
luluensis (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus luluensis.
luteiflorus (*Engl. & K. Krause*) *Danser, l. c.*: Loranthus luteiflorus.
luteo-aurantiacus (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus luteo-aurantiacus.
luteo-striatus (*Engl. & K. Krause*) *Danser, l. c.*: Loranthus luteo-striatus.
luteo-vittatus (*Engl. & K. Krause*) *Danser, l. c.*: Loranthus luteo-vittatus.
Macrosolen (*Steud. ex A. Rich.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Macrosolen.
malacophyllus (*Engl. & K. Krause*) *Danser, l. c.*: Loranthus malacophyllus.
mangheënsis (*De Wild.*) *Danser, l. c.* 116: Loranthus mangheënsis.
marginatus (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus marginatus.
mbogaënsis (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus mbogaënsis.

TAPINANTHUS:—
Menyharthii (*Engl. & Schinz*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 116 (1933): Loranthus Menyharthii.
micrantherus (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus micrantherus.
microphyllus (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus microphyllus.
minor (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus minor.
Molleri (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Molleri.
mollissimus (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus mollissimus.
Moorei (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus Moorei.
Mortehani (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Mortehani.
muerensis (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus muerensis.
musozensis (*Rendle*) *Danser, l. c.*: Loranthus musozensis.
myrsinifolius (*Engl. & K. Krause*) *Danser, l. c.*: Loranthus myrsinifolius.
natalitius (*Meissn.*) *Danser, l. c.*: Loranthus natalitius.
nigritanus (*Benth.*) *Danser, l. c.*: Loranthus nigritanus.
nitidulus (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus nitidulus.
nyasicus (*Baker & Sprague*) *Danser, l. c.* 117: Loranthus nyasicus.
obovatus (*Peter*) *Danser in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 224: Loranthus obovatus.
ochroleucus (*Engl. & K. Krause*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 117 (1933): Loranthus ochroleucus.
oedostemon *Danser in Ned. Kruidk. Arch., Versl.* 1931, 167.—S. Rhodesia.
Oehleri (*Engl.*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 117 (1933): Loranthus Oehleri.
ogowensis (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus ogowensis.
oleifolius (*Wendl.*) *Danser, l. c.*: Lichtensteinia oleifolia.
ophiodes (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus ophiodes.
pallide-viridis (*Engl. & K. Krause*) *Danser, l. c.*: Loranthus pallide-viridis.
parviflorus (*Van Tiegh.*) *Danser, l. c.*: Loranthus parviflorus.
pennatulus (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus pennatulus.
penteneurus *Danser, l. c.*: Loranthus quinquenervius *De Wild.*
petiolatus (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus petiolatus.
platyphyllus (*Hochst. ex A. Rich.*) *Danser, l. c.*: Loranthus platyphyllus.
Poggei (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Poggei.
polycryptus (*Didr.*) *Danser, l. c.*: Loranthus polycryptus.
polygonifolius (*Engl.*) *Danser, l. c.* 118: Loranthus polygonifolius.
proteicola (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus proteicola.
pseudonymus *Danser, l. c.*: Loranthus discolor *Engl. ex De Wild. & Th. Dur.*
pubiflorus (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus pubiflorus.
Pungu (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Pungu.
quinquangulus (*Engl. & Schinz*) *Danser, l. c.*: Loranthus quinquangulus.
quinquenervius (*Hochst.*) *Danser, l. c.*: Loranthus quinquenervius.
ramulosus (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus ramulosus.
Redingi (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Redingi.
regularis (*Steud. ex A. Rich.*) *Danser, l. c.*: Loranthus regularis.
remotus (*Baker & Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus remotus.
Reygaerti (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Reygaerti.
rhamnifolius (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus rhamnifolius.
rigidilobus (*K. Krause*) *Danser, l. c.*: Loranthus rigidilobus.
rondensis (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus rondensis.

TAPINANTHUS:—
rosiflorus (*Engl. & K. Krause*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 118 (1933): Loranthus rosiflorus.
rubiginosus (*De Wild.*) *Danser, l. c.* 119: Loranthus rubiginosus.
rubro-marginatus (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus rubro-marginatus.
rubro-viridis (*Van Tiegh.*) *Danser, l. c.*: Oliverella rubro-viridis.
rubro-vittatus (*Engl. & K. Krause*) *Danser, l. c.*: Loranthus rubro-vittatus.
rufescens (*DC.*) *Danser, l. c.*: Loranthus rufescens.
rugegensis (*Engl. & K. Krause*) *Danser, l. c.*: Loranthus rugegensis.
rugulosus (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus rugulosus.
Sacleuxii (*Van Tiegh.*) *Danser, l. c.*: Oliverella Sacleuxii.
sakarensis (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus sakarensis.
sambesiacus (*Engl. & Schinz*) *Danser, l. c.*: Loranthus sambesiacus.
sankuruensis (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus sankuruensis.
sansibarensis (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus sansibarensis.
Sapini (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Sapini.
Scassellatii (*Chiov.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Scassellatii.
Schimperi (*Hochst. ex A. Rich.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Schimperi.
Schlechteri (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Schlechteri.
Schubotzianus (*Engl. & K. Krause*) *Danser, l. c.* 120: Loranthus Schubotzianus.
Schweinfurthii (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Schweinfurthii.
senegalensis (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus senegalensis.
Sereti (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Sereti.
sigensis (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus sigensis.
sphaerico-compressus (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus sphaerico-compressus.
Sterculiae (*Hiern*) *Danser, l. c.*: Loranthus Sterculiae.
Stolzii (*Engl. & K. Krause*) *Danser, l. c.*: Loranthus Stolzii.
Stuhlmannii (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Stuhlmannii.
subquadrangularis (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus subquadrangularis.
subulatus (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus subulatus.
sulfureus (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus sulfureus.
Swynnertonii (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus Swynnertonii.
syringifolius (*Van Tiegh.*) *Danser, l. c.*: Acrostephanus syringifolius.
Talbotiorum (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus Talbotiorum.
tambermensis (*Engl. & K. Krause*) *Danser, l. c.*: Loranthus tambermensis.
tanganyikae (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus tanganyikae.
tenuifolius (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus tenuifolius.
Terminaliae (*Engl. & Gilg*) *Danser, l. c.*: Loranthus Terminaliae.
Thollonii (*Van Tiegh.*) *Danser, l. c.* 121: Thelecarpus Thollonii.
Thonningii (*Schumacher*) *Danser, l. c.*: Loranthus Thonningii.
Thorei (*K. Krause*) *Danser, l. c.*: Loranthus Thorei.
toroënsis (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus toroënsis.
tricolor (*Peter*) *Danser in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 224: Loranthus tricolor.
trinervius (*Engl.*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 121 (1933): Loranthus trinervius.
triplinervius (*Baker & Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus triplinervius.
truncatus (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus truncatus.
tschertscherensis (*Pax*) *Danser, l. c.*: Loranthus tschertscherensis.
tschintschochensis (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus tschintschochensis.

TAPINANTHUS:—
ugogensis (*Engl.*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 121 (1933): Loranthus ugogensis.
uhehensis (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus uhehensis.
umbelliflorus (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus umbelliflorus.
unyorensis (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus unyorensis.
usambarensis (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus usambarensis.
usuiensis (*Oliv.*) *Danser, l. c.*: Loranthus usuiensis.
Vanderystii (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Vanderystii.
variifolius (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus variifolius.
Verschuereni (*De Wild.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Verschuereni.
villosiflorus (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus villosiflorus.
viminalis (*Engl. & K. Krause*) *Danser, l. c.*: Loranthus viminalis.
vittatus (*Engl.*) *Danser, l. c.* 122: Loranthus vittatus.
Warneckii (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Warneckii.
Welwitschii (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Welwitschii.
Wentzelianus (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Wentzelianus.
woodfordioides (*Schweinf.*) *Danser, l. c.*: Loranthus woodfordioides.
Wyliei (*Sprague*) *Danser, l. c.*: Loranthus Wyliei.
xanthanthus *Danser, l. c.*: Loranthus luteiflorus *De Wild.*, non *Engl.*
Zeyheri (*Harv.*) *Danser, l. c.*: Loranthus Zeyheri.
zizyphifolius (*Engl.*) *Danser, l. c.*: Loranthus zizyphifolius.
zygiarum (*Hiern*) *Danser, l. c.*: Loranthus zygiarum.

TAPINOSTEMMA Van Tiegh. (Loranthac.).
meridianum *Danser in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 216 (1931).—Tanganyika Terr.

TAPIPHYLLUM Robyns (Rubiac.).
Fadogia *Bullock in Kew Bull.* 1933, 147.—Tanganyika Terr.
floribundum *Bullock, l. c.* 472.—Tanganyika Terr.
fulvum *Robyns in Journ. Bot.* 1931, lxix. 186.—Angola.
Gossweileri *Robyns, l. c.* 185.—Angola.
grandiflorum *Bullock in Kew Bull.* 1933, 148.—N. Rhodesia.
molle *Robyns in Journ. Bot.* 1931, lxix. 186.—Angola.

TAPIRIRA Aubl. (Anacardiac.).
retusa *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 741.—Bras. (Amaz.; Pará).

TAPURA Aubl. (Dichapetalac.; Chailletiac., Gen. Pl.).
coriacea *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 68 (1931).—Peruv.
leucantha *K. Krause in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 136 (1931).—Peruv.
peruviana *K. Krause, l. c.* 135.—Peruv.

TARAKTOGENOS Hassk. (Flacourtiac.; Bixac., Gen. Pl.).
calophyllum *Ridley in Hook. Ic. Pl.* xxxii. t. 3167 (1932).—Borneo.

TARALEA Aubl. (Legumin.).
crassifolia (*Benth.*) *Ducke in Rev. Bot. Appliq.* 1934, xiv. 407: Dipteryx crassifolia.
reticulata (*Benth.*) *Ducke, l. c.*: Dipteryx reticulata.

TARAXACUM [Zinn, 1757, pro parte] Wiggers (Compos.) [nomen conservandum.]
acerrinum *Hagl. ex Christiansen in Bot. Tidsskr.* xliii. 238 (1935), nomen.—Dania.
acromaurum *Dahlst. in Ostenf. & Grøntv. Fl. Iceland & Faeroes*, 146 (1934).—Islandia.
acroschistum *Hagl. in Bot. Notiser*, 1935, 97.—Dania.
aequisectum *Christiansen in Bot. Tidsskr.* xliii. 239 (1935), nomen.—Dania.
alaid-litorale *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 467.—Ins. Kuril.
alaid-montanum *Koidz. l. c.*—Ins. Kuril.

TARAXACUM:—

albo-ciliatum *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 561.—Japon.
albo-marginatum *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 103.—Manchur.; Corea.
aleuticum *Tatewaki & Kitamura in Journ. Fac. Agric., Sapporo,* xxxvi. 89 (1934).—Ins. Aleut.
alpicola *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 123.—Japon. (Hondo).
ambigens *Fernald in Rhodora,* 1933, xxxv. 376.—Labrador; Newfoundland; Quebec.
amblyphyllum *Markl. ex Hagl. in Bot. Notiser,* 1935, 130.—Dania.
amborum *Hagl. in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 5, 25 (1934).—Graecia.
amphilobum *Christiansen in Bot. Tidsskr.* xliii. 238 (1935), nomen.—Dania.
amphiodon *Dahlst. in Bot. Notiser,* 1934, 3.—Suecia; Dania.
angermannicum *Dahlst. l. c.* 1935, 295.—Suecia.
angliciforme *Dahlst. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles,* 1932, x. 26 (1933).—Cambria.
angustum *H. Lindb. in Acta Bot. Fenn.* No. 17, p. 13 (1935), nomen.—Fennia.
apoënse *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* ix. 356 (1933).—Japon. (Yezo).
Arakii *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 182.—Japon. (Hondo).
aristatum *Koidz. in Bot. Mag., Tokyo,* 1933, xlvii. 111.—Japon.
armeniacum *Schischk. in Grossheim, Fl. Kavkaza,* iv. 246 (1934).—Caucas.
asconense *Dahlst. in Ber. Schweiz. Bot. Ges.* xlii. 722 (1933).—Helvet.
atkaënse *Tatewaki & Kitamura in Journ. Fac. Agric., Sapporo,* xxxvi. 90 (1934).—Ins. Aleut.
atlanticola *H. Lindb. Itin. Mediterr. (Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 170 (1932).—Marocc.
atlantis-majoris *H. Lindb. l. c.*—Marocc.
atripictum *Markl. ex Pettersson in Mem. Soc. Faun. Fl. Fenn.* 1933–4, No. 10, 221 (1934), nomen.—Esthonia.
atriviolaceum *H. Lindb. in Acta Bot. Fenn.* No. 17, p. 17 (1935), in syn.: T. cuspidatum.
atrovirens *Dahlst. in Bot. Notiser,* 1935, 100.—Dania.
balcanicum *K. H. Rechinger in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 19.—Macedon.; Thessal.
balticiforme *Dahlst. in Ber. Schweiz. Bot. Ges.* xlii. 719 (1933).—Gallia; Helvet.
bitchuense *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* ix. 352 (1933).—Japon. (Hondo).
Boldtii *H. Lindb. in Acta Bot. Fenn.* No. 17, p. 16 (1935), nomen.—Fennia.
brachyphyllum *Koidz. in Bot. Mag., Tokyo,* 1933, xlvii. 109.—Japon.
brevisquamum *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 472.—Ins. Kuril.
caespitans *Dahlst. in Bot. Notiser,* 1935, 297.—Suecia.
candidum *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 563.—Japon.
ceratolepis *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 183.—Japon. (Hondo).
chlorodes *Hagl. in Bot. Notiser,* 1934, 398.—Dania.
chloroticum *Dahlst. ex Florstr.; Dahlst. in Bot. Notiser,* 1935, 298, descr.—Suecia; Fennia.
concinnum *Hagl. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 9, 16 (1932).—Suecia.
confertilobum *H. Lindb. in Acta Bot. Fenn.* No. 17, p. 16 (1935), nomen.—Fennia.
confusum *Schischk. in Grossheim, Fl. Kavkaza,* iv. 251 (1934).—Caucas.
constrictifrons *Markl. ex Eklund in Mem. Soc. Faun. Fl. Fenn.* 1933–4, No. 10, 35, in obs., 190 (1934).—Fennia.
coreanum *Nakai in Bot. Mag., Tokyo,* 1932, xlvi. 62.—Corea.
crassicollum *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 469.—Ins. Kuril.
crispatum *Dahlst. in Bot. Notiser,* 1935, 300.—Suecia.
crispulum *Hagl. in Bot. Notiser,* 1934, 6.—Suecia.
curvatum *Dahlst. in Ber. Schweiz. Bot. Ges.* xlii. 721 (1933).—Helvet.
Dahlii *Dahlst. in Bot. Notiser,* 1935, 301.—Norveg.
Degelii *Hagl. in Bot. Notiser,* 1935, 430.—Hibern.

TARAXACUM:—

deltoideum *Hagl. in Bot. Notiser,* 1935, 101.—Suecia.
denigratum *Christiansen in Bot. Tidsskr.* xliii. 238 (1935), nomen.—Dania.
densilobum *Dahlst. in Bot. Notiser,* 1935, 303.—Suecia.
denticorne *Koidz. in Bot. Mag., Tokyo,* 1934, xlviii. 673.—Japon. (Hondo).
denticulato-marginatum *Koidz. l. c.* 670.—Japon. (Hondo).
dentosum *Christiansen in Bot. Tidsskr.* xliii. 238 (1935), nomen.—Dania.
denudatum *Koidz. in Bot. Mag., Tokyo,* 1933, xlvii. 94.—Japon. (Hondo).
desertorum *Schischk. in Grossheim, Fl. Kavkaza,* iv. 251 (1934).—Caucas.
devians *Dahlst. in Ostenf. & Gröntv. Fl. Iceland & Faeroes,* 145 (1934).—Islandia; Ins. Faröe.
dilaceratum *Christiansen in Bot. Tidsskr.* xliii. 238 (1935), nomen.—Dania.
dissectissimum (*Koidz.*) *Koidz. in Bot. Mag., Tokyo,* 1934, xlviii. 676: T. hondoënse subsp. dissectissimum.
distinctum *H. Lindb. in Acta Bot. Fenn.* No. 17, p. 17 (1935), nomen.—Fennia.
diversilobum *Hagl. in Bot. Notiser,* 1934, 8.—Dania; Latvia.
dolichocephalum *Dahlst. ex Christiansen in Bot. Tidsskr.* xliii. 238 (1935), nomen.—Dania.
elatum *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 118.—Japon. (Hondo).
ensigerum *Hagl. in Bot. Notiser,* 1934, 400.—Dania.
epacrum *Dahlst. in Bot. Notiser,* 1935, 304.—Suecia.
excellens *Dahlst. l. c.* 305.—Suecia.
fallax *Pettersson ex Eklund in Mem. Soc. Faun. Fl. Fenn.* 1933–4, No. 10, 191 (1934).—Fennia.
filicinum *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* ix. 350 (1933).—Japon. (Hondo).
foliosissimum *Koidz. in Bot. Mag., Tokyo,* 1934, xlviii. 671.—Japon. (Hondo).
formosanum *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 48.—Formosa.
frigicola *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 465.—Ins. Kuril.
frigidopratense *Koidz. l. c.* 475.—Ins. Kuril.
frigidum *Koidz. l. c.* 468.—Ins. Kuril.
fujisanense *Koidz. l. c.* 562.—Japon.
gamborgense *Christiansen in Bot. Tidsskr.* xliii. 238 (1935), nomen.—Dania.
gelertiiforme *Christiansen, l. c.*, nomen.—Dania.
giganteum *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* ix. 362 (1933).—Ins. Kuril.
gladiolare *Christiansen in Bot. Tidsskr.* xliii. 238 (1935), nomen.—Dania.
glossocentrum *Dahlst. in Bot. Notiser,* 1934, 11.—Suecia; Fennia.
graminifolium *Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève,* 1930, Sér. II. xxii. 463 (1931).—Gallia.
grandidens *Christiansen in Bot. Tidsskr.* xliii. 238 (1935), nomen.—Dania.
grandifolium *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 472.—Ins. Kuril.
Grossheimii *Schischk. in Grossheim, Fl. Kavkaza,* iv. 250 (1934).—Caucas.
haematopodides *H. Lindb. in Acta Bot. Fenn.* No. 17, p. 18 (1935), nomen.—Fennia.
heterolepis *Nakai & Koidz. ex Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo,* 1933, xlvii. 829.—Manchur.
hibernicum *Hagl. in Bot. Notiser,* 1935, 433.—Hibern.
Hideoi *Nakai in Journ. Jap. Bot.* ix. 351 (1933).—Japon. (Hondo).
Hisauchii *Koidz. in Bot. Mag., Tokyo,* 1934, xlviii. 668.—Japon. (Hondo).
hispanicum *H. Lindb. Itin. Mediterr. (Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 171 (1932).—Hispan.
hondoënse *Nakai ex Koidz. in Bot. Mag., Tokyo,* 1933, xlvii. 119.—Japon.
hotakaënse *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* ix. 363 (1933).—Japon. (Hondo).
Huelphersianum *Dahlst. ex Hagl. in Bot. Notiser,* 1934, 402, in obs.; *Dahlst. in Bot. Notiser,* 1935, 104.—Suecia; Dania; Fennia.

TARAXACUM:—

imbricatum *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* ix. 358 (1933).—Japon. (Yezo).
inaënse *Koidz. l. c.* 1935, xi. 561.—Japon.
insigne *Dahlst. ex Hagl. in Bot. Notiser,* 1934, 372, in obs., nomen.—Dania.
intumescens *Hagl. l. c.* 14.—Dania; Memel.
inugawense *Koidz. in Bot. Mag., Tokyo,* 1933, xlvii. 97.—Japon. (Hondo).
Junpeianum *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 103.—Manchur.
kansaiense *Koidz. ex Kitamura, l. c.* 1933, ii. 125.—Japon.
karatavicum *Pavlov in Sovietsk. Bot.* 1934, No. 1, 29, in obs., nomen.—Turkestan.
ketoiense *Tatewaki & Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 106.—Ins. Kuril.
Kimuranum *Kitamura, l. c.* 103.—Ins. Kuril.
kisoënse *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* ix. 350 (1933).—Japon. (Hondo).
kiushianum *Koidz. in Bot. Mag., Tokyo,* 1933, xlvii. 100.—Japon. (Kiushiu).
Kojimae *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 119.—Ins. Kuril.
kok-saghyz *Rodin in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS,* Ser. I. Fasc. 1, 187 (1933).—Turkestan. (Thian Shan).
Kudoanum *Tatewaki & Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 104.—Ins. Kuril.
kurohimense *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* ix. 363 (1933).—Japon. (Hondo).
lacerilobum *Dahlst. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles,* 1931, ix. 562 (1932).—Anglia.
laciniosifrons *Dahlst. ex Wiinst. in Raunk. Dansk Exkursionsfl.* ed. 5, 309 (1934); *Dahlst. in Bot. Notiser,* 1935, 108.—Eur. bor.
lacistophylloides *Dahlst. in Ber. Schweiz. Bot. Ges.* xlii. 719 (1933).—Gallia; Helvet.
laetevirens *H. Lindb. in Acta Bot. Fenn.* No. 17, p. 21 (1935), in syn.: T. polyodon.
laeticeps *Hagl. in Bot. Notiser,* 1934, 17.—Suecia.
laetifrons *Hagl. l. c.* 20.—Dania; Suecia.
laevirostrum *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* ix. 360 (1933).—Japon. (Yezo).
lamprophyllum *Christiansen in Bot. Tidsskr.* xliii. 238 (1935), nomen.—Dania.
lanibasis *Koidz. in Bot. Mag., Tokyo,* 1934, xlviii. 672.—Japon. (Hondo).
lasianthum *Koidz. l. c.* 591.—Sakhalin.
latifolium *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 120.—Corea.
latisectiforme *Markl. ex Eklund in Mem. Soc. Faun. Fl. Fenn.* 1933–4, No. 10, 194 (1934), nomen.—Fennia ?
laurentianum *Fernald in Rhodora,* 1933, xxxv. 375.—Newfoundland; Quebec.
Lehbertii *H. Lindb. ex Pettersson in Mem. Soc. Faun. Fl. Fenn.* 1933–4, No. 10, 221 (1934), nomen.—Esthonia.
leiophyllum *Koidz. in Bot. Mag., Tokyo,* 1933, xlvii. 102.—Japon. (Hondo).
lepidum *Christiansen in Bot. Tidsskr.* xliii. 238 (1935), nomen.—Dania.
leptophyllum *H. Lindb. in Acta Bot. Fenn.* No. 17, p. 8, in obs., 19 (1935), nomen.—Fennia.
liaotungense *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo,* 1933, xlvii. 825.—Manchur.
Lindbergii *Markl. ex Pettersson in Mem. Soc. Faun. Fl. Fenn.* 1933–4, No. 10, 222 (1934), nomen.—Esthonia.
linguatum *Dahlst. ex Raunk. Dansk Exkursionsfl.* ed. 5, 313 (1934); *Dahlst. in Bot. Notiser,* 1935, 307.—Suecia; Dania.
Litvinovii *Schischk. in Grossheim, Fl. Kavkaza,* iv. 250 (1934).—Caucas.
liukiuense *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* ix. 350 (1933).—Ins. Liukiu.
livens *Koidz. l. c.* 357.—Japon. (Yezo).
livonicum *Markl. ex Pettersson in Mem. Soc. Faun. Fl. Fenn.* 1933–4, No. 10, 222 (1934), nomen.—Esthonia.
lobuliferum *Markl. ex Pettersson, l. c.* 221, nomen.—Esthonia.
lojoënse *H. Lindb. in Acta Bot. Fenn.* No. 17, p. 8, in obs., 19 (1935), nomen.—Fennia.
longe-caudatum *Koidz. in Bot. Mag., Tokyo,* 1934, xlviii. 679.—Japon. (Hondo).

TARAXACUM:—

longe-petiolatum *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 475.—Ins. Kuril.
longifolium *Koidz. l. c.* ix. 361 (1933).—Ins. Kuril.
longifrons *Hagl. in Bot. Notiser*, 1935, 111.—Suecia.
Longii *Fernald in Rhodora*, 1933, xxxv. 379.—Newfoundland; Quebec.
lunatum *Lindstr. ex Hagl. in Bot. Notiser*, 1934, 396, in syn.: T. trilobatum.
macrolepium *Schischk. in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 249 (1934).—Caucas.
marginellum *Christiansen in Bot. Tidsskr.* xliii. 239 (1935), in obs., non seq.—Dania.
marginellum *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 171 (1932).—Hispan.
maroccanum *H. Lindb. l. c.*—Marocc.
megaranthum *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 471.—Ins. Kuril.
melanostigma *H. Lindb. in Acta Bot. Fenn.* No. 17, p. 20 (1935), nomen.—Fennia.
melanthes *Dahlst. ex Hagl. in Bot. Notiser*, 1934, 398, in syn.: T. xanthostigma.
melanthoides *Dahlst. ex Hagl. l. c.* 389, nomen; *Dahlst. in Bot. Notiser*, 1935, 309, descr.—Suecia.
messanense *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 171 (1932).—Marocc.
micranthum *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 183.—Japon. (Hondo).
microcarpum *Koidz. in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 590, non seq.—Sakhalin.
microcarpum *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 172 (1932).—Hispan.
microcranum *Markl. ex Pettersson in Mem. Soc. Faun. Fl. Fenn.* 1933–4, No. 10, 222 (1934), nomen.—Esthonia.
microlobum *Markl. ex Eklund in Mem. Soc. Faun. Fl. Fenn.* 1933–4, No. 10, 201 (1934), in obs.—Fennia.
mimuloides *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 172 (1932).—Hispan.
miniatum *H. Lindb. l. c.*—Hispan.
minoënse *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* ix. 353 (1933).—Japon. (Hondo).
Miyabei *Koidz. in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 113.—Japon.
mongolicum *Hand.-Mazz.*; *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 824, descr. emend.—China.
mosciense *Dahlst. in Ber. Schweiz. Bot. Ges.* xlii. 722 (1933).—Helvet.
multifidum *Hagl. in Bot. Notiser*, 1934, 23.—Suecia.
multilobum *Dahlst. ex Eklund in Mem. Soc. Faun. Fl. Fenn.* 1933–4, No. 10, 196 (1934).—Fennia.
multiseriale *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* ix. 357 (1933).—Japon. (Yezo).
multisulcatum *Koidz. l. c.* 1935, xi. 476.—Ins. Kuril.
Muraii *Koidz. in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 678.—Japon. (Hondo).
nairoënse *Koidz. l. c.* 593.—Sakhalin.
Nakaii *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* ix. 354 (1933).—Japon. (Hondo).
nambuënse *Koidz. l. c.* 363.—Japon. (Hondo).
napifolium *Koidz. l. c.* 356.—Japon. (Yezo).
nemorum *Hagl. in Bot. Notiser*, 1935, 114.—Suecia.
Nemotoi *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* ix. 355 (1933).—Japon. (Hondo).
neorhodobasis *Koidz. in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 680.—Japon. (Hondo).
nevadense *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 172 (1932).—Hispan.
nipesotsuense *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* ix. 357 (1933).—Japon. (Yezo).
nudicola *Koidz. in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 117.—Japon.
Numajirii *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* ix. 364 (1933).—Japon. (Hondo).
nutans *Dahlst. in Svensk Bot. Tidskr.* 1932, xxvi. 264.—China (Shansi).
obscuratum *Hagl. in Bot. Notiser*, 1934, 26.—Dania; Suecia.
obtusilobum *Dahlst. in Bot. Notiser*, 1935, 117.—Suecia; Dania.
obtusiusculum *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 173 (1932).—Hispan.

TARAXACUM:—

Ohashitatsuoi *Koidz. ex Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 125.—Ins. Kuril.
Ohwianum *Kitamura, l. c.* 124.—Corea.
orphnocephalum *Dahlst. & Ohlsén in Bot. Notiser*, 1935, 312.—Suecia.
ostrobottnicum *H. Lindb. in Acta Bot. Fenn.* No. 17, p. 20 (1935), nomen.—Fennia.
Otagirianum *Koidz. ex Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 127.—Sakhalin.
Otayae *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* ix. 354 (1933).—Japon. (Hondo).
pachypodum *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 173 (1932).—Marocc.
pallens *H. Lindb. ex Pettersson in Mem. Soc. Faun. Fl. Fenn.* 1933–4, No. 10, 222 (1934), nomen.—Esthonia.
pallidipes *Markl. ex Hagl. in Bot. Notiser*, 1934, 29.—Suecia.
pannulatiforme *Dahlst. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1931, ix. 563 (1932).—Anglia.
pargasense *H. Lindb. in Acta Bot. Fenn.* No. 17, p. 9, in obs., 20 (1935), nomen.—Fennia.
parvilobum *Dahlst. in Ber. Schweiz. Bot. Ges.* xlii. 720 (1933), an seq.—Helvet.
parvilobum *Markl. ex Eklund in Mem. Soc. Faun. Fl. Fenn.* 1933–4, No. 10, 196 (1934).—Fennia.
patulum *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* ix. 353 (1933).—Japon. (Hondo).
pectinatum *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 119.—Japon. (Hondo).
peninsulae *Nakai ex Koidz. in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 96.—Corea.
percrispum *Christiansen in Bot. Tidsskr.* xliii. 238 (1935), nomen.—Dania.
platylobum *Dahlst. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1932, x. 26 (1933).—Anglia.
plicatum *Dahlst. l. c.* 1933, x. 476 (1934).—Ins. Orkney.
polylobum *Dahlst. ex Hagl. in Bot. Notiser*, 1934, 382, in syn.: T. crispifolium.
porrectidens *Dahlst. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1931, ix. 563 (1932).—Anglia.
praecox *Dahlst. ex Hagl. in Bot. Notiser*, 1934, 372, 391, nomen.—Dania.
praeradiantifrons *Dahlst. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1932, x. 27 (1933).—Anglia.
praticola *Schischk. in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 245 (1934).—Caucas.
protractifrons *Dahlst. ex Hagl. in Bot. Notiser*, 1934, 386, in adnot.—Dania.
pruinatum *Christiansen in Bot. Tidsskr.* xliii. 238 (1935), nomen.—Dania.
pruiniferum *H. Lindb. in Acta Bot. Fenn.* No. 17, p. 21 (1935), nomen.—Fennia.
pruinosum *Koidz. in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 596.—Sakhalin.
pseudo-albidum *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 831.—Manchur.
pseudohamatum *Dahlst. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1931, ix. 564 (1932).—Anglia.
pseudolasianthum *Koidz. in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 592.—Sakhalin.
pseudopatulum *Koidz. l. c.* 679.—Japon. (Hondo).
pseudo-trigonolobum *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 474.—Ins. Kuril.
pycnodes *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 173 (1932).—Marocc.
quelpaertense *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 184.—Corea (Quelpaert).
recurvilobum *Dahlst. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1931, ix. 564 (1932).—Anglia.
reflectens *Dahlst. apud Lyche in K. Norske Vid. Selsk. Forh.* 1934, vii. No. 5, 14 (1935).—Norveg.
rhamphodes *Hagl. in Bot. Notiser*, 1935, 120.—Suecia; Dania.
rhodobasis *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* ix. 359 (1933).—Japon. (Yezo).
rhodopodum *Dahlst. ex Hagl. in Bot. Notiser*, 1934, 392, nomen.—Dania.
robustius *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 564: T. hondoënse var robustum *Koidz.*
robustum *Koidz. in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 92.—Japon. (Hondo).
ruberulum *Dahlst. & Borgv. in Bot. Notiser*, 1932, 63.—Suecia.

TARAXACUM:—

rubisquameum *Christiansen in Bot. Tidsskr.* xliii. 238 (1935), nomen.—Dania.
rubro-lineatum *H. Lindb. in Acta Bot. Fenn.* No. 17, p. 21 (1935), nomen.—Fennia.
sachalinense *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 121.—Sakhalin.
sachalinense *Koidz. in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 597.—Sakhalin.
sagittipotens *Dahlst. & Ohlsén in Bot. Notiser*, 1934, 29.—Dania; Suecia.
saxatile *Koidz. in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 594.—Sakhalin.
scaturiginosum *Hagl. in Arkiv Bot., Stockh.* xxvi. A. No. 5, 26 (1934).—Graecia.
Schelkovnikovii *Schischk. in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 251 (1934).—Caucas.
sendaicum *Kitamura ex Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. p. (7), japonice; *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 104, latine.—Japon.
shikokianum *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 121.—Japon. (Hondo).
shikotanense *Kitamura, l. c.* 126.—Ins. Kuril.; Japon. (Yezo).
shimushirense *Tatewaki & Kitamura, l. c.* 1934, iii. 105.—Ins. Kuril.
shinanense *Koidz. in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 89.—Japon.
shiroumense *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* ix. 362 (1933).—Japon. (Hondo).
shumushuense *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 124.—Ins. Kuril.
sinicum *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 826: T. sinense *Dahlst.*
sonchifolium *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* ix. 349 (1933).—Japon. (Yezo).
splendidum *Hagl. in Bot. Notiser*, 1935, 122.—Suecia.
squamatissimum *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 470.—Ins. Kuril.
Steenhoffianum *Dahlst. in Bot. Notiser*, 1935, 313.—Suecia.
sub-bipinnatum (*Koidz.*) *Koidz. in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 684: T. venustum subsp. sub-bipinnatum.
subdissimile *Dahlst. in Ber. Schweiz. Bot. Ges.* xlii. 719 (1933).—Helvet.
subestriatum *Christiansen in Bot. Tidsskr.* xliii. 238 (1935), nomen.—Dania.
subhamatum *Christiansen, l. c.*, nomen.—Dania.
submosciense *Dahlst. in Ber. Schweiz. Bot. Ges.* xlii. 723 (1933).—Helvet.
submucronatum *Dahlst. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1931, ix. 565 (1932).—Anglia.
subpraticola *Hagl. in Bot. Notiser*, 1934, 33.—Suecia.
subspiculatum *Christiansen in Bot. Tidsskr.* x liii. 238 (1935), nomen.—Dania.
Sugawarae *Koidz. in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 588, 684.—Sakhalin.
surrigens *Dahlst. & Ohlsén in Bot. Notiser*, 1935, 315.—Suecia.
tanyolobum *Dahlst. in Ber. Schweiz. Bot. Ges.* xlii. 720 (1933).—Helvet.
tanyphyllum *Dahlst. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1931, ix. 565 (1932).—Anglia.
tenillisquameum *Markl. ex Eklund in Mem. Soc. Faun. Fl. Fenn.* 1933–4, No. 10, 35, in obs., 199 (1934).—Fennia.
tenue *Hagl. in Bot. Notiser*, 1934, 36.—Suecia.
tenuissimum *Nakai ex Koidz. in Journ. Jap. Bot.* ix. 351 (1933).—Japon. (Kiushiu).
togakushiense *Koidz. in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 667.—Japon. (Hondo).
tokachiense *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 560.—Japon.
tokaiense *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 122.—Japon. (Hondo).
torngatense *Fernald in Rhodora*, 1933, xxxv. 385.—Labrador.
towadense *Koidz. in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 676.—Japon. (Hondo).
trigonum *Christiansen in Bot. Tidsskr.* xliii. 239 (1935), nomen.—Dania.
triquetrum *Christiansen, l. c.* 238, nomen.—Dania.
Tsurumachii *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 107.—Japon.

TARAXACUM:—
tubiflorum *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* ix. 352 (1933). —Japon. (Kiushiu).
tumentilobum *Markl. ex Hagl. in Bot. Notiser,* 1934, 38.—Dania; Suecia.
Uianum *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 564. —Japon.
uncosum *Hagl. in Bot. Notiser,* 1935, 125.—Suecia.
undulatiflorum *Christiansen in Bot. Tidsskr.* xliii. 238 (1935), nomen.—Dania.
unguilobiforme *Dahlst. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles,* 1933, x. 475 (1934).—Ins. Orkney.
ussuriense *Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS,* 1931, xxx. 221 (1932).—Sibir. (Marit. Prov.).
Vachellii *Dahlst. in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles,* 1932, x. 26 (1933).—Hab. ?
valloënse *Christiansen in Bot. Tidsskr.* xliii. 238 (1935), nomen.—Dania.
variabile *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 106.—Japon.
vastisectum *Markl. ex Hagl. in Bot. Notiser,* 1935, 130.—Dania.
vegetum *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* ix. 361 (1933). —Ins. Kuril.
venustum *Koidz. in Bot. Mag., Tokyo,* 1933, xlvii. 104.—Japon.
violascens *Dahlst. in Bot. Notiser,* 1935, 126.—Suecia; Dania.
vitelliniforme *Hagl. in Bot. Notiser,* 1934, 38.—Dania; Suecia.
vulcanorum *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* ix. 361 (1933).—Ins. Kuril.
Yamamotoi *Koidz. ex Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 127.—Ins. Kuril.
yatsugatakense *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* ix. 355 (1933).—Japon. (Hondo).
yesoalpinum *Nakai ex Koidz. l. c.* 359.—Japon. (Yezo).
yetchuense *Koidz. l. c.* 354.—Japon. (Hondo).
yetrofuense *Kitamura in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 184.—Ins. Kuril.
yezoënse *Koidz. in Kyozai-Kôza,* vi. No. 9, p. 14 (1930); *Koidz. in Journ. Jap. Bot.* ix. 360 (1933). —Japon. (Yezo).
yuparense *Koidz. l. c.* ix. 358 (1933).—Japon. (Yezo).

TARAXACUM Zinn, Cat. Pl. Gott. 425 (1757): **Leontodon** L. (Compos.).

TARENNA Gaertn. (Rubiac.).
arborescens *Ridley in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 271. —Borneo.
asteriscus (*K. Schum.*) *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 7, in obs., 199 (1934): Ixora asteriscus.
attenuata (*Hook. f.*) *Hutchinson in Sarg. Pl. Wils.* iii. 411 (1916), in obs.: Webera attenuata.
axillaris *Ridley in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 273.—Borneo.
Bakeri (*Merrill*) *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 187 (1934): Pavetta Bakeri.
barbetonensis (*Bremek.*) *Bremek. l. c.* 7, in obs.: Stylocoryne barbetonensis.
Bartlettii *Ridley in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 273.—Borneo.
bipindensis (*K. Schum.*) *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 7, in obs., 208 (1934): Chomelia bipindensis.
calycina (*Korth.*) *Bremek. l. c.* 189: Pavetta calycina.
canarica (*Bedd.*) *Bremek. l. c.*: Pavetta canarica.
ciliolata (*Korth.*) *Bremek. l. c.*: Pavetta ciliolata.
cinerea (*A. Rich.*) *Bremek. l. c.*: Pavetta cinerea.
cinerea *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 88 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 276, descr. ampl.—Siam.
cinnamomea *Craib, l. c.*; *et l. c.* 277, descr. ampl. —Siam.
compactiflora (*Kurz*) *Bremek. in Fedde Repert.* xxxvii. 190 (1934): Ixora compactiflora.
crassifolia *Ridley in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 257.—Borneo.
debilis *Ridley, l. c.* 272.—Borneo.
elliptica *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 90 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 278, descr. ampl.—Siam.
flava *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon,* vi. Suppl., 150 (1931).—Ind. or.-austr.; Zeylan.
Friesiorum (*K. Krause*) *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 192 (1934): Pavetta Friesiorum.

TARENNA:—
glaberrima *Ridley in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 257, in obs.: T. glabra *Ridley.*
gracilipes (*Hayata*) *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 57 (1934): Chomelia gracilipes.
graveolens (*S. Moore*) *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 193 (1934): Pavetta graveolens.
Gyokushinkwa *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 57 (1934).—Ins. Liukiu; Kiushiu.
hirsuta *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 91 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 278, descr. ampl. —Siam.
hispidula *Craib, l. c.*; *et l. c.* 279, descr. ampl. —Siam.
Hosei *Ridley in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 272.—Borneo.
Hutchinsonii *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 200 (1934): Pavetta nigrescens *Hutchinson & Dalziel,* non Tarenna nigrescens *Hiern.*
Junodii (*Schinz*) *Bremek. l. c.* 7, in obs.: Chomelia Junodii.
kotoënsis (*Hayata*) *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa,* 1932, xxii. 462: Chomelia kotoënsis.
kwangsiensis *Hand.-Mazz. in Sinensia,* v. 14 (1934).—China (Kwangsi).
lagosensis *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 76 (1931).—Nigeria.
lancifolia (*Hayata*) *Kanehira & Sasaki in Sasaki, List Pl. Formos.* 387 (1928): Chomelia lancifolia.
lasiorhachis (*K. Schum. & K. Krause*) *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 196 (1934): Pavetta lasiorhachis.
Laui *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 59 (1935). —China (Hainan).
limbata (*Stapf*) *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 197 (1934): Pavetta limbata.
Loheri (*Merrill*) *Bremek. l. c.*: Pavetta Loheri.
luteola (*Stapf*) *Bremek. l. c.* 7, in obs., 197: Pavetta luteola.
luzoniensis (*Vidal*) *Bremek. l. c.* 198: Webera luzoniensis.
macroptera (*Miq.*) *Bremek. l. c.* 187, 198: Pavetta macroptera.
Meyeri (*Elmer*) *Bremek. l. c.* 199: Pavetta Meyeri.
multinervia (*Merrill*) *Bremek. l. c.* 200: Pavetta multinervia.
neurophylla (*S. Moore*) *Bremek. l. c.*: Pavetta neurophylla.
nilagirica (*Bedd.*) *Bremek. l. c.*: Pavetta nilagirica.
oblanceolata *Ridley in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 256. —Borneo.
patula *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 75, in clavi, 76 (1931).—Nigeria.
pilosa (*Craib*) *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 202 (1934): Pavetta pilosa.
puberula *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 94 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 279, descr. ampl.—Siam.
pubescens (*Bartl. ex DC.*) *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 203 (1934): Stylocoryne pubescens.
pubescens *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 94 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 280, descr. ampl.—Siam.
punctata (*K. Krause*) *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 203 (1934): Pavetta punctata.
rhypalostigma (*Schlechter*) *Bremek. l. c.*: Pavetta rhypalostigma.
sakae *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 95 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 280, descr. ampl.—Siam.
Soyauxii (*Hiern*) *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 7 (1934), in obs.: Ixora Soyauxii.
subsessilis (*A. Gray*) *Hosokawa in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan,* 1934, vi. 206; *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 58 (1934): Stylocoryne subsessilis.
sumatrensis (*Roth*) *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 206 (1934): Pavetta sumatrensis.
supra-axillaris (*Hemsl.*) *Bremek. l. c.*: Pavetta supra-axillaris.
sylvicola (*Ridley*) *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 158 (1934): Stylocoryne sylvicola.
Thomasii *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 75, in clavi, 76 (1931).—Guinea Gall.; Sierra Leone.
trichantha (*Baker*) *Bremek. in Fedde, Repert.* xxxvii. 207 (1934): Pavetta trichantha.
Tsangii *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xi. 59 (1932). —China (Hainan).
valida *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 96 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 281, descr. ampl.—Siam.

TARENNA:—
Vignei *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 75, in clavi, 76 (1931).—Gold Coast.
viridis *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 97 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 282, descr. ampl.—Siam.

TARIGIDIA Stent in Kew Bull. 1932, 151. *GRAMINEAE.*
aequiglumis (*Goossens*) *Stent, l. c.*: Anthephora aequiglumis.

TARRIETIA Blume (Sterculiac.).
parvifolia (*Merrill*) *Merrill & Chun in Sunyatsenia,* ii. 281 (1935): Heritiera parvifolia.

TASSADIA Decne. (Asclepiadac.).
apocynella *Gleason & Moldenke in Phytologia,* i. 15 (1933).—Colomb.
Rusbyi *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago,* Bot. Ser., xi. 34 (1931): T. Sprucei *Rusby.*

TATEA F. Muell. (Verbenac.).
herbacea (*Roxb.*) *Junell in Symb. Bot. Upsal.* No. 4 (*Gynäceummorph. u. Syst. Verbenac. u. Labiat.*) 85 (1934): Premna herbacea.
humilis (*Merrill*) *Junell, l. c.*: Pygmaeopremna humilis.

TATEANTHUS Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl. 1931, lviii. 424. *MELASTOMATACEAE.*
duidae *Gleason, l. c.*—Venez.

TAVEUNIA Burret in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu, xi. No. 4, 12 (1935). *PALMAE.*
trichospadix *Burret, l. c.* 13.—Ins. Viti.

TAXILLUS Van Tiegh. (Loranthac.).
aldabrensis (*Turrill*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 123 (1933): Loranthus aldabrensis.
amplifolius (*Lecomte*) *Danser, l. c.*: Loranthus amplifolius.
Balansae (*Lecomte*) *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 445 (1931): Loranthus Balansae.
Balfourianus (*Diels*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 123 (1933): Loranthus Balfourianus.
Baroni (*Baker*) *Danser, l. c.*: Loranthus Baroni.
Bojeri (*Baker*) *Danser, l. c.*: Loranthus Bojeri.
caloreas (*Diels*) *Danser, l. c.*: Loranthus caloreas.
clavatus (*Desr.*) *Danser, l. c.*: Loranthus clavatus.
collapsus (*Lecomte*) *Danser, l. c.*: Loranthus collapsus.
coriaceus (*Van Tiegh.*) *Danser, l. c.*: Phyllodesmis coriacea.
courtallensis (*Gamble*) *Danser, l. c.*: Loranthus courtallensis.
daibuzanensis (*Yamamoto*) *Danser, l. c.*: Loranthus daibuzanensis.
Delavayi (*Van Tiegh.*) *Danser, l. c.*: Phyllodesmis Delavayi.
diplocrater (*Baker*) *Danser, l. c.* 124: Loranthus diplocrater.
glaucus (*Thunb.*) *Danser, l. c.*; *et in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1933, xxx. 473, in obs.: Loranthus glaucus.
gonocladus (*Baker*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 124 (1933): Loranthus gonocladus.
griseus (*S. Elliot*) *Danser, l. c.*: Loranthus griseus.
hoyifolius (*Baker*) *Danser, l. c.*: Loranthus hoyifolius.
Kaempferi (*DC.*) *Danser, l. c.*: Viscum Kaempferi.
kwangtungensis (*Merrill*) *Danser, l. c.*: Loranthus kwangtungensis.
lenticellatus (*Baker*) *Danser, l. c.*: Loranthus lenticellatus.
madagascaricus (*Hochr.*) *Danser, l. c.*: Loranthus madagascaricus.
Matsudai (*Hayata*) *Danser, l. c.*: Loranthus Matsudai.
microcuspis (*Baker*) *Danser, l. c.* 125: Loranthus microcuspis.
microlimbus (*Baker*) *Danser, l. c.*: Loranthus microlimbus.
monophlebius (*Baker*) *Danser, l. c.*: Loranthus monophlebius.
nigrans (*Hance*) *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 445 (1931): Loranthus nigrans.

TAXILLUS:—
niitakayamensis (*Yamamoto*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 125 (1933): Loranthus niitakayamensis.
notothixoides (*Hance*) *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 445 (1931): Loranthus notothixoides.
ovalis (*E. Mey.*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 125 (1933): Loranthus ovalis.
pachyphyllus (*Baker*) *Danser, l. c.*: Loranthus pachyphyllus.
parvibracteatus (*Lecomte*) *Danser, l. c.*: Loranthus parvibracteatus.
paucifolius (*Van Tiegh.*) *Danser, l. c.*: Phyllodesmis paucifolia.
peralatus (*Lecomte*) *Danser, l. c.*: Loranthus peralatus.
Poissonii (*Lecomte*) *Danser, l. c.*: Loranthus Poissonii.
pseudochinensis (*Yamamoto*) *Danser, l. c.*: Loranthus pseudochinensis.
Robinsonii (*Lecomte*) *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 445 (1931): Loranthus Robinsonii.
rubro-viridis (*Baker*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 125 (1933): Loranthus rubro-viridis.
sechellensis (*Baker*) *Danser, l. c.* 126: Loranthus sechellensis.
sordidus (*S. Elliot*) *Danser, l. c.*: Loranthus sordidus.
tandrokensis (*Lecomte*) *Danser, l. c.*: Loranthus tandrokensis.
thuducensis (*Lecomte*) *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 445 (1931): Loranthus thuducensis.
tricostatus (*Lecomte*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 126 (1933): Loranthus tricostatus.
tsaratanensis (*Lecomte*) *Danser, l. c.*: Loranthus tsaratanensis.
umbellifer (*Schultes*) *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 445 (1931): Loranthus umbellifer.
Viguieri (*Lecomte*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 126 (1933): Loranthus Viguieri.
Yadoriki (*Maxim.*) *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 445 (1931): Loranthus Yadoriki.

TAXUS L. (Taxac.; Conif., Gen. Pl.).
Chienii *Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., ix. 240 (1934).—China (Chekiang).
Davidiana *Hort. ex Dallimore in Rep. Conif. Conf. R. H. S. 1931* (*Conif. in Cult.*) 35 (1932), in syn.: T. baccata var. Davidiana *Hort.*

TECLEA Delile (Rutac.).
angustialata *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 315 (1931).—Tanganyika Terr.
crenulata (*Engl.*) *Engl. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C. 433 (1895): Toddalia crenulata.
diversifolia *Lanza in Lav. Ist. Bot. Palermo*, 1934, v. p. (7).—Erythraea.
evodioides *Chiov. Fl. Somala*, II. 47 (1932).—Somal. Ital.
ferruginea *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1933, Sér. II. v. 409.—Sudan. Gall.
Fischeri (*Engl.*) *Engl. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C. 433 (1895): Toddalia Fischeri.
natalensis (*Sond.*) *Engl. l. c.*, in obs.: Toddalia natalensis.
simplicifolia (*Engl.*) *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 757 (1915), in obs.: Toddalia simplicifolia.
sudanica *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1933, Sér. II. v. 408.—Sudan. Gall.
trichocarpa (*Engl.*) *Engl. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C. 433 (1895): Toddalia trichocarpa.

TECLEOPSIS Hoyle & Leakey in Kew Bull. 1932, 266. *RUTACEAE.*
glandulosa *Hoyle & Leakey, l. c.*—Kenya Col.

TECOMA Juss. (Bignoniac.).
Olgae *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 802 (1895), in syn.: Incarvillea Olgae.

TECOMA:—
Peroba *Record in Record & Mell, Timbers Trop. Amer.* 537 (1924).—Bras.
stans (*L.*) *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 144 (1819): Bignonia stans.

TECOMARIA Spach (Bignoniac.).
rupium *Bullock in Kew Bull.* 1931, 274.—Tanganyika Terr.

TEIJSMANNIODENDRON Koord. (Verbenac.).
Ahernianum (*Merrill*) *Bakh. in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 74: Vitex Aherniana.

TEINOSTACHYUM Munro (Gramin.).
Beddomei *C. E. C. Fischer in Gamble, Fl. Madras*, 1860 (1934); *et in Kew Bull.* 1935, 148, in obs.: T. Wightii *Bedd.*, non Bambusa Wightii *Munro.*

TELLIMA R. Br. (Saxifragac.).
Williamsii (*Eaton*) *Canby in Bot. Gaz.* xvi. 237 (1891), in obs., nomen alternativ.: Heuchera Williamsii.

TELOSMA Coville (Asclepiadac.).
cathayensis *Merrill in Sunyatsenia*, ii. 18 (1934).—China (Kwangtung).

TEMNADENIA Miers (Apocynac.).
ornata (*Hoehne*) *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1932, xix. 383: Echites ornata.
stenantha *R. E. Woodson, l. c.* 1934, xxi. 613.—Colomb.

TEPHROCACTUS Lem. (Cactac.).
atacamensis (*R. Phil.*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 108 (1935): Opuntia atacamensis.
atroviridis (*Werderm. & Backeb.*) *Backeb. l. c.* 105: Opuntia atroviridis.
campestris (*Britton & Rose*) *Backeb. l. c.* 111: Opuntia campestris.
Corotilla (*K. Schum.*) *Backeb. l. c.* 112, in obs.: Opuntia Corotilla.
corrugatus (*Hort. ex Salm-Dyck*) *Backeb. l. c.* 113: Opuntia corrugata.
Darwinii (*Hensl.*) [*Backeb. ex*] *Frič in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1934, xlix. 105, in obs., nomen; *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 113 (1935): Opuntia Darwinii.
flexuosus *Backeb. l. c.* 109, 410.—Boliv.
floccosus (*Salm-Dyck*) *Backeb. l. c.* 105: Opuntia floccosa.
geometricus (*Castellanos*) *Backeb. l. c.* 111: Opuntia geometrica.
halophilus (*Speg.*) *Backeb. l. c.*: Opuntia halophila.
hypogaeus (*Werderm.*) *Backeb. l. c.* 110: Opuntia hypogaea.
ignescens (*Vaupel*) *Backeb. l. c.* 108: Opuntia ignescens.
ignotus (*Britton & Rose*) *Backeb. l. c.* 111: Opuntia ignota.
Kuehnrichianus (*Werderm. & Backeb.*) *Backeb. l. c.* 110: Opuntia Kuehnrichiana.
lagopus (*K. Schum.*) *Backeb. l. c.* 106: Opuntia lagopus.
minusculus *Backeb. l. c.* 109, 410.—Boliv.
minutus *Backeb. l. c.* 110, 410.—Argent.
mistiensis *Backeb. l. c.*—Peruv.
nigrispinus (*K. Schum.*) *Backeb. l. c.* 109: Opuntia nigrispina.
ovatus (*Pfeiff.*) *Backeb. l. c.* 113: Opuntia ovata.
Pentlandii (*Salm-Dyck*) *Backeb. l. c.* 108: Opuntia Pentlandii.
pseudorauppianus *Backeb. l. c.* 112, 410.—Chile.
rarissimus *Backeb. l. c.* 108, 410.—Boliv.
Rauppianus (*K. Schum.*) *Backeb. l. c.* 109: Opuntia Rauppiana.
riojanus *Backeb. l. c.* 113.—Argent.
setiger *Backeb. l. c.* 106, 410.—Argent.
silvestris *Backeb. l. c.* 109, 410.—Boliv.
sphaericus (*C. F. Först.*) *Backeb. l. c.* 111: Opuntia sphaerica.
strobiliformis (*A. Berger*) *Backeb. l. c.* 106: Opuntia strobiliformis.
subinermis *Backeb. l. c.* 108, 410.—Boliv.
subsphaericus *Backeb. l. c.* 112, 410.—Argent.
subterraneus (*R. E. Fries*) *Backeb. l. c.* 110: Opuntia subterranea.
tarapacanus (*R. Phil.*) *Backeb. l. c.* 114: Opuntia tarapacana.

TEPHROCACTUS:—
Udonis (*Weing.*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC*, 106 (1935): Opuntia Udonis.
verticosus (*Weing.*) *Backeb. l. c.*: Opuntia verticosa.
Weberi (*Speg.*) *Backeb. l. c.*: Opuntia Weberi.
Wilkeanus *Backeb. l. c.* 108, 410.—Boliv.

TEPHROSIA Pers. (Legumin.).
aurantiaca *R. Young in Ann. Transvaal Mus.* xiv. 398 (1932).—Transvaal.
avasmontana *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 203 (1932).—Hereroland.
Burttii *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 341.—Tanganyika Terr.
cordata *Hutchinson & Burtt Davy in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxxi. 377 (1932).—Swaziland.
djalonica *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 384, in clavi, 385 (1928); *Hutchinson & Dalziel in Kew Bull.* 1928, 404, descr.—Guinea Gall.
Evansii *Hutchinson & Burtt Davy in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxxi. 378 (1932).—Transvaal.
fruticosa *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 43 (1933–5).—Mexico.
interrupta *Hochst. & Steud.*; *E. G. Baker, Legum. Trop. Afr.* 176, in clavi, 195 (1926), descr.—Abyss.
kasikiensis *E. G. Baker in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxi. 301 (1932).—Congo Belg.
Meisneri *Hutchinson & Burtt Davy in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxxi. 377 (1932).—Transvaal.
multijuga *R. Young in Ann. Transvaal Mus.* xiv. 402 (1932).—Transvaal.
otaviensis *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 204 (1932).—Hereroland.
retusa *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxxi. 378 (1932).—Transvaal.
similis *Chiov. Fl. Somala*, II. 161 (1932).—Somal. Ital.
Singapou (*Buchoz*) *A. Cheval. in Compt. Rend.* 1925, clxxx. 1522, in obs.: Galega Singapou.
spathacea *Hutchinson & Burtt Davy in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxxi. 377 (1932).—Transvaal.
subulata *Hutchinson & Burtt Davy, l. c.*—Transvaal.
ternatiflora *R. Young in Ann. Transvaal Mus.* xiv. 406 (1932).—Transvaal.
transjubensis *Chiov. Fl. Somala*, II. 161 (1932).—Somal. Ital.
transvaalensis *Hutchinson & Burtt Davy in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxxii. 378 (1932).—Transvaal.
Wittei *E. G. Baker in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxi. 302 (1932).—Congo Belg.
Woodii *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxxii. 378 (1932): T. capensis var. angustifolia *E. Mey.*
zoutpansbergensis *Bremek. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 242 (1933).—Transvaal.

TEREBRARIA Kuntze (Rubiac.).
densiflora (*Wright ex Griseb.*) *Sprague in Kew Bull.* 1932, 350: Stenostomum densiflorum.
resinosa (*Vahl*) *Sprague, l. c.*: Laugeria resinosa.

TERMINALIA L. (Combretac.).
amazonia (*J. F. Gmel.*) *Exell in Pulle, Fl. Surinam.* iii. (*Meded. K. Ver. Kol. Inst. Amst.* xxx.) 173 (1935): Chuncoa amazonia.
argyrophylla *Engl. & Diels in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* iv. 15 (1900).—Sierra Leone.
Balladelli *Chiov. Fl. Somala*, II. 207 (1932).—Somal. Ital.
Brassii *Exell in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 134.—Ins. Solomon.
carolinensis *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 672.—Ins. Carolin. (Kusai; Ponape).
chrysomalla *Gilg & Lederm. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 722 (1921), in obs.—Cameroons.
Creaghii *Ridley in Kew Bull.* 1933, 493.—Borneo.
Cunninghamii *C. A. Gardner in For. Dep. Bull., W. Austral.* No. 32, 73 (1923).—W. Austral.
Curtisii *Ridley in Kew Bull.* 1931, 449.—Siam.

TERMINALIA:—
Dielsii *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 720 (1921), in obs. —Tanganyika Terr.
Ferdinandiana *Exell in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 263: T. edulis *F. Muell.*
Fitzgeraldi *C. A. Gardner in For. Dep. Bull., W. Austral.* No. 32, 79 (1923).—W. Austral.
flava *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 722 (1921), in obs.— Cameroons.
foetens *Gilg ex Engl. l. c.* 724, in obs.—Tanganyika Terr.
hainanensis *Exell in Sunyatsenia*, ii. 1 (1934).— China (Hainan).
Kajewskii *Exell in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 133.— Ins. Solomon.
laeteviridis *Gilg & Lederm. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 720 (1921), in obs.—Nigeria.
macrocarpa *v. Slooten in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. iv. 282 (1922), nomen.—Hab.?
megalocarpa *Exell in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 132. —Ins. Solomon.
mollis *Teysm. & Binn. Cat. Hort. Bot. Bog.* 252 et 205 (1855); cf. *v. Slooten in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. vi. 30 (1924).—Ins. Sunda (Timor; Sumbawa).
morogorensis *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 721 (1921), in obs.—Tanganyika Terr.
mpapwensis *Engl. l. c.* 722, in obs.—Tanganyika Terr.
novo-caledonica *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1933, lxxviii. Beibl. 19, 289.—N. Caled.
roseo-grisea *Gilg & Lederm. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 720 (1921), in obs.—Nigeria; Cameroons.
solomonensis *Exell in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 132. —Ins. Solomon.
tristis *Gilg & Lederm. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 720 (1921), in obs.—Cameroons.

TERNSTROEMIA Mutis (Theac.; Ternstroemiac., Gen. Pl.).
buxifolia *Ekman & O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxix. 13 (1931).—Santo Domingo.
camelliifolia *Linden & Planch.*; *Sprague in Kew Bull.* 1926, 42: T. dentata var. nudiflora *Choisy*.
discoidea *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 398.—Venez.
duidae *Gleason, l. c.* 400.—Venez.
dura *Gleason, l. c.* 401.—Venez.
monosperma *Gleason, l. c.* 399.—Venez.
paucifolia *Gleason, l. c.* 401.—Venez.
polypetala *Melch. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1076, 1095 (1934).—Tanganyika Terr.
pungens *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 400.—Venez.
tristyla *Gleason, l. c.* 398.—Venez.

TERRELLA Nevski in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS, 1931, xxx. 639 (1932), in adnot.: **Terrellia** Lunell (Gramin.).
curvata (*Piper*) *Nevski, l. c.*, in adnot.: Elymus curvatus.
halophila (*Bicknell*) *Nevski, l. c.*, in adnot.: Elymus halophilus.
hirsutiglumis (*Scribn.*) *Nevski, l. c.*, in adnot.: Elymus hirsutiglumis.
jejuna (*Ramaley*) *Nevski, l. c.*, in adnot.: Elymus virginicus f. jejunus.
virginica (*L.*) *Nevski, l. c.*, in adnot.: Elymus virginicus.

TESSMANNIA Harms (Legumin.).
anomala (*Micheli*) *Harms in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 457 (1915), in obs.: Baikiaea anomala.
Lescrauwaetii (*De Wild.*) *Harms, l. c.*, in obs.: Baikiaea Lescrauwaetii.

TESSMANNIOPHOENIX Burret (Palmae).
dianeura *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 499 (1932).—Colomb.

TESTUDIPES Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xii. 547, 550 (1935). *APOCYNACEAE.*
recurva (*Roxb.*) *Markgraf, l. c.* 547: Tabernaemontana recurva.

TETRACERA L. (Dilleniac.).
calothyrsa *Gilg & Lederm. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 477 (1921), in obs.—Afr. trop.
djalonica *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 155, in clavi, 156 (1927).—Guinea Gall.
malangensis *Exell in Journ. Bot.* 1932, lxx. Suppl. 1, 205.—Angola.
parviflora (*Rusby*) *Sleum. in Fedde, Repert.* xxxix. 47 (1935): Davilla parviflora.
Williamsii *Macbride in Candollea*, vi. 14 (1934).— Peruv.

TETRACME Bunge (Crucif.).
bucharica (*Korsh.*) *O. E. Schulz in Engl. Jahrb.* lxvi. 98 (1933): Tetracmidion bucharicum.

TETRADENIA Nees (Laurac.).
acutivena (*Hayata*) *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 373 (1931): Litsea acutivena.
akoënsis (*Hayata*) *Makino & Nemoto, l. c.*: Litsea akoënsis.
boninensis (*Koidz.*) *Makino & Nemoto, l. c.*: Neolitsea boninensis.
brideliifolia (*Hayata*) *Makino & Nemoto, l. c.*: Litsea brideliifolia.
cuneifolia (*Koidz.*) *Makino & Nemoto, l. c.*: Neolitsea cuneifolia.
dolichocarpa (*Hayata*) *Makino & Nemoto, l. c.* 374: Litsea dolichocarpa.
gilva (*Koidz.*) *Makino & Nemoto, l. c.*: Neolitsea gilva.
Hayatae *Nemoto in Makino & Nemoto, l. c.* 375: Litsea kotoënsis.
hypophaea (*Hayata*) *Makino & Nemoto, l. c.*: Litsea hypophaea.
japonica (*Mirb.*) *Makino & Nemoto, l. c.*: Litsea japonica.
Kawakamii (*Hayata*) *Makino & Nemoto, l. c.*: Litsea Kawakamii.
Nakaii (*Hayata*) *Makino & Nemoto, l. c.*: Litsea Nakaii.
obovata (*Hayata*) *Makino & Nemoto, l. c.*: Litsea obovata.
Ohbana (*Koidz.*) *Makino & Nemoto, l. c.* 376: Neolitsea Ohbana.
stenophylla (*Koidz.*) *Makino & Nemoto, l. c.*: Neolitsea stenophylla.

TETRADYAS Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz. Sér. III. xi. 361 (1931). *LORANTHACEAE.*
perfoliata *Danser, l. c.* 362.—N. Guin.

TETRAGASTRIS Gaertn. (Burserac.).
phanerosepala *Sandwith in Kew Bull.* 1932, 209.— Guiana Brit.

TETRAGONIA L. (Ficoidac.).
chisimajensis *Chiov. Fl. Somala*, II. 226 (1932).— Somal. Ital.

TETRAGONOCALAMUS Nakai in Journ. Jap. Bot. ix. 86, 88 (1933). *GRAMINEAE.*
angulatus (*Munro*) *Nakai, l. c.* 86, 89: Bambusa angulata.
quadrangularis (*Fenzi*) *Nakai, l. c.* 90, in obs.: Bambusa quadrangularis.

TETRALIX Zinn, Cat. Pl. Gott. 202 (1757); Sprague in Kew Bull. 1934, 219: **Erica** L. (Ericac.), pro parte maxima.
septentrionalis *E. Mey. Preuss. Pflanzengatt.* 100 (1839): Erica Tetralix.

TETRAMOLOPIUM Nees (Compos.).
arbusculum (*A. Gray*) *Sherff in Bot. Gaz.* xcv. 502 (1934): Vittadinia Chamissonis var. arbuscula.
Bennettii *Sherff, l. c.* 498.—Ins. Sandvic.
ericoides *Mattf. in Nova Guinea*, xiv. 522 (1932). —N. Guin.
filiforme *Sherff in Bot. Gaz.* xcv. 498 (1934).—Ins. Sandvic.
Klossii (*S. Moore*) *Mattf. in Nova Guinea*, xiv. 521 (1932): Erigeron Klossii.
lepidotum (*Less.*) *Sherff in Bot. Gaz.* xcv. 500 (1934): Erigeron lepidotus.

TETRAMOLOPIUM:—
polyphyllum *Sherff in Bot. Gaz.* xcv. 499 (1934). —Ins. Sandvic.
prostratum *Mattf. in Nova Guinea*, xiv. 523 (1932). —N. Guin.
Rockii *Sherff in Bot. Gaz.* xcv. 500 (1934).—Ins. Sandvic.
virgatum *Mattf. in Nova Guinea*, xiv. 524 (1932). —N. Guin.

TETRANTHERA Jacq. (Laurac.).
Cubeba (*Lour.*) *Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl.* ii. 479 (1831): Laurus Cubeba.
elaeocarpa *A. Gray ex Gillespie in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 83, 7 (1931), in syn.: Endiandra elaeocarpa.

TETRAPLASIA Rehder (Rubiac.).
angustifolia (*Hayata*) *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 225: Damnacanthus angustifolius.
lutchuensis *Koidz. l. c.* 1934, iii. 161.—Ins. Liukiu.
stenophylla *Koidz. l. c.* 160.—Formosa.

TETRARDISIA Mez (Myrsinac.).
bifaria (*C. T. White & Francis*) *C. T. White in Kew Bull.* 1933, 45: Ardisia bifaria.

TETRARIA Beauv. (Cyperac.).
Bachmannii *Kükenth. in Fedde, Repert.* xxix. 191 (1931).—Pondoland.
capillaris (*F. Muell.*) *J. M. Black in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1934, lviii. 169: Chaetospora capillaris.
capitata *Kükenth. in Fedde, Repert.* xxix. 192 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
monocarpa (*J. M. Black*) *J. M. Black in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1934, lviii. 168: Schoenus monocarpus.
octandra (*Nees*) *Kükenth. in Fedde, Repert.* xxix. 193 (1931), in obs.: Elynanthus octandrus.
scariosa *Kükenth. l. c.* 190.—Afr. austr. (Cape Prov.).

TETRASTIGMA Planch. (Vitac.).
caudatum *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 275 (1935).—China (Hainan).
cauliflorum *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xi. 48 (1932).—China (Hainan).
enervium *Ridley in Kew Bull.* 1931, 498.—Borneo.
Havilandii *Ridley, l. c.* 497.—Borneo.
Lawsoni *ex Burkill, Dict. Econ. Prod. Mal. Penins.* ii. 2245 (1935), in syn.: Vitis Lawsoni.
pubinerve *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 275 (1935).—China (Hainan).

TETRASTYLIDIUM Engl. (Olacac.).
grandifolium (*Baill.*) *Sleum. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xvi b. 19 (1935): Schoepfia grandifolia.

TETRATELEIA Sond. (Capparidac.).
tenuifolia (*Klotzsch*) *Arwidsson in Bot. Notiser*, 1935, 357: Chilocalyx tenuifolius.

TETRAZYGIA Rich. (Melastomatac.).
Tuerckheimii (*Cogn.*) *Ekman ex Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 16 (1931): Pachyanthus Tuerckheimii.

TETRORCHIDIUM Poepp. & Endl. (Euphorbiac.).
didymostemon (*Baill.*) *Pax & K. Hoffm. in Engl. Pflanzenreich, Euphorb.-Addit.* VI. 53 (1919): Hasskarlia didymostemon.
minus (*Prain*) *Pax & K. Hoffm. l. c.*: Hasskarlia minor.
oppositifolium *Pax, l. c.*—Liberia; S. Nigeria.
tenuifolium *Pax & K. Hoffm. l. c.*—Cameroons.

TEUCRIUM L. (Labiat.).
afrum (*Emberger & Maire*) *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 510 [1928]: T. salviastrum subsp. afrum.
Alphonsi *Sennen in Mem. Acad. Cienc. Barcelona*, Ser. III. xx. No. 14, 8 (1928), in obs.—Hispan.
Balthazaris *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 102, in obs.—Hispan.
bombycinum *Sennen in Mem. Acad. Cienc. Barcelona*, Ser. III. xx. No. 14, 8 (1928), in obs.— Hispan.
Chardonianum *Maire & Wilczek in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1935, xxvi. 130.—Marocc.

TEUCRIUM:—
chlorostachyum *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1929, No. 370 [1930].—Marocc.
cincinnatum *Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc,* iii. 617 (1934); *et in Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc,* 1933, xiii. 272 (1934); *Maire, Contrib. Étude Fl. Afr. Nord,* Fasc. 21, reimpr. p. 2 (1933), sub nomine tananico.—Marocc.
demnatense *Coss. ex Battand. Contrib. Fl. Atlant.* 74 (1919).—Marocc.
× djebalicum *Font Quer in Cavanillesia,* vii. 76 (1935). —Marocc.
× Doumerguei *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 95 [1933].—Marocc.
dunense *Sennen in Mem. Acad. Cienc. Barcelona,* Ser. III. xx. No. 14, 8 (1928), in obs.—Hispan.
× Embergeri *Sennen in Bull. Soc. Bot. France,* 1931, lxxviii. 188, in obs.—Marocc.
Fontqueri *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 102.—Hispan.
× Garciae *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 147 [1933].—Marocc.
Gattefossei *Emberger ex Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc,* iii. 617 (1934), nomen; *Emberger in Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc,* 1933, xiii. 299 (1934), descr.—Marocc.
Grosii *Pau in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 515 [1928].—Marocc.
× Joannis *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 94 [1933].—Marocc.
Junii-Victoris *Sennen & Mauricio, l. c.* 147, nomen. —Marocc.
Liouvillei *Sennen in Sennen & Mauricio, l. c.* 94, nomen.—Marocc.
Mairei *Sennen in Bull. Soc. Bot. France,* 1931, lxxviii. 192, in obs., nomen.—Marocc.
Malenconianum *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord,* 1934, xxv. 316.—Marocc.
maroccanum *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 94 [1933].—Marocc.
melillense *Sennen in Bull. Soc. Bot. France,* 1931, lxxviii. 188, in obs., nomen; *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord,* 1932, xxiii. 209, descr.—Marocc.
Philotei *Sennen in Bull. Soc. Bot. France,* 1931, lxxviii. 193, in obs., nomen.—Marocc.
rifanum *Maire & Sennen in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord,* 1932, xxiii. 260, in obs.—Marocc.
rifeum *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 94 [1933], in syn.: T. oxylepis var. rifeum *Font Quer & Pau.*
× rubrovirens *Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 516 [1928], in syn.: T. Haenseleri var. rubrovirens *Pau.*
× Salgadoi *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 102, in obs.—Hispan.
tananicum *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord,* 1932, xxiii. 210.—Marocc.
tananicum *Maire, Contrib. Étude Fl. Afr. Nord,* Fasc. 21, reimpr. p. 2 (1933), sphalm., non praec.: T. cincinnatum.
ussuriense *Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS,* 1931, xxx. 208 (1932).—Sibir. (Marit. Prov.).
Villarianum *Font Quer in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona,* v. Ser. Bot. No. 3, 222 (1920), in obs. —Hispan.
zaianum *Emberger & Maire; Emberger & Maire in Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc,* Nos. xxi–xxii. 47 (1930).—Marocc.

TEXTORIA Miq. (Araliac.).
pellucidopunctata (*Hayata*) *Kanehira & Sasaki in Sasaki, List Pl. Formos.* 315 (1928); *Masamune & Suzuki in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard.* 1933, iii. 63: Gilibertia pellucidopunctata.

THALICTRUM L. (Ranunculac.).
aspleniifolium *Hort. ex Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. Fasc. suppl. 1, p. 11 (1931), nomen.—Hab.?
Borderi *Gandoger ex Flous & Gaussen in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse,* 1933, lxv. 67, pro syn.: T. aquilegiifolium.
chionophyllum *Nakai ex Maekawa in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 695, 696.—Japon.
hypoglaucum *Rydb. in Brittonia,* i. 88 (1931).—U.S.A. (Texas; Kansas).

THALICTRUM:—
myriophyllum *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 156.—Formosa.
nudum *Léveillé & Vaniot ex Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 311 (1931), in syn.: T. Esquirolii.
obovatum *Blatter in Journ. & Proc. As. Soc. Beng.* 1930, n. s. xxvi. 339 (1931).—Ind. or. (Bombay).
Oshimae *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan,* 1934, vi. 569.—Formosa.
qulebicum *Post ex Dinsm. in Post, Fl. Syria, Palest. & Sinai,* ed. 2, i. (*Publ. Am. Univ. Beirut,* Nat. Sc. Ser. No. 1) 4 (1932), in syn.: T. isopyroides.
rhodopaeum *K. H. Rechinger in Magyar Bot. Lap.* 1933, xxxii. 6.—Bulgar.
rubescens *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 156.—Formosa.
supradecompositum *Nakai in Bot. Mag., Tokyo,* 1932, xlvi. 54.—China (Chihli).

THAMNOJUSTICIA Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xi. 825 (1933). *ACANTHACEAE.*
amabilis *Mildbr. l. c.* 826.—Tanganyika Terr.
grandiflora *Mildbr. l. c.* xii. 100 (1934).—Tanganyika Terr.

THAMNOSERIS Phil. f. (Compos.).
lobata *I. M. Johnston in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 445.—Chile (Ins. San Felix).

THAUMASIANTHES Danser in Rec. Trav. Bot. Néerl. 1933, xxx. 464. *LORANTHACEAE.*
amplifolia (*Merrill*) *Danser, l. c.* 465: Loranthus amplifolius.
ovatibractea (*Merrill*) *Danser, l. c.* 466: Loranthus ovatibracteus.

THEA L. (Theac.; Ternstroemiac., Gen. Pl.).
buisanensis (*Sasaki*) *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* xii. 180 (1933), in obs.: Camellia buisanensis.
Cavaleriana *Léveillé, Cat. Pl. Yun-Nan,* 271 (1917), in adnot.—China (Yunnan).
cordifolia *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* xi. 17 (1932).—China (Kwangtung).
Costei (*Léveillé*) *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1934, xv. 98: Camellia Costei.
fluviatilis (*Hand.-Mazz.*) *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* vii. 316 (1931): Camellia fluviatilis.
macrophylla (*Sieb.*) *Makino in Journ. Jap. Bot.* i. 39 (1918): T. chinensis var. macrophylla.
Melliana (*Hand.-Mazz.*) *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* vii. 315 (1931): Camellia Melliana.
nokoënsis (*Hayata*) *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 745 (1931): Camellia nokoënsis.
olearia *Lour. ex Gomes in Mem. Acad. Sc. Lisb. Cl. Sc. Pol. Mor. Bel.-Let.* n. s. iv. (1), 29 (1868); *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. ii. 17, 266 (1935), in syn.: T. oleosa.
paucipunctata *Merrill & Chun in Sunyatsenia,* ii. 285 (1935).—China (Hainan).
polygama *Hu in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 171 (1935).—China (Yunnan).
Rosthorniana (*Hand.-Mazz.*) *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 394 (1931): Camellia Rosthorniana.
transnokoënsis (*Hayata*) *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 745 (1931): Camellia transnokoënsis.

THECACORIS A. Juss. (Euphorbiac.).
reticulata *Pax in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. ii. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 14 (1921), in obs.—Cameroons.

THECOPHYLLUM E. André (Bromeliac.).
capituligerum (*Griseb.*) *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcviii. 14 (1932): Tillandsia capituligera.
Cornuaultii (*E. André*) *Mez in Engl. Pflanzenreich, Bromeliac.* 423 (1935): Tillandsia Cornuaultii.
fastuosum (*E. André*) *Mez, l. c.*: Tillandsia fastuosa.
Pennellii (*L. B. Smith*) *Mez, l. c.* 422: Guzmannia Pennellii.

THECOSTELE Reichb. f. (Orchidac.).
Poilanei *Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1931, Sér. II. iii. 685.—Indo-China (Tonkin; Anam).

THELASIS Blume (Orchidac.).
clausa *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo,* 1935, xlix. 440.—Formosa.
succosa *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements,* vii. 35 (1932).—Penins. Mal.

THELESPERMA Less. (Compos.).
hybridum *Voss in Vilmorin's Blumeng.,* ed. 3, *Sieb. & Voss,* i. 484 (1894): Cosmidium Burridgeanum.
scabridulum *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 317.—Mexico.

THELIGONUM L. (Cynocrambac.; Urticac., Gen. Pl.).
formosanum *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 157, in syn.: Cynocrambe formosana.

THELOCACTUS Britton & Rose (Cactac.).
conothelos (*Regel & Klein*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 358 (1935): Echinocactus conothelos.
Ehrenbergii (*Pfeiff.*) *F. M. Knuth, l. c.* 359: Echinocactus Ehrenbergii.
hastifer (*Werderm. & Bödeker*) *F. M. Knuth, l. c.* 360: Echinocactus hastifer.
lophophoroides *Werderm. in Kakteenk.* 1934, 176. —Mexico.
porrectus (*Lem.*) *F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 361 (1935): Echinocactus porrectus.
Saussieri (*Weber*) *A. Berger, Kakteen,* 346 (1929): Echinocactus Saussieri.
subterraneus *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1934, Pt. 4, [p. 3], in obs.—Mexico.
Ysabelae *Schlange apud Croizat in Cact. & Succ. Journ. Amer.* v. 551 (1934).—Mexico.

THELYMITRA J. R. & G. Forst. (Orchidac.).
Holmesii *Nicholls in Vict. Nat.* xlix. 263 (1932).—Austral. (Victoria).
megacalyptra *Fitzg. Austr. Orch.* i. v. t. 2 (1879).—Austral. (N. S. Wales; Victoria).
Murdochae *Nicholls in Vict. Nat.* l. 219 (1934).—Austral. (Victoria).
papuana *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxvi. 162 (1934). —N. Guin.

THELYPODIOPSIS Rydb. (Crucif.).
brachycarpa (*Torr.*) *O. E. Schulz in Engl. Jahrb.* lxvi. 98 (1933): Thelypodium brachycarpum.
brachypoda *O. E. Schulz, l. c.*—U.S.A. (Calif.).
crispa (*Greene*) *O. E. Schulz, l. c.*: Thelypodium crispum.
Howellii (*S. Wats.*) *O. E. Schulz, l. c.*: Thelypodium Howellii.
leptostachya (*Greene*) *O. E. Schulz, l. c.*: Thelypodium leptostachyum.
Nuttallii (*S. Wats.*) *O. E. Schulz, l. c.* 99: Thelypodium Nuttallii.
paniculata (*A. Nels.*) *O. E. Schulz, l. c.*: Thelypodium paniculatum.
sagittata (*Nutt.*) *O. E. Schulz, l. c.*: Pachypodium sagittatum.
stenopetala (*S. Wats.*) *O. E. Schulz, l. c.*: Thelypodium stenopetalum.
torulosa (*A. A. Heller*) *O. E. Schulz, l. c.*: Thelypodium torulosum.

THELYPODIUM Endl. (Crucif.).
Endlicherianum *Muschler ex O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 390 (1932), in syn.: Arabis Endlichii.
tularense *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 21 (1933–5).—U.S.A. (Calif.).

THEMEDA Forsk. (Gramin.).
glauca (*Desf.*) *Battand. & Trab. Fl. Algér.,* Monocot. 128 (1895): Anthistiria glauca.

THEMISTOCLESIA Klotzsch (Ericac.; Vacciniac., Gen. Pl.).
caudata *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xii. 134 (1934).—Peruv.
compacta *A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 444 (1932).—Colomb.
dependens (*Benth.*) *A. C. Smith, l. c.* 442: Thibaudia dependens.
Dryanderae *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xii. 134 (1934).—Colomb.
hirsuta *A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 443 (1932).—Colomb.
peruviana *A. C. Smith, l. c.* 442.—Peruv.
recurva *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 114.—Colomb.
rostrata *A. C. Smith, l. c.* 115.—Colomb.
vegasana *A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 440 (1932).—Colomb.

THENARDIA H. B. & K. (Apocynac.).
tubulifera *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1932, xix. 381.—Mexico.

THEOBROMA L. (Sterculiac.).
Tessmannii *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 139 (1931).—Peruv.

THERIOPHONUM Blume (Arac.).
uniseriatum *Blatter & McCann in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxv. 25 (1931).—Ind. or. (Bombay).

THESIUM L. (Santalac.).
albomontanum *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 281 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Archeri *Compton, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).
Breyeri *N. E. Brown in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal,* Pt. II. p. xxxii. 461 (1932). —Transvaal.
celatum *N. E. Brown, l. c.*—Transvaal.
cilicicum *Hausskn. ex Bornm. in Fedde, Repert.* xxix. 301 (1931).—As. Min. (Cappadocia).
congestum *R. A. Dyer in Kew Bull.* 1933, 461.—Afr. austr. (Cape Prov.).
deceptum *N. E. Brown in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal,* Pt. II. p. xxxii. 460 (1932). —Transvaal.
densum *N. E. Brown, l. c.* p. xxxii. 461.—Transvaal.
disparile *N. E. Brown, l. c.* p. xxxii. 462.—Transvaal.
dumale *N. E. Brown, l. c.* p. xxxiii. 461.—Transvaal.
exile *N. E. Brown, l. c.* p. xxxiii. 462.—Transvaal.
gracilentum *N. E. Brown, l. c.* p. xxxiii. 460.—Swaziland.
Hillianum *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 282 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
inversum *N. E. Brown in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal,* Pt. II. p. xxxiii. 460 (1932). —Transvaal.
Johnstonii *Engl. ex Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. 141 (1932), in syn.: T. Schweinfurthii.
karooicum *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 282 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Lesliei *N. E. Brown in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal,* Pt. II. p. xxxiii. 460 (1932).— Transvaal.
lycaonicum *Bornm. & Andrasov. in Fedde, Repert.* xxix. 301 (1931).—As. Min. (Lycaonia).
Mossii *N. E. Brown in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal,* Pt. II. p. xxxiii. 460 (1932). —Transvaal.
Pottiae *N. E. Brown, l. c.* p. xxxiii. 459.—Transvaal.
procerum *N. E. Brown, l. c.* p. xxxiii. 462.—Transvaal.
prostratum *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. Anhang, 12 (1932).—Tanganyika Terr.
rasum (*A. W. Hill*) *N. E. Brown in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal,* Pt. II. p. xxxiii. 460 (1932): T. impeditum var. rasum.
resinifolium *N. E. Brown, l. c.* p. xxxiv. 461.—Transvaal.
Schliebenii *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 397 (1932).—Tanganyika Terr.
scoparium *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. Anhang, 12 (1932).—Tanganyika Terr.
semotum *N. E. Brown in Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal,* Pt. II. p. xxxiv. 462 (1932). —Transvaal.
subsimile *N. E. Brown, l. c.* p. xxxiv. 460.—Transvaal.
whitehillense *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 282 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Wittei *De Wild. & Staner, Contrib. Fl. Katanga,* Suppl. IV. 74 (1932).—Congo Belg.

THEVETIA Adans. (Apocynac.).
Steerei *R. E. Woodson in Am. Journ. Bot.* 1935, xxii. 685.—Mexico.

THIBAUDIA Ruiz & Pav. (Ericac.; Vacciniac., Gen. Pl.).
amplectens *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xii. 58 (1934).—Ecuador.
Andrei *A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 418 (1932).—Colomb.
anomala *A. C. Smith, l. c.* 429.—Colomb. vel Ecuador.

THIBAUDIA:—
Archeri *A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 426 (1932).—Colomb.
axillaris *Rusby in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 417 (1932).—Boliv.
cardiophylla *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xii. 135 (1934).—Peruv.
densiflora (*Herzog*) *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 114: Hornemannia densiflora.
glandulifera *A. C. Smith, l. c.* 1931, lviii. 439.—Venez.
Herrerae *A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 435 (1932).—Peruv.
involucrata *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 440.—Venez.
laxa *A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 424 (1932).—Peruv.
leucostoma (*Lindl.*) *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xii. 291 (1935): Vaccinium leucostomum.
neo-Herrerae *Sleum. l. c.* xii. 136 (1934).—Peruv.
obovata *A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 431 (1932).—Peruv.
ovalifolia *A. C. Smith, l. c.* 434.—Peruv.
pachyantha *A. C. Smith, l. c.* 415.—Colomb.
paniculata *A. C. Smith, l. c.* 426.—Colomb.
Pennellii *A. C. Smith, l. c.* 427.—Colomb.
regularis *A. C. Smith, l. c.* 436.—Peruv.
rigidiflora *A. C. Smith, l. c.* 418.—Colomb.
sanmartensis *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xii. 137 (1934).—Colomb.
spathulata *A. C. Smith in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxviii. 434 (1932).—Peruv.
truncata *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 440.—Venez.

THLADIANTHA Bunge (Cucurbitac.).
dimorphantha *Hand.-Mazz. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1934, lxxxiii. 235.—China (Shansi).

THLASPEOCARPA C. A. Smith in Kew Bull. 1931, 155: **Palmstruckia** Sond. (Crucif.).
capensis (*Sond.*) *C. A. Smith, l. c.* 156: Palmstruckia capensis.

THLASPI L. (Crucif.).
ciliatum *Hort. ex Bull. Jard. Bot. Brux.* ix. Fasc. suppl. I, p. 12 (1931), nomen.—Hab. ?
durmitoreum *Rohlena in Mém. Soc. Sc. Bohème,* 1933, No. 8, 17 (1934), in syn.: T. cuneifolium var. durmitoreum *Rohlena.*
Freynii *Busch ex Grossheim, Fl. Kavkaza,* ii. 157 (1930).—Caucas.
longistylum (*Sosn.*) *O. E. Schulz in Engl. Jahrb.* lxvi. 99 (1933): Carpoceras longistylum.
nivale *Poepp. ex O. E. Schulz in Fedde, Repert.* xxxiii. 191 (1933), pro syn.: T. magellanicum.
somkheticum (*Bordz.*) *Bordz. in Fedde, Repert.* xxx. 369 (1932): T. macranthum var. somkheticum.
Tatianae *Bordz. in Bull. Jard. Bot. Kieff,* xii–xiii. 114 (1931).—Armen.

THODAYA Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr. xix. 323 (1931). *COMPOSITAE.*
elongata *Compton, l. c.* 324.—Afr. austr. (Cape Prov.).
microphylla *Compton, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).

THORACOSTACHYUM Kurz (Cyperac.).
Heyneanum (*Backer*) *Uitt. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1935, xxxii. 200, in obs.: Mapania Heyneana.
montanum (*Lauterb. & K. Schum.*) *Suringar in Nova Guinea,* viii. 710 (1912): Mapania montana.

THOREA Briq. in Arch. Sc. Phys. & Nat., Genève, iv. Pér. IV. xiii. 613 (1902), in obs.; et in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, xvii. 274 (1914), in syn.: **Thorella** Briq. (Umbellif.).

THOTTEA Rottb. (Aristolochiac.).
robusta *v. Steenis in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 172, in obs., 205 (1932).—Ind. or. Bat. (Ins. Natuna).

THRINAX L. f. (Palmae).
robusta *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.,* ed. 3, *Sieb. & Voss,* i. 1149 (1895), in syn.: Copernicia robusta.

THRINCIA Roth (Compos.).
Beltrani *Sennen in Bull. Soc. Bot. France,* 1931, lxxviii. 188, in obs., nomen.—Marocc.

THRINCIA:—
mesorrhyncha (*Maire*) *Pau in Font Quer, Iter Marocc.* 1930, No. 726 [1932]: Leontodon nudicaulis subsp. mesorrhynchuus.
Paulini *Sennen in Bull. Soc. Bot. France,* 1931, lxxviii. 188, in obs., nomen.—Marocc.
pilosiuscula *Lag. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 554 (1834).—Hab. ?

THRIXSPERMUM Lour. (Orchidac.).
brunnescens (*Ridley*) *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxxii. 352 (1933): Dendrocolla brunnescens.
cerinum (*Ridley*) *J. J. Smith, l. c.* 353: Dendrocolla cerina.
Kjellbergii *J. J. Smith in Engl. Jahrb.* lxv. 502 (1933).—Celebes.
pulchrum *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements,* vii. 48 (1932).—Penins. Mal.
punctatum (*Ridley*) *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxxii. 355 (1933): Dendrocolla punctata.
Sasaoi *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa,* 1934, xxiv. 280.—Formosa.
Segawai *Masamune, l. c.* 212, in syn.: Sarcochilus Segawai.
tenuicalcar *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements,* vii. 46 (1932).—Penins. Mal.

THRYPTOMENE Endl. (Myrtac.).
micrantha (*DC.*) *C. A. Gardner, Enum. Pl. Austral. Occ.* 97 (1931): Baeckea micrantha.

THUJA L. (Pinac.; Conif., Gen. Pl.).
beverleyensis *Hort. ex L. H. Bailey, Cult. Conif. N. Amer.* 174 (1933), in syn.: T. orientalis var. beverleyensis *Rehder.*
macrocarpa *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.,* ed. 3, *Sieb. & Voss,* i. 1226 (1895), in syn.: Biota orientalis var. normalis *Voss.*
Zuccariniana *Hort. ex Vilmorin, l. c.,* in syn.: Biota orientalis f. compacta *Beissn.*

THUNBERGIA Retz. (Acanthac.).
aureosetosa *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 408 (1932).—Tanganyika Terr.
combretoides *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 250 (1931), in clavi.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
deflexiflora *Baker in Journ. Linn. Soc., Bot.* xxv. 338 (1890).—Madag.
spinulosa *Chiov. Fl. Somala,* II. 346 (1932).—Somal. Ital.

THYELLA Rafin. (Convolvulac.).
hirtiflora (*Mart. & Gal.*) *House in Bull. N. Y. State Mus.* 1920, Nos. 233–4, 63 (1921): Ipomoea hirtiflora.

THYLACHIUM Lour. (Capparidac.).
papillososcabrum *Chiov. Fl. Somala,* II. 10 (1932). —Somal. Ital.

THYLACIS Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 1932, Sér. II. iv. 599. *ORCHIDACEAE.*
Fleuryi *Gagnep. l. c.* 600.—Indo-China (Tonkin).
Poilanei *Gagnep. l. c.*—Indo-China (Anam).

THYLOCODRABA O. E. Schulz in Engl. Jahrb. lxvi. 94 (1933): **Drabella** Nábělek (Crucif.).
thylacocarpa (*Nábělek*) *O. E. Schulz, l. c.,* in obs.: Drabella thylacocarpa.

THYMELAEA [Tourn.] All. Stirp. Nic. 25 (1757). *THYMELAEACEAE.*
antiatlantica *Maire, Contrib. Étude Fl. Afr. Nord,* Fasc. 21, reimpr. p. 2 (1933); *Maire in Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc,* 1933, xiii. 273 (1934).—Marocc.
argentata (*Lam.*) *Pau in Cavanillesia,* v. 44 (1932): Daphne argentata.
dendrobryum *Rothmaler in Cavanillesia,* vii. 116 (1935).—Hispan.
putorioides *Emberger & Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord,* 1932, xxiii. 214.—Marocc.

THYMUS L. (Labiat.).
afer *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 554 [1928]; *Hug.-del-Vill. in Cavanillesia,* vi. 120 (1934).—Hispan.
amoenus *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1934, xxxiii. 26 (1935), descr.—Hispan.
×Applii *Domin in Preslia,* xiii–xv. 195 (1935), in adnot.—Czechoslovak.
atlanticus (*Ball*) *Pau in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 552 [1928]: T. Serpyllum var. atlanticus.

THYMUS:—
bashkiriensis *Klokov & Desiat.-Shost. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 532, 533 (1932), nomen provis.—Mont. Ural.
bellus *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1934, xxxiii. 27 (1935), descr.—Hispan.
Bonati *Sennen*; *Sennen, l. c.* 1933, xxxii. 88 (1934), descr.—Hispan.
Briqueti *Sennen*; *Sennen, l. c.* 84, descr.—Hispan.
Burnati *Sennen*; *Sennen, l. c.* 1934, xxxiii. 29 (1935), descr.—Hispan.
callitrichifolius *Sennen*; *Sennen, l. c.* 19, descr.—Hispan.
carpetanus *Sennen, l. c.* 1933, xxxii. 77 (1934), hybr. ?—Hispan.
ceretanus *Sennen*; *Sennen, l. c.* 1934, xxxiii. 22 (1935), descr.—Hispan.
cinerascens *Sennen*; *Sennen, l. c.* 1933, xxxii. 86 (1934), descr.—Hispan.
coriifolius *Ronniger in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 341 (1932); *et in Fedde, Repert.* xxxi. 147 (1932).—Caucas.
Costei *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1933, xxxii. 90 (1934), descr.—Hispan.
×cyricus *Ronniger in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 346 (1932), in obs.; *et in Fedde, Repert.* xxxi. 156 (1932).—Caucas.
delicatulus *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1934, xxxiii. 28 (1935), descr.—Hispan.
Desjatovae *Ronniger in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 335 (1932); *et in Fedde, Repert.* xxxi. 150 (1932).—Caucas.
Dubjanskyi *Klokov & Desiat.-Shost. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 544, 545 (1932).—Rossia.
×Eliasii *Sennen & Pau in Cavanillesia*, iv. 55 (1931), in obs.; *et in Bol. Soc. Ibér.* 1933, xxxii. 79 (1934).—Hispan.
eltonicus *Klokov & Desiat.-Shost. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 542, 543 (1932).—Rossia austr.-or.
eriophorus *Ronniger in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 336 (1932); *et in Fedde, Repert.* xxxi. 139 (1932).—Armen.
euxinus *Ronniger in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 341 (1932).—Caucas.
eynensis *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1934, xxxiii. 24 (1935), descr.—Hispan.
×Faurei *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1934, xxv. 315.—Alger.
Fedtschenkoi *Ronniger in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 337 (1932); *et in Fedde, Repert.* xxxi. 139 (1932).—Transcaucas.
flexicaulis *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1934, xxxiii. 28 (1935), descr.—Hispan.
floribundus *Sennen, l. c.* 25.—Hispan.
Freixei *Sennen*; *Sennen, l. c.* 17, descr.—Hispan.
Gabrielae *Ronniger in Fedde, Repert.* xxix. 148 (1931).—Bulgar.
Gabrielis *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1933, xxxii. 87 (1934), descr.—Hispan.
gadorensis (*Pau*) *Hug.-del-Vill. in Cavanillesia*, vi. 121 (1934): T. Zygis var. gadorensis.
×georgicus *Ronniger in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 345 (1932), in obs.; *et in Fedde, Repert.* xxxi. 157 (1932).—Caucas.
glandulosus *Lag.*; *Hug.-del-Vill. in Cavanillesia*, vi. 105, 107 (1934), descr.—Hispan.
×Gouraudi *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1933, xxxii. 89 (1934), descr.—Hispan.
Grossheimii *Ronniger in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 335 (1932); *et in Fedde, Repert.* xxxi. 149 (1932).—Caucas.
incanus (*Trautv.*) *Grossheim in Bull. Polytechn. Inst. Tiflis*, ii. 213 (1926): T. Serpyllum var. incanus.
×intercalatus *Ronniger in Fedde, Repert.* xxix. 148 (1931).—Bulgar.
Isidori *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1933, xxxii. 83 (1934).—Hispan.
×Jacksonii *Ronniger in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1930, ix. 278 (1931).—Anglia.
Jaubertianus *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1934, xxxiii. 20 (1935), descr.—Hispan.
kasakstanicus *Klokov & Desiat.-Shost. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 537, 539 (1932).—Ross. asiat. (Kasakstan).

THYMUS:—
Kotschyanus *Boiss. & Hohen.*; *Ronniger in Fedde, Repert.* xxxi. 138 (1932), descr. emend.—Persia; Armen.; Kurdistan.
laxifoliatus *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1934, xxxiii. 18 (1935), descr.—Hispan.
laxispicatus *Sennen*; *Sennen, l. c.* 1933, xxxii. 89 (1934), descr.—Hispan.
lemnifolius *Sennen*; *Sennen, l. c.* 1934, xxxiii. 23 (1935), descr.—Hispan.
lignosus *Sennen*; *Sennen, l. c.*, descr.—Hispan.
macrocalyx *Borb. ex Fiori, Nuov. Fl. Anal. Ital.* ii. 454 (1926).—Ital.
mandschuricus *Ronniger in Fedde, Repert.* xxix. 96 (1931).—Manchur.
Martinezii *Pau in Mem. Soc. Esp. Hist. Nat.* xiv. 467 (1934).—Hispan.
mentagensis *Battand. Contrib. Fl. Atlant.* 71 (1919).—Marocc.
mongolicus (*Ronniger*) *Ronniger in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 99: T. Serpyllum var. mongolicus.
Moroderi *Pau ex Martinez in Mem. Soc. Esp. Hist. Nat.* xiv. 465 (1934).—Hispan.
mugodzharicus *Klokov & Desiat.-Shost. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 534, 537 (1932).—Mont. Ural; Ross. asiat. (Kasakstan).
orespedanus *Hug.-del-Vill. in Cavanillesia*, vi. 118 (1934).—Hispan.
oxyodontus *Sennen & Pau in Bol. Soc. Ibér.* 1933, xxxii. 81 (1934).—Hispan.
pseudo-pallidus *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 135 (1932).—Marocc.
pycnotrichus (*Uechtr.*) *Ronniger in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1923, vii. 232 (1924): T. Serpyllum var. pycnotrichus.
pyrenaicus *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1933, xxxii. 85 (1934).—Hispan.
ricinus *Sennen, l. c.* 1934, xxxiii. 25 (1935).—Hispan.
Ronnigeri *Sennen, l. c.* 1933, xxxii. 78 (1934).—Hispan.
×Rubioi *Font Quer in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, v. Ser. Bot. No. 3, 215 (1920).—Hispan.
Schimperi *Ronniger in Fedde, Repert.* xxxi. 98 (1932).—Abyss.
Semilei *Sennen*; *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1934, xxxiii. 17 (1935), descr.—Hispan.
superbus *Ronniger in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 339 (1932); *et in Fedde, Repert.* xxxi. 141 (1932).—Caucas.
transcaucasicus *Ronniger, l. c.* 338; *et l. c.* 140.—Caucas.
verticillatus *Sennen in Bol. Soc. Ibér.* 1933, xxxii. 83 (1934).—Hispan.
Weigandi *Sennen*; *Sennen, l. c.* 1934, xxxiii. 21 (1935), descr.—Hispan.
×Zedelmejeri *Ronniger in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 346 (1932), in obs.; *et in Fedde, Repert.* xxxi. 157 (1932).—Caucas.
zheguliensis *Klokov & Desiat.-Shost. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 545, 547 (1932).—Rossia.
zygiformis *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1935, xxvi. 221.—Marocc.

THYRSIA Stapf (Gramin.).
Schliebenii *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 649 (1932).—Tanganyika Terr.

THYRSODIUM Salzm. ex Benth. (Anacardiac.).
dasytrichum *Sandwith in Kew Bull.* 1932, 210.—Guiana Brit.
subglabrum *Mildbr. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 188 (1921), in obs.—Cameroons.

TIBESTINA Maire in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 1932, Sér. II. iv. 909. *COMPOSITAE.*
lanuginosa *Maire, l. c.* 910.—Sahara Gall. (Tibesti).

TIBOUCHINA Aubl. (Melastomatac.).
brachyphylla *Gleason in Phytologia*, i. 136 (1935).—Boliv.
decora *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 218.—Peruv.
erythrophylla *Gleason in Phytologia*, i. 133 (1935).—Costa Rica.

TIBOUCHINA:—
nana (*Standley*) *Gleason in Phytologia*, i. 133 (1935): Chaetolepis nana.
oligantha *Gleason, l. c.* 134.—Boliv.
paradoxa *Kraenzl. in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 147.—Costa Rica.
saxosa *Gleason in Phytologia*, i. 135 (1935).—Peruv.
triflora *Gleason in Am. Journ. Bot.* 1932, xix. 740.—Colomb.
venosa *Gleason in Phytologia*, i. 134 (1935).—Boliv.

TIEGHEMOPANAX R. Viguier (Araliac.).
neo-ebudarum *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 264.—N. Hebrides.
Viguierii *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1933, lxxviii. Beibl. 19, 331.—N. Caled.

TIGRIDIA Juss. (Iridac.).
bracteolata (*Klatt*) *Macbride in Candollea*, v. 348 (1934): Beatonia bracteolata.
lobata (*Herb.*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 13 (1931): Hydrotaenia lobata.

TILIA L. (Tiliac.).
×advena *J. Wagner in Magyar Bot. Lap.* 1933, xxxii. 143; *et in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 26.—Hungar.
×Arpadiana *J. Wagner in Magyar Bot. Lap.* 1932, xxxi. 59.—Hungar.
×balassiana *J. Wagner in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 16.—Hungar.
begoniifolia *Chun & Wong in Sunyatsenia*, iii. 38 (1935).—China (Kwangtung).
×brachylepis *Borb. ex J. Wagner in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 65.—Ruman.
breviradiata (*Rehder*) *Hu & Cheng in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* vi. 174 (1935): T. Tuan var. breviradiata.
Chingiana *Hu & Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., x. 79 (1935).—China (Kiangsi).
×deliciosa *J. Wagner in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 9.—Hungar.
×Edinae *J. Wagner in Magyar Bot. Lap.* 1933, xxxii. 143; *et in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 56.—Hungar.
×elata *J. Wagner, l. c.* 144; *et l. c.* 54.—Hungar.
×elegantissima *J. Wagner, l. c.*; *et l. c.* 47.—Hungar.
evonymoides *Borb. ex J. Wagner in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1932, xliv. 341, in syn.: T. Javorkae.
×excellens *J. Wagner in Magyar Bot. Lap.* 1933, xxxii. 144; *et in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 48.—Hungar.
×extranea *J. Wagner in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 17, 26.—Hungar.
×foecunda *J. Wagner in Magyar Bot. Lap.* 1933, xxxii. 143; *et in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 33.—Hungar.
×formosa *J. Wagner in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1932, xliv. 341; *et in Magyar Bot. Lap.* 1933, xxxii. 143.—Hab. ?
×frondens *J. Wagner in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 26.—Hungar.
×Gaaliana *J. Wagner in Magyar Bot. Lap.* 1933, xxxii. 143; *et in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 26.—Hungar.
×gloriosa *J. Wagner in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 66.—Hungar.
×Jakabiana *J. Wagner, l. c.* 1932, xxxi. 60.—Hungar.
japonica (*Miq.*) *Simonk. in Math. és Termész. Közl.* xxii. 326 (1888): T. cordata var. japonica.
×Jarochenkoana *Grossheim & J. Wagner in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 57 (1932).—Caucas.
×jucunda *J. Wagner in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 46.—Hungar.
×keszthelyensis *J. Wagner, l. c.* 16.—Hungar.
×Kitaibelii *J. Wagner, l. c.* 49.—Hungar.
×koeszegiensis *J. Wagner in Magyar Bot. Lap.* 1933, xxxii. 143; *et in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 43.—Hungar.
×Kovatsii *Hulj. & J. Wagner in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 65.—Hungar.
×Kozlowskyana *Grossheim & J. Wagner in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 57 (1932).—Caucas.
×Kuemmerlei *J. Wagner in Magyar Bot. Lap.* 1933, xxxii. 144; *et in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 17.—Hungar.

TILIA:—
kwangtungensis *Chun & Wong in Sunyatsenia*, iii. 41 (1935).—China (Kwangtung).
×Lengyelii *J. Wagner in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 64.—Hungar.
×lobata *J. Wagner in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1932, xliv. 338.—Hungar.
×Ludovici *J. Wagner in Magyar Bot. Lap.* 1932, xxxi. 60.—Hungar.
×luxuriosa *J. Wagner, l. c.* 1933, xxxii. 143; *et in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 56.—Hungar.
×macilenta *J. Wagner in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 65.—Hungar.
×Makashviliana *Grossheim & J. Wagner in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 57 (1932).—Caucas.
×Matrae *J. Wagner in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 16.—Hungar.
×mediana *J. Wagner in Magyar Bot. Lap.* 1933, xxxii. 143; *et in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 16.—Hungar.
×microtypos *J. Wagner in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 55.—Hungar.
×minima *J. Wagner in Magyar Bot. Lap.* 1933, xxxii. 143; *et in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 16.—Hungar.
×mirifica *J. Wagner in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 67.—Hungar.
×modica *J. Wagner, l. c.* 65.—Hungar.
mofungensis *Chun & Wong in Sunyatsenia*, iii. 40 (1935).—China (Kwangtung).
×nyirsegiensis *J. Wagner in Magyar Bot. Lap.* 1932, xxxi. 58.—Hungar.
obscura *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 610 (1933).—China (Hunan).
×obscura *J. Wagner in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 9.—Hungar.
×opulenta *J. Wagner, l. c.* 55.—Hungar.
×paradensis *J. Wagner in Magyar Bot. Lap.* 1933, xxxii. 143; *et in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 55.—Hungar.
×peregrina *J. Wagner, l. c.*; *et l. c.* 16.—Hungar.
×pergrata *J. Wagner in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 67.—Hungar.
×perlaeta *J. Wagner, l. c.*—Hungar.
×permira *J. Wagner, l. c.* 64.—Hungar.
×permixta *J. Wagner, l. c.* 1933, xxxii. 143; *et in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 9.—Hungar.
×peropulenta *J. Wagner in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 55.—Hungar.
×perplexa *J. Wagner in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 66.—Hungar.
×pervulgaris *J. Wagner, l. c.* 1933, xxxii. 143; *et in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 34.—Hungar.
×placata *J. Wagner in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 8.—Hungar.
×praecellens *J. Wagner in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 68.—Hungar.
×praedita *J. Wagner in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 34.—Hungar.
×praelustris *J. Wagner in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 68.—Hungar.
Prilipkoiana *Grossheim & J. Wagner in Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 56 (1932).—Caucas.
×prodigiosa *J. Wagner in Magyar Bot. Lap.* 1933, xxxii. 143; *et in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 48, 56.—Hungar.
×pseudoflavescens *J. Wagner, l. c.*; *et l. c.* 43.—Hungar.
×pseudoformosa *J. Wagner in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 41.—Hungar.
×pseudoulmifolia *J. Wagner, l. c.* 55.—Hungar.
×recepta *J. Wagner, l. c.* 1932, xliv. 340.—Hungar.
×recondita *J. Wagner, l. c.* 1933, xlv. 17.—Hungar.
×ruralis *J. Wagner in Magyar Bot. Lap.* 1933, xxxii. 143; *et in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 41.—Hungar.
×sagvariensis *J. Wagner in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 57.—Hungar.
×Schwerini *J. Wagner in Magyar Bot. Lap.* 1932, xxxi. 60.—Hungar.
×semivitifolia *J. Wagner, l. c.* 58.—Hungar.
×simplex *J. Wagner in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 34.—Hungar.
×spuria *J. Wagner, l. c.* 17.—Hungar.

TILIA:—
×Stephani *J. Wagner in Magyar Bot. Lap.* 1932, xxxi. 58.—Hungar.
×subbudensis *J. Wagner in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 16.—Hungar.
×subjucunda *J. Wagner, l. c.* 46.—Hungar.
×subneglecta *J. Wagner in Magyar Bot. Lap.* 1932, xxxi. 60.—Hungar.
×subvulgaris *J. Wagner in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 34.—Hungar.
×Tankaeana *J. Wagner in Magyar Bot. Lap.* 1932, xxxi. 58.—Hungar.
×tibiscina *J. Wagner, l. c.* 1933, xxxii. 143; *et in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 9.—Hungar.
×turgida *J. Wagner in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1932, xliv. 341.—Hungar.
×vegeta *J. Wagner, l. c.*—Hungar.
×Wulffiana *J. Wagner in Magyar Bot. Lap.* 1933, xxxii. 144; *et in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1933, xlv. 17.—Hungar.
×zirciensis *J. Wagner in Magyar Bot. Lap.* 1932, xxxi. 58.—Hungar.

TILIACORA Colebr. (Menispermac.).
cabindensis *Exell & Mendonça in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. Suppl., 7.—Congo Lusit.
glycosmantha *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 662 (1932).—Tanganyika Terr.
Johannis *Exell in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. Suppl., 7.—Congo Lusit.
subcordata (*Oliv.*) *A. Cheval. Expl. Bot. Afr. Occ. Franç.* i. 17 (1920): Triclisia subcordata.

TILLANDSIA L. (Bromeliac.).
Archeri *L. B. Smith in Proc. Am. Acad.* lxviii. 147 (1933).—Colomb.
Bakeri *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcv. 45 (1931): T. flexuosa (*Baker*) *Mez*.
baliophylla *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 538 (1935).—Hispaniola.
boliviensis *Baker*; *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcviii. 15 (1932), descr. emend.—Boliv.
brachypodia (*Morr.*) *Mez in Engl. Pflanzenreich, Bromeliac.* 564 (1935), cum descr.: Anoplophytum brachypodium.
brevilingua *Mez, l. c.* 535: Catopsis latifolia.
Butzii *Mez, l. c.* 636: T. variegata *Schlecht.*
cambuquirensis *Alv. Silv. Fl. Mont.* ii. 5, 27 (1931).—Bras. (Minas Geraes).
Cardenasii *L. B. Smith in Proc. Am. Acad.* lxx. 154, 167 (1935).—Boliv.
caribaea *L. B. Smith, l. c.* 155: T. Fendleri *Mez.*
Castellani *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 80 (1934).—Argent.
×Chevalieri *Hort. ex C. Cheval. in Rev. Hort.* 1934–5, n. s. xxiv. 514 (1935).—Hort.
cyanescens *Mez in Engl. Pflanzenreich, Bromeliac.* 563 (1935): Anoplophytum amoenum.
Dielsii *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 534 (1935).—Ecuador.
duidae *L. B. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 340.—Venez.
Ernesti *Mez in Engl. Pflanzenreich, Bromeliac.* 636 (1935): T. gracilis *Ule.*
ferruginascens *Mez, l. c.* 500: T. parviflora *Griseb.*
flammea *Mez, l. c.* 478.—Costa Rica.
Friesii *Mez*; *Castellanos in An. Mus. Argent. Cient. Nat. Buenos Aires*, xxxvii. 501 (1933), descr. emend.—Argent.
fulgens (*Klotzsch ex Beer*) *Mez in Engl. Pflanzenreich, Bromeliac.* 501 (1935): Tussacia fulgens.
funebris *Castellanos in An. Mus. Argent. Cient. Nat. Buenos Aires*, xxxvii. 502 (1933).—Argent.
grao-mogolensis *Alv. Silv. Fl. Mont.* ii. 5, 26 (1931).—Bras. (Minas Geraes).
Harmsiana *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcviii. 16 (1932).—Peruv.
Juzepczukii *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 535 (1935).—Colomb.
latisepala *L. B. Smith in Proc. Am. Acad.* lxviii. 148 (1933).—Peruv.
lepidosepala *L. B. Smith, l. c.* lxx. 155 (1935).—Mexico.
modesta *Mez in Engl. Pflanzenreich, Bromeliac.* 481 (1935).—Mexico.
myriophylla *Small, Man. Southeast. Fl.* 270 (1933).—U.S.A. (Florida).

TILLANDSIA:—
parviflora *Griseb. in Goett. Nachricht.* 16 (1864); cf. *Mez in Engl. Pflanzenreich, Bromeliac.* 500 (1935).—Am. austr.?
pueblensis *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 81 (1934).—Mexico.
retrorsa *Alv. Silv. Fl. Mont.* ii. 6, 25 (1931).—Bras. (Minas Geraes).
simulata *Small, Man. Southeast. Fl.* 270 (1933).—U.S.A. (Florida).
speciosa *Hort. ex Nicholson, Ill. Dict. Gard.* iv. 45 (1887), in syn.: T. splendens.
Standleyi *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcv. 46 (1931).—Honduras.
stenoura *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 537 (1935).—Ecuador.
subandina (*Ule*) *Mez ex L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcviii. 16 (1932): Cipuropsis subandina.
venusta *Alv. Silv. Fl. Mont.* ii. 5, 29 (1931).—Bras. (Minas Geraes).

TIMONIUS DC. (Rubiac.).
atropurpureus *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 132 (1932): T. hirsutus *Ridley.*
korrensis *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 351.—Ins. Palau.
macrophyllus (*Teysm. & Binn.*) *Valeton ex K. Heyne, Nutt. Pl. Ned.-Ind.* iv. 200 (1917): Greenea macrophylla.
megacarpus *Kanehira in Tropical Woods*, 1932, No. 29, 5, in obs., nomen; *et in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 494, descr.—Ins. Carolin. (Truk).
villosissimus *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 923.—Ins. Palau.

TIMOURIA Roshev. (Gramin.).
aurita *Hitchcock in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1933, xxiii. 134.—Kashmir.

TINA Roem. & Schult. (Sapindac.).
apiculata (*Radlk.*) *Radlk. ex Choux in Mém. Acad. Malgache*, iv. 79 (1927), in obs.: Tinopsis apiculata.
conjugata *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 1122 (1933).—Madag.
leptophylla *Radlk. l. c.* 1120.—Madag.
tsaratananensis *Choux in Ann. Mus. Hist. Nat. Marseille*, xxii. Mém. II. 42, 45 (1929); *Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 1124 (1933).—Madag.
unifoveolata *Radlk. l. c.* 1121.—Madag.

TINNEA Kotschy & Peyr. (Labiat.).
caudata *G. Taylor in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 166.—N. Rhodesia.
ochracea *Good in Journ. Bot.* 1933, lxxi. Suppl. 2, 169.—Angola.
Physalis *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1933, 150.—Tanganyika Terr.

TINOSPORA Miers (Menispermac.).
pseudo-crispa *Boerl. ex Backer in Meded. Dep. Landbouw*, No. 4 (*Fl. Batav.* i.) 35 (1907), in syn.: T. uliginosa.
sinensis (*Lour.*) *Merrill in Sunyatsenia*, i. 193 (1934): Campylus sinensis.

TIPUANA Benth. (Legumin.).
Lundellii *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 65 (1935).—Guatem.; Brit. Honduras.
mucronata (*Benth.*) *Macbride in Candollea*, vi. 10 (1934): Machaerium mucronatum.
Tipu (*Benth.*) *Lillo in U. S. Dept. Agric., Bur. Pl. Ind., Invent. Seeds & Pl. Import.* No. 31, 87 (1914): Machaerium Tipu.

TISONIA Baill. (Flacourtiac.).
Whitei *Exell in Journ. Bot.* 1931, lxix. 99.—Madag.

TISSA Adans. (Caryophyllac.).
coreana (*Léveillé*) *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 775: Spergula coreana.

TITANOPSIS Schwantes (Ficoidac.).
crassipes (*Marloth*) *N. E. Brown in Gard. Chron.* 1931, Ser. III. lxxxix. 14: Mesembryanthemum crassipes.
Fulleri *Tisch. ex Jacobs. Succ. Pl.* 249 (1935).—Hab.?
Luckhoffii *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 307 (1931).—Little Namaq.
setifera *L. Bolus, l. c.* Pt. II. 416 (1933).—Afr. austr. (Cape Prov.).

TITHYMALUS Mill. (Euphorbiac.).
alaicus *Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med.* (*Trans. Rubber & Guttap. Inst.*) 34, in clavi, 57 (1933).—As. centr.
alatavicus (*Boiss.*) *Prokh. l. c.* 43, in clavi, 97: Euphorbia alatavica.
altotibeticus (*Paulsen*) *Prokh. l. c.* 68, in obs.: Euphorbia altotibetica.
androsaemifolius (*Schousb.*) *G. Sampaio in An. Fac. Sc. Porto*, xvii. 46 (1931), in obs.: Euphorbia androsaemifolia.
aristatus (*Schmalh.*) *Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med.* (*Trans. Rubber & Guttap. Inst.*) 108 (1933), in obs.: Euphorbia aristata.
baeticus (*Boiss.*) *G. Sampaio in An. Fac. Sc. Porto*, xvii. 46 (1931), in obs.: Euphorbia baetica.
bounophilus (*Boiss.*) *Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med.* (*Trans. Rubber & Guttap. Inst.*) 147 (1933), in obs.: Euphorbia bounophila.
Buhsei (*Boiss.*) *Prokh. l. c.* 51, in clavi, 166: Euphorbia Buhsei.
Bungei (*Boiss.*) *Prokh. l. c.* 35, in clavi, 62: Euphorbia Bungei.
caudiculosus (*Boiss.*) *Prokh. l. c.* 147, in obs.: Euphorbia caudiculosa.
deltobracteatus *Prokh. l. c.* 49, in clavi, 149.—As. centr.
densiusculus (*Popov*) *Prokh. l. c.* 45, in clavi, 137: Euphorbia densiuscula.
ferganensis (*B. Fedtsch.*) *Prokh. l. c.* 39, in clavi, 77: Euphorbia ferganensis.
Franchetii (*B. Fedtsch.*) *Prokh. l. c.* 46, in clavi, 140: Euphorbia Franchetii.
glomerulans *Prokh. l. c.* 54, in clavi, 183.—As. centr.
Gmelinii (*Steud.*) *Prokh. l. c.* 53, in clavi, 174: Euphorbia Gmelinii.
guntensis *Prokh. l. c.* 55, in clavi, 201.—As. centr.
herpetorrhizus *Prokh. l. c.* 49, in clavi, 145.—As. centr.
hypoleucus *Prokh. l. c.* 55, in clavi, 199.—As. centr.
ibericus (*Boiss.*) *Prokh. l. c.* 183, in obs.: Euphorbia ibericus.
irgisensis (*Litw.*) *Prokh. l. c.* 52, in clavi, 168: Euphorbia irgisensis.
issykkulensis *Prokh. l. c.* 36, in clavi, 60.—As. centr.
jaxarticus *Prokh. l. c.* 55, in clavi, 192.—As. centr.
kanaoricus (*Boiss.*) *Prokh. l. c.* 144, in obs.: Euphorbia kanaorica.
kansuensis (*Prokh.*) *Prokh. l. c.* 75, in obs.: Euphorbia kansuensis.
kopetdaghi *Prokh. l. c.* 50, in clavi, 158.—As. centr.
Kozlovii (*Prokh.*) *Prokh. l. c.* 68, in obs.: Euphorbia Kozlovii.
kurdicus (*Boiss.*) *Prokh. l. c.* 147, in obs.: Euphorbia kurdica.
lamprocarpus *Prokh. l. c.* 41, in clavi, 105.—As. centr.
Lipskyi *Prokh. l. c.* 39, in clavi, 80.—As. centr.
Litwinowii *Prokh. l. c.* 49, in clavi, 147.—As. centr.
matritensis (*Boiss.*) *G. Sampaio in An. Fac. Sc. Porto*, xvii. 46 (1931), in obs.: Euphorbia matritensis.
microcarpus *Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med.* (*Trans. Rubber & Guttap. Inst.*) 53, in clavi, 171 (1933).—As. centr.
nudus (*Velen.*) *Prokh. l. c.* 108, in obs.: Euphorbia nuda.
nutans (*Lag.*) *G. Sampaio in An. Fac. Sc. Porto*, xvii. 45 (1931), in obs.: Euphorbia nutans.
pamiricus *Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med.* (*Trans. Rubber & Guttap. Inst.*) 55, in clavi, 198 (1933).—As. centr.
poecilophyllus *Prokh. l. c.* 54, in clavi, 186.—As. centr.
polytimeticus *Prokh. l. c.* 48, in clavi, 142.—As. centr.
Potaninii (*Prokh.*) *Prokh. l. c.* 170, in obs.: Euphorbia Potaninii.
prostratus (*Ait.*) *G. Sampaio in An. Fac. Sc. Porto*, xvii. 45 (1931), in obs.: Euphorbia prostrata.
pubescens (*Vahl*) *G. Sampaio, l. c.* 46, in obs.: Euphorbia pubescens.
schugnanicus (*B. Fedtsch.*) *Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med.* (*Trans. Rubber & Guttap. Inst.*) 35, in clavi, 64 (1933): Euphorbia schugnanica.

TITHYMALUS:—
Seguieranus (*Neck.*) *Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med.* (*Trans. Rubber & Guttap. Inst.*) 50, in clavi, 163 (1933): Euphorbia Seguierana.
semivillosus *Prokh. l. c.* 41, in clavi, 112.—As. centr.
Sewerzowii *Prokh. l. c.* 54, in clavi, 188.—As. centr.
sogdianus (*Popov*) *Prokh. l. c.* 50, in clavi, 156: Euphorbia sogdiana.
soongaricus (*Boiss.*) *Prokh. l. c.* 41, in clavi, 103: Euphorbia soongarica.
spinidens *Prokh. l. c.* 56, in clavi, 208.—As. centr.
talastavicus *Prokh. l. c.* 44, in clavi, 95.—As. centr.
tanguticus (*Prokh.*) *Prokh. l. c.* 101, in obs.: Euphorbia tangutica.
tibeticus (*Boiss.*) *Prokh. l. c.* 59, in obs.: Euphorbia tibetica.
transtaganus (*Boiss.*) *G. Sampaio in An. Fac. Sc. Porto*, xvii. 46 (1931), in obs.: Euphorbia transtagana.
Tranzschelii *Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med.* (*Trans. Rubber & Guttap. Inst.*) 36, in clavi, 59 (1933).—As. centr.
tshuiensis *Prokh. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1933, Nos. 3–4, p. 1.—Altai.
turkestanicus (*Regel*) *Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med.* (*Trans. Rubber & Guttap. Inst.*) 35, in clavi, 66 (1933): Euphorbia turkestanica.
uliginosus (*Welw. ex Boiss.*) *G. Sampaio in An. Fac. Sc. Porto*, xvii. 46 (1931), in obs.: Euphorbia uliginosa.
uralensis (*Fisch. ex Link*) *Prokh. Consp. Syst. Tithym. As. Med.* (*Trans. Rubber & Guttap. Inst.*) 55, in clavi, 203 (1933): Euphorbia uralensis.
Woronowii (*Grossheim*) *Prokh. l. c.* 209, in obs.: Euphorbia Woronowii.
zeravschanicus *Prokh. l. c.* 38, in clavi, 68: Euphorbia sarawschanica *Regel*.

TOCOCA Aubl. (Melastomatac.).
carolensis *Gleason in Am. Journ. Bot.* 1932, xix. 746.—Boliv.
glandulosa *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 252.—Peruv.
gonoptera *Gleason, l. c.* 247.—Peruv.
montana *Gleason, l. c.* 430.—Venez.
obovata *Gleason, l. c.* 429.—Venez.
oligantha *Gleason, l. c.* 431.—Venez.
stenoptera *Gleason, l. c.* 248.—Peruv.
temnoptera *Gleason, l. c.* 249.—Peruv.

TOCOYENA Aubl. (Rubiac.).
amazonica *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 350 (1931).—Peruv.
obliquinervia (*Standley*) *Standley in Contrib. Arn. Arb.* No. v. 152 (1933), in obs.: Posoqueria obliquinervia.
pendulina *Spruce ex Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 391 (1931).—Venez.
Pittieri (*Standley*) *Standley in Contrib. Arn. Arb.* No. v. 151 (1933): Posoqueria Pittieri.
Sprucei *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 350 (1931).—Bras.
Williamsii *Standley, l. c.* 349.—Peruv.

TODDALIOPSIS Engl. (Rutac.).
Bremekampii *Verdoorn in Kew Bull.* 1935, 204.—Transvaal.

TOECHIMA Radlk. (Sapindac.).
lanceolatum *C. T. White in Contrib. Arn. Arb.* No. iv. 62 (1933).—Austral. (Queensland).

TOISUSU Kimura (Salicac.).
Urbaniana (*Seem.*) *Kimura in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxvi. 397 (1934): Salix Urbaniana.

TOLPIS Adans. (Compos.).
nemoralis *Font Quer, Iter Marocc.* 1930, No. 714 [1932], in obs.—Marocc.

TOLYPANTHUS Blume (Loranthac.).
involucratus (*Roxb.*) *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France*, 1895, xlii. 248, in obs.: Loranthus involucratus.

TOONA M. Roem. (Meliac.).
inodora (*Hassk.*) *Reid & Chandler, London Clay Fl.* 279 (1933), in obs.: Cedrela inodora.

TOPOBEA Aubl. (Melastomatac.).
cuspidata *Gleason in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1935, xxxii. 209.—Guiana Bat.
ferruginea *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 434.—Venez.

TORENIA L. (Scrophulariac.).
aerinea *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 212 (1931): T. hirtella *Hook. f.*, non T. rubens var. hirtella *Benth.*
arisanensis *Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1931, xxi. 222.—Formosa.
cyanea *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 212 (1931).—Zeylan.
kiusiana *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 55 (1934).—Japon. (Kiushiu).
leucosiphon *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 212 (1931): T. asiatica var. parvifolia *Hook. f.*

TORILIS Adans. (Umbellif.).
Behri *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 147 [1933], nomen.—Marocc.
elongata (*Hoffm. & Link*) *G. Sampaio in Ann. Acad. Polyt. Porto*, xiv. 154 (1921): Caucalis elongata.
Hillebrandii *H. Wolff ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 801 (1921), in obs.—Ins. Canar. (Tenerife).
taihasenzanensis *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1934, vi. 570.—Formosa.

TORNABENEA Parl. (Umbellif.).
annua *Béguinot ex A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1935, Sér. II. vii. 144, in obs., et in syn.: Melanoselinum annuum.

TORRESEA Fr. Allem. (Legumin.).
acreana *Ducke in Arquiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, i. 205 (1935); *et in Tropical Woods*, 1935, No. 43, 19.—Bras. (Amaz.).

TORREYA Arn. (Taxac.; Conif., Gen. Pl.).
macrosperma (*Koidz.*) *Miyoshi in Tennenk.-Chōsahōk.* (*Shokubutsu*) iii. 44 (1926); cf. *Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 2, 135 (1931): T. nucifera var. macrosperma.
nuda *Miyoshi, l. c.* vi. 59 (1926); cf. *Makino & Nemoto, l. c.* 136, japonice.—Japon.

TORRUBIA Vell. (Nyctaginac.).
Broadwayana (*Heimerl*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 308 (1931): Pisonia Broadwayana.
floribunda (*Hook. f.*) *Standley, l. c.* xi. 85 (1931): Pisonia floribunda.
globosa *Small, Man. Southeast. Fl.* 490 (1933).—U.S.A. (Florida).
myrtiflora *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist. Chicago*, Bot. Ser., viii. 307 (1931).—Peruv.
obtusiloba (*Huber*) *Standley, l. c.* 308: Pisonia obtusiloba.
pubescens (*H. B. & K.*) *Standley, l. c.* xi. 86 (1931): Pisonia pubescens.
Riedeliana (*Fisch.*) *Standley, l. c.* viii. 308 (1931): Pisonia Riedeliana.
Rusbyana *Standley, l. c.* xi. 85 (1931).—Venez.
uberrima *Standley, l. c.* 88.—Colomb.
Warmingii (*Heimerl*) *Standley, l. c.* viii. 308 (1931): Pisonia Warmingii.

TORTIPES Small, Man. Southeast. Fl. 298 (1933). *LILIACEAE.*
amplexifolius (*L.*) *Small, l. c.*: Uvularia amplexifolia.

TOUNATEA Aubl. (Legumin.).
decipiens (*Holmes*) *Lyons, Plant Names Scientific & Popular*, ed. 2, 356, 474 (1907), in obs.: Swartzia decipiens.

TOURNEFORTIA L. (Boraginac.).
brachyantha *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 314 (1935).—China (Hainan).
candidula (*Miers*) *I. M. Johnston in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcii. 84 (1930): Messerschmidtia candidula.
Lilloi *I. M. Johnston, l. c.* 71.—Boliv.; Argent.
luzonica *I. M. Johnston in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 156.—Ins. Philipp. (Luzon).
Muelleri *I. M. Johnston, l. c.* 157: T. mollis *F. Muell.*

TOURNEFORTIA:—
poasana *Cufod. in Archiv. Bot., Forli*, 1934, x. 42. —Costa Rica.
sogdiana (*Bunge*) *Popov in Bull. Sect. Turkest. Soc. Russe Géogr.* 1922, xv. 52, in adnot.: Heliotropium sogdianum.
viridiflora *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 4 (1824).—Ind. or.

TOVARA Adans. (Polygonac.).
filiformis *Nakai in Rigakkai*, xxix. iv. p. 8 (1926); cf. *Hara in Journ. Jap. Bot.* ix. 255 (1933).—Japon. (Hondo).
neo-filiformis *Nakai ex Maekawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 586.—Japon.
smaragdina *Nakai ex Maekawa, l. c.* 585.—Japon.

TOVOMITA Aubl. (Guttif.).
aequatoriensis *Benoist in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 333.—Am. austr.
carinata *Eyma, Polygonac. Guttif. & Lecythidac. Surinam*, 42 (1932).—Guiana Bat.
Krukovii *A. C. Smith in Phytologia*, i. 122 (1935). —Bras. (Amaz.).
micrantha *A. C. Smith, l. c.* 123.—Bras. (Amaz.).
stenantha *Standley in Tropical Woods*, 1935, No. 42, 23.—Panamá.

TOVOMITIDIUM Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro, ii. 61 (1935). *GUTTIFERAE.*
clusiiflorum *Ducke, l. c.* 62.—Bras. (Amaz.).
speciosum (*Ducke*) *Ducke, l. c.* 61: Tovomita speciosa.

TOXOCARPUS Wight & Arn. (Asclepiadac.).
glabrescens *M. R. Henderson in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 109 (1933).—Penins. Mal.
ovalifolius *Tsiang in Sunyatsenia*, ii. 193 (1934).—China (Hainan).
pauciflorus *M. R. Henderson in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 110 (1933).—Penins. Mal.

TRACHELOSPERMUM Lem. (Apocynac.).
Bessonii *Pierre ex Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1244 (1933).—Indo-China (Cochinch.).
Bodinieri (*Léveillé*) *R. E. Woodson in Journ. Arn. Arb.* 1934, xv. 312: Melodinus Bodinieri.
suaveolens *Chun in Sunyatsenia*, i. 298 (1934).—China (Kwangtung; Kwangsi).
wenchowense *Tsiang in Sunyatsenia*, ii. 138 (1934). —China (Chekiang).

TRACHYDIUM Lindl. in Royle, Ill. Bot. Himal. 232 (Aug. 1835). *UMBELLIFERAE.*
fuscopurpureum *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 711 (1933).—China (Yunnan).

TRACHYMENE Rudge (Umbellif.).
acerifolia *C. Norman in Journ. Bot.* 1931, lxix. 287. —Ins. Sunda (Timor).

TRACHYPOGON Nees (Gramin.).
glaucescens *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 803 (1933).—Tanganyika Terr.

TRACHYSPERMA Rafin. (Gentianac.).
aquaticum (*Walt.*) *House in Bull. N. Y. State Mus.* 1920, Nos. 233–4, 65 (1921): Anonymos aquatica.
Grayanum (*Griseb.*) *House, l. c.* 66: Limnanthemum Grayanum.
Humboldtianum (*H. B. & K.*) *House, l. c.*: Villarsia Humboldtiana.
lacunosum (*Vent.*) *House, l. c.*: Villarsia lacunosa.

TRACHYSPERMUM Link (Umbellif.).
aethusifolium *Chiov. Fl. Somala*, II. 229 (1932).—Somal. Ital.
hispidum (*Thunb.*) *Drude ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 809 (1921), in obs.: Sium hispidum.
Roxburghianum (*DC.*) *Craib, Fl. Siam. Enum.* i. 788 (1931): Ptychotis Roxburghiana.
scaberulum (*Franch.*) *H. Wolff ex Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 713 (1933): Carum scaberulum.
tenue (*Sond.*) *Drude ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 809 (1921), in obs.: Ptychotis tenuis.

TRACHYSTOMA O. E. Schulz (Crucif.).
aphanoneurum (*Maire & Weiller*) *Maire & Weiller in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1934, xxv. 289, cum descr. emend.: Sinapis aphanoneura.
longivalve *Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc*, iii. 885 (1934).—Marocc.

TRADESCANTIA L. (Commelinac.).
edwardsiana *Tharp in Rhodora*, 1932, xxxiv. 57.—U.S.A. (Texas).
Ernestiana *E. Anders. & R. E. Woodson in Contrib. Arn. Arb.* No. ix. 58 (1935).—U.S.A. (Missouri; Oklahoma; Arkansas).
laekenensis *Hort. ex L. H. Bailey & E. Z. Bailey, Hortus*, 616 (1930).—Hab. ?
longipes *E. Anders. & R. E. Woodson in Contrib. Arn. Arb.* No. ix. 91 (1935).—U.S.A. (Missouri).
ozarkana *E. Anders. & R. E. Woodson, l. c.* 56.—U.S.A. (Missouri; Oklahoma; Arkansas).
paludosa *E. Anders. & R. E. Woodson, l. c.* 83.—U.S.A. (S. E. States).
pauciflora *Urb. & Ekman in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. a. No. 11, 7 (1931).—Santo Domingo.
prostrata *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1142 (1895), in syn.: T. fluminensis.
quadricolor *Hort. ex Vilmorin, l. c.* 1144, in syn.: Zebrina pendula f. quadricolor *Voss.*
texensis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 22 (1933–5).—U.S.A. (Texas).
Tharpii *E. Anders. & R. E. Woodson in Contrib. Arn. Arb.* No. ix. 70 (1935).—U.S.A. (Kansas; Missouri; Oklahoma; Texas).
valida *Brückn. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 510 (1932).—Bras.
viridis *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1142 (1895), in syn.: T. fluminensis.

TRAGIA L. (Euphorbiac.).
anisopetala *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 261 (1935).—China (Hainan).
keniensis *Rendle in Journ. Bot.* 1932, lxx. 164.—Kenya Col.
scandens *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 49 (1933–5).—Mexico.

TRAGIOLA Small & Pennell in Small, Man. Southeast. Fl. 1192 (1933); Pennell in Acad. Nat. Sc. Philad. Monogr. 1, Scroph. 97 (1935), latine. *SCROPHULARIACEAE.*
pilosa (*Michx.*) *Small & Pennell in Small, Man. Southeast. Fl.* 1192 (1933): Gratiola pilosa.

TRAGIOPSIS Pomel (Umbellif.).
Hanotei *Braun-Blanquet & Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1931, xxii. 108.—Marocc.

TRAGOPOGON L. (Compos.).
angustissimus *Nikitin in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 194 (1933).—Ross. asiat. centr.
colchicus *Alboff ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 232 (1934).—Caucas.
flexuosus *Sosn. ex Grossheim, l. c.*—Caucas.
Krascheninnikovii *Nikitin in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 192 (1933).—Ross. asiat. centr.
marginatus *Pavlov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1933, n. s. xlii. 128, 135.—Turkestan.
paradoxus *Nikitin in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 200 (1933).—Ross. asiat. centr.
serawschanicus *Nikitin, l. c.*—Ross. asiat. centr.
songoricus *Nikitin, l. c.* 198.—Songaria.
subacaulis *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxvi. 148 (1934).—As. Min. (Lydia).
turkestanicus *Nikitin in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1933, n. s. xlii. 128, 136; *et in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 196 (1933).—Turkestan.
Vvedenskyi *Popov in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1933, n. s. xlii. 128, 138.—Turkestan.

TRAGUS Haller (Gramin.).
arenarius *Bremek. & Oberm. in Ann. Transvaal Mus.* xvi. 403 (1935).—Bechuanaland Protect.

TRAPA L. (Hydrocaryac.; Onagrac., Gen. Pl.).
bispinosa *Roxb. Hort. Beng.* 11 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 449 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 428 (1832).—Ind. or.
quadrispinosa *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 451; *et l. c.* 430.—Ind. or. (Assam).

TRATTINNICKIA Willd. (Burserac.).
demerarae *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 185.—Guiana Brit.

TRECULIA Decne. (Morac.; Urticac., Gen. Pl.).
Perrieri *Jumelle in Compt. Rend.* 1920, clxxi. 926, in obs.—Madag.
Staudtii *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.*, Nachtr., 120 (1897); *et in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* i. 33 (1898).—Cameroons.

TREMA Lour. (Ulmac.; Urticac., Gen. Pl.).
Grevei *Baill. in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxxv. (*Hist. Nat. Pl.* v. Atlas iii.) t. 292 B (1896).—Madag.
integerrima (*Beurl.*) *Standley in Contrib. Arn. Arb.* No. v. 55 (1933): Sponia integerrima.
lanceolata *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* vii. 302 (1931).—China (Kwangtung).
philippinensis *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3218 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).

TREMATOLOBELIA A. Zahlbr. (Campanulac.).
sandwicensis *Degener, Fl. Hawaiiensis*, Fam. 339 (1934): Lobelia macrostachys.

TRESANTHERA Karst. (Rubiac.).
pauciflora (*Solereder*) *K. Schum. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* iv. 1v. 19 (1891), nomen; *Solereder in Bull. Herb. Boiss.* i. 280 (1893), cum descr.: Rustia pauciflora.

TREUBANIA Van Tiegh. in Morot, Journ. de Bot. xi. 324 (1897), in adnot.: **Treubella** Van Tiegh. (Loranthac.).

TREUBELLA Van Tiegh. (Loranthac.).
spathulata *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France*, 1895, xlii. 435, in obs.—Hab. ?

TREVESIA Vis. (Araliac.).
arborea *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. viii. 116 (1934).—Sumatra.

TREVOA Miers; Hook. Bot. Misc. i. 158 (1829), descr. *RHAMNACEAE.*
quinquenervia *Gill. & Hook. in Hook. l. c.*—Chile.
trinervia *Miers*; *Gill. & Hook. l. c.* 159, descr.—Chile.

TRIADENUM Rafin. (Guttif.).
japonicum (*Blume*) *Makino, Shokubutu Zukwan*, 326 (1925); cf. *Kimura in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 834: Elodea japonica.

TRIANTHEMA L. (Ficoidac.).
glandulosum *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. 11. Anhang, 30 (1932).—Tanganyika Terr.
multiflorum *Peter, l. c.* 29.—Tanganyika Terr.
nigricans *Peter, l. c.* 30.—Tanganyika Terr.
salarium *Bremek. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 239 (1933).—Transvaal.
Sennii *Chiov. Fl. Somala*, II. 225 (1932).—Somal. Ital.

TRIASPIS Burchell (Malpighiac.).
massaiensis *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 827 (1915), in obs.: T. stipulata *Engl.*
ovata *Bremek. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 245 (1933).—Transvaal.
Schliebenii *Ernst in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 709 (1935).—Tanganyika Terr.

TRIBRACHYA Korth. (Rubiac.).
Beccariana (*Baill. ex K. Schum.*) *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 1. 137 (1891): Morinda Beccariana.

TRIBULUS L. (Zygophyllac.).
saharae *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 136 (1927), in syn.: T. terrestris.

TRICALYSIA A. Rich. (Rubiac.).
coffeoides (*A. Cheval.*) *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 82, in clavi, 83 (1931): Feretia coffeoides.
Dalzellii (*Thwait.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 151 (1931): Discospermum Dalzellii.
Elliotii (*K. Schum.*) *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 82, in clavi, 83 (1931): Probletostemon Elliotii.
erythrospora (*Thwait.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 151 (1931): Discospermum erythrosporum.

TRICALYSIA:—
Hookeri *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 82, in clavi, 83 (1931).—Nigeria.
oblanceolata *Hutchinson & Dalziel, l. c.*—Nigeria.
Pobeguinii *Hutchinson & Dalziel, l. c.*—Guinea Gall.; Gold Coast; Togo.
Sennii *Chiov. Fl. Somala,* II. 240 (1932).—Somal. Ital.
sorsogonensis *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3269 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
trilocularis (*S. Elliott*) *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 82, in clavi, 83 (1931): Aulacocalyx trilocularis.

TRICERAS Andrz. (Crucif.).
bicorne (*DC*) *Maire in Cavanillesia,* vi. 9 (1933), in obs.: Matthiola bicornis.
fruticulosum (*L.*) *Maire, l. c.* 8: Cheiranthus fruticulosus.
lividum (*DC.*) *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord,* 1934, xxv. 13: Matthiola livida.
maroccanum (*Coss.*) *Maire, l. c.* 1935, xxvi. 153: Matthiola maroccana.
oxyceras (*DC.*) *Maire in Cavanillesia,* vi. 8 (1933), in obs.: Matthiola oxyceras.
tricuspidatum (*L.*) *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord,* 1933, xxiv. 196: Cheiranthus tricuspidatus.

TRICHACHNE Nees (Gramin.).
californica (*Benth.*) *Chase ex Hitchcock in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1933, xxiii. 455: Panicum californicum.
Hitchcockii (*Chase*) *Chase ex Hitchcock, l. c.* 454: Valota Hitchcockii.
patens *Swallen in Am. Journ. Bot.* 1932, xix. 442.—U.S.A. (Texas).

TRICHANTHA Karst. & Triana in Triana, Nuev. Jen. i Esp. Fl. Neo-Granad. 14 (1854); Karst. in Linnaea, xxviii. 437 (1857); Sprague in Kew Bull. 1934, 395. *CONVOLVULACEAE.*
ferruginea *Karst. & Triana, l. c.*; *Karst. l. c.* 438; *Sprague, l. c.*—Colomb.

TRICHANTHEMIS Regel & Schmalh. (Compos.).
aulieatensis (*B. Fedtsch.*) *Kraschen. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS,* Ser. I. Fasc. 1, 184 (1933): Chrysanthemum aulieatense.

TRICHILIA P. Br. (Meliac.).
Buchtienii *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 386 (1932).—Boliv.
Davisii *Sandwith in Kew Bull.* 1933, 329.—Guiana Brit.
Froesii *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1934, lxi. 193.—Bras. (Maranhão).
Jodinii (*Steud. ex Göpp.*) *Briq. in Candollea,* vi. 21 (1935): Celastrus Jodinii.
jubensis *Chiov. Fl. Somala,* II. 129 (1932).—Somal. Ital.
Krukovii *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 360.—Bras. (Pará).
Krukovii *Gleason in Phytologia,* i. 106 (1934), non praec.—Bras. (Amaz.).
leucastera *Sandwith in Kew Bull.* 1933, 328.—Guiana Brit.
Macbrideana *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 785 (1933).—Peruv.
magnifica *Baehni & Macbride in Candollea,* v. 380 (1934): T. lanceolata *Pittier.*
papillosa *Pierre ex A. Cheval. Vég. Ut. Afr. Trop. Franç.* ix. 124 (1917), in obs.—Gabon.
pauloënsis *Hoehne in Ostenia,* 301 (1933).—Bras. (S. Paulo).
punctata *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 359.—Bras. (Matto Grosso).
redacta *Bullock ex Burtt Davy, Check-Lists For. Trees & Shrubs Brit. Emp.* No. 1, Uganda, 64 (1935).—Uganda.
Roka (*Forsk.*) *Chiov. Fl. Somala,* II. 131 (1932): Elcaja Roka.
Sampaioana *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 387 (1932).—Bras. (Pará).
Schliebenii *Harms, l. c.* xi. 1070 (1934).—Tanganyika Terr.
subcordata *Gürke in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C. 232 (1895).—Tanganyika Terr.
Trollii *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 385 (1932).—Boliv.

TRICHILIA:—
validinervia *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 785 (1933).—Peruv.
Williamsii *Harms, l. c.* xi. 387 (1932).—Peruv.

TRICHOCAULON N. E. Brown (Asclepiadac.).
columnare *Nel in Kakteenk.* 1933, 135.—Little Namaq.
Decaryi *Choux in Ann. Mus. Col. Marseille,* 1932, Sér. IV. x. Fasc. 2, 10.—Madag.
halenbergense *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 163 (1931), in obs.—Afr. austr.-occ.
kubusanum *Nel ex Jacobsen, Succ. Pl.* 291 (1935).—Little Namaq.
kubusense *Nel in Kakteenk.* 1933, 70.—Little Namaq.
pubiflorum *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 192 (1932).—Great Namaq.
Triebneri *Nel in Kakteenk.* 1935, 117.—Afr. austr.-occ.

TRICHOCEREUS Riccob. (Cactac.).
auricolor *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 200, 412 (1935).—Argent.
Bertramianus *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 6, [p. 2].—Boliv.
Campos-Portoi *Werderm. Bras. Säulenkakt.* 94 (1933).—Bras. (Minas Geraes).
cephalomacrostibas *Backeb. in Cact. & Succ. Journ. Amer.* iii. 132 (1932), in obs.; *et in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 201, 412 (1935).—Peruv.
Damazioi (*K. Schum.*) *Werderm. Bras. Säulenkakt.* 94 (1933): Cereus Damazioi.
deserticola (*Werderm.*) *Looser in Rev. Chil. Hist. Nat.* 1929, xxxiii. 614: Cereus deserticola.
gladiatus *Frič in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1932, xlvii. 421, in obs.—Hab. ?
gladiatus (*Lem.*) *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 202 (1935): Cereus gladiatus.
Glaziovii (*K. Schum.*) *Werderm. Bras. Säulenkakt.* 94 (1933): Cereus Glaziovii.
litoralis (*Johow*) *Looser in Rev. Chil. Hist. Nat.* 1929, xxxiii. 598: Cereus litoralis.
Poco *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 6, [p. 1], in obs.; *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 204, 412 (1935).—Boliv.; Argent.
santiaguensis *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 432, indice, 204 (1935), pro syn.: T. Spachianus.
uyupampensis *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 7, [p. 7], in obs.; *Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC,* 205, 412 (1935).—Peruv.
Vollianus *Backeb. l. c.* 1935, Pt. 9, [p. 7], in obs.; *et l. c.*—Boliv.
Werdermannianus *Backeb. l. c.*, in obs., nomen; *et l. c.* 206, 412.—Boliv.

TRICHOCHILUS Ames in Journ. Arn. Arb. 1932, xiii. 142. *ORCHIDACEAE.*
neo-ebudicus *Ames, l. c.*—N. Hebrides.

TRICHOCLADUS Pers. (Hamamelidac.).
dentatus *Hutchinson in Kew Bull.* 1933, 430.—Tanganyika Terr.

TRICHOCLINE Cass. (Compos.).
linearifolia *Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 114 (1933).—Bras. (Paraná).

TRICHOCYCLUS N. E. Brown (Ficoidac.).
buchubergensis *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 169 (1931), in obs., nomen.—Afr. austr.-occ.
namibensis *N. E. Brown ex Maass in Zeitschr. Sukkulentenk.* iii. 234, nomen, 322, in clavi (1928).—Great Namaq.
Pillansii *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 311 (1932).—Little Namaq.
pubescens *N. E. Brown ex Maass in Zeitschr. Sukkulentenk.* iii. 234, nomen, 322, in clavi (1928).—Namaqualand.
simplex *N. E. Brown ex Maass, l. c.*—Namaqualand.

TRICHODIADEMA Schwantes (Ficoidac.).
olivaceum *L. Bolus, Notes Mesembr.* Pt. II. 261 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Ryderae *L. Bolus, l. c.* 244.—Afr. austr. (Cape Prov.).

TRICHOGLOTTIS Blume (Orchidac.).
cuneilabris *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements,* viii. 124 (1935).—Borneo.

TRICHOGLOTTIS:—
Guibertii (*Linden & Reichb. f.*) *Ames & Quisumb. in Philipp. Journ. Sc.* 1935, lvi. 464: Cleisostoma Guiberti.
lobifera *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 155 (1931).—Borneo.
Smithii *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements,* viii. 125 (1935): T. quadricornuta *J. J. Smith.*

TRICHOGONIA Gardn. (Compos.).
rhodotricha *Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 30 (1933).—Bras. (Paraná).

TRICHOLAENA Schrad. (Gramin.).
atropurpurea *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss,* i. 1195 (1895), in syn.: T. rosea f. atropurpurea *Voss.*
Busseana (*Mez*) *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. 1. 219 (1931): Panicum Busseanum.
madagascariensis (*Spreng.*) *Mez ex Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* vi. 70 (1913), in obs.: Panicum madagascariense.
violacea *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss,* i. 1195 (1895), in syn.: T. rosea f. violacea *Voss.*

TRICHOLEPIS DC. (Compos.).
divaricata (*DC.*) *Iljin in Sovietsk. Bot.* 1935, No. 5, 121, in obs.: Microlonchus divaricatus.

TRICHONEURA Anderss. (Gramin.).
elegans *Swallen in Am. Journ. Bot.* 1932, xix. 439.—U.S.A. (Texas).

TRICHOPTERYX Nees (Gramin.).
elegantula *Pilger ex Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. 1. Anhang, 93 (1930).—Tanganyika Terr.
glabrata *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 336 (1897), in obs.—Cameroons.
Glanvillei *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 426.—Sierra Leone.
gracillima *C. E. Hubbard, l. c.* 425.—Uganda.
lanata *Stent & Rattray in Proc. Rhodes. Scientif. Assoc.* xxxii. (*Stent & Rattray, Grasses S. Rhodes.*) 39 (1933).—S. Rhodesia.
perlaxa *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xii. 383 (1935).—Tanganyika Terr.
superba (*De Not.*) *Bagl. ex Chiov. in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* n. s. xxvi. 79 (1919): Loudetia superba.

TRICHOSANTHES L. (Cucurbitac.).
pedata *Merrill & Chun in Sunyatsenia,* ii. 20 (1934).—China (Kwangtung).

TRICHOSCYPHA Hook. f. (Anacardiac.).
Beguei *Aubrév. & Pellegr. in Bull. Soc. Bot. France,* 1934, lxxxi. 648.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
cavalliensis *Aubrév. & Pellegr. l. c.* 647.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
Chevalieri *Aubrév. & Pellegr. l. c.*—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
Dusenii *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 191 (1921), in obs.—Cameroons.
Oba *Aubrév. & Pellegr. in Bull. Soc. Bot. France,* 1934, lxxxi. 648.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
Smythei *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 508 (1928); *Hutchinson & Dalziel in Kew Bull.* 1929, 28.—Sierra Leone.
ulugurensis *Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 1071 (1934).—Tanganyika Terr.
yapoënsis *Aubrév. & Pellegr. in Bull. Soc. Bot. France,* 1934, lxxxi. 649.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).

TRICHOSPERMUM Blume (Tiliac.).
Ikutai *Kanehira in Tropical Woods,* 1932, No. 29, 5, in obs., nomen; *et in Bot. Mag., Tokyo,* 1932, xlvi. 486, descr.—Ins. Carolin. (Yap).
pseudojavanicum *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* xi. 511 (1932).—N. Guin.
sacciferum *Burret, l. c.*—N. Guin.

TRICHOSPORUM D. Don (Gesneriac.).
lampongum (*Miq.*) *Burkill in Kew Bull.* 1935, 319; *Burkill, Dict. Econ. Prod. Mal. Penins.* ii. 2180 (1935): Aeschynanthus lamponga.
Mjoebergii *Merrill in Sarawak Mus. Journ.* iii. 551 (1928).—Borneo.
oligodontum *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 151 (1934).—Sumatra.

TRICHOSPORUM:—
stenophyllum (*Ridley*) *Merrill in Contrib. Arn. Arb.* No. VIII. 152 (1934): Aeschynanthus stenophyllus.
ternifolium *Merrill, l. c.* 153.—Sumatra.

TRICHOSTACHYS Hook. f. (Rubiac.).
mayumbensis *De Wild. Pl. Bequaert.* vi. 80 (1932). —Congo Belg.
Tholloni *De Wild. l. c.* 82.—Gabon.
Zenkeri *De Wild. l. c.* 83.—Cameroons.

TRICHOSTELMA Baill. (Asclepiadac.).
yucatanense *R. E. Woodson in Am. Journ. Bot.* 1935, xxii. 691.—Mexico.

TRICHOTOLINUM O. E. Schulz in Engl. Jahrb. lxvi. 94 (1933). *CRUCIFERAE.*
deserticola (*Speg.*) *O. E. Schulz, l. c.*, in obs.: Sisymbrium deserticola.

TRICHOTOSIA Blume (Orchidac.).
aurea (*Ridley*) *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 99 (1935): Eria aurea.
lacinulata (*J. J. Smith*) *Carr, l. c.* 101, in obs.: Eria lacinulata.
sarawakensis *Carr, l. c.* 100.—Borneo.

TRICLISIA Benth. (Menispermac.).
Gilletii (*De Wild.*) *Staner in Bull. Agric. Congo Belge*, 1934, xxv. 389: Tiliacora Gilletii.
semnophylla *Diels ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 178 (1915), in obs.—Congo Belg.

TRICOMARIA Gill. in Hook. Bot. Misc. iii. 157 (1832). *MALPIGHIACEAE.*
Usillo *Hook. & Arn. in Hook. l. c.* 158.—Argent.

TRICYRTIS Wall. (Liliac.).
chiugokuensis *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 18.—Japon. (Hondo).
kyusyuensis *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 433.—Japon. (Kiushiu).
macranthopsis *Masamune, l. c.* 251: T. macrantha *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, ii. 39 (1930), non *Maxim.*
perfoliata *Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1935, xxv. 16.—Japon. (Kiushiu).
puberula *Nakai & Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. 1. (*Pl. Nov. Jehol.* 1.) 19 (1934).—Manchur. (Jehol).
Suzukii *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1931, iii. 21.—Formosa.

TRIDACTYLE Schlechter (Orchidac.).
brevifolia *Mansf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1063 (1934).—Tanganyika Terr.
fusifera *Mansf. in Fedde, Repert.* xxxvi. 63 (1934). —Liberia; Cameroons.
polychista *Schlechter ex Mansf. in Fedde, Repert. Beih.* lxviii. 11, t. 104, fig. 415 (1932), sine descr. —Afr.
sarcodantha *Mansf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1063 (1934).—Tanganyika Terr.
unguiculata *Mansf. l. c.* 1064.—Tanganyika Terr.

TRIENTALIS L. (Primulac.).
aleutica *Tatewaki ex Tatewaki & Kobayashi in Journ. Fac. Agric., Sapporo*, xxxvi. 74 (1934), in syn.: T. europaea var. aleutica *Tatewaki & Kobayashi.*

TRIFOLIUM L. (Legumin.).
amani *Post & Beauverd in Dinsm. Pl. Post. & Dinsm.* Fasc. 1. 5 (1932); *Dinsm. in Fedde, Repert.* xxxiii. 104 (1933).—Syria.
curvisepalum *V. Täckh. in Svensk Bot. Tidskr.* 1932, xxvi. 373.—Penins. Sinaitic.
erectum *Delastre, Fl. Dépt. Vienne*, 172 (1842).—Gallia.
galilaeum *Eig in Fedde, Repert. Beih.* lxiii. 1. 174 (1931), nomen.—Palaest.
× Joachini *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 33 [1933].—Marocc.
judaicum *Eig in Fedde, Repert. Beih.* lxiii. 1. 112 (1931), nomen.—Palaest.
Lugardii *Bullock in Kew Bull.* 1932, 494.—Afr. trop. or. (Elgon).
Miegeanum *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1932, xxiii. 177.—Marocc.
Molinerii *Colla, Herb. Pedem.* ii. 134 (1834).—Ital.
nummulariifolium *Perret ex Colla, l. c.* 132, in syn.: T. Perretii.

TRIFOLIUM:—
Perretii *Colla, Herb. Pedem.* ii. 132 (1834).—Ital.
Rouyanum *Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* iii. 40 [1914]: T. montanum var. flaviflorum *Rouy.*
Scaettae *Staner in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiii. 217 (1933), nomen.—Congo Belg.
soldeanum *Barnola in Mem. Soc. Ibér.* No. 1, 89 (1919).—Pyren. (Andorra).
Tastetii *Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 307 [1928], in syn.: T. striatum var. Tastetii *Pau.*
Thompsoni *Morton in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1933, xxiii. 270.—U.S.A. (Washington).
Vavilovi *Eig in Bull. Applied Bot., Leningrad*, Ser. VII. No. 1, 108 (1934).—Palaest.
Viciosoanum *Pau in Font Quer, Iter Marocc.* 1929, No. 264 [1930].—Marocc.

TRIGLOCHIN L. (Juncaginac.; Naiadac., Gen. Pl.).
elongata *Ising in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* 1933, lvii. 183.—Austral. centr.

TRIGONELLA L. (Legumin.).
brachypoda *Hausskn. & Bornm. ex Širjaev in Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk, Brno*, No. 148, 20 (1932), in syn.: T. coerulescens var. brachypoda *Bornm.*
× elmaluensis *Širjaev, l. c.* No. 136, 31 (1931).—As. Min. (Lycia).
hamaticarpa *Hausskn. & Bornm. ex Širjaev, l. c.* 4, in syn.: T. monantha.
lasia *Blatter in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxvi. 479 (1933).—Ind. or. (Waziristan).
macrantha *Hausskn. ex Širjaev in Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk, Brno*, No. 148, 40 (1932), in syn.: T. macrorrhyncha.
psilorhynchos *Blatter in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxvi. 479 (1933).—Ind. or. (Waziristan).

TRIGONIA Aubl. (Trigoniac.; Vochysiac., Gen. Pl.).
crassiflora *A. C. Smith in Phytologia*, i. 129 (1935). —Colomb.
membranacea *A. C. Smith, l. c.* 128.—Colomb.
virens *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 68 (1931).—Peruv.

TRIGONOSTEMON Blume (Euphorbiac.).
diffusus *Merrill in Sarawak Mus. Journ.* iii. 525 (1928).—Borneo.
Fungii *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xi. 47 (1932). —China (Hainan).
Howii *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 262 (1935).—China (Hainan).
kwangsiensis *Hand.-Mazz. in Sinensia*, ii. 130 (1932).—China (Kwangsi).

TRIGONOTIS Stev. (Boraginac.).
amblyosepala *Nakai & Kitagawa in Rep. 1st Sc. Exped. Manchoukuo, 1933*, Sect. IV. 1. (*Pl. Nov. Jehol.* 1.) 44 (1934).—Manchur. (Jehol).
gamocalyx *Hand.-Mazz. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1934, lxxxiii. 233.—Mongol.
hirsuta *Valeton ex v. Steenis in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 177 (1934), nomen.—Sumatra.
muriculata *I. M. Johnston in Candollea*, iv. 309 (1931).—China (Yunnan).
nankotaizanensis (*Sasaki*) *Masamune & Ohwi in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1933, xxiii. 210: Myosotis nankotaizanensis.

TRILISA Cass. (Compos.).
carnosa (*Small*) *B. L. Robinson in Contrib. Gray Herb.* n. s. civ. 49 (1934): Litrisa carnosa.

TRILIX L. (Flacourtiac.; Tiliac., Gen. Pl.).
magnifolia *Ruiz & Pav. ex Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 952 (1934), in syn.: Banara magnifolia.

TRILLIUM L. (Liliac.).
declinatum *Rafin. Autikon Botanikon*, 135 (1840); cf. *Fernald in Rhodora*, 1932, xxxiv. 21, 22.—U.S.A. (Alabama; Florida).
Gleasoni *Fernald, l. c.* 21: T. declinatum *Gleason.*
ozarkanum *Palmer & Steyerm. in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1935, xxii. 504.—U.S.A. (Missouri; Arkansas).
rhombifolium *Komarov, Fl. URSS*, iv. 474, 748 (1935).—Sibir. (Marit. Prov.).

TRILOBACHNE Schenck ex Henrard in Meded. Herb. Leid. No. 67, 4 (1931). *GRAMINEAE.*
Cookei (*Stapf*) *Schenck ex Henrard, l. c.*: Polytoca Cookei.

TRILOCULARIA Schlechter (Balanopsidac.).
pedicellata *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 95.—N. Hebrides.

TRIMENIA Seem. (Monimiac.).
marquesensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus. Honolulu*, No. 130, 82 (1935).—Ins. Marquesas.

TRIMERIA Harv. (Flacourtiac.; Bixac., Gen. Pl.).
rotundifolia (*Hochst.*) *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 582 (1921), in obs.: Monospora rotundifolia.

TRIMORPHA Cass. (Compos.).
Burnati (*F. O. Wolf*) *Janchen in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1932, lxxxii. 125, in obs.: Erigeron Burnati.
Schleicheri (*Gremli*) *Vierh. in Abh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xvi. 215 (1935): Erigeron Schleicheri.
Vierhapperi (*Briq. & Cav.*) *Janchen in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1932, lxxxii. 125: Erigeron Burnati var. Vierhapperi.

TRIODIA R. Br. (Gramin.).
Buckleyana (*Dewey*) *Vasey ex Hitchcock in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1933, xxiii. 452: Sieglingia Buckleyana.

TRIOSTEUM L. (Caprifoliac.).
hirsutum *Roxb. Hort. Beng.* 86 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 180 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 538 (1832).—Reg. Himal.
illinoënse (*Wieg.*) *Rydb. in Brittonia*, i. 96 (1931): T. perfoliatum var. illinoënse.

TRIPHORA Nutt. (Orchidac.).
lutea (*Schlechter*) *Schlechter ex Mansf. in Fedde, Repert. Beih.* lviii. 7 (1930): Pogonia lutea.

TRIPLEUROSPERMUM Sch. Bip. (Compos.).
conoclinum (*Boiss. & Bal.*) *Hayek in Fedde, Repert. Beih.* xxx. 11. 655 (1931): Chamaemelum conoclinum.
rosellum (*Boiss. & Orph.*) *Hayek, l. c.* 654: Chamaemelum rosellum.
Tempskyanum (*Freyn. & Sint.*) *Hayek, l. c.* 655: Chamaemelum Tempskyanum.

TRIPLOCHITON K. Schum. (Triplochitonac.).
zambesiacus *Milne-Redhead in Kew Bull.* 1935, 271.—Rhodesia.

TRIPOGON Roth (Gramin.).
japonicus (*Honda*) *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 63: T. longe-aristatus var. japonicus.
Liebenbergii *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 118. —Uganda.
loliiformis (*F. Muell.*) *C. E. Hubbard, l. c.* 448: Festuca loliiformis.
pungens *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1934, 170. —Ind. or. (Coimbatore).
Snowdenii *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 118. —Uganda.
unisetus *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 654 (1932).—Tanganyika Terr.

TRIPTERIS Less. (Compos.).
Bolusii *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 324 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
integrifolia *Dinter*; *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 92 (1932), descr. ampl.—Great Namaq.

TRIPTERIUM Bercht. & Presl (Ranunculac.).
andorranum *Gandoger ex Flous & Gaussen in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse*, 1933, lxv. 61, in syn.: Thalictrum aquilegiifolium.
Borderi *Gandoger ex Flous & Gaussen, l. c.* 67, pro syn.: Thalictrum aquilegiifolium.
fagetorum *Gandoger ex Flous & Gaussen, l. c.* 61, in syn.: Thalictrum aquilegiifolium.
flavidum *Gandoger ex Flous & Gaussen, l. c.*, in syn.: Thalictrum aquilegiifolium.
glaucocarpum *Gandoger ex Flous & Gaussen, l. c.*, in syn.: Thalictrum aquilegiifolium.
herbaventi *Gandoger ex Flous & Gaussen, l. c.*, in syn.: Thalictrum aquilegiifolium.

TRIPTERIUM:—
integratum *Gandoger ex Flous & Gaussen in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse*, 1933, lxv. 66, pro syn.: Thalictrum aquilegiifolium.
iodantherum *Gandoger ex Flous & Gaussen, l. c.* 61, in syn.: Thalictrum aquilegiifolium.
onustium *Gandoger ex Flous & Gaussen, l. c.*, in syn.: Thalictrum aquilegiifolium.
partilobum *Gandoger ex Flous & Gaussen, l. c.*, in syn.: Thalictrum aquilegiifolium.
parum *Gandoger ex Flous & Gaussen, l. c.*, in syn.: Thalictrum aquilegiifolium.
permixtum *Gandoger ex Flous & Gaussen, l. c.*, in syn.: Thalictrum aquilegiifolium.
platypterum *Gandoger ex Flous & Gaussen, l. c.*, in syn.: Thalictrum aquilegiifolium.
pyrenaicum *Gandoger ex Flous & Gaussen, l. c.*, in syn.: Thalictrum aquilegiifolium.
Pyrrha *Gandoger ex Flous & Gaussen, l. c.*, in syn.: Thalictrum aquilegiifolium.
rupestre *Gandoger ex Flous & Gaussen, l. c.*, in syn.: Thalictrum aquilegiifolium.
taedens *Gandoger ex Flous & Gaussen, l. c.*, in syn.: Thalictrum aquilegiifolium.
tenerifolium *Gandoger ex Flous & Gaussen, l. c.*, in syn.: Thalictrum aquilegiifolium.
vallicola *Gandoger ex Flous & Gaussen, l. c.*, in syn.: Thalictrum aquilegiifolium.

TRIPTERYGIUM Hook. f. (Celastrac.).
Doianum *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 140.—Japon. (Kiushiu).

TRIPTILION Ruiz & Pav. (Compos.).
pusillum *R. Phil. in Verh. Deutsch. Wiss. Ver. Santiago (Chile)*, ii. 107 (1890), nomen; *et in An. Univ. Chile*, lxxxvii. 96 (1894), descr.—Chile.

TRIRAPHIS R. Br. (Gramin.).
andropogonoides (*Steud.*) *Phillips, S. Afr. Grasses (S. Afr. Agric. Ser.* vi.) 219 (1931): Avena andropogonoides.
glomerata *A. Camus in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 759.—Sahara.

TRISETOBROMUS Nevski in Acta Univ. As. Med. Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, p. 15 (1934), in clavi. *GRAMINEAE.*
hirtus (*Trin.*) *Nevski, l. c.*, in clavi: Trisetum hirtum.

TRISETUM Pers. (Gramin.).
bifidum (*Thunb.*) *Ohwi in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 191: Bromus bifidus.
ciliare (*Kit.*) *Domin in Preslia*, xiii–xv. 41 (1935): Avena ciliaris.
filifolium *Scribn. ex Beal, Grasses N. Amer.* ii. 375 (1896).—Mexico.
griseovirens *H. Lindb. Itin. Mediterr. (Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 25 (1932).—Marocc.
Howellii *Hitchcock in Proc. Calif. Acad. Sc.* Ser. IV. xxi. 296 (1935).—Ins. Galapag.
kitadakense *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 297.—Japon.
Koidzumianum *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 33.—Japon. (Hondo).
Litvinovii (*Domin*) *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, 1 (1934), in clavi: Koeleria Litvinovii.
macratherum *Maire & Trab. in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1932, xxiii. 218.—Alger.
orthochaetum *Hitchcock in Am. Journ. Bot.* 1934, xxi. 134.—U.S.A. (Montana).
Paui *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 129 [1933], nomen.—Marocc.
Sandbergii *Beal, Grasses N. Amer.* ii. 378 (1896).—U.S.A. (Washington).
tenellum (*Petrie*) *Allan & Zotov ex Laing & Gourlay in Trans. & Proc. Roy. Soc. N. Z.* lxiv. 3 (1934): T. antarcticum var. tenellum.

TRISTACHYA Nees (Gramin.).
coarctata *A. Camus in Bull. Soc. Bot. France*, 1933, lxxx. 774 (1934).—Guinea Gall.
Dregeana (*Nees*) *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C. 109 (1895): Trichopteryx Dregeana.
Eylesii *Stent & Rattray in Proc. Rhodes. Scientif. Assoc.* xxxii. (*Stent & Rattray, Grasses S. Rhodes.*) 41 (1933).—S. Rhodesia.
fulva *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 434.—Guinea Gall.

TRISTACHYA:—
kagerensis (*K. Schum.*) *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1934, xiv. 43: Trichopteryx kagerensis.
Kerstingii (*Pilger*) *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 435: Trichopteryx Kerstingii.
longispiculata *C. E. Hubbard, l. c.* 263.—Angola.
minuta *A. Cheval. in Rev. Bot. Appliq.* 1934, xiv. 43.—Guinea Gall.
multinodis *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1935, 308.—Sierra Leone.
parviflora *Hackel in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, lii. 191.—Congo Lusit.
purpurea *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1935, 308.—Guinea Gall.
spicata *Pilger ex Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. 1. Anhang, 89 (1930).—Cameroons; Tanganyika Terr.
tristachyoides (*Trin.*) *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1935, 309: Panicum tristachyoides.

TRISTAGMA Poepp. (Liliac.).
Ameghinoi (*Speg.*) *Speg. in An. Mus. Buenos Aires*, vii. 172 (1902): Brodiaea Ameghinoi.

TRISTANIA R. Br. (Myrtac.).
polyandra *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 5.—N. Caled.

TRISTANIOPSIS Brongn. & Gris (Myrtac.).
undulata *Panch. ex Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 5, in syn.: T. capitulata.

TRISTELLATEIA Thou. (Malpighiac.).
cynanchoides *Chiov. Fl. Somala*, II. 44 (1932).—Somal. Ital.

TRISTEMMA Juss. (Melastomatac.).
controversum *A. Cheval. & Jacques-Félix in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 681.—Guinea Gall.
Kassnerianum *Kraenzl. in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 148.—Congo Belg.
leucanthum *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 754 (1921), in obs.—Cameroons.
Mildbraedii *Gilg, l. c.* 755, in obs.—Fernando Po.
monanthum *Gilg, l. c.* 754, in obs.—Cameroons.
montanum *Gilg & Lederm. l. c.*, in obs.—Cameroons.
radicans *Gilg, l. c.*, in obs.—Fernando Po.
Schellenbergianum *Gilg, l. c.* 755, in obs.—Cameroons.

TRISTICHA Thou. (Podostemac.).
alternifolia *Thou. ex Roem. & Schult. Syst. Veg.* i. 50 (1817), in syn.: Dufourea alternifolia.

TRITHECANTHERA Van Tiegh. (Loranthac.).
Scortechinii (*King*) *Danser in Verh. Akad. Wetensch. Amst. Afd. Natuurk.* Sect. II. xxix. No. 6, 128 (1933): Loranthus Scortechinii.
superba *Danser in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1934, xxxi. 245.—Borneo.

TRITICUM L. (Gramin.).
armeniacum (*Stolet.*) *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 683 (1934): T. dicoccum f. armeniacum.
breviaristatum *H. Lindb. Itin. Mediterr. (Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 17 (1932), in syn.: Haynaldia breviaristata.
carthlicum *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 685 (1934): T. persicum *Vavilov*.
× Hackelii *Druce ex Vachell in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1933, x. 743 (1934).—Cambria.
Macha *Dekaprel. & Menabde in Bull. Applied Bot., Leningrad*, Ser. V. No. 1, pp. 14, 38 (1932).—Transcaucas.
maurorum *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 135 [1933], nomen.—Marocc.
persicum *Vavilov in Ann. Acad. Petrovsk.* 1–4, 177 (1919), nomen; cf. *Komarov, Fl. URSS*, ii. 685 (1934); *Zhuk. in Bull. Appl. Bot., Petrograd*, 1922–3, xiii. No. 1, 46 (1923), descr.—Transcaucas.
spontaneum *Flaksb. in Cult. Fl. SSSR*, ed. *Vavilov & Wulff*, 1. (*Cereals: Wheat*) 33, in clavi, 339 (1935).—Eur. austr.-or.; As. austr.-occ.
variabile (*Eig*) *Markgraf in Fedde, Repert. Beih.* xxx. III. 225 (1932): Aegilops variabilis.
Vavilovi (*Tuman.*) *Jakubz. in Sotzialist. Rast.* No. 7, 222 (1933); cf. *Flaksb. in Cult. Fl. SSSR*, ed. *Vavilov & Wulff*, 1. (*Cereals: Wheat*) 47, 48 (1935); *Jakubz. in Priroda* (*Nature*) No. 11, 72 (1933); *Zhuk. Turq. Agric.* (*Part. Asiat.—Anatolie*) 705, 805 (1933): T. vulgare var. Vavilovi.

TRITICUM:—
volgense (*Flaksb.*) *Nevski in Komarov, Fl. URSS*, ii. 683 (1934): T. dicoccum f. volgense.

TRITOMA Ker-Gawl. (Liliac.).
praecox *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1077 (1895), in syn.: Kniphofia praecox.

TRITONIA Ker-Gawl. (Iridac.).
chrysantha *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 77 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
parvula *N. E. Brown in Kew Bull.* 1931, 452.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Pottsii (*Baker*) *Baker in Bot. Mag.* t. 6722 (1883): Montbretia Pottsii.

TRIUMFETTA L. (Tiliac.).
boyacana *Moldenke in Phytologia*, i. 10 (1933).—Colomb.
brevipetiolata *De Wild. in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxi. 203 (1932).—Congo Belg.
cupricola *De Wild. l. c.* 206.—Congo Belg.
Elskensi *De Wild. l. c.* 209.—Congo Belg.
likasiensis *De Wild. l. c.* 212.—Congo Belg.
Mearnsi *De Wild. l. c.* 215.—Kenya Col.
multipliciforma *De Wild. l. c.* 217.—Congo Belg.
palmatiloba *Dunkley in Kew Bull.* 1933, 170.—N. Rhodesia.
rectaculeata *Alston in Trimen, Handbook Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 33 (1931): T. tomentosa.
Robynsi *De Wild. in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxi. 231 (1932).—Congo Belg.
ruhengerensis *De Wild. l. c.* 232.—Congo Belg.
Schunkei *Macbride in Candollea*, v. 381 (1934).—Peruv.
tricuspidatifolia *De Wild. in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxi. 236 (1932).—Congo Belg.
Vermoeseni *De Wild. l. c.* 237.—Congo Belg.
Wittei *De Wild. l. c.* 239.—Congo Belg.

TRIXIS P. Br. (Compos.).
denticulata *Dusén ex Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 117 (1933).—Bras. (Paraná).
thyrsoidea *Dusén ex Malme, l. c.* 116.—Bras. (Paraná).

TROCHISCUS O. E. Schulz in Engl. Jahrb. lxvi. 94 (1933). *CRUCIFERAE.*
cochlearioides (*Roth*) *O. E. Schulz, l. c.*, in obs.: Alyssum cochlearioides.

TROCHOMERIA Hook. f. (Cucurbitac.).
Harmsiana *Bullock in Kew Bull.* 1932, 490.—Afr. trop. or. (Elgon).

TROLLIUS L. (Ranunculac.).
× cultorum *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 566 (1924).—Hort.
giganteus *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 22 (1894), in syn.: T. europaeus.
micranthus *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 268 (1931).—China (Yunnan).
vaginatus *Hand.-Mazz. l. c.* 267.—China (Yunnan).

TROPAEOLUM L. (Tropaeolac.; Geraniac., Gen. Pl.).
chilense *Bert. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 524 (1833); *Colla in Mem. Accad. Torin.* xxxvii. 47 (1834).—Chile.
glaucum *Heilb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 9, p. 4 (1931).—Ecuador.
longiflorum *Killip in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1934, xxiv. 48.—Peruv.
purpureum *Killip, l. c.*—Peruv.
repandum *Heilb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 9, p. 5 (1931).—Ecuador.
septemlobatum *Heilb. l. c.* p. 9.—Ecuador.

TROPIDIA Lindl. (Orchidac.).
Bellii *Blatter & McCann in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxv. 730 (1932).—Ind. or. (Bombay).

TRUKIA Kanehira in Bot. Mag., Tokyo, 1935, xlix. 278. *RUBIACEAE.*
megacarpa (*Kanehira*) *Kanehira, l. c.* 279: Timonius megacarpus.

TRYMATOCOCCUS Poepp. & Endl. (Morac.; Urticac., Gen. Pl.).
oligandrus (*Benoist*) *Lanj. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* 1935, xxxii. 271: Lanessania oligandra.

TRYMATOCOCCUS:—
parvifolius *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 27 (1915), in obs.—Tanganyika Terr.

TRYPHOSTEMMA Harv. (Passiflorac.).
Friesii *Norlindh in Bot. Notiser*, 1934, 107.—Rhodesia.
latilobum *Harms ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 599 (1921), in obs.—Tanganyika Terr.

TSUGA Carr. (Pinac.; Conif., Gen. Pl.).
chinensis (*Franch.*) *Pritzel apud Diels in Engl. Jahrb.* xxix. 217 (1900): Abies chinensis.
longibracteata *Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., vii. 1 (1932).—China (Kweichau).
macrocarpa *Lemmon in Pacific Rural Press*, Feb. 8th (1879); *Lemmon in Sierra Cl. Bull.* ii. 162 (1898), in adnot.—U.S.A. (Calif.).

TULBAGIA L. (Liliac.).
fragrans *Verdoorn in Pl. Pl. S. Afr.* 1931, xi. t. 438.—Transvaal.

TULIPA L. (Liliac.).
anisophylla *Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xxi. 147 (1935).—As. centr.
bifloriformis *Vved. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 358 (1935).—As. centr.
carinata *Vved. l. c.* 332.—As. centr.
cypria *Stapf apud Turrill in Bot. Mag.* t. 9363 (1934).—Cyprus.
dasystemonoides *Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xxi. 147 (1935).—As. centr.
dubia *Vved. l. c.* 148.—As. centr.
Dykesiana *Vved. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 348 (1935), in obs.: T. Hoeltzeri *Dykes, Notes Tulip Sp.* 74 (1930), non T. triphylla var. Hoeltzeri *Regel*.
ferganica *Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xxi. 148 (1935).—As. centr.
Fernandezii *Blatter in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxvii. 420 (1934).—Ind. or. (Waziristan).
Hayatii *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxvi. 69 (1934).—As. Min. (Lydia).
hellespontica *Árpád in Magyar Bot. Lap.* 1933, xxxii. 145.—Thracia.
hissarica *Popov & Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xxi. 149 (1935).—As. centr.
karatavica (*Regel*) *Vved. ex Lipschitz in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 733 (1932), in obs.: T. altaica var. karatavica.
Korshinskyi *Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xxi. 149 (1935).—As. centr.
Krauseana *Regel*; *Lipschitz in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 734, 735 (1932), descr. ampl.—Ross. asiat. (Kasakstan).
kuschkensis *B. Fedtsch. in Engl. Jahrb.* I. Suppl., 612 (1914), nomen; *B. Fedtsch. Rastit. Turkest.* 242 (1915), in clavi; *Sealy in Bot. Mag.* t. 9370 (1934), descr.—Turkestan. Ross.
Lipskyi *Grossheim, Fl. Kavkaza*, i. 223 (1928).—Caucas.
mogoltavica *Popov & Vved. ex Vved. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 335 (1935).—As. centr.
orithyioides *Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xxi. 150 (1935).—As. centr.
paradasystemon *Vved. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 362 (1935), in obs.—Hab. ?
platystemon *Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xxi. 150 (1935).—As. centr.
porphyreo-chrysantha *Blatter in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxvii. 421 (1934).—Ind. or. (Waziristan).
rosea *Vved. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 343 (1935).—As. centr.
sharonensis *Dinsm. in Post, Fl. Syria, Palest. & Sinai*, ed. 2, ii. 621 (1933); *Dinsm. Pl. Post. & Dinsm.* Fasc. 11. 12 (1934) (*Publ. Am. Univ. Beirut*, Nat. Sc. Ser. No. 1 et No. 3).—Palaest.
Stapfii *Turrill in Bot. Mag.* t. 9356 (1934): T. cuspidata *Stapf*.
subpraestans *Vved. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 334 (1935).—As. centr.
tarda *Stapf in Bot. Mag.* t. 9321 (1933).—Turkestan. ?
turcomanica *B. Fedtsch. in B. Fedtsch. et al., Fl. Turkm.* i. 306 (1932).—Transcasp.

TULIPA:—
urumiensis *Stapf in Bot. Mag.* t. 9288 (1932).—Persia.
Zenaidae *Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xxi. 150 (1935).—As. centr.

TULOTIS Rafin. Herb. Rafinesq. 70 (1833). *ORCHIDACEAE*.
albiflora *Rafin. l. c.* 71.—U.S.A. (N. Hampshire).
fragrans (*Rafin.*) *Rafin. l. c.*: Orchis fragrans.
herbiola (*R. Br.*) *Rafin. l. c.*: Habenaria herbiola.
parviflora *Rafin. l. c.*—U.S.A. (Carolina).

TUNGA Roxb. Fl. Ind., ed. Carey & Wall., i. 187 (1820); Fl. Ind., ed. Carey, i. 183 (1832). *CYPERACEAE*.
diandra *Roxb. l. c.* 188; *et l. c.* 184.—Ins. Molucc. (Amboina).
laevigata *Roxb. l. c.*; *et l. c.* 183.—Ind. or.
triceps *Roxb. l. c.* 187; *et l. c.*—Ind. or.

TUNICA Scop. (Caryophyllac.).
rhiphaea *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1929, No. 147 [1930].—Marocc.

TUPISTRA Ker-Gawl. (Liliac.).
tupistroides (*Kunth*) *Dandy in Journ. Bot.* 1932, lxx. 329: Macrostigma tupistroides.

TURNERA L. (Turnerac.).
hispidissima *Colla, Herb. Pedem.* ii. 454 (1834).—Bras.
Luetzelburgii *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 70 (1934).—Bras. (Bahia).
luminosa *Macbride in Candollea*, vi. 12 (1934).—Peruv.
Martii *Colla, Herb. Pedem.* ii. 454 (1834).—Bras.
scabra *Suesseng in Fedde, Repert.* xxxix. 16 (1935).—Bras. (Parahyba).
tortuosa *Colla, Herb. Pedem.* ii. 455 (1834).—Bras.

TURPINIA Vent. (Staphyleac.; Sapindac., Gen. Pl.).
glaberrima *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* vii. 312 (1931).—China (Kwangtung).
sambucifolia *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3217 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
unifoliata *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 37 (1934).—China (Hainan).

TURRAEA L. (Meliac.).
Lamyi *Bonnet ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 815 (1915), in obs.—Congo Gall.
oblancifolia *Bremek. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 245 (1933).—Transvaal.
parviflora *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 813 (1915), in obs., sphalm.: T. parvifolia *Deflers ex C. DC.*
Schliebenii *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1070 (1934).—Tanganyika Terr.

TUTCHERIA Dunn (Theac.).
multisepala *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 41 (1934).—China (Hainan).

TYLERIA Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl. 1931, lviii. 391. *OCHNACEAE*.
floribunda *Gleason, l. c.* 392.—Venez.
grandiflora *Gleason, l. c.* 393.—Venez.
linearis *Gleason, l. c.*—Venez.
spathulata *Gleason, l. c.* 394.—Venez.

TYLEROPAPPUS Greenm. in Bull. Torr. Bot. Cl. 1931, lviii. 486. *COMPOSITAE*.
dichotomus *Greenm. l. c.*—Venez.

TYLOPHORA R. Br. (Asclepiadac.).
albiflora (*Franch. & Sav.*) *Makino in Journ. Jap. Bot.* viii. 40 (1933): T. japonica var. albiflora.
aneityensis *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 21.—N. Hebrides.
arenicola *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 69 (1934).—China (Hainan).
atrofolliculata *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* xi. 265 (1932).—China (Hainan).
auriculata (*Franch. & Sav.*) *Makino in Journ. Jap. Bot.* viii. 40 (1933): Vincetoxicum sublanceolatum var. auriculatum.
calcicola *M. R. Henderson in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 111 (1933).—Penins. Mal.
Chungii *Merrill ex Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* xi. 264 (1932).—China (Fokien; Chekiang).

TYLOPHORA:—
cordata (*Thunb.*) *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 82 (1932): Apocynum cordatum.
Deightonii *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 59 (1931).—Sierra Leone.
Dickinsii (*Franch. & Sav.*) *Makino in Journ. Jap. Bot.* viii. 40 (1933): Vincetoxicum sublanceolatum var. Dickinsii.
Koi *Merrill in Sunyatsenia*, ii. 17 (1934).—China (Kwangtung).
Lugardae *Bullock in Kew Bull.* 1932, 496.—Afr. trop. or. (Elgon).
macrantha (*Maxim.*) *Makino in Journ. Jap. Bot.* viii. 40 (1933): Vincetoxicum sublanceolatum var. macranthum.
minutiflora *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 272 (1917).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
minutiflora *R. E. Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1934, xxi. 609, non praec.—China (Szechuan).
multiflora (*Wight & Arn.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 195 (1931): Iphisia multiflora.
obtusula (*Franch. & Sav.*) *Makino in Journ. Jap. Bot.* viii. 40 (1933): Vincetoxicum sublanceolatum var. obtusulum.
parvifolia *Robyns & Lebrun in Ann. Soc. Sc. Brux.* lii. Sér. B, 35 (1932).—Congo Belg.
Ridleyi *M. R. Henderson in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 111 (1933): Gymnema flavum.
tannaënsis *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 22.—N. Hebrides.

TYLOSTEMON Engl. (Laurac.).
kenyensis *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 107 (1935).—Kenya Col.

TYNANTHUS Miers (Bignoniac.).
hyacinthinus *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 87 (1935).—Brit. Honduras.

TYPHONIUM Schott (Arac.).
amboinense (*Rumph.*) *Blatter & McCann in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxv. 23 (1931): Arisarum amboinense.
incurvatum *Blatter & McCann, l. c.* 22.—Ind. or. (Bombay).

U

UAPACA Baill. (Euphorbiac.).
albida *De Wild. in Ann. Soc. Sc. Brux.* liii. Sér. B, 57 (1933).—Congo Belg.
angustipyrena *De Wild. l. c.* lii. Sér. B, 205 (1932).—Congo Belg.
brevipedunculata *De Wild. l. c.* liii. Sér. B, 145 (1933).—Congo Belg.
dubia *De Wild. l. c.* 307.—Congo Belg.
esculenta *A. Cheval. ex Aubrév. & Léandri in Bull. Soc. Bot. France*, 1935, lxxxii. 52.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
katentaniensis *De Wild. in Ann. Soc. Sc. Brux.* liii. Sér. B, 58 (1933).—Congo Belg.
Kibuati *De Wild. l. c.* 309.—Congo Belg.
Lebruni *De Wild. l. c.* 146.—Congo Belg.
Le-Testuana *A. Cheval. Vég. Ut. Afr. Trop. Franç.* ix. 304 (1917); *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 297 (1917).—Gabon.
munamensis *De Wild. in Ann. Soc. Sc. Brux.* lii. Sér. B, 206 (1932).—Congo Belg.
neo-Masuku *De Wild. l. c.* 208.—Congo Belg.
paludosa *Aubrév. & Léandri in Bull. Soc. Bot. France*, 1935, lxxxii. 50.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
Robynsi *De Wild. in Ann. Soc. Sc. Brux.* liii. Sér. B, 60 (1933).—Congo Belg.
Samfi *De Wild. l. c.* 310.—Congo Belg.
Somon *Aubrév. & Léandri in Bull. Soc. Bot. France*, 1935, lxxxii. 50.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
verruculosa *De Wild. in Ann. Soc. Sc. Brux.* liii. Sér. B, 148 (1933).—Congo Belg.

UBIUM J. F. Gmel. (Dioscoreac.).
scandens *J. St.-Hil. Expos. Fam. Nat.* i. 106 (1805).—Ind. or.

UDORA Nutt. (Hydrocharitac.).
surinamensis *Miq. ex M. R. Schomb. Reisen Brit.-Guiana*, iii. 900 (1848), nomen.—Guiana Brit.

UGNI Turcz. (Myrtac.).
Ugni (*Mol.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 315 (1894): Myrtus Ugni.

UHDEA Kunth (Compos.).
pyramidalis *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 478 (1894), in syn.: Eriocoma tomentosa.

ULEX L. (Legumin.).
Ceballosi (*Vicioso*) *Pau in Cavanillesia*, v. 43 (1932): Nepa Ceballosi.
Mauritii *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 28 [1933], nomen.—Marocc.
Maximiliani *Sennen & Mauricio, l. c.*, nomen.—Marocc.
microclada *Sennen & Mauricio, l. c.*, nomen.—Marocc.
tazensis (*Braun-Blanquet & Maire*) *Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc.* 1927, No. 282 [1928]: U. Boivinii var. tazensis.
Vidali *Pau in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1925, xxv. 124.—Marocc.

ULMARRONIA Friesen in Bull. Soc. Bot. Genève, 1931–2, Sér. II. xxiv. 143 (1933). *BORAGINACEAE.*
corymbosa (*L.*) *Friesen, l. c.*: Lantana corymbosa.
crenata (*Ruiz & Pav.*) *Friesen, l. c.* 180: Varronia crenata.
dichotoma (*Ruiz & Pav.*) *Friesen, l. c.* 181: Varronia dichotoma.
lanceolata (*Desv.*) *Friesen, l. c.*: Varronia lanceolata.
lima (*Desv.*) *Friesen, l. c.* 182: Varronia lima.
mariquitensis (*H. B. & K.*) *Friesen, l. c.* 181: Cordia mariquitensis.
patens (*H. B. & K.*) *Friesen, l. c.*: Cordia patens.
serratifolia (*Cham.*) *Friesen, l. c.* 148, in obs.: Cordia serratifolia.

ULMUS L. (Ulmac.; Urticac., Gen. Pl.).
anglica *Druce, Comit. Fl. Brit. Isles*, 266 (1932): U. sativa *Mill.*
belgica *Burgsd. ex Rehder in L. H. Bailey, Standard Cycl. Hort.* vi. 3412 (1917), in syn.: U. hollandica var. belgica *Rehder.*
coreana *Nakai, Fl. Sylvat. Koreana*, xix. 31 (1932).—Corea.
elegantissima *Horwood in Horwood & Noel, Fl. Leicestershire & Rutland*, 482 (1933).—Anglia.
integrifolia *Roxb. Pl. Coromandel*, i. 56 (1795).—Ind. or. (Madras).
macrophylla *Nakai, Fl. Sylvat. Koreana*, xix. 15 (1932).—Corea.
manshurica *Nakai, l. c.* 22.—As. bor.-or.

UMBILICUS DC. (Crassulac.).
ferganicus *Popov in Trav. Turkest. Univ., Tashkent*, No. 4 (*Vég. Monts Sary-Taou, etc.*) 51 (1922), in syn.: Cotyledon ferganica.

UNCARIA Schreb. (Rubiac.).
acida *Hunter in Roxb. Hort. Beng.* 86 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 129 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 520 (1832).—Penins. Mal.
angolensis (*Haviland*) *Welw. ex Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 99 (1931): U. africana var. angolensis.
brevicarpa *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3270 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).
bulusanensis *Elmer, l. c.* 3271.—Ins. Philipp. (Luzon).
cirrhiflora *Roxb. Hort. Beng.* 86 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 129 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 520 (1832).—Arch. Mal.
glaucescens *Craib in Kew Bull.* 1931, 210.—Siam.
korrensis *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 924.—Ins. Palau.
lanosa *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 131 (1824).—Penins. Mal.
macrophylla *Wall. l. c.* 132.—Ind. or. (Assam).
oligoneura *Korth. in Temminck, Verh. Nat. Gesch. Nederl. Overz. Bezitt., Bot.* 171 (1839–42), in obs.—Borneo.
orientalis *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 1.—N. Hebrides.

UNCARIA:—
ovalifolia *Roxb. Hort. Beng.* 86 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 128 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 519 (1832).—Penins. Mal.
pedicellata *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.*; *et l. c.* 520.—Ins. Molucc.
pilosa *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 130; *et l. c.*—Ind. or. (Bengal).
sclerophylla *Hunter in Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.*; *et l. c.*—Penins. Mal.
sessilifructus *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.*; *et l. c.*—Ind. or. (Bengal).

UNGERNIA Bunge (Amaryllidac.).
ferganica *Vved. in Komarov, Fl. URSS*, iv. 484 (1935).—As. centr.
minor *Vved. l. c.*—Asia.
tadshikorum *Vved. l. c.* 483.—As. centr.
Victoris *Vved. l. c.*—As. centr.

UNIFOLIUM Zinn, Cat. Pl. Gott. 104 (1757); cf. Sprague in Kew Bull. 1934, 219: **Maianthemum** Weber (Liliac.), nomen conservandum.

UNONA L. f. (Annonac.).
Lecardii *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 690.—N. Caled.
Stuhlmannii *Engl. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C. 179 (1895).—Tanganyika Terr.
tiebaghiensis *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 161.—N. Caled.

UNONOPSIS R. E. Fries (Annonac.).
leiophylla *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 80 (1931).—Venez.; Colomb.; Bras.

URAGOGA Baill. (Rubiac.).
biaurita (*A. Cheval.*) *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 127, in clavi, 128 (1931): Psychotria biaurita.
cyrtandroides *Hochr. in Candollea*, v. 271 (1934).—Samoa.
Giorgii *De Wild. in De Wild. & Staner, Contrib. Fl. Katanga*, Suppl. iv. 97 (1932).—Congo Belg.
Homblei *De Wild. l. c.* 96.—Congo Belg.
Klainei *De Wild. in Ann. Soc. Sc. Brux.* lv. Sér. B, 48 (1935).—Gabon.
Le-Testui *De Wild. l. c.* 51.—Gabon.
Mannii (*Benth. & Hook. f.*) *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 127 (1931): Cephaëlis Mannii.
mayumbensis *De Wild. in Ann. Soc. Sc. Brux.* lv. Sér. B, 52 (1935).—Congo Gall.
Parkeri *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxxvi. (*Hist. Nat. Pl.* vi. Atlas, iv.) t. 426 (1897).—Madag.
retiphlebia *Drake, l. c.* t. 428.—Madag.
Sapini *De Wild. in De Wild. & Staner, Contrib. Fl. Katanga*, Suppl. iv. 98 (1932).—Congo Belg.
spathacea (*Hiern*) *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 127, in clavi, 128 (1931): Cephaëlis spathacea.
ternifolia *Drake in Grandidier, Hist. Pl. Madag.* xxxvi. (*Hist. Nat. Pl.* vi. Atlas, iv.) t. 427 (1897).—Madag.
Tholloni *De Wild. in Ann. Soc. Sc. Brux.* lv. Sér. B, 53 (1935).—Congo Gall.; Congo Belg.

URANDRA Thwait. (Icacinac.; Olacac., Gen. Pl.).
Ammui *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1931, xlv. 293: U. elliptica *Schellenb.*

URARIA Desv. (Legumin.).
aequilobata *Hosokawa in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 202.—Hongkong; Formosa.

URCEOLA Roxb. (Apocynac.).
longisepala *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 188 (1934).—Sumatra.
montana *M. R. Henderson in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 108 (1933).—Penins. Mal.

URCEOLINA Reichb. (Amaryllidac.).
peruviana (*C. Presl*) *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 11 (1931): Sphaerotele peruviana.
urceolata (*Ruiz & Pav.*) *Macbride, l. c.* 12: Crinum urceolatum.

URERA Gaudich. (Urticac.).
Braunii *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 53 (1915), in obs.—Tanganyika Terr.

URERA:—
crenulata *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 53 (1915), in obs.—Kenya Col.; Tanganyika Terr.
Fischeri *Engl. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C. 162 (1895).—Tanganyika Terr.
robusta *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 301 (1917).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
sansibarica *Engl. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C. 162 (1895).—Zanzibar.
sarmentosa *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 302 (1917).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).

URGINEA Steinh. (Liliac.).
aurantiaca *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 34 (1932).—Marocc.
gracilis *A. Duthie in Ann. Univ. Stellenb.* 1928, vi. Sect. A, No. 2, 12.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Langi *Bremek. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 237 (1933).—Transvaal.
minor *A. Duthie in Ann. Univ. Stellenb.* 1928, vi. Sect. A, No. 2, 11.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Muirii *N. E. Brown in Gard. Chron.* 1933, Ser. III. xciii. 334.—Afr. austr. (Cape Prov.).
polyantha *Blatter & McCann in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xxxii. 735 (1928).—Ind. or. (Bombay).
porphyrantha *Bullock in Kew Bull.* 1932, 505.—Afr. trop. or. (Elgon).
pygmaea *A. Duthie in Ann. Univ. Stellenb.* 1928, vi. Sect. A, No. 2, 10.—Afr. austr. (Cape Prov.).
revoluta *A. Duthie, l. c.* 9.—Afr. austr. (Cape Prov.).
somalensis *Chiov. Fl. Somala*, II. 427 (1932).—Somal. Ital.
unifolia *A. Duthie in Ann. Univ. Stellenb.* 1928, vi. Sect. A, No. 2, 8.—Afr. austr. (Cape Prov.).
volubilis *H. Perrier in Lecomte, Not. Syst.* v. 65 (1935).—Madag.

UROCHLOA Beauv. (Gramin.).
geniculata *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1933, 499.—Tanganyika Terr.
lata (*Schumacher*) *C. E. Hubbard, l. c.* 1934, 112: Panicum latum.
mosambicensis (*Hackel*) *Dandy in Journ. Bot.* 1931, lxix. 54: Panicum mosambicense.
novemnervia *C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1933, 500.—Tanganyika Terr.
platyrrhachis *C. E. Hubbard, l. c.* 1934, 112.—Congo Belg.
rhodesiensis *Stent in Proc. Rhodes. Scientif. Assoc.* xxxii. (*Stent & Rattray, Grasses S. Rhodes.*) 26 (1933).—S. Rhodesia.

UROGENTIAS Gilg & Gilg-Benedict in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xi. 944 (1933). *GENTIANACEAE.*
ulugurensis *Gilg & Gilg-Benedict, l. c.*—Tanganyika Terr.

UROPHYLLUM Jack ex Wall. in Roxb. Fl. Ind., ed. Carey & Wall., ii. 184 (1824). *RUBIACEAE.*
aequale *Craib in Kew Bull.* 1931, 444.—Siam.
borneënse *Miq.*; *Ridley in Journ. Bot.* 1932, lxx. 223, descr. ampl.—Borneo.
bracteolatum *Ridley, l. c.* 221.—Borneo.
bullatum *Ridley, l. c.* 195.—Borneo.
canthiiflorum (*Hook. f.*) *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 104 (1931): Pauridiantha canthiiflora.
capituligerum *Ridley in Journ. Bot.* 1932, lxx. 222.—Borneo.
castaneum *Ridley, l. c.* 220.—Borneo.
cephalotes *Ridley, l. c.* 222.—Borneo.
chinense *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 19 (1934).—China (Kwangtung).
congestiflorum *Ridley in Journ. Bot.* 1932, lxx. 224.—Borneo.
crassum *Craib in Kew Bull.* 1931, 445.—Siam.
Creaghii *Ridley in Journ. Bot.* 1932, lxx. 193.—Borneo.
enneandrum (*Wight*) *Ridley, l. c.*: Axanthes enneandra.
fuscum *Craib in Kew Bull.* 1931, 446.—Siam.
glabrum *Jack ex Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 186 (1824).—Penins. Mal.

UROPHYLLUM:—
Havilandii *Ridley in Journ. Bot.* 1932, lxx. 194.—Borneo.
insculptum *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 104 (1931).—Nigeria.
leucophlaeum *Ridley in Journ. Bot.* 1932, lxx. 196: U. coriaceum *Ridley*.
Linderi *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 104 (1931).—Liberia.
longipes *Craib in Kew Bull.* 1931, 446.—Siam.
longipetalum *Ridley in Journ. Bot.* 1932, lxx. 193.—Borneo.
Lowei *Ridley, l. c.* 195.—Borneo.
melanocarpum *Ridley, l. c.* 226.—Borneo.
Motleyi *Ridley, l. c.* 225.—Borneo.
neriifolium *Ridley, l. c.*—Borneo.
oblongum *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 84 (1932); *Craib in Kew Bull.* 1932, 276, descr. ampl.—Siam.
olivaceum *Craib in Kew Bull.* 1931, 447.—Siam.
paniculatum *Ridley in Journ. Bot.* 1932, lxx. 223.—Borneo.
Pellacalyx *Ridley, l. c.* 194.—Borneo.
pilosum *Ridley, l. c.* 219.—Borneo.
rigidum *Ridley, l. c.* 196.—Penins. Mal.
salicifolium *Stapf*; *Ridley, l. c.* 225, descr. ampl.—Borneo.
sericeum *Ridley, l. c.* 221.—Sumatra; Java; Borneo.
Shelfordii *Ridley, l. c.* 197.—Borneo.
stipulosum *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 104 (1931).—Liberia.
sumatranum *Ridley in Journ. Bot.* 1932, lxx. 197.—Sumatra.
sylvicola *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 103, in clavi, 104 (1931).—Liberia.
talangense *Craib in Kew Bull.* 1931, 447.—Siam.
villosum *Jack ex Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 185 (1824).—Penins. Mal.
vulcanicum *Ridley in Journ. Bot.* 1932, lxx. 224.—Sumatra.
Yatesii *Ridley, l. c.* 220.—Sumatra.

UROSPATHA Schott (Arac.).
angusta *K. Krause in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 616 (1932).—Peruv.

UROSTELMA Bunge (Asclepiadac.).
Ikema *Sieb. Cat.* ii. 47 (1863), nomen; cf. *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 122, in adnot.—Hab.?

URSINIA Gaertn. (Compos.).
argentea *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 326 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
frutescens *Dinter in Fedde, Repert.* xxx. 91 (1932).—Great Namaq.

URTICA L. (Urticac.).
fragilis *J. Thiéb. in Bull. Soc. Bot. France*, 1935, lxxxii. 192.—Libanus.
Nepa *Hort. ex Colla, Herb. Pedem.* v. 155 (1836), in obs.—Hab.?
Takedana *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 129: U. platyphylla *Wedd.*

URTICASTRUM Fabricius (Urticac.).
crenulatum (*Roxb.*) *Lyons, Plant Names Scientific & Popular*, 385 (1900), in obs.: Urtica crenulata.
ferox (*Blanco*) *Lyons, l. c.*, in obs.: Urtica ferox.

URVILLEA H. B. & K. (Sapindac.).
obtusifolia *Fourn. ex Radlk. in Engl. Pflanzenreich, Sapindac.* 359 (1932), in syn.: U. ulmacea.

USTERIA Medik. (Liliac.).
non-scripta (*L.*) *Chouard in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 625, in obs.: Hyacinthus non-scriptus.

UTRICULARIA L. (Lentibulariac.).
alutacea *Tutin in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 313.—Guiana Brit.
appendiculata *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1933, 475.—Tanganyika Terr.
arenicola *Tutin in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 312.—Guiana Brit.
arrojadensis *Merl ex Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste Braz.* iii. 222 (1923) [*Insp. Fed. Obras Secc.* Publ. 57], nomen; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 151.—Bras. (Bahia).
biflora *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 144 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 143 (1832).—Ind. or. (Bengal).

UTRICULARIA:—
bramadensis *Merl ex Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste Braz.* iii. 222 (1923) [*Insp. Fed. Obras Secc.* Publ. 57], nomen; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 151.—Bras. (Bahia).
butanensis *Merl ex Luetzelb. l. c.* 219, nomen; *et l. c.*—Bras. (S. Paulo).
dissectifolia *Merl ex Luetzelb. l. c.* 221, nomen; *et l. c.*—Bras. (Bahia).
equiseticaulis *Blatter & McCann in Journ. Ind. Bot. Soc.* 1931, x. 122.—Ind. or. (Bombay).
exigua *Merl ex Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste Braz.* iii. 221 (1923) [*Insp. Fed. Obras Secc.* Publ. 57], nomen; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 151.—Bras. (Bahia; Goyaz).
fasciculata *Roxb. Hort. Beng.* 4 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 143 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 143 (1832).—Ind. or. (Bengal).
Goebelii *Merl ex Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste Braz.* iii. 220 (1923) [*Insp. Fed. Obras Secc.* Publ. 57], nomen; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 151—Bras. (Bahia).
graniticola *A. Cheval. & Pellegr. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 276 (1917).—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
jaquatibensis *Merl ex Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste Braz.* iii. 222 (1923) [*Insp. Fed. Obras Secc.* Publ. 57], nomen; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 151.—Bras. (Espirito Santo).
kalmaloënsis *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 588.—N. Nigeria.
kimberleyensis *C. A. Gardner in For. Dep. Bull., W. Austral.* No. 32, 90 (1923).—W. Austral.
Lloydii *Merl in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1934, lxi. 370.—Bras. (Minas Geraes).
Luetzelburgii *Merl ex Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste Braz.* iii. 219 (1923) [*Insp. Fed. Obras Secc.* Publ. 57], nomen; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 151.—Bras. (Goyaz; Bahia).
marcelliana *Merl ex Luetzelb. l. c.* 221, nomen; *et l. c.*—Bras. (Bahia).
obsoleta *Merl ex Luetzelb. l. c.*, nomen.; *et l. c.*—Bras. (Piauhy).
ogmosperma *Blatter & McCann in Journ. Ind. Bot. Soc.* 1931, x. 123.—Ind. or. (Bombay).
peltatifolia *A. Cheval. & Pellegr. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 276 (1917).—Afr. trop.
Rendlei *F. E. Lloyd in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 42.—N. Rhodesia.
rotundifolia *Merl ex Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste Braz.* iii. 221 (1923) [*Insp. Fed. Obras Secc.* Publ. 57], nomen; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 151.—Bras. (Bahia).
rubricaulis *Tutin in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 312.—Guiana Brit.
saccata *Merl ex Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste Braz.* iii. 221 (1923) [*Insp. Fed. Obras Secc.* Publ. 57], nomen; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 151.—Bras. (Piauhy).
saudadensis *Merl ex Luetzelb. l. c.* 222, nomen; *et l. c.*—Bras.
sciaphila *Tutin in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 333.—Guiana Brit.
taikankoënsis *Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1931, iii. 241.—Formosa.
tenuicaulis *Miki in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 847.—Japon. (Hondo).
tenuissima *Tutin in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 334.—Guiana Brit.
tinguensis *Merl ex Luetzelb. Estud. Bot. Nordéste Braz.* iii. 219 (1923) [*Insp. Fed. Obras Secc.* Publ. 57], nomen; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 151.—Bras. (Bahia).
violacea *Barton, Fl. Virg.* 6 (1812); cf. *Pennell in Bartonia*, 1925–6, No. 9, 29 (1926).—U.S.A. (Virginia).
yakusimensis *Masamune in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* xi. Bot. No. 4, 409 (1934).—Ins. Liukiu (Yakushima).

UVARIA L. (Annonac.).
Balansaeana *Baill. ex Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 689, nomen.—N. Caled.
Caillei *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 49, in clavi, 50 (1927).—Guinea Gall.

UVARIA:—
echinata *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 50 (1927), in syn.: U. cristata.
Engleriana *Exell in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. Suppl., 4, in adnot.: U. verrucosa *Engl. & Diels.*
Hoffmanniana *Baill. ex R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* x. 13 (1930), in obs., pro syn.: Sapranthus Palanga.
Johannis *Exell in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. Suppl., 2.—Congo Lusit.
Macclurei *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 73 (1931).—China (Hainan).
microphylla *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 50 (1927), in syn.: U. ovata.
microstyla *Chiov. Fl. Somala*, II. 1 (1932).—Somal. Ital.
Palanga *Oerst. ex R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* x. 13 (1930), in obs., pro syn.: Sapranthus Palanga.
pecoënsis *Exell in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. Suppl., 2.—Congo Lusit.
Petelotii *Exell, l. c.* 1932, lxx. 104.—Indo-China (Tonkin).
scaberrima *Exell, l. c.* 1935, lxxiii. Suppl., 3.—Angola.
speciosa *Poepp. ex R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* x. 183 (1931), in obs., nomen.—Peruv.
spectabilis *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 47, in clavi, 50 (1927).—Guinea Gall.; Côte d'Ivoire.
tortilis *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, l. c.* 49, in clavi, 50.—Afr. trop. (Côte d'Ivoire).
ugandensis (*Bagshawe & E. G. Baker*) *Exell in Journ. Bot.* 1932, lxx. 105: Meiocarpidium ugandense.

UVARIODENDRON (Engl. & Diels) R. E. Fries in Acta Hort. Berg. x. 51 (1930). *ANNONACEAE.* [Uvaria sect. Uvariodendron Engl. & Diels.]
angustifolium (*Engl. & Diels*) *R. E. Fries, l. c.* 58: Uvaria angustifolia.
calophyllum *R. E. Fries, l. c.* 63.—Cameroons.
connivens (*Benth.*) *R. E. Fries, l. c.* 55: Uvaria connivens.
fuscum (*Benth.*) *R. E. Fries, l. c.* 61: Uvaria fusca.
giganteum (*Engl.*) *R. E. Fries, l. c.* 62: Uvaria gigantea.
Le-Testui (*Pellegr.*) *R. E. Fries, l. c.* 60: Uvaria Le-Testui.
mayumbense (*Exell*) *R. E. Fries, l. c.* 57: Uvaria mayumbensis.
mirabile *R. E. Fries, l. c.* 59.—Cameroons.
molundense (*Diels*) *R. E. Fries, l. c.* 61: Uvaria molundensis.
pycnophyllum (*Diels*) *R. E. Fries, l. c.* 58: Uvaria pycnophylla.
usambarense *R. E. Fries, l. c.* 65.—Tanganyika Terr.

UVARIOPSIS Engl. & Diels; Robyns & Ghesquière in Ann. Soc. Sc. Brux. liii. Sér. B, 314 (1933), descr. emend. *ANNONACEAE.*
Bakeriana (*Hutchinson & Dalziel*) *Robyns & Ghesquière, l. c.* 320: Tetrastemma Bakerianum.
Batesii *Robyns & Ghesquière, l. c.*—Cameroons.
Chevalieri *Robyns & Ghesquière, l. c.* 318.—S. Nigeria.
congensis *Robyns & Ghesquière, l. c.* 317.—Congo Belg.
dioica (*Diels*) *Robyns & Ghesquière, l. c.* 321: Tetrastemma dioicum.
pedunculosa (*Diels*) *Robyns & Ghesquière, l. c.*: Tetrastemma pedunculosum.
sessiliflora (*Mildbr. & Diels*) *Robyns & Ghesquière, l. c.* 322: Tetrastemma sessiliflorum.
Solheidii (*De Wild.*) *Robyns & Ghesquière, l. c.* 321: Tetrastemma Solheidii.
Vanderystii *Robyns & Ghesquière, l. c.* 64.—Congo Belg.

V

VACCINIUM L. (Ericac.; Vacciniac., Gen. Pl.).
adenurum *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1932, 293.—Borneo.
alto-montanum *Ashe in Rhodora*, 1931, xxxiii. 196.—U.S.A. (Tennessee; N. Carolina).

VACCINIUM:—
anfractum *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 110.—Colomb.
arkansanum *Ashe in Rhodora*, 1931, xxxiii. 195.—U.S.A. (Arkansas).
Ashei *Reade in Torreya*, 1931, xxxi. 71.—U.S.A. (S. E. States).
Bartlettii *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 183 (1934).—Sumatra.
Benthamianum *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 110: Anthopterus mucronatus.
berberifolium *Degener, Fl. Hawaiiensis*, Fam. 287 (1934), in syn.: V. berberidifolium.
cercidifolium *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 463 (1935).—Borneo.
crassivenium *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 482 (1935).—China (Kwangsi).
crenatum (*D. Don ex Dunal*) *Sleum. l. c.* 291: Gaylussacia crenata.
dependens (*G. Don*) *Sleum. l. c.*: Gaylussacia dependens.
Dopii *H. F. Copeland in Philipp. Journ. Sc.* 1932, xlvii. 103, in adnot.: V. Petelotii *Dop.*
Endertii *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 462 (1935).—Borneo.
irazuense *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 138 (1934).—Costa Rica.
lanceolatum (*Blume*) *J. J. Smith in Ic. Bogor.* iv. 68 (1910), in obs.: Gaylussacia lanceolata.
loquihense *Dop & Y. Troch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 699: V. Poilanei *Dop.*
missouriense (*Ashe*) *Ashe in Rhodora*, 1931, xxxiii. 193: V. vacillans var. missouriense.
Mjoebergii *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xiii. 461 (1935).—Borneo.
Motosukeanum *Koidz. in Yuhki, Fl. Yamagata-praefect.* 75 (1934); *et in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 149.—Japon.
parvibaccatum *J. J. Smith in Contrib. Arn. Arb.* No. viii. 128 (1934).—Sumatra.
Pennellii *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 111.—Colomb.
pentandrum *Sodiro ex Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 123 (1934), pro syn.: Disterigma pentandrum.
Petelotii *Merrill*; *Dop & Y. Troch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 698, descr. ampl.—Indo-China (Tonkin).
pseudocaracasanum *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 139 (1934).—Peruv.
raiateënse *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 35 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
rapae *Skottsb. in Acta Hort. Gothoburg.* 1933, viii. 96.—Polynes. (Ins. Rapa).
repens (*Léveillé*) *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1934, xv. 283: Pieris repens.
retusifolium *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxx. 176 (1932).—Ins. Molucc. (Buru; Ceram).
sangtavanense *Dop & Y. Troch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 699.—Indo-China (Tonkin).
sericeum (*Mohr*) *Palmer in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 429, in adnot.: V. melanocarpum var. sericeum.
serratum (*Dunal*) *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 139 (1934): Thibaudia serrata.
serum *Ashe in Rhodora*, 1931, xxxiii. 194.—U.S.A. (Maryland; Virginia).
supracostatum *Hand.-Mazz. in Sinensia*, v. 3 (1934).—China (Kwangsi).
symplocifolium (*G. Don*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 176 (1931): Agapetes symplocifolia.
Tatei *Rusby in Phytologia*, i. 71 (1934).—Boliv.
tentaculatum *J. J. Smith in Fedde, Repert.* xxx. 175 (1932).—Ins. Molucc. (Ceram).
thibaudioides *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 140 (1934).—Boliv.
triflorum *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1934, xv. 287, cum descr. ampl.: Pieris buxifolia.
urophyllum *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 184 (1934).—Sumatra.
Whiteanum *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 486 (1935).—Ins. Solomon (Bougainville).
Whitmeei *F. Muell. in Papers & Proc. Roy. Soc. Tasman.* 1875, 163 (1876).—Samoa.

VACCINIUM:—
yaoshanicum *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 483 (1935).—China (Kwangsi).

VACHELLIA Wight & Arn. (Legumin.).
densiflora *Alexander in Small, Man. Southeast. Fl.* 655 (1933).—U.S.A. (S. E. States).
insularis *Small, l. c.*—U.S.A. (Florida).
peninsularis *Small, l. c.* 654.—U.S.A. (Florida).

VAHADENIA Stapf (Apocynac.).
Caillei (*A. Cheval.*) *Stapf ex Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 31 (1931): Landolphia Caillei.

VAHLIA Thunb. (Saxifragac.).
pentandra (*Retz.*) *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1932, 56: Oldenlandia pentandra.

VAHLODEA Fries (Gramin.).
flexuosa (*Honda*) *Ohwi in Acta Phytotax. & Geobot.* 1933, ii. 33: Erioblastus flexuosus.
paramushirensis (*Kudo*) *Roshev. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 242, 750 (1934): Deschampsia atropurpurea var. paramushirensis.

VALDIVIA Remy (Saxifragac.).
rupestris *Gay ex Gunckel in Rev. Univ.* (*Univ. Catól. Chile*) xvi. 516 (1931), in syn.; cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 133.—Chile.

VALERIANA L. (Valerianac.).
agrimoniifolia *Killip in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 353.—Peruv.
ajanensis *Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 216 (1932).—Sibir. or.
alpicola *Utkin ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 45 (1934), in syn.: V. saxicola.
altaica *Sumnev. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1935, Nos. 1–2, p. 5.—Altai.
amurensis *P. Smirnow ex Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 214 (1932).—Sibir. (Amur).
aspleniifolia *Killip in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 352.—Peruv.
cassiensis *Kreyer in Bull. Applied Bot., Leningrad*, 1929–30, xxiii. No. 1, 71 (1930).—Hab.?
cespitosa *Requien ex Guérin in Desv. Journ. de Bot.* iii. [No. 5] 235 [1816].—Gallia.
chinensis *Kreyer ex Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 215 (1932).—Sibir. (Amur); Manchur.
dageletiana *Nakai ex Maekawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1933, xlvii. 618.—Corea.
daphniflora *Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 179.—China (Yunnan; Szechuan).
Delavayi *Franch. ex Hand.-Mazz. l. c.* 180, in obs., nomen.—China.
estonica *Nenjukov in Sitz. Nat.-Ges. Univ. Tartu*, xxxix. 220 (1933).—Esthonia.
fenno-scandica *Kreyer in Bull. Applied Bot., Leningrad*, 1929–30, xxiii. No. 1, 198 (1930).—Fennia; Gallia.
Hardwickii *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 166 (1820).—Reg. Himal.
Kryloviana *Sumnev. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1935, Nos. 1–2, p. 7.—Altai.
lancifolia *Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 181.—China (Szechuan).
maxima *Killip in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 351.—Peruv.
moravica *Kreyer in Bull. Applied Bot., Leningrad*, 1929–30, xxiii. No. 1, 191 (1930).—Eur. centr.
nokozanensis *Yamamoto, Suppl. Ic. Pl. Formos.* Pt. 5, 31 (1932).—Formosa.
oblongifolia (*Karst.*) *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 27, Cuadro 7 (1934): Porteria oblongifolia.
oligodonta *Killip in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 351.—Peruv.
pipenbergica *Kreyer in Versuchs. Mohilewisch. Versuchsst. für Arzneipfl.* 1921–5, 56 (1926); *et in Bull. Applied Bot., Leningrad*, 1929–30, xxiii. No. 1, 163 (1930), in syn.: V. nitida.
Pleijelii *Kreyer in Bull. Applied Bot., Leningrad*, 1929–30, xxiii. No. 1, 205 (1930).—Eur.
provisa *Kreyer, l. c.* 143.—Austria; Caucas.
Reverdattoana *Sumnev. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1935, Nos. 1–2, p. 6.—Turkestan.
rossica *P. Smirnow in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1935, Nos. 1–2, p. 12.—Hab.?

VALERIANA:—
rufescens *Killip in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 352.—Peruv.
saichanensis *Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 213 (1932).—Sibir. or.
Saposhnikovii *Sumnev. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1935, Nos. 1–2, p. 8.—Altai.
Schischkinii *Sumnev. l. c.* p. 10.—Altai.
silesiaca *Kreyer in Bull. Applied Bot., Leningrad*, 1929–30, xxiii. No. 1, 201 (1930).—Succia; Siles.
Stubendorfii *Kreyer ex Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 215 (1932).—Sibir. or.
× Suendermannii *Melch. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 408, 412 (1935).—Hort.
tergemina *Kreyer in Bull. Applied Bot., Leningrad*, 1929–30, xxiii. No. 1, 142 (1930).—Hort.
texana *Steyerm. in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1932, xix. 393.—U.S.A. (Texas).
tianschanica *Kreyer ex Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 170, in clavi, 175.—China.
transjenisensis *Kreyer in Bull. Applied Bot., Leningrad*, 1929–30, xxiii. No. 1, 71 (1930).—Sibir.
trichostoma *Hand.-Mazz.*; *Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 178, descr. ampl.—China (Szechuan; Yunnan).
tripteroides *Hand.-Mazz. l. c.* 173.—China (Hunan; Hupeh).
tripteroides (*Neuman*) *Kreyer in Bull. Applied Bot., Leningrad*, 1929–30, xxiii. No. 1, 190 (1930): V. excelsa var. tripteroides.
turuchanica *Kreyer, l. c.* 71, 209.—Rossia.
umbrosa *Sumnev. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1935, Nos. 1–2, p. 9.—Sibir.
Wallrothii *Kreyer in Bull. Applied Bot., Leningrad*, 1929–30, xxiii. No. 1, 185 (1930): V. collina var. stolonifera *Wallr.*
wolgensis *Kaskw. in Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk.* 1935, Nos. 1–2, p. 12.—Hab.?

VALERIANELLA Mill. (Valerianac.).
eriocarpa (*Stev.*) *Krok. ex Grossheim, Fl. Kavkaza*, iv. 42 (1934): Fedia eriocarpa.
lusitanica *Font Quer in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, v. Ser. Bot. No. 5, 39 (1924).—Hispan.

VALERIANOIDES Medik. (Verbenac.).
dichotoma (*Vahl*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 825 (1895), in obs.: Stachytarpheta dichotoma.
mutabilis (*Jacq.*) *Kuntze, Rev. Gen.* ii. 510 (1891): Verbena mutabilis.

VALLARIS Burm. f. (Apocynac.).
anceps (*Dunn & R. Williams*) *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1931, 28: Trachelospermum anceps.

VALLISNERIA L. (Hydrocharitac.).
asiatica *Miki in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 329.—Asia.
subulispatha (*Makino*) *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 147: V. spiralis var. subulispatha.

VANCOUVERIA C. Morr. & Decne. (Berberidac.).
aurea *Rattan, Pop. Calif. Fl., Anal. Key W. Coast Bot.*, ed. rev. 8, 17 (1888), sphalm.; *A. Gray, Syn. Fl. N. Amer.* i. 71 (1895), in syn.: V. chrysantha.

VANDA R. Br. (Orchidac.).
amiensis *Masamune & Segawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1934, xxiv. 212.—Formosa (Ins. Botel Tobago).
× Boumaniae *J. J. Smith in Gard. Bull. Straits Settlements*, v. 232 (1931).—Ins. Sunda (Alor).
Denevei *Zurowetz in Orch. Rev.* 1933, xli. 76.—Borneo.
Devoogtii *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xii. 146 (1932).—Celebes.
Merrillii *Ames & Quisumb. in Philipp. Journ. Sc.* 1932, xlvii. 211.—Ins. Philipp. (Luzon).
nasugbuana *Parsons in Orch. Rev.* 1931, xxxix. 39.—Ins. Philipp. (Luzon).
saprophytica *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France*, 1932, lxxix. 37.—Indo-China (Laos).

× **VANDACOSTYLIS** Guillaumin in Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, Sér. VI. xii. 608 (1935), in obs. *ORCHIDACEAE.*
[Rhynchostylis × Vanda.]
Bernardii *Guillaumin, l. c.* 608, 609.—Cult.

×**VANDAENOPSIS** Guillaumin in Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, Sér. VI. xii. 607 (1935), in adnot.: **Vandopsis** Hort. (Orchidac.).
[PHALAENOPSIS × VANDA.]
Bultelii *Guillaumin, l. c.*, in obs.—Cult.
ferrierensis (*Hort.*) *Guillaumin, l. c.*, in adnot.: Vandopsis ferrierensis.

×**VANDOPSIS** Hort. ex Bull. Soc. Nat. Hort. France, 1931, Sér. V. iv. 412. *ORCHIDACEAE.*
[PHALAENOPSIS × VANDA.]
ferrierensis *Hort. l. c.*—Cult.

VANDOPSIS Pfitz. (Orchidac.).
Davisii *Ames & Quisumb. in Philipp. Journ. Sc.* 1932, xlix. 497.—Ins. Philipp. (Luzon).

VANGUERIA Juss. (Rubiac.).
longiflora *Hutchinson*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 108 (1931), in syn.: Hutchinsonia barbata.
spinosa *Roxb. Hort. Beng.* 15 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 172 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 536 (1832).—Ind. or. (Bengal); China.

VANGUERIOPSIS Robyns ex Good (Rubiac.).
Gossweileri *Robyns in Journ. Bot.* 1931, lxix. 189.—Congo Lusit.
leucodermis (*K. Krause*) *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 116, in clavi, 117 (1931): Chomelia leucodermis.

VANIERIA Lour. (Urticac.).
triloba (*Hance*) *Satake in Journ. Fac. Sc. Tokyo*, Sect. III. Bot. iii. 497 (1931): Cudrania triloba.

VANILLA Mill. (Orchidac.).
annamica *Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 686.—Indo-China (Anam).
Decaryana *H. Perrier in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 193, in clavi, 194.—Madag.
insignis *Ames in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.* ii. 101 (1934).—Honduras.
kinabaluensis *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 176 (1935).—Borneo.
Pierrei *Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 686.—Cambodia; Cochinch.
ponapensis *Kanehira & Yamamoto in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 1933, xxiii. 21.—Ins. Carolin. (Ponape).
tahitensis *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 25 (1933).—Ins. Societ.

VANTANEA Aubl. (Humiriac.).
macrocarpa *Ducke in Arquiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, i. 205 (1935); *et in Tropical Woods*, 1935, No. 43, 20.—Bras. (Amaz.).
peruviana *Macbride in Candollea*, v. 371 (1934).—Peruv.

VARECA Roxb. Hort. Beng. 18 (1814), nomen; Fl. Ind., ed. Carey & Wall., ii. 445 (1824); Fl. Ind., ed. Carey, i. 647 (1832). *VIOLACEAE.*
heteroclita *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 446; *et l. c.* 648.—Ind. or.
lanceolata *Roxb. l. c.* 86, nomen; *et l. c.*; *et l. c.*—Penins. Mal.
moluccana *Roxb. l. c.* 18; *et l. c.* 445; *et l. c.* 647.—Ins. Molucc.

VARRONIA P. Br. (Boraginac.).
areolata (*Urb.*) *Friesen in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1931–2, Sér. II. xxiv. 156 (1933): Cordia areolata.
asperrima (*DC.*) *Friesen, l. c.* 155: Cordia asperrima.
barahonensis (*Urb.*) *Friesen, l. c.* 164: Cordia barahonensis.
Bridgesi *Friesen, l. c.* 172.—Boliv.
calocephala (*Cham.*) *Friesen, l. c.* 148: Cordia calocephala.
caput-Medusae (*Taub.*) *Friesen, l. c.* 149: Cordia caput-Medusae.
clarendonensis *Britton*; *Friesen, l. c.* 154, latine.—Jamaica.
jacmeliana (*E. H. L. Krause*) *Friesen, l. c.* 177: Cordia jacmeliana.
limicola (*T. S. Brandegee*) *Friesen, l. c.* 148: Cordia limicola.
mexicana *Friesen, l. c.* 162, in obs.—Mexico.
oaxacana (*DC.*) *Friesen, l. c.* 175: Cordia oaxacana.

VARRONIA:—
paucidentata (*Fresen.*) *Friesen in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1931–2, Sér. II. xxiv. 173 (1933): Cordia paucidentata.
polyantha (*Benth.*) *Friesen, l. c.* 167: Cordia polyantha.
Pringlei (*B. L. Robinson*) *Friesen, l. c.* 168: Cordia Pringlei.
selleana (*Urb.*) *Friesen, l. c.* 176: Cordia selleana.
subtruncata (*Rusby*) *Friesen, l. c.* 151: Cordia subtruncata.
urticacea (*Standley*) *Friesen, l. c.* 174: Cordia urticacea.

VARRONIOPSIS Friesen in Bull. Soc. Bot. Genève, 1931–2, Sér. II. xxiv. 142 (1933). *BORAGINACEAE.*
villicaulis (*Fresen.*) *Friesen, l. c.*: Cordia villicaulis.

VASEYOCHLOA Hitchcock in Journ. Wash. Acad. Sc. 1933, xxiii. 452. *GRAMINEAE.*
multinervosa (*Vasey*) *Hitchcock, l. c.*: Melica multinervosa.

VATAIREOPSIS Ducke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xi. 473 (1932). *LEGUMINOSAE.*
speciosa *Ducke, l. c.* 474.—Bras. (Amaz.).

VATERIA L. (Dipterocarpac.).
copallifera (*Retz.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 26 (1931): Elaeocarpus copallifer.
Lewisiana (*Trimen*) *Alston, l. c.* 25: Stemonoporus Lewisianus.

VATICA L. (Dipterocarpac.).
cuspidata (*Ridley*) *Desch in Malayan Forester*, 1934, iii. 200: Synaptea cuspidata.
dulitensis *Symington in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 35 (1934).—Borneo.
flavida *Foxworthy in Malayan Forest Records*, No. 10, 272 (1932).—Penins. Mal.
lobata *Foxworthy, l. c.* 276.—Penins. Mal.

VAVAEA Benth. (Meliac.).
bantamensis (*Koord. & Valeton*) *Koord. & Merrill in Koord. & Valeton, Atlas Baumart. Java*, iv. Verbess. u. Einfüg. 9 (1918): Vitex bantamensis.
bougainvillensis *B. L. Burtt in Kew Bull.* 1935, 303.—Ins. Solomon (Bougainville).
oligantha *B. L. Burtt, l. c.* 304: V. pauciflora *Ridley*.

VELOPHYLLA Durand, Ind. Gen. Phan. 344 (1888). *PODOSTEMACEAE.*

VELTHEIMIA Gleditsch (Liliac.).
Burchellia *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1077 (1895), in syn.: Kniphofia Burchellii.
Deasii *Barnes in S. Afr. Gard.* 1931, xxi. 228, 234.—Afr. austr. (Cape Prov.).
viridiflora *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1123 (1895), in syn.: Veltheimia capensis.

VENIDIUM Less. (Compos.).
×fastulaceum *Cayeux in Bull. Soc. Nat. Hort. France*, 1931, Sér. V. iv. 137, 140.—Hort.
micranthum (*Thunb.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 541 (1894): Arctotis micrantha.
multiflorum *Hort. ex Vilmorin, l. c.* 542, in syn.: V. micranthum.

VENTANA Macbride in Candollea, v. 371 (1934), sphalm.: **Vantanea** Aubl. (Humiriac.).

VENTILAGO Gaertn. (Rhamnac.).
borneënsis *Ridley in Kew Bull.* 1931, 493.—Borneo.
inaequilateralis *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 38 (1934).—China (Hainan).
Nisidai *Kanehira in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 273.—Ins. Palau.

VEPRIS Comm. (Rutac.).
angolensis *Engl.*; *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiii. 151 (1896), descr. ampl.—Angola.
glomerata (*F. Hoffm.*) *Engl. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C. 433 (1895): Toddalia glomerata.
Mildbraediana *G. M. Schulze in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 192 (1934).—Tanganyika Terr.
paniculata (*Lam.*) *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* iii. IV. 178 (1896), in obs.: Toddalia paniculata.

VEPRIS:—
pilosa (*Engl.*) *Engl. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C. 433 (1895): Toddalia pilosa.
teitensis *Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix a. 306 (1931): V. pilosa *Engl.*

VERATRUM L. (Liliac.).
calyciflorum *Komarov, Fl. URSS*, iv. 11, in clavi, 13 (1935), sphalm.: V. calycinum.
calycinum *Komarov, l. c.* 11, in clavi, 13, 733.—Sibir. (Amur); Manchur.
japonicum (*Baker*) *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1932, iv. 194: V. nigrum var. japonicum.
Kudoi *Masamune, l. c.* 193.—Japon.

VERBASCUM L. (Scrophulariac.).
adulterinum *Biroli ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 296 (1835).—Hab. ?
×akhalkalakiense *Bordz. in Bull. Jard. Bot. Kieff*, xii–xiii. 135 (1931).—Caucas.
alagezicum *Bordz. in Monit. Jard. Bot. Tiflis*, 1928–30, n. s. Pt. 5, 46 (1931), in syn.: V. clinantherum.
×arctotrichum *Murb. in Magyar Bot. Lap.* 1933, xxxii. 38.—Bulgar.
×arpaczajicum *Bordz. in Bull. Jard. Bot. Kieff*, xii–xiii. 132 (1931).—Armen.
×Baumgartnerianum *K. H. Rechinger in Magyar Bot. Lap.* 1934, xxxiii. 35, in obs.—Dalmat.
×Borbasianum *Soó in Bot. Közl.* 1935, xxxii. 230.—Hungar.
×Borisii-regis *Murb. in Magyar Bot. Lap.* 1933, xxxii. 37.—Bulgar.
clinantherum *Bordz. in Monit. Jard. Bot. Tiflis*, 1928–30, n. s. Pt. 5, 45 (1931).—Armen.
×Degenianum *Soó in Bot. Közl.* 1935, xxxii. 230.—Hungar.
×dupnicense *Murb. in Magyar Bot. Lap.* 1933, xxxii. 39.—Bulgar.
×Fridae *Murb. l. c.* 38.—Bulgar.
gracile *Turrill in Hook. Ic. Pl.* xxxiii. t. 3253 (1935).—Thracia.
hajastanicum *Bordz. in Monit. Jard. Bot. Tiflis*, 1928–30, n. s. Pt. 5, 47 (1931).—Armen.
×Harknessii *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 577 (1924).—Hort.
×Javorkae *Soó in Bot. Közl.* 1935, xxxii. 230.—Hungar.
Joannis *Bordz. in Monit. Jard. Bot. Tiflis*, 1928–30, n. s. Pt. 5, 49 (1931), in syn.; *et in Bull. Jard. Bot. Kieff*, xii–xiii. 136 (1931), in syn.: Celsia Joannis.
×Johannis-Zernyi *Murb. in Magyar Bot. Lap.* 1933, xxxii. 39.—Bulgar.
latesulcatifolium *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 84 [1933], nomen.—Marocc.
×moravicum *Domin in Preslia*, xiii–xv. 178 (1935).—Czechoslovak.
×Nagelsii *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 577 (1924).—Hort.
patris *Bordz. in Monit. Jard. Bot. Tiflis*, 1928–30, n. s. Pt. 5, 51 (1931), in syn.; *et in Bull. Jard. Bot. Kieff*, xii–xiii. 137 (1931), in syn.: Celsia patris.
Paui *Ceballos & Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 388.—Hispan.
×Pilatii *Domin in Preslia*, xiii–xv. 179 (1935).—Czechoslovak.
pseudo-Blattaria *Battand. Contrib. Fl. Atlant.* 62 (1919), hybr. ?—Alger.
ramosum *Schrad. ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 296 (1835).—Hab. ?
×rilaënse *Murb. in Magyar Bot. Lap.* 1933, xxxii. 40.—Bulgar.
rumiciforme *O. Schwarz in Fedde, Repert.* xxxvi. 137 (1934).—As. Min. (Lydia).
splendidiforme *O. Schwarz, l. c.*—As. Min. (Lydia).
×torculifragum *Murb. in Magyar Bot. Lap.* 1933, xxxii. 40.—Bulgar.
Urumoffi *Stoyanoff & Achtaroff in Stoyanoff & Stefanoff, Fl. Bulg.* ed. 2, 911 (1933); *et in Bull. Soc. Bot. Bulgar.* vi. 68 (1934).—Bulgar.

VERBENA L. (Verbenac.).
Briquetii *Macbride in Candollea*, v. 402 (1934): V. hystrix *Briq.*
delticola *Small apud Perry in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1933, xx. 314.—U.S.A. (Texas); Mexico.
macrodonta *Perry, l. c.* 289.—Calif. infer.

VERBENA:—
montana *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 825 (1895), in syn.: V. Aubletia.
nubigena *Poepp. in Froriep, Notiz. Gebiet Natur-u. Heilk.* Ser. I. xxiii. 292 (1829), in adnot.—Chile.
Orcuttiana *Perry in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1933, xx. 284.—Calif. infer.
patagonica *Moldenke in Phytologia*, i. 171 (1935): V. bonariensis *Rendle*.
setacea *Perry in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1933, xx. 339.—Calif. infer.
sphaerocarpa *Perry, l. c.* 256.—Mexico.
Townsendii *Svenson in Am. Journ. Bot.* 1935, xxii. 253.—Ins. Galapag.
tumidula *Perry in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1933, xx. 322.—U.S.A. (Texas; N. Mexico).
verna *A. Nelson in Am. Journ. Bot.* 1931, xviii. 436.—U.S.A. (Arizona); Mexico.

VERBESINA L. (Compos.).
aligera *Blake in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1931, xliv. 79.—Colomb.
ampla *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 75 (1933–5).—Mexico.
auriculigera *Blake in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1931, xliv. 80.—Peruv.
cayucensis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 76 (1933–5).—Calif. infer.
Ekmanii *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 79 (1931).—Haiti.
Killipii *Blake in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1931, xliv. 82.—Colomb.
Lundellii *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1935, xxv. 316.—Mexico.
peraffinis *Blake in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1931, xliv. 84.—Venez.
pustulata *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 77 (1933–5).—Calif. infer.
retifera *Blake in Proc. Biol. Soc. Wash.* 1931, xliv. 81.—Peruv.
simulans *Blake, l. c.* 83.—Venez.

VERNONIA Schreb. (Compos.).
actaea *Koster in Fedde, Repert.* xxxiv. 4 (1933).—Celebes.
albifila *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1932, lix. 374.—Bras. (Amaz.).
albifolia *Koster in Fedde, Repert.* xxxiv. 5 (1933).—Ins. Sunda (Lombok).
amboinensis *Koster in Blumea*, i. 398 (1935).—Ins. Molucc. (Amboina).
arachniolepis *Ekman & Dusén ex Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 16 (1933).—Bras. (Paraná).
Barkeri *Ekman ex Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 49 (1931).—Haiti.
bauchiensis *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 165, in clavi, 168 (1931).—Nigeria.
Calderoni *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 325.—Am. centr. (Salvador).
camporum *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 259 (1917).—Guinea Gall.
camporum *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 69 (1933–5), non praec.—Mexico.
carinata *Hutchinson & B. L. Burtt in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiii. 37 (1932).—Congo Belg.
coerulea *Koster in Blumea*, i. 423 (1935).—Ins. Sunda (Timor).
conyzoides *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 165, in clavi, 168 (1931).—Sierra Leone.
Craibiana *Kerr in Kew Bull.* 1935, 328.—Siam.
crassa *Ekman ex Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 24 (1933).—Bras. (Paraná).
denudata *Hutchinson & B. L. Burtt in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiii. 37 (1932).—Congo Belg.
djalonensis *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 164, in clavi, 167 (1931).—Guinea Gall.
durifolia *Koster in Blumea*, i. 399 (1935).—Sumatra.
Dusenii *Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 14 (1933).—Bras. (Paraná).
Ekmanii *Urb.*; *Urb. in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 11, 47 (1931), descr. ampl.—Haiti.
elegantissima *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 164, in clavi, 167 (1931).—Nigeria.
Fieldiana *Gleason in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1932, lix. 374.—Peruv.

VERNONIA:—
fimbrillata *Koster in Blumea*, i. 401 (1935).—Borneo.
floccosa *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 69 (1933–5).—Mexico.
floresiana *Koster in Blumea*, i. 444 (1935).—Ins. Sunda (Flores).
Forrestii *Anthony in Notes Bot. Gard. Edinb.* xviii. 35 (1933).—China (Szechuan; Yunnan).
Hillii *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 165, in clavi, 168 (1931).—Cameroons.
Hoffmanniana *Hutchinson & Dalziel, l. c.* 167: V. lappoides *O. Hoffm.*
hypochlora *Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 12 (1933).—Bras. (Paraná).
jodopappa *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 60 (1935).—Kenya Col.
Junghuhniana *Koster in Blumea*, i. 404 (1935): V. Moritziana *Sch. Bip.* (1854).
kabaënsis *Koster in Fedde, Repert.* xxxiv. 1 (1933).—Celebes.
letiensis *Koster in Blumea*, i. 445 (1935).—Ins. Sunda (Leti).
mangokensis *Humbert ex Basse in Ann. Sc. Nat.* 1934, Sér. X. xvi. 142, nomen.—Madag.
Moritziana *Sch. Bip. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Arch.* 119 (1854); *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 17 (1856).—Ins. Sunda (Nusa Barong).
oxyodonta *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 6, 19 (1932).—Bras. (Rio Grande do Sul).
patentissima *Koster in Blumea*, i. 397 (1935).—Sumatra.
Pellegrini *Humbert ex Basse in Ann. Sc. Nat.* 1934, Sér. X. xvi. 140, nomen.—Madag.
perangusta *Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 21 (1933).—Bras. (Paraná).
Piovani *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 61 (1935).—Kenya Col.
pleiotaxoides *Hutchinson & B. L. Burtt in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiii. 38 (1932).—Congo Belg.
Poissoni *Humbert ex Basse in Ann. Sc. Nat.* 1934, Sér. X. xvi. 142, nomen.—Madag.
Pristis *Hutchinson & B. L. Burtt in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiii. 38 (1932).—Congo Belg.
Rusbyi *Gleason in Am. Journ. Bot.* 1932, xix. 753: V. cuneifolia *Gleason*.
sangka *Kerr in Kew Bull.* 1935, 329.—Siam.
Schliebenii *Mattf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 414 (1932).—Tanganyika Terr.
senecioides *A. Cheval. in Bull. Soc. Bot. France*, 1914, lxi. Mém. 8, 259 (1917).—Guinea Gall.
Sennii *Chiov. Fl. Somala*, II. 256 (1932).—Somal. Ital.
squarrulosa *Mattf. ex Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 6, 18 (1932).—Bras. (Rio Grande do Sul).
stenostegia (*Stapf*) *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 164, in clavi, 166 (1931): Candidea stenostegia.
subobscura *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 8, 13 (1932).—Bras. (Matto Grosso).
subpaludosa *Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 20 (1933).—Bras. (Paraná).
subtilis *Koster in Blumea*, i. 422 (1935).—Celebes.
sutepensis *Kerr in Kew Bull.* 1935, 329.—Siam.
Tengwallii *Koster in Blumea*, i. 420 (1935).—Ins. Sunda (Lombok).
tephrodoides *Chiov. Fl. Somala*, II. 255 (1932).—Somal. Ital.
timorensis *Koster in Blumea*, i. 455 (1935).—Ins. Sunda (Timor).
tovarensis *Gleason in Am. Journ. Bot.* 1932, xix. 753.—Venez.
triflora *Bremek. in Ann. Transvaal Mus.* xv. 262 (1933).—Transvaal.
tuberculata *Hutchinson & B. L. Burtt in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiii. 39 (1932).—Congo Belg.
uniflora *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 166, in clavi, 169 (1931).—Nigeria.
vernonioides (*A. Gray*) *Bacigal. in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcvii. 77 (1931), in obs.: Perezia vernonioides.
viarum *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 69 (1933–5).—Mexico.
viminea *Ekman ex Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 25 (1933).—Bras. (Paraná).

VERNONIA:—
virentiformis *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 8, p. 8 (1932).—Bras. (Matto Grosso).
Walshae *Koster in Blumea*, i. 454 (1935).—Ins. Sunda (Timor).
Westermanii *Ekman & Dusén ex Malme in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. III. xii. No. 2, 10 (1933).—Bras. (Paraná).
wetarensis *Koster in Fedde, Repert.* xxxiv. 3 (1933).—Ins. Sunda (Wetar).
Wittei *Hutchinson & B. L. Burtt in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiii. 39 (1932).—Congo Belg.

VERONICA L. (Scrophulariac.).
arceuthobia *Woronow in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 223 (1933).—Caucas.
Asa-Grayi *Miyabe & Miyake in Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 178, japonice.—Japon.
Baxteri *House in Bull. N. Y. State Mus.* 1920, Nos. 233–4, 11 (1921).—U.S.A. (N. York).
Boronetzkii *Bordz. in Mitt. Naturf. Ver. Kiew*, (1911); cf. *Bornm. in Fedde, Repert.* x. 472 (1912), in obs., pro syn.: V. Sintenisii.
brachysiphon (*Summerhayes*) *Bean in Kew Bull.* 1934, 224: Hebe brachysiphon.
capitata *Fisch. ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 348 (1835).—Altai.
Chartonii *Litard. & Maire*; *Litard. & Maire in Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc*, No. xxvi. 31 (1931), descr. ampl.—Marocc.
Consolatae *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 90 (1935).—Kenya Col.
constantinopolitana [*Tourn. ex*] *Riek in Fedde, Repert. Beih.* lxxix. 18 (1935), in obs., pro syn.: V. pectinata.
× delphinensis *Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève*, 1932–3, Sér. II. xxv. 315 (1934).—Gallia.
Denkichiana *Honda in Bot. Mag., Tokyo*, 1932, xlvi. 420.—Japon.
Deutzeri *Hort. ex Härle in Biblioth. Bot.* civ. 26 (1932), in syn.: V. grandis.
Gayeriana *Lengyel in Vasi Szemle*, i. 136–7 (1934); cf. *Bot. Közl.* 1935, xxxii. 214.—Hab.?
Hendersonii *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 784 (1895), in syn.: V. speciosa.
imperialis *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in syn.: V. speciosa.
incanovelutina *Koidz. in Yuhki, Fl. Yamagata-praefect.* (1934); cf. *Acta Phytotax. & Geobot.* 1934, iii. 173.—Japon.
jasminoides *Hort. ex Bean, Trees & Shrubs Brit. Isles*, iii. 493 (1933), in syn.: V. diosmifolia.
karataviensis *Pavlov in Sovietsk. Bot.* 1934, No. 1, 27, in obs.—Turkestan.
kitamiana *Tatewaki ex Miyabe & Tatewaki in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.* xiii. 110 (1934), in syn.: V. Schmidtiana var. linearilobа *Miyabe & Tatewaki*.
Koenitzeri *Hort. ex Härle in Biblioth. Bot.* civ. 26 (1932), in syn.: V. grandis.
Kojimae *Ohwi in Fedde, Repert.* xxxvi. 55 (1934), in syn.: V. morrisonicola var. Kojimae *Ohwi*.
Libaudii *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 784 (1895), in obs., nomen.—Hab.?
lobelioides *Hort. ex Druce in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1931, ix. 570 (1932).—Anglia.
Miyabei *Nakai & Honda in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 355: V. Grayi *Miyabe & Miyake*.
mogoltavica *Popov ex Vved. in Bull. Univ. As. Centr.* xi. Suppl., 19 (1925), in obs.: V. biloba var. platysepala *Trautv.*
nevadensis *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 141 (1932).—Hispan.
nipponica *Makino in Makino & Nemoto, Fl. Jap.* ed. 1, 233 (1925); *et l. c.* ed. 2, 1077 (1931), japonice.—Japon.
olgensis *Komarov in Bull. Jard. Bot. Acad. Sc. URSS*, 1931, xxx. 209 (1932).—Sibir. (Marit. Prov.).
× Otrubae *Domin in Preslia*, xiii–xv. 183 (1935).—Czechoslovak.
pauciflora *Font Quer in Cavanillesia*, iv. 54 (1931), in obs.—Hispan.
rapensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 266 (1935).—Polynes. (Ins. Rapa).
Reidii *Hort. ex Kavka in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1933, xlviii. 100.—N. Zel.

VERONICA:—
restrictior *P. Fourn. in Le Monde des Plantes*, 1933, xxxiv. 12, hybr. ?—Gallia.
Schinzii *Aschers. & Sint. ex Rõmpp in Fedde, Repert. Beih.* l. 116 (1928), in syn.: V. cinerea.
schistosa *E. Busch in Trav. Mus. Bot. Acad. Sc. URSS*, xxiv. 23 (1932).—Transcaucas.
subincano-velutina *Koidz. in Yuhki, Fl. Yamag.* 89 (1934); *et in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 81.—Corea; Japon.
sublongifolia (*Neuman*) *Härle in Biblioth. Bot.* civ. 21 (1932), in obs.—Scandinav.
subspicata (*Neuman*) *Härle, l. c.*, in obs.—Scandinav.
Takedana (*Makino*) *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1934, x. 366: V. cana var. Takedana.
tetraphylla *Popov in Trav. Turkest. Univ., Tashkent*, No. 4 (*Vég. Monts Sary-Taou, etc.*) 58, 65 (1922).—Turkestan.
transcaucasica (*Bordz.*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 393 (1932): V. spicata subsp. transcaucasica.
tsugitakensis *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1931, iii. 21.—Formosa.
umbigena *Herb. ex Riek in Fedde, Repert. Beih.* lxxix. 37 (1935), in obs., pro syn.: V. Billardieri *Vahl.*
undulata *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 147 (1820).—Reg. Himal.

VERTICORDIA DC. (Myrtac.).
Mitchelliana *C. A. Gardner in Journ. Roy. Soc. W. Austral.* 1932–3, xix. 89 (1934).—W. Austral.

VESICARIA Adans. (Crucif.).
macrocarpa (*Jávorka*) *O. E. Schulz in Engl. Jahrb.* lxvi. 99 (1933): Alyssoides macrocarpum.

VETIVERIA Thou. (Gramin.).
elongata (*R. Br.*) *Stapf ex C. E. Hubbard in Kew Bull.* 1934, 444: Holcus elongatus.
filipes *C. E. Hubbard, l. c.*—Austral. (Queensland).

VEXILLABIUM Maekawa in Journ. Jap. Bot. 1935, xi. 457. *ORCHIDACEAE.*
Nakaianum *Maekawa, l. c.* 458.—Corea; Japon.
yakushimense (*Yamamoto*) *Maekawa, l. c.* 459: Anoectochilus yakushimensis.

VIBURNUM L. (Caprifoliac.).
antioquiense *Killip & A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1930, lvii. 256 (1931).—Colomb.
australe *Morton in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxvi. 345 (1933).—Mexico.
blandum *Morton, l. c.* 352.—Mexico.
×Burkwoodii *Hort. ex Gard. Chron.* 1931, Ser. III. lxxxix. 438, in obs.—Hort.
conspectum *Morton in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxvi. 349 (1933).—Panamá.
deltoideum *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 68 (1933–5).—Mexico ?
disjunctum *Morton in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxvi. 355 (1933).—Guatem.
dispar *Morton, l. c.* 353.—Mexico.
Goudotii *Killip & A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1930, lvii. 249 (1931): Oreinotinus furcatus.
Halli (*Oerst.*) *Killip & A. C. Smith, l. c.* 251: Oreinotinus Halli.
hirsutum *Morton in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxvi. 362 (1933).—Mexico.
hizenense *Hatusima in Acta Phytotax. & Geobot.* 1935, iv. 207, in syn.: V. dilatatum subsp. hizenense *Hatusima.*
Jamesonii (*Oerst.*) *Killip & A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1930, lvii. 249 (1931): Oreinotinus Jamesonii.
jucundum *Morton in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxvi. 355 (1933).—Guatem.
×Juddii *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 360.—Hort.
Kerrii *Geddes in Kew Bull.* 1931, 207.—Siam.
lautum *Morton in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxvi. 351 (1933).—Mexico.
lepidotulum *Merrill & Chun in Sunyatsenia*, ii. 22 (1934).—China (Kwangtung).
Mathewsii (*Oerst.*) *Killip & A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1930, lvii. 253 (1931): Oreinotinus Mathewsii.
optatum *Morton in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxvi. 358 (1933).—Guatem.

VIBURNUM:—
parvilimbum *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 51 (1934).—China (Kwangtung).
sessiliflorum *Geddes in Kew Bull.* 1931, 207.—Siam.
sikokianum *Koidz. in Acta Phytotax. & Geobot.* 1932, i. 176.—Japon. (Shikoku).
Smithii *Metcalf in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 298: V. parvifolium *W. W. Smith.*
subsessile *Killip & A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1930, lvii. 256 (1931).—Colomb.
tridentatum *Killip & A. C. Smith, l. c.* 251.—Peruv.
triplinerve *Hand.-Mazz. in Sinensia*, v. 15 (1934).—China (Kwangsi).
undulatum (*Oerst.*) *Killip & A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1930, lvii. 248 (1931): Oreinotinus undulatus.
venustum *Morton in Contrib. U. S. Nat. Herb.* xxvi. 350 (1933).—Costa Rica.
zambalense *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3181 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).

VICIA L. (Legumin.).
abyssinica *Herb. ex Colla, Herb. Pedem.* ii. 216 (1834).—Hab. ?
akhmaganica *Kazarjan in Fedde, Repert.* xxxvi. 389 (1934).—Armen.
Basilei *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 147 [1933], nomen.—Marocc.
Delmasii *Emberger & Maire*; *Emberger & Maire in Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc*, Nos. xxi–xxii. 33 (1930).—Marocc.
Embergeri *Font Quer & Maire*; *Emberger & Maire in Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc*, xi. Nos. 4–6, 98 (1931).—Marocc.
esdraelonica *Warb. & Eig in Fedde, Repert. Beih.* lxiii. 1. 113 (1931), nomen: V. esdraelonensis *Warb. & Eig* ?
Fernandezi *Sennen in Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, xv. Ser. Bot. No. 1, 50 (1931), in obs., nomen.—Hispan.
garbiensis *Font Quer & Pau in Font Quer, Iter Marocc.* 1930, No. 381 [1932].—Marocc.
nummularia *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. vii. 577 (1933).—China (Yunnan).
Ohwiana *Hosokawa in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1933, v. 288.—Corea.
Perretii *Colla, Herb. Pedem.* ii. 217 (1834).—Hab. ?
sibirica *Herb. ex Colla, l. c.* 216.—Hab. ?
speciosa *R. Phil. in Verh. Deutsch. Wiss. Ver. Santiago* (*Chile*) ii. 203 (1892), in obs.; *et in An. Univ. Chile*, lxxxiv. 277 (1894).—Chile.
subbiflora *Salzm. ex Pau, Contrib. Fl. Granada*, 17 (1916); cf. *Maire in Cavanillesia*, iv. 11 (1931): V. pseudocracca var. brevipes *Willk.*
Tenorii (*Lamotte*) *Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* iii. 68 [1914]: Lens Tenorii.
viciiformis (*Lag.*) *Martinez in Mem. Soc. Esp. Hist. Nat.* xiv. 447 (1934): Orobus viciiformis.
Villaris *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 148 [1933]: V. Embergeri ?

VICOA Cass. (Compos.).
glanduligera *Kraschen. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 177 (1933).—Pamir; Afghan.

VIGNA Savi (Legumin.).
asparaginea (*Bertoni*) *Bertoni in Agronomia*, v. No. 7, 274 (1913); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 142: V. unguiculata var. asparaginea.
brasilica (*Bertoni*) *Bertoni, ll. cc.*: V. unguiculata var. brasilica.
caesia *Chiov. Fl. Somala*, II. 167 (1932).—Somal. Ital.
capensis (*Thunb.*) *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxxiv. 420 (1932): Phaseolus capensis.
congoënsis *E. G. Baker in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxi. 303 (1932).—Congo Belg.
debilis *Fourc. in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xxi. 96 (1932).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Galpinii *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxxiv. 421 (1932).—Transvaal.
Hundtii *Rossberg in Fedde, Repert.* xxxviii. 107 (1935).—Angola.
Inga (*Bertoni*) *Bertoni in Agronomia*, v. No. 7, 275 (1913); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 142: V. unguiculata var. Inga.

VIGNA:—
juncea *Milne-Redhead in Kew Bull.* 1934, 301.—Tanganyika Terr.; N. Rhodesia.
Lebrunii *E. G. Baker in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxiii. 181 (1933).—Congo Belg.
leptodon *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 816 (1933).—Tanganyika Terr.
longiloba *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxxiv. 421 (1932).—Transvaal.
malayana *M. R. Henderson in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 99 (1933): V. parviflora *Ridley.*
nervosa *Markötter in Ann. Univ. Stellenb.* 1930, viii. Sect. A, No. 1, 26.—Natal.
occidentalis *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 41.—Afr. trop. occ.
oryzina (*Bertoni*) *Bertoni in Agronomia*, v. No. 7, 275 (1913); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 142: V. unguiculata var. oryzina.
pongolensis *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxxiv. 421 (1932).—Transvaal.
rhomboidea *Burtt Davy, l. c.*—Transvaal.
scabrida *Burtt Davy, l. c.*—Transvaal.
Schlechteri *Harms in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 688 (1915), in obs.: Dolichos reticulatus *Schlechter.*
Schliebenii *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 817 (1933).—Tanganyika Terr.
serotina (*Bertoni*) *Bertoni in Agronomia*, v. No. 7, 275 (1913); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 142: V. unguiculata var. serotina.
sesquipedalis *Fruw. Unbau Huelsenfrucht.* 254 (1898); *Merrill, Fl. Manila*, 262 (1912); *Merrill, Enum. Philipp. Fl. Pl.* ii. 320 (1923), in syn.: V. sinensis.
stenodactyla *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 817 (1933).—Tanganyika Terr.
stenophylla (*Harv.*) *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxxv. 421 (1932): V. triloba var. stenophylla.
sudanica *E. G. Baker in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 295.—Sudan. Brit.
sulphurea (*Bertoni*) *Bertoni in Agronomia*, v. No. 7, 275 (1913); cf. *Gray Herb. Card Cat.*, Issue 142: V. unguiculata var. sulphurea.
tonkinensis (*Bertoni*) *Bertoni, ll. cc.*: V. unguiculata var. tonkinensis.
ulugurensis *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 1067 (1934).—Tanganyika Terr.
Wilmsii *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxxv. 420 (1932).—Transvaal.
Wittei *E. G. Baker in Rev. Zool. & Bot. Afr.* xxi. 304 (1932).—Congo Belg.

VIGUIERA H. B. & K. (Compos.).
corumbensis *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 8, 45 (1932).—Bras. (Matto Grosso).
longiligula *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 75 (1933–5).—Mexico.
magnicapitata *M. E. Jones, l. c.* 76.—Mexico.
megapotamica *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 6, 68 (1932).—Bras. (Rio Grande do Sul).
triangularis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 75 (1933–5).—Calif. infer.

VIMEN P. Br.; H. Hallier in Meded. Herb. Leid. No. 36, 5 (1918): **Hyperbaena** Miers (Menispermac.).

VINCENTELLA Pierre (Sapotac.).
camerounensis *Pierre apud Aubrév. & Pellegr. in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 800 (1935).—Côte d'Ivoire; Cameroons.

VINCETOXICUM Walt. (Asclepiadac.).
cabulicum *Bornm. in Engl. Jahrb.* lxvi. 233 (1934), in syn.: Cynanchum cabulicum.
calcaratum *R. E. Woodson in Am. Journ. Bot.* 1935, xxii. 689.—Mexico.
campechianum *Standley in Publ. Carnegie Inst. Wash.* No. 461, 82 (1935).—Mexico.
grandiflorum *Standley, l. c.* 83.—Guatem.

VINTICENA Steud. (Tiliac.).
Boehmiana (*F. Hoffm.*) *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 715 (1935), in obs.: Grewia Boehmiana.
botryantha (*Baill.*) *Burret l. c.*, in obs.: Grewia botryantha.
brideliifolia (*Baill.*) *Burret, l. c.*, in obs.: Grewia brideliifolia.

VINTICENA:—
caffra (*Meissn.*) *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 715 (1935), in obs.: Grewia caffra.
carpinifolia (*Juss.*) *Burret, l. c.*, in obs.: Grewia carpinifolia.
celle (*Baill.*) *Burret, l. c.*, in obs.: Grewia celle.
cernua (*Baker*) *Burret, l. c.*, in obs.: Grewia cernua.
falcistipula (*K. Schum.*) *Burret, l. c.*, in obs.: Grewia falcistipula.
flavescens (*Juss.*) *Burret, l. c.*, in obs.: Grewia flavescens.
flavicans (*Boiv. ex Baill.*) *Burret, l. c.*, in obs.: Grewia flavicans.
Forbesii (*Harv. ex Mast.*) *Burret, l. c.*, in obs.: Grewia Forbesii.
Grandidieri (*Baill.*) *Burret, l. c.*, in obs.: Grewia Grandidieri.
Grevei (*Baill.*) *Burret, l. c.*, in obs.: Grewia Grevei.
Hildebrandtii (*Baill.*) *Burret, l. c.*, in obs.: Grewia Hildebrandtii.
Holstii (*Burret*) *Burret, l. c.*, in obs.: Grewia Holstii.
Kerstingii (*Burret*) *Burret, l. c.*, in obs.: Grewia Kerstingii.
lasiodiscus (*K. Schum.*) *Burret, l. c.*, in obs.: Grewia lasiodiscus.
lavanalensis (*Baill.*) *Burret, l. c.*, in obs.: Grewia lavanalensis.
macromischa *Burret, l. c.* 714.—Tanganyika Terr.
microcyclea (*Burret*) *Burret, l. c.* 715, in obs.: Vincentia microcyclea.
nossibeënsis (*Baill.*) *Burret, l. c.*, in obs.: Grewia nossibeënsis.
olukondae (*Schinz*) *Burret, l. c.*, in obs.: Grewia olukondae.
platyclada (*K. Schum.*) *Burret, l. c.*, in obs.: Grewia platyclada.
retinervis (*Burret*) *Burret, l. c.*, in obs.: Grewia retinervis.
rhomboides (*Boj.*) *Burret, l. c.*, in obs.: Grewia rhomboides.
Schweinfurthii (*Burret*) *Burret, l. c.*, in obs.: Grewia Schweinfurthii.
sely (*R. Viguier*) *Burret, l. c.*, in obs.: Grewia sely.
turbinata (*I. B. Balf.*) *Burret, l. c.*, in obs.: Grewia turbinata.
viscosa (*Boiv. ex Baill.*) *Burret, l. c.*, in obs.: Grewia viscosa.
Welwitschii (*Burret*) *Burret, l. c.*, in obs.: Grewia Welwitschii.

VIOLA L. (Violac.).
alaica *Vved. in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 3, 79 (1928), in obs.—Turkestan.
anomala *Kit. ex Colla, Herb. Pedem.* i. 268 (1833), in obs.—Ital.?
apetala *Roxb. Hort. Beng.* 18 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 449 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 650 (1832).—Mauritius.
×ausonensis *Sennen in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.* 1932, xxxii. 111.—Hispan.
×Balmesi *Sennen, l. c.* 112.—Hispan.
bambusetorum *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 377 (1931).—China (Szechuan).
brunneostipulosa *Hand.-Mazz. l. c.* 380.—China (Yunnan; Kweichau; Szechuan).
canescens *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 450 (1824).—Nepal.
×Curnowi *Druce in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1930, ix. 336 (1931).—Anglia.
eizanensis (*Makino*) *Makino in Journ. Jap. Bot.* i. 15 (1917): V. dissecta var. eizanensis.
fissifolia *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 226.—Manchur.
Flahaultiana *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 15 [1933], nomen.—Marocc.
florariensis *Hort. ex Karrer in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1932, xlvii. 280.—Hort.
Fontanesi *Coss. ex Battand. Fl. Algér.*, Suppl. Phanérog. 20 (1910), in syn.: V. Munbyana.
glandulifera *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 452 (1824).—Reg. Himal.
Greatrexii *Nakai & Maekawa in Ic. Pl. As. Or.* i. No. 1, 6 (1935).—Japon. (Kiushiu).
herbivaga *Ridley in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 17.—Sumatra.
hunanensis *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* Pt. VII. 376 (1931).—China (Hunan).

VIOLA:
jugalis *Ridley in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 18.—Sumatra.
Kjellbergii *Melch. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 206 (1934).—Celebes.
korinchensis *Ridley in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 15.—Sumatra.
kwangtungensis *Melch. in Sunyatsenia*, i. 124 (1933).—China (Kwangtung).
×Malvesini *Jeanjean in Act. Soc. Linn. Bordeaux*, lxxxiii. Proc.-Verb., 54 (1931).—Gallia.
maroccana *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1932, xxiii. 168.—Marocc.
×maxima *Hort. ex Domin in Preslia*, xiii–xv. 100 (1935).—Hort.
mucronulifera *Hand.-Mazz. in Sinensia*, ii. 4 (1931).—China (Kwangsi).
nuda *W. Becker in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 148 (1931).—China (Yunnan).
Pomelli *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 15 [1933], nomen.—Marocc.
pusilla *Poepp. in Froriep, Notiz. Gebiet Natur-u. Heilk.* Ser. I. xxiii. 277 (1829), in adnot.—Chile.
reniformis *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 451 (1824).—Nepal.
rhizomata *Nakai in Bot. Mag., Tokyo*, 1935, xlix. 498.—Japon. (Hondo).
rhodosepala *Kitagawa in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 611.—Manchur.
Robinsonii *Ridley in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. 16.—Penins. Mal.
rosulata *P. Fourn. in Le Monde des Plantes*, 1933, xxxiv. 36.—Pyren.
rugosa *Small, Man. Southeast. Fl.* 891 (1933).—U.S.A. (Florida).
sarotina *P. Fourn. in Le Monde des Plantes*, 1933, xxxiv. 36.—Pyren.
serpens *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 449 (1824).—Nepal.
shinchikuensis *Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan*, 1933, v. 352.—Formosa.
×Stuartii *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 591 (1924).—Hort.
Unwinii *W. Becker in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 147 (1931).—Burma.
×Visseriana *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 592 (1924).—Hort.
×Wittrockiana *Hort. ex Kappert in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1932, xlvii. 293.—Hort.

VIORNA Reichb. (Ranunculac.).
albicoma (*Wherry*) *Moldenke in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 57 (1932): Clematis albicoma.
Beadlei *Small, Man. Southeast. Fl.* 527 (1933).—U.S.A. (Georgia; Tennessee).
Scottii (*Porter*) *Rydb. Fl. Colorado*, 141 (1906): Clematis Scottii.
subreticulata *Harbison ex Small, Man. Southeast. Fl.* 527 (1933).—U.S.A. (S. E. States).

VIRGILIA Lam. (Legumin.).
divaricata *Adamson in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 43.—Afr. austr. (Cape Prov.).
sericea *Wall. ex Stapf in Bot. Mag.* sub t. 9234 (1931).—Nepal.

VIROLA Aubl. (Myristicac.).
brachycarpa *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 131 (1932).—Brit. Honduras.
elliptica *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 351.—Bras. (Matto Grosso).
loretensis *A. C. Smith, l. c.* 1931, lviii. 95.—Peruv.
villosa *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 724.—Peruv.

VISCAGO Zinn, Cat. Pl. Gott. 188 (1757), nomen illegitimum; cf. Sprague in Kew Bull. 1934, 219. *CARYOPHYLLACEAE.*
[CUCUBALUS L. et SILENE L.]

VISCARIA Roehl. Deutschl. Fl. ed. 2, ii. 37 (1812). *CARYOPHYLLACEAE.*
vallesiaca (*Thell.*) *Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters*, 594 (1924), hybr.?: V. vulgaris subsp. vallesiaca.
Viscaria (*L.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 100 (1894): Lychnis Viscaria.

VISCUM L. (Loranthac.).
alatum *Splitg. ex K. Krause in Pulle, Fl. Surinam*, i. (*Meded. K. Ver. Kol. Inst. Amst.* XXX.) 22 (1932), in syn.: Phoradendron Martianum.

VISCUM:—
coloratum (*Komarov*) *Nakai, Rep. Veg. Dagel. Island*, 17 (1919), nomen; *Nakai ex Mori, Enum. Pl. Cor.* 128 (1922): V. album var. coloratum.
Dielsianum *Dinter in Fedde, Repert.* xxix. 164 (1931), in obs., nomen.—Afr. austr.-occ.
Loranthi *Elmer*; *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 464 (1931), latine.—Sumatra.
luteum *Splitg. ex K. Krause in Pulle, Fl. Surinam*, i. (*Meded. K. Ver. Kol. Inst. Amst.* XXX.) 23 (1932), in syn.: Phoradendron piperoides.
melanocarpum *Peter in Fedde, Repert. Beih.* xl. II. Anhang, 13 (1932).—Tanganyika Terr.
Osmastonii *Raizada in Indian Forester*, 1934, lx. 537.—Ind. or. (Kumaon).
Spragueanum *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxxv. 466 (1932).—Transvaal.
stenocarpum *Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 469 (1931).—Java.

VISENIA Houtt. (Sterculiac.).
ferruginea *Colla, Herb. Pedem.* i. 432 (1833).—Hab.?
scabra *Colla, l. c.* 431.—Hab.?
spicata *Colla, l. c.*—Bras.

VISMIA Vand. (Guttif.; Hypericac., Gen. Pl.).
orientalis *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 501 (1921), in obs.—Tanganyika Terr.

VISMIANTHUS Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, xii. 706 (1935). *CONNARACEAE.*
punctatus *Mildbr. l. c.*—Tanganyika Terr.

VITALIANA Sesl. apud Donati, Auszug seiner Natur-Geschichte d. Adriat. Meers, 66, t. [2], fig. x, A–I (1753); et in Donati, Ess. Hist. Nat. Mer. Adriat. 69, t. 11, fig. A–I (1758); cf. Becherer in Journ. Bot. 1934, lxxii. 293. *PRIMULACEAE.*

VITEX L. (Verbenac.).
agraria *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 276 (1931), in syn.: V. thyrsiflora.
ajugiflora *Dop in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse*, 1928, lvii. 202.—Indo-China (Anam; Cochinch.).
annamensis *Dop, l. c.* 203.—Indo-China (Anam).
Balbi *Chiov. Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya*, 99 (1935).—Kenya Col.
Brittoniana *Moldenke in Torreya*, 1933, xxxiii. 67.—Curaçao; Colomb.; Venez.; Guiana Brit. et Gall.
caespitosa *Exell in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl. 2, 145.—Angola.
cilio-foliolata *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 277 (1931), in syn.: V. rivularis.
cochinchinensis *Dop in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse*, 1928, lvii. 199.—Cochinch.
Duclouxii *Dop, l. c.* 208.—China (Yunnan).
Eberhardtii *Dop, l. c.* 204.—Indo-China (Laos; Tonkin).
holoadenon *Dop, l. c.*—Cambodia.
Klugii *Moldenke in Phytologia*, i. 101 (1934).—Peruv.
kwangsiensis *P'ei in Mem. Sc. Soc. China*, i. No. 3 (*Verbenac. China*) 93 (1932).—China (Kwangsi).
kweichowensis *P'ei in Sinensia*, ii. 71 (1931).—China (Kweichau).
lanceolata *P'ei in Mem. Sc. Soc. China*, i. No. 3 (*Verbenac. China*) 114 (1932).—China (Yunnan).
longe-acuminata *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 277 (1931), in syn.: V. micrantha.
lucens *T. Kirk in Trans. & Proc. N. Z. Inst.* 1896, xxix. 525 (1897): V. littoralis *A. Cunn.*
lucida *Moldenke in Phytologia*, i. 102 (1934).—Cuba; S. Domingo.
lutea *Exell in Journ. Bot.* 1931, lxix. Suppl. 2, 145.—Congo Lusit.
payos (*Lour.*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 334 (1935): Allasia payos.
Pierreana *Dop in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse*, 1928, lvii. 205.—Cochinch.
rapinioides *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1932, xiii. 27.—N. Hebrides.
rufa *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 275, in clavi, 276 (1931).—Liberia; Côte d'Ivoire.

VITEX:—
Rusbyi *Moldenke in Phytologia*, i. 103 (1934).—Colomb.
spongiocarpa *Ducke in Tropical Woods*, 1932, No. 31, 20; *et in Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro*, vi. 88 (1933).—Bras. (Amaz.).
stylosa *Dop in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse*, 1928, lvii. 201.—Indo-China (Tonkin).
Thorelii *Dop*, *l. c.* 206.—Cambodia.
tomentulosa *Moldenke in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 58 (1932).—Cuba.
tripinnata (*Lour.*) *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 335 (1935): Tripinna tripinnata.

VITIPHOENIX Becc. (Palmae).
petiolata *Burret in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu*, xi. No. 4, 8 (1935).—Ins. Viti.
samoënsis *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 600 (1935), in obs., nomen alternativ.—Samoa.
Seemannii *Becc. ex Martelli in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1935, n. s. xlii. 87, in syn.: Drymophloeus Seemannii.
sessilifolia *Burret in Occas. Papers Bishop Mus., Honolulu*, xi. No. 4, 9 (1935).—Ins. Viti.
Smithii *Burret*, *l. c.* 7.—Ins. Viti.

VITIS L. (Vitac.; Ampelidac., Gen. Pl.).
adnata (*Roxb.*) *Wall.*; *Wight & Arn. Prodr.* 126 (1834), cum descr.: Cissus adnatus.
affinis *Gagnep. ex Osmaston, For. Fl. Kumaon*, 119 (1927).—Ind. or. (Kumaon).
arachnoidea (*Hassk.*) *Backer, Voorl. Schoolfl. Java*, 58 (1908): Cissus arachnoideus.
barbata *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 478 (1824).—Ind. or. (Assam).
bracteolata *Wall. l. c.* 483.—Ind. or. (Bengal).
Chungii *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* xi. 102 (1932).—China (Fokien; Kiangsi).
cinnamomea *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 483 (1824).—Penins. Mal.
cissioides (*Blume*) *Backer, Schoolfl. Java*, 245 (1911): Pterisanthes cissioides.
compressa (*Blume*) *Backer*, *l. c.* 250: Cissus compressus.
glaberrima *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 476 (1824).—Penins. Mal.
glabrata (*Blume*) *Backer, Schoolfl. Java*, 253 (1911): Cissus glabratus.
glandulosa *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 479 (1824).—Nepal.
gracilis *Wall. l. c.* 477.—Penins. Mal.
Hui *Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., x. 77 (1935).—China (Kiangsi).
illex *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, iii. 217 (1934): V. cordifolia var. sempervirens *Munson*.
kelungensis *Momiyama in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 527.—Formosa.
kiusiana *Momiyama*, *l. c.* 525.—Japon.
Koordersii *Backer, Schoolfl. Java*, Verbeterblad, p. 10 (1911).—Java.
lanata *Roxb. Hort. Beng.* 18 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 474 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 660 (1832).—Ind. or. (Madras).
latifolia *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.*; *et l. c.* 661.—Ind. or.
mollissima *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 482 (1824).—Penins. Mal.
novogranatensis *Moldenke in Phytologia*, i. 9 (1933).—Colomb.
papillosa (*Blume*) *Backer, Schoolfl. Java*, 252 (1911): Cissus papillosus.
Parkeri *Gagnep. ex Osmaston, For. Fl. Kumaon*, 120 (1927).—Ind. or. (Kumaon).
parvifolia *Roxb. Hort. Beng.* 18 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 475 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 662 (1832).—Ind. or. (Bengal).
peninsularis *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 57 (1933–5).—Calif. infer.
piloso-nervia *Metcalf in Lingnan Sc. Journ.* xi. 14 (1932).—China (Fokien).
quadrangularis (*L.*) *Wall.*; *Baker in Oliv. Fl. Trop. Afr.* i. 399 (1868): Cissus quadrangularis.
rubifolia *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 480 (1824).—Ind. or. (Bengal).
rufo-tomentosa (*Makino*) *Makino in Journ. Jap. Bot.* i. 31 (1918): V. flexuosa var. rufo-tomentosa.
rugosa *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 480 (1824).—Nepal.

VITIS:—
semicordata *Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 481 (1824).—Nepal.
Shiragai *Makino in Journ. Jap. Bot.* i. p. (105) (1917), japonice; *et l. c.* i. 32 (1918), anglice.—Japon.
simplex (*Blanco*) *Burkill in Kew Bull.* 1935, 319; *Burkill, Dict. Econ. Prod. Mal. Penins.* ii. 2243 (1935), in obs.: Cissus simplex.
Smalliana *L. H. Bailey, Gentes Herbarum*, iii. 207 (1934).—U.S.A. (Florida).
sola *L. H. Bailey*, *l. c.* 203.—U.S.A. (Florida).
Tsoii *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xi. 101 (1932).—China (Kwangtung).
variegata *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 183 (1894), in syn.: Ampelopsis heterophylla.
verrucosa (*Zoll.*) *Backer, Schoolfl. Java*, 253 (1911): Cissus verrucosus.
virginiensis *Juss. ex DC. Monogr. Phan.* v. 352 (1887), in syn.: V. riparia var. palmata *Planch.*
yokogurana *Makino in Journ. Jap. Bot.* i. 31 (1918), hybr. ?—Japon.

VOACANGA Thou. (Apocynac.).
gracilipes (*Miq.*) *Markgraf in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 548 (1935): Orchipeda gracilipes.

VOCHYSIA Juss. (Vochysiac.).
angustifolia *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 738.—Bras. (Amaz.).
biloba *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 52 (1935).—Bras. (Amaz.).
complicata *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 738.—Bras. (Amaz.).
densissima *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 298 (1931).—Peruv.
diversa *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 67 (1931).—Peruv.
ingens *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 50 (1935).—Bras. (Amaz.).
majuscula *Pilger in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 297 (1931).—Peruv.
maxima *Ducke in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 739.—Bras. (Pará).
revoluta *Ducke in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, ii. 51 (1935).—Bras. (Amaz.).

VOLUTARIA Cass. (Compos.).
Belouini (*Humbert*) *Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc*, iii. 818 (1934): Centaurea Belouini.
crupinoides (*Desf.*) *Maire*, *l. c.*: Amberboa crupinoides.
leucantha (*Coss.*) *Maire*, *l. c.* 817: Amberboa leucantha.
maroccana (*Barratte & Murb.*) *Maire*, *l. c.* 818: Amberboa maroccana.
muricata (*L.*) *Maire*, *l. c.* 817: Amberboa muricata.
Omphalodes (*Battand.*) *Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, 1934, xxv. 16: Amberboa Omphalodes.

VOLVULUS Medik. (Convolvulac.).
dahuricus (*Choisy*) *Junger ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 712 (1895): Calystegia dahurica.
pubescens (*Lindl.*) *Voss in Vilmorin*, *l. c.*: Calystegia pubescens.
Soldanella *Junger ex Rilstone in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles*, 1933, x. 766 (1934), nomen.—Anglia.

VOUACAPOUA Aubl. (Legumin.).
Araroba (*Aguiar*) *Lyons, Plant Names Scientific & Popular*, 396 (1900): Andira Araroba.
Aubletii (*Benth.*) *Lyons*, *l. c.*, in obs.: Andira Aubletii.
pallidior *Ducke in Tropical Woods*, 1932, No. 31, 15.—Bras. (Amaz.).
retusa (*Poir.*) *Lyons, Plant Names Scientific & Popular*, 396 (1900): Geoffraea retusa.
spinulosa (*Mart.*) *Lyons*, *l. c.*, in obs.: Andira spinulosa.

VOYARA Aubl.; H. Hallier in Meded. Herb. Leid. No. 35, 23 (1918): **Capparis** L. (Capparidac.).

VOYRIA Aubl. (Gentianac.).
grandiflora *Gilg-Benedict in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 220 (1934).—Guiana Brit.
rhodochroa *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 55.—Guiana Brit.

VOYRIELLA Miq. (Gentianac.).
oxycarpha *Sandwith in Kew Bull.* 1931, 56.—Guiana Brit.; Bras. (Amaz.).

VRIESIA Lindl. (Bromeliac.).
altodaserrae *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcviii. 16 (1932).—Bras. (Paraná; S. Paulo).
atro-purpurea *Alv. Silv. Fl. Mont.* ii. Addenda, p. 3 (1931).—Bras. (Minas Geraes).
Broadwayi *L. B. Smith in Proc. Am. Acad.* lxviii. 149 (1933).—Trinidad.
Dusenii *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcviii. 17 (1932).—Bras. (Paraná).
Erici *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 533 (1935).—Cuba.
glauca *Alv. Silv. Fl. Mont.* ii. Addenda, p. 3 (1931).—Bras. (Minas Geraes).
glutinosa (*Mart.*) *Wawra, Itin. Princ. S. Coburgi*, i. 167 (1883), in obs.; *Mez in Mart. Fl. Bras.* iii. III. 538 (1894): Tillandsia glutinosa.
Hoehneana *L. B. Smith in Proc. Am. Acad.* lxviii. 150 (1933).—Bras. (S. Paulo).
leptantha *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 532 (1935).—Bras. (Rio de Janeiro).
neoglutinosa *Mez in Engl. Pflanzenreich, Bromeliac.* 636 (1935): V. glutinosa *Wawra*.
Schippii *L. B. Smith in Contrib. Gray Herb.* n. s. xcviii. 18 (1932).—Brit. Honduras.
sparsiflora *L. B. Smith*, *l. c.* n. s. xcv. 48 (1931).—Bras. (S. Paulo).
Swartzii (*Baker*) *Mez in Engl. Pflanzenreich, Bromeliac.* 400 (1935): Tillandsia Swartzii.
×tenuis *Hort. ex Mez*, *l. c.* 409.—Hort.
Urbaniana *Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 532 (1935).—Cuba; Hispaniola.

VRYDAGZYNEA Blume (Orchidac.).
albostriata *Schlechter*; *J. J. Smith in Nova Guinea*, xviii. 12 (1935), descr. emend.—N. Guin.
argentistriata *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements*, viii. 183 (1935).—Borneo.
bicostata *Carr*, *l. c.* 185.—Borneo.
Cheesemanii *Ames in Journ. Arn. Arb.* 1933, xiv. 103.—N. Hebrides.
Endertii *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 85 (1931).—Borneo.
semicordata *J. J. Smith*, *l. c.* 86.—Borneo.

VULPIA C. C. Gmel. (Gramin.).
australis (*Nees*) *Blom in Acta Hort. Gothoburg.* 1934, ix. 163: Festuca australis.
eriolepis (*Desv.*) *Blom*, *l. c.* 153, 156: Festuca eriolepis.
fibrosa *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 26 (1932).—Marocc.
Litardiereana (*Maire*) *A. Camus in Riv. Scient.* 1934, xxi. 44: Festuca Litardiereana.
Munozi *Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 133 [1933], nomen.—Marocc.
Pauana (*Font Quer*) *Font Quer, Iter Marocc.* 1930, No. 73 [1932]: Festuca Pauana.
persica (*Boiss. & Buhse*) *Krecz. & Bobr. in Komarov, Fl. URSS*, ii. 535 (1934): Nardurus persicus.
rigida *Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Or.* 133 [1933], nomen.—Marocc.
Schousboei *H. Lindb. Itin. Mediterr.* (*Act. Soc. Sc. Fenn.* n. s. B, i. No. 2) 26 (1932).—Marocc.

W

WAHLENBERGIA Schrad. (Campanulac.).
filipes *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 66 (1933–5).—Mexico.
kowiensis *R. A. Dyer in Kew Bull.* 1934, 265.—Afr. austr. (Cape Prov.).

WALLACEA Spruce (Ochnac.).
multiflora *Ducke in Arquiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro*, i. 207 (1935); *et in Tropical Woods*, 1935, No. 43, 22.—Bras. (Amaz.).

WALLICHIA Roxb. (Palmae).
siamensis *Becc. in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa*, Mem., 1934, xliv. 175.—Siam.

WALTHERIA L. (Sterculiac.).
Ladewi *Rusby in Phytologia*, i. 65 (1934).—Boliv.
Martii *Colla, Herb. Pedem.* i. 433 (1833).—Bras.
urticifolia *Mart. ex Colla*, *l. c.*—Bras.

WARSZEWICZIA Klotzsch (Rubiac.).
obovata *Ducke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 475 (1932).—Bras. (Amaz.).

WASABIA Matsumura (Crucif.).
koreana *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 150.—Corea.
Wasabi (*Sieb.*) *Makino in Journ. Jap. Bot.* viii. 35 (1932): Cochlearia Wasabi.
yunnanensis (*Franch.*) *Nakai in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 151, in obs.: Eutrema yunnanense.

WATSONIA Mill. (Iridac.).
Archbelliae *L. Bolus in Kew Bull.* 1932, 329.—Natal.
Comptonii *L. Bolus, l. c.* 330.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Desmidtii *L. Bolus in Journ. Bot.* 1933, lxxi. 124.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Emiliae *L. Bolus in Kew Bull.* 1932, 327.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Hutchinsonii *L. Bolus, l. c.* 328.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Leipoldtii *L. Bolus, l. c.*—Afr. austr. (Cape Prov.).
lepida *N. E. Brown in Kew Bull.* 1931, 194.—Orange Free State.
neglecta *N. E. Brown, l. c.* 195.—Natal.
pauciflora *L. Bolus in Kew Bull.* 1932, 328.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Plantii *N. E. Brown in Kew Bull.* 1931, 194.—Natal.
pyramidata (*Andr.*) *Stapf in Bot. Mag.* sub t. 9261 (1932): Gladiolus pyramidatus.
Ryderae *L. Bolus in Kew Bull.* 1932, 326.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Stokoei *L. Bolus in S. Afr. Gard.* 1935, xxv. 56, 57.—Afr. austr. (Cape Prov.).
Strubeniae *L. Bolus in Journ. Bot.* 1931, lxix. 261.—Transvaal.

WEBERA Schreb. (Rubiac.).
auriculata *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 537 (1824).—Penins. Mal.
densiflora *Wall. l. c.* 536.—Penins. Mal.
macrophylla *Roxb. Hort. Beng.* 85 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 534 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 697 (1832).—Penins. Mal.
odorata *Roxb. l. c.* 15, nomen; *et l. c.* 535; *et l. c.* 699.—Ind. or. (Assam).
oppositifolia *Roxb. l. c.* 85, nomen; *et l. c.*; *et l. c.* 698.—Ind. or. (Bengal).
scandens *Roxb. l. c.* 15, nomen; *et l. c.* 534; *et l. c.*—Ind. or. (Assam).
truncata *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 538 (1824).—Penins. Mal.

WEBERBAUERA Gilg & Muschl. (Crucif.).
bracteata (*O. E. Schulz*) *Macbride in Candollea*, v. 356 (1934): Pelagatia bracteata.
trichocarpa (*Muschl.*) *Macbride, l. c.*: Eudema trichocarpa.

WEDELIA Jacq. (Compos.).
adhaerens *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1932, xxii. 383.—Guatem.
ambigens *Blake, l. c.* 1931, xxi. 330.—Venez.
macrorrhiza (*Chiov.*) *Chiov. Fl. Somala*, II. 264 (1932): Aspilia macrorrhiza.
pedunculata *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* iii. 428 (1834).—Bras.
penninervia *Blake in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1931, xxi. 331.—Colomb.
rhombifolia *Koster in Fedde, Repert.* xxxiv. 19 (1933).—Ins. Sunda (Wetar).

WEIGELA Thunb. (Caprifoliac.).
Sakaii *Makino & Honda in Journ. Jap. Bot.* 1935, xi. 567, in syn.: Diervilla Sakaii.

WEIGELTIA A. DC. (Myrsinac.).
glomerulata *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 386.—Bras. (Pará).
Lawrancei *Moldenke in Phytologia*, i. 12 (1933).—Colomb.
multiflora *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 387.—Bras. (Matto Grosso).
nanayensis *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 33 (1931).—Peruv.
silvestris *Macbride in Candollea*, vi. 16 (1934).—Peruv.

WEIHEA Spreng. (Rhizophorac.).
Dinklagei *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 11. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 672 (1921), in obs.—Cameroons.
wambugensis *Engl. l. c.* 669, in obs.—Tanganyika Terr.

WEINMANNIA L. (Cunoniac.; Saxifragac., Gen. Pl.).
apurimacensis *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxix. 31 (1931).—Peruv.
baezana *Cuatrec. in An. Univ. Madrid*, iv. Fasc. 2, 262 (1935).—Ecuador.
Clemensiae *v. Steenis in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 3.—Borneo.
ibaguensis *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 26, 19 (1933).—Colomb.
Kajewskii *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 250.—N. Hebrides.
latielliptica *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxix. 31 (1931).—Peruv.
marquesana *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 99 (1935).—Ins. Marquesas.
monticola *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 165.—N. Caled.
ovalifolia *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 28 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
piurensis *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxix. 30 (1931).—Peruv.
raiateënsis *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 28 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
rapensis *Forest Brown in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 130, 100 (1935).—Polynes. (Ins. Rapa).
tannaënsis *Guillaumin in Journ. Arn. Arb.* 1931, xii. 251.—N. Hebrides.
tolimensis *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 26, 18 (1933).—Colomb.
Trollii *O. C. Schmidt in Fedde, Repert.* xxxii. 97 (1933).—Boliv.

WELFIA H. Wendl.; H. Wendl. in Regel, Gartenflora, 1869, xviii. 242, in adnot. *PALMAE.*

WENDIA Hoffm. (Umbellif.).
brevivittata (*Ledeb.*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 191 (1932): Heracleum brevivittatum.
hymenocoleon *Woronow ex Grossheim, l. c.* 190.—Caucas.
incana (*Boiss. & Huet*) *Grossheim, l. c.* 191: Heracleum incanum.
minima (*Lam.*) *Bonnier & Layens in Bonnier, Fl. Compl. France, Suisse & Belg.* iv. 98 [1920]: Heracleum minimum.
pastinacifolia (*K. Koch*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, iii. 191 (1932): Heracleum pastinacifolia.

WENDLANDIA Bartl. (Rubiac.).
Amocana *Cowan in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 277 (1932).—Ind. or. (Bengal).
andamanica *Cowan, l. c.* 295.—Ins. Andaman.
angustifolia *Wight ex Hook. f.*; *Cowan, l. c.* 279, descr. ampl.—Ind. or. (Madras).
appendiculata *Wall. ex Hook. f.*; *Cowan, l. c.* 255, descr.—Nepal.
arborescens *Cowan, l. c.* 296.—Penins. Mal.
Augustinii *Cowan, l. c.* 298.—China (Yunnan).
Burkillii *Cowan, l. c.* 297.—Burma; Penins. Mal.
erythroxylon *Cowan, l. c.* 299.—Formosa.
formosana *Cowan, l. c.* 247.—Formosa.
Gamblei *Cowan, l. c.* 271.—Ind. or. (Madras).
grandis *Cowan, l. c.* 261.—Ind. or. bor.; Upper Burma.
Handelii (*Cowan*) *Cowan, l. c.* 314: W. tinctoria subsp. Handelii.
Merrilliana *Cowan, l. c.* xviii. 303 (1935).—China (Hainan).
nobilis *Geddes in Kew Bull.* 1931, 210.—Siam.
orientalis (*Cowan*) *Cowan in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 314 (1932): W. tinctoria subsp. orientalis.
ovata *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 198 (1934).—Sumatra.
philippinensis *Cowan in Notes Bot. Gard. Edinb.* xvi. 274 (1932).—Ins. Philipp. (Luzon).
sibuyanensis *Cowan, l. c.* 299.—Ins. Philipp. (Sibuyan).
sikkimensis *Cowan, l. c.* 246.—Ind. or. (Sikkim; Bengal).
speciosa *Cowan, l. c.* 254.—Upper Burma; Yunnan.
syringoides (*Cowan*) *Cowan, l. c.* xviii. 187 (1934): W. luzoniensis var. syringoides.
ternifolia *Cowan, l. c.* xvi. 279 (1932).—Indo-China (Tonkin).

WENDLANDIELLA Dammer (Palmae).
polyclada *Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 203 (1931).—Peruv.
simplicifrons *Burret, l. c.* xi. 316 (1932).—Peruv.

WERDERMANNIA O. E. Schulz (Crucif.).
pinnata (*Barnéoud*) *O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 645 (1932): Sisymbrium pinnatum.
pubescens (*Barnéoud*) *O. E. Schulz, l. c.*: Sisymbrium pinnatum var. pubescens.

WERNERIA H. B. & K. (Compos.).
Fontii (*Cuatrec.*) *Cuatrec. in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid*, Ser. Bot., No. 29, 42 (1935), cum descr.: W. humilis var. Fontii.
Lehmannii *Klatt in Ann. Naturhist. Hofmus., Wien*, 1894, ix. 368, in obs.: W. glandulosa *Klatt.*
Mandoniana *Wedd.*; *Klatt, l. c.* 367, descr.—Boliv.
plantaginifolia *Wedd.*; *Klatt, l. c.*, descr.—Boliv.

WETRIA Baill. (Euphorbiac.).
cuneifolia (*Miq.*) *Pax in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* ed. 2, xix c. 119 (1931): Pseudotrewia cuneifolia.

WETTSTEINIOLA Suesseng. in Fedde, Repert. xxxix. 18 (1935). *PODOSTEMACEAE.*
pinnata *Suesseng. l. c.*—Bras. austr.

WHITFORDIODENDRON Elmer (Legumin.).
pubescens (*Craib*) *Burkill in Kew Bull.* 1935, 319; *Burkill, Dict. Econ. Prod. Mal. Penins.* ii. 2256 (1935): Padbruggea pubescens.
sumatranum *Merrill in Papers Mich. Acad. Sc.* 1933, xix. 159 (1934).—Sumatra.

WIDDRINGTONIA Endl. (Pinac.; Conif., Gen. Pl.).
caffra *Berg in Bonplandia*, viii. 190 (1860).—Afr. austr. (Cape Prov.).

WIGANDIA H. B. & K. (Hydrophyllac.).
imperialis *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 690 (1895), in obs.—Hab.?

WIKSTROEMIA Endl. (Thymelaeac.).
Alberti (*Regel*) *Domke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 362 (1932): Stellera Alberti.
altaica (*Thiéb. ex Pers.*) *Domke, l. c.*: Stellera altaica.
amplifolia (*Schlechter*) *Domke in Biblioth. Bot.* cxi. 60 (1934), in obs.—N. Guin.
angustiloba (*Rehder*) *Domke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 363 (1932): Daphne angustiloba.
aurantiaca (*Diels*) *Domke, l. c.* 358: Daphne aurantiaca.
Chamaejasme (*L.*) *Domke, l. c.* 362: Stellera Chamaejasme.
circinata (*Lecomte*) *Domke, l. c.* 361: Stellera circinata.
diffusa (*Lecomte*) *Domke, l. c.* 362: Stellera diffusa.
Fargesii (*Lecomte*) *Domke, l. c.* 361: Stellera Fargesii.
flaviflora (*H. Winkler*) *Domke, l. c.* 363: Daphne flaviflora.
gemmata (*E. Pritz.*) *Domke, l. c.* 362: Daphne gemmata.
Genkwa (*Sieb. & Zucc.*) *Domke, l. c.* 363: Daphne Genkwa.
glabra *Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., vi. 69 (1931).—China (Chekiang).
gracilis (*E. Pritz.*) *Domke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 362 (1932): Daphne gracilis.
hainanensis *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 40 (1935).—China (Hainan).
Lecomteana *Domke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 362 (1932): Stellera chinensis.
leuconeura (*Rehder*) *Domke, l. c.* 363: Daphne leuconeura.
Mairei (*Lecomte*) *Domke, l. c.* 361: Stellera Mairei.
modesta (*Rehder*) *Domke, l. c.* 363: Daphne modesta.
myrtilloides (*Nitsche*) *Domke, l. c.* 362: Daphne myrtilloides.
penicillata (*Rehder*) *Domke, l. c.* 363: Daphne penicillata.
pilosa *Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China*, Bot. Ser., viii. 140 (1932).—China (Chekiang).
pretiosa (*I. B. Balf. & W. W. Smith ex Farrer*) *Domke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 363 (1932): Farreria pretiosa.

WIKSTROEMIA:—
raiateënsis *J. W. Moore in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 102, 32 (1933).—Ins. Societ. (Raiatea).
rosea (*Nakai*) *Domke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 362 (1932): Stellera rosea.
rosmarinifolia (*Rehder*) *Domke, l. c.* 363: Daphne rosmarinifolia.
sericea *Christoph. in Bull. Bishop Mus., Honolulu*, No. 86, 78 (1931).—Ins. Cook (Rarotonga).
sericea *Domke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 356 (1932), non praec.—China (Kiangsi).
tenuiflora (*Bur. & Franch.*) *Domke, l. c.* 362: Daphne tenuiflora.
thibetensis (*Lecomte*) *Domke, l. c.*: Pentathymelaea thibetensis.
turcomanica (*Czerniak.*) *Domke, l. c.*: Stellera turcomanica.
Vaccinium (*Léveillé*) *Rehder in Journ. Arn. Arb.* 1934, xv. 103, cum descr.: Lonicera Vaccinium.
yakushimensis (*Makino*) *Nakai ex Masamune, Prelim. Rep. Veg. Yakus.* 99 (1929); *Masamune in Mem. Fac. Sc. & Agric. Taihoku Imp. Univ.* xi., Bot. No. 4, 316 (1934): W. pauciflora var. yakushimensis.

WILCKIA Scop. (Crucif.).
runcinata (*C. A. Mey.*) *Grossheim, Fl. Kavkaza*, ii. 215 (1930): Malcolmia runcinata.
stenopetala (*Bernh.*) *N. Busch in Fl. Sibir. & Orient. Extr., Crucif.* 595 (1931): Malcolmia stenopetala.

WILCOXIA Britton & Rose (Cactac.).
Schmollii (*Weing.*) *Backeb. Blätter Kakteenforsch.* 1935, Pt. 11, [p. 2]: Cereus Schmollii.

WILLIAMSIA Merrill (Rubiac.).
viridescens *Elmer, Leafl. Philipp. Bot.* ix. 3215 (1934).—Ins. Philipp. (Luzon).

WILLUGHBEIA Roxb. (Apocynac.).
cochinchinensis *Pierre ex Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1094 (1933).—Cambodia; Cochinch.

WILSONIA Hook. in Hook. Bot. Misc. i. 172 (1829). *VERBENACEAE.*
glaberrima *Gill. & Hook. l. c.* 173.—Argent.

WILSONIA Rafin. Specchio, i. 157 (1814). *FAM.?*
linearis *Rafin. l. c.*—Polynes.

WINCHIA A. DC. (Apocynac.).
ternifolia *Pierre ex Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1100 (1933).—Indo-China (Anam).

WINTERA Murr. (Magnoliac.).
monogyna *Van Tiegh. in Journ. de Bot.* 1900, xiv. 291, in obs.—N. Zel.
terminalis *Van Tiegh. l. c.*, in obs.—N. Zel.
Traversii (*J. Buch.*) *Cockayne in Bull. N. Zeal. State For. Serv.* No. 4, 43 (1928): Hymenanthera Traversii.

WISTERIA Nutt. (Legumin.).
koreana *Uyeki, Not. Dendrol. Koreae*, No. 1, reimpr. p. 1 [1935].—Corea.

WITHANIA Pauquy (Solanac.).
adpressa *Coss.; Coss. ex Battand. in Bull. Stat. Recherch. Forest. Nord Afr.* i. 138 (1917); *Battand. Contrib. Fl. Atlant.* [90 b] (1919); *Battand. Maire & Trab. Atlas Fl. Algér.* Fasc. v. 75 (1920).—Marocc.; Alger.
obtusifolia *V. Täckh. in Svensk Bot. Tidskr.* 1932, xxvi. 370.—Aegypt.

WITHERINGIA L'Hérit. (Solanac.).
capsicoides *Mart. ex Colla, Herb. Pedem.* iv. 277 (1835), in obs.—Bras.

WITTMACKIA Mez (Bromeliac.).
Poeppigii (*Baker*) *Mez in Engl. Pflanzenreich, Bromeliac.* 89 (1934): Aechmea Poeppigii.

WRIGHTIA R. Br. (Apocynac.).
Balansae *Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1188 (1933).—Indo-China (Tonkin).
cambodiensis *Pierre; Pitard, l. c.* 1184, descr.—Cambodia; Cochinch.
Lecomtei *Pitard, l. c.* 1188.—Cambodia.

WRIGHTIA:—
macrocarpa *Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1190 (1933).—Indo-China (Tonkin; Anam).
Rheedii *Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl.* iii. 1060 (1834).—Ind. or.
rubriflora *Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine*, iii. 1185 (1933).—Indo-China (Anam).
stellata *Pitard, l. c.* 1186.—Indo-China (Tonkin).

WURMBEA Thunb. (Liliac.).
conferta *N. E. Brown in Kew Bull.* 1931, 453.—Afr. austr. (Cape Prov.).

X

XANTHIUM L. (Compos.).
×Parodii *Widder in Beih. Bot. Centralbl.* liv. A. 338 (1935).—Hort.

XANTHOMYRTUS Diels (Myrtac.).
hienghenensis *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 16.—N. Caled.
Moultonii (*Merrill*) *Merrill in Sarawak Mus. Journ.* iii. 533 (1928): Myrtus Moultonii.
taxifolia (*Ridley*) *Merrill, l. c.* 532: Myrtus taxifolia.

XANTHOPHYLLUM Roxb. (Polygalac.).
Arsatii *C. E. C. Fischer in Kew Bull.* 1932, 176.—Borneo.
geminiflorum (*Dennst.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 16 (1931): Kaulfussia geminiflora.

XANTHOSOMA Schott (Arac.).
×Brownii *Degener, Fl. Hawaiiensis*, Fam. 51 (1932).—Hab.?
purpuratum *K. Krause in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 621 (1932).—Peruv.
trichophyllum *K. Krause, l. c.* 622.—Peruv.

XANTHOSTEMON F. Muell. (Myrtac.).
austro-caledonicus *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 12.—N. Caled.
Baudouini *Guillaumin, l. c.*—N. Caled.
Francii *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 691.—N. Caled.
Grisei *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 13.—N. Caled.
lateriflorus *Guillaumin, l. c.*—N. Caled.
laurinus *Guillaumin, l. c.* 13, in obs., 15, in clavi.—N. Caled.
longipes *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1932, Sér. II. iv. 691.—N. Caled.
Sebertii *Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France*, 1934, lxxxi. 14.—N. Caled.

XANTHOXALIS Small (Oxalidac.).
coloradensis *Rydb. Fl. Colorado*, 220 (1906), in clavi.—U.S.A. (Colorado; S. Dakota).

XANTONNEA Pierre ex Pitard (Rubiac.).
parvifolia (*Kuntze*) *Craib, Fl. Siam. Enum.* ii. 130 (1932): Discospermum parvifolium.

XEROCHLAMYS Baker (Chlaenac.).
Bernieri (*Baill.*) *H. Perrier in Bull. Soc. Bot. France*, 1931, lxxviii. 59: Leptolaena Bernieri.
luteola *H. Perrier, l. c.* 57.—Madag.

XEROPHYTA Juss. (Velloziac.; Amaryllidac., Gen. Pl.).
eglandulosa *H. Perrier in Arch. Bot., Caen*, Bull., 1930, iv. 71.—Madag.

XIMENIA L. (Olacac.).
Rogersii *Burtt Davy, Man. Fl. Pl. & Ferns Transvaal*, Pt. II. p. xxxv. 454 (1932).—Rhodesia; Bechuanaland Protect.; Transvaal.

XOLISMA Rafin. (Ericac.).
alpina (*Urb. & Ekman*) *Sleum. in Fedde, Repert.* xxxvi. 272 (1934), in obs.: Lyonia alpina.
apiculata *Sleum. l. c.* 270.—Santo Domingo.
cryptogonia *Sleum. l. c.*—Santo Domingo.
elongata *Sleum. l. c.* 271.—Santo Domingo.
longelaminata *Sleum. l. c.*—Santo Domingo.
oblongata (*Urb.*) *Sleum. l. c.* 272, in obs.: Lyonia oblongata.
orbiculata *Sleum. l. c.*—Haiti.
pseudotinensis *Sleum. l. c.*—Santo Domingo.
Urbaniana *Sleum. l. c.* 273.—Santo Domingo.

XYLINABARIOPSIS Pitard in Lecomte & Humbert, Fl. Gén. Indo-Chine, iii. 1261 (1933). *APOCYNACEAE.*
Reynaudi (*Jumelle*) *Pitard, l. c.*: Xylinabaria Reynaudi.

XYLOCARPUS Koenig (Meliac.).
gangeticus (*Prain*) *C. E. Parkinson in Indian Forester*, 1934, lx. 140: Carapa moluccensis var. gangetica.

XYLOPHYLLA L. (Euphorbiac.).
parviflora *Bellardi ex Colla, Herb. Pedem.* v. 106 (1836), in obs.—Hab.?

XYLOPIA L. (Annonac.).
conjungens *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* x. 333 (1931).—Peruv.
dibaccata *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1931, lxxvi. 161.—N. Caled.
Dunaliana *Linden & Planch.*; *Sprague in Kew Bull.* 1926, 34: Unona xylopioides *Dunal.*
excellens *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* xii. 210 (1934).—Bras. (Amaz.).
gilviflora *Exell in Journ. Bot.* 1935, lxxiii. Suppl., 4.—Congo Lusit.
gracilis (*R. E. Fries*) *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* x. 92 (1930): X. brasiliensis var. gracilis.
longicuspis *R. E. Fries, l. c.* xii. 210 (1934).—Bras. (Amaz.).
longifolia (*Sagot*) *R. E. Fries, l. c.* x. 111 (1930): X. nitida var. longifolia.
macrocarpa *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 53 (1927), in syn.: X. villosa.
Mendoncae *Exell in Journ. Bot.* 1934, lxxii. 280.—Angola.
Otunga *Exell, l. c.* 1931, lxix. 99.—Cameroons; Congo Lusit.
Peekelii *Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xi. 83 (1931).—N. Guin.
peruviana *R. E. Fries in Acta Hort. Berg.* x. 117 (1930).—Peruv.
pilosa *Benth. ex R. E. Fries, l. c.* 112, in syn.: X. Benthami.
platypetala *R. E. Fries, l. c.* xii. 211 (1934).—Colomb.
Poeppigii *R. E. Fries, l. c.* x. 121 (1930).—Peruv.
polyantha *R. E. Fries, l. c.* xii. 208 (1934).—Bras. (Pará).
Talbotii *Exell in Journ. Bot.* 1931, lxix. 98.—Nigeria.
tembelingensis *M. R. Henderson in Gard. Bull. Straits Settlements*, vii. 89 (1933).—Penins. Mal.

XYLOSMA G. Forst. (Flacourtiac.; Bixac., Gen. Pl.).
anisophylla *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 135 (1932).—Mexico; Brit. Honduras.
armata *Macbride in Candollea*, v. 391 (1934).—Peruv.
bahamensis (*Britton*) *Standley in Tropical Woods*, 1933, No. 34, 41: Myroxylon bahamense.
capillipes *Guillaumin in Lecomte, Not. Syst.* v. 14 (1935).—N. Caled.
celastrina (*H. B. & K.*) *Standley in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., viii. 318 (1931): Flacourtia celastrina.
characantha *Standley, l. c.* xi. 136 (1932).—Brit. Honduras; Guatem.
cochine *Lour. ex Gomes in Mem. Acad. Sc. Lisb. Cl. Sc. Pol. Mor. Bel.-Let.* n. s. iv. (1), 29 (1868); *Merrill in Trans. Am. Phil. Soc.* n. s. xxiv. II. 16 (1935): Daphne Cannabina *Lour.*
litoralis *Däniker in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, 1933, lxxviii. Beibl. 19, 278.—Ins. Loyauté.
minutiflora *Macbride in Candollea*, v. 392 (1934).—Peruv.
pilosa *Macbride, l. c.* 391.—Peruv.
rhombifolia (*Britton & P. Wilson*) *Sleum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, xii. 56 (1934): Myroxylon rhombifolium.
Ruiziana *Sleum. l. c.* xii. 476 (1935).—Peruv.
Rusbyana *Sleum. l. c.* xii. 56 (1934): X. ovatum *Rusby.*
terrae-reginae *C. T. White & Sleum. l. c.* xii. 477 (1935).—Austral. (Queensland).
Tessmannii *Sleum. l. c.*—Peruv.

XYLOTHECA Hochst. (Flacourtiac.; Bixac., Gen. Pl.).
Solmsii *Gilg ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. II. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde*, ix.) 567 (1921), in obs.—Afr. austr.-occ.

XYRIS L. (Xyridac.).
atriceps *Malme in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 325.—Venez.
capillaris *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 5, p. 8 (1932).—Angola.
capnoides *Malme, l. c.* p. 4.—Angola.
cryptocarpa *Rusby ex Malme, l. c.* xxv. A. No. 12, p. 4 (1933), pro syn.: X. subulata.
Drummondii *Malme, l. c.* p. 14.—U.S.A. (Alabama).
duidensis *Malme in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 325.—Venez.
elegantula *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiv. A. No. 5, p. 5 (1932).—Angola.
Gossweileri *Malme, l. c.* p. 3.—Angola.
lugubris *Malme in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 324.—Venez.
Mexiae *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxv. A. No. 12, p. 13 (1933).—Bras. (Minas Geraes).
peregrina *Malme, l. c.* p. 9.—Bras. (Minas Geraes).
Pocockii *Malme, l. c.* xxiv. A. No. 5, p. 7 (1932).—N. Rhodesia.
rhodesiana *Malme in Bot. Notiser*, 1932, 12.—Rhodesia.
stenophylloides *Malme in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 323.—Venez.
subalata *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxv. A. No. 12, p. 12 (1933), sphalm.: X. bialata.
subglabrata *Malme in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 322.—Venez.
subvacillans *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxv. A. No. 12, p. 11 (1933).—Bras. (S. Paulo).
Tatei *Malme in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 323.—Venez.
Theodori *Malme in Bot. Notiser*, 1932, 13.—Rhodesia.
trichophylla *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxv. A. No. 12, p. 7 (1933).—Bras. (Minas Geraes).

XYSMALOBIUM R. Br. (Asclepiadac.).
amplifolium *Weimarck in Bot. Notiser*, 1935, 369.—S. Rhodesia.
dilatatum *Weimarck, l. c.* 370.—S. Rhodesia.
graniticola *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* ii. 61 (1931), in syn.: Dalzielia oblanceolata.

Y

YOANIA Maxim. (Orchidac.).
amagiensis *Nakai & Maekawa in Proc. Imp. Acad., Tokyo*, 1931, vii. 319.—Japon.

YOUNGIA Cass. (Compos.).
alaica *Kraschen. in Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS*, Ser. I. Fasc. 1, 182 (1933), in syn.: Crepis alaica.

YUCCA L. (Liliac.).
argyrophylla *Nicholson, Ill. Dict. Gard.* ii. 37 (1885), in syn.: Furcraea Bedinghausii.
arizonica *McKelvey in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 270: Y. Treleasei *Macbride*.
elephantipes *Hort. ex Regel, Gartenflora*, 1859, viii. 35, pro syn.: Y. aloifolia.
laevigata *Hort. ex Nicholson, Ill. Dict. Gard.* iv. 234 (1887), in syn.: Y. Peacockii.
mohavensis *Sarg. in Garden & Forest*, 1896, ix. 104, in obs.—U.S.A. (Calif.).
Thornberi *McKelvey in Journ. Arn. Arb.* 1935, xvi. 268.—U.S.A. (Arizona).

YUSHUNIA Kamik. in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard. 1933, iii. 77. *LAURACEAE*.
randaiensis (*Hayata*) *Kamik. l. c.* 78: Lindera randaiensis.

Z

ZALACCA [Rumph.] Reinw. ex Blume in Schultes f. Syst. vii. 1333 (1830). *PALMAE*.
Zalacca (*Gaertn.*) *Voss in Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1152 (1895): Calamus Zalacca.

ZALUZANIA Pers. (Compos.).
Robinsonii *Sharp in Ann. Missouri Bot. Gard.* 1935, xxii. 105.—Mexico.
subcordata *Sharp, l. c.* 111.—Mexico.

ZAMIA L. (Cycadac.).
amplifrons *Hort. ex Schuster in Engl. Pflanzenreich, Cycadac.* 130, 142 (1932), in syn.: Ceratozamia mexicana; Zamia Wallisii.
brachyphylla *Hort. ex Schuster, l. c.* 159, in syn.: Z. angustifolia.
calcicola *Britton ex Schuster, l. c.* 155, in syn.: Z. media.
Chamberlainii *Schuster, l. c.* 153.—Cuba.
elegantissima *Hort. ex Schuster, l. c.* 112, in syn.: Encephalartos Altensteinii.
farinosa *Corda ex Schuster, l. c.* 145, in syn.: Z. Loddigesii.
ferruginea *Hort. ex Schuster, l. c.*, in syn.: Z. Loddigesii.
Forgetiana *Hort. ex Schuster, l. c.* 141, in syn.: Z. Skinneri.
Forsteri *Hort. ex Schuster, l. c.* 145, in syn.: Z. Fischeri.
fuscata *Hort. ex Schuster, l. c.* 138, in syn.: Z. Verschaffeltii.
glabra *Hort. ex Schuster, l. c.* 112, in syn.: Encephalartos Altensteinii.
glauca *Hort. ex Schuster, l. c.* 115, 117, in syn.: Encephalartos spp.
glaucescens *Hort. ex Schuster, l. c.* 115, in syn.: Encephalartos Lehmannii.
gracilis *Karw. ex Schuster, l. c.* 148, in syn.: Z. Loddigesii.
Houtteana *Dyer ex Schuster, l. c.* 137, in syn.: Z. Tuerckheimii.
insignis *Hort. ex Schuster, l. c.* 160, nomen.—Hort.
Kalbreyeri *Dammer ex Schuster, l. c.* 142, in syn.: Z. montana.
Katzeri *Regel ex Schuster, l. c.* 112, in syn.: Encephalartos Altensteinii.
linearis *Miq. ex Schuster, l. c.* 159, in syn.: Z. angustifolia.
Macleayi *Hort. ex Schuster, l. c.* 100, in syn.: Macrozamia Denisonii.
nigra *Hort. ex Schuster, l. c.* 145, in syn.: Z. Loddigesii.
Ortgiesi *A. Br. ex Schuster, l. c.* 142, in syn.: Z. pseudoparasitica.
rigida *Karw. ex Schuster, l. c.* 125, in syn.: Dioön edule.
rotundifolia *Hort. ex Schuster, l. c.* 152, in syn.: Z. pygmaea.
spadicea *Karw. ex Schuster, l. c.* 148, in syn.: Z. Loddigesii.
subcoriacea *Wendl. ex Schuster, l. c.* 155, in syn.: Z. media.
van-Houttei *Hort. ex Schuster, l. c.* 137, in syn.: Z. Tuerckheimii.
Verbruggiana *Hort. ex Schuster, l. c.* 159, in syn.: Z. angustifolia.
Vroomi *Hort.*; *Serres, Jard. Bot. Brux.* 194 (1903); cf. *Schuster in Engl. Pflanzenreich, Cycadac.* 112 (1932), in syn.: Encephalartos Altensteinii.
Wielandii *Schuster, l. c.* 149.—Mexico.

ZAMIOCULCAS Schott (Arac.).
lanceolata *A. Peter in Nachr. Ges. Wiss. Gött. Math.-phys. Kl.* pp. 185–225 (1929); cf. *K. Krause in Engl. Jahrb.* lxiv. Literaturber. p. 9 (1931).—Afr. Lusit. Or.

ZANHA Hiern (Burserac.).
golungensis *Hiern*; *A. Cheval. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1933, Sér. II. v. 156, descr. ampl.—Dahomey.
Vuilletii *A. Cheval. l. c.* 157.—Sudan. Gall.

ZANTHOXYLUM L. (Rutac.).
attiense *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 481 (1928), in syn.: Fagara attiensis.
caudatum *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 37 (1931).—Zeylan.
crenatum *A. Cheval.*; *Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr.* i. 481 (1928), in syn.: Fagara angolensis.
Dugandii *Standley in Tropical Woods*, 1935, No. 42, 24.—Colomb.
Krukovii *A. C. Smith in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1933, lx. 358.—Bras. (Matto Grosso).

ZANTHOXYLUM:—
Le-Ratii *Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1934, Sér. II. vi. 305.—N. Caled.
Limonella (*Dennst.*) *Alston in Trimen, Hand-Book Fl. Ceylon*, vi. Suppl., 37 (1931): Tipalia Limonella.
paraguariense (*Chodat & Hassler*) *Standley in Tropical Woods*, 1933, No. 34, 41: Fagara paraguariensis.
semiarticulatum *St. John & Hosaka ex Degener, Fl. Hawaiiensis*, Fam. 179 (1932).—Ins. Sandvic. (Oahu).

ZEA L. (Gramin.).
gigantea *Hort. ex Vilmorin's Blumeng.*, ed. 3, *Sieb. & Voss*, i. 1189 (1895), in syn.: Z. Mays var. virginica *Bonafous*.
gracillima *Hort. ex Vilmorin, l. c.* 1190, in syn.: Z. Mays var. gracillima *Koern.*
minima *Hort. ex Vilmorin, l. c.*, in syn.: Z. Mays var. gracillima *Koern.*
vittata *Hort. ex Vilmorin, l. c.* 1189, in syn.: Z. Mays var. japonica *Koern.*

ZEMISNE Degener & Sherff in Am. Journ. Bot. 1935, xxii. 708. *COMPOSITAE*.
Menziesii *Degener & Sherff, l. c.*—Ins. Sandvic.

ZEPHYRANTHELLA (Pax) Pax in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, xv a. 416 (1930). *AMARYLLIDACEAE*.
[HIPPEASTRUM subgen. ZEPHYRANTHELLA Pax.]
tubispatha (*Pax*) *Pax, l. c.*: Hippeastrum tubispathum.

ZEPHYRANTHES Herb. (Amaryllidac.).
Briquetii *Macbride in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago*, Bot. Ser., xi. 9 (1931).—Peruv.
parvula (*Seub.*) *Herter, Fl. Urug. Pl. Vasc.* (*Estud. Bot. Reg. Urug.* iv.) 49 (1931): Amaryllis parvula.
Simpsoni *Chapm. Fl. S. U. States*, ed. 2, Suppl. 2, 696 (1892); cf. *Year Book Amer. Amaryll. Soc.* 1935, ii. 84.—U.S.A. (Florida).

ZERNA Panz. (Gramin.).
adjarica (*Somm. & Lev.*) *Nevski in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 17, p. 18 (1934), in clavi: Bromus adjaricus.
angrenica (*Drobov*) *Nevski, l. c.*, in clavi: Bromus angrenicus.
Biebersteinii (*Roem. & Schult.*) *Nevski, l. c.*, in clavi: Bromus Biebersteinii.
cappadocica (*Boiss. & Bal.*) *Nevski, l. c.*, p. 17, in clavi: Bromus cappadocicus.
irkutensis (*Komarov*) *Nevski, l. c.*, in clavi: Bromus irkutensis.
kopetdagensis (*Drobov*) *Nevski, l. c.*, in clavi: Bromus kopetdagensis.
Korotkyi (*Drobov*) *Nevski, l. c.*, in obs.: Bromus Korotkyi.
occidentalis *Nevski, l. c.* p. 18, in clavi.—Sibir. occ.
ornans (*Komarov*) *Nevski, l. c.* p. 17, in clavi: Bromus ornans.
pamirica (*Drobov*) *Nevski, l. c.* p. 18, in clavi: Bromus pamiricus.
Paulsenii (*Hackel*) *Nevski, l. c.*, in clavi: Bromus Paulsenii.
Richardsonii (*Link*) *Nevski, l. c.* p. 17, in clavi: Bromus Richardsonii.
riparia (*Rehm.*) *Nevski, l. c.*, in clavi: Bromus riparius.
stenostachya (*Boiss.*) *Nevski, l. c.* p. 16, in obs.: Bromus stenostachyus.
tomentella (*Boiss.*) *Nevski, l. c.* p. 17, in clavi: Bromus tomentellus.
tomentosa (*Trin.*) *Nevski, l. c.* p. 18, in clavi: Bromus tomentosus.
turkestanica (*Drobov*) *Nevski, l. c.* p. 13: Bromus turkestanicus.
tyttholepis *Nevski, l. c.* p. 16.—Turkestan. (Thian Shan).
variegata (*M. Bieb.*) *Nevski, l. c.* p. 18, in clavi: Bromus variegatus.
vogulica (*Soczava*) *Nevski, l. c.* p. 17, in clavi: Bromus vogulicus.

ZEUXINE Lindl. (Orchidac.).
agyokuana *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo*, 1934, xlviii. 433.—Formosa.
Bonii *Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1931, Sér. II. iii. 326.—Indo-China (Tonkin).

ZEUXINE:—
boninensis *Tuyama in Bot. Mag., Tokyo,* 1935, xlix. 369.—Ins. Bonin.
Evrardii *Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1931, Sér. II. iii. 326.—Indo-China (Anam).
fluvida *Fukuyama in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard.* 1933, iii. 81.—Formosa.
kantokeiensis *Tatewaki & Masamune in Bot. Mag., Tokyo,* 1932, xlvi. 772.—Formosa.
kutaiensis *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 89 (1931).—Borneo.
linguella *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements,* viii. 71 (1935).—Borneo.
Niijimai *Tatewaki & Masamune in Bot. Mag., Tokyo,* 1932, xlvi. 772.—Formosa.
papillosa *Carr in Gard. Bull. Straits Settlements,* viii. 189 (1935).—Borneo.
petakensis *J. J. Smith in Bull. Jard. Bot. Buitenz.* Sér. III. xi. 87 (1931).—Borneo.
rupicola *Fukuyama in Bot. Mag., Tokyo,* 1935, xlix. 292.—Formosa.
thanmoiensis *Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 1931, Sér. II. iii. 327.—Indo-China (Tonkin).
tonkinensis *Gagnep. l. c.* 328.—Indo-China (Tonkin).
yakusimensis *Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric., Taiwan,* 1931, iii. 393.—Japon.

ZEXMENIA La Llave (Compos.).
pustulata *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 80 (1933–5).—Mexico.

ZEYDORA Lour. ex Gomes in Mem. Acad. Sc. Lisb. Cl. Sc. Pol. Mor. Bel.-Let. n. s. iv. (1), 27 (1868); Merrill in Trans. Am. Phil. Soc. n. s. xxiv. II. 15, 210 (1935), in syn.: **Pueraria** DC. (Legumin.).
agrestis *Lour. ex Gomes, l. c.*; *Merrill, l. c.*, in syn.: Pueraria montana.

ZIERIA Sm. (Rutac.).
collina *C. T. White in Proc. Roy. Soc. Queensl.* 1931, xliii. 46 (1932).—Austral. (Queensland).

ZIMMERMANNIA Pax (Euphorbiac.).
ovata *E. A. Bruce in Kew Bull.* 1933, 468.—Kenya Col.

ZINGIBER Adans. (Zingiberac.; Scitamin., Gen. Pl.).
compactum *Stokes, Bot. Mat. Med.* i. 68 (1812): Amomum Cardamomum.
elatum *Roxb. Hort. Beng.* 1 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, i. 56 (1820); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 57 (1832).—Ind. or. (Bengal).
panduratum *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 53; *et l. c.* 55.—Burma.
villosum (*Lour.*) *Stokes, Bot. Mat. Med.* i. 63 (1812): Amomum villosum.

ZINNIA L. (Compos.).
barrancae *M. E. Jones, Contrib. West. Bot.* No. 18, 78 (1933–5).—Mexico.
dahliiflora *Hort. ex Kilgus in Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit.* 1933, xlviii. 14, in obs.—Hort.

ZIZANIA L. (Gramin.).
interior (*Fassett*) *Rydb. in Brittonia,* i. 82 (1931): Z. aquatica var. interior.
texana *Hitchcock in Journ. Wash. Acad. Sc.* 1933, xxiii. 454.—U.S.A. (Texas).

ZIZANIOPSIS Doell & Aschers. (Gramin.).
bonariensis (*Bal. & Poitr.*) *Speg. in An. Mus. Nac. Buenos Aires,* vii. 183 (1902): Zizania bonariensis.

ZIZIA Koch (Umbellif.).
latifolia *Small, Man. Southeast. Fl.* 982 (1933).—U.S.A. (Florida).
sylvatica *Benke in Rhodora,* 1933, xxxv. 45.—U.S.A. (Illinois).

ZIZIPHORA L. (Labiat.).
Woronowii *Maleev in Trav. Inst. Bot. Tiflis,* i. 120 (1934).—Caucas.

ZIZIPHUS Mill. (Rhamnac.).
albens *Roxb. Hort. Beng.* 17 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 355 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 607 (1832).—China.
Angolito *Standley in Tropical Woods,* 1932, No. 32, 20.—Colomb.
calophylla *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 366 (1824).—Penins. Mal.
Caracutta *Buch.-Ham. ex Roxb. Hort. Beng.* 17 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 361 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 612 (1832).—Ind. or. (Mysore).
elegans *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 366 (1824).—Penins. Mal.
elliptica *Roxb. Hort. Beng.* 17 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 359 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 610 (1832).—Ind. or. (Travancore).
flavescens *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 367 (1824).—Reg. Himal.
flexuosa *Wall. l. c.* 365.—Reg. Himal.
floribunda *Wall. l. c.* 368.—Ind. or.
Fungii *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiii. 61 (1934).—China (Hainan).
glabra *Roxb. Hort. Beng.* 17 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 364 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 614 (1832).—Ind. or. (Bengal).
hamosa *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 369 (1824).—Nepal.
Havilandii *Ridley in Kew Bull.* 1931, 495.—Borneo.
incurva *Roxb. Hort. Beng.* 17 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 364 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 614 (1832).—Nepal.
latifolia *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 355; *et l. c.* 607.—Ind. or. (Madras).
Laui *Merrill in Lingnan Sc. Journ.* xiv. 32 (1935).—China (Hainan).
macrophylla *Ridley in Kew Bull.* 1931, 494.—Borneo.
microphylla *Roxb. Hort. Beng.* 17 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 362 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 613 (1832).—Ind. or.
nitida *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 358; *et l. c.* 609.—China.
oppositifolia *Wall. in Roxb. Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 370 (1824).—Nepal.
soporifer (*Lour.*) *Stokes, Bot. Mat. Med.* i. 433 (1812): Rhamnus soporifer.
tomentosa *Roxb. Hort. Beng.* 17 (1814), nomen; *Fl. Ind.*, ed. *Carey & Wall.*, ii. 360 (1824); *Fl. Ind.*, ed. *Carey*, i. 611 (1832).—Ind. or. (Bengal).
trinervia *Roxb. l. c.*, nomen; *et l. c.* 354; *et l. c.* 606.—Ind. or. (Mysore).
yucatanensis *Standley in Tropical Woods,* 1932, No. 32, 16.—Mexico.

ZOLLIKOFERIA Nees (Compos.).
polydichotoma (*Ostenf.*) *Iljin, Crit. Obs. Chondr.* (*Bull. Sect. Rubber-Produc. Pl., Moscow,* No. 3) 61 (1930): Chondrilla polydichotoma.

ZORNIA J. F. Gmel. (Legumin.).
cuyabensis *Malme in Arkiv Bot., Stockh.* xxiii. A. No. 13, 75 (1931).—Bras. (Matto Grosso).
subperforata *Malme, l. c.* 26.—Bras. (Rio Grande do Sul).

ZOSTERA L. (Potamogetonac.; Naiadac., Gen. Pl.).
asiatica *Miki in Bot. Mag., Tokyo,* 1932, xlvi. 776.—Sakhalin; Ins. Kuril.; Corea; Japon.
caespitosa *Miki, l. c.* 780.—Manchur.; Corea; Japon.
capensis *Setchell in Proc. Nat. Acad. Sc.* 1933, xix. 815.—Afr. austr. (Cape Prov.).
caulescens *Miki in Bot. Mag., Tokyo,* 1932, xlvi. 779.—Corea; Japon.
novazelandica *Setchell in Proc. Nat. Acad. Sc.* 1933, xix. 816.—N. Zel.

ZSCHOKKEA Muell.-Arg. (Apocynac.).
panamensis *R. E. Woodson in Tropical Woods,* 1935, No. 44, 22.—Panamá.

ZYGIA P. Br. (Legumin.).
dulcis (*Benth.*) *Lyons, Plant Names Scientific & Popular,* ed. 2, 503 (1907): Pithecellobium dulce.
Saman (*Benth.*) *Lyons, l. c.*: Pithecellobium Saman.

ZYGOPETALUM Hook. (Orchidac.).
Sanderae *Sanders' Orchid Guide,* ed. rev. 450 (1927).—Hab.?
Tatei *Ames & C. Schweinf. in Bull. Torr. Bot. Cl.* 1931, lviii. 351.—Venez.

ZYGOPHYLLUM L. (Zygophyllac.).
aureum *Dinter ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 735 (1915), in obs.—Afr. austr.-occ.
Dielsianum (*Popov*) *Popov in Acta Univ. As. Med.* Ser. VIII b, Bot. Fasc. 3, 75 (1928): Z. miniatum subsp. Dielsianum.
fabagoides *Popov in Bull. Univ. As. Centr.* xi. 113 (1925).—Turkestan.
ifniense *Caballero in Trab. Mus. Cienc. Nat., Madrid,* Ser. Bot., No. 30, 22 (1935).—Marocc.
iliense *Popov in Bull. Univ. As. Centr.* xii. 112 (1926).—Turkestan.
laxum *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 735 (1915), in obs.—Great Namaq.
obliquum *Popov in Bull. Univ. As. Centr.* xi. 113 (1925).—As. centr.
oxycarpum *Popov, l. c.* xii. 112 (1926); *et l. c.* Suppl., 12.—Turkestan.; Mongol.
ramosissimum *Popov, l. c.* xi. 115 (1925).—Turkestan.
Rangei *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 735 (1915), in obs.—Great Namaq.
Rogersii *Compton in Trans. Roy. Soc. S. Afr.* xix. 296 (1931).—Afr. austr. (Cape Prov.).
Schaeferi *Engl. in Engl. Pflanzenw. Afr.* iii. 1. (*Engl. & Drude, Veg. der Erde,* ix.) 732 (1915), in obs.—Namaqualand.

ZYGOSTATES Lindl. (Orchidac.).
Octavioreisii *C. Porto & Brade in Archiv. Inst. Biol. Veg., Rio de Janeiro,* ii. 214 (1935).—Bras. (Rio de Janeiro).

ZYGOSTEMMA Van Tiegh. in Ann. Sc. Nat. Sér. IX. x. 164 (1909), in obs. *DIPSACACEAE.*
creticum (*L.*) *Van Tiegh. l. c.*, in obs.: Scabiosa cretica.

NOMINA GENERICA NOVA ATQUE NEGLECTA SUB FAMILIIS DISPOSITA

A

ACANTHACEAE
Calycostylis *Hort. ex Vilmorin*, in syn.
Chingiacanthus *Hand.-Mazz.*
Chlamydostachya *Mildbr.*
Kudoacanthus *Hosokawa*
Parajusticia *Benoist*, sine descr.
Plagiotheca *Chiov.*
Psiloësthes *Benoist*, sine descr.
Schliebenia *Mildbr.*
Streptosiphon *Mildbr.*
Thamnojusticia *Mildbr.*

ACERACEAE
Argentacer *Small*
Rufacer *Small*

AMARANTHACEAE
Irenella *Suesseng.*
Marcelliopsis *Schinz*
Pseudocentema *Chiov.*
Pseudoplantago *Suesseng.*

AMARYLLIDACEAE
Hannonia *Braun-Blanquet & Maire*
Pamianthe *Stapf*
Zephyranthella (*Pax*) *Pax*

AMPELIDACEAE
Cyphostemma (*Planch.*) *Alston*

ANACARDIACEAE
Melanocommia *Ridley*
Pachycormus *Coville*
Scassellatia *Chiov.*

ANNONACEAE
Bocageopsis *R. E. Fries*
Cremastosperma *R. E. Fries*
Duckeanthus *R. E. Fries*
Enneastemon *Exell*
Guatteriopsis *R. E. Fries*
Mischogyne *Exell*
Neostenanthera *Exell*
Onychopetalum *R. E. Fries*
Phoenicanthus *Alston*
Pityothamnus *Small*
Uvariodendron (*Engl. & Diels*) *R. E. Fries*

APOCYNACEAE
Allomarkgrafia *R. E. Woodson*
Argyronerium *Pitard*
Asketanthera *R. E. Woodson*
Cufodontia *R. E. Woodson*
Faskia *Lour. ex Gomes*
Fernaldia *R. E. Woodson*
Galactophora *R. E. Woodson*
Ixodonerium *Pitard*
Macoubea *Aubl.*; *H. Hallier*
Oïstanthera *Markgraf*
Ostreocarpus *Rich. ex Endl.*
Pagiantha *Markgraf*
Peltastes *R. E. Woodson*
Piaggiaea *Chiov.*
Salpinctes *R. E. Woodson*
Testudipes *Markgraf*
Xylinabariopsis *Pitard*

ARACEAE
Heterolobium *Peter*
Microculcas *Peter*

ARALIACEAE
Diplopanax *Hand.-Mazz.*
×Fatshedera *Guillaumin*

ASCLEPIADACEAE
Aphanostelma *Malme*
Aphanostelma *Schlechter*
Asclepiodella *Small*
Biventraria *Small*
Cyclodon *Small*
Edisonia *Small*
Heliostemma *R. E. Woodson*
Hoodiopsis *Luckhoff*
Luckhoffia *A. White & Sloane*
Odontostephana *Alexander*
Stapelianthus *Choux*
Stapeliopsis *Choux*
Stapeliopsis *Phillips*
Stultitia *Phillips*

B

BALANOPHORACEAE
Acroblastum *Soland. in Seem.*, in syn.; *Setchell*, cum descr.
Balaneikon *Setchell*
Exorhopala *v. Steenis*

BALSAMINACEAE
Impatientella *H. Perrier*

BIGNONIACEAE
Nouletia *Endl.*
Paratecoma *Kuhlm.*
Pseudocalymma *A. Sampaio & Kuhlm.*

BOMBACACEAE
Aguiaria *Ducke*
Huberodendron *Ducke*

BORAGINACEAE
Allocaryastrum *A. Brand*
Amphibologyne *A. Brand*
Collococcus *P. Br.*; *H. Hallier*
Cynoglossopsis *A. Brand*
Echiochilopsis *Caballero*
Echiostachys *Levyns*
Embadium *J. M. Black*
Glyptocaryopsis *A. Brand*
Lithococca *Small ex Rydb.*
Montjolya *Friesen*
Myriopus *Small*
Myxa *Friesen*
Omphalolappula *A. Brand*
Patagonula *L.*
Sclerocaryopsis *A. Brand*
Ulmarronia *Friesen*
Varroniopsis *Friesen*

BROMELIACEAE
Abromeitiella *Mez*
Bakerantha *L. B. Smith*
Mezobromelia *L. B. Smith*
Neoregelia *L. B. Smith*

BURSERACEAE
Haplolobus *H. J. Lam*
Lipara *Lour. ex Gomes*

C

CACTACEAE
Acanthocalycium *Backeb.*
Aïzoanthemum *Dinter*
Andenea *Kreuzinger*
Armatocereus *Backeb.*
Bridgesia *Backeb.*

CACTACEAE:—
Brittonia *Hort.*
Chilenia *Backeb.*
Chileniopsis *Backeb.*
Clavarioidia *Kreuzinger*
Corynopuntia *F. M. Knuth*
Cylindropuntia (*Engelm.*) *F. M. Knuth*
Eulychnocactus *Backeb.*
Fobea *Frič ex Bödeker*
Haageocactus *Backeb.*
Haageocereus *Backeb.*
Islaya *Backeb.*
Mediolobivia *Backeb.*
Meyenia *Backeb.*
Pseudoëspostoa *Backeb.*
Rebulobivia *Frič & Schelle ex Backeb. & F. M. Knuth*, in syn.
Rhodocactus (*A. Berger*) *F. M. Knuth*
Spegazzinia *Backeb.*

CAMPANULACEAE
Cyrtandroidea *Forest Brown*
Jasionella *Stoyanoff & Stefanoff*
Rotantha *Small*

CANELLACEAE
Capsicodendron *Hoehne*
Dawea *Sprague ex Dawe*, in syn.

CAPPARIDACEAE
Bachmannia *Pax*
Neocleome *Small*
Voyara *Aubl.*; *H. Hallier*

CARYOPHYLLACEAE
Gastronychia *Small*
Illecebrella *Kuntze*
Krauseola *Pax & K. Hoffm.*
Mollugophytum *M. E. Jones*
Phryna (*Boiss.*) *Pax & K. Hoffm.*
Phrynella *Pax & K. Hoffm.*
Pleiosepalum *C. E. Moss*
Plettkea *Mattf.*
Polium *Stokes*
Pseudostellaria *Pax*
Reicheëlla *Pax*
Segetella *Desv.*

CELASTRACEAE
Chingithamnus *Hand.-Mazz.*
Goniodiscus *Kuhlm.*
Hexaspora *C. T. White*

CENTROLEPIDACEAE
Pseudalepyrum *Dandy*

CHENOPODIACEAE
Aellenia *Ulbr.*
Austrobassia *Ulbr.*
Duriala (*R. H. Anders.*) *Ulbr.*
Haloxanthium *Ulbr.*
Iljinia *Korovin*
Micromonolepis *Ulbr.*
Neopreissia *Ulbr.*
Rumicastrum *Ulbr.*
Sclerobassia *Ulbr.*
Scleroblitum *Ulbr.*

CLETHRACEAE
Schizocardia *A. C. Smith & Standley*

COMBRETACEAE
Mekistus *Lour. ex Gomes*

COMMELINACEAE
Neomandonia *Hutchinson*
Rectanthera *Degener*

COMPOSITAE
Adenothamnus *Keck*
Ageratinastrum *Mattf.*
Alatoseta *Compton*
Alepidocline *Blake*
×Anthechrysanthemum *Domin*
×Anthe-Matricaria *Geisenheyn. ex Domin*, in syn.
Arnicula *Kuntze*
Brachionostylum *Mattf.*
Calendella *Kuntze*
×Carduocirsium *Sennen*
×Centaureopappus *Hort. ex Möller*
Chaetospira *Blake*
Duidaea *Blake*
Eriopus *D. Don*
Fontquera *Maire*
Greenmaniella *Sharp*
Haarera *Hutchinson & E. A. Bruce*
Harleya *Blake*
Hutchinsonia *M. E. Jones*
Inezia *Phillips*
Mattfeldia *Urb.*
Neotysonia *Dalla Torre & Harms*
Paua *Caballero*
Philyrophyllum *O. Hoffm.*
×Pseudomatricaria *Domin*
×Railliautia *Sherff*
Schischkinia *Iljin*
Smallanthus *Mackenzie*
×Solidaster *Wehrhahn*
Stenopadus *Blake*
Syreitschikovia *Pavlov*
Takeikadzuchia *Kitagawa & Kitamura*
Thodaya *Compton*
Tibestina *Maire*
Tyleropappus *Greenm.*
Zemisne *Degener & Sherff*

CONNARACEAE
Burttia *E. G. Baker & Exell*
Vismianthus *Mildbr.*

CONVOLVULACEAE
Perispermum *Degener*
Strophocaulos *Small*

CORNACEAE
Dorisia *Gillespie*

CRASSULACEAE
Aldasorea *Hort. ex Haage & Schmidt*
Chamaerhodiola *Nakai*
Meterostachys *Nakai*
×Pachyrantia *Walth.*
×Pachyveria *Hort. ex Haage & Schmidt apud A. Berger*
Rhopalota *N. E. Brown*

CRUCIFERAE
Asta *Klotzsch ex O. E. Schulz*
Calymmatium *O. E. Schulz*
×Cheirysimum *Janchen*
Cibotarium *O. E. Schulz*
Cuphonotus *O. E. Schulz*
Dictyophragmus *O. E. Schulz*
Esquiroliella *Léveillé*
Fezia *Pitard*
Hartwegiella *O. E. Schulz*
Hutchinsiella *O. E. Schulz*
Ivania *O. E. Schulz*

CRUCIFERAE:—
Kremeriella *Maire*
Leptoplax *O. E. Schulz*
Loxoptera *O. E. Schulz*
Mitophyllum *O. E. Schulz*
Phlebolobium *O. E. Schulz*
Phlegmatospermum *O. E. Schulz*
Poliophyton *O. E. Schulz*
Pseudoanastatica *Grossheim*
Pseudosempervivum (*Boiss.*) *Grossheim*
×Rapistrosymbrium *P. Fourn. ex Madioţ*
Rhammatophyllum *O. E. Schulz*
Romanschulzia *O. E. Schulz*
Spryginia *Popov*
Thlaspeocarpa *C. A. Smith*
Thylacodraba *O. E. Schulz*
Trichotolinum *O. E. Schulz*
Trochiscus *O. E. Schulz*

CUCURBITACEAE
Siraitia *Merrill*

CYCADACEAE
Eriozamia *Hort. ex Schuster*, in syn.

CYPERACEAE
Apartea *Pellegr.*
Ascopholis *C. E. C. Fischer*
Chillania *Roiv.*
Megarrhena *Schrad. ex Nees*, in syn.
Paramapania *Uitt.*
Principina *Uitt.*
Sphaeromariscus *E. G. Camus*

D

DIDIEREACEAE
Alluaudiopsis *Humbert & Choux*

DIOSCOREACEAE
Illigerastrum *Prain & Burkill*

DIPSACACEAE
Coulterella *Van Tiegh.*
Phalacrocarpus (*Boiss.*) *Van Tiegh.*
Scabiosella *Van Tiegh.*
Zygostemma *Van Tiegh.*

DIPTEROCARPACEAE
Pierreocarpus *Ridley ex Symington*, in syn.
Scaphula *R. N. Parker*

E

ELAEOCARPACEAE
Courimari *Aubl.*; *H. Hallier*

ERICACEAE
Arachnocalyx *Compton*
Botryostege *Stapf*
Buxella *Small*
Cymothoë *Airy-Shaw*
Diogenesia *Sleum.*
Empedoclesia *Sleum.*
Eubotryoides (*Nakai*) *Hara*
Herpothamnus *Small*
Iaera *H. F. Copeland*
Kalmiopsis *Rehder*
Lasiococcus *Small*
Lateropora *A. C. Smith*
Lysiclesia *A. C. Smith*
Mycerinus *A. C. Smith*
Nuihonia *Dop*
Pellegrinia *Sleum.*
Periclesia *A. C. Smith*
Schizococcus *Eastw.*
Tetralix *Zinn*

ERIOCAULACEAE
Rondonanthus *Herzog*

EUPHORBIACEAE
Acanthopyxis *Miq. ex Lanj.*, pro syn.
Anomalocalyx *Ducke*
Ateramnus *P. Br.*; *H. Hallier*
Cecchia *Chiov.*
Ctenadena *Prokh.*

EUPHORBIACEAE:—
Cystidospermum *Prokh.*
Dodecastigma *Ducke*
Paradrypetes *Kuhlm.*
Paxia *Herter*
Polygonanthus *Ducke*
Saipania *Hosokawa*
Sandwithia *Lanj.*
Sclerocyathium *Prokh.*

F

FICOIDACEAE
Aïstocaulon *v. Poelln. ex Jacobsen*
Berresfordia *L. Bolus*
Maughania *N. E. Brown*
×Muirio-Gibbaeum *Jacobsen*
Neogunnia *Pax & K. Hoffm.*
Saphesia *N. E. Brown*
Sarcozona *J. M. Black*

FLACOURTIACEAE
Ancistrothyrsus *Harms*
Chlorocarpa *Alston*
Dendrostigma *Gleason*
Glossodiscus *Warb. ex Sleum.*, in syn.

G

GENTIANACEAE
Chorisepalum *Gleason & Wodehouse*
Urogentias *Gilg & Gilg-Benedict*

GESNERIACEAE
Brachiostemon *Hand.-Mazz.*
Codonanthopsis *Mansf.*
Oshimella *Masamune & Suzuki*
Petrodoxa *Anthony*
Protocyrtandra *Hosokawa*
Saintpauliopsis *Staner*

GONYSTYLACEAE
[vide Thymelaeaceae.]

GOODENIACEAE
Antherostylis *C. A. Gardner*

GRAMINEAE
×Agropogon *P. Fourn.*
×Agropyrohordeum *G. Camus ex A. Camus*
Agropyropsis (*Battand. & Trab.*) *A. Camus*
×Ammocalamagrostis *P. Fourn.*
Aneurolepidium *Nevski*
Arthrochlaena *Boiv. ex Benth.*
Asthenatherum *Nevski*
Bracteola *Swallen*
Brasilocalamus *Nakai*
Calyptochloa *C. E. Hubbard*
Centrochloa *Swallen*
Chaetopogon *Janchen*
Chevalierella *A. Camus*
Cleistochloa *C. E. Hubbard*
Cleistogenes *Keng*
Clinelymus *Nevski*
Crassipes *Swallen*
Cycloteria *Stapf*
×Danthosieglingia *Domin*
Decaryella *A. Camus*
Deina *Alef.*
Dendrochloa *C. E. Parkinson*
Eremopoa *Roshev.*
Gigachilon *Seidl*, in syn.
Graphephorum *Honda*
Hackelia *Vasey ex Beal*
Helictotrichon *Bess. ex Roem. & Schult.*
Heptaseta *Koidz.*, in syn.
Heterochaeta *Bess. ex Roem. & Schult.*
Homalachne (*Benth.*) *Kuntze*
Homopholis *C. E. Hubbard*
×Hordeopyrum *Simonet*
Humbertochloa *A. Camus & Stapf*
Klemachloa *R. N. Parker*
Leiopoa *Ohwi*
Loliolum *Krecz. & Bobr.*
Lycochloa *G. Samuelsson*

GRAMINEAE:—
Malacurus *Nevski*
Nevskiella *Krecz. & Vved.*
Orinus *Hitchcock*
Ottochloa *Dandy*
Oxyrhachis *Pilger*
Pappagrostis *Roshev.*
Parectenium *Stapf*
Peniculus *Swallen*
Psathyrostachys *Nevski*
Pseudarrhenatherum *Rouy*
Sasamorpha *Nakai*
Sclerandrium *Stapf & C. E. Hubbard*
Senisetum *Honda*
Sinarundinaria *Nakai*
Stephanachne *Keng*
Taeniatherum *Nevski*
Tarigidia *Stent*
Tetragonocalamus *Nakai*
Trilobachne *Schenck ex Henrard*
Trisetobromus *Nevski*
Vaseyochloa *Hitchcock*

GUTTIFERAE
Ardinghella *Thou.*
Lebrunia *Staner*
Lorostemon *Ducke*
Spachelodes *Kimura*
Tovomitidium *Ducke*

H

HAEMODORACEAE
Neolourya *L. Rodrig.*

HIPPOCRATEACEAE
Dillonia *Sacleux*
Managa *Aubl.*; *H. Hallier*
Tampoa *Aubl.*; *H. Hallier*

HYPERICACEAE
[vide Guttiferae.]

I

ICACINACEAE
Briquetina *Macbride*
Jobalboa *Chiov.*
Merrilliodendron *Kanehira*
Poraresia *Gleason*

IRIDACEAE
Anaclanthe *N. E. Brown*
Anapalina *N. E. Brown*
Anomalesia *N. E. Brown*
Chasmanthe *N. E. Brown*
Curtonus *N. E. Brown.*
Kentrosiphon *N. E. Brown*
Radinosiphon *N. E. Brown*
Salpingostylis *Small*
Tanaosolen *N. E. Brown*

J

JUGLANDACEAE
Petrophiloides [*Bowerbank*, gen. foss.] *Reid & Chandler*

L

LABIATAE
Amethystanthus *Nakai*
Ascocarydion *G. Taylor*
Asterohyptis *Epling*
Benguellia *G. Taylor*
Isodictyophorus *Briq.*
Nautochilus *Bremek.*
×Origanomajorana *Domin*
Platyelasma *Kitagawa*
Pseudocimum *Bremek.*
Skottsbergiella *Epling*
Stachyopsis *Popov & Vved.*

LAURACEAE
Licaria *Aubl.*; *H. Hallier*
Neocinnamomum *H. Liou*
Yushunia *Kamik.*

LECYTHIDACEAE
Sapucaya *Knuth*

LEGUMINOSAE
Apoleya *Gleason*
Aubrevillea *Pellegr.*
Carrissoa *E. G. Baker*
Chidlowia *Hoyle*
Faidherbia *A. Cheval.*
Gamwellia *E. G. Baker*
Kaoue *Pellegr.*
Martiodendron *Gleason*
Nissoloides *M. E. Jones*
Nogra *Merrill*
Ploca *Lour. ex Gomes*
Ptycholobium *Harms*
Recordoxylon *Ducke*
Salweenia *E. G. Baker*
Sclerothamnus *Harms*
Vataireopsis *Ducke*
Zeydora *Lour. ex Gomes*

LILIACEAE
Amana *Honda*
Antherolophus *Gagnep.*
Camptorrhiza *Hutchinson*
Colania *Gagnep.*
Collospermum *Skottsb.*
Evrardiella *Gagnep.*
Fortunatia *Macbride*
×Gasteraloë *Guillaumin*
×Gasterhaworthia *Guillaumin*
×Gastrolirion *Walth.*
Herreriopsis *H. Perrier*
Hexacyrtis *Dinter*
Kinugasa *Tatewaki & Sutô*
Leptaloë *Stapf*
×Lomataloë *Guillaumin*
×Lomateria *Guillaumin*
Muscarimia *Kostel.*
Racemaria *Rafin.*, in syn.
Sarcoyucca (*Trelease*) *Lindinger*
Tortipes *Small*

LOGANIACEAE
Mitrasacmopsis *Jovet*

LORANTHACEAE
Emelianthe *Danser*
Helicanthes *Danser*
Papuanthes *Danser*
Rhizomonanthes *Danser*
Sogerianthe *Danser*
Steirotis *Rafin.*
Tetradyas *Danser*
Thaumasianthes *Danser*
Treubania *Van Tiegh.*

M

MAGNOLIACEAE
Austrobaileya *C. T. White*

MALPIGHIACEAE
Dolichopterys *Kosterm.*

MALVACEAE
Abortopetalum *Degener*
Armouria *Lewton*
Cephalohibiscus *Ulbr.*
Fioria *Mattei*
Sidopsis *Rydb.*

MELASTOMATACEAE
Bourdaria *A. Cheval.*
Brachypremna *Gleason*
Catonia *P. Br.*; *H. Hallier*
Cyphotheca *Diels*
Enaulophyton *v. Steenis*
Hormocalyx *Gleason*
Krassera *Schwartz*
Merianthera *Kuhlm.*
Tateanthus *Gleason*

MENISPERMACEAE
Dialytheca *Exell & Mendonça*
Paracyclea *Kudo & Yamamoto*
Synandropus *A. C. Smith*
Vimen *P. Br.*; *H. Hallier*

MORACEAE
Calpidochlamys *Diels*
Conocephalopsis *Kuntze*
Craterogyne *Lanj.*
Metatrophis *Forest Brown*

MYRSINACEAE
Collaea *Bert. ex Colla*

MYRTACEAE
Mosiera *Small*
Psidiomyrtus *Guillaumin*

N

NYCTAGINACEAE
Guapira *Aubl.*; *H. Hallier*

O

OCHNACEAE
Fleurydora *A. Cheval.*
Pentaspatella *Gleason*
Roraimanthus *Gleason*
Tyleria *Gleason*

OLEACEAE
Amarolea *Small*
Comoranthus *Knobl.*
Leuranthus *Knobl.*
Noldeanthus *Knobl.*
×Osmarea *Hort.*
Steganthus *Knobl.*

ORCHIDACEAE
×Aëridovanda *Hort.*
Allochilus *Gagnep.*
Ambrella *H. Perrier*
Anaphora *Gagnep.*
Bracisepalum *J. J. Smith*
Chamaegastrodia *Makino & Maekawa*
Changnienia *Chien*
Cheirorchis *Carr*
Chusua *Nevski*
Cladorhiza *Rafin.*, pro syn.
Cryptanthemis *Rupp*
Denslovia *Rydb.*
Dinklageëlla *Mansf.*
Diplanthera *Rafin.*, in syn.
Diplolabellum *Maekawa*
Diteilis *Rafin.*
Donacopsis *Gagnep.*
×Doritaenopsis *Guillaumin*
Eleorchis *Maekawa*
Epigeneium *Gagnep.*
Evrardia *Gagnep.*
Hakoneaste *Maekawa*
Holopogon *Komarov & Nevski*
Kegeliella *Mansf.*
Lepanthopsis *Ames*
Neoclemensia *Carr*
Nipponorchis *Masamune*
×Orchidanacamptis *Labrie*
×Orchimantoglossum *Aschers. & Graebn.*
Pachyrhizanthe (*Schlechter*) *Nakai*
Parhabenaria *Gagnep.*
Polytoma *Lour. ex Gomes*
Pristiglottis *Cretz. & J. J. Smith*
Pseudodiphryllum *Nevski*
Pseudolaelia *C. Porto & Brade*
Schoenomorphus *Thorel ex Gagnep.*
Semiphajus *Gagnep.*
Sphyrarhynchus *Mansf.*
Stevenorchis *Wankow & Kraenzl.*
Thylacis *Gagnep.*
Trichochilus *Ames*
×Vandacostylis *Guillaumin*
×Vandaenopsis *Guillaumin*
×Vandopsis *Hort.*
Vexillabium *Maekawa*

OROBANCHACEAE
Mannagettaea *H. Smith*

P

PALMAE
Brassiophoenix *Burret*
Clinostigmopsis *Becc.*
Diglossophyllum *H. Wendl. ex Drude*, in syn.
Eora *O. F. Cook*
Golubiopsis *Becc. ex Martelli*, sine descr.
Goniosperma *Burret*
Hexopetion *Burret*
Kajewskia *Guillaumin*
Lepidorrhachis (*H. Wendl.*) *Burret*
Masoala *Jumelle*
Mauritiella *Burret*
Paralinospadix *Burret*
Schippia *Burret*
Sindroa *Jumelle*
Taveunia *Burret*

PAPAVERACEAE
Coreanomecon *Nakai*
Meconia *Hook. f. & Thoms.*
Oceanopapaver *Guillaumin*

PHILYDRACEAE
Orthothylax (*Hook. f.*) *Skottsb.*

PINACEAE
Abela *Salisb.*
Abietia *Kent*
Stachycarpites *Ogura*

PIPERACEAE
Anderssoniopiper *Trelease*
Arctottonia *Trelease*
Pleiostachyopiper *Trelease*
Rhynchophorum (*Miq.*) *Small*

PLUMBAGINACEAE
Caballeroa *Font Quer*
Cephalorhizum *Popov & Korovin*
Lerrouxia *Caballero*

PODOSTEMACEAE
Euhydrobryum *Koidz.*
Hydroanzia *Koidz.*
Velophylla *Durand*
Wettsteiniola *Suesseng.*

POLYGALACEAE
Psychanthus *Rafin.*

POLYGONACEAE
Acetosella (*Meissn.*) *Fourr.*
Eriogonella *Goodman*

PONTEDERIACEAE
Hirschtia *K. Schum. ex Schwartz*, pro syn.

PORTULACACEAE
Ketumbulia *Ehrenb. ex v. Poelln.*, in syn.
Limnalsine *Rydb.*

PROTEACEAE
Diploptera *C. A. Gardner*

PYROLACEAE
Monotropastrum *H. Andres*

R

RAFFLESIACEAE
Rhizanthes *Dumort.*

RANUNCULACEAE
Megaleranthis *Ohwi*
Miyakea *Miyabe & Tatewaki*

RAPATEACEAE
Amphiphyllum *Gleason*

RHAMNACEAE
Ampelozizyphus *Ducke*
Siegfriedia *C. A. Gardner*

RHOIPTELEACEAE
Rhoiptelea *Diels & Hand.-Mazz.*

ROSACEAE
Ariosorbus *Koidz.*
Docyniopsis (*C. K. Schneider*) *Koidz.*
Ernestella *Germain de Saint Pierre*
Hesperhodos *Cockerell*
Neuradopsis *Bremek. & Oberm.*
Novosieversia *Bolle*
Oncostylus (*Schlecht.*) *Bolle*
Parageum *Nakai & Hara*
Platyrhodon (*Decne.*) *Hurst*
Saintpierrea *Germain de Saint Pierre*
Sinomalus *Koidz.*

RUBIACEAE
Abramsia *Gillespie*
Botryarrhena *Ducke*
Bradea *Standley*
Chytropsia *Bremek.*
Creatantha *Standley*
Dendrosipanea *Ducke*
Didymoecium *Bremek.*
Dinocanthium *Bremek.*
Discocoffea *A. Cheval.*
Duidania *Standley*
Edithea *Standley*
Einsteinia *Ducke*
Flemingia *Hunter ex Ridley*
×Galiasperula *Ronniger*
Gamotopea *Bremek.*
Gleasonia *Standley*
Hayataëlla *Masamune*
Hintonia *Bullock*
Holtonia *Standley*
Ibetralia *Bremek.*
Naletonia *Bremek.*
Neobaumannia *Hutchinson & Dalziel*
Notopleura (*Benth. & Hook. f.*) *Bremek.*
Petagomoa *Bremek.*
Robynsia *Hutchinson*
Sarcopygme *Setchell & Christoph.*
Spathichlamys *R. N. Parker*
Standleya *Brade*
Trukia *Kanehira*

RUTACEAE
Clausenopsis (*Engl.*) *Engl.*
Dumula *Lour. ex Gomes*
Fagaropsis *Mildbr.*
Muiria *C. A. Gardner*
Nycticalanthus *Ducke*
Oriciopsis *Engl.*
Tecleopsis *Hoyle & Leakey*

S

SAPINDACEAE
Allosanthus *Radlk.*
Belingia *Pierre*
Chiarinia *Chiov.*
Handeliodendron *Rehder*
Hypseloderma *Radlk.*
Palaoea *Kanehira*
Sennia *Chiov.*

SAPOTACEAE
Aningeria *Aubrév. & Pellegr.*
Breviea *Aubrév. & Pellegr.*
Endotricha *Aubrév. & Pellegr.*
Gluema *Aubrév. & Pellegr.*
Krausella *H. J. Lam*
Northiopsis *Kanehira*
Sebertia *Pierre ex Engl. & Prantl*

SAXIFRAGACEAE
Brexiella *H. Perrier*
Mukdenia *Koidz.*

SCROPHULARIACEAE
Chamaegigas *Dinter ex Heil*
Magdalenaea *Brade*
Ophiocephalus *Wiggins*
Tragiola *Small & Pennell*

SELAGINACEAE
Cromidon *Compton*
Globulariopsis *Compton*

SIMAROUBACEAE
Diomma *Engl. ex Ulc*
Picrita *Schumacher*

SOLANACEAE
Eutheta *Standley*

STERCULIACEAE
Gourmannia *A. Cheval.*

STYRACACEAE
Huodendron *Rehder*
Rehderodendron *Hu*
Styracinia *Zoll.*

T

THEACEAE
Pseudoëurya *Yamamoto*

THYMELAEACEAE
Amyxa *Van Tiegh.*
Asclerum *Van Tiegh.*
Craspedostoma *Domke*
Gilgiodaphne *Domke*
Oreodendron *C. T. White*

TILIACEAE
Hainania *Merrill*
Hydrogaster *Kuhlm.*
Rhizanota *Lour. ex Gomes*

TRIURIDACEAE
Lilicella *L. C. Rich. ex Baill.*

U

UMBELLIFERAE
Brachyapium (*Baill.*) *Maire*
Haploseseli *H. Wolff & Hand.-Mazz.*
Macrochlaena *Hand.-Mazz.*
Thorea *Briq.*

URTICACEAE
Decorsella *A. Cheval.*
Nesobium *R. Phil. ex Fuentes*, in syn.
Pseudopipturus *Skottsb.*

V

VERBENACEAE
Bertolonia *Rafin.*
Cleianthus *Lour. ex Gomes*
Hilairanthus *Van Tiegh.*
Karomia *Dop*
Recordia *Moldenke*
Rehdera *Moldenke*

VIOLACEAE
Clelandia *J. M. Black*

VITACEAE
Pareira *Lour. ex Gomes*

W

WINTERACEAE
Pseudowintera *Dandy*
Wintera *G. Forst. ex Van Tiegh.*

INCERTAE SEDIS

Alloiosepalum *Gilg* (Ochnaceae?)
Daphmanthus *F. K. Ward*
Decorsea *R. Viguier*
Ezehlsia *Lour. ex Gomes* (Liliaceae?)
Geanthus *Rafin.* (Iridaceae?)
Mopex *Lour. ex Gomes* (Tiliaceae?)
Pentilium *Rafin.* (Liliaceae?)
Petagnia *Rafin.*
Wilsonia *Rafin.*